



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

D 1,070,078















PROPERTY OF

*The  
University of  
Michigan  
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS





PROPERTY OF

*The  
University of  
Michigan  
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS









Vel. a jíz. K. K. K.

Lith. akcie společnosti Bohemia v Praze.

# ARCHIV

pro přírodovědecké

## PROSKOUMÁNÍ ČECH

vydávané od

OBOU KOMITÉTŮ PRO VÝSKUM ZEMSKÝ

redakcí

prof. dr. KARLA KOŘISTKY a prof. JANA KREJČÍHO

s příspěvky od

E. Bořického, A. Friče, K. Felstmantla, R. Helmhackera, K. Kořistky a J. Vály.

Druhý díl.

První polovice.

S 22 lithogr. tabulemi, 4 mapami a 28 dřevorytinami.

---

V PRAZE.

V KOMISI FRANTIŠKA ŘIVNÁČE.

1877.

98

QH  
7  
.A67  
no. 2  
pt. 1

## Obsah druhého dílu první polovice Archivu.

Práce topografického oddělení (I) obsahující:

1. Terén a poměry výšek hor Jizerských a Krkonošských a jejich výběžků od prof. dr. Karla Kořistky.
2. Druhá řada měřených výšek (list sekce III) od téhož.
3. Dvě mapy s vrstvami výšek Krkonošských a Jizerských hor (list sekce III) od téhož.

Práce geologického oddělení (II) obsahující:

1. Fauna kamenouhelného útvaru v Čechách od prof. dr. A. Friče.
2. Uhlé pánve u Malých Přílep a t. d. od hor. ředitele Karla Feistmantla.
3. Ložiska železných rud u Prahy a Berouna od hor. rady Jos. Vály a hor. inženýra Rud. Helmhackera.
4. Geognostický popis krajiny mezi Benešovem a Sázavou od hor. inženýra R. Helmhackera.
5. Petrografická studia v oboru čedičů českých od prof. dr. Em. Bořického.





**PRÁCE**

**TOPOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ**

pro

**výskum země České**

obsahující:

**Dra. KARLA KOŘISTKY: Poměry terénu, seznam výšek, pak mapy s vrstvami výšek pohoří Jizerského a Krkonošského a jejich výhězků.**

~~~~~

**S 2 chromolith. pohledy, 10 dřevorytinami, 1 tab. profilní a 2 mapami.**

**(ARCHIV PRO PŘÍRODOVĚDECKÉ PROSKOUÁNÍ ZEMĚ ČESKÉ. II. DÍL, I. ODDĚLENÍ.)**





**P R Á C E**  
**topografického oddělení**  
**přírodovědeckého proskoumání Čech**

**v letech 1867—1871 (list sekce III.),**

jež obsahují

**POPIS TERÉNU, SPISEK MĚŘENÝCH VÝŠEK A MAPU VRSTEVNÍ**  
**HOR JIZERSKÝCH A KRKONOŠSKÝCH**  
**S JIŽNÍM A VÝCHODNÍM PODHOŘÍM JEJICH.**

**Sepsal**

**Prof. Dr. KAREL KOŘISTKA,**

dop. čl. cís. akademie nauk ve Vídni, ř. čl. kr. české spol. nauk v Praze a dop. čl. zeměp. spol. v Paříži, jednatel správ.  
komitétu pro přírodověd. proskoumání Čech a představený oddělení topografického, rytíř několika řádův.

**S 2 chromolít. pohledy, 10 dřevorytinami, 1 tabulkou profilův a 2 mapami vrstevními.**

**(Archiv přírodověd. proskoumání Čech. Díl II. odd. I.)**

---

**V PRAZE.**

**v komisi Fr. Řivnáče.**

**1877.**



## Předmluva.

---

Od té chvíle, co vyšel první díl topografických prací přírodovědeckého proskoumání Čech, prošla doba mnohem delší, než očekáváno i obmyšleno; budeť tedy třeba ospravedlniti tohoto opozdění. Již r. 1867 počal spisovatel t. d. měření svá v Krkonoších, kteráž také již r. 1871 v obvodu, tuto vypsáném, dospěla jsou konce svého. Když potom pracováno o sestavení materiálu, takovým způsobem k místu sjednaného, objevila se najednou potřeba dodatečného důkladnějšího vyšetření a tak stalo se, že spisovatel t. d. až do r. 1874 každoročně nucena se viděl, poznovu podívati se do těchto hor. Zabýváje se pak již kresbou mapy vrstevní, stížen jest náhle neduhem očním, kterýž přinutil ho, zanechati na dobu celého jednoho roku všelikého kreslení map, v podstatě zajisté namáhavého; svěřiti pak kresbu řečené mapy vrstevní jiným silám, bylo zhola nemožné, ač nechtěl-li zbaviti se výhody očitě znalosti kraje, kteráž při takových pracích bývá vždy nejpřednější pomůckou. Konečně byl s překážkou i náklad, jehož sestavení a vydání knihy s početnými uměleckými přílohami nezbytně sobě vymáhá a jenž prostředkův našeho výskumu pokaždé do té míry pohlcuje, že vydání takové teprv po delší přestávce lze zase ve skutek uvést.

V následujících listech podávám tedy k veřejnosti práce topografického oddělení, pokud totiž v terénu odb. listu III. měly jsou průchod. V popisu terénu, při výkazech měřených výšek, ba i v samé mapě vrstevní

dostalo se oběma stranám hor Jizerských a Krkonošských, české totiž i slezské, jednostejné skoro píše i zevrubnosti v díle a zdělán takto snad ponejprv dokonale přehledný obraz obou těchto pohoří, kterýž může nyní dobře státi se základem širších studií přírodovědeckých. S obtíží bylo zase podrobné rozčlenění Krkonošů a podhoří jejich. Spravoval jsem se v té příčině zásadami, v prvním již dílu topografických prací těchto vyslovenými, jež nepotkavše se s nížádným odporem, ba od velkých autorit, jakou byl zajisté nebožtík Sydov, za jediné pravé prohlášeny byvše, přidržují se geologického složení půdy co základu, na němž pak rozeznávají tvary, vlivem hydrologických zjevů vzniklé. Nemůžef dnešního dne zajisté podstatná nauka o tvaru půdy obejít se bez výsledkův geologických, jak se to pohříchu v mnohých, nad to silně rozšířených učebních knihách posud ještě se škodou děje; musíť ona spíše o ně se opírat, nesponštějíc se při tom jinak hlediště rozčlenění půdy dle vnějších znamení podoby její.

Od počátku těchto prací topograficko-hypsometrických, což bylo před 13 lety a k čemuž byly jsou podnět daly předchozí práce spisovatele v jiných zemích, — až do dnešního dne dovršil se zajisté veliký obrat v mínění kruhův, v té příčině na hlas vzatých, kterýžto obrat jest spisovateli jakož i všem těm, kdož bojovali jsou s ním za stejné náhledy, s nemalým dosti učiněním. Neboť odpor, s kterýmž nesl se oficielní svět v pracích geodætických proti všelikému vyšetřování poměrův výše, jakož i proti zdělávání map patrových či vrstevních, pominul jest za posledních 20 let poznenáhlu, ba převrhl se v pravý opak, pokud totiž nyní při všech nových vyměřováních země k oné věci přihlíží se právě s největší bedlivostí. Tak přistoupeno mezi jiným před sedmi lety také v Rakousích se strany c. k. zeměpisného ústavu vojenského k novému mapování celé říše, při kterémž pomýšlí se zároveň na zevrubné vyšetřování poměrův výše, jakož i na pomocné užití jich k ustrojení map vrstevních. Jakmile práce tyto ze zemí alpských, jichž snětí ve způsobě takovém skoro již bude ke konci přivedeno, — postoupí také do naší vlasti, nastane úkolu topografického výskumu Čech podstatné zjednodušení, pokud totiž pro ostatní díly země nebude

více třeba podrobného hypsometrického snímání, nýbrž postačí toliko vojenské snění ve vlastní užitek obrátiti a výsledky jeho náležitě zpracovati.

Měřené výšky, jež uvádějí se v druhém oddělení t. knihy, byly koncem r. 1871 skoro všechny již vypočteny. Pamětliv zůstáváje vždycky účelův výskumu českého, t. j. možného rozšíření podstatných vědomostí o přírodních poměrech vlasti naší, nevzpěchoval jsem se arci také nikdy, zdělití všem, kdož jsou si toho žádali, výšky jednotlivých míst; odtud pak pošlo, že nemalý počet mnou vykonaných měření od několika let dostal se k veřejnosti cestou jiných prací od jiných spisovatelův, pohříchu také nejednou bez všelikého pojmenování pramene, jak jsem toho dle pravidel literární slušnosti přece očekával. Pročež prohlašuji zde výslovně, že prostředkem chifry autora, připojené ve spisku výšek ke každé uváděné výšce, hájiti chci priority měření, jehož se tkne.

Na konec nastává mně podobně, jako při dohotovení prvního dílu, příjemná povinnost, vysloviti poděkování všem těm, kdož mne při práci této jsou podporovali. Jsoutě to zejména vzhledem k zemi české p. Gabriel Hendrich, první asistent učební stolice gæodæsie na pražské polytechnice, nyní professor při vyšším hospodářském ústavě v Liebwerdu u Děčína, dále p. Fr. Müller, professor na české polytechnice, kteřížto pánové r. 1868, a sice prvéjší krajinu mezi Starkovem a Novým Městem n. Metují, druhý krajinu mezi Hořici a Josefovem byli jsou měřili a sňali, pak c. k. ministerstvo války a ředitelství c. k. voj. geografického ústavu ve Vídni, kteřížto slavní úřadové svolili jsou k tomu, aby výskumný komitét směl obdržeti fotografické snímky c. k. mapování v ceně výrobní, konečně pak generální ředitelství dráhy státní, rakouské severozápadní a Liberecko-Pardubické, kteráž ochotně zdělila mně výsledky nivellování svých drah.

Co se dílu prusko-slezského tkne, jsemť z obsahu jeho díky povinován váženému druhdy příteli svému, plukovníku král. prus. gen. štábu, Th. E. Sydovnu, jehož předčasná smrt s velikou újmou vědy se obešla; byltě on zejména, kterýž mně poskytnul k volnému užití spisek všech,



v této straně až do jeho časův provedených měření, ježž byl sám pro sebe sestavil. Za touto příležitostí třeba mně i toho vděčně vzpomenouti, že vřelé jeho účastenství, kteréž osvědčoval právě těmito pracím topografickým, hned od samého počátku jejich, přičinilo se prospěšně k zdaru jejich a nepřetržitému postupu.

Podobně budtež ještě díky vzdány p. professoru Jos. Erbenovi v Praze za dobrou radu, kterouž mne v příčině názvosloví, jehož by v tomto českém vydání náleželo užítí, jakož i při místních jmenech, v něm se vyskytujících, mnohonásobně jest podporoval.

V PRAZE, v měsíci září 1877.

**Dr. Karel Kořistka.**

# O B S A H.

## PRVNÍ ODDĚLENÍ.

**Hory Jizerské a Krkonošské s jižním a východním podhořím jejich: Popis  
orografických a hydrografických poměrův jejich.  
(Odb. list III. prozkoumání Čech.)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strana |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §. 1. Přehled obecný . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| (Význam a povaha kraje, tuto líčeného. Str. 1. — Rozdělení jeho dle vlastností<br>orograficko-geologických. Str. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| §. 2. Hory Jizerské . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |
| (Omezení, rozloha a rozčlenění. Str. 3. — Vlastní hory Jizerské. Str. 4. — Geo-<br>logický sklad jejich. Str. 5. — Orografická povaha jejich: Vysoký les, Poledník, hora<br>„u Obrázku“, Vyšší hřeben Jizerský. Str. 5. — Severní podhoří. Str. 9. — Jižní<br>podhoří. Str. 10. — Hlavní rozhraní vodní a sedla. Str. 11. — Žlaby dolinné, v tabul-<br>kách i pro sebe: Nisa, Jeřice, Rychnovský potok, Smědá, Kviza, Jizera, Kamenice.<br>Str. 14. — Procentní poměr rozlohy půdy po patrech. Str. 23.)                                                                                                 |        |
| §. 3. Krkonoše, hřebeny a vrcholy jeho . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25     |
| (Omezení, rozloha a rozčlenění. Str. 25. — Geologický sklad hor. Str. 26. — Pohled<br>na Krkonoše se strany jižní i severní. Str. 27. — Hlavní hřeben: Sinná hora, Vys.<br>Kolo, Lány, Sněžka, vyhlídka z ní, hřeben Schmiedeberský. Str. 29. — Hřeben po-<br>boční: Kotel a Studničná. Str. 41. — Jižní rozsochy: Vlčí hřeben, Heidlova hora,<br>Planina, Černá hora, Kolbovská a Rýchorská hůra. Str. 44. — Severní rozsochy:<br>Kobylí hlava, Korálový kamen, Turné, Kynast, Černý kopec, Brückenberga a Lancut-<br>ský hřeben. Str. 47. — Rozhraní vodní, profily podélné a příčné, sedla. Str. 51.) |        |
| §. 4. Krkonoše (pokračování), jeho žlaby dolinné a střední výška . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53     |
| (Obecná povaha dolin. Str. 53. — Tabulka jejich. Str. 55. — Popis žlabův dolin-<br>ných, a sice na jižní straně: Velká Jizera, potok Sejský, Mumlava, Malá Jizera,<br>hořejší Labe (Sedmidolů), Menší Labe, Javornický potok, Úpa, Ličná. Str. 57. — Na<br>severní straně: Zacken, Hermsdorfská voda, Hajský potok, Lomnice (Věší a Menší<br>stav), Bobrava. Str. 68. — Rostlinstvo v Krkonoších. Str. 73. — Procentní poměry<br>rozlohy půdy po patrech. Str. 73.)                                                                                                                                      |        |
| §. 5. Vrchovina Hruboskalská a Prachovská . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75     |
| (Omezení, rozloha a rozčlenění. Str. 75. — Geologické poměry. Str. 76. — Po-<br>pis po skupenstvích či částech: Hory Sokolské, Hřbet Hruboskalský, Mužská hůra<br>a hřbet, Chloumek. Str. 76. — Profily a rozhraní vodní. Str. 79. — Žlaby v tabulce<br>a o sobě, zejména: Jizera, Libunka, potok Klášterský. Str. 80. — Procentní poměry<br>rozlohy půdy po patrech. Str. 82.)                                                                                                                                                                                                                          |        |

## VIII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strana |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §. 6. Náhorní roviny Horecké a Zárovské s výběžky jejich (Kozákov a Zvíčinská hůra) . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83     |
| (Omezení, rozloha a rozčlenění. Str. 83. — Poměry geologické. Str. 84. — Popis členův: Kozákov, náhorní roviny Horecké, hřbet Zvíčinský, náh. roviny Zárovské s Královstvím. Str. 85. — Rozhraní vodní, profily a sedla. Str. 90. — Žlaby v tabulce i o sobě: Jizera, Olešná, Cidlina, Javorka, Bystřice, Labe, Úpa. Str. 91. — Procentní poměry rozlohy půdy po patrech. Str. 97.) |        |
| §. 7. Východní podhoří Krkonošův: hřbet Svatoňovický (Žaltmanské hory), pískovcové hory či stěny Aberípašské i Polické a Broumovská pánev . . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 97     |
| (Omezení, rozloha a rozčlenění. Str. 97. — Hřbet Svatoňovický. Str. 98. — Stěny Aberípašské a Polické a Hejšoviny. Str. 100. — Broumovská pánev. Str. 106. — Rozhraní vodní, profily a sedla. Str. 107. — Žlaby v tabulce a o sobě: Metuj, Stenava. Str. 108. — Procentní poměry, rozlohy půdy po patrech. Str. 112.)                                                               |        |
| §. 8. Závěrečné rozjímání . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113    |
| (Porovnání čar výšinných všeho tuto popsaného prostranství. Str. 113. — Porovnání žlabův. Str. 115. — Porovnání rozlohy půdy po patrech. Str. 116. — Čáry komunikační. Str. 117. — Význam popsaného kraje v příčině strategické. Str. 118.)                                                                                                                                         |        |

### Lithografické a dřevorytinné pohledy co přílohy textu.

|                                                                            | Strana          | Obrázek titulní |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Obří důl a Sněžka . . . . .                                                | 6               |                 |
| Pohled na Jizerské hory od Frydlantu . . . . .                             | 32              |                 |
| Kameny Dívčí a Mládenčí . . . . .                                          | 35              |                 |
| Pohled na vrchol Sněžky k východu od Obří boudy . . . . .                  | 42              |                 |
| Pozadí údolí Rokytnického . . . . .                                        | 60              |                 |
| Pohled do Sedmi dolů s Kozích hřbetův nad boudou Rennrovou . . . . .       | 77              |                 |
| Pohled na Prachovské skaly od Podhradí u Jičína . . . . .                  | 87              |                 |
| Pohled do hořejšího údolí Labského a na horu Zvíčinskou od Kuksu . . . . . | 102             |                 |
| Skály Aberípašské od severu nad zámkem . . . . .                           | 104             |                 |
| Skalní město u Teplic . . . . .                                            | 111             |                 |
| Pohled do doliny Broumovské se Stohu (Hejšoviny) . . . . .                 | 111             |                 |
| Dva pohledy na celé Krkonoše od jihu i severu . . . . .                    | Obraz závěrečný |                 |
| Tabulka profilů hřbetův i žlabův . . . . .                                 | "               |                 |

## ODDĚLENÍ DRUHÉ.

### Druhý spisek měřených výšek v Čechách. (Odb. list III. výskumu Čech.)

|                                                                        | Strana |                                                          | Strana |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| Uvedení . . . . .                                                      | 123    | 9. Vákolí Sv. Petra (Spindlmühl) . . . . .               | 140    |
| 1. Vákolí Nového města (pod Frydlantem a Frydeberk v Prusku) . . . . . | 127    | 10. " Sněžky . . . . .                                   | 142    |
| 2. " Obrázku (a Flinsberka v Prusku) . . . . .                         | 128    | 11. " Königshanu (a Schmiedeberka v Prusku) . . . . .    | 144    |
| 3. " Albrechtsdorfu . . . . .                                          | 129    | 12. " Železného Brodu a Semil (k západu odtud) . . . . . | 146    |
| 4. " Harachovic . . . . .                                              | 130    | 13. " Semil (vých. díl) a Poniklého . . . . .            | 148    |
| 5. Sedm dolů, Vysoké kolo a údolí Zacken-aké . . . . .                 | 132    | 14. " Jilemnice a Vrchlabí . . . . .                     | 150    |
| 6. Vákolí Warmbrunn (Teplic) a Arnsdorfu . . . . .                     | 134    | 15. " Teplic Svatojanských a Vrajtu . . . . .            | 152    |
| 7. " Tannwaldu . . . . .                                               | 136    | 16. " Zacléře . . . . .                                  | 154    |
| 8. " Vysokého a Rokytnice . . . . .                                    | 138    | 17. " Abráspachu (a Šumperku v Prusku) . . . . .         | 157    |

## IX

|                                                  | Strana |                                                          | Strana |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| 18. Vůkolí Broumova (a Frydlantu v Prusku)       | 160    | 31. Vůkolí Dvora Králové . . . . .                       | 182    |
| 19. " Šonova (a Ludwigsdorfu v Prusku) . . . . . | 163    | 32. " Hradiště Choustníkova a Brusnice německé . . . . . | 184    |
| 20. " Rovenska . . . . .                         | 164    | 33. " Kostelce a Náchoda . . . . .                       | 186    |
| 21. " Lomnice . . . . .                          | 166    | 34. " Hronova (a Chudoby v Prusku)                       | 187    |
| 22. " Horek . . . . .                            | 167    | 35. " Kopidlno (severně odtud) . . . . .                 | 189    |
| 23. " Hostinného a Pilínkova . . . . .           | 168    | 36. " Jičíněvsi a Konecchlumí . . . . .                  | 190    |
| 24. " Trutnova . . . . .                         | 170    | 37. " Hořic . . . . .                                    | 191    |
| 25. " Svatoňovic . . . . .                       | 171    | 38. " Miletina a Vřeštova . . . . .                      | 192    |
| 26. " Police . . . . .                           | 172    | 39. " Jaroměře a Josefova . . . . .                      | 194    |
| 27. " Božanova (a Radkova v Prusku)              | 176    | 40. " Skalice a Nového města n. Metují . . . . .         | 195    |
| 28. " Prachova a Podhradí . . . . .              | 178    | 41. " Nového Hrádku (a Dušník v Prusku) . . . . .        | 197    |
| 29. " Jičina a Železnice . . . . .               | 179    |                                                          |        |
| 30. " Nové Paké a Bělohradu . . . . .            | 181    |                                                          |        |

|                                                              | Strana |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| K vyjasnění tabulky profilův a obou map vrstevních . . . . . | 199    |

## MAPY VRSTEVNÍ:

1. Krkonoše, vrstevní mapa v měřítku 1 : 100.000 k str. 25 a násl. textu.
2. Mapa výšek s 25 metrovými vrstvami. Sekce III. Měřítko 1 : 200.000 co list závěrečný.





## §. 1. Přehled obecný.

Ujímaje se rozpravy své o půdě severočeské zase na témž místě, na kterém jsem jí v prvním dílu Archivu pro vědecké prozkoumání Čech byl přestal, hodlám i v následující stati o to se pokusiti, abych líčení své svedl v obraz možné okrouhlý, pokud ono totiž určeno jest, býti zároveň textem objasňujícím k přiložené mapě výšek. I tenkrát bude mi lze, užiti v prospěch svůj té okolnosti, že v rámci jmenované mapy směřávají se některé osobité a významné základní tvary půdy české bez mála v celé své skutečné rozloze, k čemuž přistupuje ještě ta výhoda, že na přiložené mapě, kteráž činí III. sekci 10tilistové mapy Čech, shledávají se právě nejvyšší a nejdůležitější hory české t. j. Krkonoše.

Jest-li ona část terrainu severočeského, kteráž v prvním dílu Archivu popsána jest byla, zcela způsobna jest k tomu, aby malebným tvarem čedičových a pískovcových vrchův svých, jakož i bohatým rozčleněním a krasami krajinnými vábila k sobě vysokou měrou pozornost skoumatelův i pocestných: tož bude je vysočina, kterouž tuto jmu se popisovati, neméně zajímati, jednak odtud, že se všech stran a pravidelně zdvíhá se povlovně k nádhernému hřbetu horskému, jenž hřbetnou výší svou i nad samé patro smrků a borovic vynikaje, přijímá na se dokonalou povahu výsehorskou, — jednak i odtud, že rozryta jsouc dlouhými, hlubokými a utěšenými údolními, honosí se zároveň nevšedním složením geologickým.

Avšak k prostoru, jež v následujících listech hodlám vylíčiti, váže se jiný ještě, obecnější interest. Jestliť to zejména přechod, kterýž v těchto stranách děje se od orografických a geologických tvarův středoevropských k tvarům východo-evropským. Jakkoli přechod tento nedovršuje se dokonale již zde, nýbrž dále k východu na pokraj oněch podlouhlých hřbetův horských, jejichž ouhrnu dává se starodávní jméno „Sudetův“: tož běže tato rozsáhlá osnova horská v okrese námi popisovaném aspoň svůj počátek, jevíc se zde hned nejmocnějším a nejzajímavějším členem svým, horami totiž „Krkonošskými a Jizerskými“, k nimž dále k východu vážou se tak zvané hory Soví a Rychlebské v Slezích a jihovýchodněji ještě tak zvané „České hřebeny“ či „hory Orlické“, jež pak připojují se posléze k „Hrubému Jeseníku“ či k moravským Sudetům, na jichž východním úpatí dokonává se potom poslední přechod k horstvu Karpatskému.

Kraj, jež zobrazuje přiložená mapa, zanímá prostor nějakých 90 čtver. mil rakouských čili okrouhlým číslem asi 518.000 hektárův nebo 51·8 čtv. myriametrův,

při čemž hleděno i k tomu, aby obraz, jejž mapa poskytuje, vztažen byl dle možnosti i za politické hranice Čech, což i v textu provedeno bude, a sice do té míry, do kteréž třeba jest jíti, aby čtenář zjednatí sobě mohl dostatečný přehled hor zde popsaných v celé jich rozloze. Do té chvíle brávala věšina popisův, k pěkné této soustavě horské se vztahujících, nemalou újmu od té okolnosti, že politická hranice Čech i říše rakouské zrovna běží po nejvyšším hřebeni jejím, dělí ji takto na dvě, bez mála stejné polovice. Pokud tedy popisy těchto hor vycházely buď s česko-rakouské buď s prusko-slezské strany, stávalo se, že druhá, cizí totiž jich polovice buď mlčením prostě bývala pominuta buď svrchovaně nedostatečnou měrou líčena a popisována, a přece objeví se hory ty jen tehdyž veškerou mohutností a pravou svou dojmavostí, bude-li lze přehlednouti a představití si je věrně v celé jich rozloze.

*Nejdůležitější a nejurčitější tvary* oblasti horské, o níž tuto rozprávíme, jsou následující:

1. *Hory Jizerské*, kteréž sice již na sekci II., k I. dílu Archivu přiložené, s část se objevují, jichž hlavní díl ale teprv na naší sekci III. ze severozápadního kouta jejího k jihovýchodu se táhne. Hory tyto skládají se z několika připloštělých a mezi sebou rovnoběžných hřbetův, kteréž na severozápadním konci svém z pravidla srázné svahy ukazující a 700—800 metrů střední výše držíce, mají vrcholy podobně připloštělé (jako na př. kupa „U obrázku“ řečená = Tafelfichte), ale až nad 1100 metrů vystupující a co hřbety samé z jednodušího kamene (žuly) složené. Jediné rozsochy jejich, a sice na jižním a východním okraji, skládají se z prahorních hřidlic.

2. *Krkonoše* složeny jsou z jediného hlavního hřbetu, jenž přímo s Jizerskými horami se váže, nedá se od nich s hledišť geologického nikterak rozeznati, pak z druhého, k onomu rovnoběžného hřbetu a z několika rozsoch. Hlavní hřeben drží se všechen v prosté výši více než 1200 metrů, má celou řadu vrcholů, 1400 až 1600 metrů vysokých (Sněžka), a je větším dílem žulový. Z téhož kamene skládají se též rozsochy na severní straně, any jižní rozsochy obsahují buď rulu, buď svor, buď hřidlice hlinité.

3. *Podhůří Krkonošské na jižní straně* má jak s hledišť geologického tak orografického velice rozdílnou povahu. Vysočina, v samém úpatí Krkonoš rozložená, čili *hořejší podhůří* jejich je od podoby náhorních rovin, na severním okraji svém něco zapadlých a na rudém pískovci spoléhajících, jenž z husta melaphyrem jest protknut, jevícím se buď v podobě mohutných, na temeni skalistých, jinak ale ojedinelých chlumův (jako Levín a sousední hora Císařská), buď ve vidu obdélných hřebenův (jako Kozákov). Prostá výše kraje toho drží se středním vývodem 400 až 500 metrův, any hřbety a chlomy melafyrové až do 600 metrův vystupují. Krkonoše jsou tímto podhůřím jako by pasem s jižní strany otočeny. K pásu tomu připojuje se *dolejší podhůří*, jsouc na mapě naší v orografickém vzhledu snadno od hořejšího rozeznatelné, jakož i geologickým složením svým dokonale rozdílné, pokud totiž na jihozápadě přechází ve vrchovinu Hruboskalskou, v skály Kostské (s vrchem Mužským) a Prachovské, na jihu co hřbet Zvíčinský se jeví, na jihovýchodě pak vrchovinu Zárovskou a tak zvané Království tvoří, kteréžto kraje rozeznávají se od severní oblasti buď malebnými tvary kvádrového pískovce buď povlnnými úbočími

opuky, z kterých jsou složeny, jsouce i nad to mnohem nižší (300—400 metrů), než hořejší podhoří.

4. *Podhůří Krkonošské na straně východní* podobá se v příčině geologického složení svého podhoří jižnímu; jsouť to zejména i zde rudé pískovce, kteréž východní okrají Krkonošů obstupují, toliko že zde místo melafyrův zauímají zvláště charakteristické porfyry, kteréž rudými pískovci na den se prolamujíce, také v tomto okrese táhlé hřbety horské nebo ojediné chlumy tvoří (jako Vraní hory, Haidlovy hory a j.). I kvádrových pískovcův není zde nedostatek, a ony jsou zejména v tak zvaných Žaltmanských a Hejšovinských horách do té míry mocně rozloženy, že malebné formy jejich pestrým tvarům tak zvaných česko-saských Švýcar dobře mohou se vyrovnati. Avšak orografická členitost této vysočiny je zde podstatně rozličná a do té míry spletená, že vždy zůstane s obtíží, východní toto podhoří Krkonošské chtíti rozložiti v přírodní členy jeho.

Kromě těchto okresův orografických spatřuje se na mapě ještě dílec půdy české, kterýž od Náchoda a Nového Města nad Metují k jihu a jihovýchodu se prostíraje. severní konec tak zvaných „hor Orlických“ čili (dle pruského pojmenování) „Českých hřebenův“ činí. Popis tohoto kraje odkládáme však k onomu dílu Archivu, kterémuž ona sekce mapy naší bude připojena, jež větší ostatek hor Orlických obsahuje.

## §. 2. Hory Jizerské.

Mnozí geografové považují hory Jizerské toliko za severozápadní konec Krkonošů, dokládajíce se tím, že hory ony mají jednostejné s Krkonoši geologické složení, a že sedlo či převal, jenž je od sebe rozděluje, spíše lze míti za člen spojný než rozspojný, poněvadž převal ten (na silnici z Nového Světa k Mariánskému slezskému) nalezá se ve výši 800 metrů, ana sama střední výše hřbetů hor Jizerských nevynikne nikdež nad 900 metrů. Chystaje se k tomu, abych o horách Jizerských vzdor tomuto mínění samostatně pojednal, nehodlám jemu tím nikterak upírati jisté míry práva a pravdy. Zatím vidělo se mně, chtějícímu zde do podrobností se pouštět i vedle toho i přehlednosti celku šetřiti, býti s prospěchem účelu této knihy, aby dostalo se osobitého líčení také onomu kraji, jež lid ode dávna, a to dobrým právem, „horami Jizerskými“ nazývati obvyknul. Také lze i několik, neméně vážných důkazův vésti k tomu, aby hory Jizerské aspoň s orografického hlediště co samostatný celek tuto byly líčeny. Chcť zde prozatím jen poukázati k skrovnější jejich výšce nadmořské (800 až 1000 metrů proti 1200 až 1600 metrů v Krkonoších), k odchýlnému tvaru povrchu jejich, jenž každému pozorovateli hned při první návštěvě obou hor bude nepochybným, konečně také k pestrému, na pohled velice nepravidelnému rozčlenění hor Jizerských, přirovnávajíc je totiž ke Krkonošům.

*Jmena* dostalo se horám Jizerským od řeky Jizery, kteráž v nich se temní, a to zase pochodí nejspíše od slova „Jezero“, poněvadž Jizera má svůj počátek z nepočetných drobných stavích čili jezerech, kteréž na samém hřbetu horském v prostranných a slatinných korytech jeho se spatřují. Jiní učenci (zejména i Palacký)



srovnávají jmeno „Jizera“ s cizími Jsar, Jsère a t. d., vlastníce mu tedy výslovně původ keltský.

*Hranice* půdy, kterouž hodlám tuto přičísti k území čili oblasti hor Jizerských, určuje se těmito čarami: K západu a jihozápadu čára, kterouž položil jsem v dílu prvním Archivu (st. 106.) co hranici hor Ještědských na severovýchodní straně jejich a kterouž na 2. listu mapy lze sobě vyhledati, totiž řeka Nisa výše hranic zemských od Hrádku na Chrastavu a Liberec až k Rychnovu, odtud pak čára jdoucí na Mukařov k Malým Skalám při Jizeře, na jihu pak Jizera sama od Skal směrem na Brod Železný a Semily až k Ernsttálu, na východ zase Jizera přes Poniklé a Jablonec až k Vurzelndorfu, odtud potok Mumlava (u Harachovic) a výše silnice na přič přes hory k Marientálu a Petrovicům slezským vedoucí, k severovýchodu údolí potoka Menšího Zackenu a řeky Kvízy (Kvidža, Queiss) až k Frydeberku, na sever od Frydeberku asi podél silnice až k hranici zemské a podél této k Závidovu a Ostřici Lužické při řece Nise, odkudž zase činí Nisa až k pomezí u Hrádku hranici proti západu.

Území, takto omezené, pokrývá plochu 981·12 čtver. kilometrů čili 17·05 čtv. mil rakouských i lze je rozdělit na *tři okresy*, kteréž arci nemají všudež dosti určitých hranic mezi sebou; jsou to zejména: *vlastní hory Jizerské, dále severní a jižní podhůří jejich.*

Vlastní hory Jizerské v užším slova smyslu nalézají se v prostředku oblasti hor Jizerských, činíce kmen horský čili souhoří, 900—1000 m. vysoké, s některými vrcholy ještě vyššími. Široké hřebety tohoto pohoří prostírají se k jihozápadu, jihu a jihovýchodu a majíce mezi sebou údolí, způsobem poloměrův se rozbíhající, nabývají při konci svém neobyčejné šířky, odkudž pochodí, že kraj jimi prostupovaný běže na se aspoň v dolejší části své podobu náhorních rovin. Dolejší tento kraj i s výběžky jeho lze odtud a tím spíše mysliti sobě co samostatný okres horský, od vlastního pohoří Jizerského rozdílný, poněvadž na něm také jeden určité omezený příčný hřbet se vypíná, jenž po vsi Černé studnici jmeno své máje a směru od ZJZ k VSV se přidružuje, honosí se také osobitým složením geologickým. K severu a severozápadu naopak svažují se hory Jizerské srázně a mají všudež okraj určité vytknuté. V této straně přidružuje se k nim vrchovina, slabě rozvlněná s nečetnými kupami, činíce takto severní podhoří jejich.

*Vlastní* či *vnitřní hory Jizerské* mají, jak již povéděno, tvar souhoří čili hmotného kmene horského, kterýž největší výše dostupuje vrcholem, při samé hranici zemské položeným, kterémuž říká se „U obrázku“ (Tafelfichte). V příčině *orografického rozčlenění* svého skládá se toto pohoří z jednoho hlavního hřbetu, jenž obloukem od Černé hory blíž Olbersdorfu na východ až k Obrázku se prostírá; zahýbaje se při tom něco k jihu, — pak z několika příčných hřbetův, kteréž rozbíhajíce se hvězdovitě od hlavního hřbetu, na západním konci ukazují směr jihozápadní, na východním jihovýchodní, v prostředku pak jižní.

*Hranice* tohoto souhoří znamená se proti severu náhlou vkleslinou půdy, kteráž od řeky Kvízy blíž Ullersdorfu směrem k Novému městu a k Libverdě, odtud pak údolím řeky Smědé až k Frydlantu běží, dále pak, a sice směrem na Dittersbach, do údolí potoka Rychnovského přechází a severně k dolejší Nise táhne. Západní a jihozápadní mezi činí pak Nisa sama nahoru až k Jablonci, jižní mezi

zase čára, odtud k Smržovce a Tanvaldu, pak k Příchovicům a Harachovicům vedená. Jihovýchodní a východní hranice posléze jest určena od samé přírody dolinami Věčného a Menšího Zackenu, pak údolím hořejší Kvízy až zase k Ullersdorfu.

Ale i s *hledišť geologického* lze toto území vlastních hor Jizerských s dostatečnou určitostí vymeziti, pokud ono bez mála úplně shoduje se s obvodem jisté odrůdy žuly, kteréž zeměznalci říkají „granitit“. Podstatná hmota této horniny skládá se z živce barvy naháčové až hnědé, jenž vydobuje se v podobě hlatí buď jednoduchých buď dvojitých a 2 až 4 centimetry dlouhých; dále z bílého oligoklasu, z šedých až hnědých zrněk křemene a s okrouhlých štítkův tmavozelené až černé slídy. Veliké hlatě orthoklasové dávají tomuto granititu sloh porfyrovitý, objevující se následkem zvětření druhdy u velikém množství a hustě pohromadě. Některé partie tohoto kamene větrají a rozdrobují se velice snadně, any jiné partie, na pohled jednostejné v složení svém, drží naopak velmi pevně pohromadě, vzdorující takto dlouho větrání. Odtud právě pochodí, že voda dešťová zvětřalé a rozrušené části tohoto kamene vyplakuje a odnáší, any druhé, hutnější totiž, na místě ostávají, berouce takto na sebe podobu stěn a turní, kteréž v osamělosti své na plochých hřebetech horských nebo i v stráních dosti širokých údolí pocestného podivením naplňují. Kromě granititu, kterýž jest hlavní horninou vlastních hor Jizerských, spatřuje se na severovýchodním konci jejich i rula hojně býti rozšířena, pokud totiž nejvyšší vrchol celého toho pohoří, t. j. Obrázek, jakož i hřeben, odtud k východu vycházející (tak zv. Vysoký hřeben Jizerský), skoro jen z této druhé horniny složeny jsou. Součástí této ruly jsou bělomodrý živec, jako mléko bílý oligoklas, bílý, silně našedivělý křemen a hnědá nebo bílá slída. I tato hornina podobá se ostatně velice žule, jež úzkým pruhem podél severního kraje jmenovaného granititu se táhne, lišíc se od něho jediné slohem svým. Také svor nalezá se na východním rohu Jizerských hor, zejména u Paseky Schreiberovy (Schreiberhau).

S *hledišť orografického* jsou vnitřní hory Jizerské, jak již řečeno, vlastně souhořím od podoby ellipsy, jejíž větší osa je asi 35—40, menší 20 kilometrů dlouhá, při čemž velká osa přidržuje se směru od západu k východu, malá od severu k jihu. Tato ellipsa je na severním obvodu svým nejmocněji vypouklá či vyvýšena (přes 1100 m.) a svažuje se k jihu, západu a východu povlovně, k severu ale srázně, a sice do údolí řeky Smědé. Severní toto okrají nezachovává ostatně také nikterak pravidelnosti oblouku elliptického, nýbrž běží od náhorní roviny tak zv. Vysokého lesa (Hohenwald) délkou 14 kilometrů přímo k východu, zahýbá se pak u Veissbachu (Bělé) pod pravým úhlem k severu, načež u Nového města přechází mírným obloukem na VJV, činíc odtud levý břeh hořejší Kvízy a levé boky údolí jejího.

Pohledneme-li na hory Jizerské se strany severní, otevře se nám velikolepý k nim pohled, jak toho přiložený obrazec (viz stranu následující) přibližným jest dokladem. Ze širokého údolí řeky Smědé (Wittig, jinak též Schmieda) prostírá se nejprv až k patám hor široká, povlovně vystávající rovina, jak souvislými všemi tak ojedinelými dvorci osazená, jež leží mezi bohatými lučinami a úrodnými rolemi, majíce asi 300 m. střední výše nadmořské. Na obrubě tohoto dlouhého pásu zdvihá se pojednou půda v podobě vysoké, lesem pokryté plasy se sráznými straněmi, a sice hned k výši 600—700 metrů, a v této vysoké poloze vynikají nad hustý

Pohled na Jizerské hory od Frydlantu.



Vysoký háj Oheznok

Březá Mittelneichen Východka

Hojubník

Poledník

hvozd až do prosté výše 800 metrů mocné skály, buď samotným turním či věžím, buď zavřeným stěnám či zděm se podobající. Odtud nahoru vystupuje půda zase povlovně, a jsouc střídavě lesem nebo pastvištěmi porostlá, přijímá na se podobu buď plochých kup, porůznu rozsetých, buď širokých a dlouhých hřbetův, kteréž paprskovitě k jihozápadu, jihu a jihovýchodu se rozbíhají. Jsoutě to zejména ony malebné partie skalní, jež pocestné zvláště k sobě vábí, pročez také o tomto severním kraji čili svahu hor Jizerských nejvíce se ví a vypravuje, any ostatní končiny jejich skoro jen od milovníkův botaniky bývají navštěvovány. Poněvadž předěl říčná ve vnitřních horách Jizerských věším dílem tohoto severního okrají jejich se přidržuje, jsou také údolí zdejší velice krátká, jakkoli jinak četná. Vstávajíť pomalu všecky z doliny řeky Smědé, a však dostihnuvše dolejšího patra lesův, zdvíhají se náhle, a na hořejším konci krátkých těchto dolův spatříš zvláště po jarních sněžích a deštích, any stříbrné pruhy vodní rychle spouštějí se přes stěny skalní, jimiž doly ty se zavírají, — tvoříce takto počátky bystřic, jež přes balvany a kameny dolů k řece Smědé pospíchají.

Jakkoli doly tyto či debře jsou vesměs krátké, vznikají jimi přece obyčejně tak hluboké záhyby a prory v severním svahu hor, že tyto jakoby přirozeně na několik oddílů čili skupenství skrzeně se rozpadají. Jsoutě pak *skupenství*, takto povstávající, a síce směrem od západu k východu, zejména tato: *Náhorní rovina Vysokého lesa* na nejzazším západním konci vnitřních hor Jizerských, v podobě téměř dokonale kruhovitě, lesem zarostlé plochy o 3 kilom. průměru s dvěma plochými kupami, z nichž jedna nazývá se Vysoký les (Hohenwald), jsouc 645 m. vysoká, druhá pak Vysoký Kámen (Hoher Steinberg) o 618 m. výše; skupenství, řečené *Špičák* (Spitzberg), složené z pěti lesem zarostlých, směrem od Z k V seřaděných kup, jichž výška mění se mezi 645 a 700 metry a jichž nejvýchodnější, tak zv. Grubberk („Nad jamou“) končí se skalní stěnou, k jihu skloněnou, která chová v sobě tak zv. „Čertovou jámu“ (Teufelsloch). Třetí skupenství, t. j. skupenství *Poledníka* (Mittagsberg) skládá se

těž z řady skalistých štítův, kteréž jsou: Koňská hlava, Strán Scharfova (Scharflehne), Brachstein, vlastní Poledník (859·4 m.) a Sviňská hlava (Saukuppe). Skupenství tak zv. *Holubníka* (Taubenhaus 1070 m.) a *Poledních kamenův* (Mittagssteine) vyniká zvláště přírodní krasou, pokud totiž Holubník, jenž je od podoby málo vypouklé hlavy s pěknou vyhlídkou, na severním svahu svém pojednou v divokou stěnu se proměňuje, „Skalami krásné Máří“ (Schöne Marienfelsen) se nazývající, ano z Poledních kamenův, jež v podobě podivných skalistých klepův čili turní k sobě se řadí (mezi nimi tak zv. „Nos“, „Ořech“ = Nussstein a j.), bystřice Černý potok dolů se pouští, čině takto jeden z nejpěknějších slapův v těchto horách. Odtud vzdálí asi 3 kilom. k JV spatřuje se prostranná a plochá kupa, kteréž říkají „*Na Vyhlídce*“ (Sieh- nebo také Sichhübel), jež má zase řadu ojedinelých klepů a 1122 m. výše, zasluhujíc jména svého odtud, že z ní volná a rosáhlá vyhlídka k výšinám celého pohoří Jizerského se otvírá. Posledním skupenstvím, ale zároveň nejznamenitějším v této severní straně hor Jizerských, jest zajisté hmotné *skupenství* „*Obrázku*“ (Tafelfichte); z dosavadní řady daleko k severu vybíhající. Nejvyšší temeno tohoto skupenství záleží z velice ploché, okrouhlé a 1200 metrů v průměru držící kupy, pěknými smrky porostlé, z nichž jeden druhdy asi obrázek nějakého svatého nosíval. Kupa ta je skoro dokonalou rovinou, s níž vody sstékati nemohou, a proto je tu půda močálovitá či slatinná. Asi 400 m. od hranice zemské stojí také znamení triangulační, a to ve výši nadmořské 1125 metrů. Pro ploskost, prostrannost, křoví a stromoví této kupy lze sice na několika místech zjednoti sobě průhledu k podnožnímu kraji, volné ke všem stranám vyhlídky ale nepozíješ nikde, jakkoli místo to je nejvyšší v celém pohoří Jizerském. Něco rozsáhlejšího pohledu lze sobě způsobiti vystoupením na tak zvaný „Stožek“ (Heufuder), asi 1400 metrův odtud vzdálený, kterýž v podobě ploché kupy jen něco málo metrů nižší jest, ale již na pruské půdě se nalezá. Z ploché kupy „U obrázku“ vybíhají čtyři krátké hřbety čili rozsochy k severu, jež do roviny Novoměstské náhle se svažují, prvé však patero strmých štítův tvoříce, jež průřezem po 750 metrech výše mají: jsouť zejména směrem od Z k V tak zv. vrch Kulmrichův (Kulmrichsberg), Sviňský vrch (Sauberg), Mědný vrch (Kupferberg), Rapický vrch a „Žéz“ (Brandhöhe), jež všechny těsným polokruhem Obrázek obkličují. Tímto skupenstvím počíná útvar zarudlé ruly, jež vytisknuvši panující dotud granitit, severovýchodní křídlo hor Jizerských potom skládá. V těchto místech mění se také dokonale dosavadní směr hlavního hřbetu, převrhne se totiž v obecný směr horstva Sudetského, t. j. od severozápadu k jihovýchodu. Také jinačí teď celé pohoří ráz a vnější tvar svůj potud, pokud proměňuje se rozhodně ve hřbet, k oběma stranám stejně se svažující a věším dílem z ruly složený, kterýž znám jest pod jménem „*Vysokého hřebene Jizerského*“. Nad tento hřeben, jenž má výše hřbetné 850—900 m., vynikají některé, jinak málo vypouklé a skrovně nad něj vyvýšené kupy, jako „Vysoký hřeben“, „Obrovský hřeben“ (Riesenkamm) a j. Při Bílé Kamení (Weisser Flinsberg) roztupuje se však jednotný posud hřeben do dvou členův. Hořejší přidržuje se směru prostě východního i vyznamenává se skupenstvím zvětralých klepů žulových, kterýmž říkají „Vysoké kameny“ (Hochstein, také „Abendburg“!) a kteréž 890 až 920 m. vysoké jsouce, poskytují pěkného pohledu jak na velehory tak do nížiny okolo Teplíc slezských (Warmbrunn). Druhý člen převrhne se v směr jihovýchodní,

tvoří plochou kupu, „Theisenhübl“ (Tisová) řečenou (870 m.), a spojuje u Boud Prokšových hory Jizerské s Krkonoši.

Níže této hlavní osy zdvižení, kterouž jsme právě byli popsali, nabývá souhoří Jizerské směrem ke všem ostatním stranám tvaru více rovinatého a jen geologické síle vodní (účinkům vyrytí a vyplakování) náleží přičísti, že jeví se býti rozděleno do několika, paprskovitě se rozbíhajících hřbetů, jež na hořejším konci čili při kmeni svém všechny zase se scházejí, způsobující tu 800—1000 metrů vysokou, slabě vypouklou náhorní rovinu s několika rovněž málo vypouklými kupami. Rovina tato, mezi kterouž ostatně široké, málo ještě vypláklé doliny zapadají, je posud hustým hvozdem zarostlá a netoliko v žlabech údolí svých, nýbrž i nahoře na temeni skoro všudež slatinná. V pravdě lze celé vlastní pohoří Jizerské považovati za jediné, rozsáhlé rašeliniště, jehož těžení nevešlo ale posud ještě v obyčej. Velké toto prostranství je také posud velmi skrovně osazeno; toliko tři vesnice, Christianstál totiž, pak Věcí a Menší Jizera, nad to pak řídké, osamotnělé boudy čili sruby lze tam spatřiti, jako Vítkův domek (Wittighaus), Börndlovy a Pavlovy domky a j. v., kteréžto poslední bývají po věčině útočištěm drvoštěpů, jakkoli se v nich za letní doby salašnictví provozuje. Cest najdeš v těchto končinách velmi málo a jsoutě věcíím dílem pěšiny pro drvoštěpy nebo voznice pro dříví, jen na čas vydržované, jež zase zarůstají, jak mile paseka je vyklížena. Na těchto slatinných rovinách pramení se také potokové hor Jizerských, jež níže potom se spojují, řekám těchto hor dávají počátku. V náhorních korytech a úpadech, jež drží nejhlubší vrstvy rašeliny a nejvíce jsou vodou prosáklé, nedaří se více lesu, na jehož místo tu nastupují mokré, prostranné louky (blaně). Z nich je tak zv. louka Jizerská se vsí Věcí Jizerou nejrozsáhlejší, majíc dobře 3 kilom. zdělí a těšíc se pro vzácné rostliny své hojně návštěvě milovníkův botaniky.

Hlavnější hřbety, kteréž z jmenované náhorní roviny vycházejí, jsou směrem od západu k východu tyto: Vrch „*Lange Farbe*“ řečený (nejspíše „Dlouhé Brdo“), široký totiž a plochý hřbet, jenž od Velkého kamene se odštěpuje a jihozápadním směrem se prostírá, mezi Ruprechtici (Ruppersdorf) a Einsiedlem na několik drobnějších, skalistými věčinou štíty korunovaných hřbetův se rozpadává, z nichž Ostrý kámen (Scharfberg) a Dračí skála (Drachenberg) jsou nej památnější, Dlouhé Brdo pak nejvyšší (876 m.). — Hora *Vysoká* (Hohe Berg), kterýž nad Buschdorfem tak zv. Malinovým vrchem (Himbeerberg) počíná, prostírá se odtud k JJV i dělí se potom taktéž do několika menších hřbetův, z nichž vlastní Vysoká má 740 m., ostatní pak, proti Liberci stojící, ještě menší výšku (500—600 m.). Oba tyto hřbety, jichž střední směr je jihozápadní, spouštějí se při jihozápadním kraji svém, kdež na několik chlumů se rozpadají, velmi srážně k údolí řeky Nisy (350—400 m. prosté výše), kteréž zde značně se rozšiřuje, i ukazují na stránkách svých zhusta holé skály. Druhý právě vzpomenutý hřbet je ostatně poslední hřbet na západě, kterýž ještě směru jihozápadního se drží, všechny ostatní hřbety odtud k východu se spatřující, převrhují se již více méně v směr jihovýchodní, kterýž ovšem s hlavním směrem Krkonošův se srovnává, jakkoli pozornosti skoumatele sotva bude moci ujíti, že hřbety tyto, tedy také údolí, v nich vybrázděná, nezřídka oblibují sobě náhlou změnu tohoto směru od JZ k SV (směr Krušných hor), v kterémž se také udržují, jakkoli jen na neveliké vzdálenosti. Z této druhé třídy podhorních hřbetův

Jizerských uvádím zde tak zv. *Vysoký hřeben*, zcela krátký to hřbet, jenž vychází od Malinového vrchu a prostíraje se k jihovýchodu, v soujmené kupě největší výše své (870 m.) dostupuje a tak zvaným Ktlem (Kesselstein 649 m.) u Rýnovic se končí. Dále náleží sem *hřbet Maxdorfský*, kterýž u myslivny Frydrychsvaldské od hlavního hřebene se odštěpuje, vrchem Maxdorfským výšky 789·5 m. dosahuje, načež široko se rozloží, do hořejšího údolí Nisy mezi Jabloncem (520 m.) a Smržovkou se spouští a západně tohoto místa, jehož poloha již k východu se kloní, mělké sedlo nedaleko Krčmy u Kříže (Kreuzschänke, 631 m.) způsobuje, prostředkem kterého vlastní hory Jizerské vcházejí ve spojení s jižním podhůřím svým, s chlumm totiž Studnickým (Schwarzbrunnberg). Při jižním okraji Maxdorfského hřbetu spatřiti lze několik, téměř dokonale kuželovitých chlumnů, jež slozeny jsou z čediče, zde na povrch vyniklého, v jednotvárném jinak obrazu této končiny příjemnou způsobují změnu. Z nich zasluhuje hora Buková (Buchberg, 854 m.) od pěkného, nádherného tvaru svého předního připomenutí. Proti ní zdvíná se mezi Tannvaldem a Albrechtsdorfem (Albrechtsem) jiný, a sice ojedinělý se všech stran a končitý kužel čedičový, totiž Špičák (817), kterýž ale v smyslu orografickém nepatří více k hřbetu Maxdorfskému, nýbrž k *Velkému hřebeni*, od Ktle sem se prostírajícímu, na kterémž nalezájí se hlavaté vrcholy, jako vlastní Velký hřeben (1006 m.), Brdo (Farbenberg 870 m.) a Vrch krásné Máří (869) blíž Antoniwaldu. Jakkoli tento slabě sklenutý a lesnatý hřbet jednotvárným pohledem téměř přímočárně zdělí 6 kilom. od SSZ k JJV dolů se táhne, spouští se přece proti Albrechtsdorfu náhle prostředkem srázné plasy a způsobiv zde sedlo, asi 1 kilom. široké, zdvíná se ihned zase pod jménem vzpomenutého již, pěkného Špičáku, z něhož otvírá se utěšená v pravdě vyhlídka do dolin a debrí hor Jizerských, zvláště do obou údolí řeky Desny, pak na dlouhý hřbet vrchu Studnického, k východu pak ke hřbetu Příchovickému a na skálu Štěpánovu (Stefanshöhe). Rovnoběžně s Velkým hřbenem táhne se na pohled zcela jemu podobný hřbet dolů až ke vsi Desné (Dessendorf), jenž u lidu nazývá se „Wenner-Kaspersbruch“ (t. j. Lom Kašpara Wernera) a má 901 m. výše. Posléze náleží zmínku učiniti ještě o dvou rovnoběžných hřbetech, kteréž ke vzpomenutému Velkému hřebeni s jedné a k Vysokému hřebeni Jizerskému s druhé strany těsně přilehají a jichž první „Vlašským hřbenem“, druhý „Prostředním hřbenem Jizerským“ se nazývá.

*Vlašský hřeben* (Welscher Kamm) má prý jméno své po Italianech či Vlaších, kteříž za minulých století dle dosti oprávněné pověsti zde drahé kameny hledávali. Bylyť zajisté za starších dob hory Jizerské nemálo prosluly co naleziště drahých kamenů, poněvadž se v rozsypech potokův a řek zdejších ne zřídka granaty, safíry, pak vzácný jinak Iserin (železo titanové) nalezájí a druhy mnohem hustěji nalézaly, což zajisté vábilo skoumatele nerostův i sběratele drahých kamenův do údolí zdejších. Nejvyšší místo tohoto hřbetu jsou klepy řečené „Na Zámčích“ (Schlössersteine, 1005 m.) na jižním konci jeho, odkudž se pak hřbet rychle k sedlu Vurzelzdorfskému (778 m.) svažuje. — *Prostřední hřeben Jizerský* počíná pod vrchem Keiligem t. j. v oné končině, kteráž prostředkem nízkého sedla prameny potoka Smědé od zřídla Věcí Jizery odděluje. Máje nejprve podobu přímočarného skalistého hřebene, jehož nejvyšší místo „Straní Zimnrovou“ (Zimmerlehne, 1017 m.) se nazývá, svažuje se tento hřeben potom srázně do údolí Věcí Jizery, kteréž je mezi vzo-

menutým již Vysokým hřebenem a tímto Prostředním hřebenem uloženo. V přičině onoho t. j. Vysokého hřebene Jizerského řečeno již výše, že i z něho poboční hřbet, a sice směrem od SZ k JV vybíhá, t. j. tak zv. Tisová (Theisenhubel 870 m.), jenž u Boud Prokšových prostředkem převalu, málo ostatně sníženého, hory Jizerské ke Krkonošům připojuje.

Vylíčív takto poměry vlastního souhoří Jizerského, přistupuji již k popsání *severního a jižního podhůří* jeho, pokud obě totiž s orografického hlediska co taková poznávají se dávají.

Na *straně severní* jest úpatí vlastních hor Jizerských a náhlý sklon jeho lemován dosti plochou pahorkovinou, jež má 300—350 m. střední výšky nadmořské, a svažujíc se povlovně k dolinám řek Kvízy, Smědé a Nisy, vyznamenává se některými pěknými kopci a kuželitými vrchy, kteréž o samotě stojíce, vysoko nad podnožní pohorkatý kraj se vypínají. Tvar tohoto kraje je ovšem přímým účinkem geologického složení jeho; neboť rula, která netoliko horu „U obrázku“, nýbrž i celé severovýchodní odnoží hor těchto, totiž Vysoký hřeben Jizerský, tvoří, obkládá úzkým pruhem i severozápadní okrajek vnitřních hor Jizerských, jsouc takto jich nejspodnějším patrem a podvaleni. Na ní spoléhají v podhoří ještě vrstvy břidlic hlinitých, kteréž slabě jsouce sklenuty, způsobují nižší kopce a přehyby oné pahorkoviny, any záhyby čili prohlubeniny její mocnými vrstvami diluviálních písků, štěrků a hlin jsou vyplněny. K tomu obklopuje ještě tento severní okrajek hor Jizerských širokým obloukem řada průlomů čedičových, dávajíc takto vznik oněm pěkným hřibům a kuželům, o nichž jsem již byl zmínku položil a z nichž vrch „Vysoký háj“ řečený (Hohe Hein, 491 m.) bude asi podoby nejnádhernejší. Jiné důležitější vrchy tohoto složení jsou vrch Steinmerichův (418 m.) na JV Frydlantu, zámecký vrch Frydlantský (400 m.), pak vrch Humerichův (510 m.) severně Šumvaldu (Schönwald).

Na *straně jihozápadní* činí hory Ještědské s hlinitými břidlicemi svými, jež tu ale jsou strmě pozdvíženy, s hlediskem geologického přirozené jakés podhůří hor Jizerských, jakkoli s hlediskem orografického lze je vždy za osobité pohoří míti, čehož i já místem svým jsem se přidržel.\*)

Na *jižní straně* jeví se podhůří Jizerské v podobě dvou širokých a rovných hřbetův, kteréž, jak již výše řečeno, dodávají této končině povahy náhorní roviny, jsouce nad to s hlediskem orografického vlastně jen pokračováním dvou hřbetův vnitřních hor Jizerských. Hřbet Maxdorfský totiž, sníživ se mezi Jabloncem a Smržovkou k těsnému sedlu 631 metrův, ukazuje ihned zase nové pokračování v podobě vypnuliny půdy, k jihu běžící, kteráž ale již po 500 metrech délky přepažena jest pěkným, v přímočarém směru běžícím, příčným hřbetem, t. j. *horou Studnickou* (Schwarzbrunn-Berg). Osa tohoto hřbetu směřuje od ZJZ k VSV, protýkajíc tedy skoro pod pravým uhlím směrné čáry hřbetův, z Jizerských hor sem docházejících. Hřbet Studnický vyznamenává se nad to ostrým temenem svým, jakož i souměrným sklonem k jihu i severu, jenž v úpatí jeho činí asi 5—6, při hřebeni ale 15 až 20 stupňů, k čemuž přistupuje i zvláštnost geologického složení; neboť všechen

\*) Srov. mou zprávu o pracích topograf. oddělení věd. prozkoumání Čech v l. 1864—1866. V Praze 1869. Strana 98 a n.

hřbet Studnický zdělán jest ze žuly. Tato žula vyniká vytečným krystallinickým slohem, liší se od granititu sousedního souhoří Jizerského netoliko zažloutlou barvou svého orthoklasu, nýbrž i velice světlou, ba skoro bílou slídou. Hřbet Studnický je 6·5 kilom. dlouhý, na západním konci svém asi 3 kilom., na severovýchodním nezcela 2 kilom. v základech široký a má do sebe podobu roztáhlé střechy. Na tomto hřbetu, jehož slímě zachovává se v střední výši 750 m., spatřuje se řada štítův, větším dílem takovými skalnými stěnami ozdobených, jakéž v žule Krkonošské rády se vytvářejí, a z kterých jsou nejznamenitější: vlastní hora Studnická (869 m.) s pěkným pohledem k horám Jizerským a Krkonošským, pak hora Múchova (782 m.), jež mají mezi sebou těsné sedlo blíže domků Beranských o 761 m. výše. — Široký nástavek, jehož bylo dostalo se hřbetu, od Jizerských hor sem postupujícímu skrze horu Studnickou, zůstává ostatně i na jižní straně této hory v platnosti, jakkoli útvar půdy přechází zde v hlinité břidlice. Náhorní rovina, takto vytvořená, zachovává 450—500 metrů střední výšky (Jirkovský vrch 600 m., Jilové 514 m., Bzí 429 m.), svažuje se náhle k východu proti potoku Kamenici, k jihu proti Jizeře (Brod Železný 281 m.) a vchází na západě prostředkem sedla Mukařovského (571 m.) ve spojení s Ještědem.

Druhý ze vzpomenutých širokých hřbetův, jež jižním podhořím Jizerským lze nazývati, t. j. *hřbet Příchovický a Vysoký*, je vlastně pokračováním Vlašského hřebene, výše námi popsaného. Prostíraje se tímž směrem, zejména od SSZ k JJV, běže vlastně počátek svůj u Vurzelsdorfu (778 m.), a povýšiv se prodloužením svým až na 800 m., klesá zase povlovně k jihu až na 700 a 650 m., nastavuje jak proti dolině Jizery (k V), tak proti dolině potoka Kamenice (k Z) srázné straně. Délka tohoto hřbetu činí od Vurzelsdorfu až k Loukovu 3 kilom., střední šířka jeho u Vysokého 1·7 kilom. Na plochem jeho prostranství zdvíhají se některé vysoké chlupy, jako Skála Štěpánova (Stefanshöhe) severovýchodně Příchovic (958 m.) s pěknou, velice oblíbenou výhlídkou, pak t. zv. „Petrůskovy vrchy“ u Vysokého (714 m.). Obecným videm však má i tento hřbet, jenž je také z břidlic hlinitých složen, podobu náhorní roviny, slabě rozčleřeně, kteráž zejména u Vysokého (700 m.) neklamně v tomto způsobě na odív se staví.

Prvé než vylíčením sníženin tohoto horského terrainu, t. j. vylíčením údolí a sedel jeho, počneme se zanášeti, přihledněmež ještě krátce k *předěli vodní*, kteráž severní svah těchto hor od jižního dělí a s kterouž směrově netoliko tekoucích vod, nýbrž i čar komunikačních těsně jsou spojeni. V následujícím přehledu najde čtenář nejprvé nejvýznamnější body lomu hlavní předěle vod Jizerských, a sice počnouce od řeky Nisy u Žitavy až k potoku Zackenu u Petrovic, pak i příčný jich průřez čili profil od Obrázku až k Brodu Železnému směrem na vrch Studnický náležitě sestaveny.

*Nejdůležitější body předěle vodní hor Jizerských jsou tyto:*

|                                          | Výška prostá<br>v metrech | Vzdálenost od<br>nejblížejšího místa<br>v kilom. | Směr  |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1. Řeka Nisa u Žitavy . . . . .          | 246·5                     | 2·7                                              | SZ—JV |
| 2. Hořejší Ullersdorf, návrší . . . . .  | 289·0                     | 4·2                                              | „     |
| 3. Vecvald, hřbet sev. kostela . . . . . | 354·0                     | 3·4                                              | Z—V   |



|                                                                                        | Výška prostá<br>v metrech | Vzdálenost od<br>nejbližšího místa<br>v kilom. | Směr    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 4. Jechlův kopec (Gichelsb.), vrchol . . . . .                                         | 569·0                     | 1·5                                            | Z—V     |
| 5. Hoř. Vítkov (O. Wittig), rozhraní sedla proti<br>potoku Slatině (Schlade) . . . . . | 485·0                     | 1·3                                            | ZJZ—VSV |
| 6. Vysoký les, nejvyšší místo v polích na<br>temeni. . . . .                           | 638·9                     | 2·4                                            | Z—V     |
| 7. Olbersdorf, rozhraní sedla na silnici od Li-<br>berce k Frydlantu . . . . .         | 554·7                     | 1·8                                            | JZ—SV   |
| 8. Černá hora, štít . . . . .                                                          | 682·1                     | 1·3                                            | SZ—JV   |
| 9. Špičák, sev. Filipsguntu, štít . . . . .                                            | 700·9                     | 0·5                                            | ZJZ—VSV |
| 10. Pomezní buk v sedle mezi Grubberkem a<br>Špičákem . . . . .                        | 596·4                     | 0·5                                            | Z—V     |
| 11. Grubberk („Nad jamou“), vrchol . . . . .                                           | 703·6                     | 0·8                                            | „       |
| 12. Čertova jáma, sev. výstupek . . . . .                                              | 649·7                     | 0·5                                            | ZSZ—VJV |
| 13. Sedlo na silnici z Filipsguntu k Raspenavě . . . . .                               | 479·8                     | 1·0                                            | „       |
| 14. Scharfova stráň, nejvyšší štít . . . . .                                           | 691·3                     | 1·1                                            | „       |
| 15. Poledník, kupa lesem zarostlá . . . . .                                            | 859·4                     | 2·4                                            | SZ—JV   |
| 16. Velký kámen . . . . .                                                              | 850·0                     | 2·5                                            | ZJZ—VSV |
| 17. Ptačí skála (Vogelkuppe) . . . . .                                                 | 1066·5                    | 1·3                                            | SZ—JV   |
| 18. Holubník, nejvyšší místo . . . . .                                                 | 1070·0                    | 5·8                                            | Z—V     |
| 19. „Na vyhlídce“ (Siehhübel), temeno . . . . .                                        | 1123·0                    | 2·4                                            | JZ—SV   |
| 20. Nad Vítkovým domkem (Wittighaus), sedlo<br>mezi Menší Jizerou a Smědou . . . . .   | 898·0                     | 2·0                                            | J—S     |
| 21. Kupa v Prostředním hřebeni Jizerském . . . . .                                     | 1000·0                    | 2·4                                            | „       |
| 22. Obrázek, temeno . . . . .                                                          | 1124·1                    | 4·7                                            | ZSZ—VJV |
| 23. Vysoký hřeben Jizerský, kupa blíž Hřeben-<br>ných domků (Kammhäuser) . . . . .     | 931·0                     | 6·0                                            | SZ—JV   |
| 24. Sedlo při Bílém Kameni (Weisser Flinsberg) . . . . .                               | 850·0                     | 4·0                                            | Z—V     |
| 25. Vysoký kámen (Hochstein), nejvyšší místo . . . . .                                 | 886·0                     | 4·8                                            | „       |
| 26. Potok Zacken v Petrovicích . . . . .                                               | 420·0                     |                                                |         |

*Příčný průřez (profil) od Obrázku k Studnickému vrchu:*

|                                                                        | Výška prostá<br>v metrech | Vzdálenost od<br>nejbližšího místa<br>v kilom. | Směr  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 1. Heinersdorf, kostel . . . . .                                       | 375·5                     | 2·5                                            | S—J   |
| 2. Kupa v lese Heinersdorfském . . . . .                               | 563·0                     | 1·6                                            | „     |
| 3. Nové město, náměstí . . . . .                                       | 475·0                     | 4·9                                            | SZ—JV |
| 4. Obrázek, temeno . . . . .                                           | 1124·1                    | 2·4                                            | S—J   |
| 5. Kupy v Prostředním hřebeni Jizerském . . . . .                      | 1000·0                    | 2·0                                            | „     |
| 6. Nad Vítkovým domkem, sedlo mezi Menší<br>Jizerou a Smědou . . . . . | 898·0                     | 2·4                                            | SV—JZ |
| 7. „Na vyhlídce“, temeno . . . . .                                     | 1123·0                    | 2·2                                            | S—J   |

|                                                | Výška prostá<br>v metrech | Vzdálenost od<br>nejbližšího místa<br>v kilom. | Směr    |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 8. Veliký hřeben, štít . . . . .               | 1006·0                    | 2·6                                            | SSZ—JJV |
| 9. Brdo (Farbenberg), kupa . . . . .           | 879·3                     | 1·4                                            | "       |
| 10. Puchlov (Puchloch), kupa . . . . .         | 855·0                     | 2·5                                            | S—J     |
| 11. Albrechtsdorf, nad kostelem . . . . .      | 625·0                     | 0·9                                            | "       |
| 12. Špičák, štít . . . . .                     | 817·0                     | 1·7                                            | "       |
| 13. Tanvald, v údolí pod kostelem . . . . .    | 524·0                     | 2·1                                            | "       |
| 14. Studnický vrch, domky „Za vrchy“ . . . . . | 718·0                     | 3·0                                            | SV—JZ   |
| 15. Studnický vrch, nejvyšší štít . . . . .    | 869·4                     | 2·3                                            | SSZ—JJV |
| 16. Huť (Labau), chalupy u mlýna . . . . .     | 510·0                     | 5·3                                            | S—J     |
| 17. Brod Železný, při Jizeře . . . . .         | 281·0                     |                                                |         |

Z přehledův těchto poznává se, že výšky štítův a sedel v západní končině hor Jizerských podstatně liší se od oněch, jež nalezájí se v ústřední a východní končině jejich; držít se v prvéjší končině zajisté výšky štítův mezi 500—700 metry, výšky sedel mezi 400—600 m., any v ostatních dvou končinách výšky štítné nad 900, výšky sedelné nad 800 m. vystupují. *Důležitějších sedel* čili převalů je vlastně jen tři, poněvadž jen těchto po míře jich polohy a povahy k přechodům silničním lze užití. Jsoutě zejména sedlo Olbersdorfské, Filipsgruntské a převal u Vítkova domku. *Sedlo Olbersdorfské* jest po výšce starodávní čarou spojnou mezi údolím hořejší Nisy u Liberce a mezi údolím řeky Smědé u Frydlantu (srov. sekci II. naší mapy výšek) i těší se nyní také dobré silnici, kteráž ale nadržuje se nejkratšího, přes toto sedlo vedoucího, zcela přirozeného směru k Chrastavě, nýbrž běží se od Liberce (350 m.) nejprv přes dva výběžky hor Jizerských u dol. Ruppersdorfu (390 m.) a Schönbornu (423 m.), načež teprvé, a sice z údolí Einsiedelského (381 m.) povlnově k Filipswerku a Olbersdorfu vzhůru se točí, aby posléze na severním svahu hor prostředkem dvou krátkých ohbů, v stráni založených, k Frydlandu (285 m.) dolů se spouštěla. Vlastní sedlo Olbersdorfské má 4 kilom. zdělí, a jsouc velice ploché a rovné a chalupami této vsi osazené, není nad to do hřbetu horského nikterak zapadlé, čehož příčina jest ta, že jižní údolí nemá sobě shodného na severní straně, odkudž také nedošlo na hlubší vypláknutí toho sedla skrze sílu vodní. K severu panuje tento převal nad podnožním nízkým krajem v celé rozloze jeho, t. j. od údolí Nisy a Smědé u Rybářova (Reibersdorf) v Sasích až k Raspenavě, i jest tudíž s nemalou důležitostí strategickou i taktickou.

Druhé důležité sedlo jest *sedlo Filipsgruntské*. Zůstavivše silnici z Einsiedlu k Olbersdorfu v levo, ubíráme se údolím potoka Görsského, kteréž k SV do hor se zarává, jsouc jak v žlabu svém, tak na lázích pokryto chalupami, jež patří nejprv k Ullersdorfu v Lese (Busch-Ullersdorf), výše pak k Filipsgruntu. Teprv u posledních chalup Filipsgruntských zdvihá se půda rychle, vedouc lesem, a sice mezi Grubberkem a Scharfovou straní k jmenovanému sedlu (480 m.) Na severní straně spouští se shodné údolí silným sklonem dolů k Raspenavě (300 m.). Toto sedlo je v lano hor mnohem hlouběji zaryté, než Olbersdorfské, úzké a těsné i jestit jím zejména kromě silnice nedávno i železná dráha z Liberce k Frydlantu prolomena, pročez poznává se také co nejdůležitější a nejkratší čára spojovací mezi

oběma městy. Třetí sedlo konečně jest sedlo u *Vítkova domku* čili *sedlo Bělské* (Weissbach), nalezající se asi 4 kilom. vzdálí od konce této vsi k JV. K tomuto sedlu vedou s jižní strany dvě cesty. Jedna, přicházejíc z údolí řeky Kamenice od Tanvaldu, kamž nyní také již železnice od Brodu dosahuje, běře se nejprv po široké silnici k Tiefenbachu, odkudž však opouštějíc tuto silnici, obloukem dále k Vurzelsdorfu vedoucí, vniká přímo k severu do těsné, divoké doliny Černé Desny, kdež lze jen špatné voznice užiti, jež nahoře za posledními domky vsi Suširny (Dörre) dokonce v pouhou pěšinu se mění a podél osamotnělých Börndlových domků běžíc, u domku Vítkova se končí. Druhá cesta vede z náhorní roviny u Vysokého a Příchovic po široké silnici až k Schenkenhahnu u Vurzelsdorfu, kdež tato do pěkné silnice, od Tanvaldu k Harachovicím běžící, téměř pod pravým uhlím se ústí. Odtud táhne se cesta přímým téměř směrem co zemská a okresní silnice po jihovýchodní lesní stráni Vlašského hřebene mezi skalami „na zámcích“ a tak zv. „Čistou pasekou“ (Blanke Haide), povlovně a stejně se zdvihajíc, až ke vsi Menší Jizeře (kteráž též Buchberk a Wilhemshöhe se nazývá a 825 m. vysoko leží), odtud pak jde již skoro v rovině slatinným údolím potoka Menší Jizery k SSZ k vlastnímu převalu, ve výši 898 m. položenému, z něho pak náhlým sklonem dolů k lesní krčmě, „Wittighaus“ řečené (830 m.). Cesta ode vsi Menší Jizery k Vítkovu domku, druhdy dobrá voznice, zanedbává se a pustne nyní vůči-hledě, k čemuž se také spodní slatinná půda nemálo přičiňuje. Jestli ale zajisté s přáním, aby orgány veřejné správy obrátily zase zřetel svého k této důležité spojné čáře mezi údolím hořejší Smědé a údolím Nisy s jedné a lidnatými dolinami Kamenice a Jizery s druhé strany, jejíž oprava a zachování tím spíše dá se provést, poněvadž celá ta trať z Vurzelsdorfu až do Weissbachu jen 18 kilom., trať pak nejvíce zanedbaná, t. j. mezi Menší Jizerou a Vítkovým domkem, toliko 6½ kilom. dlouhá jest.

Přístupmež nyní již k vyličení *údolí* celé té oblasti hor Jizerských. Hory Jizerské jsou v takové končině Čech položeny, kdež ony dva hlavní směry, jimiž hory této země vyzdviženy jsou, na vzájem se protínají. Odtud pochodí, že v horách Jizerských nevládne ani jeden, ani druhý tento směr výhradně; neboť hlavní hřbet (jak již výše doloženo) běře se obloukem, k jihu vypouklým, skoro přímo od západu k východu, any hřbety příčné paprslkovitě z hlavního hřbetu a všemi směry se rozbíhají, pokud tyto mezi JZ a JV leží. S těmito různými směry snášejí se také čáry snížení, t. j. žlaby dolin, pročez také náleží ve shodě s hřbetnými čarami dolinu hořejší Smědé od Weissbachu (Bělč) až k Dörflu (Vísce) pod Frydlantem, dále údolí potoka Rychnovského, údolí Nisy od Jablonce až k Hrádku, posléze ale také údolí Jizerské od Ernsttálu až k Vranové vyhlásiti za údolí podélná, všechna ostatní údolí pak, buď v celé, buď v částečné jich délce, míti za příčná.

V tabulce níže stojící položil jsem přehledně *nejdůležitější žlaby dolin*, pokud tyto veškerou oblast hor Jizerských buď obkličují, buď pronikají, načež teprv bude možné, přistoupiti k porovnání vážných zajisté poměrův sklonu. Jmenem „žlab dolinný“ znamená se však ona čára, kteráž dána jest směrem přirozené povahy půdy v dolině samé, neberouc nikterak v přičet neustavičné řečiště vod, v ní tekoucích. Sloupcům, jež řečená tabulka obsahuje, nebude asi širších výkladův třeba; chciť jen připomenouti, že v sloupci pod nadpisem „spád“ nalézají se po obvyklém

obě udání, na kolik jednotek vodorovné vzdálenosti výšky o jednu jednotku jde, a že lze obdržeti tečnu uhlu výše čili uhlu sklonu údolí samého, dělí-li se, nacházející se v sloupci „rozdíl výšky“ číslem, v sloupci „vzdálenost“ obsaženým.

Přehled žlabů dolinných v horách Jizerských a okolo nich.

| Název žlabu:                                    | Odkud až kam:                   | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdíl<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Údolí Nisy                                      | Prameny Nisy nad Frydrychš-     |                                             |                                            |                                                |                                           |            |
|                                                 | valdem . . . . .                | 760·0                                       | 30·0                                       | 1·5                                            | 1: 50                                     | S—J        |
|                                                 | Frydrychšvald, u pily . . .     | 730·0                                       | 152·0                                      | 2·6                                            | 1: 17                                     | SSZ—JJV    |
|                                                 | Gränzenzendorf, nejh. chalupy . | 578·0                                       | 162·7                                      | 6·6                                            | 1: 41                                     | SSV—JJZ    |
|                                                 | Jablonec (Gablonz) u mlýna .    | 415·3                                       | 72·6                                       | 10·0                                           | 1:137                                     | JV—SZ      |
|                                                 | Liberec, řeka Nisa . . . .      | 342·7                                       | 73·4                                       | 12·7                                           | 1:174                                     | JV—SZ      |
|                                                 | Chrastava, ústí potoka Görsu    | 269·3                                       | 20·8                                       | 13·5                                           | 1:641                                     | JV—SZ      |
|                                                 | Hrádek, poloha u Harty . . .    | 248·5                                       | 35·5                                       | 12·8                                           | 1:356                                     | JJZ—SSV    |
|                                                 | Hirschfeld (v Sasích) . . . .   | 213·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                                                 | Radiměřice (Radmeritz) v        |                                             | 23·0                                       | 16·5                                           | 1:717                                     | JJZ—SSV    |
|                                                 | prusk. Slezsku . . . . .        | 190·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                                                 | Od pramene až k Radiměřicům . . |                                             | 570·0                                      | 76·2                                           | 1:134                                     | JJV—SSZ    |
| Údolí potoka<br>Görsu . . .                     | Pramen pod Poledníkem . . .     | 780·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                                                 | Vstup do Filipsguntu . . . .    | 407·7                                       | 372·3                                      | 4·3                                            | 1: 12                                     | VSV—ZSZ    |
|                                                 | Einsiedel, u kostela . . . .    | 381·2                                       | 26·5                                       | 2·5                                            | 1: 93                                     | SV—JZ      |
|                                                 | Stok s Nisou u Chrastavy . .    | 269·3                                       | 111·9                                      | 9·5                                            | 1: 85                                     | VSV—JJZ    |
|                                                 | Od pramene až k ústí . . . .    |                                             | 510·7                                      | 16·3                                           | 1: 32                                     | VSV—JJZ    |
| Údolí p. Rych-<br>ovského (v Sa-<br>sích) . . . | Počátek pod kopcem Stein-       | 390·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                                                 | merichovým . . . . .            |                                             | 71·4                                       | 4·3                                            | 1: 60                                     | V—Z        |
|                                                 | Hermesdorf, hořejší chalupy .   | 318·6                                       | 73·6                                       | 5·0                                            | 1: 67                                     | VJV—ZSZ    |
|                                                 | Rychnov, u kostela . . . . .    | 245·0                                       | 32·0                                       | 6·2                                            | 1:194                                     | JV—SZ      |
|                                                 | Hirschfeld, stok s Nisou . . .  | 213·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                                                 | Od pramene až k stoku . . . .   |                                             | 177·0                                      | 15·5                                           | 1: 88                                     | VJV—ZSZ    |

| Jmeno žlabů:                  | Odkud až kam:                                      | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdí<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 4. Údolí Smědé                | Prameny n. Vítkovým domkem                         | 950·0                                       |                                           |                                                |                                           |            |
|                               | Veissbach (Bělá), hořejší ko-<br>nec vsi . . . . . | 500·0                                       | 450·0                                     | 5·0                                            | 1: 11                                     | JV—SZ      |
|                               | Haindorf, u kostela . . . .                        | 303·4                                       | 196·6                                     | 5·0                                            | 1: 25                                     | V—Z        |
|                               | Frydlant, ústí pot. Řasnice .                      | 274·0                                       | 29·4                                      | 10·6                                           | 1:366                                     | VJV—ZSZ    |
|                               | Veigsdorf, při ř. Smědé . . .                      | 231·0                                       | 43·0                                      | 9·2                                            | 1:214                                     | VJV—ZSZ    |
|                               | Radiměřice (v pr. Slezsku) .                       | 190·0                                       | 41·0                                      | 13·4                                           | 1:327                                     | VJV—ZSZ    |
|                               | Od pramene k ústí . . . . .                        |                                             | 760·0                                     | 43·2                                           | 1: 57                                     | VJV—ZSZ    |
|                               |                                                    |                                             |                                           |                                                |                                           |            |
| 5. Údolí Kvízy<br>(v Prusích) | Prameny pod Bílým kamenem                          | 800·0                                       |                                           |                                                |                                           |            |
|                               | Flinsberk, u kostela . . . .                       | 472·0                                       | 328·0                                     | 9·5                                            | 1: 29                                     | JV—SZ      |
|                               | Frydeberk, při řece . . . . .                      | 390·0                                       | 82·0                                      | 7·2                                            | 1: 86                                     | J—S        |
|                               | Od pramene do Frydeberka .                         |                                             | 410·0                                     | 16·7                                           | 1: 41                                     | JJV—SSZ    |
| 6. Údolí Jizery               | Prameny pod „Obrázkem“ .                           | 900·0                                       |                                           |                                                |                                           |            |
|                               | Jizerská louka . . . . .                           | 853·2                                       | 46·8                                      | 3·2                                            | 1: 68                                     | SZ—JV      |
|                               | Ústí p. Menší Jizery . . . .                       | 760·0                                       | 93·2                                      | 7·8                                            | 1: 84                                     | SZ—JV      |
|                               | Vurzelsdorf, u Strikrových<br>domků . . . . .      | 555·0                                       | 205·0                                     | 7·5                                            | 1: 36                                     | S—J        |
|                               | Jablonec, u kostela . . . . .                      | 470·0                                       | 85·0                                      | 8·4                                            | 1: 99                                     | S—J        |
|                               | Ernsttál . . . . .                                 | 390·0                                       | 80·0                                      | 10·7                                           | 1:134                                     | S—J        |
|                               | Semily . . . . .                                   | 329·5                                       | 60·5                                      | 13·5                                           | 1:221                                     | V—Z        |
|                               | Železný Brod . . . . .                             | 278·0                                       | 51·5                                      | 8·2                                            | 1:158                                     | V—Z        |
|                               | Vranová u Malých Skal . . .                        | 273·1                                       | 4·9                                       | 6·8                                            | 1:139                                     | V—Z        |
|                               | Od pramene až k Vranové .                          |                                             | 627·9                                     | 66·1                                           | 1:105                                     | S—J        |
|                               |                                                    |                                             |                                           |                                                |                                           |            |
| 7. Údolí Kamenice             | Počátek pod Holubníkem .                           | 950·0                                       |                                           |                                                |                                           |            |
|                               | Christiantál, sklenná hut . .                      | 791·2                                       | 158·8                                     | 3·0                                            | 1: 19                                     | SV—JZ      |
|                               | Tanvald, ústí p. Desny . . .                       | 448·0                                       | 343·2                                     | 16·0                                           | 1: 49                                     | SZ—JV      |
|                               | Navarov, pod zámkem . . . .                        | 364·0                                       | 84·0                                      | 7·0                                            | 1: 83                                     | S—J        |
|                               | Ústí do Jizery . . . . .                           | 300·0                                       | 64·0                                      | 7·8                                            | 1:122                                     | S—J        |
|                               | Od pramene až k ústí . . . .                       |                                             | 650·0                                     | 33·8                                           | 1: 52                                     | S—J        |

Uvažujmež nyní o sobě dolinné tyto žlaby v předchozí tabulce přehledně  
sestavené.

Údolí řeky Nisy bere počátek svůj v revíru Frydrychvaldském, a sice  
v jižních končinách jeho, vzdálí asi 1 kilom. od hořejší pily tamější, a to podobou

velice mělkého koryta ve výši 760 metrů. Toto koryto odlučuje se žebrem, jen něco málo metrů vyšším, od jiných dvou, jemu podobných koryt, z nichž jedno obsahuje zřídla Černé Nisy, druhé pak prameny Červeného potoka, níže k potoku Blatnému a s ním ke Kamenici jdoucího, čímž způsobuje se tak zajímavý zjev, že z těchto míst rozbíhají se hvězdovitě tři směry žlabův k JZ, J a JV. Tato tři koryta a vedle nich i mnohá jiná podobného mělkého tvaru spatřují se na oné prostranné náhorní rovině pohoří Jizerského, kteráž horami Holubnskem, Dlouhým Brdem, Vysokým hřebenem a Černou horou zavřena jest a na kteréž vznikají tímž časem početní pramenové, čínice půdy, jež bez výjimky ze žuly se skládá, močálovitou a slatinnou. Máje poměrně jen velice povlný spád 1 : 50, běží žlab Černé Nisy jižním směrem až k Frydrychswaldu, kdež potok teprv jme se hloub v půdu se zarýváti, ubíraje se mezi strmými stráněmi Vysokého a Frydrychwaldského hřebene spádem 1 : 17 a směrem jihovýchodním k Sv. Jánů (Johannesberg) a ke Gränzendorfu. Zde nalézá se údolí jeho 578 m. nad mořem. Tu však pozměňuje žlab potoka poznova směru svého, obrací se na hranici mezi Harcdorfským a Grünwaldským revírem od severu k jihu, což trvá až k pšle, pod Jabloncem stojící, při čemž drží se spádu 1 : 41, promykaje se nad to těsnou debří. Až sem vede od počátku údolí, a sice napořád podél potoka samého, voznice, jinak dosti chatrná, i nebudeť nemístné, považovati tento díl údolí Nisského v podstatě za údolí příčné. Od zmíněné pšly Jablonecké jinačí však toto údolí pod úhlem 60° směr i povahu svou, převrhujíc se v směr severozápadní a stávajíc se takto údolím podélným. Za nedlouho rozvírají se i stráně jeho; vlastní břehy řeky zůstávají sice napořád srázné, nemajíce však z pravidla více než 20 až 40 metrů výšky, ano údolí samo šířky 2 až 4 kilometrův nabývá, zavřeno jsouc povzdálí úbočími hřbetův horských, s obou stran je provázejících, t. j. podnožními výšinami hor Jizerských od severovýchodní, a hor Ještědských od jihozápadní strany. Také spád stává se nyní skrovnějším, klesaje z poměru 1 : 137 až na poměr 1 : 641 (blíž Hartý). Nadmořská výška této části údolí Nisského obnáší u Liberce 343, u Hrádku 249 metrů. Půda skládá se s počátku t. j. pod Jabloncem ještě ze žuly, níže ustupuje tato na pravý břeh, ano břeh levý pokryt jest diluvialními písčky a štěrky; posléze pak, t. j. pod Chrastavou, protýká řečiště Nisy i nejspodnější vrstva břidlic silurských, na den zde vycházejících. Na celé této dolejší trati běží údolím široká, dobře spravovaná silnice, od Liberce pak i železnice. Nad Žitavou, kdež vody jeho proudem potoka Mandavy, s protivné strany přichodícího, se stavují (čímž také skrovný spád žlabu v těchto místech lze sobě vyložiti), mění se směr údolí poznovu, bera se potom od JJZ k SSV. Tato trať, kterouž však jen až k ústí řeky Smědé, t. j. až k Radiměřicům chceme sledovati, setrvává při ubývajícím napořád spádu 1 : 356 až 1 : 717 v jmenovaném směru; žlab údolí je tu s počátku, a sice až k Hirsfeldu také široký, později však sужuje se, jsa po obou bocích lemován vysokými stráněmi. Rozvoj celého údolí Nisského, a sice od počátku jeho až k Radiměřicům, činí 2:49, je tedy neobyčejně velký, což pochodí zejména odtud, že obvodná čára jeho obnáší více, než polovinu oblouku kruhového.

Do údolí Nisského ústí se následující, podstatně důležitější údolí poboční:

*Údolí potoka Gersbachu.* Tento potok, jehož jméno náleží nepochybně vyložiti na slovanské *Jerice* (t. j., jarý, rychlý potok), vzniká pod horou Pöledníkem

ve výši 780 m. skoro při samé předěli vodní, a sice ze dvou pramenův, teče nejprv při silném spádu (1: 12) přímo od S k J, pak od SSV k JJZ, posléze pak od V k Z skrze těsnou žulovou rokli dolů k Filipsgruntu, kdež údolí jeho pojímá v sebe dlel, od sedla Filipsgruntského přichodící, a zahnuvši se zde ve výšce 408 m. pod pravým úhlem, přidržuje se odtud směru od SV k JZ. Spádu ubývá mu zde rychle, a sice až na 1: 80 a 1: 100; touž dobou šíří se údolí Jeřice, čím náhleji totiž se snižuje, tak že šířka jeho od 0·5 až do 1·5 kilom. dochodí, při čemž zachovává nastoupeného směru od SV k JZ až k ústí svému (ve výši 269 m.), leda s jediným ohlbem, do kteréhož pod pravým úhlem u kostela Einsiedelského vchází. Všechna prostranství v údolí, na dlel i stráně po obou bocích jeho, pokryta jsou bez přetržky chalupami a dvorci, kteréž s hora jsouce počítány, skládají osady Gersbach, Filipsgrun, Busch-Ullersdorf, Einsiedel, Novou ves a Chrastavu. Od Chrastavy až k Filipsgruntu běží celým údolím dobrá silnice okresní, kterouž přetíná v samém prostředku jeho u Einsiedlu aerární silnice, z Liberce do Olbersdorfu a Frydlantu vedoucí. Mimo to běže se hořejším dílem jeho, a sice od Einsiedlu až k Filipsgruntu, železnice z Liberce k Frydlantu a Závidovu. Rozvoj údolí Jeřice je skrovný, obnášeje toliko 1·19 přímé vzdálenosti počátku od konce.

*Údolí Rychnovské* počíná se oním nízkým sedlem, kteréž spatřuje se na JZ Frydlantu mezi vrchy Steinmerichovým a Hoffmanovým, a sice ve výšce 390 m. Údolí toto je ustláno v pouhé pahorkatině a majíc spád v poměru 1: 60 až 1: 200, přidržuje se rovnoběžného směru jak k hlavnímu hřebeni Jizerských hor, tak k dolinám Nisy i Smědé, pročez náleží je míti za údolí podélné. Až k Rychnovu (245 m.) jsouc těsné a vysokými, sráznými břehy provázené, rozšiřuje se níže Rychnova až pod Hirschfeld napořád, při čemž břehy jeho zároveň se níží a pohorky, nad povrchní potoka o 40—50 m. vyvstávající, po obou stranách do pozdálí ustupují. Žlab údolí Rychnovského pokryt jest dvorci a chalupami několika lidnatých osad, kteréž jsou: Drhovle (Türchau), Rychnov, Heřmanice (Hermsdorf) a Jetřichovice (Dittersbach), spojené mezi sebou dosti chatrnou voznicí. (Dobrá silnice od Frydlantu u Rychnova obchází však toto údolí na severu.) Rozvoj údolí Rychnovského, jež ostatně jen čtvrtým dílem svým do Čech náleží, obnáší 1·30.

*Údolí potoka Smědé* (Wittig) počíná, jak již řečeno, u Vítkova domku (Wittighaus, 830 m.), kterýž není nic jiného, leč kréma lesní, vzdálená asi 4 kilom. od nejhořejších chalup, k Bělé (Weissbach) patřících. V dolině čili vkleslině půdy, zde počínající, shromažďují se vody početných potoků, jež ze slatin, k S, V a J odtud rozložených, zejména pak pod Klínovou Horou (Keilige Berg), Vyhlídkou a Černou Horou se sbírajíce, způsobují takto dosti mocný a vodnatý potok, Smědá řečený. Ze vzpomenutých žil vodních jest ona, kteráž od JZ přichodíc, Bělou (Weissbach čili Weisse Wittig) se nazývá a v mokré louce (blani) mezi Vítkovou horou (Wittig- nebo Rollberg) a Vyhlídkou se prýští, — bez odporu nejmocnější, jakkoli lid původ řeky vztahuje k druhému, od severu nachodícímu prameni, jenž má jméno „Smědá“ (Schmieda n. vůbec Wittig). Od Vítkova domku, kdež oba pramenové se slévají, spouští se vzpěněná Smědá těsnou, skalistou a lesnatou dobří dolů ke vsi Bělé, a sice spádem 1: 10 až 1: 20 a směrem od JV k SZ, kteréhož údolí její až k Vísce (Dörfel) pod Frydlantem vůbec se přidržuje, pročez hodí se mu právě jméno údolí podélného. Při vsi Bělé rozvrá se dolina pojednou

až na jeden kilometr šíře. (jakkoli břehy, řeku lemující, neztrácejí i zde výšky a příkrostiti), opírajíc se v levo o strmé stráně a skály hlavního hřebene hor Jizerských, v pravo pak o hoky pahorkatiny, kteráž od „Obrázku“ sem se prostírá a nad kterouž čedičové kužele Vysokého Hájce, vrchu Humerichova a j. se vypínají. Údolí Smědé náleží v krajinném vzhledě k nejpůvabnějším dolinám hor Jizerských. Spád jeho z Bělé až k Haindorfu (kdež kostel je ve výši 303 m.) jest 1 : 25, odtud pak až do Frydlantu (274 m.) 1 : 366. Dvě důležité doliny poboční ústí se v ně na této trati. Jestliž to zejména dolina Černého potoka, kteráž vede k pěknému slapu téhož potoka, se stráně Poledníka se spouštějícího, u Mildeneichu pak ono krátké údolí, kterýmž přichází se od známých lázní Libverdských (402 m.). Od Haindorfu až nad Frydlant zachovává údolí Smědé touž povahu, majíc vůbec jen skrovný spád, což odtud pochodí, že u samého zámku Frydlantského nalézá se soutěska s ohbem, jichž vlivem šterky a náplavy, při velké vodě z hor nanášené, mezi Haindorfem a Frydlantem se srážejí a usazují, odkudž půda údolí stává se rovnou, pozbývajíce tynž časem téměř všeliké sváženosti k obzoru. Žlab údolí běže se tu tedy věcí dilem po alluviálním šterku a valouncech, kteréž spoléhají na tvrdých rulách a bridlicích. Od Bělé až k Mildeneichu běží údolím okresní, odtud až do Frydlantu dobrá státní silnice. Pod Frydlantem, kterýž položen jest v malé pěkné kotlině, zavírá se údolí zase, a řeka promyká se tady zatočinami až k obci Vísce (269 m.), tu pak mění údolí naprosto směr svůj, berouc se skoro přímo od J k S, odkudž sluší je v této trati míti za příčné. Břehy jsou nízké a rovné, údolí samo 1 až 1·5 kilom. široké, a výšiny, je provázející, jako tak zv. Buková hora, Gersdorfský kopec a tak zv. Loheberg (t. j. Slatinná hora) na levém, pak Rösselberg a Pertoltický vrch (Berzdorfer Berg) na pravé straně, zdvihají se celkem jen 60—100 metrů nad žlabem údolí, jehož spád drží se tu až k Louce (Wiese) mezi 1 : 200 a 1 : 300. U této osady obrací se řeka i údolí zase k SZ a spojuje se u Radiměric s údolím Nisy. Rozvití celého údolí Smědé obnáší 1·55.

*Údolí Kvízy.* Již výše připomenuli jsme, že od hory Obrázku odštěpuje se dlouhý a vysoký hřbet, hory Jizerské s Krkonoši spojující, jemuž Vysoký hřeben Jizerský říkájí, a že od tohoto hřebene zabíhá k východu rozsocha, na kteréž spatřují se skalisté štíty Bílého Flinsu a Vysokého kamene. Směr hřebene mezi Flinsem a Obrázkem je zrovna od VJV k ZSZ, tedy rovnoběžný k hlavnímu hřbetu Krkonošů. Nejiným směrem běží také, přiléhaje k němu všude na severovýchodní straně, dlouhý žlab vodní, jež na severní straně hřbetu Kamenický (Kamnitz-Berg) provází, a jenž hořejší údolí řeky Kvízy tvoří. Počátek jeho spatřuje se na severním svahu hory Flinsu a sice pod žebrem, jež Vysoký hřeben Jizerský s horou Kamenickou spojuje, zároveň ale také údolí Kvízy od doliny Menšího Zackenu odlučuje, kterouž lze vším právem míti za druhý díl oné dlouhé rozsedliny, jež spoustu Vysokého hřebene Jizerského ostře odděluje od slezského podhoří hor Jizerských. Žebro to nalézá se v prosté výši 803 m. i lze je přejíti po dobré pěšině, spojující osady obou jmenovaných údolí mezi sebou. Od tohoto žebra běže se údolí těsným, lesy zarostlým žlabem dolů ke vsi Flinsberku, any po obou stranách početné, krátké i vodné rokle (na jižní straně je jich 16, na severní nemnoho méně) do něho se istí. V této části údolí shledáš se zhusta s pěknými, divokými obrazy krajiny, zvláště při tak zvaném „Kamenném splavu“ (Steinerne Wöhr), kdež vysoký



slap po skalách dolů se spouští, pak u tak zvaných „Napájedel“ (Tränkefall), kdež potok „Tränke“ z divokého údolí prostředkem prahův do řeky se vlévá. Spád údolí od počátku jeho až k Flinsberku (472 m.) jest 1 : 29. Nedaleko lázní Flinsberských mění se však pojednou povaha jeho i spád dosavadní. Žlab zahýbá se totiž pod pravým úhlem i stává se nyní, převrhujíc se v směr od JJZ k SSV, údolím příčným, při čemž se zároveň na 0·5 až 0·8 kilom. rozvírá. Břehy zůstávají sice aspoň po levé ruce vždy ještě strmé, stráně ale a výšiny, lemující údolí po obou stranách, snižují se a ustupují od břehův čím dál, tím více. Na této trati řadí se jedna osada k druhé; Flinsberk, po něm Ullersdorf, Krobsdorf, Egelsdorf, Stínava (Steine) a posléze město Frydeberk (390 m.) jsou, hle, osady, kterýmiž procházíš, údolím dolů se ubíraje, a kteréž dobrou silnicí, až k nejhořejším chalupám Flinsberským se prodlužující, mezi sebou jsou spojeny. Spád údolí od kostela ve Flinsberku až do Frydeberku činí středním vývodem 1 : 86, rozvití pak žlabu od kolébky jeho až do Frydeberka 1·30. Na celé této trati je řečiště Kvízy v rulu zaryto, jediné mezi Flinsberkem a Ullersdorfem jde žlab přes onen pás břídlíc hlinitých, kterýž k severnímu svahu Obrázku přiléhaje, příčným směrem na Ullersdorf až ke Kamenici a Hirsperku se prostírá. Ostatní pokračování údolí Kvízy nepřestává sice býti zajímavým, avšak leží již mimo meze tohoto popisu.

*Údolí věcí Jizery* počíná se při jihovýchodním úbočí hory Obrázku, kteréž k této straně velice povlovně se sklání a společně s východní straní Klínové hory a západním sklonem Suchého vrchu trojhranné koryto způsobuje, v němž vody z močálů a slatin těchto tří hor se sbíhají, odkudž lze také prameny Jizery dobře do 900 m. výše položit. Z jmenovaného koryta, jež nalezá se v místech, s Pruskem po několik desetiletí sporných, a proto tak od lidu „Sporným kusem“ (Zankstück) jmenovaným, — vychází na české půdě mocný za každé roční doby potok, k JV tekoucí, jenž stihnuv po běhu 2 kil. na hranici zemskou, drží se potom na trati, asi 15 kilom. dlouhé (t. j. až k tak zvaným Strikrovým domkům blíž Wurzelsdorfu) samého pomezí Čech a Slezska. Žlab Jizery, kterýž v nejhořejším dílu svém, t. j. od počátku až k hranici zemské, nejprv mělkou, hustým lesem zarostlou rozsedinou, a sice spádem 1 : 68 byl se ubíral (kterýžto spád vzhledem k vrchovišti řeky v tak vysoké poloze zajisté lze nazvati skrovným), rozstupuje se na hranici povlovně, an les vzdaluje se po obou stranách, dáváje místa mokré louce (blani), 2—3 kilom. široké a 4—5 kilom. dlouhé, kteráž od starodávna „Jizerskou loukou“ se nazývá, a v této výši (750 m.) a v takovém vřkolu zajisté jest zjevem nezvyklým, bývajíce nad to pro vzactné rostliny své od milovníkův botaniky hojně navštěvována. Nad touto loukou shledávají se na levé, severovýchodní straní samotné i v skupenstvích rozestavené chalupy, kteréž i k severu t. j. k Vysokému hřebeni Jizerskému vzhůru stoupají, skládajíce do hromady slezskou ves „Věcí Jizeru“, jinak též „Jizerské domky“ řečenou. Mezi nimi vede pěšina nahoru k hřebeni Jizerskému, odtud pak skrze tak zvané „Domky na hřebeni“ (Kammhäuser) dolů do údolí Kvízy u Flinsberku. Údolí, potud k JV běžící, mění pod domky Jizerskými směr svůj nejprv v jihojihovýchodní, za nedlouho pak přímo v jižní, stávajíc se čím dál, tím těsnější, při čemž vodnatý nyní potok pořád ještě po slatinné půdě se ubírá, jakkoli spodní základové její, podobně co obapolné stráně údolí, z čelnějšího v Jizerských horách kamene, t. j. z granititu složený

jsou. V těchto končinách spatříš také poslední stopy nízké borovice (kleče) a zde ústí se blízko sebe dvě příčné doliny v hlavní údolí Jizerské. Jestli to nejprv od levé (východní) strany, a sice od Tisové stráně (Theissenhübel) přichodící, potočné údolí, kteréž podle sklárny, Karlstál řečené (788 m.), vzhůru vede k jmenovanému vrchu, jenž na temeni svém mocnou turní skalnou jest ozdoben. Nad údolím a v jižní stráni Tisové vede též pěšina k Boudám Prokšovým, na silnici od Harachovic k Marientálu stojícím. Druhé příčné údolí dobíhá zase od k pravé (západní) strany hlavního údolí, a sice v úpatí hory Bukové (keilige Buchberg), z čediče složené, jenž zde granitem se prolomiv, nádhernou kuželitou podobou svou od slabě nakloněných tvarů granitu pěkně se odráží. Tímto příčným údolím nadchází se šumotem potok „Menší Jizera“, kterýž nad Vítkovým domkem svůj počátek máje, v mělké rozsedlině mezi Prostředním hřebenem Jizerským a Vlašským hřebenem nejprv při skrovném spádu až ke vsi Menší Jizeře (jinak též Wilhelmsböhe nebo i Buchberg řečené a ve výši 825 m. položené) teče, potom ale urychleným během k Věči Jizeře pospíchá, do níž v nadmořské výši 760 m. se ústí. Spád hlavního údolí mezi Jizerskou loukou a tímto místem obnáší 1 : 84. Níže odtud, a sice v délce několika kilometrů nalezá se ono prostranství, kteréž pro vzácné své nerosty od mineralogův bývá navštěvováno. Těsnou, divokrásnou debrí berou se nyní sloučení proudové Věči i Menší Jizery nejprv podél chalup, ke sklárně Hoffnungstálu patřících, k J až k domkům Strickrovým (555 m.) Spád této trati drží se poměru 1 : 36 i jeť vůbec největší, jehož se Jizera kdy dodělává. Cest není v této končině, čehož příčinou jest těsnost a příkrý svah údolí; pročež vsi Věči a Menší Jizera mají spojení mezi sebou prostředkem voznice, po jižním sklonu Stráně Zimmrovy vedoucí, kteráž u Menší Jizery v okresní silnici se mění a ve východní stráni Vlašského hřebene k Polubnům a Wurzelndorfu dolů se běže. U Strickrových domků rozšiřuje se údolí poněkud, tak že bylo lze, vésti v něm asi délkou půl kilom. státní silnici, kterouž jede se od Tannwaldu a Vysokého na Harachovice k Teplicím slezským (Warnbrunn). Ihned ale pod Strickrovými domky stává se údolí Jizery ještě těsnějším a divějším, než prvé; mohutné, s sousedního Čertova vrchu svalivší se balvany skalní zbraňují místy spěšným vodám řeky volného průchodu; ale i níže této končiny neustává řeka klestiti sobě početnými ohby cestu v těsné debrí, zevšad vysokými, do 400—500 metrů nad povrchem její vystávajícími stráněmi zahrazené, dokud šumotem a nesčíslnými prahy nestihne českého městečka Jablonce. Asi na 1.5 kilom. výše Jablonce otvírá se k řece od levé (východní) strany hluboké a úzké údolí příčné, kterýmž nadchází vodnatý potok, druhdy Rokytnice, nyní Hüttenbach řečený. Jdeš-li údolím tímto nahoru, spatříš je se šířiti a v několik pobočných dolů se rozvětlovati, kteréž až k Lysé hoře a ke Krkonošskému Kotli povlovně se zdvihají, jsouce jak dole tak po stráních až do 1000 metrů výše více jak 1100 domky posázené, jež v celosti své skládají průmyslná městečka Dolejší a Horejší Rokytnici, více jak 10.000 obyvatel držící. Spád řeky Jizery mezi Strickrovými domky a kostelem Jabloneckým jest 1 : 99. U Jablonce rozstupuje se údolí na chvíli, zavře se ale hned zase a ukazuje naporád příkré stráně, jakkoli vlastní hory ustupují stranou, majíce také jen 600 až 700 m. prosté výše, tak že toliko do 200—300 m. nad žlab údolí vystávají. U Ernsttálu (390 m.) pode vsí Přívlaky přestává údolí Jizery svého dosavadního

jižního směru, narazivší na žlab řeky Malé Jizery, od hory Kotle pod pravým úhlem k němu přichodící, kteréhožto nového směru, západního totiž, spojené a zvodněné řeky nyní nuceny jsou, se přidržovati. Spád údolí mezi Jabloncem a Ernsttálem jest 1 : 134, a v celé té trati běží jím po levém břehu řeky pěkná silnice, nákladem zemským v posledních letech vystavená. Pod Ernsttálem nabývá údolí Jizery zároveň se změnou směru zcela jiné tvárnosti. Nastává zejména již jiné složení půdy, od dosavadního na prosto rozdílné, pokud totiž údolí Jizery v granititu, jak známo, se počavší, u Strikrových domků nejprve do svoru, a níže do hlinitých břidlic vstupuje, u Ernsttálu pak mezi rudé pískovce útvaru permského vchází, v kterýchž také až pod Semily setrvává. Údolí, dosud napořád těsné, rozšiřuje se nyní, a jakkoli najdeš vždy ještě hojnost míst, kde stráně jeho náhle k sobě se přibližují, zbývá přece ještě více takových, kdež ony široko se rozstupují, dávajíce v údolí místa netoliko dlouhým vsím, nýbrž i městům. V takových kotlinách leží zejména města Semily a Brod Železný. Spád údolí stává se nyní povlovným, drže se v mezích 1 : 150 a 1 : 230, proti Semilům pak vchází do něho železná dráha, kteráž ho potom více neopouští. Pod Brodem mění se ostatně zase směr jeho pod pravým úhlem, bera se odtud k JJZ. Údolí sужuje se zase a řeka promyká se u Malých Skal a Vranové (273 m.) příkrými skalami pískovce kvadrového. Spád žlabu mezi Brodem a Vranovou jest 1 : 139, co pak z něho ještě až do ústí řeky zbývá, popsáno najdeš v prvním dílu topografických prací našich (str. 107 a násl.). Rozvíti celé hořejší části údolí Jizerského od počátku jeho až k Ernsttálu činí 1:25, odtud až k Vranové 1:52.

*Údolí Kamenice* má počátek svůj v ústřední končině hor Jizerských, kdež i řeka Nisa se temení; zejména spatřují se v revíru Frydrychwaldském na oně náhorní rovině, na kteréž stojí daleko svidná myslivna Novolucká (Neuwies), k V této dva korytné úpady podlé sebe ve výši 950 m., v kterýchž shromažďují se vody, s Holubníka a Černé hory dolů stékající a odtud k JJZ hlubokým žlabem dále pospíchající. Jeden z těchto pramenův, západní totiž, nazývá se Blatný potok (Blattney-Bach) a přijímá níže potom Červený potok; druhý, vychodní, slove Kamenice; oba pak spojují se pod Blatnou Horou (Blattberg) v dosti mocný a vodný potok, na nějž jméno Kamenice přechází. Až k huti Christiántálské jest spád potoka toho 1 : 10 až 1 : 20, umaluje se ale napořád; není níže odtud až k ústí Desny průřezem zajisté větší, než 1 : 49. Na celé této trati jest žlab Kamenice v půdu granititu hluboko zarytý, vysoké břehy a strmé, lesem porostlé stráně zavírají jej po obou stranách, zdvihající se do 250 až 300 m. nad patou údolí, jehož směr ubíhá celkem k JV, jakkoli ne bez početných, pod pravým úhlem povstávajících ohbů. Od Christianstálu běže se dosti pořádná voznice podél levého břehu řeky dolů, kteráž spojuje mezi sebou osady, po obou stráních a výše na rovině položené, zejména Josefstál, Antoniwald, Georgenthal, dolejší Smržovku a Tannwald. Níže Antoniwaldu šíří se údolí a obrací se pak, obcházejíc volným obloukem čedičový kužel Špičáku, u Tannwaldu (448 m.) potom k východu. V samém Šumburce ústí se údolí Kamenice do žlabu, od S k J přímo k němu naředšího a co do délky své hlavního, jemuž řeka Kamenice sice i dále jméno dává, jakkoli slušelo by mu spíše jméno řeky, kteráž směrem jeho posud byla se ubírala, vynalevši i údolí toto. Jestli to zejména řeka *Desna* (t. j. Levá), dva kilometry výše u Tiefenbachu

ze stoku dvou stejně mocných bystřic povstavší, kteréž Bílou a Černou Desnou se zovou a od hory Vyhličky dvěma divokými, skalistými debřemi paralelně k sobě se přibližují, při čemž východní, černá totiž Desna, blíže vsi Suširny (Dörre) pěkný slap činí. U Šumburka vstupuje tedy, jak řečeno, údolí Kamenice do směru Desny a obešedší ohbem ostrou hranu vrchu Studnického, běže se nyní v břidlicích hlinitých dále, jižního toho směru, jakkoli s početnými pak ohby a zátečmi, napořád se přidržuje. Údolí, jehož žlabem od ústí jeho do Jizery až k Tannwaldu nahoru nákladná železnice postupuje, kteráž jest poboční tratí dráhy Pardubicko-Liberecké, u Semil se odštěpující, — zůstává vždy ještě těsné a hluboko zaryté. Jen na málo místech, jako zejména u Dolejších Bohdalovic, pak u Bohušovska rozšiřuje se poněkud, jakkoli ani zde nedosahuje šíře 300 metrů. Na početných místech, jako u hradu Navarova (povrcheň vody tamtéž má 364 m. výše) sbíhají se břehy v podobě skalnatých strání do té míry, že tu sotva zůstává prostoru pro silnici nebo železnici, a řeka berouc se šumotem přes mohutné balvany skalní, všechnen žlab údolí pro sebe zaujímá. U vsi Dolejšho Spalova (300 m.) ústí se údolí Kamenice skoro pod pravým úhlem do údolí Jizery. Spád jeho mezi Tannwaldem a Navarovem jest 1 : 83, odtud až k Spalovu 1 : 122. Rozvití celé řeky Kamenice od pramenův až k Spalovu činí 1 : 47.

V příčině *rostlinstva* horského obvodu Jizerského připomíná se, že půda jeho při březích řek a potokův, ovšem jen v dolejších polohách (patrech) až do 500 m. výše, je vesměs luční a rolní s dobrou a dosti hojnou prstí; zejména jest všechno severní podhoří, neméně i údolí Nisy a jižní podhoří v louky a role proměněno. Arciť daří se zde jen v nejhlubších polohách pšenice, vůbec sklízí se ale žito, na vyšších plasách jen oves. Lesa shledáš až do 500 metrů málo, z čehož vyňaty jsou toliko některé polohy u Nového města, jakož i čedičové kupy těch stran. V polohách, nad 500 metrů vyvýšených, přestává rychle obilí, na místo něhož nastupuje brambor a mokrá věcmí dílem louka, lesy však, a sice bukové, smrkové i smíšené, šíří se nyní po rozsáhlých prostranstvích. Na výšehorách Jizerských prostírá se však nepřetržitý hvozď, skládající se věcmí dílem z pěkných bučin a smrčín; řídkěji vyskytují se sosny nebo borovice, nízké borovice pak (kleče), v Krkonoších velice rozšířené, nenajdeš kromě malého kusu blíž Jizerské louky skoro nikdež. Jsouť ale i v Jizerských horách rozsáhlé prostory, na kterých nedaří se lesu přese vši péči; mínímeť četná, mělká koryta výšehorská, v kterých sbírají se vody s vřklných výšin, jež od jilovitosti půdy v korytech nemohou do země vsáknouti, aniž (od skrovného sklonu půdy) pořádně odtékati. V takových polohách povstávají pak ony blaně a slatiny, kteréž tu vlastní žlab všech výšehorských údolí tvoří a druhy daleko do podhoří zasahují. Nad hranici stromů nevystupuje žádné místo v horách Jizerských.

V následujícím sestavení podáváme přehled *rozlohy půdy v rozličných výškách nadmořských*, připomínající toliko, že z celé oblasti hor Jizerských pojali jsme v něj toliko onen okres, kterýž do Čech náleží a jehož meze výše (srov. str. 4. t. d.) jsou naznačeny\*).

\*) Plošné obsahy vrstev čili pater vyšetřeny jsou zejména prostředkem planimetru, krychlový obsah  $V$  vypočten jest prostředkem formule  $V = \frac{h}{8} (f_1 + 4f_2 + 2f_3 + \dots + f_n)$ , střední

|     |                                                              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Všechno prostranství (oblast) vnitř onoho omezení drží . . . | 98.112 hektar. |
| 2.  | Prostranství (patro) nad vrstevnicí 300 metrů . . . . .      | 98.840 "       |
| 3.  | " " " " 400 " . . . . .                                      | 67.440 "       |
| 4.  | " " " " 500 " . . . . .                                      | 46.968 "       |
| 5.  | " " " " 600 " . . . . .                                      | 31.200 "       |
| 6.  | " " " " 700 " . . . . .                                      | 19.728 "       |
| 7.  | " " " " 800 " . . . . .                                      | 12.960 "       |
| 8.  | " " " " 900 " . . . . .                                      | 7.224 "        |
| 9.  | " " " " 1000 " . . . . .                                     | 1.368 "        |
| 10. | " " " " 1100 " . . . . .                                     | 216 "          |

Z toho jde v příčině rozlohy půdy po patrech, a sice:

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | V prosté výši 200 až 300 metrů leží 7.272 hekt. čili 74% vší oblasti |
| 2.  | " " " 300 — 400 " " 23.400 " " 23.8% " "                             |
| 3.  | " " " 400 — 500 " " 20.472 " " 20.9% " "                             |
| 4.  | " " " 500 — 600 " " 15.768 " " 16.1% " "                             |
| 5.  | " " " 600 — 700 " " 11.472 " " 11.7% " "                             |
| 6.  | " " " 700 — 800 " " 6.768 " " 6.9% " "                               |
| 7.  | " " " 800 — 900 " " 5.736 " " 5.8% " "                               |
| 8.  | " " " 900 — 1000 " " 5.856 " " 6.0% " "                              |
| 9.  | " " " 1000 — 1100 " " 1.152 " " 1.2% " "                             |
| 10. | " " " 1100 — 1200 " " 216 " " 0.2% " "                               |

Z čísel těchto poznává se, že celkem něco více, než polovice vší půdy oblasti hor Jizerských, zejména 52.1% nalézá se v nadmořské výši 200—500 metrů, a něco méně než polovice (totiž 47.9%) ve výši 500 až 1200 metrů, odkudž *výšehorského rázu* kraje tohoto nikterak nebude lze popírati, jemuž zejména v patrech, nad 600 metrů vystupujících, povlnné ubývání podílů percentních dodává ještě větší váhy a mohutnosti.

Hořejší čísla o rozloze vrstev či pater poskytují dále ještě možnost, vypočísti *střední výši nadmořskou* veškeré oblasti horstva Jizerského v užším onom smyslu. Všechna hmota jeho, nalezající se nad nejspodnějším patrem 200 metrů, obsahuje totiž  $V = 324.62$  krychlových kilometrů, kteréžto číslo, děleno budouc základní plochou  $918.12 \square$  kilom., dá vyvýšení  $0.332$  kilom. = 332 metrů. Při počte-li se k tomu prostá výše nejspodnějšího patra 200 m., vznikne číslo 532 metrů, což znamená tolik, že veškeré horské prostranství, právě námi popsané, kdyby je jednotejně rozložil po ploše  $918.12 \square$  kilom., jevílo by se co spousta, 532 metrů vysoká.

Kdyby však líbilo se připočísti k prostranství, tuto vyčíslenému, ještě i onen pruský podíl, kterýž severně od hranic až k řece Kvíze a Menšímu Zackenu leží, vzrostla by rozloha či plocha jeho ještě o 16.080 hektarů, z čehož asi polovice nalézá se v prosté výši 800 a více metrů.

výše nadmořská pak z formule  $V : f_1 = z$ , při čemž  $f_1$  přijato za = 98.112,  $f_2 = 90.840$  a t. d. a  $h = 100$  metrů = 0.1 kilom. Co čísla poměrná platí i tu 1 rak. jitr = 0.575 hektarů, 1 hektar = 1.738 jiter, 1 čtver. rak. míle = 57.5 kilom. a  $1 \square$  kilom. = 0.0176  $\square$  m. rak.

### §. 3. Krkonoše, hřebety a vrcholy jejich.

V tomto paragrafu hodláme popsatí horstvo Krkonošské v nejuzším slova smyslu, pokud se totiž již při pouhém pohledu na kraj, jím vyplňovaný, ještě lépe ale při pohledu na mapu patrovou nebo geologickou co osobitý celek samo zjevuje. Myslímeť při tom na onen kraj čili na onu oblast, kterouž na západě omezuje údolí řeky Jizery, a sice od Ernsttálu až k Wurzelsdorfu, odtud až k Harachovicům potok Mumlava, výše až k Boudám Prokšovým přítok její Mumlavice (Mühlmitz), nejzáže pak až k pruské celnici Petrovické potok Věcí Zacken. K severní straně činí hranici její dolejší běh V. Zackenu, dále pak k severu spadající úpatí hor samých, jež od roviny Teplické (Warmbrunn) v čáře, daleko viditelné, jasně se odráží a jež co přírodní hranici po směru silnice od Petrovic na Hermsdorf, Giersdorf, Seidorf, Arnsdorf, Sejfy kamenné a Schmiedeberg pohodlně lze sledovati, — posléze pak od nejsevernějšího konce Schmiedeberku oblouk, kterýž na Buchwald, Berndorf, Novou ves, Wühl, Röhrsdorf a Schreiberdorf k řece Bobravě u Lancutu vésti se dá. Všechny tyto čáry činí v souvislosti své hranici severní. Východní hranice pak znamená se výše Lancutu tokem řeky Bobravy a sice nahoru na Lřbov až do Königshanu, dále pak potokem Bernartickým čili Lřčnou až k Pořřčí, (Parschnitz) u Trutnova.

Na jižní straně není arci snadnou věcí, udati hranice tak určitě. Jinak jestiř to ovšem také čára, podél kteréž srážnější svah hor zřejmě se ruší a láme; avšak není tu právě nikdeř tak rovné plochy jako na severu, pročeř třeba jest přestati na omezení, obecněji toliko vytknutém, jakěž bude zejména údolí řeky Úpy od Pořřčí nahoru na Trutnov až k Bukům mladým, odtud pak čára, přidřžující se celkem silnice od Buků až k Teresientálu čili doliny potoka Javornřka (Mohren-Bach), konečně pak vřbec čára, směrem na Forst, Vrchlabř a Hrabačov u Jilemnice až k Ernsttálu při Jizeře vedená.

Prostranství, takto vymezené, drří plochu 936·5 čtver. kilometrů čili 16·28 čtver. mil. Obsahujeť sice jen díl, avšak zajistě ústřední a nejdřležitější díl oněch hor, kteréž v širším slova smyslu k horám Krkonošským čítati jsme obvykli. Ně- které z nich hodláme v pozdějších oddělenřích této práce vypsati, jiných pak, zejména těch, jež za hranicemi zemskými jsou položeny, nezbyvá leč mlčením pominouti.

Vnitř této oblasti, kteráž má podobu čtverce o tupých hranách, délku asi 40 a šířku 23 kilometrů, zdvihá se hlavní hřeben její, jenž rovnoběžně s podélným rozložením celé hornatiny se prostřraje a štřty Jinřnošem (Reifträger), Vysokým Kolem a Sněžkou znamenán jsa, na dvě nestejně polovice ji dělí, z nichž severní leží v pruském Slesku, jižní pak v Čechách, poněvadž přes hřbet ten hranice zemská i řřská jest vedena. Směr toho hřebene jde skoro přímo od ZSZ k VJV, odchyluje se od rovnoběžnřka svého o nějakých 20 až 24 stupňův, pročeř také s polednřkem úhel 70—66° činí. Bez mála rovnoběžně s tímto hlavním hřebenem a sice vzdálř 3 kilom. od něho, běží druhý hřeben se štřty Kotle, Krkonošem, Kozřmi hřbety a Studničnou; ten však liší se mezi jiným od nepřetržitěho hlavního hřebene tím, že v samém středu svém jest dokonale prorván a že na obou krajřích svých, kdež zejména s hlavním hřebenem se spojuje, dříve také přestává, než tento.

Pod pravými úhly, tedy od hlavního hřebene k severu, od pobočního k jihu, vychází z nich několik dlouhých příčných hřbetův, kteréž na jižní straně mnohem jsou delší, širší i jednotvarnější než na severní, jež naopak jeví se býti sice kratší a užší, avšak bohatě rozčleněné. Jsoutě pak mocnější z nich na jižní straně: Vlčí hřeben, Heidlova Hora, Planina (Planur-B.), Beerenberg, Benešův kopec (Bönisch-B.), Černá hora a Rýchorská hora (Rehhorn-B.), na severní straně pak: Kobylí hlava (Pferdekopf), Homole (Hummelberg), Zámecká hora (Schösshübel) s Kynastem, Černá hora, Hora „Na hrobech“ řečená (Gräberberg) a Březí kameny (Friesensteine).

V příčině *geologického složení* Krkonošů náleží vyznati, že horniny, jež je skládají, nejsou ani pestré aniž četné; to však lze bezpečně tvrditi, že uložení těchto hornin či vlastní *sklad hor* není tak jednoduchý, jak by na pohled se podobalo, a že v něm zůstává mnoho ještě na záhadě. Hlavní hřeben skládá se v celé rozloze své od Bud Prokůvých, kdež s horami Jizerskými takorča k nerozeznání souvisí, až po Sněžku z téhož *granititu*, jenž skoro v celých horách Jizerských panuje a ježž jsme již při nich (srov. str. 5 t. d.) byli šíře popsali. Z tohoto granititu je zejména skoro veškeren pruský díl hor Krkonošských složen, poněvadž severní rozsochy hlavního hřebene až po Sněžku jen tuto horninu v sobě drží. Na české straně však skládá se toliko čeren čili téměř hlavního hřbetu a jižní úbočí jeho, pak spodní díl severního svahu pobočního hřebene z granititu, a poněvadž tato hornina od Harachovic či, lépe řečeno, od slapu potoka Mumlavy přímo k východu se prostírá, stává se nezbytně, že rozloha její na české straně napořád se tenčí (neboť osa hlavního hřebene směřuje něco k JV), tak že posléze s hlavním hřebenem se protíná — což zejména děje se nedaleko Obří boudy (Riesenbäude) pod samým kuželem Sněžky — a potom na české straně na dobro zmizí. V tomto granititu shledávají se z husta couky žuly, a sice tak mocné, že druhdy i 150 metrů tloušťky mívají. Žula ta je z pravidla drobnozrná, zvětřavajíc povlovněji, než granitit, pročež také z husta tvoří turně, klepy a hřivy (nízké skalné hřebeny) na obdelných hřbetech, z granititu složených, jako na př. na nízkém hřebeni Teplickém (Warnbrunn) a Schmiedeberském. Také čedič vyskytuje se sem a tam v granititu, jako na př. v Menším březně sněžném (Schneegrube). Při východním konci hlavního hřebene, zejména nad Schmiedeberkem, pak v podobě úzkého s počátku pruhu na hoře Kolbě a na Dlouhé hoře u Menší Úpy objevuje se zvláštní odrůda ruly, kterouž Jokely za *vyvrhelou* (eruptivní) *rulu* má a kteráž pak na jihovýchodě tohoto okresu Krkonošského neobyčejně mocných rozměrův nabývá, pokud totiž v této končině plochý hřbet Černé hory, jižní rozsochy pobočního hřebene, zejména Benešův vrch, hora Vachour a Heidlov kopec (Heidelberg) na jižním svém konci z ní složeny jsou. Rula Krkonošská je tence štěpná, křemenitá i bohatá na hutné hlaté křemene a živce, slída v ní pak málo hojná. Hornina ta jde obvykle pod jmenem *protogynu*, jež navrhnul Jokely na rozdílu od starší ruly, a dosahuje od východu jen až k Heidlově hoře u Vrchlabí, západněji jí nenajdeš; sklon její blíží se všudež k pravému uhlu. Oblast této ruly odděluje od hřbetu granititového široky pás *svoru*, jenž podél celé jižní hranice granititu se prostírá, jsa od něho také nadzvižen. Jakkoli jej na západě bridlice hlinitá, na východě pak vzpomenuť již rula přikrývají či protínají, objevuje se tento svor v jižním úpatí Krkonoš poznavu, a sice

zase v podobě pásu, směrem od Z k V uloženého, nemá ale více ani té šírky aniž délky jako nahoře, pokud totiž jen od Vrchlabí na Lanov až k Svatojanským Lázním dosahuje. Máť zajisté sloh dokonale hlacený, skládá se zejména z drobných lupénků tmavošedé slídy a křemene, a drží na některých místech početná, drobná zrna granátová, jež ale zhusta spatřují se v živce býti proměněná, od čehož pak tento kamen podobu ruly na se běře.

Z tohoto svoru skládá se po výtce skoro celý hřeben poboční, zejména vynikající vrcholy jeho, jako Lysá hora, Kotel, Krkonoš, Kozí hrbety, Studničná, ale i sama Sněžka. V okrese svoru lze se ale také nezdávka potkati s břidlicemi křemitými, jež zejména na Kozích hrbetech ostrými hranami skal svých na pohled se poznávají. V jižním okrese svoru vyskytují se zase mocné couky a kabany pěkného zrnitého vápence, jako zejména u hořejšího Lánova, u Švarctálu a u Lázní svatojanských; ale i sloje břidlice tuhé (u Švarctálu), pak couky kyzu arsenového a magnetového (v Obrím dole pod Sněžkou) najdeš v tomto svoru, jež se na jmenovaných místech i těží. Společajice na svoru a nezdávka po míře podoby své na pohled v něj přicházejíce, panují v jihozápadní končině této oblasti Krkonošské, a sice v okrají mezi Věcí a Menší Jizerou — t. j. od hory Kotle přichodící, pročez ji Němci také „Kesselwasser“ nazývají — naopak prahorní *břidlice hlinité* (Phyllit), jež vyznamenávají se početnými odrůdami, od břidlice totiž kropenaté (pestré) až k břidlici pokryvačské. Uložení jejich směřuje po výtce od Z k V, sklon pak k jihu, jakkoli vlivem přehybů a protržení i jiné směry uložení a sklonu se vyskytují. Určiti hranici těchto břidlic hlinitých a jmenovaného svoru bývá druhdy s nemalou nesnází, poněvadž jedna hornina v druhou až k nepoznání přechází a poněvadž i v hlinitých břidlicích tytéž vklady a výměsky lze spatřiti, jakýchž při svoru vzpomenu. Zvláště třeba tu také ještě vytknouti sloj rud medných, olovňých a antimonových nedaleko hořejší i dolejší Rokytnice na západním konci tohoto okrají. Na východní straně oblasti Krkonošské přiléhají ke svoru ještě *břidlice jínorázové*, kteréž ode vsi Rýchor (Rehhorn) úzkým pruhem na Dittersbach až k slezskému Kupferberku se prostírají, tvořice tu boky tak zvaného Lancutského hřebene. Posléze třeba i doložiti, že při jihovýchodní a východní hranici *rudé pískovce* i *pískovce kamenouhelné* (a sice ony u Trutnova, tyto u Zacléře) na půdu Krkonošskou přecházejí, kteréž však později obšírněji budou vypsány, majíce tu jen skrovných podílův. Na obou podélných, jakož i na širších příčných hrbetech jsou ostatně i rozsáhlá ložiska *rašeliny*.

*Orografickou povahu* Krkonošů lze nejzpůsobněji seznati z map patrových, ke knize této přiložených. Všechna oblast jejich jeví se zde co hornatina, od J k S povlnně se zdvihající, na severní straně ale náhle přetržená, odkudž také přiléhající k ní od severu prostranství v značné hloubce se ocítá. Od toho pochodí také *rozdílné obrazy Krkonoš se strany severní a jižní*, čehož pokusili jsme se způsobiti pravé ponětí prostředkem dvou pohledův na Krkonoše, jež také co přílohy k této knize připojeny jsou.

Budeť zajisté nesnadné, nalézti na jižní čili české straně Krkonoš místa, z kteréhož by se dal přehlednouti celý hlavní hřeben, poněvadž jej zakrývají jižní vystupky hřebene pobočního. Mně aspoň nebylo možné, vyšetřiti v té příčině jiného, příhodnějšího hlediska, leč vrchol hory Zvíčinské západně Dvora Králové. (S vrchův



u Horek [Falgendorf], jakož i s hory Tábora u Lomnic je pohled mnohem obmezenější.) V popředí vystupuje povlovně jižní podhoří Krkonošů, majíc nápadně rovné a rolemi pokryté hřbety a rozkládajíc se až k úpatí vlastních Krkonošů, t. j. asi do výše 450 metrů; tu pak zdvihají se pojednou jižní výstupky či rozsochy hlavních hřbetů, porostlé lesy chvojnými (hlavně smrky), se sklonem 20—25 stupňů a k výši 1000 až 1200 metrů (jako Černá hora), kteréž ale v podobě obdélných širokých hřbetův od jihu k severu se kladouce, do té míry těsná údolí mezi sebou skrývají, že s jižní strany nepropouštějí průhledu ani k pobočnímu hřebeni, z kteréhož vlastně vyběhají, aniž k hřebeni hlavnímu.

Z těchto rozsoch naráží nejprv v levo do očí plochá kupá hory Heidlovy, pod níž leží Vrchlabí, v prostředku pak rozlehlá hora „na Rovině“ (Plattenberg) řečená, na pravo konečně mohutná spousta hory Černé, celou šířku svou nastavující, v jejímž úpatí leží mezi hustými lesy půvabně Lázně svatojanské. Jediné s hory Zvíčinské spatříš v pozadí obrazu na levé, či západní straně nejprv západní polovici Krkonošského hřebene pobočního, jenž se tam lysou horou Kotlem a dlouhým, klečí porostlým hřebenem hory „Krkonoše“ zjevuje, jejíž východní bok, k výstupu řeky Labe ze Sedmi dolů pod Spindelmühlem se sklánějící, v našem obraze také lze rozeznati. Na druhé straně této prorvy zdvihá se hřivnatý Koží hřbet, týmž směrem co Krkonoš, k východu se beroucí, jenž sice v obraze našem horou Planinon (Planurberg) s částí zastřen jest, k východu odtud ale oku stihnouti se dává, přiléhaje těsně k vysoké pláni hory Studničné (Brunnberg), jejíž skalisté stráně na pravo k tak zvanému Obřímu dolu (Riesengrund) se spouštějí, ano severní rovný konec k planině pod Sněžkou (Koppenplan) přiléhá, nad níž u Obří boudy nádherný kužel Sněžky samé k nebesům se pne. Sněžka zejména jest onen bod, v kterémž hřeben poboční s hlavním hřebenem Krkonošským na vzájem se protínají. Ve smyslu geologickém patří Sněžka k hřebeni pobočnímu, s hlediště orografického sluší ji však počítati k hřebeni hlavnímu, poněvadž leží spíše v ose tohoto. Z tohoto hlavního hřebene spatříš pak na našem obraze toliko skupenství Vysokého Kola s Věším Šišákem (Sturmhaube) a s tak zvanými Mužskými či Mládenčími kameny (Mannsteine).

Pohled na Krkonoše se strany severní je mnohem vyšší měrou velebnější a zajímavější. Potkáváš-li se na jižní straně s nesnázemi, chtěje dodělati se hlediště, s kteréhož bylo by lze aspoň menší díl hlavního hřebene spatřiti, při čemž třeba býti dobrým znalcem hor samých, aby hlavnější vrcholy jejich s určitostí dovedl pojmenovati: tož máš na severní straně, a sice v široké kotlině od Teplic slezských až k Schmiedeberku, všudež a pořád hlavní hřeben před očima, a sice se všemi významnými vrcholy jeho i s turněmi, klepy a sedly, tak že snadno se v něm poznati můžeš. Jediné osvětlení bývá na severní straně zřídka tak šťastné, aby daly se obrysy početných výstupků či rozsoch tamějších s jistotou sledovati; neboť slunce svítí pozorovateli buď do očí, buď jsou zase hory samy v tmavých stínech ponořeny. Nejprůhodnější v té příčině osvětlení nastává časně z rána při jasném nebi v měsících letních. Za takové chvíle nakreslil jsem také přiložený druhý pohled na Krkonoše se strany severní (t. j. z Teplic slezských). V pozadí tu lze spatřiti hlavní hřeben Krkonošský v celé jeho délce. Nejprv shlédne se v levo (na východě) obdélný a lesnatý hřeben Schmiedeberský s dvěma vrcholy

svými t. j. tak zvanou Mordovou strání (Mordhöhe) a Stolnými kameny (Tafelsteine), načež následuje převal (sedlo) pod Prostřední horou (Mittelberg), odkudž po srázích vystupuje se nahoru k Černé kupě, kteráž nalézá se již v patře kleče. Odtud zůstává hlavní hřeben na hezkou vzdálenost rovný a plochý, dokud nevystává z něho mohutný kužel Sněžky. Od ní v pravo či k západu prostírá se tak zvaná Planina pod Sněžkou (Koppenplan) až k Láněm (Lahnberg) a Menšímu Šišáku. Jasně viděti jest turně, kteréž znamenají místo, kdež nalezají se tak zvané Věci stavy (Teiche). Dále ještě snižuje se hřeben patrně k onomu sedlu, přes kteréž vede pěšina od Giersdorfu i Agnetendorfu podlé Petrmanových a výše podlé Špindlerových bud do Sedmi dolů a Špindelmühlu. Po té zdvihá se zase hlavní hřeben prostředkem četných vrcholů (kup) poznovu do věcí výše. Nejprv spatřiti lze skalné klepy tak zvaných Dívčích kamenů, pak turně, řečené Mužské či Mládenčí kameny (Mannsteine, mezi lidem Männersteine), dále kupu Věcího Šišáku, pak zvonovitý vrchol Vysokého kola, kterýmž západní díl hlavního hřebene dostupuje největší své výsokosti. Široká, s dostatek rovná planina, kteráž na východ Vysokého Kola se prostírá, spouští se k severu v podobě srázných, skalných štěn, kteréž obstupují kotlinu tak zvaných Sněžných březů (Schneeegruben). Odtud snižuje se hřeben napořád směrem k západu. Povlný tento svah, kterýž jedině přetržen jest hranatým, dvojitou turní vyznamenaným štítem Jinínoše (Reifträger), lze pak sledovati až k známému sedlu u Bud Prokšových, kdež počíná se právě hlavní hřeben Krkonošský.

Také severní rozsochy Krkonoš jsou členitější než jižní, jak zejména již vzpomenu, dodávajíce zvláště krajinnému obrazu prostředního popředí čilejšího života. Zde zajímaví zejména oko pozorovatele v levo nejprv tak zvaný Gräberberg („Na hrobech“) s Hrobními kameny (Gräbersteine) a s kaplou sv. Anny, v prostředku komolý a temným lesem zarostlý kužel Černé hory, v pravo pak malebná ssutina hradu Kynastu, anž rovinné úpatí hor samých s početnými a výstavnými osadami svými, úrodnými poli, zelenými lukami a háji a hojnými i prostrannými rybníky, v kterých zrcadlí se velikáni, v pozadí stojící, důstojným způsobem zavírají obraz krajiny, jemuž nebude asi mnoho rovných.

Prostředkem obou obrazů krajinných, k dlu tomu připojených a právě vyložených, došel čtenář, nemaje toho ani potřebu, vkročiti do hor samých, bohda k poznání nejdůležitějších míst jeho i nehudeť tedy s obtíží, provoditi ho nyní ještě nahoru a obrátiti pozornost jeho i k oněm polohám, kteréž čelním pohledem na hory k zastření přicházejí. Pro lepší věci přehled chceme výšehorskou tuto oblast popsati tímto pořadem: Hlavní hřeben, poboční hřeben, jižní rozsochy, severní rozsochy.

**Hlavní hřeben.** Hlavní směr jeho ustanovuje se čarou, od Jinínoše k Sněžce vedenou, kteráž běží od ZSZ k VJV, činic s poledníkem uhel 60 stupňů. Směru toho přidržuje se hlavní hřeben od Prokšových bud až k Sněžce délkou asi 23 kilometrů. Na Sněžce láme se však tato čára pod uhlem 130°, načež hlavní hřeben bere se délkou 5·6 kilometrů, a sice až k tak zvané Mordové stráni, směrem od ZJZ k VSV. Střední výše nadmořská čáry hřebenné jest 1200 metrů, na nehlubším západním místě u Prokšových bud zejména 830 a na východním konci u Bud hraničných (Gränzbauten) 1050 m. Hlavní hřeben má nahoře střední šířku 200 až 400 m., a jest tu slabě sklenutý; místy rozšiřuje se však až do 1000, ba i do

2000 metrů, zejména všudež tam, kde nějaké kupy nad něj se zdvihají nebo kde poboční hřeben k němu se připojuje. K severu sklání se hlavní hřeben všudež příkře (pod úhly 20—25°), k jihu naopak mnohem povlovněji, a sice pod úhly sklonu 10—15°. Po nejhořejší čáře hřebenné běží hranice zemská, pročez také skoro všude spadá za jedno s rozhraním vod jeho. Podél hranice zemské, tedy také podél předěle vodní, vede pěšina, kteráž na mnohých místech, zejména tam, kdež ubírá se po vrcholech, kamením a šterkem věším dílem pokrytých, bývá spustlá a tudíž těžko schůzná. Volíš-li však tuto stezku, poznáš nejlépe a nejrychleji jak orografickou povahu, tak rozčlenění Krkonoš; neboť bez přestání zříš před sebou hlavní hřeben, an k západu neb východu ubíhá, znamená směr svůj vrcholy, pořadem na něm vystávajícími, což i o pobočném hřebeni platí; v pravo pak i v levo lze od počátku až do konce sledovati všecky ony početné vystupky a rozsochy obou hřebenův. Nad hlavní hřeben vypínají se početné vrcholy, buď samotně, buď v skupenstvích se vyskytající. V sousedství takových míst zdvihá se pomálu i čára hřebenná, a sice hned s daleka, odkudž děje se, že k vlastním kupám (kromě jediné Sněžky) lze se velice snadno a beze všeho namáhání dostat. Hlavní hřeben skládá se, jak již pověděno, od Prokšových bud až k severnímu úpatí Sněžky s granititu, vystávající pak z něho vrcholy svědčí věším dílem o kremenitých coucích žuly, jež zvětrání a opláknutí k sobě tíže připouštějí než granitit, je obklopující, pročez také těmito výkony živelnými nevzaly jsou takového porušení, jako silně opláklá i rozrytá půda, z granititu složená, od jehož skrovného odporu právě pochodí významná, slabě sklenutá podoba hlavního hřebene. Vrcholy, jichž jména hned povím, jsou naopak pokryty hybkými kameny a klepy, kteréž nejspíše budou asi posledními pozůstatky ssutých a snešených turní, jež za dráhnou dobu (jak to zejména na Mládeněch i Dívčích kamenech posud lze pozorovati) dovedše se zachovati, posléze přece vlivem vzrůstajícího se větrání nezbytnou zkázu jsou vzaly. Z daleka jeví se tyto klepy a turně na mnoze v barvách zelených a spolu zažloutlých, čehož původem jest zvláštní lišejník též barvy (*Lecidea atro-virens*), po klepech i kamenech všude se stroucí. Ploštější a rovnější místa jsou chudou travou (věším dílem *Nardus stricta*) zarostlá; toliko okolo bud (salaší) najdeš bujnější trávníky, což od hnoje dobytčího, do země vnikajícího, pochodí. Na hlubších rovných prostorech, zvláště pak v sedlech, nalézají se buď věci, buď menší slatiny a řašeliniště; neméně sbírají se všudež ve vysokých horách mnohé vzácné, Krkonošům vlastní byliny lékařské, kterýmiž provozuje se výnosný obchod i do cizozemska. Rozsáhlé prostory netoliko hlavního, nýbrž i pobočního hřebene pokryty jsou klecím (*Pinus pumilio*), kteráž jest odrůdou nízké sosny či borovice, kmenem i větvemi po zemi se stroucí, ale zřídka do výše muže dorůstající. Klecí najdeš ve výši 1000 až 1500 metrů buď v podobě menších porostlin, buď i videm celých lesův, pak ale drží se tak hustě pohromadě, že bez průsekův nelze jím proniknouti. Vysoký les (věším dílem smrky) nedostupuje pohromadě z pravidla nyní výše než do 1100 až 1200 m. výšky nadmořské; a však jsouť důkazy toho, že les za starších dob, a sice ještě v minulém století, až k hlavnímu hřebeni dosahoval, ba i místy také ho pokrýval.

Tolik o obecné povaze hlavního hřebene. Na něm však stojí početné vrcholy, kteréž mu těmi místy zvláštního rázu dodávají, jevíce se směrem od Z

k V v následujících skupenstvích: skupenství Jinínoše, Vysokého kola, skupenství Lán, Sněžky a Schmiedebersky hřeben. Popíšemeť je ihned něco obsírněji.

*Skupenství Jinínoše* \*) bývá nejdříve navštěvováno, poněvadž stezník, po hřebeni jdoucí, nevede přes ně, nýbrž zahýbá se k jihu okolo něho. Skupenství toto skládá se z jednoho hlavního vrcholu od podoby podlouhlého, nepravidelného hranolu, kterýž již za hranicemi českými leží, pak z několika menších štítů. Hlavní vrchol Jinínoše (Reifträger), jest pod nakloněnou plochou nahoře urýznut, 70—80 m. nad hlavní hřeben pozdvižen a má výšku nadmořskou 1354 m. Na západním konci jeho spatříš dva obrovské klepy, jež ale již se drobí. Pohled s této hory je zvláště k severní straně znamenitý; neboť odtud přehlednouti lze v celé délce všechen hřeben Vysokého kamene, dolinu Věcího Zackenu, jakož i dolinu Chuchelné (Kochel) veškerou jich rozlohou. Naopak překáží volnějšímu rozhledu k jihu hřeben Kotle. Na jihovýchodní straně vrcholu Jinínoše, a sice vzdálí asi 500 metrů, shledávají se skupenství skal, jimž říkají *Svínské kameny* (Schweinsteine), a týmž směrem vzdálí jednoho kilom. a více tak zvané *Syrové kameny* (Quarksteine). Štít Jinínoše obkličují prostranné louky, k Z tak zvaná Hranická louka (Gränz- nebo i Kranichswiese) a za ní planina Libochova (Luboch-Ebene), k JV pak louka, „Návor“ řečeniá (Nawor-Wiese); prvejší lze nejsnadněji dostoupiti od nové boudy Slezské. Skupenství Jinínoše spadá sice na sever strmě k údolí potokův Zackenu a Chuchelné, tvoří ale při tom plasu, daleko vystupující, kteréž říká se *Kobylá* či *Kobylí hlava* (Pferdekopf); k J naopak svažuje se celé prostranství povlovně k řece Mumlavě. V této straně leží, a sice nahoru k hřebeni, Osecká bouda a tak zvaná „Hvězda“ (Sternbaude).

Na západním konci hlavního hřebene Krkonošského je nejdůležitější částí skupenství *Vysokého kola* (Hohes Rad). Vrchol, hříbovitě asi o 80 metrů nad plochu hřebene vystávající, jehož nejhořejší místo má nadmořskou výšku 1507 m. a Vysokým kolem se nazývá, činí vlastní středisko celého toho skupenství. Hora tato je co do výšky nadmořské sama třetí v Krkonoších, ustupujíc v té příčině toliko Sněžce a hoře Studničné (Brunnberg), pročez také poskytuje rozhled velice prostranný a rozsáhlý. Ze vzdálenějších míst spatřiti lze odtud zejména při jasném nebi Vysokou Vartu (Lausche) u Warnsdorfu, zrovna podle ní v pravo pak Věcí Vinterberk v saských Švýcarech, dále Obrázek, k SZ pak hrad Lauškron (Landskron) nad Zhořelici, ba i samou Zhořelici, celý hřeben Vysokého kamene, město Greifenberg, k severu Teplice slezské, Hirschberk a vrch Kapličku nad ním, níže město Kupferberk, kaplu sv. Anny na „Hrobec“, k východu pak Březí kameny a město Šmídeberk a týmž směrem v modravé vzdálí hory Sobotky (Zobten). Skrovnější naopak jest pohled k jižní straně, tedy do Čech. Z důležitějších míst a poloh spatříš odtud jen Sněžku, horu Studničnou, díl města Vrchlabí a horu Jestědí, čehož příčinou jsou prvé jmenované dvě hory, zastíňující blízkostí a výší svou krajinu podnoží. Ihned od samého úpatí Vysokého Kola prostírá se hlavní

\*) Komu by viděl se tento název, jakkoli správně utvořený, býti příliš dělaný, necht volí jméno *Sinák* nebo *Sinná hora*, dle všech okolností nejpříhodnější. Jméno *Krkonoše* (!), s nímž lze sem a tam v učebních knihách a na mapách českých se potkati, je již dle podoby štitu této hory ovšem zcela nepřipadné a tudíž i nemožné.

hřeben v podobě dokonalé roviny dále k východu, přidržuje se při tom jednotejné výše 1400 metrů. Severní kraj jeho jest však obloukovitou čarou stržen a spadá tudíž podobou strmé stěny do velikánského, 320 m. hlubokého kotle skalného, kterýž úzkým, od hořejšího kraje dolů se spouštějícím žebrem na dva díly jest rozdělen. Této k jedné straně otevřené, tedy do polokruhu se rozkládající dvojité propasti říká se *Sněžná března* (Sněžné jámy, Schneegruben), východní zejména slove Věším, západní Menším březnem; divoká i malebná poloha jejich, zvláště pak sněžné spousty, na dně jejich (jež paprskům slunečním naprosto jest nepřístupné) z pravidla za celé léto se držící, jsou toho hlavní příčinou, že navštěvovatelé Krkonošů po výtce vždy těchto míst vyhledávají. Na dně Sněžných březů spatřiti lze dva, někdy i tři stavy, roztávajícím sněhem tamějším živěné, jehož rychlému a dokonalému odtoku zbraňuje zejména přirozená nízká hráz nasazených štěrků a rozsypů. Na hořejším západním kraji Sněžných březů nalézá se bouda,



Kameny Dívčí a Mládenčí.

„nad Březny“ (Schneegrubenbaude) řečená, za ní pak turně skalní, kteráž *Krkonošovou* nebo *Čertovou kazatelnou* slove. Ještě západněji pak stojí nízké turně, *Mšený kámen* (Veigelstein) řečené. Na východní straně náleží ke skupenství Vysokého Kola ještě dva vrcholy, totiž *Věži Šišák* (Grosse Sturmhaube), štít něco přirostlý a klepy pokrytý ve výši nadmořské 1422 m. s dobrou vyhlídkou, pak plochý vrchol tak zvaných *Mládenčích kamenů* (Mannsteine), 1326 m. vysoký, na němž zdvihá se zvětřalá skalní stěna s vyššími ještě turněmi, jež z povzdálí ssutinami starého hradu se podobají. Ještě pěknější jsou podobné jim, na výšině několik set krokův odtud se zdvihající tvary skalní, kterýmž zase dávají jméno *Dívčích kamenů* (Mädelsteine, 1391 m.).

Připojujím zde obrázek těchto dvou skupenství skalních, poněvadž takové tvary mají pro Krkonošské hory osobitého významu, nepoččetně na žulové půdě jejich se opakující.

Z těchto a podobných tvarů poznávají se nejlépe účinky zvětrání a vymýlní, jejichž stopy v těchto výškách všudež na odiv se staví. Tyto tvary skal, jež pod jmény věží nebo turní (Thurmsteine), kamenů čarodějných (Hexensteine), čertových stěn a j. po všem pohoří Krkonošském tak zhusta se vyskytají, jsou věcí dle pozůstatky coukův žuly nebo i jiných křemenitých kamenů, jež proniknuly granitem, snadno zvětrávajícím. Na všech takových turních, zdech a klepech shledávají se početné plochy rozstupné, rovnoběžné k sobě ležící a k horizontu málo nakloněné, kromě toho pak i trhliny a rozsedliny, svislými směrem jdoucí. Z vrstev, takto povstalých a na sebe jako by naložených, bývají střídne jedny více, jedny zase méně zvětralé a udrobené; zachovalejší pak mívají z pravidla zakulacené hrany, odkudž zhusta podobá se taková hromada kamení naplněnému pytlu. Podobné tvary lze sice také v oblasti kvadrových pískovců českých stihnouti, avšak těm nedostává se onoho oblého povrchu; jestli naopak tvar jejich z pravidla spíše pravouhelný, tak jako i turně a zdi pískovcové berou na sebe spíše tvar hranolů pravouhelných.

Za tou příležitostí budiž vzpomenu ještě jiného zjevu, jež na těchto ojedinelých troskách v obvodu hor Krkonošských zhusta lze pozorovati. Takové trosky totiž, jichž nejsvrchnější deska či vrstva jest širší a vodorovně položená, mívají na ní velmi často po jedné okrouhlé nebo oblé a mělké jamce, zřídka kdy hlubší nad 5—10 centimetrů. Archaeologové jsou sice toho mínění, že takové desky bývaly obětními kameny čili oltáři a že v jamkách oněch zachycovala se krev zvířat v obět porážených u oněch pohanských pranárodův, kteříž druhdy v Krkonoších obývali. Nechtěje zrovna popírati, že by snad některé z oněch desk k podobným účelům nebyly sloužily, mohu přece směle tvrditi, že aspoň při oněch jamkách, jež událo se mně osobně ohledati (jako na př. na tak zv. Březích kamenech na SV Schmiedeberka), lze sobě vznik jejich mnohem způsobněji a pravdivěji vyložiti, přijme-li se za pravé, že byly nejprv od vody deštné, na vodorovné desky jejich padající, vymlety a pak od zrněk křemenitých, ve vodě při dešti se točících (jež posud v nich lze spatřiti), průchodem tisíciletí vybroušeny a prohloubeny. Jako všudež na hlavním hřebeni Krkonošském, tak svažuje se i kraj Vysokého Kola srážně k severu, odkudž s této strany nesnadné jest nahoru se dostat. Od severu vede zejména několik *stezníků* přímo k vrcholu, totiž z údolí Věcí Chuchelné od slapu jejího podél Slezské boudy k Mešnému č. Fialovému kamenu (Veilchenstein), nebo od Agnetendorfu přes Korálový kámen do Sněžných březů, nebo z téhož Agnetendorfu přes Turni (Thurmstein) k Šišáku; zbýváť pak ještě pěšina z Agnetendorfu nebo Háje (Hayn) na Jägerhübel k Petrově boudě. Nejvhodnější bez odporu je cesta po hřebeni, a sice buď od Jinásoše, buď od Sněžky. Jižní svah hřebene není tak strmý, jako severní; s počátku spouští se sice kraj s výše 1400 do 1300 m. náhle, a sice pod úhlem sklonu 18 až 20°; níže odtud až k Sedmi dolům (jež zejména skupenstvím Vysokého Kola od severozápadní strany obklíčeny jsou) nebývá sklon větší, než 12°. Na hřebeni samém nalezá se kromě boudy nad Sněžnými březny ještě druhá bouda,

řečená Petermanova nebo prostě Petrova, a sice hned k východu Dívčích kamenů ve výši 1288 m., pak něco níže pod hřebenem třetí bouda, Špindlerova totiž (1214 m.), kde bývá vždycky veselo od hostů. V jižní stráni naopak je mnoho bud, z nichž nejznámější jsou Labská, Pudlova, Dvorecká (Hofbaude) a Lagrova. Od jihu lze po mnohých cestách k Vysokému Kolu se dostat; jsou to zejména: cesta od Krausových bud přes Krkonoš a Labskou louku, pak čtyři cesty od Špindlmühlu, zejména podél řeky Labe a přes boudu Labskou, přes boudu Tipeltovu a dvoreckou, přes Daftovu boudu anebo posléze stezku na boudy Leyrovu a Špindlerovu k boudě Petrově, po němž nejčastěji nahoru se chodí. V hojných úpadech, na hřebeni se vyskytujících, bývá půda močálovitá a rašelinitá; nejrozsáhlejší taková slatina nalézá se pak na jihozápadní straně Vysokého kola, kdež zejména hlavní hřeben prostředkem šije, 1·5 kilom. široké, k pobočnému hřebeni se připojuje. Na této šíji, jež k východní straně podobou skalné stěny k údolí Labskému se spouští, spatřuje se v prostředku jejím a ve výši 1258 m. mělký, ale rozsáhlý úpad (koryto), v němž sbírají se vody Mešného kamene (Feigelstein) i Kotle, činnice jak zřídla Labe na V, tak potoka Mumlavy na Z. Zřídla Labská jsou tu na jednom místě, jemuž *Labský pramen* říkají, na způsob studánky roubením opatřeny.

*Skupenství Lan.* K tomuto skupenství lze čítati onen díl hlavního hřebene, kterýž prostírá se od sedla blíže bud Špindlerových až k pláni pod Sněžkou. V samém prostředku tohoto prostranství shledává se na hřebetě, zde nad obyčej širokém, zřejmá vyvýšenina od podoby náhorní roviny, jež 0·6 kilom. šíře a 1·4 kilom. délky drží a něco nad 1500 m. výše nadmořské májíc, na *Lanech* nebo také na *Stříbrné hoře* se nazývá. Rovina či planina tato honosí se pěknou vyhlídkou k severu, ano pohled k jihu zastřen jest na věším dle horou Studničnou, jakož i Kozími hřbeti. Zvláště pěkný bývá odsud pohled do početných malých dolin, kteréž rovnoběžně mezi sebou od hlavního hřebene k severu se otvírají, směřujíc se mezi lesným a homolitým Černým kopcem a mezi Brückenberkem. K SV odtud, a sice vzdálí 1·5 kilom. od nejvyššího místa této planiny, spatřuje se mocný, čteně navštěvovaný klep, tak zv. *Polední kámen*, k Z pak od Lán strmý, rozvalinami pokrytý hřib, jemuž říká se *Menší Šišák* (Kleine Sturmhaube, 1446 m.)\*). Hřeben Krkonošský spouští se tu srázně k severu, zahýbaje se na straně severovýchodní účinkem hluboké, k jihu do něho se zarývající rokle posléze i sám také na jih. Tato rokle dělí se při hořejším konci svém na dva oupady; v severním, kotlinatém úpadě leží mezi sráznými stěnami pleso, „Věcí stav“ (der grosse Teich) řečené, v prosté výši 1249 m., v jižní podlouhlé rytvině pak „Menší stav“ (1189 m.). Od Lan lze dostat se po stezku k hořejšímu kraji obou stavů. Jižní strán hřebene má i v těchto místech povlnnější svah i dává se jí zejména tam, kdež počíná něco srázněji k údolí Bělé (Weisswasser) se spouštět, jmeno „Čertovy Louky“ (Teufelswiese). Na této louce stojí několik bud, mezi nimiž zvláště jmenovaná již bouda Špindlerova, Sommrova a Scharfova. Na jihovýchodním konci svém přiléhá skupenství Lanské podobným způsobem k pobočnému hřebeni, jakým se

\*) Vlastně slušelo by této hoře, co vyšší a vůbec nádhernější, jmeno Věcího Šišáka; tamější horáci obvykle však nazývají svrchu již vzpomenutý, něco nižší štít „Věcím Šišákem“, dávajíce toto jmeno jinak také někdy Vysokému Kolu.



Pohled na vrchol Sněžky k východu od Obří boudy.



to na Z vzhledem na skupenství Vysokého Kola děje, o čemž něco níže hned bude pověděno. K Lanům vede kromě pohodlného stezníku pohraničního také jedna pěšina ode vsi Háje (Hayn) v Slezích přes Bílý kámen, pak od Brückenberka na boudu Zaječí (Hasenbaude); s české strany lze k nim dostat se buď od Loučné boudy (Wiesenbaude), buď z Bělské doliny na boudu Hollmannovu.

Skupenství *Sněžky* jest zajisté nejznamenitější ze všech skupenství Krkonošských, pokud na hlavním hřebeni se zdvihají; neboť ono je netoliko nejrozsáhlejší, nýbrž i nejvyšší. V poslední pak příčině stává se zejména, že navštěvovatelé Krkonoš hlavně k němu putují, vědouce, že nejvyšší štít jeho také nejvyšším místem jest netoliko v Čechách, nýbrž i ve všem Německu, kamž s polovicí své náleží. Celé toto skupenství skládá se pak se čtyř štítů, kteréž jsou: Menší Sněžka, Věcí Sněžka, Rožmberk a Černá skála.

Na onom místě, kde dosavadní šírka hlavního hřebene Krkonošského silně se tenčí, pokud totiž od S tmavý důl Melzrův, od J pak pověstný krajinnou krasou svou důl Obří hluboko do něho se zarývá, — pne se mocně do oblakův mohutný jehlanec skalní, trojhranný a nahore něco komolý, jemůž říká se *Sněžka* (Schncekoppe, jinak též Riesenkoppe nebo i Koppe vůbec) a jenž vyniká o 217 m. (687 stf.) nad hlavní hřeben, zde ještě v nadmořské výši 1383 m. se nalézající. Spodek tohoto jehlance na hřebeni samém můž' v největším rozepnutí svém od Z k V držeti dobře jeden kilometr délky, odkudž by nejmenší sklon jeho na samých hranách asi 23 stupňů vynášel; za to je sklon stran jeho mnohem náhlejší, usiluje se zejména na stráni, k Melzrovu dolu (k S) se spouštějící, na 40, na stěnách, do dolu Obřího spadajících (k JZ), až na 60 stupňův. V přiloženém výkresu učiněn jest pokus, podati čtenáři, a sice s místa, s něhož hořejší konec památného tohoto chlumu velmi pěkně lze shlédnouti, možně pravý obraz jeho; hlediště toto pak nalezá se vzdálí asi 400 kroků na západ Obří boudy nahore na tak zvané pláni pod Sněžkou čili Bílé Louce a na cestě k boudě Loučné. V popředí spatřuje se klečí, jímž pláň pod Sněžkou je porostlá, na konci této pak stojí Obří bouda, z břeven zdělaná, kteráž po strůjci svém také boudou Mitlehnerovou se nazývá. Tato bouda je skutečným střediskem všech cest, jež od západu, budiž z Čech, budiž ze Slez ke Sněžce vedou; neboť za touto boudou scházejí se stezky z Melzrova dolu, od obou stavův a od boudy Hamplový, pak stezník pomezí od Vysokého Kola, od Kozích hřbetův a boudy Loučné, konečně i pěšina, z Obřího dolu nahoru vedoucí, pročež zde také panuje za doby letní živý ruch a veselý život. Za stavením Obří boudy spatřujeme, ana vlastní Sněžka do výše se pne; rovná, široká a tmavá plocha v levo obrazu jest k severu obrácena, na temeni svém šterkem a rozvalinami, níže řídkým a chudým klečím pokryta i spadá srázně, a však rovnoměrně, k dolu Melzrovu. V pravo spatřujeme ostrou, k SZ vyvstávající hranu jehlance, po kteréž četnými ohby vine se dosti úpravná cesta nahoru k štítu samému. Podlé této cesty, a sice k pravé ruce a ve výsluní viděti jasně jižní svah hory k dolu Obřímu, kteráž v ohbu, na obraze ostatně již neviditelném, spouští se tu srázně podobou stěny. Nahore na štítu samém spatřuje se v pravo kaple, v levo pak známá hospoda na Sněžce (Koppenhaus). Hřbet, v pozadí obrazu na pravo vyvstávající, je jižní hrana jehlance Sněžky, hřbet na levém konci obrazu je prodloužená severovýchodní hrana.

Jak již výše napovězeno, nalezá se Sněžka zrovna na hranici mezi granitem a svorem hor Krkonošských. Okolo Obří boudy a dále za ní prostírá se ještě granitit, štít jehlance Sněžky samé, neméně i jižní boky její jsou již z čírého svoru, jinak arci početnými couky křemene a žuly hojně proniknutého. Skály na Sněžce zhusta bývají porostlé jistým zarudlým lišejníkem (*Byssus Jolithus* Lin.), kterýž zapáchá silně fialkami a byv něco navlažen, za dlouhý čas poznovu zase tuto vůni vydává, pročež mu fialkový mech a kameni, na němž se drží, fialkový kámen říkají. Vlastní hlava Sněžky skládá se ze samého hrubého šterku a to neobyčejné mocnosti; aspoň píše se, že, kopajíce základy kaple, teprv v hloubce 14 stř. tvrdé skály se dodělali.

Dostoupíce vrcholu Sněžky, shledáme se tam — ve shodě s podobou hory co trojhranného a zároveň komolého jehlance, — s dosti rovnou plochou, kteráž k vidu komolého trojúhelníka v skutku také se přizpůsobuje, jehož základna, směrem severní strany jehlance, tedy od Z k V běžící, drží asi 140 kroků, ona výška trojúhelníka (se směrem od S k J) měří asi 100 kroků. V samém prostředku této pláně stojí okrouhlá věž z tesaného kamene s podjezdem (přístěnkem) a špičatou střechou, jejíž vnitřní průměr drží asi 7 metrů, výška pak od základův až k jehle střechy asi 10 metrů. Jestliž to kaple na jméno sv. Vavřince, která již r. 1668 postavena byla. Hranice Čech a Slezska běže se zrovna podél této kaple, jež ostatně do Slezska připadá, a sice po nejvyšším temeni hory. Východně této kaple, vzdálí asi 50 kroků na pokraj pláně, vystaveny jsou dvě prostranné a dobré hospody pro pocestné; větší z nich, již říkají Koppenhaus, stojí na pruské, druhá na české půdě; obě pak mají od nedávna téhož pruského vlastníka. Zrovna 47 kroků od kaple k Z stojí kamenné znamení starší rakouské triangulace, podlé kteréž obnáší nadmořská výška Sněžky při tomto kameni 844·37 víd. sáhů čili 1601·3 m. nebo 5066·2 víd. střevíců. Vzdálí 14 kroků k J kaple spatřiti lze nyní nový kamenný signál, jenž před nedávnem k účelům středoevropského měření stupně zde byl postaven. Jak mile dospějí výpočty sítě trojúhelníkův, odtud k moři položených, konce svého, pozná se pravá výška nadmořská tohoto místa, tedy i Sněžky, s věcí ještě jistotou.\*)

*Vyhledka s vrcholu Sněžky* náleží bez odporu k nejrozsáhlejšímu a nejzajímavějšímu svého způsobu. Ovšem třeba k tomu požití čistého vzduchu bez suchých a vlhkých mlh a slunečného dne, vůbec tedy pěkného počasí, kteréhož za obvyklé u nás doby cest a vycházek, tedy v měsících červnu, červenci a srpnu, pohřichu zde málo kdy lze se dočkati; přihazujet se zde totiž velmi často, že i za jasné jinak pohody téměř Sněžky v hustou mhlou bývá zahaleno, odkudž většina pocestných je opouští, nedošedše cíle svého. Za to nastane v měsíci září z pravidla pěkná a stálejší pohoda v těchto horách. O polednách nelze sice i za jasného dne, jak již v horách bývá, podoby věcí určitě rozeznávati; nejlépe učiníš však, vyčkaje asi dvou hodin před slunce západem. Vyhledka se Sněžky zajímá zejména

\*) V ty doby dostává se mně z ředitelství c. k. vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni přátelského zdělení, že z předchozích výpočtův pozorování, k měření onoho stupně se vztahujících, vynáší nadmořská výška Sněžky (t. j. hořejší plochy onoho nového kamenného znamení) 1599·5 m. čili 5060·5 víd. stř., při čemž odchylka nemůže býti větší 1 metru.

hlavně v trojí příčině. Jednak lze seznati s tohoto hlediště veškeré rozčlenění, jakož i orografickou povahu celého pohoří Krkonošského, jednak zase způsobují protivy, jež ve vůkolí této hory na odiv se staví, divoké totiž rokle dolu Melzrova, hlubiny dolu Obřího, sněžné na dříl oupady a strže protější hory Studničné, s druhé strany pak utěšená pole, háje a osady širokého údolí Teplického a Hirsberského v Slezích neobyčejné překvapení; konečně pak dochází navštěvovatel za přestálé útrapy bohaté odměny dalekostí a rozsáhlostí vyhlídky zdejší, kteráž za příznivého počasí dopouští stihnouti okem i věže Zhořelické a Vratislavské, jakož i Bílou horu za Prahou, jakkoli více než 15 mil čili 114 kilom. vzdálenou.

Chcít nyní toliko některé ze znamenitějších míst pojmenovati, jež za příznivého počasí s temene Sněžky lze spatřiti, při čemž pohled až na vzdálenost 25 kilom. (ač není-li vrchol v mlhách), poskytuje obrazův vždy s dostatek jasných, což o místech, za touto obvodní čarou ležících, ne vždy platí, ana i za jasného dne zhusta mlhou bývají zastřena. K tomu konci rozdělují obzor Sněžky do osmi nestejných polí, jichž hranice znamenány jsou místy, jež každý bez obtíže mŕž' sobě vyhledati. Pozorujmež *první pole*, kteréž leží k SZ a sice mezi směrem *Vysokého kola* a ssutinami hradu *Kynasta*, držíc plochu úhlu, asi 38 stupňů velkého. Spatřímež tu (napořád od levé ruky k pravé pozorujíc) hned vedlé Vysokého kola horu „u Obrázku“, před ní Jizerský hřeben, v samém popředí šerou povrchu Věčného stavu, v jeho směru pak pod Jizerským hřebenem dlouhou osadu Schreiberhau, za ní konečně Vysoký kamen. Při velmi jasném nebi viděti pak dále asi 8° v pravo od Vysokého kamene v modré dálce čedičovou homoli s dvěma vížkami, t. j. hrad Zhořelický (Landskrone) a zrovna pod ním samo město Zhořelici; pak zračí se nám ihned s předu boudy Schlinglova a Zaječí, za nimi pak zcela v pozadí města Greifenstein a Ljubaň (Lauban). — *Druhé pole* leží mezi *Kynastem* a městem *Hiršberkem*. Bližší osady tohoto pole, jako kostel Wangský, hora Brückenberk, pak osady okolo Teplic slezských (Warmbrunn) až k Hiršberku obrazují se všecky tak jasně, jakoby ležely na mapě rozprostřené. Ze vzdálenějších míst uvidíš sice město *Boleslavce* (Bunzlau) přes východní kraj Teplic, ale ne vždy budeš moci je najíti. Směrem k Hiršberku leží též hora „na Hrobkách“ (Gräberberg) s kapličkou sv. Anny, ves Stonsdorf a vrch Prudelberk. *Třetí* k severu hledící *pole* velikosti asi 48° prostírá se mezi *Hiršberkem*, pak mezi Schmiedebarkem a Kupferberkem. Také o tomto poli platí, co o druhém řečeno. V něm přehledneš pojednou celý důl Melzrův, pak ústí dolin obou potokův Lomnických, ves Krumhübel a skoro všecky osady až k Erdmannsdorfu a Lomnici, výše v pozadí pak Špičák blíž Probsthainu, vrch Hukulge, věže města *Goldberka* a hned při nich čedičovou homoli Vlčí hory (Wolfsberg), posléze pak na nejzazším konci směrem přes Kupferberk také město *Lehnicí*. *Čtvrté pole* obzorné spadá již k SV mezi sousední směr třetího pole a směr k *Lancutu*; držíc pak asi 33°, obsahuje východní rozsochu hlavního hřebene, Černou skálu a Schmiedeberský hřeben, dále celý Lancutský hřeben s tak zvanými Březími kameny (Friesensteine), jež zrovna přes Čertův kamen jasně lze viděti. V pravo Kupferberka spatří se město *Javor*, tři vrchy Střehomské a Střehom (Striegau) sama, dále pak o 8° úhlu v pravo od Březích kamenů, přes Schmiedeberský hřeben hledíc, na samém obzorníku věže města *Vratislavě*, jež ostatně zřídka se zjevují. *Páté pole* o velikosti 26° leží mezi

*Lancutem a Líbovem* (Liebau). Směrem na *Lancut* uhlídáš nejprv vysokou věž katolického kostela farního ve *Svidnici* (Schweidnitz), něco v pravo od něho horu Slezskou čili *Sobotku* (Zobtenberg). V popředí zračí se památná poutnická osada *Křížové* (Grüssau) a vrchy Waldenburské, něco k levé ruce pak od směru na *Líbov* počátek hor Sovích s Vysokou Sovou na samém již obzorníku. *Šesté pole* o rozloze nějakých 46° prostírá se mezi směrem na *Líbov a oním na Trutnov*, kteréžto poslední město zvláště snadno jest sobě vyhledati prostředkem obelisku, nyní na vršku Gablenzově nad městem stojícího. V popředí viděti jest údolí Maloúpské, hřeben Zacléřských vrchův a Rýchorské hory (Rehhornberg), v pravo od *Líbova* pak Vraní hory s pomezním Špičákem a horou Čápem u Teplic (Weckelsdorf), ještě hloub v pozadí pískovcové hory Hejšovinské s Věším a Menším Stohem (Hejšovinou = Heuscheuer) a skoro týž směrem na samém obzorníku mohutný *Sněžník Kralický*, v pravo pak od něho blíže k hledišti pozorovatele horu Vysokou Mezi čili Vrchmezi (Hohe Mense). — *Sedmé pole* obzorné leží mezi *Trutnovem* a oním směrem, jenž podél východní straně hory Studničné k *hoře Táboru* u Lomnice a Jičína běží, kaplou na temeni svém znamenáné. Pole toto (k J obrácené) drží 78° a v popředí jeho spatřiti lze Obří důl, ves Velikou Úpu, nádhernou Černou horu v celé rozloze její, níže pak jeden díl města Hostinného (Arnau) v údolí řeky Labe, horu Zvíčinskou s kaplou její (blíž Dvora Králové), města Josefov, Jaroměř, Hradec Králové a Horu Kunětickou u Pardubic, v levo pak Vyhnánické vrchy u Častolovic. Obzor zavírá se tu severním okrajím vysočiny českomoravské, počnouc od Nasavrch až ke Kostelci n. Černými lesy a Brodu. — *Osmé a poslední pole*, kteréž obsahuje 63° a k JZ obráceno jest, prostírá se mezi směrem k *hoře Táboru* a mezi směrem prvního pole, t. j. k *Vysokému kolu*. V popředí otvírá se zrakům opět krajina výsehorská, t. j. hned v úpatí Sněžky prostranná a klečím porostlá planina pod Sněžkou s boudami Obří, Loučnou a Rennerovou, v levo od nich velikolepá spousta hory Studničné, jejíž nejvyšší místo za Sněžkou jen o 40 metrů pozadu zůstává a která tudíž skoro všecken pohled v tuto stranu na dobro zavírá, propouštějíc však přece při východním konci svém uzříti v modravé dálce nízký hřbet, arci jen při velmi jasné pohodě viditelný, t. j. východní konec *Bílé hory u Prahy* čili Lomy (Saudberg) na Petříně. V ose hory Studničné viděti jest ostatek hřbetu pobočního, zejména Kozí hřbety se skalistými hřivami jejich a zadní, odtrženou část jeho, t. j. horu Krkonoš s Kotlem, pak dolinu Sedmi dolů, jež v pozadí zavírá se sedlem Labské blaně. Za opyší Kozích hřbetů vystává ještě nad obzor hora Ještěd u Liberce a za Kotlem zvonovitá Vysoká Varta (Lausche) u Žitavy. Mezi oběma těmato horama objevují se na obzorníku modravé výšiny, rovnou čarou ubíhající, t. j. Krušné hory v okolí Cínvaldu. — Laskavý čtenář nechť mne v tom má onlivena, že jsem vyhlídce se Sněžky popřál tuto věcího místa, než bylo původně na mém úmyslu, avšak s důstatek měl jsem příležitosti přesvědčiti se, jak mnoho drahého času bývá často mařiti i osvěcenějším navštěvovatelům naší Sněžky, než se, a to dosti chatrně, o tom zpraví, kterým směrem náleželo by hledati zajímavější místa vidu toho.

Nahoře již pověděli jsme, že skupenství Sněžky skládá se vlastně ze čtyř vrcholů, jichž největší a v samém prostředku celého skupenství položený vrchol, t. j. vlastní čili Věcí Sněžku, jsme právě tuto popsali. Ostatní tři vrcholy leží

v prodloužených třech hranách pyramidy Sněžky, zejména v prodloužení hrany severozápadní *Menší Sněžka* (Kleine Koppe, 1333 m. vysoká), kteráž obrazuje se co nepatrné vyvýšení severního konce planiny pod Sněžkou; v prodloužení jižní hrany, tvořící osobitou rozsochu, leží třetí vrchol, tak zv. *Rožmberk* čili Růžová hora (1394 m.) a v prodloužení severovýchodní hrany, jež dále k V co hlavní hřeben pokračuje a Krkonošským hřebenem (Riesenkamm) se nazývá, nalezá se konečně čtvrtý vrchol, *Černá* totiž *skála* (1410 m.). Jmeno tohoto vrcholu lze slýchati nejčastěji, poněvadž po něm vede stezník od Hübnerovy boudy k Sněžce. Černá skála (Schwarze Koppe) svažuje se strmě k SZ a JV, k JZ však jeví se co konec prodloužené, dosti povlovně se spouštějící severovýchodní hrany Sněžky. S tohoto vrcholu, jakkoli dosti vysokým klečím porostlého, lze zejména požití velice poučného pohledu do dolův a roklí řeky Menší Úpy.

Spojným členem skupenství Sněžky s hlavním i pobočným hřebenem činí se zejména často již jmenovaná *Pláň pod Sněžkou* (Koppenplan). Planina tato obrazuje se v podobě roviny, do tří kilom. dlouhé, jeden kilom. široké a povlovně do prostředka svého se svažující, kteráž majíc více jak 1328 m. (4200 víd. stř.) prosté výše, s část pokryta jest četnými porostlinami kleče, s část pak jeví se co louka, držící hojnost mokrých i slatinných míst, po kterýchž zvláště za doby stálějších deštův a s jara nesnadno jest dále se dostatí přese všechny hojné stezníky, jež na této pláni všelikými směry se křížují. Skoro všechny tekuté vody této planiny, jejíž severní díl nazývá se *Bílou loukou*, sbírají se v středu jejím, tvoříce tu potok Bělou (Weisswasser) k Labi. Na jihozápadním konci pláň stojí postranná, za minulých let ještě hojně navštěvovaná Loučná bouda (Wiesenbaude).

Ke skupenství Sněžky, ano jest vůbec nejčelnější a nejhledanější, lze dostatí se také mnohými *cestami*. S *české i slezské strany* vede ke Sněžce zejména často již vzpomínaná stezka pomezní; dále s *české strany* ještě stezka od Špindlmühlu (Přádelny), podél bud Leyrovy a Špindlerovy, jakkoli od Špindlmühlu bývá nejobecnější stezka na Sv. Petr a na boudy Rennrovu a Loučnou. Jiné stezníky jsou: od Niederhofu (Dol. Dvorů) a Švarctálu přes Liščí horu a Studničnou; od Velké Úpy na Petzrovu krčmu (Petzer), skrze Obří důl a na boudu Obří (s české strany bez odporu nejzajímavější pouť); od Velké Úpy podél Leischnerových bud a přes Rožmberk; od Malé Úpy (čili od Sv. Petra maloupského) na boudu Hübnerovu a Černou skálu. Od *strany prusko-slezské* je nemenší důstatek cest nahoru vedoucích. Tak zejména ze Schmiedeberka na Arnsberk, Hübnerovu boudu a Černou skálu; ze Schmiedeberka na boudy Lesní (Forstbauden), Stál čili Klepy (Tafelsteine) a Černou skálu; ze Schmiedeberka na Sejfy Kamenné (Steinseifen) a Příčné (Querseifen) dolem Melzrovým, od Příčných Sejf pak přes Menší Sněžku, jakož i na boudu Hamplovu; od Teplic slezských na kostel Wang (Brückenberk) a boudu Hamplovu (kudy se slezské strany nejvíce se chodí) atd.

Páté a poslední pro nás skupenství hlavního hřebene Krkonošského je tak zv. *hřeben Schmiedeberský*, jemuž také Lesný hřeben (Forstkamm) se říká a jenž na mapách rakouských také s jmenem „Fichtiglehne“ (Smrčná strán) se vyskytuje. Jestíť to zejména pěkně sklenutý hřeben, 2·5 kilom. dlouhý a od JZ k SV se stroucí, kterýž na obou koncích svých ozdoben jsa kupovitými vrcholky, nabývá takto podoby sedla, jakkoli pro les smrkový, jímž skoro všudež jest po-

rostlý, volnější výhlídky málo kde propouští. Oba štíty jeho, jichž jihozápadní *Lesná hora* (Forstberg), severovýchodní *Mordová skála* (Mordhöhe) se nazývá, mají skoro jednotejnou prostou i poměrnou výšku (1285 m.). Něco k SZ prvéjšího nalezá se na vyvstávajícím žebře skupenství skal, jimž *Stál čili na Klepech* (Tafelstein) říká i odkudž jeví se pěkný pohled do dolejšího dílu údolí Schmiedeberského, jakož i ke Sněžce a k Lanům. K tomuto skupenství lze také přičísti oddělenou kupu, na severním konci jeho stojící a hned do očí bijící, t. j. tak zv. *Býčí skldu* (Ochsenkopf, 1031 m.) s pohledem do hořejší části Schmiedeberského údolí a na Březí kameny. Schmiedeberský hřeben odděluje se od Černé skály sedlem, v prosté výši 1168 m. se nacházejícím, ze severovýchodního konce jeho pak vybíhá k J nejprv vrch Kolbenberk a níže vrch Rýchorský (Rehhornberg), čínice s ním pěkný, s část pohraniční oblouk a jsouce od sebe zase rozděleny vysokým sedlem (1052 m.) u Pomezních bud (Gränzbuden). Skupenství toto leží již celé v oblasti ruly. Kromě stezky pomezní vedou k Schmiedeberskému hřebeni ještě stezky od Hübnerovy boudy, jiný od Lesních bud (Forstbuden) a několik cest ze Schmiedeberka i Arnsberka.

Postupmež nyní k *hřebení pobočnímu*, t. j. k oné mocné vypuklině půdy, po míře jmena svého proti jižnímu svahu hlavního hřebene a rovnoběžné k němu se prostírající, kteráž skoro docela již v oblasti svoru a prahorních břidlic hlinitých se nacházejíc, na dvou místech, t. j. u Labské louky (blaně) a u planiny pod Sněžkou s hlavním hřebenem se spojuje, na třetím místě pak, k Spindlmühlu totiž, vlivem hluboké prorvy v celosti své se přetrhuje. Tak rozpadává se poboční hřeben od samé přírody své do dvou dílů, západního totiž a východního.

Středistěm *západního skupenství hřebene pobočního* je *hora Kotel* (Kesselberg, také Kesselkoppe), kteráž obrazuje se v podobě kupy slabě sklenuté, v poměrné výši 80—100 metrů nad hřebenem vyvstávající, jejíž nejvyšší místo má 1435 m. (4540 víd. stř.) nad povrchní mořskou. Na jihovýchodní straně této kupy, jinak všudež povlovně se sklánějící, spatřuje se 400 metrů hluboká propast čili kotel (březno), ssutím tamějších vrstev způsobený, jemuž říkájí jama čili březno pod Kotlem (Kesselgrube nebo také Kesselloch, 1038 m. pr. v.) a kterýž Sněžným březnům Krkonošským na pohled se podobaje, skalným žebrem také do dvou jam se rozděluje, v nichž nezřídka i v létě ještě sníh lze zastihnouti. Zrovna k jihu vybíhá Kotel v krátkou, na konci skalistou a hranatou rozsochu, *Kužel* (Koschelkamm) řečenou. S Kotle, jinak z velké dálky (od Hradiště, ba i z Mladé Boleslavě a Ďablických Ládví u Prahy) zřejmého, otvírá se pěkný pohled do Sedmi dolů, do Šerého dolu (Finstergraben), podobou černé rokle k J se beroucího, do údolí Rokytnice a Mumlavy, zvláště pak daleko do vnitra Čech, kdež jedním okamžením lze obsáhnouti všecky ony početné homole a hříby čedičové a náhorní roviny pískovcové, jež severozápadní čtvrtinu země vyplňují. Od Kotle prostírá se široký hřbet dále k západu, dvě ploché kupy nesoucí, zejména tak zv. *Lysou horu* (Kahlenberg, také Hinter-Blech), 1354 m. vysokou, pak kupu, *Blechkamm* řečenou (1186 m.), s výší hřebennou 1000 m., k čemuž přistupuje ještě nižší, od Lysé hory se odštěpující hřeben 800—900 m. prosté výše, kterýž obloukem okolo Blechkammu se klada, společně s ním údolí Seifenbašské obstupuje a na Z Čertovou skalou (1022 m.), srážně na SV k Seifenbachu se sklánějící, posléze se

Blebsaum

Lyſá Hora

Kotel

Krkonoſ

Vlčí hřeben



Pozadí údolí Rokytnického.

skonává. Hořejší a rovnější díl tohoto hřebene na straně k Dvoreckým budám (Hofbauden) nazývá se Čertova planina (Teufelsplan) nebo i Kratzlova rovina (Kratzels-ebene). Prostředkem protější rytiny pokusil jsem se podati pohled do pozadí údolí Rokytnického (Rochlitz), kteréž v hořejším dílu svém od oněch západních výstupkův Kotle obstoupeno jest, odkudž pak čtenář povahu pobočního hřebene Krkonošského, jehož západní polovice až nahoru ke Kotli v obrazu onom se zjevuje, jasněji můž' poznati, než z jakéhokoli popisu. — K východu Kotle prostírá se hřbet dále v podobě úzkého, na hoře skomoleného hřebene, jenž skoro na dva kilometry cesty v stejné výšce se drže, na temeni několik nízkých skalistých hřibů nese, nejvyš 1409 m. vysokých. Tomuto hřebeni, nahoře chudým klečím porostlému, říkají *Krkonoš* (č. i n.). Spadát na sever způsobem skalné stěny k hořejšímu údolí Labe, k jihu pak neméně srázně k údolí Šerému. K V však stře před sebe nižší i širší plasu, dva kilometry dlouhou, na níž stojí okrouhlá kupa *Klíč* (Schlüsselberg, také Berghübel, 1240 m.) řečená, načež sráznou straní náhle se končí. Tento díl pobočního hřebene Krkonošského připojuje se, jak již řečeno, k hlavnímu hřebeni prostředkem blatné šije, 1,5 kilom. dlouhé i široké a od S k J obracené, jejíž nejnižší místo má 1258 m. nad mořem a kteráž *Labskou loukou* (blaní) se nazývá. K Z spouští se Labská louka dosti srázně k hořejšímu konci potoka Mumlavy, k V naopak stojí v podobě strmé stěny, 250 m. poměrně vysoké, nad dolem Labským. Početnými *cestami* lze ke Kotli nahoru se dostat; jednak od boudy nad Brezny (Schnee-grubenbaude) na boudu u slapu Labského (Elbefallbaude), jakož i od starší Slezské boudy k prameni Labskému a odtud společně přes Labskou louku; od Harachovic údolím Mumlavy nebo na Seifenbach, Čertovu pláň a Dvorecké boudy; z Rokytnice na tytéž boudy; z Jilemnice po silnici na Křeslice, k myslivně „u Rezka“ řečené a pak pěšinami přes Vlčí hřeben a boudy Dvorecké; z Jilemnice na Vítkovice, Tři domky a ke dvorci Kotelskému (Kesselhofbaude); od Krausových bud po stezníku na hořejší Frydrychstal a přes Krkonoš, konečně od Špindlmühlu novou cestou na boudu Slapskou.

*Východní skupenství pobočního hřebene* vyznamenává se mohutným chlumem, z kteréhož vybíhá ostrý hřeben přímo na západ, a sice k onomu místu, kdež hřeben hory Krkonoše pojednou jeví se býti přetržen. Jestli onen chlum zejména hora *Studničná* (Brunnberg), často již vzpomínaná, kteráž skládá se z širokého, 3-2 kilom. dlouhého, od Z k V se stroucího hřbetu, 1500 m. vysokého, jenž na obou koncích nízkými, okrouhlými vrcholy končí. Západní vrchol, t. j. vlastní Studničná, jinak též *zadní Loučná hora* (Hinterwiesenberg) řečená, drží 1555 m. čili 4919 stř. výše, jsouc tudíž sama druhá nejvyšším štítem v celých Krkonoších, ano východní vrchol je o několik metrů nižší, máje jméno *Kamenné pole* (Steinboden). Málo kroků na V tohoto vrcholu nastává již kraj Studničné, jsa náhle jako by uříznutý a podobou bez mála svislých, protrhaných stěn do Obřího dolů hloubkou 300—400 metrů se spouští. V slojích a trhlinách této stěny, východní sklon Studničné křivou čarou lemující, drží se i v létě špinavé pruhy sněhu a mezi tamější florou najdou se nezdávka i vzácné byliny. Jižní stráň Studničné má povlnnější sklon i nazývá se mezi lidem Krkonošovou zahrádkou (Rübezahls Lustgarten); podobným obrazem je také severní svah mírně sklenutý, spouští se povlnně k jmenované již *Bílé louce* čili pláni pod Sněžkou, na kteréž, jak již



řečeno, stojí Loučná bouda v nadmořské výši 1388 m. (4390 stf.), jsouc vůbec na sever Dunaje nejvyšším místem, od lidí stále obývaným, jelikož výše položené boudy čili salaše mívají jen letní žitele. S Kamenného pole, zvláště pak s nižšího jednoho výstupku jeho, k JV odtud položeného, jemuž říká se *na Železi* (Brandkoppe), otvírá se utěšený pohled k celému skupenství Sněžky i s jižními rozsochami jeho, ano se zadní Loučné hory přehlédne se hořejší údolí Labské a bez všeliké překážky i severní Čechy až ku Praze. Naopak je pohled do Slez (k S) s obou vrcholů Studničné protějščí spoustou hlavního hřebene velice obmezen. K JZ a Z spadá Studničná strmě do údolí Sv. Petrského, k SZ však proměňuje se hřbet hory náhle v úzký hřeben, k němuž připojují se u Rennrovy boudy *Kozí hřbety*. Totě velice památný hřeben, jemuž v horách Krkonošských nic nenalezneš rovného, ze spod asi 4 kilom. dlouhý, směru celkem od V k Z se přidržující a skalné střeše dokonale se podobající, jejíž ostré slémě, 3 kilom. dlouhé, nedrží se ostatně v jednostejné výši, jsouc na onom místě, kdež k Studničné přiléhá, zajisté nejvyšší (1409 m.), odkudž mu pak k Z povlovně až na 1300 m. prostě výše ubývá. Na několika místech vynikají z tohoto slemene skalisté jehly nad střední výši jeho, zejména pak stojí taková jehla i na západním konci, kterýž nastává náhle účinkem průlomů hořejšího údolí Labského zrovna naproti kraji hřebene hory Krkonoše. Oba hřebeny leží tedy v též ose, jsouce tu protrženy hlubokou, 100 metrův širokou soustěskou, kterouž hledaly a proklestily jsou sobě také vody Sedmi dolů (t. j. Labe a Bělá) průchod v dobách pravěkých. S Kozích hřbetů, zejména s hlediště nad boudou Rennrovou, požití lze velice poučné a vděčné vyhlídky do Sedmi dolův, jejíž obraz přiložený nalezneš následujícímu § 4., kdež píše se o hořejším údolí Labském. Také ke Kozím hřbetům, jakož i na horu Studničnou vedou početné *cesty*, jež jsme větinou již při cestách ke Sněžce byli vytkli (srov. str. 40). Nejčastěji chodívá se nahoru od Špindlmühlu na Sv. Petr a k boudě Rennrově nebo z pláně pod Sněžkou na Loučnou boudu, pak i z Lanova (Langenau) na Dolejší Dvůr (Niederhof) a přes vrch Berenberk, posléze i od Petzrovy krčmy na boudy Richtrovy. Spojení východního dílu pobočného hřebene Krkonošského s hlavním děje se na podobu západního dílu také prostředkem široké šíje, t. j. Bílou Loukou a níže planí pod Sněžkou, o nichž již vícekrát zmínka se jest stala.

Vypsav takto jak hlavní, tak poboční hřeben Krkonoší, přistupuji nyní k vylíčení *rozsoch*, z jednoho i druhého hřebene vybíhajících, což věším dílem pod pravými úhly se děje, odkudž těmto rozsochám také vším právem sluší jméno *příčných hřbetův*, any hlavní a poboční hřeben jsou bez odporu *hřbety podélnými*.

Jak již výše vzpomenuto, panují mezi severními, na slezské půdě ležícími rozsochami s jedné a mezi jižními čili českými s druhé strany velké rozdílnosti. Jižní rozsochy jsou totiž málo četné, za to ale širší a mohutnější, vykazujíce sice málo členův, za to ale značnou délku (průřezem 15·5 kilom.); severní čili slezské naopak jsou na počet mnohem hojnější, proto také užší, členitější a kratší (průřezem 7·7 kilom). Ostatně byla by délka jižních rozsoch mnohem ještě větší, kdyby vidělo se, připočítá k nim také podhorní končiny jejich až do těch míst, kdež nastupuje táž nadmořská výška půdy, jako v podnoží severních rozsoch. Posléze je svah jižních rozsoch velice povlovný a zcela stejnoměrný, dokud totiž nenastane

jich konec, kdež teprv náhle se svažují. Na jižních rozsochách pozoruje se kromě toho ještě ta vlastnost, že hledí směrem popsaného právě pobočního hřebene se rozšiřovati a haluze i žebra z sebe vysílají, což asi nejspíše pochodí od četných couků křemene a zelenokamene, jimiž tyto hřbety kolmým směrem proniknuty jsou. Ostatně rozumí se samo od sebe, že vždy mezi dvěma takovými rozsochama bývají uložena příčná údolí, o kterýchž povím něco více v následujícím odstavci. Nyní hleďmež aspoň důležitější tyto *rozsochy* lépe poznati, počnouce s *jižními* čili *českými*.

*Vlčí hřeben* je první rozsochou Krkonošskou na západě. Vychází z pobočního hřebene, zejména pak od Lysé hory v podobě 14 kilom. dlouhého, od S k J běžícího horského hřbetu, jenž na temeni svém jest široký a slabě sklenutý, vůbec pak hustým lesem zarostlý. K V a sice k údolí Menší Jizery, je svah jeho dosti jednotvárný, ale přikrý, k Z však vysílá před sebe několik žeber (krátkých hřbetův) do údolí Věcí Jizery. Vlčí hřeben má počátek svůj u bud Dvoreckých ve výši 1100 m. a skonává se u Víchova nad Jilemnicí prostou výškou 600 m., skláněje se pod slabými ohby k J, jakkoli od kořene svého až nad myslivnu „u Rezka“ nosí 3 kilom. dlouhý, skalistý a klanci protrhaný čeren, jemuž jméno Vlčího hřebene vlastně přísluší a jehož nejvyšší místo drží 1150 m. Dobrá okresní silnice běží od Jilemnice zrovna po vodním rozhraní tohoto, v dolejší a střední části rolemi a vsemi osazeného hřebene přímo k S až k řečené myslivně „u Rezka“ (871 m.); odtud však odbočuje silnice k SZ a zarývají se do svahu hory, vede k Frydrychstálu a potom dolů do Rokytnice. Hřeben Vlčí drží se celkem v poměrné výši 250—400 m. nad žlabem lemujících jej údolí a roklin.

Nejbližší soused Vlčího hřebene k V jest rovnoběžný s ním *hřbet Heidelberský*, kterýž blíže bud Schlüsselských z Krkonoše vybočuje. Hřbet tento drží se skoro přímo směru od S k J a počíná v prosté výši 1100 m., snižuje se nad Vrchlabím až na 700 m., jest nahoře slabě sklenut, k V i Z stejnoměrně, ale příkře k pobočním údolím hořejšího Labe a Menší Jizery svážen, skoro všechen lesy zarostlý i nosí na temeni několik buď kupovitých, buď skalistých a srázných vrcholů, kteréž nazývají se *Kreusel* (1093 m.), *Černá skála* (Schwarzkoppe 1052 m.) *Šerý kámen* (Finsterstein, 1010 m.) a pěkný homolité dvojvrchol, *Heidelberk řečený* (1035 m.) a k SZ nad Vrchlabím stojící, jímž tato rozsocha Krkonošská se skonává.

Z hory Studničné vybočují tři rozsochy co hřbeny příčné, jedna k JZ (Planina), druhá k J (Berenberk), třetí k JV (Černá hora).

Hora „Planina“ nebo Planour (Planurberg), jinak též *Vachour* (Wachurberg) řečená a od Studničné k JZ vybíhající, jeví se s počátku v podobě homolitého vrchu, jemuž říkájí *Stoň* nebo *Stožek* (Heuschöber 1308 m.), odkudž rozkládá se k SZ a JV v širokou, slabě sklenutou a lesnou náhorní rovinu, jejíž nejvyšší místo nazývá se „na Planině“ (Planur, 1189 m.), načež obrací se v podobě hřbetu k J a sníživši se z posavadního vypnutí 1100 m. až na 800 m., přestává na SV města Vrchlabí v podobě široké kupy, *Vachour* (815 m.) řečené.

Jiná rozsocha odštěpuje se ze Studničné u Keilových bud; jestiž to hřbet, *Berenberk* řečený. Ten drží se hned s počátku jižního směru a zachováváje při

tom nadmořské výše 1000—1100 m. déle souseda svého, vyznamenává se četnými salašemi, jimž Lahrovy boudy říkají, jakož i zvláště na obou koncích svých vyšších vrcholy, kteréž jsou: na hořejším konci vlastní *Berenberk* (1306 m.), na dolejší pak *Háj Hanapetrův* (Hanapetrshain, 884 m.) nade vsí Dolejšími Dvory (Niederhof).

Nejdůležitější z rozsoch hory Studničné je bez odporu *Černá hora* (Schwarzenberg). Ta odštěpuje se od prvější směrem k JV, majíc 12·5 kilometrů délky. Blíže kořene tohoto hřbetu vypíná se nejprv kulovatá, nízká kupa, již říkají *Liščí hora* (Fuchsberg 1362 m.), načež hřbet svažuje se rychle k JV až na 1050 m., jsa v těchto nejnižších místech svých početnými salašemi (Liščí boudy, Webrovy boudy a boudy na Bobí louce = Bohnwiesbauden) osazen. Za příčnou roklí, kteráž obsahuje prameny potoka Čisté (Lauterwasser, k Labi u Hostinného) zdvíhá se tu pak najednou zase půda až do 1202 m., rozprostraňujíc se zároveň v mohutnou spoustu horskou, známou pod jmenem *Černé hory* (jinak též „Spiegel“) a viditelnou všudež ze severních krajův českých, ana obrovskou rozlohou svou největší díl hlavního hřebene Krkonošského očí zakrývá. Tento chlum, kterýž toliko k SZ k soujmenné rozsoše přiléhá, ukazuje jinak na všechny ostatní strany příkré boky, má na temeni svém slabě sváženou rovinu či planinu, 2 kilometry dlouhou a 1·5 kilom. širokou, kteréž říkají *na Spieglu* a jejíž nejvyšší místo (blíže znamení triangulačního) drží 1299 m. čili 4110 stří. prosté výše. Černá hora je po straních svých skoro všudež hustým lesem zarostlá, na temeni však shledáš buď jen klečí, buď prostrannou blatnou louku (blani), lemovanou klečím a nízkým smrčím. V jižní straně, a sice vysoko nahore, jsou také některé salaše, zejména Spieglový a Zinkový boudy, pak i Volské boudy (Ochsenbauden). K V vlastního chlumu, a sice na jakémsi skalistém žeburu jeho, vypíná se homolité, lesem zarostlý vrchol, jemuž říkají *Forstberg* (1268 m.), mezi oběma pak vychází z lůna hory těsná a srázná rokla, Klausegraben řečená, k JV nejprv k vsi Schwarzenberku, pak dolů k Maršovu (do Úpy) směřující. Jižní sklon Černé hory samé je však náhlý a dochodí až do 700 m., načež následuje zase hluboká rokla, k Švarctálu se otvírající, a za ní široká plasa, *na Ladech* (Ladich) řečená, z kteréž vyvycházejí pak četné haluze, v podobě dosti širokých hřbetův k J se beroucí, mezi kterýmiž prostírají se v táhlých údolích osady Čistá (Lauterwasser) a Forst, pak Sejfy, Javorník (Mohren) a Mladé Buky (Jungbuch). Rokli Švarctálské (Ochsengraben řečené) odpovídá na východní straně tamější šíje („u Červeného kříže“) pěkné a hluboké údolí podélné, v kterémž leží známé lázně *Svatojánské* (600 m.). S Černé hory otvírá se ostatně velikolepý a nepřetržitý pohled do severovýchodních Čech i jestli ona Krkonošům vůbec tím, čím jest Boubín Šumavě.

K rozsoše Černohorské připojuje se však nedaleko buď Fuchsových ještě jedna krátká haluz, *Zlatá hora* (Goldhöhe) řečená a k J se beroucí, kteráž mezi Švarctálem a Hořejším Lanovem (Ob. Langenau) končí se lesnatou kupou, již říkají *vrch Benešův* (Böhmisch Berg, 1013 m.). Co se posléze cest tkne, třeba sobě vzpomínouti, že na hřbetech, ze Studničné vybočujících, mnohé obývané vesnice v podobě různých buď se nacházejí, kteréž věcí dílem pěšinami nebo voznicemi mezi sebou spojeny jsou, čímž i všechny vrchy těchto rozsoch snadného spojení mezi sebou docházejí.

Šestá rozsocha, jenž ze Sněžky samé k J vybočuje, klade se v značné prosté výši mezi hořejší údolí Věcí a Menší Úpy, jsouc četnými, potočnými roklemi vybrážděna. Na ní stojí v ose hory Studničné plochá kupa, *Rožmberk* řečená (1394 m.), odkudž se směr rozsochy k SV obrací.

Co sedmou, velice vážnou rozsochu náleží na V vlastních Krkonoš vytknouti onen příčný hřbet, kterýž od východního konce Schmiedeberského hřebene se odbočuje, jsa od něho u Bud pomezních toliko mělkým sedlem ve výši 1052 m. oddělen. Jestli to hora *Kolbenberk*, směrem od S k J a délkou 4 kilom. co široký, lesnatý a slabě sklenutý hřbet s četnými žebry po hranicích se prostírající, jehož nejvyšší místo (1187 m.) nese totéž jméno. Tam, kde silnice od Sv. Petra (Maloúpského) k Valbeřicím přes něj se běže, mění se však tato posavadní povaha jeho, pokud totiž ve tři haluze počíná se rozstupovati, z nichž první, jihozápadní, přijímá na se povahu úzkého hřebene o srázných straních, několika skalistými plasami do hlubokých údolí se spouštějících. Hřeben tento, 5 kilom. dlouhý, nazývá se *Dlouhá hora* (Langenberg) a skonává se nad zámek Maršovským, nosí celou řadu štítův, jichž nejvyšší (1018 m.) a nejprůkrejší má totéž jméno; na jihozápadním konci stojí pak druhý, homolitý vrchol, *Špičák* (Spitzberg) řečený a 877 m. vysoký. Druhá, krátká haluz Kolbenberka klade se mezi údolí, v kterýchž vsi Kolbendorf a Valbeřice leží, třetí, na témž místě počínající a mírným obloukem (po hranicích zemských) taktéž k J táhnoucí, má s počátku podobu širokého hřbetu, kterýž se však brzo zase zužuje, několik skalistých štítův (mezi nimi *Tüpelstein* 1002 m.) nesa, načež vnitř země rozkládá se v mohutnou náhorní rovinu podoby eliptické, 10 kilom. dlouhou a 8 kilom. širokou, kteráž nahoře ukazuje prostranná luka, v nichž za letní doby rozličné lékařské byliny (mezi nimi zvláště *Aconitum Napellus* a *variegatum*) u velikém množství lze viděti a sbírat.

Tato náhorní rovina čili spousta horská nazývá se po blízké vsi *horou Rýchorskou* (Rehbornberg) i dostupuje na nejvyšším místě svém, jemuž Dvoreckýles (Hofbusch) říkájí, 1022 m. výše. Na západní straně svažuje se tato hora prostředkem četných žeber, vějířovitě z vnitra jejího se rozbihajících, k údolí Úpy, což podobně i na jihu se děje; naopak je východní sklon její, totiž k Zacléři, velmi příkrý i odštěpuje se tu od ní dlouhý hřeben, *Stachelberk* řečený (622 m.), kterýž obloukem k JZ běží a prostředkem několika žeber teprv nad Poříčí (Parschnitz) a Trutnovem se skonává. Přes rozsochu Kolbenberka (v širším smyslu), kteráž vůbec jest nejrozsáhlejší všech, vedou početné cesty (stezky, voznice i silnice), zvláště pak dobrá silnice od Bud pomezních do Valbeřic (Albendorfu), dále přes *Tüpelstein* do Opavy (slezské) a města Zacléře, konečně pod *Stachelberkem* do Trautenbachu a Trutnova, kromě toho pak mnohé cesty z vůkolních dolin vzhůru na chlum Rýchorský.

Přístupmež nyní k vyličení *severních rozsoch Krkonošských*, na prusko-slezské straně se rozkládajících. Svrchu již obrátili jsme zřetel čtenáře k rozdílům, kterýmiž různí se rozsochy české od rozsoch prusko-slezských, pověděvše zejména, že tyto jsou na počet hojnější a členitější, za to ale kratší, držíce se po větce jen délky 7-7 kilom. Mimo to svažují se severní tyto rozsochy ve způsobě tří zřejmých plas, a to dosti srážně k severu, klesající v hořejší plase s výše 1250 na 1050 m., v prostřední s 1000 na 850, v dolejší pak s 600 na 400 m. Srážný

sklon těchto plas má pak ten účinek, že cesty s pruské strany nevedou po temenech oněch rozsoch, jak se to zejména téměř bez odchylky na jižních rozsochách děje, nýbrž postupující vzhůru údolími, dostihují tak hlavního hřebene. Na jižních rozsochách potkávali jsme se z husta s táhlými čereny skalními (hřivami), na rozsochách severních však jich více není; za to nacházejí se tam velmi často ojedinelé turně, klepy neb trosky mohutných balvanův skalních, jimž zde vůbec Kameny (Steine) říkají, jevíce se co pozůstatkové slabších nebo mocnějších coukův křemennějšího granititu, na den vycházejících, jež věcí hutností dovedly jsou vlivům zvětrání, drobení a splakování vodou déle vzdorovati, než horniny hřebenův samých. Tak zejména nalezněš mimo jmenované již tvary toho způsobu na hlavním hřebeni (t. j. Stůl, Polední kamen, Mládenčí a dívčí kameny, Fialový čili Mešný kamen, Sýrný a Svinský kamen), jda od Z k V po těchto severních rozsochách v obvodu granititu, — tak zv. Medvědí kamen (Bärenstein) u Marientálu, Chuchelný kamen (Kochelstein) při ústí řeky Chuchelné, Korálový kamen pod Sněžnými březny, Turní č. Věž (Thurmstein) u Anežčiny vsi (Aagnetendorf), Bílý kamen u domků nad Mumlavou (Mumelhäuser), kamen Vojákův (Soldatenstein) tamtéž, kamen řečený „Gatterstein“, při Sejfském potoku, Tři kameny pod Věčím stavem, Kravarský kamen (Kraberstein) na hoře Hrobečích, pak známé již Břeží kameny na východ Schmiedeberka. Tu však vyčteny byly jen takové kameny, kteréž vůbec jsou známější.

Prohlížeje nyní severní tyto rozsochy jednu po druhé, a sice od západu k východu, setkáváme se nejprv s mohutným a širokým výpustkem čili žebrem, kteréž vychází ze severního svahu hory Siňáku (Reifträger) a kterémuž nejspíše od podoby jeho se strany dáno jmeno *Kobylí hlavy* (Pferdekopf). Rozkládá se k S mezi doly potoka Zackerle a Věcí Chuchelné, rozbíhá se v prostřední plase své v několik menších výšin, jež všechny v údolí Věcího Zackenu konce svého docházejí. Na dolejších plasách jeho spatřiti lze početné salaše, jimž říkají domky Chuchelské (Kochelhäuser).

Po něm následuje k V krátký sice, ale krásným hvozdem porostlý a od četných pramenitých roklí, jichž vody níže v potok Chuchelnou se sbírají, k S vybrázděný hřeben, jemuž jmeno *Chuchelského lesa* (revíru) svědčí a kterýž u Sněžných březů z hlavního hřebene vycházejí, má na hořejším konci svém tak zv. starší boudu Slezskou. Třetí v řadě jest pak rozsocha *Korálového kamene* a rozsocha, *Homole* (Hummelberg) řečená. Prvější odbočuje přímo k S od Věcího Šišáku, vyznamenává se v prostřední plase své u výši 864 m. pěkným skupenstvím klepův, kterýmž říkají *Koralové* čili *Horalské kameny* (Korallen-, také Goralensteine), a sklání se pak, majíc k V ještě jeden ploský vrchol, Falcký vrch řečený, k dolu Šindelářovu (Schindelgrund), jenž na hořejším svahu jeho počínaje, k V ven vychází. Za Falckým vrchem (Pfälzer Berg) zdvíhá se hřeben ten poznovu a běží nyní s malým ohbem k SV. Teď svažuje se srážně na V, vysílaje k SZ několik žeber, vesměs asi 600 m. vysokých, vrchy totiž Heidelberg, Kieferberk a Mlynářův (Mühlberg). Na vlastním hřebeni pak, kterýž na JZ Hermsdorfu se srážnými boky do Teplického údolí se sklání, spatřiti lze ještě řadu okrouhlých, jasně se obrazujících vrcholů, totiž Širokou horu čili Širák (Breitenberg), Pole (im Pole), novokřtěnou skálu Bismarkovu (Bismarkhöhe), pěknou *Homolí* (Hummelberg) a

posléze tak zv. Sabrichův kopec, kteréž drží se vesměs ve výši 700—750 metrův. Na jednom ze severozápadních výpustkův nalezá se dlouhá ves Kieseewald, z kteréž vede cesta netoliko po celém hřebeni dolů do Hermsdorfu, nýbrž i nahoru ke Korálovému kameni a k Černým Březnům sněžným pod Věším Šisákem.

Od oblého výpustku, na kterémž shledávají se vzpomenuté již Dívčí a Mládenčí kameny blíže boudy Petrmanovy, odštěpují se vedlé sebe tři rozsochy k S zároveň běžící, z nichž západní jest nejkratší, skonávajíc se již po 2 kilom. cesty, prostřední po 4 kilom., a na východní je nejdelší a nejzajímavější. Západní rozsocha vyznamenává se jen tím, že na dolejší konci svém ve výši 661 m. nese mohutnou klep v podobě věže, kteréž také *Turně* či *Věžný kamen* (Thurmstein) říkají. Na posledním hřbetě stojí zase pěkný hřibovitý vrchol, *Schossühbl* řečený, pod nímž rozstupuje se hřbet do několika krátkých žeber. Nejčelnější je tedy východní rozsocha. Ta odštěpuje se u samé boudy Petrmanovy, kdež spadá, podobně co ostatní příční hřbety severní, s výše 1280 m. hned na 1050 m., popíná se pak zase v podobě okrouhlého vrcholu, jemuž říkají Jägerühbl, sklání se tu poznovu v prostřední plase své srázně až na 850 m., zdvihá se zase v kupu, Černá čili Červený kopec (Rothühbl) řečenou, načež prostírá se mezi dvěma hlubokými doly k severu, rozpadajíc se tu v početné, ojediné vršky, nazvané Široký vrch, Fuknerův vrch, Špičák, Menzlova skála, Zlatý kopec, na Ohništi (Heerdberg) a *Kynast*. Tento vrch, vyznamenaný jak pěknou podobou svou, tak ssutinou sojmenného hradu, na vrcholu skal jeho se pnoucí, zná i navštěvuje zajisté každý pocestný v Krkonoších. Výška hory Kynastu obnáší 634 m., do kteréž dosahují ostatně skoro všechny jmenované vřkolní vrchy, některé z nich (zejména dva první) ji i předstihujíce. Přes hřbet Kynatský (v širším smyslu) vede dobrá voznice z Agnetendorfu do Giersdorfu, kromě toho ještě pěšina z hořejšího Agnetendorfu podél Myslivcova kopce k Petrmanově boudě, jiná pak údolím potoka Černé (Rothwasser).

K rozsochám, právě popsaným, přiléhá přímo k V rozsocha *Černého kopce* (Schwarzenberg). Vychází od Menšího Šisáku a jakkoli co do rozlohy je krátká a úzká, vábí k sobě přece nejvíce pozornost pocestného, nesouc totiž pěknou a homolitou, temným lesem smrkovým porostlou a daleko svidnou kupu, kteréž svědčí právě jmeno *Černého kopce* (1009 m.). Severní sklon krátkého toho hřebene je velice povlovný, pročež také na opyši jeho četné chalupy vsi Háje (Hayn) ve výši 500—600 m. důstatek mají místa. Podobného rázu je vedlejší, s ním rovnoběžný, ale kratší ještě hřeben *Bílého kamene* (Weisstein).

Ze Stříbrného hřebene, zejména pak ze severního svahu jeho u Poledníka vychází širokým kořenem mohutná rozsocha, kteráž mezi Sejfským potokem a p. Lomnicí se rozkládajíc, od nejbližšího místa v podhoří *Sejderskou* rozsochou můž' se nazývat. Na ní nalezá se, a sice hned pod hořejší plasou její, v lesnaté a povlovně svažující se rovině pěkné skalní skupenství *Tří kamenův*, na něž pak níže boudy Šlinglova a Zaječí následují. Vzdálí asi 1½ kilom. na SZ Tří kamenů pyšní se obrovská troska skalní v podobě rozvalin starého hradu, kteráž k nejkrásnějším tvarům skalním v celých Krkonoších náleží, *Tomsovu chýši* (Thumshütte) se nazývá i sráznými stěnami k potoku Sejfenbachu, v hluboké roklí tudy se beroucímu, dolů se spouští. K této straně rozvětňuje se rozsocha Sejderská

v početná, úzká a rovnoběžná žebra s pobočními roklemi, kteréž se všechny u Bavorových domků (Baberhäuser) do společného podélného údolí otvírají, na jehož severní straně vyvstává široký a hmotný chlum s několika klepy na temeni, jemuž *Vojákův kamen* (Soldatenstein) říkají a jenž k severu proti Hořejšímu Giersdorfu srážně se sklání. Tento chlum stojí od zadu ve spojení s východním dílem příčného hřebene, kterýž nemá takového přetržení, prostíraje se širokým klenutím až nad samý Sejdorf i Arnsdorf. Na této straně jeho, a sice v poslední plase ve výši 824 m., stojí památný kostelík *Wang*, dle norského způsobu ze dřeva vystavený, u prostřed domků vsi Brückenberka, po hoře rozsetých. Níže zdvihá se ještě malý vrchol, Semmelberg (jinak též Sammel- i Stirnenberg) řečený, načež široký hřbet snižuje se k mělkému sedlu, za nímž vyvstává pěkná, lesem zarostlá kupa, s jejíž jižního svahu hledí do kraje *kaplička sv. Anny* ve výši 736 m., hojně vůbec navštěvovaná, za kterouž pak výše k vrcholu samému, kterýž *Gräberberg* (jinak také Krabersberg, nepochybně tedy Kravařův kopec, 798 m.) se nazývá, — tři mohutné klepy do výše čnějí, Kravařovými kameny (Gräber- nebo Krabersteine) jmenované a pěknou vyhlídku poskytující. Za kopcem Kravařovými k S následují ještě dva vrcholky, načež veškerá spousta tohoto hřebene do lučné roviny okolo Zillerthalu i Arnsdorfu (při potoku Lomnici) příkrým sklonem se svažuje. Po tomto hřebeni vedou početné voznice i stezky z podolních vesnic Červeného dolu (Rothengrund), Sejdorfu, Arnsdorfu a Příčných Sejf ke kaple Sv. Anny, pak do Brückenberka, k Polednímu kameni, jakož i k boudě Hamplově a výše k samé Sněžce.

Ze Sněžky nevychází nižádná rozsocha k S, za to ale od pláně pod Sněžkou či, určitěji řečeno, od Menší Sněžky, kteráž mezi údolím potoka Lomnice a dolem Melzrovým k S se táhne. Rozsocha tato je několika doly vybrážděna a na hořejším konci jejím nalezá se zejména známá bouda Hamplova (1212 m.), na Dolejším pak bouda Schnurbartova i chalupy vsi *Krummhüblu* ve výši 627 m.

Také z hřebene Schmiedeberského neodštěpují se k SZ, aniž k S patrnější rozsochy, leč chtělo-li by se jmenovati tak výše již vzpomenuté „Klepy“ (Tafelsteine), pak mohutný chlum Býčí hlavy. Teprv tam, kde hřbet Schmiedeberský v severovýchodním koutě Mordovou skalou konce svého dochází, vybíhá z něho jeden příčný hřeben netoliko k J (jež jsem pod jmenem Kolbenberka již popsal), nýbrž i k SSV; a tomuto v osnově hor Krkonošských náleží bez odporu čestné místo. Jestli to hřeben Březích kamenů (Friesensteine) čili *Lancutský hřeben*. Nedaleko sedla u Bud pomezních odštěpuje se tato rozsocha od hlavního hřebene, majíc s počátku podobu lesné náhorní roviny s vrcholkem, *na Piskách* (auf dem Sande, 941 m.) a výše Molkenberg řečeným, načež následuje nejprv mělké sedlo 731 m., přes kteréž vede pěkná silnice od Schmiedeberka k Líbovu a Lancutu a kterémuž se vůbec „na Brance“ říká (am Pass). Odtud táhne lesný hřeben ve výši 800—850 m. skoro přímo k severu a slabým sklonem dále, nesa několik nízkých vrcholků (Koppe, Špičák, Sedlo = Sattelberg a j.), dokud nenastane vzdálí 4-5 kilom. od prvéjšího druhé, vyšší sedlo, v prosté výši 808 m. položené, jemuž říkají „na Výpřeží“ (am Ausgespann) a přes něj běží stará, nyní větším dílem pro srážnost svou spustlá silnice ze Schmiedeberka k Lancutu. Odtud zdvihá se hřeben poznovu, a sice až do 900 m., a v těchto končinách shledají se

nahore v lese na různě rozestavené velikánské klepy žulové na podobu turní a trosek, vypínající se vysoko nad houštiny lesní. Těmito klepům zvláště říká se *Březí kameny* (Friesensteine). Nejvyšší z nich změřen byl ode mne na 944 m. Nahore skánávají se tyto kameny vodorovnými téměř a širokými plochami, jež ukazují okrouhlé jamky, 2—10 centim. hluboké, kteréž považují se za vydlabané jímky pro krev obětných zvířat z časův pohanských, jež bych ale raději, aspoň na této hoře, a případněji za účinky přirozeného zvětrávání a vody dešťové vyhlásil (srov. o tom str. 33 t. d.). Hřeben Lancutský je bez odporu nejdelším hřebenem na severní straně Krkonoš; neboť on prostírá se od Březích kamenů dále ještě k S až k údolí řeky Bobravy u Rohrlachu a Starých Janovic.

Vypsav takto jak podélné, tak příčné hřbety vlastních hor Krkonošských, připojuji pro lepší přehled věci k tomuto vylíčení svému jak podélný průřez hlavního rozhraní vodního, tak i průřez příčný.

*Důležitější místa hlavní předěle vodní v Krkonoších jsou zejména následující:*

|                                                                                 | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Boudy Prokšovy, sedlo na silnici z Harrachovic k Teplicím slezským . . . . . | 848·3                    | 3·0                                           | ZSZ—VJV |
| 2. Libochova planina . . . . .                                                  | 1250·0                   | 1·5                                           | Z—V     |
| 3. Jeřábí louka . . . . .                                                       | 1280·0                   | 1·9                                           | ZJZ—VSV |
| 4. Šiňák (Reifträger), nejvyšší skála . . . . .                                 | 1354·0                   | 0·8                                           | SZ—JV   |
| 5. Sviňský kamen v sedle . . . . .                                              | 1279·0                   | 1·9                                           | Z—V     |
| 6. Špičák čili Ptačí skála (Vogelsberg) . . . . .                               | 1465·0                   | 0·7                                           | Z—V     |
| 7. Kazatelna Krkonošova (Rübezahls Kanzel) . . . . .                            | 1483·0                   | 1·1                                           | Z—V     |
| 8. Vysoké kolo . . . . .                                                        | 1506·7                   | 0·3                                           | ZJZ—VSV |
| 9. Sedlo mezi Vysokým kolem a Věším Šišákem . . . . .                           | 1369·9                   | 0·5                                           | ZJZ—VSV |
| 10. Věcí Šišák . . . . .                                                        | 1432·2                   | 0·4                                           | Z—V     |
| 11. Sedlo mezi V. Šišákem a Mládenčími kameny . . . . .                         | 1330·7                   | 0·7                                           | ZSZ—VJV |
| 12. Kameny Mládenčí . . . . .                                                   | 1396·0                   | 0·6                                           | Z—V     |
| 13. Kameny Dívčí . . . . .                                                      | 1390·6                   | 0·9                                           | SZ—JV   |
| 14. Sedlo mezi Dívčími kameny a Menším Šišákem . . . . .                        | 1214·0                   | 2·3                                           | ZSZ—VJV |
| 15. Menší Šišák . . . . .                                                       | 1446·0                   | 2·0                                           | ZSZ—VJV |
| 16. Na Lanech (nad Poledním kamenem) . . . . .                                  | 1520·0                   | 3·0                                           | SZ—JV   |
| 17. Sedlo mezi Loučnou a Obří boudou . . . . .                                  | 1320·0                   | 1·2                                           | Z—V     |
| 18. Obří bouda (Mitlehnerova) . . . . .                                         | 1383·0                   | 0·8                                           | Z—V     |
| 19. Sněžka (kaple) . . . . .                                                    | 1601·0                   | 2·1                                           | ZJZ—VSV |
| 20. Černá skála (Schwarze Koppe) . . . . .                                      | 1410·6                   | 1·2                                           | ZJZ—VSV |
| 21. Sedlo mezi Černou skalou a Schmiedeborským hřebenem . . . . .               | 1168·0                   | 0·8                                           | JJZ—SSV |



|                                                                                         | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 22. Schmiedeberský hřeben nad Klepy<br>(Tafelsteine) . . . . .                          | 1285·0                   | 2·2                                           | ZSZ—VJV |
| 23. Boudy pomezí, sedlo silnice ke<br>Schmiedeberku . . . . .                           | 1052·0                   | 2·6                                           | S—J     |
| 24. Kolbenberk . . . . .                                                                | 1187·0                   | 4·1                                           | SSZ—JJV |
| 25. Sedlo na silnici od Valbeřic (Alben-<br>dorf) k Mikulovicům (Michelsdorf) . . . . . | 885·0                    | 3·4                                           | S—J     |
| 26. Tüpelstein . . . . .                                                                | 907·6                    | 5·6                                           | Z—V     |
| 27. Hřeben mezi Lampertici (Lampersdorf)<br>a Bobravou . . . . .                        | 620·0                    | 3·5                                           | Z—V     |
| 28. Königshann . . . . .                                                                | 520·0                    |                                               |         |

*Příčný průřez hor Krkonošských od Hermsdorfu a Teplic slezských až k Mladým  
Bukům u Vrajtu.*

|                                                                 | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Hermsdorf u Teplic, kostel . . . . .                         | 358·3                    | 1·5                                           | S—J     |
| 2. Kynast, ssutiny hradu . . . . .                              | 634·0                    | 1·3                                           | S—J     |
| 3. Sedlo jižně Kynastu . . . . .                                | 560·0                    | 1·0                                           | S—J     |
| 4. Široká hora na jih Anežčiny vsi (Ag-<br>netendorf) . . . . . | 690·0                    | 1·1                                           | SSZ—JJV |
| 5. Údolí pod Šírokou horou . . . . .                            | 580·0                    | 3·6                                           | S—J     |
| 6. Černý kopec . . . . .                                        | 1099·0                   | 1·4                                           | S—J     |
| 7. Menší Šišák . . . . .                                        | 1446·0                   | 2·0                                           | ZSZ—VJV |
| 8. Lány (nad Poledním kamenem) . . . . .                        | 1520·0                   | 2·8                                           | SZ—JV   |
| 9. Loučná bouda . . . . .                                       | 1388·0                   | 1·4                                           | SSV—JJZ |
| 10. Studničná . . . . .                                         | 1554·5                   | 1·8                                           | S—J     |
| 11. „Na rovině“ (Plattenberg) . . . . .                         | 1360·0                   | 2·4                                           | SZ—JV   |
| 12. Liščí hora (Fuchsberg) . . . . .                            | 1362·0                   | 3·2                                           | SZ—JV   |
| 13. Sedlo mezi Liščí a Černou horou . . . . .                   | 1094·0                   | 2·5                                           | SZ—JV   |
| 14. Černá hora . . . . .                                        | 1299·4                   | 1·8                                           | SZ—JV   |
| 15. Zinkovy boudy pod Černou horou . . . . .                    | 1121·0                   | 1·8                                           | SZ—JV   |
| 16. Teplice svatojanské . . . . .                               | 600·0                    | 0·9                                           | S—J     |
| 17. Sv. Janský kopec na jih Teplic . . . . .                    | 740·0                    | 3·7                                           | SZ—JV   |
| 18. Mladé Buky v údolí Úpy . . . . .                            | 481·0                    |                                               |         |

Z průřezův těchto poznává se přede vším, že hlavní hřeben Krkonošský nemůže se vůbec honositi velkými rozdíly u výše své. Neboť kladouc počátek hlavního hřebene k Boudám Prokšovým, konec pak jeho k silnici Valbeřické, shledá se, že výšky všech sedel a štítův drží se mezi 1000 a 1600 metry; zejména pak dosahují sedla nadmořské výše 1000—1369, štíty pak 1280 až 1600 m., z čehož mezi střední výší sedel a střední výší štítův vychází rozdíl pouhých 255 m.

Také z příčného průřezu jde na rozum, s jakou povlovností a stejností hory Krkonošské k jižní čili české straně se sklánějí, ano na straně severní lze velmi dobře rozeznati jisté plasy, kterýmiž zdejší srázný sklon se vykonává.

*Cest komunikačních* v Krkonoších vzpomenu jsme sice již s důstatek při výpisu členů hor těchto, neváháme však přece, vyjmenovati zde poznovu aspoň nejdůležitější z nich, činitele to jednak k vůli lepšímu přehledu, jednak v té příčině, aby směry komunikační, prvé jen po částech uváděné, poznány byly v celém svém prodloužení a určení.

*Silnice*, pořádně zdělané a v dobrém stavu zachovávané, pokud na přič celým horstvem vedou, jsou zejména tyto: Silnice pojizerská v údolí Věcí Jizery od Ernsttálu na Jablonec, Harachovice, Boudy Prokšovy (sedlo ve výši 848 m.) k Petrovicům a Hiršberku. Silnice tato pojímá u Harachovic v sebe silnice od Tannwaldu a od Vysokého. — Druhé pořádné silnice, kteráž by přímo z Čech přes hory do Slez vedla, nenalezneš více ve vlastních Krkonoších, leč teprv na samém východním konci jejich; jestli to silnice od Svatoňovic a Trutnova přes Olešnou (Goldenöls) a Königshann (sedlo ve výši 520 m.) do Líbova a Lancutu. Silnici tuto provází také železnice. Z toho všeho jde, že vlastně posud nedostává se pohodlného a stálého přechodu přes hory Krkonošské, neboť i po silnici od Harachovic bývá za sněžných zim nespaseno přes sedlo se dostat. Naopak není ani s české, aniž se slezské strany nedůstatek takových silnic, kteréž hluboko do vnitra hor až pod samý hlavní hřeben vnikají; jsou to zejména silnice od Jilemnice přes Vlčí hřeben do Rokytnice, silnice od Vrchlabí na Boudy Krausovy do Špindlmühl, z Trutnova do Vrajetu (až tam i železnice), Maršova a Velké Úpy, z Trautenbergu na Zacléř a přes vrch Rýchorský do Valberka a výše přes Suchý důl (Dörreggrund) do Malé Úpy a k Boudám pomezím. Také nacházejí se dobré cesty v podhoří podél hlavního směru jeho, jako na české straně z Mladých Buk na Seify (Hermannsseifen) a Lanov do Vrchlabí, odtud pak na Jilemnici do Ernsttálu; na severní straně silnice z Petrovic na Hermsdorf, Gierstorf, Sejdorf až do Schmiedeberka, odtud pak přes „Branku“ (Pass) do Líbova. Rovnoběžně se silnicemi, posléze jmenovanými, jakkoli něco povzdálí hor lemuji úpatí jejich také dvě železnice, zejména na české straně dráha Rakouská-severozápadní (a Pardubicko-Ližerecká) z Poříčí (Parschnitz) u Trutnova až k Staré Paké, na pruské straně pak Slezská horská dráha od Ruhbanku až do Hiršberka. Nesčetné je ovšem množství obyčejných voznic a steznic po horách a pod nimi, jichž hlavnější byly již svými místy zvláště vytknuty.

#### §. 4. Krkonoše (pokračování), jich údolí a střední výška.

Vypsav v předchozí stati vyvýšený prostor horstva Krkonošského, přistupuji nyní k vyličení prohlubní jeho čili údolí.

Obecnou povahu údolí Krkonošských lze krátce určit, nazvou-li se *příčnými údolímí horskými*. Hlavní směr jejich jak na jižní, tak na severní straně hlavního hřebene snáš se skoro docela se směrem polednic, odchyluje se od

ních o málo jen stupňův; jinak najdeš v Krkonoších přece také krajiny, kdež údolí drží se rovnoběžného směru k hlavnímu hřebeni, jako na př. doly Labského potoka a Bílé vody. Také stavá se, že všecka příčná údolí, vystupující z hor, mění bez výmínky svůj směr, berouce se pak od ZSZ k VJV nebo naopak, a to za příčinou, o kteréž níže hned něco bude pověděno. Délka údolí jižních je ostatně mnohem větší než délka severních, podobně má se to i s šířkou, jakkoli třeba jedna i druhá údolí nazvati *těsnými*. Mimo to provázejí je po obou bocích srázné, často i skalisté stráně, odkudž pochodí, že v žlabu údolí vedlé potoka zřídka kdy zůstane dostatečného místa pro silnice a domy, pročez spatřiti lze tyto zhusta na příkrých stranách hor nebo i nahoře na hřebtech a temenech, v čemž je ostatně i ten důvod oučinný, že obyvatelé hor, jimž chov dobytka hlavní bývá živností, na hřebenech, celkem slabě skloněných, nacházejí mnohem spíše a hojněji dobrých pastvin dobytku svému, než dole v těsných dolinách nebo v příkrých a kamenitých stráních jejich.

Jakkoli sklon hlavního hřebene na slezské a české straně velice jest rozdílný a jakkoli dle toho i spád údolí na jedné nebo druhé straně měl by se spravovati, toť lze platnosti tohoto pravidla pro Krkonoše přece jen v obecném smyslu dopustiti a také jen potud, pokud se počátek údolí některého také tam položí, kamž jej i obyvatelé hor klásti obvykli. V tomto smyslu má se spád údolí jižních k údolím severním jako 41 : 51 čili bez mála jako 4 : 5. Místy vyrovnává se však i tento skrovný rozdíl, což pochodí odtud, že sráznější sklon hlavního hřebene k severu nahraňuje se na jihu hlubokou onou padlinou, kteráž zároveň s hlavním hřebenem běžíc a od hřebene pobočného jej dělic, jeví se netoliko v podobě údolí Sedmi dolů, nýbrž i co údolí Mumlavské a dílem i Úpské. Počátek údolí Krkonošských poskytuje zejména vždy ten obraz, že vysoko nahoře na hlavním hřebeni, slabě vůbec sklenutém, nachází se některé koryto, kteréž sbírá vody slatinné věcmi dílem půdy, sváděje je potom při nepoznatelném téměř spádu k ústí svému nad některou stěnou skalní, odkudž pak tyto vody v podobě tenkých proužkův, po silných deštích pak i v podobě slapů, 150—200 metrů vysokých, do nejbližší příčné rozseldliny náhle se spouštějí, vymylajíce tu sobě široké a okrouhlé pánve čili kotle, odkudž pak nastupují další cestu, kterouž sobě směrem původní příčné trhliny čili prorvy a prostředkem naneseného šterku byly vymlely, vybrousily i vyrovnaly. Na jižní straně přivedeno jest takové vyrovnání již věcmi dílem ke konci svému a údolím zdejšími ubývá tudíž dosti pravidelně spádu jejich; toliko na některých ještě místech, kdež zejména panující v těchto stranách svory a břidlice hlinité početnými plásty a couky mnohem tvrdších břidlic křemenitých, kolmo k směřům údolí běžících, k obložení jsou přišly: tam přetrhuje se také rovnoměrnost tohoto pravidelného ubývání spádu, jeví se zejména tím, že nad takovou překážkou spádu ubývá, pod ní však rychlejší přibývání jeho v podobě početných, krátkých prahův nebo proudův zase nastává. Naopak nepřišlo na severní straně takové srovnání žlabův dolinných posud ještě k místu. Podobát se k pravdě, že příčné trhliny vytvořily se tu v granitu podobou stupňů čili plas, jichž nej-mocnější dává se posud ještě skrze řadu pěkných slapův znáti, s kterýmiž skoro ve všech příčných údolích severní strany, a to v stejné skoro vzdálenosti od hlavního hřebene lze se potkati; jsouť to slap Zackenský, slap Chuchelský, Ilájský a j. v.

V následující tabulce gestavil jsem na podobu tabulky v §. 2 obsažené, důležitější žlaby dolinné, pokud v oblasti vlastních Krkonošův se nacházejí; co pak sloupce této tabulky vyznamenávají, vyloženo již na str. 14 a 15 t. d.

Přehled žlabů dolinných v Krkonoších a okolo nich.

| Jmeno žlabů:                                             | Odkud až kam:                                         | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdí<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>1. Údolí Mamlá-<br/>vice a Velké<br/>Jizery . . .</b> | Počátek pod Prokšovými bu-<br>dami . . . . .          | 810·0                                       |                                           |                                                |                                           |            |
|                                                          | Harachovice, pode vsí . . .                           | 620·0                                       | 190·0                                     | 5·7                                            | 1: 30                                     | S—J        |
|                                                          | Wurzelsdorf, Strikrovy domky                          | 555·0                                       | 65·0                                      | 2·4                                            | 1: 37                                     | S—J        |
|                                                          | Jablonec, u kostela . . . .                           | 470·0                                       | 85·0                                      | 8·4                                            | 1: 99                                     | S—J        |
|                                                          | Ernsttál . . . . .                                    | 390·0                                       | 80·0                                      | 10·7                                           | 1:134                                     | S—J        |
|                                                          | Od Prokšových bud až k<br>Ernsttálu . . . . .         |                                             | 420·0                                     | 27·2                                           | 1: 65                                     | S—J        |
| <b>2. Údolí Malé Ji-<br/>zery . . .</b>                  | Počátek v březnu pod Kotle                            | 1038·0                                      |                                           |                                                |                                           |            |
|                                                          | U Tří domkův . . . . .                                | 790·0                                       | 248·0                                     | 3·2                                            | 1: 13                                     | S—J        |
|                                                          | U Vítkovic . . . . .                                  | 665·0                                       | 125·0                                     | 4·6                                            | 1: 37                                     | S—J        |
|                                                          | U Hrabačova blíž mostu . .                            | 418·0                                       | 247·0                                     | 9·3                                            | 1: 38                                     | S—J        |
|                                                          | Ernsttál, stok s Velkou Ji-<br>zerou . . . . .        | 390·0                                       | 28·0                                      | 3·7                                            | 1:132                                     | V—Z        |
|                                                          | Od počátku do Ernsttálu . .                           |                                             | 648·0                                     | 20·8                                           | 1: 31                                     | S—J        |
| <b>3. Údolí Labe<br/>(nejhořejší díl)</b>                | Labská louka, počátek po-<br>toka Labe . . . . .      | 1300·0                                      |                                           |                                                |                                           |            |
|                                                          | Pod slapem Labským . . .                              | 1050·0                                      | 250·0                                     | 1·4                                            | 1: 6                                      | SZ—JV      |
|                                                          | Stok s potokem Bělou . . .                            | 768·0                                       | 282·0                                     | 5·2                                            | 1: 19                                     | SZ—JV      |
|                                                          | Krausovy boudy . . . . .                              | 665·3                                       | 102·7                                     | 4·3                                            | 1: 42                                     | S—J        |
|                                                          | U stezky Žezulčí, nad pro-<br>smykem (Klemme) . . . . | 601·0                                       | 64·3                                      | 4·0                                            | 1: 62                                     | S—J        |
|                                                          | Vrchlabí, jižní konec . . .                           | 470·0                                       | 131·0                                     | 8·2                                            | 1: 63                                     | S—J        |
|                                                          | Od počátku do Vrchlabí . .                            |                                             | 830·0                                     | 23·1                                           | 1: 28                                     | SSZ—JJV    |

| Jmeno žlabů:                                       | Odkud až kam:                                       | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdíl<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 4. Údolí Velko-<br>úpské . . .                     | Počátek pod Studničnou . . .                        | 1300·0                                      |                                            |                                                |                                           |                      |
|                                                    | Pod slapem Úpským v Obřím<br>dolu . . . . .         | 1010·0                                      | 290·0                                      | 0·9                                            | 1: 3                                      | SZ—JV                |
|                                                    | Simmerberk u krčmy Petz-<br>rovy . . . . .          | 756·0                                       | 254·0                                      | 3·7                                            | 1: 15                                     | S—J                  |
|                                                    | Maršov, u zámku . . . . .                           | 572·0                                       | 184·0                                      | 7·5                                            | 1: 41                                     | SZ—JV                |
|                                                    | Vrajt, pod dolejším mostem . . .                    | 490·5                                       | 82·5                                       | 4·7                                            | 1: 57                                     | S—J                  |
|                                                    | Trutnov, u dolejšího mlýna . . .                    | 409·0                                       | 81·5                                       | 10·8                                           | 1:132                                     | SZ—JV                |
|                                                    | Poříčí, ústí potoka Líčné . . . .                   | 386·0                                       | 23·0                                       | 3·5                                            | 1:152                                     | Z—V                  |
|                                                    | Od počátku do Poříčí . . . . .                      |                                             | 764·0                                      | 13·1                                           | 1: 41                                     | SSZ—JJV              |
| 5. Údolí potoka<br>Líčné . . .                     | Počátek nad Lampertici . . . .                      | 550·0                                       | 96·0                                       | 5·6                                            | 1: 58                                     | S—J                  |
|                                                    | Krinsdorf, na východ vsi<br>v údolí . . . . .       | 454·0                                       | 68·0                                       | 9·5                                            | 1:140                                     | S—J                  |
|                                                    | Poříčí, výtok potoka do Úpy . . .                   | 386·0                                       |                                            |                                                |                                           |                      |
|                                                    | Od počátku do Poříčí . . . . .                      |                                             | 164·0                                      | 15·1                                           | 1: 92                                     | S—J                  |
| 6. Údolí Věčího<br>Zackenu (v Sle-<br>zích) . . .  | Počátek pod horou Zackenem . .                      | 1000·0                                      |                                            |                                                |                                           |                      |
|                                                    | Pod pruskou celnici . . . . .                       | 740·0                                       | 260·0                                      | 6·5                                            | 1: 25                                     | V—Z, Z—V             |
|                                                    | Marientál, hospoda u slapu<br>Zackenského . . . . . | 581·7                                       | 158·3                                      | 4·3                                            | 1: 27                                     | Z—V                  |
|                                                    | Petrovice, most silničný přes<br>Zacken . . . . .   | 374·6                                       | 207·1                                      | 8·6                                            | 1: 41                                     | ZJZ—VSV              |
|                                                    | Teplíce (Warmbrunn) . . . . .                       | 334·0                                       | 40·6                                       | 6·8                                            | 1:151                                     | ZJZ—VSV              |
|                                                    | Hiršberk, ústí do řeky Bo-<br>bravy . . . . .       | 308·0                                       | 26·0                                       | 5·5                                            | 1:2 12                                    | J—S                  |
|                                                    | Od počátku do Hiršberka . . . .                     |                                             | 692·0                                      | 31·7                                           | 1: 46                                     | ZJZ—VSV <sub>1</sub> |
|                                                    |                                                     |                                             |                                            |                                                |                                           |                      |
| 7. Údolí Hajské<br>a Giersdorfské<br>(v Slezích) . | Počátek pod Menším Ši-<br>šákem . . . . .           | 1250·0                                      |                                            |                                                |                                           |                      |
|                                                    | Slap Hajský . . . . .                               | 528·0                                       | 722·0                                      | 5·8                                            | 1: 8                                      | J—S                  |
|                                                    | Giersdorf, nedaleko kostela . . .                   | 342·0                                       | 186·0                                      | 4·0                                            | 1: 21                                     | J—S                  |
|                                                    | Teplíce, ústí potoka . . . . .                      | 332·0                                       | 10·0                                       | 3·8                                            | 1: 38                                     | J—S                  |
|                                                    | Od počátku do Teplíc . . . . .                      |                                             | 918·0                                      | 13·6                                           | 1: 15                                     | J—S                  |

| Jmeno žlabů :                    | Odkud až kam .               | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdíl<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 8. Údolí Lomnické (v Slezích).   | Menší stav nedaleko boudy    |                                             |                                            |                                                |                                           |            |
|                                  | Hamplovy . . . . .           | 1130·0                                      |                                            |                                                |                                           |            |
|                                  | U boudy Schnurbartovy . .    | 700·0                                       | 430·0                                      | 3·5                                            | 1: 8                                      | JJZ—SSV    |
|                                  | Pod Příčnými Sejfy . . .     | 552·0                                       | 148·0                                      | 2·5                                            | 1: 17                                     | JJZ—SSV    |
|                                  | Arnsdorf, u kostela . . .    | 440·0                                       | 112·0                                      | 2·8                                            | 1: 25                                     | J—S        |
|                                  | Erdmansdorf (Dol. dvůr) .    | 350·0                                       | 90·0                                       | 4·7                                            | 1: 52                                     | J—S        |
|                                  | Šildov, stok s Bobravou .    | 341·0                                       | 9·0                                        | 3·8                                            | 1:422                                     | JJZ—SSV    |
|                                  | Od počátku do Šildova . .    | . . .                                       | 789·0                                      | 17·3                                           | 1: 22                                     | JJZ—SSV    |
| 9. Údolí Bobravy (v Slezích) . . | Počátek na stráni Bobravské  |                                             |                                            |                                                |                                           |            |
|                                  | (u Zaclěře) . . . . .        | 779·4                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                                  | Bobrava (ves), dolejší konec | 570·0                                       | 209·4                                      | 2·4                                            | 1: 12                                     | JZ—SV      |
|                                  | Líbov, pod městem . . .      | 466·0                                       | 104·0                                      | 11·5                                           | 1:111                                     | JZ—SV      |
|                                  | Lancut . . . . .             | 428·0                                       | 38·0                                       | 11·5                                           | 1:303                                     | J—S        |
|                                  | Od počátku do Lancutu . .    | . . .                                       | 313·4                                      | 25·4                                           | 1: 81                                     | JZ—SV      |

Povšimněmež sobě nyní zevrubněji těchto žlabův dolinných, prohlédnouce je po řadě, a sice nejprv na jižní čili české straně.

*Údolí Velké Jizery s dolinami Mumlavice a Mumlavy.* Údolí tato, pokud oddělují se jimi hory Jizerské orografickým videm od Krkonošův, popsali jsme již svrchu (srov. str. 21 a 22 t. d.) s důstatek; zejména jest onen díl údolí Velké Jizery, kterýž mezi Wurzelsdorfem a Ernsttálem čili Hořejší Sytovou leží, ne jiný, než ten, jež by nám nyní vzhledem ke Krkonošům náleželo poznovu popisovati. Zbýváť tedy jen ještě nejhořejší trať tohoto dílu, kteráž sice co do směru, nikoli ale také dle jména svého patří ke žlabu Jizery. Tato část žlabu Jizerského, kteráž u Wurzelsdorfu, či, lépe řečeno, u Domků Strikrových ve směru údolí Velké Jizery k severu pokračuje, do hor hluboko se zářvají, jest zejména od J nejprv vodami říčky Mumlavy vyplněna, jež ale teprv u Harachovic sem nadchází, z protější totiž, k východu běžící úžlabiny, ana prorva, hlavního směru severního dále se držící, ponímá v sebe vody potoka Mumlavice (Mühlmitz), jehož jméno také nese. Zbudeť tedy popsati zde jen ještě údolí Mumlavice a Mumlavy.

Potok *Mumlavice* vzniká v slatinách jihovýchodní straně hory Tisové nedaleko Bud Prokšových, a sice ve výši 810 metrův, i vlévá se u Harachovic v nadmořské výši 620 m. do Mumlavy. Délka údolí jeho činí 5·7 kilom., odkudž má se

spád jeho, jako 1 : 30. Směr je skoro přímo od S k J, od kteréžto přímky nepatrně jen se odchyluje. Údolí samo je těsné a hluboko zaryté.

Věcí zajímavosti má do sebe *údolí Mumlavy*, jehož střední směr běže se nejprv rovnoběžně k hlavnímu hřebeni od V k Z se skrovnou odchylkou k SZ. Vody říčky této sbírají se z početných pramenův západního sklonu Labské louky, a sice pod straní, řečenou Mummelzwiesel, v prosté výši více než 1200 metrův, majíce tu již vzhled znamenitého a vodného potoka, kterýž zvláště od severu, t. j. z Jeřábí louky a od Libochovy planiny, přijímá početné ručeje a ubíraje se těsnou debří a v srázných, lesem zarostlých březích při rychlém spádu dále až k Harachovicům, napodobuje takto v malém obraz pověstných Sedmi dolův (viz o nich níže). Výška nadmořská povrchně jeho při ústí ručeje Libošského obnáší 869 m., při ústí Mumlavice 615 m. Spád činí, a sice na první či hořejší trati 1 : 13, na druhé či dolejší 1 : 23, údolí samo je pak 10 kilom. dlouhé. Žlab je do té míry těsný, že nebylo v něm až do nedávna nižádného spojení s druhými dolinami v Krkonoších. Teprv za posledních tří let prokleštěna jest údolím Mumlavy dobrá voznice, u Harachovic počínající, kteráž vzhůru údolím samým zcela pohodlně k Labské louce vede, setkávajíc se zde, a sice nedaleko Slapské boudy (Elbefallbaude), s onou cestou, jež také teprv za posledních let s druhé strany, zejména od Špindlmühlu, k Labské louce byla jest ražena. Silnice ona běže se podél početných prahův a proudů, v Mumlavě zhusta se nalézajících, z nichž pak významává se jeden, jemuž jméno *Slapu Mumlavy* (Mummelfall) vlastně svědčí (728 m.), dosti neobyčejnou výší a šíří.

Od Harachovic (620 m.) až k Domkům Strikrovým běží Mumlava směrem od SV k JZ, v těsném i hlubokém údolí ještě 2·4 kilom. dále, majíc tu spád 1 : 37, i setkává se pak s Velikou Jizerou, jejíž údolí odtud až k Ernsttálu nalezneš popsáno na str. 21 a 22 t. d.

*Údolí Malé Jizery* vzniká pod Svojšickou skalou (Schwozerkappe) u tak zv. Hutí (Hütten) při stoku dvou potokův, z nichž jeden Kůželským potokem (Koschelbach), druhý Kotelskou vodou (Kesselwasser) se nazývá. Prvější nachodí od jižního svahu Lysé hory a běže se těsnou a divokou debří, mezi západním sklonem Kůžele (Koschelkamm) a Vlčím hřebenem ustlanou. Voda Kotelská zase vzniká v Březně Kotelném (1038 m.), o jehož poloze pod horou Kotletem již na str. 41 pověděno, i spěchá rozpěněná přes obrovské trosky žulové i břidličné skrze těsnou a tmavou rokli, všudež lesem zarostlou, pojmajíc od SV ještě dva ručeje horské. Rokle tato rozstupuje se pak něco málo u tak zvaných „Tří domků“ (790 m.), poskytujíc tu prostředkem pěkného luhu místa třem chalupám, odkudž i jméno této samoty pošlo. Spádu má Kotelská voda na této, 3·2 kilom. dlouhé trati 1 : 13, směru přidržuje se skoro přímo severojižního. Až do konce svého zůstává debř Kotelská věrna divoké povaze své, dokud tu nespojí se s debří potoka Kůželského, což děje se v končině, kteráž od skelné hutě, druhdy zde byvší, nazývá se podnes „u Hutí“. Nastalé odtud údolí Malé Jizery, rozvírajíc se zároveň něco málo, obchází nyní podél mocného výpustku vzpomenuté již Svojšické skály směrem od S k J. Níže odtud ustupuje hustý dosud les jak na západních, tak i později na východních stranách povlovně do výše, propouštěje na travnatých bocích hor zároveň důstatek místa početným salaším (boudám), jež odtud bez přestávky až

k ústí údolí samého jsou rozsety, skládající se po řadě několik osad. Boudy, od Hutí na 4 kilom. délky k J dosahující, náleží k veliké osadě Vítkovicům, jejíž kostel (671 m.) i fara spatřují se při dolejší konci vsi na výstupku, od hory Kobylé k V, tedy k pravému břehu řeky vycházejícím. Údolí samo pak je v žlabu svém od Hutí až sem do té míry těsné a po březích strmé, že toliko úzká voznice lesní nalezá místa vedlé řečiště. Spád od Tří domků až skoro pod kostel Vítkovický činí 1 : 37. Níže Vítkovic pozbývá údolí poznenáhlu již výšehorské povahy své. Žlab jeho zůstává sice napořád ještě úzký a těsný, za to počínají stráně po obou březích povlovněji se skláněti, pokrývající se zhusta na místě lesa rolemi, pastvinami i lukami, jakož i pořádnými dvorci poplužními, kteréž na západní straně údolí pořádně skládají české vsi Roudnice, Křeslice a Víchov, na východní straně pak Benecko, Rychlov, Zákoutí a Dolejší Štěpanice. Spád žlabu na této, 9·3 kilom. dlouhé trati jest 1 : 38, nad ním pak vede z Vítkovic dolů okresní silnice, kterouž zvláště v roklinné soutěsce pod Zákoutím nesnadno bylo prorazit. U Hrabačova (418 m.) zahýbá však tato silnice a s ní i údolí Jizery prostředkem dlouhého mostu do nového úžlabí, kteréž jest zejména ve shodě se směrem hlavního hřbetu Krkonošského, tedy i se směrem oné sníženiny půdy, jež hory Krkonošské vůbec od V k Z obklíčuje, srovnávajíc se touž dobou s hraničnou čarou mezi útvarem prahorním a útvarem rudých pískovcův.)\* Dostavši se takto k novému žlabu, obrací se Malá Jizera, posud od S k J plynuvši, pod pravým úhlem k Z, i spěchá nyní, spojit vod svých po krátkém běhu 3·7 kilom. s proudy Velké Jizery, což zejména u Hořejší Sytové či Ernsttálu (390 m.) se vykonává. Spád řeky v tomto širokém údolí není již větší, leč 1 : 132. Pod mostem Hrabačovským spojuje se Vítkovická silnice zejména s onou silnicí, jež od Jilemnice vede do údolí Velké Jizery a odtud k Dolejší Rokytnici, ona nad mostem odštěpuje se od nich pěkná silnice horská, jež na Víchov a myslivnu Rezeckou pod Vlčím hřebenem k Hořejší Rokytnici vzhůru stoupá. Zřejmoť tedy, že v údolí Jizerském pod mostem Hrabačovským nalezá se uzel silnic horských, nemalé významu jsoucích. Co pak posléze středního spádu celého údolí se tkne, vynášel by se poměrem 1 : 31, rozvoj pak žlabu samého od Kotelského března až k Ernsttálu činí 1 : 40.

*Údolí řeky Labe v nejhořejším dílu jejím*, totiž od počátku až po Vrchlabí, náleží bez odporu k nejzajímavějším dolinám v horách českých. Netoliko znamenitost řeky samé, jež v této končině má své vrchoviště, nýbrž i způsob souvodně pramenův jejích, velikolepý tvar údolí a geognostické poměry jeho, to vše ve spolek pobízí k návštěvě této končiny, v zeměpisném vzhledě velice poučné. Jiz nejednou (srov. zejména str. 41 t. d.) vyložili jsme, že hlavní hřeben Krkonošský oddělen jest od pobočného hřebene svého hlubokou úžlabinou, kteráž běžíc zároveň s hlavním hřebenem, na dvou místech přepažena jest šíjemí v podobě krátkých příčných hřbetův, totiž tak zv. Labskou a Bílou loukou (srov.

\*) Původní směr proryvy či příčného údolí Jizerského má ostatně přirozené pokračování své v rudých pískovcích v podobě mělkého, potočného údolí, jež k J Hrabačova na Jilemnici a Jilem s ohbem k JV ještě 6·4 kilom. vzhůru se táhne, docházejíc teprv v malebné, rybníčně kotlině u Martinic (Jilemnická stanice rakouské dráhy severozápadní) mezi stranami Maňasovského a Branského chlumu vlastního konce svého.



Kozí hřbetý

Kotel  
Krhonos

Labský del

Labská louka

Vysoké kolo



Pohled do Sedmi dolů s Kozích hřbetů nad boudou Rennrovou.

str. 34 a 36 t. d.) čili planí pod Sněžkou. Tento dílec řečené úžlabiny podkrkonošské s krátkými, od hlavního hřebene vycházejícími a do ní ústícími se příčnými doly slove velice případným jmenem „Sedmidolí“ (Sieben Gründe), i jestli tato končina, kteréž také přiložený, se stanoviště na Kozích hřbetech kreslený obraz svědčí, vlastním vrchovištěm nejhořejší tratě Labe. Na řečeném obrazci (s kterýmž ostatně náleží také připojenou mapku Krkonošů porovnat) vidí se nejprve v samém popředí v levo ostrý čeren Kozích hřbetův a co přirozené pokračování jeho hřbet Krkonoš, v pravo pak v pozadí Vysoké Kolo s jinými ještě vrcholy hlavního hřebene. Mezi oběma hřebeny viděti dobře hlubokou úžlabinu sedmidolskou, v kteréž čelní pramenité potoky Labské, totiž *potok Labský*, vlastně tak řečený (po něm. Elbseifen, na obraze bílým pruhem vodním znamenán), pak *potok Bělá* či Bílá voda (Weisswasser, na obraze lesnatou roklí, až do popředí se táhnoucí, se žlabem svým naznačená) — proti sobě tak dlouho tekou, až v těsné prorvě mezi Krkonošem a Kozími hřbety spojení svého docházejí, načež co *řeka Labe* z dosavadního východozápadního směru pod pravým úhlem do severojižního se obracují. Za tou příležitostí budiž také hned doloženo, že Bělá při stoku svém vede věcí množství vody, než potok Labský. Stráně pobočního hřebene (v obraze stráně Krkonoše a Kozích hřbetův) svažují se náhle do údolí, přijímajíce na se nezřídka podobu svislých skoro stěn, pročež také řečených potokův z nedůstatku vlastní plochy vodou nemohou napájeti, aniž příčných a vodných dolův k nim odsylati. Za to jeví však hlavní hřeben mnohem povlovnější sklon k jmenované úžlabině, což zvláště platí o vysotách jeho nad 1000 m. Vrchoviště či prameniště Labe je tedy na severní této straně 8 až 9krát rozlehlejší, než na jižní, odkudž také pošlo, že na tomto, střechovitě od S k J se sklánějícím prostranství (jež na obrazci našem právě pole jeho zanímá) zaryly jsou se do granititu, zde snadno porušitelného, průchodem časův početné strouhy, jež od ustavičného vymýlání přijaly konečně na se podobu roklinných dolů příčných, rovnoběžného téměř mezi sebou směru od S k J se přidružujících. V přiloženém nákresu obázejí se tyto doly toliko tmavějšími stíny svými, na mapce Krkonošů lze je ale všechny napořád nalézti. V pravdě je takových dolů deset, a to rozdílně dlouhých, horáci zdejší však dávají toliko sedmi znamenitějším vlastním jmen, odkudž také souborné jméno „Sedmi dolův“ původ svůj vzalo. Jsoutě zejména, jdouc od Z k V, tyto: Pudlova voda (Pudlawasser), Voda Dvorecká (Hofbaudenwasser) a Medvědí důl (Bärengrund), jež ústí se do potoka Labského, pak Červená a Černá bystřice (Roths u. Schwarzes Floss), po stoku svém Sturmgraben (Hřímava?) nazvané, dále Křivá (Krummseifen) a Stříbrná bystřice (Silberwasser), jež do Bělé se vlévají. Všecky tyto doly svádějí vody sněžné a deštné, v močálovitých korytech a blaních hlavního hřebene se sbírající, dolů k jmenovaným dvěma hlavním potokům, jež ostatně samy hned od pramene svého nejvíce vody drží, jak to již přednost jich před ostatními v sobě obnáší. Labský potok zejména má počátek svůj ze silného zřídla, Labským pramenem nazvaného (1300 m.), asi 1·7 kilom. vzdálí od Boudy nad Březny, s jehož vodami, prostředkem mělkého koryta k JV přes Labskou louku dolů stékajícími, spojují se pak skoro všechny pramenité vody této rozsáhlé slatinné plochy. Popořed takto skoro za jeden kilometr cesty, dostává se Labský pramen k severovýchodnímu kraji onoho, bez mála svislého srázu (stěny), kterýž zavírá Labskou louku k vý-

chodní straně proti dolu Labskému. Zde stojí ve výši 1280 m. salaš, Labskou boudou nazvaná, u kteréž pramen Labský po těsném, skalném žlabu, 0·55 kilom. dlouhém, do 250 m. hloubky prostředkem několika prahův a vzpěným tokem do Labského dolu se žene. Místu tomu říkají *Slap Labský* (Elbefall) i má ono za-  
jistě svou znamenitost. V pobočných výmolech tohoto žlabu nalezneš nezřídka i v létě sněhu důstatek. Jiný slap, kterýž sice nemívá tolik vody, za to ale ne-  
obyčejnou výšku spádu, nalezá se asi 1·3 kilom. na J Labské boudy, kdež zejména vody, se severní straně hory Kotle stékající a na jižním hořejším konci Labské louky se sbírající, způsobují potůček či ručej, *Pučava* (Pantsche) nazvaný, jenž dostav se posléze také ke kraji vzpomenuté již stěny, jediným skokem a pruhem 300 kilom. níže v Labském dolu se ocitá. Pohříchu mívá tento potok za letních  
zásuch tak málo vody, že horáci, chtějíce pocestným žádoucím potěšením způsobiti, za delší čas vodu jeho na vrchu schválně stavují a potom dolů spouštějí! — Co se samého  
dolu Labského (1050 m.) tkne, jeví se tento s počátku v podobě skalisté rokly či propasti, 900 m. dlouhé, 200 m. široké a 250—300 m. hluboké, jež na dně svém, téměř vodorovném, klepy, troskami, šterkem i chudým stromovým a křovím jest  
pokryta a v níž potok Labský k J dále se beře. Při konci rokly obrací se důl Labský pojednou k V, sužuje i svažuje se nyní rychle, jsa při tom k J obrouben  
sráznými straněmi hory Krkonoše, any boky hor, k S stojících, v dolejších dílu svém sice také jsou strmé, výše však stávají se velice povlovnými, ukazující pak až k temeni jen slabý sklon a ojedineným salašním místa dávající. Takový jest  
tedy vid západní končiny Sedmi dolův. Ony tři příčné doly, jež otvírají se k po-  
toku Labskému, totiž Pudlova voda, Dvorecká voda a Medvědí důl, jsou jinak skoro jednoduše povahy. Prvější dva doly přicházejí od Vysokého kola, třetí od  
Věcího Šišáku. Mají při kolébce své značný spád 1 : 12, jenž níže zmenšuje se na 1 : 20, nad ústím do Labského potoka však zase se unahluje. Voda Pudlova činí  
asi  $\frac{1}{4}$  hodiny cesty nad ústím svým také slap, Pudelfall řečený, kterýž od roman-  
tiky vůkolí svého stojí za podívanou.

Proběhnuv takto od počátku dolu Labského celkem asi dráhu 5 kilom., spojuje se Labský potok pod tak zv. Šancemi (Festungsberg) s potokem Bělou, od V nadbíhající, což děje se zrovna nad průlomem, v pobočném hřebeni způsobeným, v nadmořské výši 768 m. Spád jeho od slapu Labského až k tomuto  
místu obnáší 1 : 19.

Bělá čili Bílá voda, druhý potok hlavní, jenž probíhá Sedmidolím od V k Z, vyvívá v slatinné půdě mělkého koryta, od Lan, Studničné a Sněžky obstoupe-  
ného, jemuž, jak známo, Bílá louka říkájí a jež na západním konci pláně pod Sněžkou se prostírá. Nejvyšší zřídlo Bělé leží skoro 1400 m. vysoko. Sbírají se  
v ručeji či potůčku, kterýž ve výši 1388 m. a se skrovným toliko spádem běží zrovna podél samé boudy Loučné, načež přijav k sobě 1·6 kilom. níže Střbrnou  
vodu, od soujmené hory nachodící, žene se dolů do hluboké a divoké rokly, lemované na J sráznými stěnami Kozích hřbetů, na S pak lesnými straněmi Čertovy  
Louky. V této rokli, kteráž níže proměňuje se v těsný a tinný důl soujmenný, běží Bělá dále až ke stoku svému s potokem Labským, berouc se s hukotem po  
četných a úhledných prazích. Rozmnoživši vody své početnými ručeji východní  
končiny Sedmi dolův, t. j. Červenou a Černou Bystřici, Hřimavou (Sturmgraben)

a Křivou i Stříbrnou bystřicí, přivádí s sebou Bělá větší hojnost vody, než společník její, Labský totiž potok, načež oběma vším právem dostává se jmena *řeky Labe*.

Jak již výše vzpomenu, nastupuje Labe, s Bélou se spojivší, nyní do směru od S k J, od kteréhož také celkem, pokud totiž ve vlastních Krkonoších mešká, t. j. až k Vrchlabí, nikdež neodstupuje. Zůstává tu zejména v oné prorvě, kterouž druhdy byly jsou roztrženy od sebe hřebeny Krkonoše a Kozích hřbetů a kteráž pak průchodem věkův hrubými nánosy horské bystřice této dostatečně jest obroušena a s částí i vyplněna. Ostatně není toto dílo přírody nikterak ještě u konce; neboť dolejší trať řeky až k Vrchlabí nemá posud ještě spádu rovnoměrně ubývajícího, pokud se v řečišti samém mnohé ještě nepravidelnosti shledávají, jednak totiž početné mělčiny, jinak zase příkré plochy a v následcích toho proudy a prahy, zvláště v těsninách či soutkách řeky, zde „Klemme“ zvaných. Údolí Labské přidržuje se na této trati sice hlavního směru od S k J, a však ne bez početných ohbův a příluk, jež způsobeny bývají buď obměnou vrstev skalních — jako na př. u Herklovic (Hackelsdorf) v tak zvané Bukovské soutce (Buchberger Klemme), kdež zejména svor zaměňuje se červenavou rulou, kteráž v podobě příkrého čefene (brádlá) údolí na příč přepažuje, — buď zase početnými zde couky křemene (Quarzit) a zelenokamene, jež pronikají svor nebo břidlice hlinité v hořejší polovici této tratě dolinné, a sice vždy kolmo na směr jejich. Žlab údolí mívá tu sice na některých (ostatně řídkých) místech šířku až do 150 metrův, na jiných zase dosahuje sotva 20 metrův, odkudž stává se, že řeka i silnice, po březích jejích běžící, zhusta nenacházejí místa podlé sebe, pročez této bývá do srázné stráně se uhýbatí. Stráně tyto jsou ostatně všudež příkré, pokrývajíce se lesem nebo i dobrými lukami. Toliko v šířkách údolí, jichž ovšem je málo, našly jsou mlýny i domky (boudy) něco více místa, jako u Špindlmühlu, Frydrychstálu, dolejších Krausových bud a na dolejší konci této tratě, totiž v Hořejším a Dolejším Vrchlabí. U většině ostatních případův nalezají se chalupy a dvorce horských vesnic zdejších vysoko nahoře buď ve straních, nebo na hřbetech hor, údolí Labské provázejících; tak jsou zejména rozloženy po západních straních řeky Hořejší boudy Krausovy, boudy Sachrovy a Přední, po východních lázích pak Boudy u obrázku (Tafelbauden), pak vsi Klauseberg, Volský důl (Ochsengraben), Leyrovy domky a ves Herlíkovic. Z příkrých, úzkých a Labské údolí s obou stran svírajících hřbetův příčných, z Heidelberka totiž a Planiny, vycházejí jen krátké a spíše stržím nebo roklím podobající se doly k Labi. Toliko nahoře, pod samým totiž výstupem řeky z jmenované prorvy, ústí se do ní skoro kolmým směrem těsně sice a svahovitě, a však na 6·5 kilom. dlouhé údolí, od V k Z jdoucí, údolí totiž Sv. Peterské, na jehož dně teče tak zvaná Udolená voda (Grundwasser, také Klausewasser), sbírající prameny své ze západního sklonu hory Studničné čili ze Zadní louky. Spád žlabu Labského na trati mezi Špindlmühlem a Vrchlabím mění se v mezích 1 : 30 až 1 : 70. Středním vývodem je pak spád celého tohoto nejhořejšího dílce údolí Labského 1 : 28 a rozvití jeho 1 : 30. Z Vrchlabí až k Špindlmühlu lze po dobré okresní *silnici* údolím samým nahoru se dostat, že Špindlmühlu pak založena jest za posledních dob schůzná cesta podél Labského potoka západní končinou Sedmi dolův, jež vede k Labské boudě a nahoru k Louce

Labské. Ve východní končině Sedmi dolův pak lze po dobrém stezníku dostat se od bud Leyrových k bondě Špindlerově a Petermanově a takto i na Sněžku; jiná, ještě obvyklejší pěšina vede ze Špindlmühlu přes Kozí hřbety k boudám Rennrově a Loučné.

Mezi údolím Labským a Úpským, a sice rovnoběžně k oběma, shledávají se ještě dva žlaby dolinné, kteréž nemají sice té váhy do sebe, jako žlaby právě řečené, jichž význam vzhledem k hydrografické povaze vřkolní krajiny činí je však bez odporu k tomu způsobilé, aby nebyly zde mlčením pominuty. Jsoutě to zejména údolí Lanovské čili žlab Menšího Labe, a údolí Švarctálské, jinak též údolí potoka Čisté (níže Seifenbach řečeného).

*Údolí Menšího Labe* čili *údolí Lanovské* vzniká v hořejších Krkonoších spojením se několika dolův, jež bez rozdílu mají původ svůj v jižních stranách Berenberka, Liščího a Benešova vrchu, pokud totiž z těchto rozsoch, vesměs k onomu dlouhému hřebeni, jenž horu Studničnou s Černou spojuje, náležitých (srov. str. 46 t. d.), početné úžlabiny vycházejí, s počátku k JZ, potom k J se berouce a posléze všechny poblíž Dol. Dvorů (Niederhof) v jediný žlab se spolčující, kdež tedy z vod jejich povstává mocný potok, jemuž říkají Menší Labe. Kolébka těchto dolův a potokův nalezá se vesměs ve výši 1200 m., čelnější pak z nich jsou zejména: důl potoka Roveňského (Keilwasser), jenž v dolejší Rovině (Plattenberg, jinak též Keilberg) vzniká, pak důl Kotelské vody (Kesselwasser), jež vychází z koryta mezi Berenberkem a Liščím vrchem. Všecky tyto doly jsou těsné, od podoby roklí, přikrými a lesnými stranami sevřených, nemajíce v hořejším dílu svém nijakých cest, leda bylo sem a tam pěšin, any všechny schůzné cesty vedou buď horem po hřebeni, buď aspoň horem stráně, ač není-li příliš strmá. Spojení těchto údolí u Dol. Dvorů nalezá se v nadmořské výši skoro 600 m. Níže odtud šíří se údolí a pozbývajíce poznenáhlu silného sklonu svého, běží přímo od S k J, vyplněno jsouc chalupami a dvorci dlouhých vsí Hořejšího, Prostředního a Dolejšího Lanova. Pod touto vsí pak nastává ústí jeho do údolí Labe, z něhož jde dolem dobrá silnice až k Dol. Dvům.

Potok *Čistá* (Seifenbach) se soujmenným údolím svým vzniká v slatinném sedle, mezi Černou a Liščí horou položeném, jemuž Slatinná stráň (Moorlehne) čili též Bobí louka (Bohnwiese) říká, a to ve výši 1060 m. Malý tento ručej, k němuž pod Bukovou horou (Buchberg) hned přibývá druhý, zarává se hluboko do těsného, roklinného žlabu svého, mezi Benešovým vrchem a horou Černou od S k J se beroucího. U Nové vsi proniká žlab, v rule běžící, mocným coukem prahorního vápence, zřejmého na bílých skalách tak zv. Bílého kamene na západní straně údolí, jenž se nyní také těží a vyváží. Něco níže objevují se hned domky prastarého městečka Švarctálu (591 m.), pod nímž ručej, od šje „Červeného kříže“ (srov. str. 46 t. d.) přichodící, do Čisté se vlévá, načež žlab potoka, vyšedší ven z hor do rovnějšího, ale vždy ještě vysokého kraje, volně se rozšiřuje a na Čistou (Lauterwasser) a Forst (444 m.) dále se ubírá, u Teresientálu (384 m.) s potokem Javorníkem (Mohrenbach, od hory Ladvé přichodícím, odkudž pět jiných potokův sbírá) se spojuje, načež ve vlastním sice žlabě, a však pod cizím jmenem u potoka Javorníka k Labi (pod Hostinným) spěchá. Z Hostinného až k Švarctálu vede údolím okresní silnice.

Důležitější, než obě jmenovaná údolí, a po Labském nejpřednější, je **zajisté údolí Věcí Úpy**. Pramenové řeky Úpy neleží sice výše, a však vrchoviště její má v tomto hořejším dílu značně větší rozlehlost a řeka sama větší také vodnatost. Náleží zejména údolí Úpské k oněm dolinám Krkonošským, jež směru svého nejdnou, a to jako by skokem, od S k J ve směr k VJV pozměňují, stávající se střídavě dolinami příčnými i podélnými, tak že v některých místech, jako zejména na této trati, převrhuje se směr v kolmý ke směru, posléze vzpomenutému. Jsouť zejména hora Studničná, pak Sněžka a hřeben Schmiedeberský ve spojení svém základnou trojhranu s vrcholem, k zámku Maršovskému směřujícím, v jehož lůně hledati náleží nejhořejší prameny oněch vod, jež žlabu řeky Úpy, nejprv ve svoru, potom v červenavé rule a posléze v rudých pískovcích běžícím, poskytly jsou nynější podoby jeho a hloubky. V prostranství, oním trojúhelníkem uzavřeném, nalezájí se žlaby, jež ve vrcholu jeho, u zámku Maršovského, potom se spojují, a sice jeden se směrem od Z k V, druhý a třetí (východní) se směrem od S k J, jenž něco málo k V se odchyluje. První žlab nazývá se údolím Věcí Úpy, druhý je údolím Menší Úpy, třetí je bystřice Kolbovská.

Na výšinách Pláně pod Sněžkou, a sice mezi severovýchodním svahem Studničné (čili Kamenným polem = Steinboden) a mezi Obří boudou spatřuje se nejprv malé koryto (1300 m.), pokryté blaní a klečím a k J se sklánějící, v kterémž sbírají se vody se strání Studničné a Sněžky, vylévající se potom k jihu. Že však tato, s počátku slabě nakloněná úbočí na východní straně Studničné (srov. str. 43) a západní straně Sněžky (srov. str. 36) náhle proměňují se v skalné srázy, stává se, že tyto hořejší vody musí bráti se v podobě *slapu*, se dvou pruhův se skládajícího, po několika prazích dolů do hloubky nějakých 150 až 180 metrův. Jestliže to zejména *slap Úpský* (Aupafall), ostatně jen s jara a po hustějších nebo delších deštích mocnější a jen tenkrát zajímavější. Srázy Studničné a slévající se tu s nimi skalné stěny Sněžky způsobují takto divokou a malebnou dolinu, pod jmenem *Obřího či Úpského dolu* vůbec známou, jejíž vid snáhl jsem se v titulním obraze t. d. dle pravdy před oči čtenáře postavit. Vid ten je kreslen od jižního konce dolu, jež přehledněš odtud v celosti i se stráněmi jeho. Důl sám má délku asi 1·7 kilom., největší šířku 100 m. a na hořejším konci pod slapem Úpským nadmořskou výšku 1010 m., na dolejší asi 88 m., tedy také silný spád poměrem 1 : 13. Půda jeho obrazuje se co nepřetržitý, arci nerovný luh, kterýmž potok Úpa početnými ohby se vine a v kterémž stojí řadou několik bud. Boudy tyto jsou podél východního úbočí chatrnou voznicí jak mezi sebou, tak s dolejšími osadami Úpského údolí spojeny, jakkoli není radno, pustiti se na voze po této cestě, jinak dobře schůzná. Na Z, tedy k levé straně obrazu spatřují se srázné stráně hory Studničné, v kterých držívá se nezřídka sníh i v letě, v pravo pak úbočí Rožmberka či Růžové hory (srov. str. 47 t. d.), a na pozadí strmí obrovská spousta Sněžky do výše. Od jmenované voznice odštěpuje se stezník, kterýž prostředkem zátočin, velmi případně založených, a mina staré haldy opuštěných dolů na utrých, dosti pohodlně vede nahoru k Obří boudě a tedy i na Sněžku.

Vyznačil jsem na jmenovaném obraze tuto stezku, jakožto s české strany nejobvyklejší, něco ostřeji, než se ke skutečnému vidu této končiny asi hodí,

což však nebude jinak věci na újmu. Z Obrřího dolu běží žlab Věcí Úpy směrem napořád jihovýchodním a mezi hustými porostlinami lesními podél Bantových domků (Bantenhäuser) nejprv do Simmerberka, kdež nalezá se předkem starodávní huť na utrých a něco níže známá všem navštěvovatelům Sněžky „krčma u Petzra“ (756 m.) s poštovní sběrnou. Až potud má údolí Úpy střední spád v poměru 1 : 15. Tu pak rozvírá se poněkud a po východních lázech jeho kladou se boudy Simmerberské (čili Velká Úpa III. dílu), ano k JV lze již spatřiti věž farního kostela Velkoupského, brzo pak i velkou ves tuto (V. Úpa, I. díl), jejíž početné domky po obou stráních údolí mezi lukami až k pokraji lesa vzhůru lezou. Vší vede nyní dosti dobrá silnice, držící se věším dílem u výši 10—15 m. nad povrchní řeky čili nad žlabem údolí, na krátko také směrem přímo od Z k V. Odtud počínají domky řídnouti, žlab údolí se ouží a obraceje se k JV, stane konečně při směru od S k J.

Tam, kde nový tento směr nastává, což zejména u hospody, řečené „u Kříže“ (Kreuzschänke, 632 m.) se děje, ústí se údolí *Menší Úpy*. Toto spouští se od jižního úbočí Schmiedeberského hřebene dolů směrem od S k J, dostávajíc vodu svou ze tří ručejův. První, Lví potok zvaný, vzniká v korytě mezi Sněžkou a Černou skalou (Schwarze Koppe), druhý, Černý potok, dostává od Smrčné stráně (Fichtig-Lehne), Černou skálu se Schmiedeberským hřebenem spojující, hojných vod svých, sbíraje je z krásných, květnatých paloukův blíž boudy Hübnerovy, ano třetí, neméně vodnatý přítok, povstávající z pramenův pod západní straní hory Kolbenberka, spěchá údolím, rovněž hlubokým, pod kostelem Maloupským (Sv. Petra), dále k JZ. Zrovna u mlýna a mostu v dolejší Malé Úpě spojují se všechny tři potoky, činíce nyní říčku Menší Úpu, kteráž berouc se dále těsným a hlubokým žlabem, u Křížové krčmy do Věcí Úpy se vlévá.

Věcí Úpa, spojivši se s Menší, vchází nyní do tak zvaného Tmavého dolu (Dunkelthal), jenž vlastně není nic jiného, leč těsná a tmavá soutěska, sevřená k Z příkrými a lesnými úbočími hory Forstberka (srov. str. 46 t. d.), k V pak straněmi hory Špičáku, jež nahoru až k vrcholu hrubým i drobným kamením jsou pokryty. Touto soutěskou klesá sobě řeka obtížnou dráhu, proudíc přes početné valouny, vedlé ní pak běží silnice, zvláště u tak zv. „vysokého mostu“ z nouze se jí vyhybající. Tato soutěska je sotva 1·5 kilom. dlouhá a směřuje od S k J, načež obrací se pak žlab řeky k JV, čímž i údolí samo se rozvírá. V něm potkáváme se nejprv s hutí skelnou a příslušnými k ní domky, pak se zámkem Maršovským (572 m.), načež následuje ostatek lidného toho a přívětivého městečka horského. Od krčmy Petzrovky až pod zámek má údolí Věcí Úpy spád 1 : 41. Na tomto místě ústí se také do něho *důl Kolbovské bystřice*, t. j. žlab, asi 6 kilom. dlouhý a od S k J směřující, v němž leží dlouhá ves Kolbendorf a jehož vody přichodí jak od hory Kolby tak z malého údolí Valbeřického (Albendorf). Jedním i druhým údolím berou se dosti dobré silnice, jednak k Sv. Petru a Pomezním boudám, jednak zase do Opavy a Zacléře vedoucí.

Z Maršova vede nyní žlab řeky Úpy pod rovnou skoro čarou od S k J k městečku Vrajetu (Freiheit, 490·5 m.). V této trati nepřibývá mu sice šířky, za to strácí stráně, s obou stran jej provádící, dosavadní příkrostiti, pokrývající se tudíž až do výšiny 650 i 700 m. rolemi a lukami, načež teprv sráznější sklon na-

stupuje, jsa zároveň porostlý lesem, jenž také po bocích Rýchorského chlumu i protějšího Forstberka nahoru se táhne, ana silnice napořád údolím běží. Spád této tratě, až k dolejšímu mostu Vrajtskému 4·7 kilom. dlouhé, má se jako 1:57. Níže Vrajtu mění se směr žlabu od SZ k JV a šířka jeho roste z 200 na 600 m., pravým i levým straním pak ubývá sklonu i výše, čímž i údolí samo zbavuje se povlovně výšehorské povahy své. Změny tyto nastupují v tu chvíli, co údolí Úpy počíná pod Vrajtem zarývat se do útvaru rudých pískovců, v podobě vlnitých náhorních rovin od J až sem dosahujících. Půda údolí, složená z jílu a mladších nánosův, pokryta jest odtud bujnými lukami a úrodnými poli, ovocným stromovím obroubenými, mezi nimiž řadí se k sobě bez přetržky osady Vrajt, Mladé Buky Kalná voda (Trübenwasser), Hořejší a Dolejší Staré Město s výstavnými domky svými a závody, jež spojuje mezi sebou netoliko dobrá silnice, nýbrž i křídlo železnice rak. severozápadní, z Trutnova sem zabíhající. U Vrajtu ústí se do hlavního údolí pěkný důl, od Teplic svatojanských přichodící, kamž v severní stráni jeho dobrá silnice vede, any u Kalné vody otvírají se sem tři doly od levé strany. První, od SZ nachodící a vody z luk Rýchorského vrchu snášející, je údolí Thal-sejfské, druhé se směrem od S k J (od Dvoreckého háje) je údolí Sklenářovické (Glasendorf), třetí od SV nazývá se údolím Trautenbašským, jsouc odtud nejdůležitější, že jím běží dobrá silnice přes sedlo Verněřovické (Wernsdorf) do Zacléře. Údolí Úpy samo má pak na této trati (t. j. až k dolejšímu mlýnu Trutnovskému, jenž leží 409·0 m. vysoko) délku 10·8 kilom. a spád poměrem 1:132.

V posledním dílci svém, od Trutnova do Poříčí (Parschnitz, 386 m.), mění údolí Úpy na dobro směr svůj, obracujíc se skoro pod pravým úhlem k SV; zachovává však celkem dosavadní povahy své, majíc v délce 3·5 kilom. spád poměrem 1:152. Tudy běží také vedlé aerární silnice trať rakouské dráhy severozápadní od Poříčí k Staré Paké. Rozvití celého údolí Věcí Úpy, pokud zde bylo jest vyličeño činí od počátku jeho až k Poříčí 1·26, střední spád jeho pak jest 1:41.

Údolí potoka Ličné je poslední na jižní straně Krkonošů, činíc zároveň ve smyslu orografickém východní hranici vlastních Krkonošů a východního podhoří jejich. Žlab tohoto údolí přidržuje se celkem směru od S k J, od něhož toliko při počátku svém na délku asi 3 kilom., a sice k JV se odchyluje. Vody tohoto údolí sbírají se na vlnité půdě náhorních rovin útvaru kamenouhelného k SV Zacléře, jakož i v nízkém prohbí tamějším, jež v střední výši 600 m. mezi říčnou oblastí Úpy a Bobravy od Zacléře na Černou vodu (Schwarzwasser) až po Königshann se rozkládá. Údolí samo beře počátek svůj nad Lampertici, jsouc nejprv dosti široké a plochými lázy provázené, načež obchází velkým obloukem chlum Zacléřský a spojuje se u M. Krinsdorfu (454·0 m.) s údolím potoka Weiselbachu, od Rýchorského vrchu ze SZ přichodícího. Tato hořejší trať údolí má délku 5·8 kilom. a spád 1:56. Níže odtud počíná se žlab potoka hloub zarývat, stává se při tom těsnějším, any přikré, lesnaté stráně po obou březích jej provázejí; to děje se zejména s počátku v kamenouhelných, níže pak v rudých pískovcích. Tohoto vzhledu přidržuje se údolí Ličné i v dolejší, přímo od S k J směřující trati skoro bez výminky, dokud nespojí se s údolím Úpským u Poříčí (386 m.). Spád na této trati, 9·5 kilom. dlouhé, vynáší se poměrem 1:140. Bez mála celým údolím Ličné od Poříčí až k dolejší domkům Lampertickým



běží hlavní trať rak. dráhy severozápadní (prvé Pardubicko-Liberecké), kteráž pak u stanice Lamperticko-Bernartické do pobočného údolí zahýbajíc, vystupuje na výši důležitého sedla Königshanského (517 m.), odkudž nastává ostatní spojení železničné jednak s Lřbovem a Lancutem, jednak na Ruhbank s Vratislaví. Také voznici tu najdeš po celém údolí, pořádnou silnici však jen v dolejším a hořejším dílci jeho; jedna totiž vede z Trutnova k SZ do Gabersdorfu, zahne ale k SV do malého údolí, v němž leží ves Olešná (Goldenöls), odkudž pak zniknuvši vrch, spouští se k Bernarticům (Bernsdorf) a pak rovně do Königshanu u Lřbova, any z Bernartic samých vycházejí ještě dvě silnice, jedna totiž k Zaclři, druhá k Lamperticům. Střední spád celého údolí, 15·1 kilom. dlouhého, činí 1 : 92, rozvřtí jeho 1·33.

Posléze budiž ještě dopřáno místa stručnému vylíčení nejčelnějších *žlabův dolinných*, pokud na severní čili prusko-slezské straně Krkonoš se nacházejí. Lze-li vůbec při tom s věcí krátkostí se obejít, tož příčinu toho náleží hledati v té okolnosti, že o těchto žlabech je již několik dobrých a obšrných popisův po ruce, pročež také odporučovalo se, přestávati na pouhém fysikálně-měřičském momentu jejich, jenž posud pohřichu hrubě se zanedbával, kdežto zase o žlabech na české straně vůbec velmi málo posud bylo psáno, odkudž měl jsem se také povinna, obšrněji aspoň tuto je vylíčiti. Vzhledem k prusko-slezským žlabům počínám zase od západu i popíši tudíž beze vší obdéllosti údolí Zackenu, údolí Hájské a Giersdorfské, pak údolí Lomnické a Bobravské.

*Údolí potoka Zackenu*, jak od délky své, tak od početných kras přírodních nejvážnější a nejhledanější mezi všemi dolinami severními, vzniká vlastně ze tří dolin. Jedna z nich počíná se na východním sklonu onoho sedla, kteréž spojuje Vysoký hřeben Jizerský s horou Kamenicí, oddělujíc touž dobou údolí Kvízy od údolí Menšího Zackenu (srov. str. 19.). Jestli to zejména *údolí Menšího Zackenu*, jehož běh drží se dokonale též čáry, co běh Kvízy, ale opáčného směru, totiž od Z k V, kterýmž potok v hlubokém lesném dolu dále se beře a v Petrovicích do hlavního údolí se ústí. Toto nese jméno potoka *Většího Zackenu* a počínajíc se korytem, jež hora Zacken s hřebenem Libochovým na Z Jeřabí louky ve výši nadmořské nějakých 1000 m. činí, — beře se z nejprva asi v délce 3 kilom. od V k Z dolem pod budami Prokšovými, načež na krátko (1 kilom.) k S zabočivši, převrhne se potom v směr, prvějšímu opáčný, totiž od Z k V. Nemajíc v hořejší trati své valné hloubky, zarývá se údolí toto na druhé, od Z k V obrácené trati naopak hluboko do zdejšího, snadno porušitelného granitu, tvoříc celou řadu památných, jakkoli s těží přístupných roklí a soutěsek. Pod pruskou celnicí činí nadmořská výše jeho 740·0 m., střední spád pak je 1 : 25. I níže odtud je žlab těsný a skalistý, jakkoli rozvřít se na jednom místě v širší poněkud důl, v němž sklárna „Josefinenhütte“ řečená, místa jest nalezla, vchází ale brzo zase v těsnou bránu skalní, kterouž od J činí vrch Medvědí, od S pak tak zv. Dutý Kamen (Hohle Stein), načež šíří se zase do té míry, že na půdě jeho, jakož i na straních, jej provázejících, mohly směstnati se chalupy vesnice Marientálu. Od pruské silnice až k tomuto místu (hospoda „u slapu Zackenského“, 581·7 m.) jest spád žlabu 1 : 27, tedy o nepoznání menší, než prvé. Zde ústí se také do něho druhé, od J k S beroucí se údolí, kterémuž říkají údolí potoka „Zackerle“, nachodící od severozápadní straně Siňáka. Malý tento

důl mívá hojnou za doby letní návštěvu pro pěkný, 25 metrů vysoký slap, jemuž *Zackenský slap*, ač nezcela po právu, říkají a jež tvoří vodný potok tohoto dolu nahoře ve výši nadmořské 810 metrů. Hlavní údolí Zackenské pozměňuje v samém Marientálu něco směru svého, a sice k SV, načež brzo zase, zejména u tak zvaného Ruthensteina, pojímá v sebe druhý, taktéž z J, a sice od Vysokého Kola a ze Sněžných březů přichodící údolí Chuchelské, jehož voda sbírá se z četných, mezi sebou bez mála rovnoběžných dolů, v samém hlavním hřebeni vzniknuvších. Mezi potoky jejich jsou zajisté nejčelnější Věcí a Menší Chuchelná (Kochel). Prvější činí na krátko před stokem svým s Menší Chuchelnou slap *Chuchelský* (Kochelfall), jenž má poměrnou výšku 12 m. a prostou 521 m. Níže ústí Chuchelné obrací se žlab Zackenu skoro přímo k severu, zůstává napořád těsným, při čemž straně levé jsou příkré a skalnaté, pravé pak povlnnější; potok sám pak, rozhojniv se dosti mocně, ubíhá nyní prostředkem četných prahův s vodou čistou, ale silně vzpěněnou, přes trosky a kameny, v řečišti jeho se spatřující, dokud žlab nezahne se náhle k V, což zejména na konci hory Heidelberka a při prvních chalupách vsi Petrovic se děje, ana tímž časem levá (severní) stráž do pozadí ustupuje, propouštějíc více než s důstatek místa domkům veliké oné vsi, jakož i zahradám a polím jejím. Při východním čili dolejší konci vsi stojí most Zackenský v nadm. výši 374·6 m., odkudž střední spád žlabu toho na trati od Marientálu až sem (8·6 kilom.) má se jako 1 : 41. Na to vchází údolí Zackenu do onoho trojhranu, kterýž, od severní strany k úpatí Krkonošův přímo přiléhaje, jednak (k J) hlavním hřebenem, jednak (k SZ) rozsochami hřebene Jizerského, k SV pak Lancutským hřebenem jest obstoupen a máje půdu skoro všudež rovnou, úrodnými náplavy pokrytou a v střední výši nadmořské 350—370 m. položenou, dosti případně *kotlinou* čili *polem Teplickým* můž' se nazývati; neboť Teplice slezské leží skoro v samém prostředku tohoto trojúhelníka (ve výši 334 m.) a k nim ubírá se nyní i potok Zacken, a sice směrem k SV. Odtud jde běh jeho k vrcholu řečeného trojúhelníka, a sice k Hirsberku, kdež vlévá se do řeky Bobravy. Spád jeho má se pak na trati od Petrovic k Teplicům jako 1 : 152, odtud až po Hirsberk jako 1 : 212. Střední spád celého údolí Věcího Zackena při délce 31·7 kilom. jest jako 1 : 46, rozvití pak 1·57. Z Hirsberka vede údolím Zackena vzhůru dobrá silnice, a sice na Petrovice, Marientál a Prokšovy boudy k soujmennému sedlu, jež, jak známo, spojuje hory Jizerské a Krkonošské, odtud pak na druhé straně dolů do Harachovic, Tanvaldu, Vysokého a Rokytnice. V údolích Menšího Zackena, Zackerle a Chuchelné najdeš jen ražené pěšiny, spodem vedoucí, a sice údolím Zackerle přes novou Slezskou boudu k Šiňáku, údolím Chuchelským pak přes starší Slezskou boudu k Sněžným březům. Do údolí Věcího Zackenu ústí se nad to ještě údolí Hermsdorfské a Giersdorfské bystřice. Mimo to najdeš v oblasti Věcího Zackenu a obou Chuchelných nejhustěji zmíněné již klepy, na hořejších plochách svých na podobu mísek vykroužené, o nichž zpytatelé starožitností domnívají se, jako by bývaly obětnými oltáři pravěkého národa pohanského (srov. o tom str. 33). Jiná pověst, zejména ta, jakoby Věcí Zacken druhdy běhu svého zastavoval, tak že dolejší mlýnům dochází voda, nebude asi míti jiné podstaty, leč že žlab potoka v početných těsninách svých výše v horách skrze klepy a štěrky zhusta bývá zavalován, odkudž voda níže na několik hodin téci přestává.

*Údolí Hermsdorfské* (Heřmanické) *vody* počíná u Černého března v hluboké rytvině skalní, a sice na SV pod Věším Šišákem ve výši 1200 m., běží pak na podobu těsné rokle s jmenem Hlubokého dolu (Tiefer Grund) k S, načež pod obrovskou, osamotělou skalou, kteréž Turně nebo Věžný kamen (661 m.) říkají, spojuje se s vodou Turenskou (Thurmwasser), výše této skály po vysokých prazích (Thurmfall) dolů se spouštějící. Hlavní údolí, zůstávající v severním směru svém, ponímá v sebe vzdálí 1·6 kilom. odtud, a sice od pravé strany vodu Hutskou (Hüttenwasser) a 2·3 kilom. níže od levé ruky potok Pračský (Pratschbach), načež rozstupuje se v důl, 150—200 m. široký, v kterémž domky veliké vsi Anežčiny (Aagnetendorf, u prostřed vsi 490 m.) na délku 1·5 kilom. jsou rozestaveny, přiléhající na levo k příkrým bokům vrchu Homole (Hummelberg), v pravo pak k hoře „na Ohništi“ řečené (Heerdberg). Žlab potoka stává se odtud sice zase těsnějším, rozstupuje se ale mezi Kynastem a Sabrichovým kopcem poznovu, vchází zde, any v lůně jeho hořejší chalupy Hermsdorfské se zjevují, do doliny Teplické, kdež do Věcího Zackenu se ústí. Od Teplic postupuje podolím silnice do vsi Anežčiny, výše pak vedou jen pěšiny rozličnými doly nahoru na hřeben, z nichž nejobvyklejší bývá ta, po kteréž podél západního sklonu hlavního údolí lze k Věcímu Šišáku se dostat. I v oblasti tohoto potoka najdou se zhusta vzpomínané již obětní kameny.

*Údolí Hajské a Giersdorfské* podobá se velice údolí právě popsanému, toliko s tím rozdílem, že jest vodnější, mohouc se vykázati rozsáhlejším ouvodím. Hlavní směr tohoto údolí, jehož potok nazývá se v hořejším běhu Prostřední vodou (Mittelwasser), v středním dílu Hajským, dole pak Giersdorfským potokem, běží zase od J k S. Počátek jeho nalezá se pod Menším Šišákem asi ve výši 1250 m. a činí jej zejména tak zv. Stříbrný pramen, jenž tam přes stěnu žulovou dolů se spouští (Stříbrný slap = Silberfall). Seslív se Hřímavou vodou (Sturmgraben) zarává se potok hluboko v prorvu tamější co kolébku vlastního údolí, načež vzpěným tokem ubíhá tmavou a lesnou roklí dolů až do prosté výšky 528 m., máje tudíž na trati, 5·8 kilom. dlouhé, střední spád 1 : 8. V té výšce spatřuje se slap, přes skálu 10 m. vysokou se spouštějící (slap Hajský = Hainfall) a stejnoměrný posud spád jeho rušící, načež údolí jeho, přijavši v sebe důl potoka Sejfského, něco se rozvírá. Levá stráň, dosud příkrá, dostává nyní povlovnějšího sklonu, tak že na ní početné domky vsi Háje (Hayn) mohly jsou se směstnati. Zde ústí se v údolí Hajské od levé strany druhé věcí údolí pobočné, totiž údolí Červeného potoka čili Čermné, načež brzo následují domky velkých vsí Hořejšího a Dolejšího Giersdorfu (tuto stojí kostel u výši 342 m.) a tím došel také potok doliny Teplické, v kteréž, a sice u Teplic samých (332·0 m.), do Věcího Zackenu se vlévá. Na této trati, od slapu Hajského totiž až po Giersdorf, kteráž je 4 kilom. dlouhá, má údolí spád 1 : 21, na dolejší trati (3·8 kilom.) níže Giersdorfu až ke sklonu u Zackenu pak 1 : 38; střední spád celého, 13·6 kilom. dlouhého údolí jest tedy 1 : 15, rozvití 1 : 119. Z Teplic vede voznice na Giersdorf až do Háje, odtud pak dále k domkům Mumlovým a do Brückenberka, jakkoli v těchto místech bývá jízda dosti obtížná. Z Háje jdou pěšiny skoro všemi pobočnými doly nahoru k hřebeni.

*Údolí obou Lomnic* přidržují se směru bez mála rovnoběžného, jdouce od severního svahu Pláně pod Sněžkou k S a jsouce při počátku svém toliko Menší

Sněžkou od sebe odděleny. *Údolí Věží Lomnice* vzniká v oné hluboké propasti, kteráž počíná se na S Loučné boudy pod Planí mezi Stříbrnou horou a Menší Sněžkou. Plocha Pláně je totiž prostředkem ostrého kraje všudež náhle přetržena, svažujíc se zvláště na dvou místech v podobě příkrých, skalných stěn k S, pod nimiž nalezáj se dvě hluboká března. První směřuje od J k S, sbírajíc vody vřkolní v úzkém, téhož směru se přidržujícím vodojmu, jenž nazývá se *Menší stav* (kleiner o. Forellenteich) a máje délku 280, šířku 160 m. a největší hloubku 6—7 m., u výši prosté 1189 m. je položen. Skály, 80—100 m. vysoké, obkličují jej kol-kolem, toliko k východu spatříš malý luh, na němž stojí bouda, řečená Stavská (Teichbaude). Druhá propast, která také jest prostrannější, vytvořila se k SZ pr-  
vější. Také v ní shromažďují se vody, od Stříbrné hory a Poledního kamene dolů stékající, a způsobují tu nádržku, *Věží Stav* (Grosser Teich) řečenou a hlavně odtud povstalou, že na nejhlubším místě tohoto března vznikla jest od nanešeného štěrku a trosek hráz, vody stavící. Povrcheň Věčího stavu nalezá se v nadmořské výši 1249 m., jsouc 580 m. zdělí, 80—180 m. zšíří a májíc největší hloubku až do 24 m. Také tento stav obstupují stěny skalné, jež na jižní straně jsou až do 100 m. vysoké, držíce nezřídka i za letní doby v trhlinách svých pruhy sněhové. Zvláštní, divoká i romantická povaha těchto míst přivabuje k sobě každý rok hojnost navštěvovatelův. Prorvy, od těchto březů dále vycházející, spojují se za ne-dlouho v jedinou úžlabinu a vody jejich v jediný potok, Věčí totiž Lomnici, jež s počátku k SV se ubírá, držíc se při tom pustého a těsného žlabu, napořád sráznými stráněmi svíraného. Teprv u Krumhüblu nedaleko Příčných Sejí počíná se žlab něco rozstupovati. Nejhořejší díl jeho níže obou stavův až pod boudu Schnurbartovu má při délce 2·5 kilom. střední spád 1 : 8, druhý díl, až pod Příčné Sejfy (552 m.), také 2·5 kilom. dlouhý, však již 1 : 17. Čím dál, tím více šíří se nyní údolí Lomnice, příkré břehy ustupují stranou, tak že údolí pozbyvá brzo výšehorského vzhledu svého, vcházejíc u Arnsdorfu (440 m.) do pole Teplického. Na této trati, 2·8 kilom. dlouhé, činí střední spád žlabu 1 : 25.

Výše Arnsdorfu ústí se do hlavního údolí druhé, totiž údolí Menší Lomnice, jež počíná se nahoře v korytě, Věčí a Menší Sněžkou způsobeném, a nazýváje se z nejprva *dolem Melzrovým*, videm těsné a divoké rokle a při rychlém spádu téměř zároveň s prvéjším běží, u Březího pak (Birkigt) s ním se spojuje. Totéž děje se zde s údolím potoka Steinseifen, jež od Klepů (Tafelsteine) sem nachodí. Potok Lomnice, rozhojnuv takto značně vod svých, vine se nyní pod četnými ohby slatinným krajem okolo Prostředního Zillertálu k S, dokud nedochodí do Erdmannsdorfu (dolejší dvůr tamtéž 350 m.), po kterýž činí střední spád jeho (níže Arnsdorfu) na trati, 4·7 kilom. dlouhé, 1 : 52. U Erdmannsdorfu ztrácí údolí Lomnice posa-  
vadní šířku; neboť od Z přibližují se k němu nízký žulový hřeben Prudelberka, od V pak žebro Mravenčího vrchu. Níže Erdmannsdorfu až k Šildovu (241 m.), kdež ústí se Lomnice v Bobravu, přijavši prvé ještě potok Jihlavici (Eglitz, také Eichelbach řečený), je údolí její skoro zcela rovné, nemajíc věčího spádu, leč 1 : 422.

*Jihlavice* sama počíná se pak v oné skrovné kotlině, v kteréž, a sice v jiho-východním koutě pole Teplického, rozkládá se přívětivé městečko Schmiedeberk. Prameny její sbírají se na severovýchodním sklonu hřebene Schmiedeberského, ale také na západním svahu hřebene Lancutského u výši nadmořské 800—900 m.,

shromažďující se potom do několika ručejův, jež v samém Schmiedeberku (kdež farní kostel stojí ve výši 445 m.) se spojují, společného jména Jihlavičky nabývají. — Všechno údolí Lomnické je 17·3 kilom. dlouhé, má střední spád 1 : 22 a rozvíří 1·18. Dobré silnice jdou jím vzhůru od ústí až k Arnsdorfu, odkudž po ob-  
 stojných voznicích lze ještě až do Příčných Sejf, ba i do Krummhüblu se dostat. Odtud pak třeba již k horám po pěšinách se brát, kteréž skoro všudež drží se hřebene, poněvadž údolí bývají těsná i skalami lemována.

*Údolí řeky Bobravy* je nejvýchodnější všech údolí severních, pročez lze je také v smyslu orografickém míti za hranici oblasti Krkonošské k V, podobně co údolí Ličné na JV. Údolí toto mění několikráte směr svůj, berouc se nejprv od počátku svého až k Ruhbanku k SV a V a jsouc tedy údolím příčným, načež obrací se pod pravým úhlem k V a ZSZ, tedy skoro zároveň s hlavním hřebenem Krkonošským, odkudž stává se pak údolím podélným. Žlab Bobravy nemá nikdež povahy výšehorského údolí, jsa bez mála všudež otevřený, zespod dosti široký a straněmi rovnými a nevysokými provázený. S tím ve shodě je i skrovný spád jeho, ač vyjme-li se jediné temeniště řeky. Chciť zde toliko při hořejším dílu tohoto údolí se pozastaviti, pokud totiž činí východní mezi horstva Krkonošského, tedy až k Lancutu, v kterémž kuse uložen jest žlab buď ve vápencích, buď v pískovcích kamenouhelných, při čemž vlastní řečiště beře se vesměs po jílu, zde dosti mocném. Prameny Bobravy, jejíž jméno žlab ten nese, spouštějí se asi 2 kilom. k SZ Zacléře na tak zvané stráni Bobravské, a sice v slatinném korytě, 780 m. výše nadmořské majícím. Odtud běží ručej, sesilivší se prvé vodami jiných pramenův, lesnou roklí dolů k V i dostihuje za nedlouho vesnice Bobravy (dolejší konec 570 m.), kdež údolí hned rozstupuje se na 1·2 kilom. šíře. V této nejhořejší, 2·4 kilom. dlouhé trati má řeka střední spád 1 : 12. Níže odtud beře se široký napořád žlab k SV až po Mikulovice (Michelsdorf), obrací se tu pod pravým úhlem v podobě údolí, od blížících se straní něco stěsnaného, k SZ a vstupuje posléze do údolí Lívovského (Líbov 466 m.), skoro 2 kilom. širokého, vykonav cestu 11·5 kilom. se spádem 1 : 111. Žlabu zůstává i dále tato šffka, on však zahýbá se nyní k S a dostihuje Lancutu ve výši nadmořské 428 m. a se středním spádem 1 : 303. Střední spád celého údolí Bobravy od počátku až k Lancutu, a to na trati, 25·4 kilom. dlouhé, činí tedy 1 : 81, rozvíří jeho 1·46. — Z Lancutu vedou na Líbov a Königshann železnice i silnice do Čech, kromě toho lze po silnicích dostat se z Lancutu přes soujmenný hřeben jak do Schmiedeberka, tak do Líbova, kterážto poslední silnice, berouc se přes Branku Dittersbašskou, je výhodněji založena a lépe hleděna. Voznice jsou mimo to ještě z Mikulovic do Opavy, Bobravy i Zacléře.

*Rostlinstvo* Krkonošské je celkem jednoduché a snadno bude určiti povahu jeho. Obilí daří se toliko v nižších polohách, pšenice zejména až do nadmořské výše 550 m. u Trutnova a v údolí Úpském vůbec až k Mladým Bukům, na SZ až k Prostřednímu Lanovu a Vrchlabí, na severní straně pak všudež v poli či kotlině Teplické, kteráž ale k vlastnímu pohoří více nepatří. Žito zraje ještě v polohách, o 100 m. vyšších, pročez najde se ve všech údolích, rozsochy Krkonošské provázejících. Nejvýše ovšem dostupuje oves, jež nalezl jsem u Špindlmühlu, Herklovic a Vítkovic, na Šerém Kameni u Franzenstálu, konečně nad Svatojanskými teplicemi

pod Černou a Lesnou horou ve vysotách 760 až 790 m., pod Šerým kamenem (Finsterstein) i ve výši 843 m. Do těchto pater dostupují též brambory a lny, jakkoli v takových polohách i výše nahoru panují vlastně již *hole* čili horské louky, jichž hlavní travina (*Nardus stricta*) poskytuje dobytku chudé toliko pastvy. V ostatním řídí se jisté druhy rostlinstva mnohonásobně také polohou místní, zejména pak směrem sklonu; pročez také v Krkonoších vystupuje všeliký druh obilí po jižních straních výše nahoru, než po severních, což neméně také o obou hlavních hřebenech v obecném smyslu platí. Co pak vzrůstu stromů se tkne, třeba čítati všechno prostranství Krkonošské, pokud ve výši 600 až 1200 m. se nalezá, s převahou k půdě lesní, z čehož vyjímají se jediné žlaby dolinné a prostory, okolo bud či salaší položené, jichž užívá se co luk nebo rolí. V lesích panuje jehličnaté stromoví, zvláště pak smrky, jichž hořejší stanoviště, a to lesní, událo se mně měřiti na 10 místech; nejnižší bylo na Kuželi ve výši 1116 m., nejvyšší na Bärenberku v 1306 m., střední výška všech 10 stanovišť byla pak 1190 m., odkudž tedy lze 1200 m. *přijíti za hořejší hranici lesa*, což ale má jen o české straně hor svou platnost. Jedle bývá již řídčí, ještě vzácnější sosna a modřín. Z lupenatých stromů vyskytují se v dolejších polohách zhusta buky i břízy, a sice buď samočistě pohromadě, buď promíšené s jehličnatým stromovím; javory naopak a duby málo kdy lze napadnouti. Na místech stinných a nekrytých, zvláště pak na všech severních straních počíná již v nadmořské výši 1200 m. i níže družiti se ke smrku, jenž tu bývá již chatrný a zmrzačený, také borovice nízká či klečí (*Pinus pumilio*). Nezřídka potkal jsem se s klečím již v polohách, jen 1050 m. vysokých; v podobě rozlehlejších, souvislých a hustých, ba neproniknutelných porostlin shledal jsem je ale teprv ve vysotách 1200 až 1400 m. Dorůstajíc z pravidla jen do výšky muže, pokrývá borovice nízká dlouhými, po zemi se stroucími větvemi a stojatými, pružnými letorostmi svými haldy šterkové, neméně slatinná místa v horách, překázejíc všudež chůzi. V polohách 1400 m. ubývá jí ostatně půdy i rozlohy, výše pak vyskytá se již jen o samotě nebo v malých skupenstvích. Nad 1200 m. výše střídá se s klečím *hole* čili louka horská, stávajíc se v polohách, nad 1300 m. vyvýšených, ovšem panujících. Podobně co v horách Jizerských, sbírají se na Krkonoších ve všech těch početných drobných úpadech, korytech a sedlech výsehorských hojné vody, odkudž stává se, že *hole* zdejší proměňují se, jakkoli menší měrou než onde, v blaně a slatiny, kteréž pak činí se přirozenými nádržkami vody, jakkoli jimi chůze po horách značně se stěžuje. Že ostatně i Krkonoše honosí se mnohými vzácnými rostlinami alpské povahy, známoť dávno již všem milovníkům rostlinopisu.

Rozloha půdy v rozličných výšinách nadmořských čili *rozloha pater Krkonošských* udává se, jak následuje, čehož vyšetření vztahujeme ovšem jen k oné části horstva Krkonošského, kteráž vnitř Čech položena jest, a to zase jen v mezích, na str. 25. t. d. vytknutých. (V příčině toho, jak jsme zejména i tuto vypočetli hmotu i střední vyvýšení veškeré půdy, srov. poznamenání naše na str. 23 a 24 t. d.).

- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Všechno prostranství (oblast) vnitř onoho omezení drží . . | 58·248 hektar |
| 2. Prostranství (patro) nad vrstevnicí 400 metrů . . . . .    | 58·164 "      |
| 3. " " " " 500 " . . . . .                                    | 51·168 "      |

|     |                                     |           |   |   |   |   |        |        |
|-----|-------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|--------|
| 4.  | Prostranství (patro) nad vrstevnicí | 600 metrů | . | . | . | . | 44·376 | hektar |
| 5.  | "                                   | "         | " | " | " | " | 35·880 | "      |
| 6.  | "                                   | "         | " | " | " | " | 27·168 | "      |
| 7.  | "                                   | "         | " | " | " | " | 20·400 | "      |
| 8.  | "                                   | "         | " | " | " | " | 14·316 | "      |
| 9.  | "                                   | "         | " | " | " | " | 6·837  | "      |
| 10. | "                                   | "         | " | " | " | " | 4·726  | "      |
| 11. | "                                   | "         | " | " | " | " | 2·036  | "      |
| 12. | "                                   | "         | " | " | " | " | 1·046  | "      |
| 13. | "                                   | "         | " | " | " | " | 250    | "      |

*Z toho jde v příčině rozlohy půdy po patrech, a sice:*

|     |               |        |           |        |           |       |      |             |
|-----|---------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|-------------|
| 1.  | V prosté výši | 300 až | 400 metrů | leží   | 84 hektar | čili  | 0·1% | vší oblasti |
| 2.  | "             | "      | 400 "     | 500 "  | "         | 6·996 | "    | 12·0%       |
| 3.  | "             | "      | 500 "     | 600 "  | "         | 6·792 | "    | 11·7%       |
| 4.  | "             | "      | 600 "     | 700 "  | "         | 8·496 | "    | 14·6%       |
| 5.  | "             | "      | 700 "     | 800 "  | "         | 8·712 | "    | 15·0%       |
| 6.  | "             | "      | 800 "     | 900 "  | "         | 6·768 | "    | 11·6%       |
| 7.  | "             | "      | 900 "     | 1000 " | "         | 6·084 | "    | 10·5%       |
| 8.  | "             | "      | 1000 "    | 1100 " | "         | 7·479 | "    | 12·8%       |
| 9.  | "             | "      | 1100 "    | 1200 " | "         | 2·111 | "    | 3·6%        |
| 10. | "             | "      | 1200 "    | 1300 " | "         | 2·690 | "    | 4·6%        |
| 11. | "             | "      | 1300 "    | 1400 " | "         | 990   | "    | 1·7%        |
| 12. | "             | "      | 1400 "    | 1500 " | "         | 796   | "    | 1·4%        |
| 13. | "             | "      | 1500 "    | 1600 " | "         | 250   | "    | 0·4%        |

Z čísel těchto shledá se, že nalezá se v Krkonoších něco více, než polovice vší půdy, zejména 53%, v nadmořské výši 300 až 800 metrů, ostatek, tedy 47%, čili něco méně, než polovice, ve výši 800 až 1600 metrů. Povlovné ubývání podílů procentních v hořejších patrech vztahuje se ke zvláštní stránce povahy pohoří tohoto, t. j. k ploskosti hřbetův jeho.

Onen díl Krkonoš, jenž patří do pruského Slezska, má přibližnou rozlohu 354 □ kilom., při čemž liší se vzhledem k poměrům výše od jižního podhoří hlavně tím, že rozloha oněch vrstev jeho, jež v patrech 300 až 500 m. se nachází, je poměrně větší, než podíly ostatních pater.

Prostředkem čísel, o rozloze pater Krkonošských výše uvedených, vynásí se krychlový obsah oné hmoty hor, kteráž nad nejspodnější patro 300 metrů se vypíná, po míře výše uvedené formule na 307·03 krychlových kilometrů. Dělí-li se toto číslo základní plochou 582·48 □ kilom., vznikne vyvýšení 0·528 kilom. čili 528 metrů. Připočte-li se k tomu nadmořská výška nejspodnějšího patra 300 metrů, vznikne číslo 828 metrů *co střední výška veškerého prostranství Krkonošův*, což znamená tolik, že veškerá hmota těchto hor, jak zejména v §. 3. a 4. byla jest vypsána, rozvržena budouc stejněměrně po základní ploše 582·48 □ kilom., jevila by se co spousta 828 metrů vysoká.

## §. 5. Vrchovina Hruboskalská a Prachovská.

Již nahoře, zejména na str. 2. a 3. t. d., vyhradil jsem sobě, popsati pod zvláštním záhlavím jižní podhoří Krkonošův. Vylíciv v předchozích dvou §§. tvar a vnější podobu vlastních hor Krkonošských, přistupuji nyní k provedení druhého úkolu, t. j. k vypsání podhoří Krkonošského, jež bude případné rozvrhnouti, pokud totiž v Čechách se nalezá, na šestero skupenství. Počneme-li se západem, tož spatřují se první tři skupenství zrovna na jihu Krkonošů, ostatní tři pak na jiho-východě a východě jejich.

Za jižní podhoří lze považovati vrchovinu Hruboskalskou a Prachovskou, vysočinu Horeckou s rozsochami jejími, Kozákovem totiž a horou Zvíčinskou, dále pak vysočinu Zarovskou čili Království. Ostatně nebude věci na újmu, zahrnou-li se vysočiny, posléze jmenované, také v jediné horstvo.

Východní podhoří Krkonošů skládá se pak ze hřbetu Svatoňovického, ze stěn (pískovcových hor) Aberspášských a Polických, posléze pak z pánve Brumovské.

Vrchovina Prachovská a Hruboskalská, o kteréž hodlám v tomto §. promluvit, jest k severu a k západu, a sice počnouc od Brodu železného čarou na Turnov, Boleslav Mladou a Zámostí, omezena řekou Jizerou, k východu pak památným prohlbím půdy, jež počínajíc u vsi Vratu proti Brodu železnému a překročivši u Vesce a Lochtuše sedlo mezi horami Sokolem a Kozákovem, údolím potoka Rovenského dále běží, načež proti Troskám k JV se zahnuvši, do údolí Libuňky a mezi horou Tábořem a skalami Prachovskými do údolí říčky Cidliny přechází, až k Jičínu jeho potom se přidružuje. Odtud k JV a J stává se hranice tohoto okrají poněkud nerozhodnou, pokud totiž údolí Cidliny šíří se níže do té míry, že všechnu východní končinu jeho nelze více k podhoří Krkonošskému čítati; jsoutě jím ale bez odporu ještě jihovýchodní výpustky Podhradského vrchu, pak jižní výběžky vrchu Kopaniny u Lšbaně a Chlumu či Chlumku u Dobrovice. Silnice, z Jičína do Kopidlna, odtud pak voznice, na Křešice k Dobrovici a k Zámostí vedoucí, srovnávají se asi nejspíše s jihovýchodní a jižní hranicí tohoto vrchovitého okrají.

Že vyloučili jsme oblast, právě vymezenou, z ostatního podhoří Krkonošského co zvláštní jižní dílec jeho, toho nás omlouvají jak orografická, tak i geologická povaha její; slušíc totiž v celé rozloze své ještě k útvaru křídovému, mohla by tato oblast sice také býti přičítána k pískovcové vysočině Jizerské, v I. dílu topografického oddělení archivu na stránce 97 a násl. vylíčené, kdyby dvě věci, že totiž zde zcela jiné členy tohoto útvaru panují a nad to orografická podoba vysočiny této také od prvejší značně se liší, — za to nepřimlouvaly se, aby jí vykázano bylo místo osobité. V ostatním budiž i na vůli dáno, míti toto okrají za jakýsi člen přechodní z vysočiny Jizerské k vysočinám Horecké a Zarovské.

Vysočina Hruboskalská a Prachovská spoléhá na základně, pahorkaté náhorní rovině, 210 až 230 m. vysoké, se podobající, na prostoru 686·6 □ kilom. rozložené a obvodem stejnostrannému trojúhelníku se blížící, jehož vrchol k severu jest obrácen. Od vrcholu toho k jihu hromadí se tři, nahoře připoštělé a mnohonásobně rozryté hřbety, hory Sokolské totiž, hřbet Hruboskalský a Mužská hora zároveň za sebou, těsnými doly toliko od sebe jsouce odloučeny, podélnou csu svou od SZ k JV obracující a 100 až 150 metrů nad základní plochu vystávající.



Všecky tři hřbety jsou pak na JV prostředkem řady nízkých vrchův mezi sebou spojeny, jež také činí rozhraní vod Jizery a Cidliny. Vrchy tyto prostírají se pak dále ještě podél východní hranice tohoto okrají až k Libáni, kdež pod pravým uhlem zahnuvše k západu, nabývají podoby dlouhého a širokého, dosti při tom sklenutého hřbetu s početnými, ale plochými vrcholy (jako Kopanina a Chlum), jenž až k Jizeře se táhne a základnu jmenovaného trojúhelníka tvoří. Společně s Mužskou horou obkličuje tento hřbet prostrannou, nízkou ale nerovnou kotlinu, v kteréž potokové Kněžmostský a Klášterský vymleli jsou sobě od věkův nynější své žlaby a na jejímž dolejší konci, zejména nad Kosmonosy, spatřují se podnes ještě zůstatkové druhého podobného hřbetu, tak zvané Baby.


Co se poměrův geologických tkne, tož jsou základní tvary okrají tohoto, zvláště pak jmenované vrchy, hřbety a hory, složeny z hořejších členův útvaru křídového. Toliko západní část Sokolských hor skládá se z prostředního čili Jizerského pískovce, číníc tedy v geologickém vidu se sousední pískovcovou vysočinou Jizerskou jeden celek. Ostatní hřbety drží naopak kvádrové pískovce a slíny rozhodně mladší, a prvější obrazují se i zde zhusta u vlastní jim podobě příkrých stěn a ojedinelých, zvětřaním a opláknutím povstalých jehel, zdí a turní. Také v tomto okrají bývají nejvyšší vrcholy, zvláště pak nasazené na nich kupy, z čediče složeny, jakkoli se to řídkěji přihazuje, než ve vysočině Jizerské. Ve všech hlubších polohách lze naopak s diluviálními nánosy se potkati, kteréž ale tuto neskládají se, jako na pravém břehu Jizery, z hlin, nýbrž jediné ze šterku a písku, jež druhdy, jako zejména u Sobotky, Hrubé Skály a Mužského, až nahoru na temena hřbetův se prostírají. Nad diluviálními nánosy nejhlubších poloh nahromadily se konečně prodlením časův novotné náplavy, zvláště pak najdou se u Turnova, Žďáru, Koprníka a Března rozsáhlá rašeliniště.

Z horských skupenství této oblasti jeví se nejprvé na samém severním konci jejím hory Sokolské co hmotná vysočina tvaru v pravdě velikolepého, 6 kilom. délky a 2,5 kilom. šířky držící, kteráž nad to podélnou osou k J jest obrácena a v hořejších patrech svých, zejména ve vysotách nad 400 m., mnohonásobně porušena a obořena. V této výši zejména, a to až do 560 m., vystává na severním konci jejím příkrými stěnami plochá bašta skalní, asi 1,5 kilom. v průměru držící, kteráž mnohonásobně jest rozpadlá a vybrážděna a jejíž nejvyšší místo (562 m.) nazývá se *Sokol*. Nedaleko odtud stojí k J skála, 503 m. vysoká, na podobu turně, kteréž říkají *Zbiroh*. Od této pláně vybíhá k jihu úzký hřeben ke vsi Klokočimu, kdež rozstupuje se do několika krátkých rozsoch k JZ směřujících, kteréž mají všechny něco nad 400 m. výše. Hřbet Sokolský, jsa k Jizeře vsudež náhle a příkře svážen, spouští se naopak k J a JV dosti povlovně do údolí potoka Libuňky (250 m.), jež odděluje jej patrně od hřbetu Hruboskalského.

K JZ tohoto prohbí vypíná se, a sice směrem od SZ k JV druhý hřbet, jímž nabývá celá tato oblast vlastní své podoby, totiž *hřbet Hruboskalský, Troskovický a Prachovský*. Hřbet tento drží v délce asi 1·8 kilom., v šířce 1·4 kilom. a má 100—150 metrů výše nad podlahou veškeré vrchoviny \*). Na severozápadním konci

\*) Větší díl výšek nadmořských, jež se zde uvádějí, vyňaty jsou ze spisku výšek, v I. dílu archivu obsaženého, a sice na str. 216, 234, 236, 249, 251, 264 a 266.

jeho panují ještě pískovce kvádrové, pročez hřbet sám bývá tu v prosté výšce 380 až 400 metrů nahoře široký a značně připlotělý, při čemž jak k Jizeře tak k Libunce příkrými stěnami se sklání, jsa nad to v lůně svém mnohonásobně rozryt a roklinatými doly prostoupen. V severovýchodním úpatí hřbetu spatřují se v romantické poloze známé a hledané lázně Sedmihorské (Wartenberg) ve výši 258 m., nedaleko odtud nalézá se pak zámek Hrubá Skála (most jeho ve výši 352,3 m.), jehož poloha snáší se zároveň se střední výškou hořejšího kraje skalního pískovců kvádrových; severněji pak spatřují se ssutiny hrádku Valdšteina (388,5 m.). Nejvyšší místo tohoto kraje znamená se však homolí čedičovou nade vsí Vyskří, na kteréž stojí kaplička sv. Anny (spodek její má 465,3 m.) Prostřední díl jmenovaného hřbetu, jenž od hořejšího, k SZ ležícího, hlubokým dolem (výmolem) Želejovským jest odloučen, činí hora Troskovická, kteráž k JV Hrubé Skály ze širokého, eliptického podvalu vzhůru se pne, nesouc na temeni svém (483 m.) dva čedičové jehlance s malebnými ssutinami hradu Trosek (Panny a Baby). Odtud sklání se hřeben zase k JV, načež v nejdolejším oddělení svém, a sice na SZ Jičína, zdvíhá se poznovu v podobě prostranné, přes 400 m. vysoké nahorní roviny, jež složena jsou z kvádrových pískovců, na všecky strany příkře se svažuje a skrze vymleté doly na tři skupenství skalní se rozpadává. Těm říká se skály Prachovské a sice po vsi Prachovu, jež mezi druhým a třetím skupenstvím jejich v stráni leží. První čili severní skupenství vyznamenává se v prostředku svém homolitým vrcholem, jemuž Velká Hůra dějí (459 m.); druhé čili prostřední skupenství je skoro dokonale sploštělé, na nejvyšším místě 462 m. vysoké a rozryté hlubokými a divokými roklemi, nad nimiž četné trně a trosky čnějí; tomu svědčí jméno skal Prachovských v užším



Rýbníčky

Holín

Přívěš (Brada)

Kozákov

Prachovské skály

Trosky

smyslu. Třetí skupenství konečně vchází do podoby úzké elipsy, k V obrácené, vyznačujíc se několika kupami, jichž nejvyšší (467 m.) nazývá se Přivýšinskou skalou, jinak také Bradou po vsi soujmenné, na východním svahu jejím položené. Odtud sklání se všechno prostranství povlovně k Jičínu (280 m.), kterýž na nejvýchodnějším kraji jeho se spatřuje. V přiloženém nákresu pokusil jsem se podatí obraz tohoto jihovýchodního konce hřbetu Hruboskalského, pokud jej totiž s Podhradskeho vrchu čili Velíše u Jičína lze přehlednouti.

Třetí z hlavních hřbetův rovnoběžných je *Mužská hora* u Hradiště Mnichového. Tento hřbet je 25 kilom. dlouhý i stojí východně Hradiště v podobě dlouhé a srázné stěny skalní, kteráž nad celým údolím střední Jizery panuje, zvedajíc se k široké náhorní rovině pískovcové, 400 m. vysoké, na kterouž posazena jest hříbovitá kupa čedičová, již *Mužská hůra* v užším smyslu říkají (465 m.) Zde nalezněš v pískovcích podobné malebné tvary skalní, jako u Hrubé skály a Prachova, a s těmi setkáme se také později všudež tam, kde tento pískovec, připouštějící k sobě velice snadno zvětrání a vymylání, podlahu půdy činí. Hřbet *Mužský* běží od SZ k JV, obkličuje při tom obloukem pěknou dolinu Novovesskou čili Branžežskou, do níž vedou s něho početné rokly a doly. Prostřední díl jeho (u Kamenice) je rovněž hlubokými doly, mezi nimiž Podkostský (s hradem Kostí) malebností svou zvláště vyniká, mnohonásobně rozrytý a rozpadlý; naopak počíná se dolejší díl již u Sobotky, kdež diluviální šterky až k sedlu jeho v 350 m. nahoru dosahují, silně snižovati a vyrovnávati, načež na jihovýchodním konci svém, podobně co hřbet Hruboskalský, jme se zase do 400 m. zdvihati, nesa při tom několik ploských vrcholův, z nichž Velíšský čili Podhradský vrch (431 m.) pěkným rozhledem svým jest nejznámější. Z *Mužského* hřbetu, a sice ze severozápadního konce jeho vycházejí kromě toho dvě nízké vypnuliny půdy, kteréž v rozích svých při Jizeře do značné výše zase vyvstávají, podobn okrouhlých vrchův na se berouce. Jsoutě to Podolská hůra (351 m.) severně a Hůrka (310·7 m.) jihovýchodně od Hradiště, jež obě jsou s nemalou důležitostí taktickou, ovládající tuto všeliké přechody přes řeku Jizeru.

Hřbet, *Chlum* čili *Chlomek* řečený, činí čtvrtou znamenitější vyvýšeninu půdy v této oblasti. V přímém rozložení svém od Z k V, zejména pak ode vsi Bezděčína u Mladé Boleslavi až ke vsi Bačalkům u Libáně má Chlum Boleslavský (čili Dobrovický) délku 17 kilom. U Bačalek obracejí se výšiny jeho k SV a prostírajíce se ještě na délku 7 kilom. tímto směrem, slučují se potom u vsi Zajakur (na JV Sobotky) k nepoznání s jižními výběžky *Mužského* hřbetu. Hřbet *Chlumský* je v celé rozloze své 300 až 350 m. vysoký a ukazuje zvláště k S, SZ a JZ dosti náhlý sklon, maje při tom stráně své četnými a rovnoběžnými, ale krátkými po většině roklemi silně vybrázděné. Na východním i západním konci jeho jsou nejvyšší místa v podobě ploských vrcholů, onde zejména Kopanina (nad Bačalkami, 371 m.), tuto Bojetická hůrka (366 m., nad Dobrovicí). Západně Kopaniny, zejména nad Domousnicí, spatřuje se ve hřbetu prohbí čili sedlo, kteréž má jen 270 m. výše nadmořské.

Již nahoře připomenuli jsme, že hřbet *Mužský* společně s *Chludem* zavírají nížinu od podoby polokruhu, jejíž půda je nerovná a hrbolatá, držíc se u výši

é 210 až 230 metrů. Na pokraji této nížiny čili kotliny nalezájí se zejména Kněžmost, Dolejší Bousov a Březno. Tam, kde kotlina tato, kteráž znatou řadou výšin, z prostředního (Kostského) dílu Mužské hory k Z cí, na dvě jest rozdělena (dolina Kněžmostská a Bousovská), — k údolí otvírá, spatřuje se ojedinené skupenství vrchův, mezi Kosmonosy a Bazojsí, jichž nejvyšší jest hora, Baba řečená (362 m.) a jež lze míti za k pátého hřbetu pískovcového. Vrchy ty jsou důležité polohou svou při te, panující nad ústím údolí, od Bělé sem se otvírajícího. Mezi Babou a při jihozápadním konci Bousovské či Březenské doliny leží lidné město Mladá (spodek věže při radnici 238 m.), prostírající se po výšině 25—30 m. ou, jejíž nadmořská výše jest tu v 205 m.

Hlavní rozhraní vodní není v této oblasti takové důležitosti, jako jinde, i příčině, že hřbety, jdouce vedle sebe skoro rovnoběžně, k tomu pak čáře rozvodní, dávají této průchodu teprv na nejhlubších místech svých a sedlech, je mezi sebou spojujících. Pováží-li se dále, že rozdíly výšek blasti nebývají veliké, shledá se, že ani hřbety ani sedla nezpůsobují ici vůbec, zvláště pak cestám z údolí Jizery do údolí Cidliny nižádných ekážek. Zajímavější bude ostatně, učiniti sobě pro lepší poznání povahy sti příčný průřez skrze následující polohy:

*Příčný průřez vedený od Brodu Železného na Hrubou Skálu a Mužskou hlumu:*

|                                        | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| a u Brodu Železného . . . . .          | 280·0                    | 1·0                                           | SV—JZ   |
| (ves), hořejší kraj stráně . . .       | 410·0                    | 2·2                                           | VSV—ZJZ |
| l, štít . . . . .                      | 562·0                    | 7·4                                           | S—J     |
| vice, prostřed vsi . . . . .           | 343·5                    | 1·5                                           | SV—JZ   |
| úhorky (Wartenberg), most přes         |                          |                                               |         |
| r v údolí . . . . .                    | 250·5                    | 1·0                                           | S—J     |
| á Skála, most zámecký . . . . .        | 352·3                    | 2·8                                           | SV—JZ   |
| ef, kopec nade vsí . . . . .           | 465·3                    | 3·0                                           | V—Z     |
| ov, mlýn u Žehrovského potoka . . .    | 245·9                    | 5·0                                           | V—Z     |
| ká hora, vrchol . . . . .              | 464·0                    | 6·8                                           | S—J     |
| nfk, domek na sev. konci vsi . . . . . | 226·8                    | 4·2                                           | SV—JZ   |
| , vrchol . . . . .                     | 362·5                    | 5·8                                           | S—J     |
| lecké předměstí u Boleslavě, ho-       |                          |                                               |         |
| rybník . . . . .                       | 233·5                    | 3·4                                           | SZ—JV   |
| lický vrch (část Chlumu) . . . . .     | 366·0                    | 2·3                                           | SZ—JV   |
| ovice, u dvora . . . . .               | 229·9                    |                                               |         |

Přístupmež nyní k důležitějším žlabům dolinným tohoto okrají, sestavíce nejprve v následující přehled:

(Kamenického) dílce Mužského hřbetu vycházejícího, a sice ve výši 290 m., běží nejprv se spádem 1 : 119 přímo k J až k dolnímu Bousovu (232·0 m.), kdež těsně dosud údolí se roztupuje, obracejíc se pak skoro pod pravým úhlem k ZJZ. Nad Dolním Bousovem pojímá potok jeho (Sobotka řečený) druhý (Spěšovský), od SV přichodící, vchází nyní také v směr jeho od VSV k ZJZ, kteréhož pak ostatek údolí, jemuž nyní vlastně teprv svědčí jmeno Klášterského potoka (po býv. klášteře praemontstratském v Březně), — až k ústí svému do Jizery se přidržuje, šíříc se zároveň v pravo i v levo na 5—6 kilom. Celá tato šířka je vyplněna diluvialním štěrkem a pískem, žlab potoka samého pak ustlán jest až na šířku 1 kilom. v rašelině. Na levé (jižní) straně údolí zdvýchají se vzdálí 1—2 kilom. dosti příkré severní boky Chlumského hřbetu, any k S provázejí žlab nejprv výšiny, od Mužského hřbetu sem dochodící, níže pak lesnaté stráně Baby, mezi nimiž údolí v délce 7 kilom. prostředkem nízkých pahorkův (okolo Všeberska) s dolinou Kněžmostskou jest spojeno, jež má podobné poměry co Klášterská. V dolejší kuse údolí má se spád 1 : 724, při konci svém je pak údolí ještě ve výši prosté 204·8 metrů. Na mnohých místech je ostatně potok Klášterský i s přítoky svými staven a činí dosti prostranné rybníky. Rozvítí jeho jest 1·33. V údolí samém, a sice v severní straně běží od Boleslavě státní silnice, opouští je však u Obrubec a vystoupivší potom nahoru k SV, spojuje se u Hořeného Bousova se silnicí, od Hradiště přichodící; odtud jde silnice k JZ dále do Sobotky, načež zniká u Stankova v 360 metrech výšiny, spojující Chlumský hřbet s Mužským, k Jičínu dolů se ubírajíc. Od této důležité silnice odbočuje u Března, tedy ještě v údolí Klášterském, voznice nemnoho sjízdná, kteráž způsobuje přes Chlum spojení na Kopidlnu, a sice u Domousnice.

Všecky tyto žlaby, jež jsme právě vypsali, spatřují se na západní straně čáry předělné celé této oblasti; neboť strana východní, sklánějící se k údolí Cidlina, má příliš skrovnou šířku, než aby v ní značnější žlaby byly mohly vzniknouti.

Co se *rostlinstva* tkne, jestiž zajisté největší díl půdy této oblasti pokryt rolemi, v něž pšenice, žito, ječmeny a ovsy bez mála stejnými díly se dělí; kromě toho nalezneš také dobré louky, zvláště většími prostory v početných dolech a dolinách, po obou stranách tekutých vod. Lesy, a sice největším dílem chvojné, v nichž panují sosny a borovice, pokrývají příkrejší stráně hor pískovcových, v nižších, zvláště hlinitých polohách lze také s lupenatými lesy se potkati.

*Rozloha půdy v rozličných výškách nadmořských* jeví se způsobem následujícím, při čemž náleží sobě povšimnouti omezení celé oblasti, jak zejména na str. 75. jest vytknuto.

|    |                                                         |        |         |
|----|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1. | Všechno prostranství v mezích vytknutých drží . . . . . | 68·664 | hektarů |
| 2. | Prostranství nad vrstevnicí 300 metrů . . . . .         | 28·262 | "       |
| 3. | " " " 400 " . . . . .                                   | 1·699  | "       |
| 4. | " " " 500 " . . . . .                                   | 48     | "       |

Z čehož jde rozloha půdy po patrech čili vrstvách, zejména:

|    |                                                                              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Ve výši nadmořské 200 až 300 metrů leží 40·402 hekt. čili 58·8% této oblasti |  |
| 2. | " " " 300 " 400 " " 26·563 " " 38·7% " "                                     |  |
| 3. | " " " 400 " 500 " " 1·651 " " 2·4% " "                                       |  |
| 4. | " " " 500 " 600 " " 48 " " 0·1% " "                                          |  |

Z kterýchžto čísel poznává se, že daleko více, než polovice této oblasti horské spatřuje se ve výši prosté pod 300 m. a skrovný toliko dílec její výše 400 m. jest položen.

Za pomoci čísel, vzhledem k rozloze pater právě uvedených, shledává se, že všechna hmota horská, pokud nad nejspodnější patro 200 metrů se vypíná, — obnáší 61·1 krychl. kilometrů. Dělí-li se tento obnos základní plochou 686·6 čtver. kilometrů, vznikne vyvýšení půdy v síle 0·088 kilom. = 88 metrů. K čemuž když připočte se ještě nadmořská výška 200 metrů nejspodnějšího patra, vyjde na jevo číslo 288 metrů *co střední výška nadmořská celé vrchoviny Hruboskalské a Prachovské*, což znamená tolik, že všechna spousta horská, v § tomto vypsaná a nad 200 metrů prosté výše vyvstávající, rozprostřena budouc stejněměrně po podlaze 686·6 čtver. kilometrů veliké, měla by prostou výšku 288 metrů.

Porovnají-li se posléze tato čísla s oněmi, jichž jsme došli na stráně 74 v příčině pohoří Krkonošského, nabude se teprv pravého ponětí o významné důležitosti jeho.

## §. 6. Vysočina Horecká a Zarovská s Kozákovem a Zvíčinskou horou.

Obě jmenované oblasti jsou toliko těsnou prorvou řeky Labe od sebe odděleny a ukazujíce v příčině orografického tvaru i složení geologického poměry zcela podobné, skládají tudíž v souvislosti své okrají přírodní, s Krkonoši rovnoběžně se prostírající. V uvažení těchto důvodův rozhodnul jsem se také, vypsati je zde pospolu.

Vysočina, společným oním jmenem znamenáná, činí v celosti své nepravidelný a prodloužený trojhran, asi 57 kilom. dlouhý a 24 kilom. široký, obsahující prostranství, 1277·28 čtver. kilometrů veliké. K severu omezuje je ona čára, kterouž jsem již na str. 25 t. d. co jižní hranici vlastních Krkonošů byl vytknul, t. j. čára od Poříčí nad Úpou až k Mladým Bukům, odtud pak silnice, vedoucí na Javorník, Sejfy (Heřmanovy) a Lanov prostřední k Vrchlabí, dále podolí, od Valteřic až k Hřabačovu u Jilemnice se táhnoucí a údolím Jizery k Sitovému (Ernsttálu) a Brodu Železnému běžící. Západní hranice srovnává se zase dokonale s východní hranicí vrchoviny Hruboskalské a Prachovské (srov. str. 75 t. d.), směrem od Brodu k Jičínu jdoucí. Zde počíná se hranice jižní, kterouž v nedostatku zřejmého omezení přírodního určiti lze silnicemi, vedoucími z Jičína na Konecchlumí, Hořici a Jeřice k Vřeštovu malému, načež hranice zabočuje do čáry, položené v myslí na Jeřičky, Hustiřany a Velichovky až k Jaroměři. Jihovýchodní a východní hranici činí pak odtud zase podolní silnice ke Skalici, od Skalice pak až k Poříčí údolí řeky Úpy.

Celek tento podobá se rozlehlé náhorní rovině, jejíž hořejší plocha má středním vývodem 450—500 metrů výšky nadmořské; žlaby dolinné spatřují se při jižním kraji vysočiny ještě ve výši 300 metrů, severní kraj pak spojuje se

přímo s jižním úpatím Krkonošův. Na těchto náhorních rovinách sedí dosti početné vrchy, 600—700 m. prosté výše držíci. Prorva, kterouž činí řeka Labe mezi Hostinným a Dvorem Králové, dělí celou tuto oblast na dvě nestejně polovice, západní totiž a východní. Středisko dílce západního nalezá se u Horek (Falgendorf), dílec ten nemá však vlivem dvou dlouhých hřbetův, z něho vycházejících, podoby pravidelné. Druhý východní dílec naopak, jehož středisko leží u Hořejšího Zárova (Soor), jeví naopak v základní formě své velkou pravidelnost, nemaje nežádáných rozsoch.

V příčině *poměrův geologických* panujících zajisté v celé této oblasti horské rudé pískovce čili útvar permský nebo dyadický. Od pomezího probíhá na západě (jdoucím čarou na Železný Brod, Rovensko a Železnici u Jičína) až k východní hranici, t. j. až k údolí Úpskému i dále za ně, spatřují se zde po výtce kameny řecného útvaru širokým pásem rozložené, jež ale hojně proniknuty jsou mocnými průlomy melaphyrův a čedičů. Toliko na jižním a jihovýchodním kraji vyskytují se s větší mocností kameny dolejšího útvaru křídového, a sice s počátku úzkým toliko pruhem, jemuž však čím dál k východu, tím více šířky přibývá. Útvar dyadický jeví se zde zejména trojím patrem. Nejspodnější patro obsahuje buď šedé, buď nahnědlé (šedohnědé) slepence, buď šedé, nezřídka vápnité pískovce, držíci místy také mědné rudy, i přiléhá přímo ke svoru a břidlicím Krkonošským, k jihu jsouc vrstvami svými nakloněno. Toto patro vyniká na den pásem, 1—4 kilometry širokým, v samém jižním úpatí Krkonošů i lze je zejména sledovati bez přestávky od Semil na Jilemnici a Vrchlabí až k Vrajetu. Prostřední patro, tak zvané arkosové, je vlastně panujícím členem v této oblasti, skládající největší část její. Záležít zejména z živcovitých, hrubých i drobných pískovcův rozličné, hlavně však zarudlé (rudohnědé) barvy, ale také ze slídnatého lupku podobně zbarveného a zelenými skvrnami znamenaného, jež od plátek chloritické slídy pochodí. Kdož nerozumí geologii, pozná tento člen útvaru dyadického na pohled po rudé barvě hlíny i skal a v pravdě jest po tomto zbarvení hranice tohoto a jiných útvarův i na samých polích a věších pozemcích znatelná. V tomto členu útvaru dyadického skrývají se také pověstné zkamenělé lesy těchto končin. Jsoutě to početné zlomky kmenův bývalých stromů, 0.1 až 0.6 metrů tlusté, jež náleží k rozličným druhům araucarit i vykopávají se na mnohých místech v pískovci arkosovém, pokud na den vychází, jako zejména na Kozinci u Jilemnice, u vsi Stupného, pod hradem Peckou, u Studence a t. d. Jižní hranice těchto rudých pískovců a lupkův znamená se asi čarou, jež běží od Lhoty Bradlecké (u Železnice) na Proseč (Böhm. Proschwitz), Pecku, Nové Zámky u Hostinného, na Brusnici a Kyje (Keule) až k městečku Úpici nad samou Úpou. Svrchní patro konečně skládá se z písčitého lupku barvy jasně hnědé až cihelné, kterouž provázejí slabé a málo hojně plásty nebo kabany pískovce stejných barev. Toto patro není jinak mocné, jeví se toliko pouhými trsy, jež po prostředním patře roztroušeny jsou, jako na př. na jihovýchodním svahu hory Kozákova, pak u Martinic, Branné, Arnsdorfu a Nové Paké. Jsou-li vrstvy prostředního patra v položení svém již všelijak pomateny, děje se to při vrstvách svrchního patra vyšší ještě měrou. Převrasy takové mají původ svůj v hojných zdviženích melaphyru, jichž lze zejména v tomto okraji patra dokázati. Bylyť se zajisté tyto kameny v podobě těstovité za doby, kdy vrstvy

útvary dyadického tu se usazovaly, v rozličných občasích přes ně rozlily, načež pokryty jsou od nových vrstev útvaru toho. Melaphyr jest mandlovec, zhusta děravý i struskovitý, drže v mandlích a peckách svých nezřídka velice vzácné nerosty; že pak je zvětrání méně přístupný, než pískovec rudy, skládají se z něho posud mnohé vrchy i hřbety v těchto náhorních rovinách. Takové průlomy vycházejí s větší mocností na den toliko v západní polovici oblasti, tuto popsané, a sice početnými, k sobě rovnoběžnými pruhy po obou stranách Jizery, směrem na Semily a Hrabačov až k Branné dolejší pak podél celého Kozákova od Hamršteina až k Lomnici, dále v podobě celých vrchů na severu a jihu Levína (Olešnice), v náhorních rovinách Leštenské a Studenecké, posléze ve hřbetu Ždírnickém (mezi Čistou a Borovnicí). Ve východním dílu této oblasti, totiž v náhorní rovině Zarovské, není takových průlomův. Ostatně najdeš také průlomy porfyrův a čedičův v této oblasti, jakkoli v skrovném množství. V nejjižnější končině útvaru dyadického, a sice mezi Bukovinou a Mosteckými lázněmi, vystávají vrstvy jeho k JV a pod nimi vycházejí pak na den pláсты břidlic hlinitých, také k JV se zdvihaají, načež pojednou se rozštěpují, propouštějíce mezi sebou místa mocnému couku červené ruly. To jest zejména pěkný hřbet hory Zvíčinské na západě Králové Dvora. Všechn ostatek tohoto kraje, jak zejména odtud k J a JZ se prostírá, skládá se ve svrchních polohách svých, jež na rudé pískovce přímo naléhají, ze spodních slínů a pískovců kvadrových a ze spodních opuk, což zvláště také platí o lese, Království řečeném (na S Dvora), pak o jihovýchodní opyši hřbetu Zvíčinského, jakož i o chlumech Mlazovickém, Hořickém a Vřeštovském; naopak panují v hlubších polohách u Dvora, Žirče, Miletína a Vřeštova vrstvy středního a vrchního pískovce kvadrového i opuk.

*V orografickém vzhledě* nabytí lze nejjasnějšího ponětí o rozčlenění celé oblasti, postupuje-li se po míře rozdělení, svrchu vytknutého, směrem od Z k V a pozorují-li se tudíž nejprve hřbet Kozákov, pak náhorní rovina Horecká, Zvíčinská hora s podhořím jejím, dále plasy Lanovská a Vlčická a konečně náhorní rovina Zarovská.

*Hřbet Kozákov* mezuje k Z přímo s vrchovinou Hruboskalskou, již jsme v předchozím § byli popsali. Máť zejména podobu hřbetu, od SZ k JV se stroucího, na hřebeni pak dosti rovného, jehož nejvyšší místo je vlastní hora Kozákov (745 m.) k JZ Semil, odkudž také lze dobře přehlednouti vrchy, jež obstupují hořejší údolí Jizery. Hřbet tento svažuje se po obou stranách, k JZ totiž i k SV, dosti příkrě až k výši nadmořské 500 m., načež rozšiřuje se v náhorní rovinu, skláněje se při tom až do prosté výše 400 m. velice povlovně. Na této plase jeho spatřují se četné a dosti lidné osady, jako vsi Dlouhé (497 m.), Smrčí (499. m.), Záhoří (510 m.), Světlá (540 m.) a j. m. Ostatně najdeš i v hořejší příkré stráni, tedy ve výši 550—650 m. několik menších obývaných vesnic a samot. S výše 400 m. sklání se půda poznovu s rychlejším svahem jak k prohbí, na jihozápadní straně hřbetu od Lestkova k Rovensku čelícímu, tak k SV, t. j. k Jizeře a výše k údolí potoka Olešné, a to až na 350 i 300 metrů. Na JV spouští se hřbet Kozákova jen až do prosté výše 490 m., rozstupuje se při tom mezi Hořenskem a Menším Kotelskem v široké sedlo. Na to zdvíná se poznovu, a sice mezi Stružincem a Veselým, až do prosté výše 550 m., zahýbaje se při tom k jihu, a vypne se u Hrádku (pod Lomnicí) až do 665 metrů, načež přechází zase v směr původní,



t. j. jihovýchodní, kteréhož potom až po Novou Pakou se přidružuje; v této části jeho vynikají pěkná homole hory Tábor s výtečnou vyhlídkou (684 m.) pak romantické vrchy Bradlec (561 m.) a Kumburk (641 m.) s ssutinami hradů svých. V celé čáře zdvižení má hřbet Kozákov délku 25 kilom. a větší, z čehož však náleží toliko prvních 15 kilometrů na délku hřbetnou počítati. Neboť výše Nové vsi, na severní straně ležící, stává se žlab potoka Olešné, jenž zároveň hranici hřbetu toho k SV činí, do té míry mělkým, že odtud již až k Nové Paké lze míti souvislost hřbetu Kozákova s náhorní rovinou Horeckou za jistou a patrnou. Z Turnova položena jest na Tatobity silnice nahoru k hřebeni Kozákova, dělí se však u Žlábků v ten způsob, že jedna trať vede po druhé straně do Semil dolů k údolí Jizery, druhá však v úpatí samého hřebene do Lomnice a dolů do Železnice, křižující se při tom v samé Lomnici se silnicí Jičínsko-Jilemnickou.

*Náhorní roviny Horecké* připojují se přímo k severovýchodnímu sklonu Kozákova, jsouce od něho toliko odděleny údolím potoka Olešné. Od hor Jizerských a Krkonošských dělí je naopak žlab údolí Jizerského, jakož i prohíbí, od Sitového na Hrabačov k Vrchlabí jdoucí; odtud pak činí hranici údolí Labské k V až ke vsi Dvořáčkům (Burghöf). Jižní hranice běží odtud zároveň s tratí železničnou přes Borovničku až k Pecce. Omezení toto zavírá v sobě kraj od podoby elipsy, jejíž větší osa drží se také směru od SZ k JV, majíc asi 30 kilom. délky, ana menší osa je toliko 15 kilom. dlouhá. Všecek tento kraj má tvar vysočiny, nad podlahou svou z výše nadm. 300 m. rychle do výše 400 m. vyvstávající a mezi tímto a hořejším patrem 550 m. podobu hrbolaté náhorní roviny na se přijímající, nad kterouž pne se ještě výše několik chlumův a vrchův, větším dílem ve skupenstvích pohromadě se vyskytávících. Jak snadno na rozum jde, činí se tyto chlumy zároveň také středišti vyvýšení náhorních rovin Horeckých. Rozhodného směru nějakého nelze ostatně těmto vyvýšeninám půdy přičítati; spíše bude lze tvrditi, že se zde severojižní a západovýchodní směr všudež protínají, což asi připadá na vrub hojných průlomův melaphyru, jež zároveň porušily mnohonásobně původních směrův uložení. Nejmnocnější pásmo takových nahromadění chlumův a vrchův spatřuje se zejména u samých Horek (Falgendorf). Patrná, k tomu pak 12 kilom. a více dlouhá vypnulina půdy, v jejímž prostředku leží zejména také Horky, běží směrem od ZSZ k VJV ode vsi Bělé blíž Olešnice Levínské až k Borovnici, na kteréž pak sedí několik hmotných, nahoře zakulacených a plochých, lesem porostlých chlumů se sráznými stráněmi, jako vrchy Jiva (547 m.), Babka (548 m.), Levín (571 m.), Císařův chlum (605 m.) a Čistecký vrch (570 m.). Řečená vypuklina půdy jme se však, arci s překážkami, pokračovati až k východnímu konci Horeckého náhoří, kdež ji zejména ještě v Dubině (Eichhübel, 505 m.) u Borovničky, pak na Bradle (Bradlberg, 520 m.) u Debrného lze sledovati. S tímto směrem vyvýšení stýká se, a sice skoro pod pravým uhem, u Horek druhá vypnulina, od S k J běžící, kteráž počínajíc u Martinic blíž Jilemnice, na Leštné a Studenec k jihu se beře. Na této jsou nasazeny vrchy Stráž (Wachberg, 630 m.) a Hůrka u Studence samého. V severní končině Horecké náhorní roviny lze se taktéž potkati s několika vypnulínami půdy, jakkoli vůbec bez určitého směru, jež ale vždy mají na sobě pěkné kupy horské, jako vrch Dehetník (Dechnik, 556 m.) u Čikvasky, Hajsko (597 m.) u Mříčného a Kozinec (560 m.) u Jilemnice. Ná-

horní rovina Horecká těší se hojným prostředkům komunikačním, i lze ji vůbec, jakkoli není ani úrodná aniž průmyslná, míti za vážné středisko cest spojovacích. Samým prostředkem jejím běží hlavním směrem od ZSZ k VJV dráha Liberecko-Pardubická, kteráž zejména u Horek zniká rozhraní vodní mezi Jizerou a Labem. Trať tato je u Staré Paké přetata tratí rakouské dráhy severozápadní, od jihu přichodící, kteráž k severu dále se berouc, objíždí směrem na Roztoky, Martinice, Brannou, Kunčice (Pelsdorf), Hostinný a Vestřev (Neustadt) celé severní okrají této oblasti. Značný počet dobrých silnic, jichž uzel nalezá se zejména také blíž Horek, berou se všelikými směry touto vysočinou, rozbíhajíce se odtud (t. j. z Horek) hvězdovitě buď k jihu, buď k severu do rozličných údolí Krkonošských.

*Hřbet Zvíčinské hory* odštěpuje se od náhorních rovin Horeckých na jiho-východním konci jejich. U Lázní Mosteckých (Mastig-Bad) zdvihá se totiž půda velikým polokruhem do výše nadmořské 500 metrů i klene se odtud, směrem od SZ k JV dále se berouc, v obdélný a velkolepý hřbet horský, jehož nejvyšší místo ozdobeno jest kostelcem, jenž přísluší k blízké vsi Zvíčině, v severozápadní stráni ležící, po kteréž i celý hřbet od lidu pojmenován jest. Místo toto, 671 m. nad mořem se vypínající, poskytuje výborného rozhledu nejen po podnožním, zvláště pak po dolejší kraji vůbec, nýbrž i nevyrovnaného s jižní strany pohledu k pohorí Krkonošskému, pročez jsem je také zvolil za hledisko k výkresu Krkonošů, jenž k závěrku tohoto díla připojen jest. Celý hřbet Zvíčinský má délku 17 kilom. i přidržuje se řečeného směru skoro v přímé čáře. Šířka jeho obnáší u Hořejší Brusnice s počátku 6 kilom.,



Zvíčinská hora

Pohled do horčejšího údolí Labského a na horu Zvíčinskou od Kuksu.

na jihovýchodním konci však (u Kašova) sotva 3 kilom. Výška hřebene roste směrem jihovýchodním rychle až na 671 m., odtud však ubývá jí stejnoměrně, až posléze klesá na 400 m. V severu spadá hřbet Zvíčinský bez překážky náhle k širokému údolí Labskému u Dvora, sklání se ale naopak k JZ velice povlovně. Výkres na předcházející stránce poskytuje pohled na tento pěkný hřbet, v jehož severovýchodní stráni běže se trať dráhy Pardubicko-Liberecké nahoru k výšinám Horeckým, ano úpatí jeho spoléhá na širokém žlabu údolí Labského, za nímž spatřiti lze věže a domy města Dvora Králové, výše pak (k pravé ruce obrazu) stráně lesa, „Království“ řečeného, jenž náleží již k náhorním rovinám Zarovským. Zajímavé jsou geologické poměry tohoto, na pohled jednotvárného hřbetu; skládá se z jistě, jak již výše napověděno, počátek jeho na SZ z pískovců útvaru dyadického, prostředek i s vlastní horou Zvíčinskou z břidlic hlinitých a červenavé ruly, ostatek pak, k JV se prostírající, ze slínův a pískovců spodního útvaru křídového. Rovnoběžně ke hřbetu Zvíčinskému a vzdálí 3 kilom. od něho prostírá se ode vsi Konecchlumí až k Velkému Vřeštolu jiný hřbet, těsnými prorvami potokův Javorky a Bystřice na tři menší hřbety či chlomy rozdělený, jenž z vůkolního podolí, a sice z prosté výše 300 m. až do 430 m. se pne a jehož tři zjevné části, od 425 až do 437 m. výše vystávající, nesou také domácí jméno Chlumův. Západní nazývá se zvláště Mlazovickým chlumením, prostřední Hoříckým, východní pak Vřeštolovským a všechny tři jsou větším dílem lesy zarostlé a zvláště k severu příkrě svážené. Kromě řečených již železnic, z nichž dráha severozápadní právě divokou roklí potoka Javorky k Bělehradu a Paké nahoru se ubírá, vedou po obou stranách hřbetu Zvíčinského dobré silnice od SZ k JV, přecházejíce zejména přes něj na třech místech, a sice pode vsí Zvíčinou, u Doubravice a u Hříbojed. V strategickém vzhledě jest zvláště také důležitá silnice, jež od Jaroměře v širokém a hrbolatém prohbí mezi Zvíčinskou horou a Chlumy vede na Lanžov, Miletín, Bělohrad, Choteč a Úlibice k Jičínu.

Čtvrtým členem rozsáhlého kraje, jež tuto popisujeme, jsou *náhorní roviny Zarovské*. Jsouc koloem obmezena význačnými žlaby dolinnými, kteréž jsou k SZ údolí Trutnovské a Pilínkovské, k Z a JZ údolí Labské, k JV, V a SV pak Úpské, zdvihá se tato oblast v podobě kruhovitě s průměrem 20—23 kilometrů ze žlabů řečených dolin, tedy z výše nadmořské 300 až 350 metrů všudež náhle a s příkrými celkem sklony do prosté výše 400 metrů, v kteréž se půda vyrovnává, aby pak k středišti celé oblasti prostředkem klenutých vln zase až do výše 600 m. poznovu vystala. A však i nejvyšší polohy tohoto kraje jeví se toliko v podobě rovinaté, zvláště pak scházejí skoro dokonale všelike význačné vrchy a kopce, s nimiž v náhorních rovinách Horeckých byli jsme se naopak zhusta setkávali. Tento nedůstatek lze asi nejspíše připsati té okolnosti, že scházejí zde vůbec sopečné tvary melaphyrů, porfyrů a čedičův, jež onde právě nejvyšší a nejpěknější vrchy byly jsou vytvořily. Západní díl vysočiny Zarovské pokryt jest prostranným a souvislým hvozdem, jemuž ode dávna co části býv. věnuého panství králových českých říkají „Království“. Hlavní směrové zdvižení půdy jdou od Z k V, jakož i od S k J, oba pak protínají se u vsi Hořejšího Zárova (Ober-Soor) na silnici z Trutnova do Dvora, Jaroměře a Josefova, kteréžto místo daleko jest svídné skrze dvě ploché výšiny, větrnými mlýny znamenáné; ostatně jest tato končina známa,

ba i pověstná bitvami, kteréž tu r. 1745 v dědické válce rakouské, jakož i severně odtud u Rokytníka (Rognitz) r. 1866 ve válce rakousko-pruské svedeny jsou byly. Vyšší z těchto pahorkův mlýnských má 541 m. výše nadmořské. Nejvyšší místo celé náhorní roviny Zarovské je však skála, vyčnívající k JV odtud nade vsí Brusnicí na pokraji lesného, na V (k údolí Černého potoka) náhle, na Z (k Bídě a Kocbeři) mírně sváženého chlumu, jemuž by odtud jmeno Brusnického chlumu nejspíše slušelo; skále oné pak říká se Gamberk (607 m.). Po ní následují co do výše vrch Fichtenberk u Koclérova (Ketzelsdorf, 584 m.), jenž vypíná se z širokého a lesního hřbetu, od Starých Buků k JZ až po Labe jdoucího a železniční údolí Pilínkovské k J provázejícího, posléze pak vrch Hranná (Graner Koppe 552 m.) nad Střítěží (Burgersdorf) při SV konci téhož hřbetu. K SV spadá celá oblast, zejména pak hřbet Pilínkovský, právě tuto jmenovaný, příkrě do údolí Úpy u Trutnova, kterýžto svah má podobně historickou památnost svou skrze šarvátku, jež se na něm r. 1866 přihodila (skála Gablenzova, dříve Svatojanský kopec, nad Trutnovem, 506 m.). Od obou směrův vypnutí, jež v těchto náhorních rovinách se protínají, rozbíhají se úvaly této krajiny všelikými směry, tedy hvězdovitě, ústíce se do žlabův dolinných, jež tuto oblast kolkolem lemují. Čára, svedená od Debrného na Koclérova, Bídu ženskou (Weiberkränke) k Maršovu, znamená hranici útvaru dyadického; neboť jižně odtud skládá se již veškera půda ze spodních pískovců kvádrových a ze spodních opuk, kterýžto člen útvaru křídového s důstatek jeví se také podobou straní u Nesyt (Nimmersatt), Ferdinandova a Ostrého (Neudorf). — Co se pak ještě prostředkův komunikačních tkne, tož obcházejí okolo těchto náhorních rovin skoro všudež dráhy železné, vyjmouc toliko krátkou prorvu Labskou mezi Vestřeví (Novými zámkami) a dolejší Nemaňovem (Emaus). Státní nebo okresní silnice berou se kromě toho z Josefova na Hradiště Choustníkovo a Nový Rokytník do Trutnova, z Dvora na týž Rokytník taktéž do Trutnova, pak na Koclérova do Hostinného, z Josefova na Skalici do Úpice a Poříčí, pak z Úpice na Kyje do Dvora.

Posléze sluší ještě přičísti k oblasti, v tomto § vypisované, malý trojhran, jehož plochý vrchol leží při ústí potoka Pilínkovského do Labe (u Nových zámků) ana základna, k S jsouc obrácena, činí jižní úpatí Krkonoš směrem od Vrchlabí až ke Kalné vodě (Trübenwasser) u Trutnova. Chciť tomuto dílci dáti jmeno *náhorních rovin Vlčíckých a Lanovských*. Ve smyslu geologickém shoduje se tento kraj zcela s náhorní rovinou Zarovskou, skládaje se naopak v orografickém vzhledě z prodloužených hřbetů Krkonošských, t. j. ze hřbetu hory Vachoura, Benešova vrchu a Černé hory. Všecky tyto hřbety sklánějí se totiž, jak již na str. 45 a 46 t. d. pověděno, v oné čáře, na kteréž břídlíce prahorní přestávají, s příkrými stráněmi 300—400 m. hluboko k jihu, přivádějíce takto i v orografickém smyslu jižní hranici vlastních Krkonoš k platnosti, jež z hlediště geologického početím útvaru dyadického vůbec se znamená. A však potoky, jež z hor vysedše, mezi těmito hřbety k J se ubírají, neustaly vymýlati půdu i v dolejší běhu svém, odkudž vznikla jsou mezi žlaby jejich jakás pokračování výše jmenovaných hřbetův, jež arci v dobré příčině náleží počítati k pohoří Krkonošskému. Jinak mění se zde vlivem protivného směru vrstev nového útvaru dosavadní směr oněch hřbetův dosti značně; neboť první dva odkloňují se od původního směru svého k JV,

třetí pak k JZ. První dva hřbety, jež jsou mělkým žlabem potoka Prosečenského čili Menšího Labe, 9 kilom. dlouhým a domky vsí Dolejšího Lanova (438 metrů) a Prosečného (Proschwitz, 371 m.) pokrytým, od sebe odděleny, nesou na temeni svém několik nad ně vyvýšených vrcholů, jako Hartskou hůrku (491 m.) nade vsí Hartou, a Kopec (Koppenberg, 525 m.) nad láznemi Forstskými, jdouce jinak silně do rovne a šíře. Třetí, východní hřbet zahýbá se při vstupu svém do kraje okolo Mladých Buk pod pravým uhlem k ZJZ, sklání se k S proti údolí potoka Javorníka (Mohrenbach) příkře, rozbíhá se však na jih k údolí Pilínkovského potoka do několika plochých a krátkých rozsoch s 4 pobočnými úvaly. I na něm lze, a sice jak na hřbetné čáře, tak mimo ni, několik plochých kup pozorovati, jako tak zv. Červený Kopec (Rothe Höhe, 520 metrů) u Leopoldova, Seplův kopec (582 m.) u Mladých Buků a níže Vlčickou hůru (542 metrů). Co se prostředkův dopravy tkne, lemuje všechen tento kraj k JZ, J a JV železnice i silnice, od Vrchlabí na Kunčice (Pelsdorf) a Hostinný k Trutnovu běžící; kromě toho vedou četné silnice okresní od této hlavní tratě nahoru do údolí Krkonošských.

V tabulce, níže stojící, sestavil jsem nejdůležitější místa rozhraní vodního celé této oblasti v přehled, a sice v tom způsobě, jak zejména od Jizery a Malých Skal až k Labi u Jaroměře napořád se vyskytují.

*Jsoutě pak čelnější místa hlavního rozvodí hřbetu Kozákova, vysočiny Horcké, Zvičinské a Zarovské zejména následující :*

|                                                                  | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Malé Skaly (Vranové), stanice železniční při Jizeře . . . . . | 273·5                    | 0·9                                           | SZ—JV   |
| 2. Hora Sokol, jihovýchodně Vranového, vrchol . . . . .          | 562·1                    | 0·7                                           | SZ—JV   |
| 3. Besedice, nejvyšší domek v severní straně Sokola . . . . .    | 515·5                    | 1·6                                           | SZ—JV   |
| 4. Chloudov, sedlo v dolejší Kozákově . . . . .                  | 510·0                    | 1·7                                           | SZ—JV   |
| 5. Vrchol na jihozápad Hamrsteina . . . . .                      | 611·0                    | 1·6                                           | SZ—JV   |
| 6. Pračkov, sedlo ve hřbetě . . . . .                            | 555·0                    | 1·7                                           | S—J     |
| 7. Kozákov, nejvyšší místo . . . . .                             | 744·5                    | 2·1                                           | SZ—JV   |
| 8. Silnice u Lhoty na hřbetě jihových. odtud . . . . .           | 620·0                    | 2·6                                           | SZ—JV   |
| 9. Sedlo na silnici, jihozáp. vsi Tuhaně . . . . .               | 490·5                    | 2·9                                           | SZ—JV   |
| 10. Skuhrov, domky na výšině . . . . .                           | 590·0                    | 2·7                                           | S—J     |
| 11. Krošov, domky na výšině . . . . .                            | 665·0                    | 1·0                                           | Z—V     |
| 12. Nouzov, sedlo v silnici od Jičina k Lomnici . . . . .        | 564·7                    | 1·4                                           | SZ—JV   |
| 13. Hora Tábor, u kaply . . . . .                                | 683·0                    | 1·3                                           | Z—V     |
| 14. Ploučnice, sedlo u silnice . . . . .                         | 500·0                    | 2·9                                           | SZ—JV   |
| 15. Klepanda (hospoda), nad týmž sedlem . . . . .                | 480·0                    | 1·9                                           | Z—V     |
| 16. Kumburk, u hradu . . . . .                                   | 640·8                    | 1·4                                           | Z—V     |
| 17. Brdo (ves), nejhořejší chalupy . . . . .                     | 527·0                    | 2·8                                           | Z—V     |
| 18. Nová Paká, sedlo na silnici k Jičínu . . . . .               | 460·0                    | 5·6                                           | JJZ—SSV |

|                                                                          | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 19. Lesná hůrka u Rokytné (Vrchoviny)                                    | 510 . .                  | 2·4                                           | J—S     |
| 20. Horka, nádraží v sedle tamějším . .                                  | 518·5 . .                | 3·9                                           | ZSZ—VJV |
| 21. Hřbet, jižně Borovnice . . . . .                                     | 540·0 . .                | 4·3                                           | ZSZ—VJV |
| 22. Hůrka k jihozápadu lázní Mosteckých                                  | 545·5 . .                | 1·8                                           | S—J     |
| 23. Sedlo na silnici z Vidonic k Hoř.<br>Brusnici . . . . .              | 505·8                    | 1·9                                           | SZ—JV   |
| 24. Nejvyšší místo na silnici z Chroustova<br>do Hoř. Brusnice . . . . . | 571·0 . .                | 1·4                                           | ZSZ—VJV |
| 25. Zvíčinská hůra, spodek kaply . . .                                   | 671·4 . .                | 1·3                                           | ZSZ—VJV |
| 26. Kopec k jihovýchodu Zvíčinské hůry                                   | 588·3 . .                | 3·0                                           | SZ—JV   |
| 27. Výšina k východu Hoř. Dehtova . .                                    | 510·0 . .                | 1·1                                           | ZSZ—VJV |
| 28. Sedlo při voznici z Doubravice do<br>Bílé Třemošné . . . . .         | 441·0                    | 2·0                                           | SZ—JV   |
| 29. Největší výška silnice z Doubravice<br>do Dvora . . . . .            | 450·0 . .                | 1·7                                           | ZSZ—VJV |
| 30. Podhoří (Silverleiten), domky na hře-<br>beni . . . . .              | 431·0 . .                | 3·0                                           | ZSZ—VJV |
| 31. Nejvyšší místo na silnici z Hříbojed<br>do Žírče . . . . .           | 404·3 . .                | 2·3                                           | ZSZ—VJV |
| 32. Sedlo mezi Záloňovem a Stanovici . . . .                             | 305·0                    | 1·1                                           | ZSZ—VJV |
| 33. Výšina u Čertovy krčmy . . . . .                                     | 326·0 . .                | 2·7                                           | SZ—JV   |
| 34. Údolí Labské nad Jaroměří . . . . .                                  | 265·0                    |                                               |         |

Tato čára rozvodní má délky asi 70 kilom., výška vrcholná drží se pak mezi 500 a 600 m.; výška sedelná stává se hned s počátku znamenitou, zachovávajíc se nad to od Chloudova až k Zvíčinské hoře při 460 až 560 metrech, z čehož lze nejlépe usouditi výsehorskou povahu celého toho okrají. Neméně bude i zajímavé zjistiti, že tato vysočina v celé délce své oddělena jest od podhoří Krkonošského probhím čili úvalem, což nejlépe pozná se z následujících tří profilův, od S k J zdělaných:

|                      |        |                          |        |                    |        |
|----------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------|--------|
| Hrabačov(přim. Jiz.) | 422 m. | Hostinný . . . . .       | 360 m. | Trutnov (úd. Úpy)  | 413 m. |
| Horka (Falgendorf)   | 519 „  | Borovnička . . . . .     | 473 „  | Rokytník nový . .  | 500 „  |
| Nová Paká . . . . .  | 430 „  | Mostek (lázně) . . . . . | 530 „  | Bída ženská . . .  | 533 „  |
| Dolanky (u Jičina) . | 312 „  | Bělohrad . . . . .       | 320 „  | Žíreč (úd. Labe) . | 289 „  |

Činít tedy beze vší pochybnosti veškerá oblast, v tomto § popsaná, netoliko v geologickém, nýbrž i v orografickém vidu skutečné podhoří Krkonošův, kladouc se jakoby násep před horskou spoustu jejich a zavírajíc takto údolí, z nich vycházející, jež bez toho nesnadno jsou průchodná. Odtud také píše se taktická důležitost tohoto podkrají, odtud lze posléze i vyložiti sobě tu pravdu, že v jakýchkoli valkách, jež naši vlast jsou stihly (zejména v starých polských a pozdějších braniborských i pruských), dobře rozuměno jest povaze jeho co platné čáry obranné, kteréž také bez bitvy nikdy neopuštěno.

Přistupmež nyní k výpisu nejdůležitějších žlabův dolinných, jež jsem v následující tabulce nejprv přehledně byl sestavil.

Tabulka žlabův dolinných ve vysočinách Horecké a Zarovské.

| Jmeno žlabů :     | Odkud až kam :                                                 | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdíl<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1. Údolí Jizerské | Hrabačov, pod mostem . . .                                     | 418·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                   | Sitové (Ernsttál), pod mo-<br>stem . . . . .                   | 390·0                                       | 28·0                                       | 3·7                                            | 1:132                                     | V—Z        |
|                   | Semily . . . . .                                               | 329·5                                       | 60·5                                       | 13·5                                           | 1:221                                     | V—Z        |
|                   | Brod železný . . . . .                                         | 278·0                                       | 51·5                                       | 8·2                                            | 1:158                                     | V—Z        |
|                   | Od Hrabačova do Brodu . . .                                    | . .                                         | 140·0                                      | 25·4                                           | 1:181                                     | V—Z        |
| 2. Údolí Olešné   | Počátek u Horek . . . . .                                      | 525·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                   | Ždírec, u mlýna . . . . .                                      | 451·8                                       | 73·2                                       | 5·3                                            | 1: 72                                     | V—Z        |
|                   | Stará Paká, u nádraží . . .                                    | 406·0                                       | 45·8                                       | 2·2                                            | 1: 48                                     | S—J        |
|                   | Libštat, k severu silnice . .                                  | 362·4                                       | 43·6                                       | 10·4                                           | 1:239                                     | JV—SZ      |
|                   | Semily, stok s Jizerou . . .                                   | 329·5                                       | 32·9                                       | 9·2                                            | 1:279                                     | VJV—ZSZ    |
|                   | Od počátku až k Semilům . .                                    | . .                                         | 195·5                                      | 27·1                                           | 1:139                                     | VJV—ZSZ    |
| 3. Údolí Cidlina  | Počátek u Nouzova . . . . .                                    | 500·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                   | Cidlina, ves, u dol. mlýna . .                                 | 362·5                                       | 137·5                                      | 3·2                                            | 1: 23                                     | S—J        |
|                   | Jičín, Holínské předměstí . .                                  | 274·0                                       | 88·5                                       | 7·4                                            | 1: 83                                     | S—J        |
|                   | Od počátku do Jičína . . . .                                   | . .                                         | 226·0                                      | 10·6                                           | 1: 47                                     | S—J        |
| 4. Údolí Javorky  | Počátek u Vidochova . . . .                                    | 510·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                   | Bělá, v údolí . . . . .                                        | 350·0                                       | 160·0                                      | 5·5                                            | 1: 34                                     | S—J        |
|                   | Bělohrad, v údolí . . . . .                                    | 300·0                                       | 50·0                                       | 6·2                                            | 1:124                                     | S—J        |
|                   | Ostroměř, v údolí . . . . .                                    | 250·5                                       | 49·5                                       | 9·7                                            | 1:195                                     | S—J        |
|                   | Od počátku až do Ostroměře .                                   | . .                                         | 259·5                                      | 21·4                                           | 1: 82                                     | S—J        |
| 5. Údolí Bystřice | Počátek pod Zvíčinsk. horou .                                  | 620·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                   | Miletín, v údolí . . . . .                                     | 324·5                                       | 295·5                                      | 6·5                                            | 1: 22                                     | S—J        |
|                   | Jeřice . . . . .                                               | 271·2                                       | 53·3                                       | 10·4                                           | 1:195                                     | S—J        |
|                   | Od počátku do Jeřic . . . . .                                  | . .                                         | 348·8                                      | 16·9                                           | 1: 48                                     | S—J        |
| 6. Údolí Labské   | Vrchlabí, v jižním konci mě-<br>sta (srov. str. 55. t. d.) . . | 470·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                   | Nové Zámky u Hostinného . .                                    | 363·0                                       | 107·0                                      | 18·4                                           | 1:172                                     | SZ—JV      |
|                   | Dvůr Králové (Dol. před-<br>městí) . . . . .                   | 290·1                                       | 72·9                                       | 14·5                                           | 1:199                                     | SSZ—JJV    |
|                   | Josefov (v údolí) . . . . .                                    | 255·0                                       | 35·1                                       | 16·2                                           | 1:463                                     | SZ—JV      |
|                   | Od N. zámku až do Josefova .                                   | . .                                         | 215·0                                      | 49·1                                           | 1:229                                     | SZ—JV      |

| Jmeno žlabův:              | Odkud až kam :              | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdíl<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 7. Údolí Věči<br>Úpy . . . | Mladé Buky, u mostu . .     | 469·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                            | Trutnov, dolejší mlýn . .   | 409·0                                       | 60·0                                       | 8·6                                            | 1:142                                     | SZ—JV      |
|                            | Poříčí, ústí pot. Ličné . . | 386·0                                       | 23·0                                       | 3·5                                            | 1:152                                     | Z—V        |
|                            | Úpice, v údolí . . . . .    | 345·0                                       | 41·0                                       | 10·2                                           | 1:249                                     | SSZ—JJV    |
|                            | Skalice, v údolí . . . . .  | 268·5                                       | 76·5                                       | 16·5                                           | 1:211                                     | SSZ—JJV    |
|                            | Josefov, ústí do Labe . .   | 255·0                                       | 13·5                                       | 10·8                                           | 1:800                                     | SV—JZ      |
|                            | Z Buků do Josefova . . .    |                                             | 214·0                                      | 49·6                                           | 1:232                                     | S—J        |

Ze žlabů dolinných, jež se zde uvádějí, byla jsou údolí Jizery, Labe i Úpy v hořejším dílu svém, pokud tento v oblasti Jizerských a Krkonošských hor se nalezá, šfe vypsána i jednat se zde tedy jen o pokračování jejich; naopak sluší údolí potoka Olešné celé do kraje, tuto vylíčeného, údolí Cidliny, Javorky a Bystřice zase mají zde svůj počátek i hořejší díl, končíce ale v jižním podkrají oblasti této. Směr tří údolí, zde jmenovaných (t. j. údolí Labe a Olešné a hořejší dílec údolí Úpského) srovnává se bez mála s hlavním směrem hřbetu Krkonošského, jda od SZ k JV; naopak berou se údolí Jizery, dolejší údolí Úpy, jakož i jiné menší úvaly a žlaby této oblasti zároveň se směrem hor Krušných, tedy směrem, k prvějšímu skóro svislým, t. j. od JZ k SV. Některé žlaby však, a sice údolí Cidliny, Javorky i Bystřice, pak prostřední díl žlabu Labského i Úpského zabraly se posléze v přímý směr od S k J. S tímto směrem pak shoduje se také všudež největší spád, čímž dává se znáti novější vznik takových žlabův, kteréž nyní, jakož i ostatní, pokud se to prvé již nestalo, poněkud zevrubněji budžtež vylíčeny.

*Údolí řeky Jizery*, pokud totiž činí severozápadní hranici okrají, tnto vypsaného, jeví se v podobě velkého úvalu, od V k Z směřujícího, kterýž pojímá v sebe od S a J menší žlaby vodní, a sice nejprv od S při vsi Hrabačově údolí Malé Jizery čili Kotelské vody, přichodící, jak známo, od hory Kotle. Údolí Velké Jizery má zde již šířky asi 500 metrů a žlab jeho nalezá se pod mostem Hrabačovským ještě ve výši 418 m. Stráně, jinak dosti příkré, provázejí je s obou stran až k Brodu železnému, majíce nad žlabem jeho 50—100 metrů poměrné výše a náležíce jak na severním, tak na jižním břehu k útvaru dyadickému či permskému (Srov. str. 59 t. d.). Spád na této trati až k Sitovému (Ernsttál) má se jako 1:132. Ostatní dílec údolí Jizerského níže Sitového popsán jest již na str. 21. a 22. t. d. Zde budiž jen ještě připomenuto, že žlab Jizery, pokud po hranicích této ohlasti se beře, t. j. od Hrabačova až k Brodu, drží střední spád 1:181 a že rozvoj jeho činí 1:43.

*Údolí potoka Olešné* zůstává celé v oblasti Horecké. Údolí toto má počátek svůj na rozvodí k SV nádraží Horeckého v lukách, jež prostírají se po ná-



horní rovině mezi Horkami a Studencem, a sice ve výši 525·0 metrů. Žlab, jehož tekuté vody i hned rozmnožují se ručeji, od Hůrky a hory Císařovy přichodícími, jme se bez odchylky vcházeti do směru západního, je s počátku těsný, rovný a struhovitý, po levém břehu až ke Ždírci od strání hory Císařovy a Levinské, níže od hor Babky a Jivy po pravém břehu provázený, načež u vsi Bělé něco se rozvírá, aby pak v dolejší dílci mezi Libštem a Semily rozstoupil se do šířky 200—300 metrů, jakkoli i zde na několika místech se sužuje. Od dolejšího mlýna Roškopovského přidržuje se žlab Olešné již směru od JV k SZ. Největší spád jeví se mezi Ždírcem a nádražím Staropackým, t. j. 1 : 48, načež ho rychle ubývá. U Semil spojuje se se žlabem řeky Jizery (329·5 m.). Rozvití údolí Olešenského, jinak zcela v písčovitých a slepencích útvaru dyadického běžícího, činí 1·46, střední spád má se jako 1 : 139. Předním komunikačním prostředkem je v tomto údolí trať železnice Pardubicko-Liberecké; jinak spatříš tu jen voznice, za špatného počasí těžko sjízdné; neboť pořádné silnice mezi většími osadami zdejšími jdou horem přes roviny.

*Údolí Cidlina* počíná se u Nouzova pod sedlem, po kterémž vede silnice z Jičína do Lomnice, a sice asi ve výši 500 metrů. V těsném žlabu ubírá se potok spádem 1 : 23 mezi vrchem Krošovským a Tábořem k jihu, kteréhož směru přidržuje se i dále, vchází zejména u vsi Cidlina (362·5 m.) do kraje rovnějšího. Jinak zůstává údolí těsné až po Železnici, teprv odtud k Jičínu rozstupuje se na 300—400 metrů, jakkoli potok neumaluje valně spádu svého (1 : 83). A však již u Jičína opouští Cidlina kraj, tuto vypsáný, a sice ve výši prosté 274·0 metrů, dosáhnoucí v něm toliko skrovného rozvoje, t. j. 1·21. Podobně má údolí Cidlina v této části jen jedinou silnici, zejména od Nouzova až ke vsi Cidlině (od Lomnice přichodící), kteráž něco výše spojuje se se silnicí k Jičínu.

*Údolí Javorky* počíná se ve výši 510 metrů v lesích, jež rozkládají se na J nádraží Horeckého i běže se nejprv pod jmenem Zlatého potoka od dolejšího mlýna Vidochovského k Stupnému a k Bělé, kdež sesiluje se vodami, od SV, a sice od Pecky přichodícími. Údolí toto, jsouc s počátku mělké, u Stupného pak příkrými straněmi sevřené, rozšiřuje se níže Stupného na 300—400 metrů, majíc až sem spád v poměru 1 : 34. Týmž časem vchází údolí do slůvků opukových útvaru křídového. Jsouc tu nejprv na trati mezi Bělou a Uhlířmi těsné, rozstupuje se potom směrem jižním čím dál tím více, any straně poboční rovnou měrou od něho se vzdalují, načež u Bělohradu nastává prostranná kotlina, nad 1 kilometr široká a 2½ kilom. dlouhá, držící několik rybníkův. Při dolejší kraji této kotliny, zejména u Lhoty Šarovcovy, učinil sobě potok průchod mezi chlupy Mlazovickým a Hořickým, jež před dolinu Bělohradskou k J na přič se kladou, a běže se tudíž těsným, lesným dolem, kterýmž i železnice nahoru k Bělohradu vystupuje. Vyšed z této prorvy, podchází žlab u Ostroměře silnici mezi Hořicí a Jičínem, jež jest jako by jižní mezí oblasti Horecké. Spád údolí Javorky mezi Bělou a Bělohradem má se jako 1 : 124, odtud k Ostroměři jako 1 : 195, středním vývodem tedy od Vidochova až do Ostroměře jako 1 : 82. Rozvití jeho činí 1·35.

*Údolí Bystrice* vzniká v jižním svahu hory Zvíčinské asi ve výši 620 m. a sice v podobě těsného žlabu, jenž počíná při dolejších chalupách vsi Zvíčiny a jižním směrem na ves Borek k Miletnu se běže. Tento nejhořejší díl jeho je

po obou bocích příkrými straněmi sevřen, máje při tom silný střední spád 1 : 225. U Miletína rozstupuje se údolí na 300—400 m., při čemž i spádu značně ubývá. A však i vody Bystřice jmou se níže odtud na podobu potoka Javorky obracet se obloukem k Z, setkavše se totiž se hřbetem chlumu Vřeštovského, načež sobě mezi ním a Hořickým chlumem prolamují cestu způsobem hluboké a těsné (ale kratší) rokle, kteráž má tentýž vzhled, jako Mezihořská (potoka Javorky). Směr údolí přechází ale potom k JV, opouštěje u vsi Jeřic (271 m.) půdu oblasti této. V údolí Bystřice, pokud do kraje tuto popsaneého náleží, berouc se tu s počátku až do Úhlejeva v břidlicích prahorních, níže pak v slínech opukových, není ostatně žádná cesta úpravnější, neboť silnice zdejší vedou vesměs stranou. Střední spád žlabu je 1 : 48, rozvítí 1:44.

*Údolí Labské*, jehož hořejší díl, od pramenův totiž až do Vrchlabí (470 m.), vypsán jest již na str. 59. a 64 t. d., běže se na přič celým tímto krajem, dělic jej zejména na vysočinu Horeckou a Zarovskou. Kromě dvou krátkých dílcův, u Harty totiž a Debrného, drží se směr žlabu Labského, jenž od Vrchlabí až k Debrnému v rudých pískovcích, odtud pak v opukách útvaru křídového, níže Dvora konečně ve vlastních náplavech uložen se spatřuje, — napořád čáry od SZ k JV, nalezá se tedy ve shodě s hlavní osou zdvižení Krkonošův. Toliko mezi Vrchlabím a Brannou dolejší, pak mezi Hostinným a Dol. Nemaňovem mění se směr tento v severojižní. Žlab údolí má mezi Vrchlabím a Brannou šířku 600—700 m., jsa provázen po obou březích rovnými a příkrými, a však jen 40—50 m. poměrně vysokými straněmi. Od Kunčic (Pelsdorf) až k Hostinnému sužuje se údolí na 200—300 metrů, povaha straní však se nemění. Pod Hostinným zahýbá se žlab pod tupým uhlím k J, rozstupuje se pak odtud až k Novým Zámkům (363 metrů) zase na 500 m. šíře. Na celé té trati činí spád 1 : 172. U Nových Zámkův vchází od V jak silnice Trutnovská, tak dráha rakouská severozápadní do úvalu toho i běží v žlabu jeho nahoru k Vrchlabí. V těch místech mění však údolí dosavadní povahu svou; neboť řeka klesá tu sobě cestu na délku 7—8 kilom. vysočinou Horeckou a Zarovskou. Žlab sužuje se do té míry, že místy zbývá sotva průchodu proudům řeky, tím méně pak cestě nějaké. Stráně, přibližující se zde k sobě na málo metrů, jsou 100 až 150 metrů vysoké, skalisté a větším dílem lesem porostlé. Spád až ke Dvoru Králové má se jako 1 : 199. A však již nade Dvorem (u Verdeka) rozvírá se údolí zase, širíc se níže odtud až k Žírci do 1·5 až 2 kilom. Jižní hranici činí zde stěny hory Zvíčinské, severovýchodní kraj jeho pak zavírá se straněmi Království, což na hořejším obrazci dobře lze rozeznati. Pod Žírcem ouží se žlab poznovu a sice na délku 3·5 kilom., prodíraje se kvadrovými pískovci okolo Kuksu. U Heřmanic nastává však zase rozšíření, jež potom není již více přetrženo, načež řeka u Josefova (255 m.) opouští oblast naši. I v této trati Labské jsou dobré silnice a na jižním konci jejím i železnice. Jako mezi Vrchlabím a Novými zámky, tak setkáš se i mezi Dvorem a Josefovem s četnými osadami, jichž domy téměř bez přetržky k sobě se připojují. Střední spád žlabu Labského od Vrchlabí až do Josefova jest 1 : 229, rozvítí jeho pak 1:33, tedy neveliké.

*Údolí Váž. Úpy*, pokud sem náleží, prostírajíc se mezi Mladými Buky a Pohřčím, bylo již na str. 65 až 67 t. d. vylíčeno. Zde třeba ještě doložiti, že žlab níže Buků (469 m.) vyznamenává se vůbec značnou šířkou 400—500 m., kteráž

u Poříčí (386 m.) je ještě větší, že směr jeho níže Trutnova (400 metrů) pod pravým uhem se odchyluje a že spád mezi Buky a Poříčím drží se celkem poměru 1 : 147. Podobně co levý břeh, je i pravý příkrými straněmi lemován, jakkoli hořejší kraj těchto straní, ač vyjme-li se z toho vrch sv. Václava u Trutnova, stojí zřídka výše nad žlabem údolí, než 40—50 m. U Poříčí zahýbá se údolí Úpy zase pod pravým uhem, vcházejíc do směru žlabu potoka Ličného, od S přichodícího, kteréhož se také s některými uchylkami až do Skalice přidržuje. Mezi tím libuje si ale žlab v početných ohbech a přílukách, jsa při tom s vyjmutím tří poloh příkrými a skalistými straněmi, jichž hořejší kraj do 50—100 m. nad něj se vypíná, provázen a soužen, odkudž málo kde zbývá v něm místa voznicím. Toliko u Oupice, Havlovic a Skalice rozstupuje se dno údolí na 200 až 400 m., tak že domy několika osad v něm mohou se rozložit. Jinde shledávají se chalupy a dvorce větším dílem buď v poloviční výši straně buď teprv nahoře na výšinách. V té samé příčině nenajdeš také v údolí úpravnějších silnic nebo železnic, kteréž se tudíž buď ve straních a na svazích drží, jako železná dráha z Poříčí do Josefova na trati mezi Poříčím a Suchovršíci (Saugwitz), buď rovnoběžně s údolím, a však v značné vzdálenosti od něho po náhorních rovinách nebo jinými úvaly se berou, jako ostatní trať oné železnice, jež u Svatoňovic do údolí potoka Olešnice zabočuje, a neméně i silnice od Skalice k Trutnovu a od Skalice (na Svatoňovice) k Poříčí — a nebo konečně toliko příčným směrem údolí se dotýkají, jako u Bohousnice, Úpice a Žernov. Žlab Úpský činí ostatně v této trati netoliko orografickou, nýbrž i větším dílem také geologickou hranici oblastí, tuto líčené. Neboť k východní straně jeho objevují se již všude pískovce a slíny útvaru křídového; a rozkládá-li se tento útvar níže Havlovic také i po pravé (západní) straně údolí, tož vymlela sobě řeka i na této straně všudež žlab svůj skrze vrstvy útvaru křídového a běží i tu v rudých pískovcích. Nadmořská výška žlabu jeví se u Oupice v 345 m., u Skalice v 268·5 m. a spád činí od Poříčí k Oupici 1 : 249, odtud ke Skalici 1 : 211. Níže Skalice běže žlab Úpy zcela rozličnou povahu na sebe: neboť vchází z hor do hořejší české nížiny, uhýbá se k JZ a rozšiřuje se tímž časem na 1 až 1·5 kilom. Straně ustupují do povzdálí a snižujíce i vyrovnávajíce se, zanikají u Josefova skoro na dobro; spád klesá na poměr 1 : 800 a řeka běže se již od Skalice do Josefova ve vlastních náplavech a roztekši se do několika hrdel, ústí se mezi Jaroměří a Josefovem (255 m.) do Labe. Střední spád žlabu od Mladých Bukův až do Josefova má se jako 1 : 232 a rozvoj jeho činí 1·70, je tedy neobyčejně velký.

Co se tkne *rostlinstva* oblastí, zde vypsané, jsou zajisté 25 až 30% půdy, z pravidla pak příkřejší straně údolí, ojediné vrchy a vrcholky, na rovinách náhorních pak písčité, a tudíž méně úrodné polohy porostly lesem, jenž skládá se větším dílem se smrků, dílem i z borovic. V teplejších a hlubších polohách vyskytují se jinak také duby, buky a jiné stromy lupenaté. Souvislý újezd lesní činí, jak již vzpomenuto, hvozd „Království“, pokrývá skoro celou jižní polovici vysočiny Zarovské. Z ostatních 70% půdy připadá asi 60% na půdu rolní a 10% na luka i pastviny. Pšenice vysívá se po řídku, a to jen v příhodných polohách, žito i ovy jsou naopak obecné i daří se jim velmi dobře. Kromě toho rostí se hojně brambory a jetely.

*Rozloha půdy v rozličné výši nadmořské má se takto :*

|                                                            |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Veškeré prostranství vnitř vytknutého omezení . . . . . | 127.728 | hektar. |
| 2. Prostranství nad vrstevnicí 300 metrů . . . . .         | 120.528 | "       |
| 3. " " " 400 " . . . . .                                   | 75.600  | "       |
| 4. " " " 500 " . . . . .                                   | 20.016  | "       |
| 5. " " " 600 " . . . . .                                   | 744     | "       |

*Z toho jde v příčině rozlohy půdy po patrech výše následující stupnice :*

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Ve výši nadmořské 200 až 300 metrů leží 7.200 hekt. č. 5·6 ze sta vsí půdy |  |
| 2. " " " 300 " 400 " " 44.928 " " 35·2 " " " "                                |  |
| 3. " " " 400 " 500 " " 55.584 " " 43·5 " " " "                                |  |
| 4. " " " 500 " 600 " " 19.272 " " 15·1 " " " "                                |  |
| 5. " " " 600 " 700 " " 744 " " 0·6 " " " "                                    |  |

Účinkem čísel, právě uvedených, obnáší všechna spousta půdy, pokud nad nejspodnější vrstvou 200 metrů se zdvíhá, dle formule naší 282·48 krychl. kilom. Délí-li se tento obnos základní plochou 1277·3 čtver. kilometrů, vznikne vyvýšení půdy 0·221 kilometrů čili 221 metrů. Přičte-li se nadmořská výška nejspodnější vrstvy 200 metrů, vznikne číslo 421 metrů co *střední výše nadmořská* celé tuto vypsané oblasti.

## §. 7. Východní podhoří Krkonošů: Hřbet Svatoňovický, stěny Teplické a Polické a pánev Broumovská.

Nelzet mně ovšem pomýšleti na to, abych pod hořejším pojmenováním jal se tuto popisovati všechno východní podhoří Krkonošů; musil bych zajisté jinak daleko vystoupiti z mezí úkolu svého, kterýž při hranicích českých přestává a vypsati s velkou částí i ony hory, jež v sousedním Kladsku a Pruském Slezsku se rozkládají. Zatím chci přece býti pamětliv (pokud totiž rozum věci toho vyžaduje), abych přihlížel také k orografickým hranicím kraje, jež tuto ještě vyliční. S některou nesnází bude ale vždy provésti takový úmysl, a sice v té příčině, že v této končině Čech hranice politická nadržuje se nikterak přírodních mezí orografických, ba na přím jimi vedena jest a opíraje se o starodávní práva historická, celý újezd Broumovský zemi české vlastní, jenž druhdy teprv pospolu s Kladskem činil jakýsi přírodní a politický celek.

Hranici západní oblasti tuto líčené činí onen úval, jenž s obecným směrem od S k J běží od hranice zemské u Königshanu na Bernartice k Poříčí (údolí potoka Ličné), odtud pak na Úpici k České Skalici (údolí řeky Úpy). Odtud myslím sobě jižní hranici této oblasti položenou podél silnice, kteráž na Kleny údolím potoka Šonovského dále vede až k městečku Krčínu při řece Metuji, jejíhož koryta hranice dále nahoru až ke vsi Slanému (nad Náchodem) se přidržuje, kdež s hranicí zemskou se potkává, jež potom k SV, SZ a S činí ostatní čáru obvodní této oblasti. Takovým způsobem byl by tento kraj určitě omezen, pokud totiž při konci tohoto §. střední výšku jeho nadmořskou náleželo vyčísliti. K účelům líčení orografického

budiž ale pro lepší rozum věci šetřeno věcí volnosti a z mezí zemských častěji vystupováno.

Na východní straně jsou zajisté Krkonoše obklíčeny půdou, bohatě a pestře rozčleněnou, jež činí se zároveň prostřednicí spojení jejich s moravsko-slezskými Sudety. K východním rozsochám Krkonošů přiléhá zejména přímo ostrý, od S k J prostřený hřeben, sedlem Königshanským toliko od nich odloučený, jemuž mapy rakouské dávají jmeno *Vraních hor* (Raaben-Gebirge), ano v pruských mapách znamená se jmenem *Überschaargebirge*, jež není asi nic jiného, než nové, lidu ještě méně obvyklé pojmenování, povstalé nejspíše z poměrů práva horního tamějších vlastníků dolož uhelných. Hřbet tento počíná se na jih Líbova (495 m.), a sice horou Kočnou (Gutschenberg, 853 m.) a vypnův se v pravidelné, co do pohledu velkolepé kupě Špičáku (874 m.) do největší výše, sklání se pak nad (pruským) Albandorfem do údolí potoka Sklenařického (Glaserwasser, k Úpě). Stráně tohoto hřbetu jsou k Z strmé a lesem zarostlé, k V však povlovněji svážené a skládají se, jako celý hřbet, z jistého druhu porfyru, kterýž k žule i dioritu se přibližuje a s nímž v této krajině často lze se potkat. V severním a západním úpatí Vraních hor běží železnice, jakož i ostatní silnice od Trutnova k Líbovu; podobně obcházejí východní a jihovýchodní sklony jeho dobré silnice. Přes hřbet samý vede pak ještě cesta od Königshanu dolem pod Špičákem ke vsi Blažejovu (Blassdorf) u slezského Šumperka.

Od Vraních hor odštěpují se tři, dobře znatelné vypnuliny půdy; jedna z nich táhne k JJV (hřbet Svatoňovický), druhá k JV (stěny Aberšpašské či Teplické a Polické), třetí pak k V (hory Heidlovy = Heidelgebirge). Prostředkem čtvrté, k SV jdoucí vypnuliny půdy připojují se Vraní hory k vrchovině Valdenburské (v Slezích) a skrze ni zase k Horám Sovím, jež ale obě leží již docela mimo Čechy. Co určité tvary orografické jeví se vnitř Čech hřbet Svatoňovický, stěny Teplické a Polické, pak mezi těmito stěnami a horami Heidlovými položená pánev Brumovská, jež jmu se ihned klíčí v následujících řádcích.

*Hřbet Svatoňovický*, jinak též *Žaltmanský*, vyvstávající na JV hor Vraních, jeví se sice od nich úvalem Poříčko-Valberčickým v orografickém smyslu býti odloučen, má však s nimi geologické spojení v té příčině, že jižní úpatí hor Vraních u Olešné (Goldenöls) a Lhoty (Welhota) složeno jest z rudých pískovců, jež věčím dílem také vytvářejí hřbet Svatoňovický. Hřbet tento přidržuje se v ostatním zdvižení svém hlavního směru od SZ k JV a prostírá se přímou čarou a délkou 17 kilom. od Petrovic (u Poříčí) až k Ilronovu nad řekou Metují, nabývá při tom šířky 3 až 5 kilometrů. Hřbet Svatoňovický vyvstává na V přímo z údolí Úpského (středním vývodem 300 m. nad mořem jsoucího), a sice v podobě strmých, mnohonásobně vymletých strání, 50 až 100 m. poměrně vysokých, načež na podlaze, 400 až 420 m. prostě vyvýšené, zdvihaají se povlovně vlny půdy zšíří 1 až 2 kilom. do prosté výše 450 až 480 metrů. Nad touto plasou klene se příkře vlastní hřbet Svatoňovický se sklonem 20 až 30 stupňů, jsa při tom skoro celý lesem zarostlý a středním vývodem asi 600 až 650 m. vysoký. Na východní straně jeho jsou podobné poměry, toliko že úval, z něhož hřbet prostředkem plasy vyvstává, t. j. údolí Vernířovické a Starkovské, leží o 100 m. výše nad mořem, než údolí Úpy. Nahoře na rovném temeni spatřují se četné tvary skalní, jako na poloze, „na pustínách“ řečené (u vsi Slatiny, 710 m.), u Pasek (Brennten, 648 m.), pak u Rad-

vanic (Žaltman, jinak Hexenstein, 721 m.), všecky v hořejší či severní polovici hřebetu toho. V jižním dílu jeho najdou se naopak na temeni jen ploché vrcholy, jako Holcárka u Menších Svatoňovic (688 m.), Poledník u Vodolova (680 m.), Turov u Rokytníka (599 m.) a j. Na severozápadním i jihovýchodním konci zahýbá se hřbet Svatoňovický skoro pod pravým úhlem, odkudž nabývá onde podoby krátkého, skalistého a na všecky strany srázně sváženého hřebene, jemuž Kozí hůra říká (u Lhoty, 602 m.), tuto pak více krátkého a plochého žebra, jehož nejvyšší místo je vzpomenutý již vrch Turov. Napověděli jsme již, že hřbet Svatoňovický v příčině geologické souvisí s jižním úpatím hor Vramích, což vyšší ještě měrou platí o sousedních náhorních rovinách Zarovských, jež hned k Z údolí Úpského se prostírají a s nimiž hřbet Svatoňovický v severním dílu skrze rudé pískovce, v jižním pak skrze opuky a pískovce útvaru křídového, jež se zde až pod vlastní hřbet kladou, požívá přímého spojení. Hřbet Svatoňovický sluší však i se stráněmi svými k rudým pískovcům, jež tuto útvar kamenouhelný pokrývají, nabývše od nepočtených zkamenělých stromů, v nich uložených, daleké pověsti. Zvláště hojně napadají se úlomky takových kmenů, jež k rodu araukarií náleží (jehličnaté, mohutné stromy, na jižní polokouli posud se vyskytující) na cestě, ode vsi Radvanic k Pasece (Brennten) nahoru vedoucí, odkudž také Göppert tuto končinu nazval „skamenělým lesem.“ Na jihozápadním svahu hřebetu je rudý pískovec do dvou pruhův rozštěpen a mezi nimi vystupuje na povrch dlouhý, se hřbetem rovnoběžný couk pískovce kamenouhelného, pod nímž vychází na den mocný plást kamenného uhlí, na něž tu v mnohých místech, hlavně pak u Menších Svatoňovic (410 m.) se doluje. Tento plást je ostatně jen jižním výběžkem rozlehlé kamenouhelné pánve, kteráž v Čechách i Slezích mezi Zacléřem a Valdenburkem se rozkládá, jsouc všudež hojně těžena. Podél jihozápadního svahu celého hřebetu Svatoňovického běží železnice od Josefova na Svatoňovice a Poříčí k Lbovu i Trutnovu, na severovýchodním svahu pak vede okresní silnice od Petrovic na Radvanice do Jivky, odtud pak přes nízký, v hlavním hřebetě hluboko zarytý klanec na Vodolov do Rtně a Úpice až dolů do údolí Úpského.

Z jižního konce hřebetu Svatoňovického, a sice mezi touto vsí a Kostelcem, vychází široký hřbet horský, klada se 6 kilom. šíře a 16 kilom. délky mezi údolí Úpy a Metuje, jenž ale k jihu napořád se sužuje a teprv u Nového města nad Metují přestává. Držít zajisté tento hřbet, jež po vsi Rybníku, v prostředku jeho položené, lze *Rybnickým* nazvati, 400 až 450 m. střední výše a vrcholy, na něm postavené, dosahují do 500 m. a výše, jako Bordišův kopec u Kostelce (529 m.) a Zábrodská hůra (502 m.), any ostatní kupy, jako poloha na „Vrchách“ u Pavlišova (449 m.), jsou již něco nižší. S nemalou důležitostí jest tento hřbet ve vzhledě strategickém a taktickém, zavíraje příchod do Čech se strany Kladské. Silnice, jež od Vratislavě a Svídnice, od Frankšteina a Kladska do Čech vedou, spojují se totiž všecky na V tohoto hřebetu v údolí Metuje nad Náchodem, načež berou se společnou silnicí na Z Náchoda přes nejnižší dílec tohoto hřebetu, t. j. přes mělké *sedlo Vysokovské* v 407 m. výše nadmořské, odkudž do údolí Úpy k Josefovu a Hradci se spouštějí. Sklon do údolí Úpského je bez výminky příkrý, průchod těžký a obtížný a obrana jeho tudíž snadná. Nedaleko Vysokova leží vesnice Václavice (400 m.), u kteréž r. 1866 přihodila se krutá šarvátka. Přes totéž sedlo Vysokovské vedena jest také trať státní dráhy, z Chocně na Týniště a Opočno do údolí

Metuje u Krčína nahoru postupující, kteráž u Starkoče spojena jest krátkou příčnou kolejí s drahou Pardubicko-Libereckou.

*Pískovcové stěny Abršpašské (Teplické) a Polické* připojují se přímo ke hřbetu Svatoňovickému. V příčině geologické činí tyto hory osamotnělou pánev útvaru křídového, kteráž prostředkem širokého pásu útvaru dyadického od jižní a jihovýchodní rozsáhlé oblasti onoho útvaru jest odtržena a odloučena. Také na východním kraji mezují tato pánev s rudým pískovcem, přiléhajíc k JV naopak přímo k prahorním hřbetům hor Kladských čili Orlických. Po míře omezení svého má tedy tato pánev, pokud v Čechách se nalézá, podobu elipsy 23 kilom. dlouhé a 10 kilom. široké, s kraji do výše vytaženými. Kraje tyto skládají se z nejspodnějšího patra útvaru křídového, zejména ze spodní opuky a spodního pískovce kvádrového, an všechen ostatní vnitřek pánve vyplněn jest vrstvami prostřední opuky a prostředních pískovců (tak zv. Jizerských). Nad to jsou kraje této pánve vyzdviženy a prohnuty, vcházejíce tudíž do podoby hřbetův, vnitřek ale věcíím dílem rovně uložen. Opuková prostranství jsou skoro všudež vlnitě rozčereňna; jen na těch místech, kde spatřují se podnes zbytkové pískovcův kvadrových, běže půda na sebe zvláštní podobu, poněvadž pískovec ten zvětrání a vymýlní málo se protivuje a tudíž snadno pohled strmých, rozpadlých a vybrázděných stěn a skal na sebe přijímá. Vzpomínám-li tuto hned s počátku geologických poměrův této oblasti, tož činím to v té příčině, že nesnadno jest nalézt v Čechách krajiny, kteráž by od složení geologického, tuto pak zvláště jen od rozličných pater téhož útvaru, nabývala povahy do té míry osobité, jako se to zejména zde děje, kdež z pouhého člena útvaru ihned o vnější podobě kraje a naopak bez omylu lze souditi. V celém tomto horském kraji dají se nejpřihodnější tyto vysočiny rozeznávati: hřbet Chvalečský, hřbet hory Bukové, vrch Čáp se stěnami Abršpašskými a Teplickými, vrch Ostaš, pak hory Hejšovinské, z nichž toliko severní polovice ještě v Čechách se nalézá.

*Hřbet Chvalečský* zavírá tento kraj k SZ a Z. Počíná se na slezské půdě mezi Šumperkem a Libnou (Liebenau) v podobě slabě sklenutého hřbetu, jenž nad vůkolní, nemálo již vysoký kraj (Šumperk 500 m.) s čarou hřebennou 640 m. se vypíná, máje nahoře již několik vyšších vrcholů, jako na př. Zelenou horu u Libné (704 m.) Tento hřbet, přes nějž u Libné také vede silnice z Šumperka do Zdoňova (Merkelsdorf), přechází u Hořejšího Abršpachu z dosavadního směru svého (SV—JZ) do směru od S k J, snižuje se potom něco až do 636 m. v podobě mělkého sedla, přes nějž položena jest dobrá okresní silnice od Trutnova do Abršpachu a Teplic, načež ihned v podobě příkré stěny v dlouhý a úzký skalní hřeben se proměňuje, jenž zůstává v dosavadním směru, „na Závoři“ (Riegel) se nazývá a v Krupné hoře (Kraupenberg, 704 m.) u Chvalče největší výše dostupuje. U vsi Radvanic, o níž nahoře již zmínka se stala, poníží se hřbet zase v podobě sedla až do 593 m., vyvstává však nad ním v kupu, 690 m. vysokou, již Radeč (Ratschberg) říká a kterouž hřbet sám také konce svého dochází. Pískovec tohoto hřbetu patří k spodnějšímu patru útvaru křídového.

Téhož složení je také hřbet hory *Bukové* (Buchberg), jenž přiléhá přímo ku hřbetu Chvalečskému na severním konci téhož u Libné, toliko údolím Zdoňovským od něho oddělen jest a ukazuje toliko slabé sklony a nízké stráně, uzavírá


k SV končinu Abršpašskou a Polickou. Konec jeho nalezá se u vsi Hutberka na silnici z Police do Broumova a nejvyšší vrchol jeho (732 m.) zove se též Buková.

Všechn vnitřní prostor krajiny Abršpašské a Polické, počnouc od hřbetu Chvalečského až k Hejšovině, skládá se z prostředního patra útvaru křídového, t. j. z prostřední opuky, kteráž buď je nažloutlá (šedožlutá) a písčitá, nebo namodralá (sivá) a hlinitá i vápnitá a jejížto vrstvy jeví se v mocnosti 60—100 m. Krajinový tvar její má podobu vlnitých náhorních rovin slabých sklonův a výšky nadmořské 450—550 m., kteráž ale při kraji až do 600 m. se usiluje a do vnitřka pánve umaluje.

Na této podlaze opukové spatřují se tři velké, avšak osamotnělé vyvýšeniny půdy, kteréž na podobu ostrovův nad ní vynikají, dávajíce kraji tomu osobitý jeho tvar. Všecky tři skládají se z prostředního kvádrovce, jemuž Krejčí dal jmeno pískovce Jizerského. Pískovec tento, jenž je buď hrubozrný, buď prostředního zrna, jeví rozličnou pevnost, pokud totiž místně od hlinitého tmelu značnou hutností se vyznamenává, jinde zase od nedůstatku téhož spojiva v drobný písek se rozpadává. K tomu přistupuje ještě ta okolnost, že týž pískovec skrze svislé trhliny a rozsedliny (vzniklé mezi tuhnutím a stahováním se hmoty jeho), jež vodorovné sloje jeho pod pravým úhlem protínají, průchodem času v nepočetné balvany a kusy se roztoupil, jež toliko od pospolitosti podlahy v poloze své se drží; sloje tyto a rozsedliny byly pak tisíciletým účinkem mrazův a vod do té míry vymlety a rozšřeny, že pozůstalé kamení přijalo na sebe nejpodivnější tvary. Také to je něco neobyčejného, že ve všech řečených vyvýšeninách vymletí a oboření původních tvarův nejsilněji postoupilo na severovýchodní straně jejich. Jsoutě pak tyto vypnuliny: skály Abršpašské a Teplické, vrch Ostaš a hory Hejšovinské.

*Skály Abršpašské a Teplické* pokrývají prostranství, jež má podobu elipsy 6.5 kilom. dlouhé a 3.8 kilom. široké (větší osa směřuje od SZ k JV), a drží tedy plochy asi 20 □kilom. čili  $\frac{1}{2}$  čtv. mil. Okres skal těchto prostírá se mezi osadami Hořejším Abršpachem (514 m.) na severu, Buchwaldsdorfem (490 m.) a dolejšími Teplicemi (470 m.) na východě, Studnicí (Dreiborn, 520 m.) na jihu a Janovici (Johnsdorf, 560 m.) na západě. Z výšky těchto míst shledává se, že podlaha skal Aberšpašských, kterouž činí střední opuka, nalezá se v prosté výši 400 m., jsouc při tom od Z k V něco nakloněna. Tato spousta skalní měla v původní, neporušené podobě své nejspíše pohled náhorní roviny s plochou rozvlněnou, jejíž střední výše nadmořská dá se nyní z nejvyšších poloh jejích, — kteréž jsou: vrch Čáp na JZ (758 m.) Starozámecký vrch (Althausberg, 675 m.) na SZ a Holský vrch (Holsterberg, 665 m.) na S, — výpočtem určiti asi na 708 m., odkudž nynější mocnost těchto skal lze při nejmenším páčiti na 200 m. čili 633 vřd. střeveců. Potok Metuje, od Raspenavy slezské směrem od S k J příchodící, nabíhá u Zdoňova na východní kraj této rozsáhlé elipsy skalní, i obchází celý východní díl obvodu jejího, vymlel sobě tu průchodem časův hlubokou a dosti širokou strouhu, kteráž odtoku vod z těchto skal, jakož i vzniklé mezi nimi osnově roklí a dolův vyměřila určitou cestu, pokud totiž žlaby vodní z největšího dílu tohoto prostranství, podobně jako ono samo, k údolí Metuje se svažují, posylajíce do ní vody své. Do vnitř tohoto bludiště skalního lze nejzpůsobněji dvěma směry se dostat, a sice od dolejšího Aberšpachu, pak od hamru u Dol. Teplic;






Pohled na skály Abryspské od severu nad zámkem.

od prvéjšiho místa pozná se severozápadní, od druhého jihovýchodní díl jeho. Z Aberšpachu lze již z povzdálí přehlédnouti památné tyto tvary skalní, jež rozpadají se do nesčíslných sloupů, turní, trosek, klepů a srázných stěn podoby nejrozmanitější, na kterýchž netoliko vrstevné uložení kamene při usazování se z moře, nýbrž i svislé směry přirozených trhlin a rozsedlin jeho, jež v něm nejprv rovnoběžné k sobě stěny způsobily, dobře lze pozorovati.

V připojeném výkresu pokusil jsem se, s hlediště svého na výšinách nad zámečkem Aberšpašským, odkudž tvary tyto nejlépe lze přehlédnouti, podati obraz jejich. V popředí v pravo spatřiti lze zámek Abršpašský s vízkou jeho, pak domky této vsi při silnici, při konci jejich pak na levé straně obrazu, a sice také v popředí, hostinec tamější (505 m.), kdež chovají se klíče od vchodu do skalného města toho a kdež i průvodčích lze se doptati. Těsný přístup ke skalám nalezá se v prostředku obrazu něco v levo, a sice na konci stromořadí v údolí (kdež také pěknou ozvěnu lze vyslechnouti), načež vstupuje se nejprve do několika dlouhých roklí čili dolů, jež brzo se sužují, brzo zase šíří, majíce vždy po boku svislé stěny skalní. Stěny tyto zachovávají 100 až 140 m. poměrné výše a směru od SZ k JV, jenž napořád se křížuje se směrem od JZ k SV. V jedné z těchto roklí nalezá se bohatý pramen, jemuž Stříbrný pramen říkají (teplota jeho v létě činí 5.2—5.6 Cel. v nadm. výši 501 m.), v jiné rokli zase, kteráž má jméno Vlčího dolu (533 m.) spatřuje se dosti prostranné pleso, přes kteréž pocestní po loďce se přepravují. Doly, k SZ směřující, vedou k ssutinám hrádku, Starý zámek (Althaus) řečeného, jež nalezají se na vrchu soujmeném (675 m.), doly jižní a jihozápadní jsou naopak větším dílem neschůdné, zdvihajíce se vesměs ke skalnímu hřebeni vrchu Liščího (Fachsberg, průřezem 680 m.), jenž skály pískovcové k JZ zavírá, spadaje při tom srážně ke vsi Janovicům. Hlavní důl, k JV jdoucí a také Vlčím dolem nazývaný, kterážto jméno se v této skalní končině ještě několikrát opakuje, způsobuje spojení mezi ní a jihovýchodním dílem jejím, t. j. se *skalami Teplickými*. Do těch vchází se obyčejně od hospody u hamru (471 m.) v dol. Teplicích. Doly zdejší přidržují se bez výminky směru od SV k JZ a některé z nich rozstupují se do podoby kotlin, zavírajíce se pak ihned zase v těsné soutky a rozsedliny, jak se příklad toho v přiloženém obraze skal Teplických spatřuje. V levo viděti zde vysokou, svobodně stojící klep, kteréž „Varta“ (Wartthurm) se říká a na níž pravé tvary pískovcův kvadrových lze studovati. Stezka, touto roklí běžící, vede mimo salaš (611 m.), v pozadí obrazu viditelnou, k velkému klenutému prostranství „chrámovému“ (Domplatz), dále pak skrze těsnou rozsedlinu, které také „Vlčí důl“ říkají, po schodech ve skále vytesaných, nahoru na hořejší plasu skal Teplických při jižním kraji jejich, kdež z nich ven se vychází, což děje se po horské louce, k SZ povolně vystávající, na kteréž leží chalupy vesnice Záboří ve výši 658 m. K Z a JV zavírají však stěny Teplické krajinu v podobě zdi, velkým obloukem se vytáčející, jakkoli nemají tu věcí výše poměrné, než 50 až 60 m. nad rovinou. K JV zase zdvihá se veškeré prostranství k okrouhlému a ojedinenému vrchu, jenž na vrcholu několika klepy jest ozdoben, nesa jméno Čápu čili Čapí hory (Storchberg, 785 m.), a ježž nesluší sobě másti s jinou horou téhož jména, ve Slezích u Dlouhých Valteric (Lang-Waltersdorf) se zdvihající. Vrch tento je nejvyšší místo ve skalách Teplických i Abršpašských i poskytuje dobrého jich přehledu. Asi na 1 kilom.



Pohled na skalní město u Teplic.

cesty dále k východu spatřuje se ještě pěkný dílec skal Teplických, kteréž se tu okolo zámku Skal (Bischofstein, 660 m.) ještě jednou v podobě svislých stěn zdvihají, nesouce na úzkém hřebeni svém ssutiny hrádku Kočičího kamene (Katzenstein, 707 m.),

Pěkný chlum, v geologické i orografické příčině vynikající, jest *vrch Ostaš*, enž stojí skoro v prostředku oblasti pískovcův Abršpasských a Polických, a od vysoké polohy své ještě dokonalejšího pohledu do nich poskytuje, než Čapí hora. Ostaš leží mezi všemi Dědovou (Nieder-Mohren) a Pěkovem na náhorní rovině opukové, kteráž má zde prostou výšku 500 m. Podlahu jeho činí elipsa, od S k J položená a 25 kilom. délky a 2 kilom. šířky držící. Nad touto podlahou vyvstávají skály pískovcové nejprv pod úhlem sklonu 8—10, výše pak 20 stupňů plasami, lobře od sebe rozeznatelnými; nejvýše pak prostírá se skalní planina, asi 550 m. dlouhá a 100 m. široká, kteráž drží 688 m. prosté výše, k SV svisle, k JZ pak povlovně dolů se sklání.

Třetí prostrannější vyvýšeninu půdy činí v tomto okraji *hory Hejšovinské* a severní jich výpustek, na Hvězdě řečený, kterémuž na stábních mapách dává se meno „Faltengebirge“ (t. j. Žaltmanské hory), jež ale v této krajině zhoľa jsouc neznámé, svědčí nejspíše a vlastně hřbetu Svatoňovickému, výše již vypsanému. Nejpravděpodobnější je zajisté jmeno „Stěny Polické“, kteréž se jim také od českého údíu sousedního dává. Všechna tato vysočina jeví se při hranicích zemských mezi českým Náchodem a kladskými Dušníky (Reinerz) a Hrádkem (Wünschelburg) v podobě prostranné náhorní roviny, stojící na podlaze ze šedé opuky (k dolejšímu patří útvaru křídového náležité), jež přidržuje se směru od SZ k JV, šířky 7—8 kilom. a střední výšky 650 m. Z lůna této náhorní roviny vycházejí k SV a JZ krátká údolí, jež vody své jednak k Metuji, jednak k řece Stenavě svádějí. Na čemž je tato vysočina v šířce 2 kilom. skoro dokonalou rovinou. Toliko v některých polohách, kteréž k severu na počet stále se množí, spatřují se osamotělé skály a klepy z pískovce Jizerského co zbytky téhož útvaru, jenž druhdy nepochybně celou tuto vysočinu opukovou byl pokrýval. Zvláště děje se tak u vsi Karlsperka (760 m.), nad kterouž zdvihají se k S dvě obrovské spousty pískovcové, vyvstávající v poměrné výši 100 a více metrů na podobu svislých stěn nad vřkolní krajinou. Obě spousty skalní mají nahoře vodorovnou planinu a nazývají se Hejšoviny Heuscheuer, druhdy nejspíše „Stohy“, jako i jiné podobné vrchy na Moravě, na Slovensku i v Rakousích). Věť Hejšovina (Grosse Heuscheuer) čili Stoh má v základě tvar rovnoběžníka se stranami 200 a 300 m. dlouhými a s nadm. výškou 110 m. Z planiny její lze poříti pěkného pohledu do doliny Broumovské, do Kladska a do hor Polických. Z tohoto stanoviště pokusil jsem se také o výkres doliny Broumovské, jenž k posledním stránkám tohoto pojednání jest přiložen. Toto místo bývá také oblíbenou vycházkou pocestných. Vedlejší spousta skalní, d Věť Hejšoviny toliko hlubokou roklí odloučená, je menší, má podobu elipsy a nazývá se Menší Hejšovinou (Stožcem); má výšku nadmořské 866 m.

Od obou Hejšovin vybíhá u vsi Posadova (Passendorf) k S ostrý hřeben skalní, jemuž dávám, jak již řečeno, jmeno „Polických stěn“ nebo Hvězdy. Hřbet tento prostírá se délkou 12 kilom. a čarou potočitou od JJV k SSZ až ke vsi Lutberku, skládaje se při tom cele z pískovce Jizerského, jenž zde šířkou 1—2

kilom. na dolejší opuce spoléhá, k Z pod sklonem 15—20°, k V však svislými skoro stěnami dolů se spouští, ukazuje na této straně zejména také významné, rozryté tvary kvádrovce českého. Čára hřebenná znamená se na něm čerčenem skalistým, druhdy sotva 5—10 kroků širokým, jenž pánev Broumovskou k Z uzavírá, místy silně do ní zabíhaje (jako se to výpustkem, Ringelskoppe řečeným, děje) a nejednoho pěkného pohledu do kraje Broumovského poskytuje. Takového lze zejména poříti od myslivny u kaple „Hvězdy“ řečené (663 m.), dále z Hůry Alžbětiny (druhdy, zejména i na mapách gen. štábu, „Geyerskorb“ nazývané, 701 m.), nad jiné pak z velkolepého a úzkého čerene, jemuž říkají Ringelkoppe (757 m.) a jenž v následujícím obraze v samém prostředku jeho se nalezá. Na severním konci svém připojují se stěny Polické k hoře Bukové, o kteréž již výše řeč byla.

Co se týče prostředků komunikačních v tomto okraji, tož nedá se upříti, že mají jak v tržebním, tak v strategickém vzhledě velkou důležitost; neboť ony způsobují spojení Čech jednak s kamenouhelnou panví Valdenburskou a s Vratislaví, jednak s hrabstvím Kladským a hořejšími Slezy. Rameno státní dráhy prochází tímto krajem pískovcovým od J k S, vstupující do něho u Náchoda, a jdouc na Hronov a Dolejší Teplice, načež překročivši u Bohdašína (Bodisch) sedlo hory Bukové ve výši 528 m., sstupuje dolů do údolí Stenavy, odkudž jednak k Valdenburku, jednak k Broumovu a Kladsku se rozvětjuje. Skoro zároveň s touto tratí železničnou běže se silnice jednak od Náchoda na Hronov a Polici k Broumovu, jednak z Police na Ždár, Dědovou a Javor k Teplicům. Od silnice Náchodské pak odštěpuje se nad Náchodem u Bělovsi druhá, kteráž na pruské Zakše a Městečko (Levin) do Dušník a Kladska vede. K této silnici přistaveno jest za posledních let nové velmi důležité spojení silničné skrze hory Hejšovinské, jež ze Zakší vycházejíc, přes vrchy u Karlsperka a Hrádku (Wünschelburg) vede. Silnice Polická, pokud k Broumovu táhne, přestupuje u vsi Hutberka pod vrchem soujmeným sedlo ve výši 595 m. Z Teplic dolejších konečně (461 m.) běží silnice k SZ do Aberšpachu, kdež se rozděluje, jdouc jednak přes sedlo Chvalečské (636 m.) do Poříčí a Trutnova, jednak k S přes sedlo Zdoňovské (550 m.) do pruského Šumperku, Frydlantu a Valdenburka, kterážto místa jsou zase silnicí na Halbštát a Hejtmánkovice (Hauptmannsdorf) s Broumovem a Kladskem ve spojení.

Pánev čili *kotlina Broumovská*, činí třetí oddělení východního podhoří Krkonošského. Nejhlubší částí její je důležité údolí řeky Stenavy, kteréž má hlavní směr od SZ k JV a zahnuvši se níže Kladska pod pravým úhlem, do údolí řeky Nisy se ústí.

Údolí Stenavské počíná vlastně již u vsi Stenavy v Slezích ve výši 650 m., je však až ke vstupu svému do Čech, kterýž pod Frydlantem se děje, úzké, pozměňující při tom nejednou směru svého. Teprv pod Frydlantem u Halbštátu (436 m.) počíná se rozstupovati, nabývající při tom podoby koryta čili pánve, pokud totiž poznáhlou až do 7 kilom. šíře roste, před východem svým z Čech u Tunschendorfu (332 m.) ale zase poněkud se zužuje. Že však koryto patří mezi žlaby dolinné, bude o něm teprv níže při údolí Stenavy širší zmínka. Zde připomínám jen tolik, že podlaha celá pánve Broumovské skládá se z rudých pískovců, na kterých k JZ spoléhají opuky a pískovce popsaných již stěn Polických, any severovýchodní, povlovně se vyvyšující boky tohoto koryta lemovány jsou pěkným a dlouhým

hřbetem horským, jenž z porfyru a melafyru jsa složen, jmenem *hor Heidlových* (Heidelgebirge), ostatně zřídka užívaným, se znamená. Případněji nazval bych jej *porfyrovými horami Broumovskými*. Začínají tyto hory zejména k V Frydlantu i náleží bytně k vysoké a rozlehlé vrchovině, kteráž k J a JV slezského Valdenburka se prostírá a v kteréž vedlé několika osobitých skupenství vrchů také některé hřebetné vyvýšeniny určitého i trvalého směru lze sledovati, jako Tanhausské hory, Neurodské a Suché vrchy a hory Heidlovy. Tyto hory zejména jsou nejjižnějším dílcem vrchoviny Valdenburské, ležíce na polovic ještě v Čechách, pokud totiž přes hřeben jejich běží politická hranice země. Na podlaze, v 500 m. nadm. výše položené, zdvihá se tu nepřetržitý a táhlý hřbet v střední výši 700 až 750 m., jenž velikým obloukem, s počátku od Z k V, potom od SZ k JV ohnutým, objímá Broumovskou kotlinu k SV a sice v délce aspoň 15 kilom. Horský tento hřbet má všudež stejný sklon 10—15° na obou stranách a je skoro celý lesem obrostlý. Nad střední výši jeho vynikají četné oblé vrcholy, jako zvláště vrch Špičák u Hranice (Gränzdörfel, 879 m.), Sv. Janský kopec (784 m.), Heidlova hůra (739 m.), oba u vsi Sv. Jana (Johannesberg), posléze pak Šolcův vrch u Šonova (751 m.). Čáry hřbetní ubývá mu všudež stejnoměrně, toliko na jednom místě (nad Sv. Janem) zarývá se do ní hloub jedno sedlo (650 m.), kterýmž vedena jest silnice z Broumova do Giersdorfu a Charlottenbrunn. Žlabem kotliny Broumovské běží ostatně odvětví železnice Chocensko-Halbštatské, kteráž má od letošního roku již spojení s Valdenburkem, ano spojení s Kladskem posud není dostaveno. O silnici stala se již výše zmínka.

K severovýchodu vrchoviny Valdenburské, již lze ještě míti za jakési podhoří Krkonošů, prostírá se po hranici mezi hrabstvím Kladským a Slezou, a sice směrem od SZ k JV horský hřbet, asi 70 kilom. dlouhý a 600—700 m. vysoký, jenž toliko na jednom místě, a sice u města Brda (Wartha), údolím řeky Nisy jsa protržen, způsobuje přímé spojení Krkonoš s moravsko-slezskými Sudetami. V hřbetu tomto rozeznává se po míře sedel, v něm jsoucích, několik dílců, jako hory Soví, Brdské, Rychlebské (Reichensteiner Geb.) a Kralické či Novoměstské, kteréž ale spatřují se vesměs mimo rámec kraje tuto vypisovaného.

V následujícím připojuji ještě dva průřezy, jež určeny jsou podati přehled tvaru půdy veškeré oblasti, v § tomto líčené. První jest průřez podélný i přidržuje se hlavní předěle vodní mezi Labem a Odrou čili mezi mořem západním (severním) a východním (baltickým).

*Nejčelnější místa rozhraní vodního přes horu Bukovou, stěny Polické a hory Hejšovinské jsou tato:*

|                                                               | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Zelená hora, na S Aberspachu . . .                         | 704·0                    | 1·3                                           | Z—V     |
| 2. Libná, ves u Šumperka, na silnici . .                      | 644·5                    | 2·6                                           | Z—V     |
| 3. Zdoňov, sedlo na S odtud . . . . .                         | 550·4                    | 1·8                                           | SZ—JV   |
| 4. Jelení (Göhlenau), kopec k Z odtud .                       | 668·0                    | 2·2                                           | S—J     |
| 5. Buková, na temeni . . . . .                                | 732·0                    | 4·1                                           | SSZ—JJV |
| 6. Bohdašín, místo v sedle na silnici<br>k Broumovu . . . . . | 527·5                    | 1·4                                           | SZ—JV   |

|                                                                          | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 7. Kirchberk, na vrchu . . . . .                                         | 698                      | 3·0                                           | Z—V     |
| 8. Hutberk, sedlo na silnici k Broumovu . . . .                          | 595·0                    | 2·3                                           | SSZ—JJV |
| 9. „Na hvězdě“, základy kaple . . . . .                                  | 664·0                    | 1·2                                           | SSZ—JJV |
| 10. Alžbětina hůra (Geyerskorb), ve skalách . . . . .                    | 701                      | 6·1                                           | SSZ—JJV |
| 11. Ringelkoppe, ve skalách . . . . .                                    | 757·0                    | 1·7                                           | SSV—JJZ |
| 12. Sedlo mezi vrchem Ringelkoppe a Hejšovinou . . . . .                 | 620·0                    | 3·2                                           | SSZ—JJV |
| 13. Opuková náh. rovina v horách Hejšovinských . . . . .                 | 760·0                    | 0·6                                           | S—J     |
| 14. Stoh (V. Hejšovina), mezi skalami . . . . .                          | 910·0                    | 1·2                                           | V—Z     |
| 15. Sedlo mezi Stohem a Spiegelberkem . . . .                            | 774·0                    | 1·1                                           | V—Z     |
| 16. Spiegelberk, vrchol . . . . .                                        | 901·0                    | 1·3                                           | SZ—JV   |
| 17. Silnice z Chudoby (Cudowa) do Karlsperka na hoře Frydrychově . . . . | 780·0                    | 5·8                                           | S—J     |
| 18. Radeč (Ratschenberg), vrchol . . . . .                               | 781·0                    | 2·1                                           | S—J     |
| 19. Sedlo při silnici z Městečka (Levína) do Dušník . . . . .            | 672                      |                                               |         |

Ještě poučnější bude následující průřez příčný, poněvadž s ním také geologický tvar půdy této oblasti je ve spojení. Směr tohoto profilu jde celkem od Z k V. Podrobnosti jeho objasňují se místy, kterýmiž jest veden.

*Příčný průřez, vedený od Úpice na hřbet Svatoňovický, Teplické a Polické stěny a přes kraj Broumovský.*

|                                                        | Výška nadm.<br>v metrech | Vzdálenost<br>k nejbližšímu místu<br>v kilom. | Směr    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Úpice, v údolí Úpy . . . . .                        | 349·0                    | 3·8                                           | JJZ—SSV |
| 2. Svatoňovice malé, u zámku . . . . .                 | 410·0                    | 1·7                                           | J—S     |
| 3. Žaltman (Hexenstein), skalný vrchol . . . .         | 721·0                    | 1·8                                           | J—S     |
| 4. Radvanice, střední výška . . . . .                  | 540·0                    | 4·4                                           | Z—V     |
| 5. Čapí hora, skalný vrchol . . . . .                  | 785·0                    | 4·1                                           | Z—V     |
| 6. Javor (Ober-Mohren) . . . . .                       | 451·0                    | 1·6                                           | Z—V     |
| 7. Ostaš, pláň na vrcholu . . . . .                    | 688·0                    | 2·1                                           | SZ—JV   |
| 8. Bukovice, ves . . . . .                             | 470·0                    | 3·5                                           | JZ—SV   |
| 9. Polické stěny, Alžbětina hůra . . . . .             | 701·0                    | 1·0                                           | JZ—SV   |
| 10. Skřínice (Weckelsdorf), nejhořejší domek . . . . . | 436·0                    | 4·6                                           | Z—V     |
| 11. Broumov, u mostu Stenavy . . . . .                 | 375·0                    | 4·2                                           | JJZ—SSV |
| 12. Rosentál, nejhořejší chalupy . . . . .             | 489·0                    | 1·9                                           | J—S     |
| 13. Heidelberg, vrchol . . . . .                       | 739·0                    | 1·7                                           | JZ—SV   |
| 14. Beuthengrund, ves, při silnici . . . . .           | 650·0                    |                                               |         |

V příčině *žlabův dolinných*, jež berou se krajem, právě vypsáním, třeba podotknouti, že jsou zejména tři, totiž údolí Úpy, Metuje a Stenavy. Že však

žlab byl již v předchozím § popsán, zbývá obírat se něco obšírněji toliko u Metuje a Stenavy.

**Valka žlabův dolinných v pískovcových horách Teplických a Polických.**

| Žlabův:        | Odkud až kam :                                       | Prostá<br>výška<br>jmen.<br>míst v<br>metr. | Rozdíl<br>výšky<br>mezi<br>nimi v<br>metr. | Vzdá-<br>lenost<br>jich od<br>sebe v<br>kilom. | Spád<br>od jed-<br>noho k<br>dru-<br>hému | Směr žlabu |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Metuje</b>  | Počát. u Raspenavy (v Slez.)                         | 568·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                | Zdoňov, u kostela . . . .                            | 506·7                                       | 61·3                                       | 5·2                                            | 1 : 85                                    | S—J        |
|                | Dolejší Teplice, nejjižnější<br>domky . . . . .      | 461·5                                       | 45·2                                       | 7·8                                            | 1 : 173                                   | S—J        |
|                | Hronov, dolejší konec . . .                          | 345·0                                       | 116·5                                      | 16·0                                           | 1 : 137                                   | S—J        |
|                | Náchod, v údolí . . . . .                            | 325·5                                       | 19·5                                       | 8·6                                            | 1 : 441                                   | S—J        |
|                | Nové město, v údolí . . . .                          | 300·0                                       | 25·5                                       | 13·2                                           | 1 : 530                                   | S—J        |
|                | Josefov, ústí do Labe . . . .                        | 255·0                                       | 45·0                                       | 19·2                                           | 1 : 427                                   | V—Z        |
|                | Od počátku do Josefova . . .                         |                                             | 313·0                                      | 70·0                                           | 1 : 224                                   | S—J        |
| <b>Stenavy</b> | Počát. u vsi Stenavy (v Slez.)                       | 650·0                                       |                                            |                                                |                                           |            |
|                | Frydlant (v Slez.), u dolej-<br>šího mlýna . . . . . | 439·0                                       | 211·0                                      | 11·0                                           | 1 : 52                                    | SSV—JJZ    |
|                | Broumov, v údolí u mostu                             | 375·0                                       | 64·0                                       | 14·4                                           | 1 : 225                                   | SZ—JV      |
|                | Prostř. Stenava (v Slez.),<br>u kostela . . . . .    | 320·0                                       | 55·0                                       | 14·0                                           | 1 : 255                                   | SZ—JV      |
|                | Od počátku až do Prostř.<br>Stenavy . . . . .        |                                             | 330·0                                      | 39·4                                           | 1 : 119                                   | SZ—JV      |

*Údolí Metuje* počíná zejména nedaleko hranic slezských u Raspenavy (568 m.) mělkého žlabu, do kteréhož vlévají vody své některé potoky z vůkolních výšin, tedy z výše 600—650 m. přichodící. Výše vsi Libné vstupuje tento půdu českou i zachovává původní podoby své, t. j. mělké brázdy, s obou šířkami slabého sklonu provázené, až pod kostel Zdoňovský. Spád od vsi až sem má se jako 1 : 85. Pod Zdoňovem vchází žlab z půdy opukové do kvadrového pískovce, oblévaje (jak již na str. 101 vzpomenuto) skály sčesané a Teplické při východním kraji jejich, odkudž také západní břeh až k ústí nabývá podoby příkrých strání skalních, ano břeh východní, jakkoli ještě z opuky složený, přece také již s náhlejším sklonem se objevuje. Spád do Teplic (461·5 m.) činí 1 : 173. Níže Teplic nabývá žlab Metuje, který opukami se beroucí, značnější šířky, stráně jsou po obou bocích zase svázeny a vůkolní kraj nižší a rovnější. Toliko na některých místech, zejména žlab má pozůstatky útvaru pískovcového, jako u Dědové pod Ostašem, kde zarývá se hloub v měkké a písčité vrstvy opuky, jako na trati mezi



Maršovem a Bezděkovem (Bösig), sužuje se údolí zase a ukazuje příkré a vysoké stráně. Spád od Teplic k Hronovu (345·0 m.) má se jako 1 : 137, je tedy něco příkřejší, než v předchozím hořejším dílci. Od Hronova až pod Náchod nabývá údolí šířky 500—800 metrů a řeka přijímá nad Hronovem od Z vodný potok Verněrovický, od V pak Machovský, nad Náchodem konečně potok Střelu (Schnelle), jenž od Městečka přichodí. Východní boky údolí skládají se tu z opuky, jsouce tudíž nízké a rovné, západní však jsou buď z rudého, buď z kamenouhelného pískovce složeny a strmí obyčejně co příkré stráně, nahoře lesem zarostlé, do značné výše. Při tom mění se spád níže Hronova neobyčejnou měrou, stává se třikrát i čtyřikrát tak povlovným, že na celé trati od Hronova do Náchoda nečiní více, než 1 : 441. Níže Náchoda (325·5 m.) bere žlab zase novou podobu na sebe; neboť řeka razí tu sobě cestu jižním výběžkem útvaru rudých pískovců, níže pak rulami hory Vrchmezí (Hohe Mense), způsobuje takto, že těsný žlab její, pronikající tuto půdu početnými ohby, nepropouští místa ani pěšině podlé řečiště svého. Údolí samo je příkrými, 150 až 200 m. vysokými a skalistými straněmi na podobu rokle sevřeno, má však na trati až k Novému Městu (300·0 m.) toliko spád poměrem 1 : 530. Pod Novým Městem uchyluje se žlab, jehož střední směr byl dosud od S k J, pojednou skoro pod pravým úhlem do směru od V k Z. Řeka i žlab její vstupují nyní u Krčína do vlastních naplavenin, jež k J i S na 1—2 kilom. šře se prostírají, berouce na sebe pohled skoro dokonalé roviny, kteráž od diluvialních pískův a štěrků na podobu břehův, 10 až 20 m. vysokých, pod velkými oblouky jest provázena, ku kterýmž řečiště brzo na severu, brzo na jihu se přitáčí, dokud u Josefova (255·0 m.) s Labem se nespojí. Spád od Nového Města do Josefova jest 1 : 427. Střední spád celého žlabu od Raspenavy až do Josefova (70 kilom.) jeví se poměrem 1 : 224, rozvití jeho pak je 1·77, tedy dosti znamenité.

*Údolí Stenavy*, pokud prochází českým krajem, shoduje se s onou oblastí, kterouž jsem nahoře panví Broumovskou nazval. Také žlab Stenavy má počátek svůj na půdě pruské, pokud totiž u vsi Stenavy (650 m.) na jih Valdenburka v lesné vrchovině tamější sbírá se několik potokův ve společné brázdě, jež s počátku jdouc od V k Z, u Dlouhých Valteric (Lang-Waltersdorf) do druhé od S k J běžící úžlabiny vchází, v kteréž pak potok, prorazivší sobě cestu porfyrovými skalami Heidlových hor, níže Frydlantu (439·0 m.) u vsi Neusorge na půdu českou vstupuje. Spád řeky od Stenavy slezské až k Frydlantu jeví se poměrem 1 : 52. Níže téhož města mění se povaha žlabu; byv totiž prvé úzký a obapolně příkrými a rovnými stráněmi lemovaný, rozstupuje se nyní v koryto čili kotlinu podoby eliptické, jejíž délka směrem od SZ k JV drží asi 16, největší šířka pak 7 kilom. Žlab Stenavy rozděluje celou tuto kotlinu do dvou, skoro stejných dílů a jeví se v podobě dlouhé a vytáhlé brázdy, jež v severním dílci svém k V, v jižním zase k Z jest zahnutá. Dno tohoto údolí je 500—600 m. široké, rovné a lemované po obou bocích stráněmi, 20 až 30 m. vysokými, jež zvláště na pravém břehu bývaj dosti příkré. Od hořejšího kraje těchto oubočí vystává půda velice povlovně na pohled slabých vln k oběma krajům doliny jak k JZ t. j. ke stěnám Polickým, tak k SV t. j. k porfyrovému hřbetu Broumovskému až pod patu těchto vysokých krajův, tedy až do výšky nadm. 500 m. V brázdách těchto vln půdy, jež bez rozdílu směřují do vnitra koryta, vysílajíce též vody své k řece Stenavě, položeny jsou četné a zá-

Hubertk

Engelkoppo



Broumov a Velká ves

Porfýrové hory Broumovské

Pohled na Broumovskou dolinu z V. Hejšoviny.

možné vesnice úrodného a dobře vzdělaného újezdu toho, jehož jižní konec určuje se dvěma nízkými hřbety, jež od Hejšovinských a porfyrových hor k žlabu řeky se přibližují, uzavírajíce zejména u Tunschendorfu (332 m., nejnižší místo kraje) celou kotlinu Broumovskou. Spád žlabu níže Frydlantu (439 m.) až k Broumovu (most přes Stenavu, 375 m.), jenž leží skoro v prostředku koryta na návrší a s předměstími i v údolí Stenavy, jeví se poměrem 1 : 225, odtud pak až do Prostřední Stenavy Kladské (330 m.) poměrem 1 : 255. Střední spád od Stenavy slezské až sem je tedy 1 : 119, rozvítí 1:70. V připojeném obrazci spatřuje se větší díl kotliny Broumovské: V levo stěny Polické se skalnou strání vrchu Ringelkoppe, do popředí vystupující, v zadu špičatý Hutberk na severozápadním konci jejich; na pravo jsou Broumovské porfyrové vrchy, docela v pozadí pak vrchy Valdenburské a Suché; v prostředku obrazu hluboké koryto Broumovské, jehož čelní osada, Broumov, po věžech Benediktinského opatství se poznává; v pravo Broumova táhnou se údolím Stenavy dvory poplužní Veliké vsi (Grossdorf), v levo vynikají ze záhybův kotliny dvory a stromy jiných dlouhých vsí Broumovských, zejména Martínkovic (Merzdorf, nehloub v obrazu), Skřínec (Weckersdorf) a Hejtmánkovic (Hauptmannsdorf).

*Rostlinstvo* oblasti, v § tomto vypsané, vytkli jsme již při osobitých odděleních jejich. Zde budiž jen obecně doloženo, že asi 25—35% celého kraje pokryty jsou lesem, 10—12% lukami a 58—60% rolemi. V okrese Abršpašském a Polickém je lesův poměrně nejvíce, v kterých zejména sosny a borovice panují, na okres Broumovský vypadá nejmenší podíl lesův, kteréž tu jsou větším dílem se smrkův, a dílem i z bukův složeny. Z rolní půdy obracejí se asi 3% k rostění pšenice, 35% na žito a 25% na oves. Brambory rostí se v obvodu Abršpašském a Polickém hojněji (13%), než v Broumovském (6% půdy), za to vysívají Broumovští hustěji jetel (16%), než Poličtí (8%).

*Rozloha půdy v rozličných výškách nadmořských* v celém kraji, v § tomto popsáném, pokud totiž vnitř Čech leží, jeví se způsobem následujícím:

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Veškerá půda uvnitř hranic . . . . .    | 66·624 hektarů |
| 2. Půda nad vrstevnicí 300 metrů . . . . . | 65·136 "       |
| 3. " " " 400 " . . . . .                   | 54·960 "       |
| 4. " " " 500 " . . . . .                   | 29·352 "       |
| 5. " " " 600 " . . . . .                   | 9·144 "        |
| 6. " " " 700 " . . . . .                   | 1·704 "        |
| 7. " " " 800 " . . . . .                   | 120 "          |

Z čehož následuje *rozloha půdy po patrech* čili vrstvách, a sice:

|                                          |             |      |      |             |
|------------------------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 1. Ve výšce nadmořské 200 až 300 m. leží | 1·488 hekt. | čili | 2·2% | vší oblasti |
| 2. " " 300 " 400 " " "                   | 10·176      | " "  | 15·3 | " "         |
| 3. " " 400 " 500 " " "                   | 25·608      | " "  | 38·4 | " "         |
| 4. " " 500 " 600 " " "                   | 20·208      | " "  | 30·3 | " "         |
| 5. " " 600 " 700 " " "                   | 7·440       | " "  | 11·2 | " "         |
| 6. " " 700 " 800 " " "                   | 1·584       | " "  | 2·4  | " "         |
| 7. " " 800 " 900 " " "                   | 120         | " "  | 0·2  | " "         |

Na základě těchto čísel lze vypočísti veškeru hmotu, kteráž nad nejspod-  
patro 200 metrů povýšena jest, s použitím vícekrát uvedené formule na  
1 krychl. kilom. Dělí-li se toto číslo základnou 666·24 čtver. kilom., vznikne  
mí půdy 0·277 kilom. = 277 metrů. Připočte-li se k tomu ještě nadm. výška  
nižšího patra = 200 m., objeví se číslo 477 metrů *co střední výška nadmořská  
blasti.*

## §. 8. Závěrečné rozjímání.

Jakkoli kraj v §§. 1—7. t. d. vylíčený, činí jen skrovný díl země české,  
dá se jinak upříti (ač vztáhne-li se objem jeho na Z až k čáře Jizerské),  
ať se co osobitý celek a že tudíž nebude věci na újmu, opáčiti tuto ještě  
hlouposti nejčelnější vlastnosti oblastí právě vypsanych.

*Nejčelnější čáry výšky* tohoto kraje najdou se přehledně sestaveny v tabulce  
tující, při čemž hleděno jen k hlavním hřbetům; z vrcholů pak uveden jest  
nejvyšší, nechť nalezá se ve skutečnosti i vně rozhraní vodního.

Z tabulky této poznává se, že střední výška hřbetná\*) nejvyšší jest v Krko-  
ně (1103 m.), a v nich zase v ústředním dílu hřebene mezi sedlem pod Dív-  
kameny až k sedlu pod Černou kupou (1401 m.), při čemž nápadná jest  
rozdíl mezi střední výškou hřbetnou s jedné, a mezi nejvyššími body  
oběma i sedlovými s druhé strany. Tento rozdíl bývá zřídka větší 200 metrů  
0·% výšky hřbetné, z čehož již předkem lze se domysleti, že hřbety Krko-  
ně jsou jednotejným způsobem slabě připloštělé, což také s geologickým  
kladem bytne souvisí. Nemajíc zajisté ani hřbety žulové, aniž nahorní roviny  
rovové značně vynikajících vrcholův. Zjev tento činí se pravým opakem oro-  
ré povahy oněch oblastí českého Středohoří, o nichž v I. dílu tohoto archivu  
jest jednáno a kdež zejména dokázáno, že rozdíl mezi výškou vrcholovou  
dílní vyvýšeností sedel drží se tam v 50 až 60 procentech, což onde má ovšem

svůj v hojných homolích a hříbech čedičových a znělcových. Co se mě-  
ní bodů sedelných tkne, tož lze mezi nejvyššími přechody v širší oblasti  
očské po vozích zniknouti toliko sedlo u Vítkova domku, pak Nouzovské  
berské, po ostatních jdou jen pěšiny, z čehož plyne, že tu v prosté výši  
metrů čili 2840' není více voznic, přes sedla vedoucích. Naopak jsou sedla  
řady t. j. nejnižší, bez výjimky sjízdná. V obrazném přehledu průřezův,  
tomuto dílu připojen jest, jsou všechny tyto momenty graficky znázorněny.  
ně šetřeno v profilech, tmavěji stíněných, všudež dokonale stejného [měřídka,  
čtějších však oblíbeno pětikrát větší měřídka, než při vzdálenostech vodo-  
h. Hory Jizerské i Krkonošské spatříš tam co do poměrův výše jejich  
eny jak prostředkem profilu podélného, držího se hrany vodní, tak pro-

\*) Název *střední výška hřbetná* znamená tolik, co *výška obdélníka*, jenž by měl touž zá-  
kladnu a touž plochu, kterouž obsahuje profil skutečné čáry hřbetné se základnou její  
a s oběma konečnými ordinatami.

| Jmeno :                                                                                          | Hlavní osa<br>zdvížení |                   | Nejvyšší body<br>vrcholové         |                          | Měřené body v sedlech                |                                 |                          |                                   |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                  | Směr                   | Délka<br>v kilom. | Jmeno                              | Výška<br>nadm.<br>v met. | Střední<br>výška<br>hřebes<br>v met. | Nejvyšší                        |                          | Nejnižší                          |                          |  |
|                                                                                                  |                        |                   |                                    |                          |                                      | Jmeno                           | Výška<br>nadm.<br>v met. | Jmeno                             | Výška<br>nadm.<br>v met. |  |
| 1. <i>Hory Jizerské</i> , rozhraní<br>vodní od Gikelsberka až<br>k údolí Zuckenskému .           | Z—V                    | 51·0              | Obrázek (Tafel-<br>fichte) . . . . | 1124                     | 826                                  | Vitkův domek<br>(Wittighaus) .  | 898                      | Filipsgrunt . . .                 | 480                      |  |
| 2. <i>Krkonoše</i> , hlavní hřeben<br>(rozhraní vodní):                                          |                        |                   |                                    |                          |                                      |                                 |                          |                                   |                          |  |
| a) Od Bud Prokůvých<br>až k sedlu u Dívčích<br>kamenů . . . . .                                  | ZSZ—VJV                | 14·4              | Vysoké Kolo .                      | 1507                     | 1192                                 | V. Šišák (záp.)                 | 1370                     | Boudy Prokůvy                     | 848                      |  |
| b) Od sedla u Dívčích<br>kamenů až k Černé<br>kupě (na V odtud<br>sedlo) . . . . .               | ZSZ—VJV                | 12·6              | Sněžka . . . . .                   | 1601                     | 1401                                 | Bouda Loučná<br>(vých.) . . . . | 1320                     | Černá kupa<br>(vých.) . . . . .   | 1168                     |  |
| c) Od sedla u Černé<br>kupy až do Königs-<br>hannu . . . . .                                     | SZ—JV                  | 22·3              | Lesný hřeben<br>(Forstkamm) .      | 1285                     | 876                                  | Černá kupa<br>(záp.) . . . . .  | 1168                     | Königshann . . .                  | 520                      |  |
| 3. Rozhraní vodní přes Ko-<br>zákov, Horky a horu<br>Zvíčinskou od Jizery až<br>k Labi . . . . . | ZSZ—VJV                | 49·3              | Sněžka . . . . .                   | 1601                     | 1103                                 | V. Šišák (záp.)                 | 1370                     | Königshann . . .                  | 520                      |  |
| 4. Rozhraní vodní přes horu<br>Bukovou a Polické stěny<br>až k hranici zemské .                  | ZSZ—VJV                | 71·6              | Kozákov . . . . .                  | 744                      | 520                                  | Nouzov . . . . .                | 565                      | Záložňov-Stanov-<br>ník . . . . . | 305                      |  |
|                                                                                                  | SSZ—JV                 | 29·0              | Ringelkoppe .                      | 757                      | 652                                  | Hutberk . . . . .               | 595                      | Bohdašín . . . . .                | 528                      |  |

lkem profilu příčného. Vzhledem k podhoří Krkonošskému, nemajícímu poté předěle vodní, zvolena jest taková čára profilová, jež nejlépe způsobila jest aziti tvar půdy rozsáhlé a rozmanité oblasti této.

Následuje nyní souborný *přehled nejdůležitějších čar hloubky čili žlabův*, celý tento kraj upravený, arci jen v hlavních zjevech jejich, což ovšem k nabytí ledu zcela stačí, poněvadž podrobnosti této stránky orografického tvaru obsaženy již v §§. předchozích.

| Jmeno žlabu:                                              | Výška nadm.<br>v metrech |              | Rozdíl<br>výšky<br>žlabu<br>v metr. | Délka<br>žlabu<br>v kilom. | Střední<br>spád<br>celého<br>žlabu | Směr    | Rozvítí |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------|---------|
|                                                           | na<br>počátku            | při<br>konci |                                     |                            |                                    |         |         |
| <i>Údolí Nisy Žhořelické, od počátku až k Radiměřicům</i> | 760                      | 190          | 570                                 | 76·2                       | 1:134                              | JJV—SSZ | 2·49    |
| Údolí Jeřice . . . . .                                    | 780                      | 269          | 511                                 | 16·3                       | 1: 32                              | VSV—ZJZ | 1·19    |
| „ pot. Rychnovského .                                     | 390                      | 213          | 177                                 | 15·5                       | 1: 88                              | VJV—ZSZ | 1·30    |
| „ p. Smědé . . . . .                                      | 950                      | 190          | 760                                 | 43·2                       | 1: 57                              | VJV—ZSZ | 1·55    |
| „ <i>Věží Jizery</i>                                      |                          |              |                                     |                            |                                    |         |         |
| a) od poč. až k M. Skalám                                 | 900                      | 273          | 627                                 | 66·1                       | 1:105                              | SSV—JJZ | 2·45    |
| b) od M. Skal až do Ml. Boleslavě . . . . .               | 273                      | 205          | 68                                  | 50·6                       | 1:741                              | SSV—JJZ | 1·53    |
| ab) od poč. až do Boleslavě                               | 900                      | 205          | 695                                 | 116·7                      | 1:168                              | SSV—JJZ | 1·95    |
| Údolí Menší Jizery . . .                                  | 1038                     | 390          | 648                                 | 20·8                       | 1: 31                              | S—J     | 1·40    |
| „ Kamenice . . . . .                                      | 950                      | 300          | 650                                 | 33·8                       | 1: 52                              | S—J     | 1·47    |
| „ p. Olešné . . . . .                                     | 525                      | 330          | 195                                 | 27·1                       | 1:139                              | VJV—ZSZ | 1·43    |
| „ p. Klášterského . .                                     | 290                      | 205          | 85                                  | 26·6                       | 1:312                              | SV—JZ   | 1·33    |
| „ Cidlina . . . . .                                       | 500                      | 274          | 226                                 | 10·6                       | 1: 47                              | S—J     | 1·21    |
| „ Javorky . . . . .                                       | 510                      | 251          | 259                                 | 21·4                       | 1: 82                              | S—J     | 1·35    |
| „ Bystřice . . . . .                                      | 620                      | 271          | 349                                 | 16·9                       | 1: 48                              | S—J     | 1·44    |
| „ <i>Labe, a sice:</i>                                    |                          |              |                                     |                            |                                    |         |         |
| a) od poč. až do Vrchlabí                                 | 1300                     | 470          | 830                                 | 23·1                       | 1: 28                              | SSZ—JJV | 1·30    |
| b) od Vrchlabí do Josefova                                | 470                      | 255          | 215                                 | 49·1                       | 1:229                              | SZ—JV   | 1·33    |
| ab) od poč. do Josefova .                                 | 1300                     | 255          | 1035                                | 72·2                       | 1: 67                              | SZ—JV   | 1·33    |
| Údolí V. Úpy . . . . .                                    | 1300                     | 255          | 1045                                | 68·6                       | 1: 66                              | SSZ—JJV | 1·54    |
| „ p. Ličné . . . . .                                      | 550                      | 386          | 164                                 | 15·1                       | 1: 92                              | S—J     | 1·33    |
| „ Metuje . . . . .                                        | 568                      | 255          | 313                                 | 70·0                       | 1:224                              | S—J     | 1·77    |
| „ Stenavy . . . . .                                       | 650                      | 320          | 330                                 | 39·4                       | 1:119                              | SZ—JV   | 1·70    |

V tabulce této sestavena jsou nejčelnější údolí směrem s hora dolů, a sice dle ústí jejich do údolí hlavních, z čehož zároveň lze poznati osnovu a souvislost va samého i žlabův jeho. Čísla prvního sloupce znamenají výšku prostou ořejším počátku žlabu blíže bodu sedelného, čísla druhého sloupce pak výšku

| J m e n o :                                         | Věkera<br>plocha<br>v čtvereč. kilom. | Mezi<br>200 a<br>300 met. | Mezi<br>300 a<br>400 met. | Mezi<br>400 a<br>500 met. | Mezi<br>500 a<br>600 met. | Mezi<br>600 a<br>700 met. | Mezi<br>700 a<br>800 met. | Mezi<br>800 a<br>900 met. | Mezi<br>900 a<br>1000 met. | Mezi<br>1000 a<br>1100 met. | Mezi<br>1100 a<br>1200 met. | Mezi<br>1200 a<br>1300 met. | Mezi<br>1300 a<br>1400 met. | Mezi<br>1400 a<br>1500 met. | Mezi<br>1500 a<br>1600 met. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Hory Jizerské . . . .                            | 981.1                                 | 7.4                       | 23.8                      | 20.9                      | 16.1                      | 11.7                      | 6.9                       | 5.8                       | 6.0                        | 1.2                         | 0.2                         | —                           | —                           | —                           | —                           |
| 2. Krkonoše . . . . .                               | 582.4                                 | —                         | 0.1                       | 12.0                      | 11.7                      | 14.6                      | 15.0                      | 11.6                      | 10.5                       | 12.8                        | 3.6                         | 4.6                         | 1.7                         | 1.4                         | 0.4                         |
| 3. Vrchovina Hruboskal-<br>ská a Prachovská . . . . | 686.6                                 | 58.8                      | 38.7                      | 2.4                       | 0.1                       | —                         | —                         | —                         | —                          | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           |
| 4. Náhorní roviny Horecké<br>a Zárvské . . . . .    | 1277.2                                | 5.6                       | 35.2                      | 43.5                      | 15.1                      | 0.6                       | —                         | —                         | —                          | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           |
| 5. Východní podhůří Krko-<br>noš . . . . .          | 666.2                                 | 2.2                       | 15.3                      | 38.4                      | 30.3                      | 11.2                      | 2.4                       | 0.2                       | —                          | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           |

nadmořskou dolejšího konce údolí při ústí jeho do jiné řeky nebo (jako zejména při Nise, Jizeře, Cidlině, Labi, Metuji, Stenavě atd.) onen konec žlabu jejich, jež na přiložené mapě ještě lze uhlédati. Ostatním sloupcům netřeba výkladu. Mimo to pokusil jsem se zobraziti také grafickým způsobem tyto žlaby v přiložené názorné tabulce profilův. Míra výšek je tu pro lepší znázornění i slabšího spádu údolí desetkrát větší, než míra vzdáleností vodorovných. Zároveň jsou ony žlaby, jež do vnitř Čech k Labi se berou, silnými, zcela vytaženými čarami zřejmy učiněny, any ostatní žlaby mají jen tečky nebo přetržené čárky. Co do hlavních výsledkův, poznává se, že Labe a Úpa mají prameny své nejvyš, načež následují sstupně Menší Jizera, Kamenice, Smědá a V. Jizera. Z tabulky profilův shledne se i hned, jak nejčelnější údolí, t. j. údolí Labe, Úpy a Jizery v hořejším dílu svém v stejných mezích výšky nadmořské mají skoro stejný spád; dále lze se poučiti v příčině směru žlabův, že směr od SZ k JV nebo opačný bývají panujícími, směr pak od S k J že řídčeji již se objevuje, jakkoli tento co do povahy své dá se na směry SZ—JV a SV—JV, pod pravými úhly se střídající, snadno rozložit; neméně shledává se také, že nejmenšího rozviti dosahuje údolí Jeřice, největšího pak údolí Nisy a hořejší údolí Jizery.

Jiná, zajímavá stránka porovnání jest *percentní rozloha plochy v rozličných patrech* či výškách nadmořských, jež v tabulce, vedle stojící, se podává, a sice v pořadí po 100 metrech (316 víd. str.).

Z této tabulky vychází na den, že největší podíly percentní vztahují se k nejnižším polohám, kteréž tu teprv ve 200 metrech počínají, jediné ve vrcho-

vině Hruboskalské a Prachovské, k polohám prostřední výše (400—500 m.) v horách Jizerských, k polohám nejvyšším pak (přes 600 m.) v horách Krkonošských.

Na závěrek tohoto topografického líčení budiž mně svoleno, doložití ještě něco o čelnějších *čardch kommunikačních*, pokud krajem, tuto vypsáním, se ubírají. Jsoutě zajisté všechny čáry komunikační v dvojí příčině vážné a důležité, a sice jednak co podpory průmyslu a tržby, jednak zase co podklad všelikých výkonův strategicko-vojenských.

V kraji Krkonošském (v širším smyslu) došly mnohé osady velikého významu v příčině tržby a průmyslu. Tak vzpomínám jen vzhledem k tržbě s obilím a ovocem Jičína a Jaroměře, v tržbě se lnem Trutnova, v příčině těžení uhlí kamenného Svatoňovic a Žacléře, jakož i pruského sice, ale nedalekého Valdenburka. Co středisko průmyslných okresův jmenuji jen v příčině předení bavlny, lnu a vlny a výroby tkanin z těchto látek Liberec, Jablonec, Tannwald, Boleslav, Rokytnici, Jilemnici, Vrchlabí, Trutnov, ano i Broumov, v příčině papírnictví Hostinný a Maršov, v příčině sklárství Harachovice (Nový svět) a Tannwald atd. Za nedávných ještě dob brala se tímto horským krajem, a sice směrem diagonálním od SZ k JV, toliko jediná dráha železná, t. j. Liberecko-Pardubická, z Liberce přes východní výběžky Ještědu do Turnova, odtud pak údolím Jizery nahoru do Šemil, dále údolím potoka Olešné k St. Paké na náhorní rovinu Horeckou, z ní pak dolů do údolí Labského a po pravém břehu řeky na Dvůr, Josefov a Hradec do Pardubic, kdež k státní dráze se připojuje.

Původní návržení této dráhy nelze nazvati nikterak šťastným. Hlavního úmyslu, kterýž byl zejména přímé železniční spojení Liberce s Vídní, dosaženo sice bez odporu, avšak spojení toto možné bylo způsobiti mnohem kratší cestou a se skrovnějším nákladem v směru k Jičínu. Dráha tato brala se kromě toho krajinou chudou a málolidnou, vyhýbajíc se zároveň jakoby schvalně lidnějších osadám i průmyslovým okresům severočeským, i kazila také spojení s Prahou, o kterémž brzo ukázalo se, že v příčině tržby je bez mála tak výhodné a žádoucí, jako spojení s Vídní. Otdud také pošlo, že vozba na oné železnici nemohla nikterak prospívati. Moudrá správa, kteréž toto železniční podniknutí v letech šedesátých se těšilo, poznala také ihned vzpomenutých nedůstatků. Toliko založení druhé dráhy, jež by nahradila chyby a nedůstatky dráhy první, vejdouc při tom v těsný svazek s ní, bylo způsobilé, pomoci prvnímu podniknutí zase ke zdraví a zdatu. S takovými úmysly založena jest rakouská dráha severozápadní, kteráž spoléhajíc na síle vlastního kapitálu, avšak při společné správě zůstávajíc, uvedla s vděkem všech, a sice prostředkem četných ramen svých, do těchto končin českých znamenité zvelebení národního hospodářství; neboť skrze ni dostalo se průmyslným závodům tohoto okresu lacinějšího paliva a výrobkům jejich snadného vývozu na všechny strany. Spojení se střediskem tržby v Čechách, s Prahou totiž, jest netoliko zase obnovené, nýbrž i obchod se sousedním Slezskem bytně usnadněn a nové kraje české do této sítě železniční vtaheny. Trati rakouské dráhy severozápadní společně s býv. Pardubicko-Libereckou jeví se nyní v kraji, tuto vypsáním, v podobě pěkné sítě, kteráž v stránce úplnosti a způsobivosti, ač přijme-li se projektované spojení Jičína s Turnovem za hotové, málo ještě zanechává na přání. Směrem od J k S berou se v tomto kraji (od Prahy) trati z Ostroměře na St. Pakou, Semily a Tannwald, pak (od



Pardubic) trať z Josefova na Svatoňovice, Poříčí, Königshan a Lbšov, jakož i Jičín—Turnov a Trutnov—Vrať. Od západu k východu běží trať od St. Paké k Martinicům (Jilemnice), Kunčicům (Vrchlabí), Hostinnému, Trutnovu a Poříčí, dole v kraji pak trať Jičín—Ostřoměř. Směru od SZ k JV konečně přidržuje se nejprv vzpomenuť dráha, Liberecko-Pardubická. O poměrech sklonu těchto tratí poučí se znalec mnohem rychleji a spůsobněji z přiložené mapy patrové, než z popisu jakkoli obšírného. Prostá výška stanic, kterouž tato dráha vzdělaným pocestným skrze velice příhodné nápisy vědomou činí, předešedší v tom všechny ostatní dráhy rakouské, obsažena jest ve spisku výšek, jenž za tímto pojednáním přímo následuje.

Ještě jedné čáry železničné, kteráž teprv v posledních dvou letech byvši dokončena, zvláště pro východní stranu této oblasti naší velice jest důležitá, třeba tuto šře vzpomenouti a to tím spíše, že skrze ni přivedeno jest k místu přímé spojení Vídně jak s kamenouhelnou panví Valdenburskou ve Slezích, tak i s Vratislaví. Mínilí novou dráhu odbočící, již ředitelství státní dráhy z Chocně vystavělo k severu a kteráž u Nového města nad Metují vstupuje v tuto naši oblast a nedaleko odtud u Vysokova až na půl kilometru délky k dráze Pardubicko-Liberecké se přibližující a s ní kolejí u Starkoče se spojující, na Náchod a Polici k Halbštatě se běře, ve společném nádraží s pruskou drahou k Valdenburku se stýká, načež sama pod pravým úhlem se zahnuvši, údolím Stenavy k Broumovu a Otendorfu běží a prodloužení svého až do Kladska, a tím i nového nepřímého spojení s drahou státní v Ústí nad Orlicí očekává.

Všecky jmenované dráhy vcházejí nad to skoro při všech stanicích svých prostředkem přiměřené osnovy silničné ve spojení se sousedním i vzdálenějším krajem, odkudž tržba i průmysl nemohou sobě na ten čas nikterak více stěžovati na nedůstatek prostředkův dopravy. Toliko přímému spojení se severem do pruského Slezska zbraňují mezilehlé hřbety hor Jizerských a Krkonošských i jsouť posud tímto směrem jen tři dobré silnice na snadě, a sice jedna na Filipsgruntu do Frydlantu (zároveň železničná trať), na Boudy Prokšovy od Harrachovic k Teplicům slezským (Warmbrunnu), pak na Königshan (také železnice) u Lbova, při čemž ale první i poslední tratě přechodní shodují se již s konci jmenovaných hor, tak že vlastním horám zbývá jediný silničný přechod u Bud Prokšových.

Nemenší důležitosti jsou tyto čáry komunikační společně s tvarem půdy vřkolního kraje v *příčině strategické*\*). I v tomto vzhledě přičinila se osnova železnic, za posledních 10 let v tomto kraji provedená, k vyplnění dřevních mezer a k nápravě spáchaných chyb, tedy i ke zvýšení prospěšné defensivy i offensivy. Oba dlouhé hřbety horské, sedlem u Bud Prokšových mezi sebou spojené, hory Jizerské totiž a Krkonoše, jeví se na celé rovné čáře od Filipsgruntu až k Zacléři a Königshanu, tedy na délku 65 kilom. čili 8·6 mil, co dokonalá zástita země v těchto stranách, a to zejména také v té příčině, že vzpomenuť silnice, z údolí Zackenu do Jizerského vedoucí, jakkoli co silnice vojenská je sice dosti široká i pohodlná, přece nevidí se k offensivnímu postupu věcíh zástupův vojenských

\*) Myšlenky, tuto vyslovené, berou se za týmž účelem, jako náhledy, v I. dílu těchto topografických prací str. 122 až 126 uveřejněné; avšak sloučení jejich v jednotný celek lze teprv v onom dílu provést, v kterémž celé hořejší údolí Labské až k Pardubicům a řece Orlicí bude vypsáno.

se strany Slezské býti způsobilá, poněvadž vlastní překážky po přechodu hranic teprv počínají; neboť další cesta do Čech vede buď úzkou, přes dvě míle dlouhou úžlabinou (údolí Jizery) nebo po neširoké náhorní rovině (nad Vysokou), jež nedopouští dostatečného rozvíti sil válečných. Vždycky bude tedy nepřítel donucen, vtrhnouti do Čech buď na Liberec nebo na Königshan.

Vstupu do země u Liberce lze však zabrániti vojenským postavením u Hodkovic, vstupu na Königshan pak postavením mezi Trutnovem a Poříčím. Poslednější může se však snadno obejít směrem od Kladska k průsmyku Náchodskému, což na ten čas dá se prostředkem nové vojenské silnice přes hory Hejšovinské (od Hrádku [Wünschelburg] na Karlsperk a Náchod) mnohem snadněji provésti než za poslední války, kdy totiž 2. divisi gardy pruské náleželo z Hrádku oklikou na Broumov se ubírat, aby k Hronovu se dostala. Jedná-li se tedy o obranu země, bude nezbytné, osaditi celou čáru od Trutnova k Náchodu, nikterak ale jen jednu nebo druhou.

Čarou obrannou průchodův Krkonošských proti mocnému a jimi od severu se hrnoucímu nepříteli, kterouž sama příroda nabízí, jsou beze vší pochybnosti náhorní roviny Horecké a Zarovské. Roviny tyto, náležité, jak již vícekrát vzpomenuto, k útvaru rudých pískovců, kladou se přede všechny východy údolí Krkonošských v podobě dlouhého, dosti vysokého náspu, jenž panuje nad všelikými východy, proměňuje zároveň směry žlabů Krkonošských bez výjimky v směry východní nebo západní. Tyto vysoké roviny poskytují množství výborných postavení, jsouce početnými háji a lesíky, jakož i věcími lesy pokryty, dobře vzdělané i dostatečně zalidněné, a držíce početné a všelikými směry se rozšiřující silnice; i lze je zajisté, ač není-li hlinitá půda jejich dlouhými dešti silně promoklá, také polem dobře projíti. Dvě tratě železničné, jedna upřímo vedouc velikou úžlabinou mezi úpatím Krkonošův a rovinami Horeckými, druhá horem po rovině samé běžící, svazují všechna důležitější místa mezi sebou a připojují se na jihu ke třem, z vnitra země přichodícím hlavním drahám, způsobují možnost jistého a snadného postupu jak ku předu tak na zad.

Přes hory Krkonošské, co hory vysoké a příkré, nebude však nikdy lze velkému zástupu vojenskému do země přímo vniknouti; nastaneť tedy vždy potřeba je obejít, a sice buď od západu, buď od východu, buď oběma směry najednou, jak se to zejména také za poslední války přihodilo. Obcházení jich od západu musí býti provedeno z Lužice hořejší od Buděšína a Žitavy na Rumburk, Warnsdorf a Jablonné, proti tomu pak najde se přirozená čára obranná při střední Jizeře mezi Hradištěm Mnichovým a Turnovem. Zde jest sice vlastní levý břeh údolí Jizerského asi o 20 metrů nižší, než pravý, avšak jednak nalezájí se v samém sousedství řeky výhodné ve vojenské příčině výšiny a vrchy, jako Podolská hůrka a výšiny u Březiny a Doubravy, jednak zdvihají se ve vzdálenosti 1—2 kilometrů skalisté stráně hřbetův Hruboskalského a Mužského, jež silně do popředí vystupují, nahoře jeví se co široké, od zadu t. j. od východu snadno přístupné náhorní roviny, jež i pravému břehu Jizery daleko k SZ panují a k postavení hrubé, za nynější doby zvlášť dalekonosné střelby s prospěchem se hodí.

Kdo však jednou tohoto postavení se spustí, nenajde v celém tuto vypsáném kraji, t. j. až k výši Josefova, druhého postavení více, z něhož by stačil

nepřítele, od SZ s velkými silami postupujícího, s některou nadějí úspěchu zadržeti nebo dokonce zpátky zatlačiti. Dolina Jičínská je sice v strategickém vzhledě důležitá od početných silnic, kteréž se tu sbíhají. Avšak pro obranu nenajdeš v ní nižších dobrých stanovišť taktických, ačkoli by se tomu na pohled tak podobalo, přijme-li se totiž, že nepřítel táhne od západu (od Jizery) a shledne-li se na mapě vysočina skal Prachovských. Tato vysočina panuje sice vůkolnímu kraji k Z a SZ, vyšší měrou ale kraji k V a JV položenému, dá se při tom se všech stran snadno obejít i poskytuje potom velice nejistou čáru k zpětnému pochodu. Nejbližší čára obranná najde se pak teprv při hořejším Labi a sice v kraji, jenž na přiložené mapě ještě se nenachází a kterýž chci tedy mimo sebe pustiti.

Okresu Broumovského nebráno zde v přičet, poněvadž je se tří stran pruskými kraji otočen, otvíraje se do nich do kořán a neposkytuje pro obranu nižšího stanoviště, odkudž mohl by nejvýš při rychlém, offensivním početí války některé služby prokázati.

Všiml-li jsem sobě v těchto řádcích toliko postavení obranných, tož stalo se to proto, že při tak malém kraji, jenž ostatně sám již k obraně velice jest spůsobilý, nedá se o strategických pohybech offensivních zholat nic podstatného povědět; neboť o takových věcech náleží se vysloviti jen vzhledem k ústředním místům země jakož i k určité základní čáře operační. Ostatně byl bych tomu zajisté velmi rád, kdyby ani nám, ani sousedům našim nenadešla brzo příležitost, pokusiti se o skutečné provedení theoretických náhledů, tuto pronešených; spíše naději se, že oba, v těchto stranách sousedící státní oblíbí sobě trvale obapolného šetření hranic državy i obvodu moci, jim od přírody vykázaných, tak že všeliké strategické i taktické studie půdy v těchto končinách bohdá přístě do oboru čisté vědy patřiti budou!



**DRUHÝ SPISEK**

**ČERENÝCH VÝŠEK V ČECHÁCH.**

Odb. list III. výskumu Čech,

obsahující

**K R A J I N Ě,**

položené mezi

**vým Městem (u Frydlantu), Hrádkem a Valdenburkem na severu**

**a mezi**

**Kopidlnem, Josefovem a Novým Městem nad Metují na jihu.**



## Uvedení.

Následující stránky zavírají v sobě druhý spisek výšek, od topografického měření pro vědecký výzkum Čech měřených, jenž rozmnožen jest nad to několika mi, při tom však spolehlivými měřeními. Ve spisku tomto nalezly jsou zpráva a ve shodě s prvním spiskem, při prvním dílu prací topografických na veřejně vydaném, umístění své jen takové body, kteréž ještě vyskytují se na obrazu půdy ené k tomuto spisku mapy patrové (odd. III.) a kteréž zejména v letech 1868, 1870 a 1871 byly jsou měřeny kromě několika pozdějších, když totiž la se r. 1874 toho potřeba, doplniti schválně některá pruská měření v krajině erské i Schmiedeberské. Methody, jichž při těchto měřeních užito, byly jsou né. V největším počtu případův užil jsem tak zvané polotrigonometrické metody, kteréž měří se se stanoviště, jehož prostá výška známá jest, prostředkem uni- nšho stroje nivelovacího nebo drobného theodolithu, a sice přímo úhly výškové jež náleží určit, sejmouc při tom vzdálenost jejich z dobré mapy speciální, vypočte se rozdíl výšek dle známých formulek. Methody této užívám již déle 26 velkým prospěchem.\*) Stanovišti či hledišti byly mi při tom triangulační body o rakouského měření katastrálního nebo i místa taková, jichž prostou výšku o bylo lze obdržeti za pomoci několika bodův triangulačních, odtud viditel- Vzdálenosti vodorovné změřeny jsou v té příčině na fotografických kopiích ních snímkův c. k. vojensko-zeměpisného ústavu ve Vídni v měřítku 1:28.800.

Nenepatrná část měřených bodův, zejména stanice železniční, v Slezích početná místa na silnicích, určeny jsou prostředkem metody nivelovací. Ito měřeních třeba doložiti, že byly jsou, kdekoli toho možnost se ukázala, y s výškami, dle metody trigonometrické změřenými, a dle nich pak na nadmořskou zredukovány. Čísla opravná najdou se níže uvedena.

Konečně byla ještě dlouhá řada barometrických měření před rukama, vzta- se věcí dle k místům takovým, jež od kryté polohy jejich nebylo lze prostředkem čar dohledných s některým stanovištěm, po trigonometricku m. Měření tato činěna jsou buď prostředkem tlakoměru rtuťového, buď pro- em aneroidu. Počet jejich vzrostl čím více, čím častěji třeba bylo ve vrcho-

\*) V knize „Studien über die Methoden und die Benützung hypsometrischer Arbeiten“, r. 1858 v Gotě u Justa Perthesa ode mne vydané, vyloženy jsou tyto metody obšír- něji a hojnými příklady objasněny.

vitém kraji tomto k nim se uchýliti. Při mnohých těchto měřeních nezbyvalo také leč vypočísti je z jediného toliko shlednutí; jinak je ale zase nemalý počet takových, při nichž bylo lze užiti dvou, tří i více snímkův (shlednutí), a to z rozličných let, což zvláště platí o měření v hořejším údolí Úpy výše Vrajtu, pak o hořejším údolí Labském výše Vrchlabí. Všecka tato měření barometrická vztažena jsou co míry rozdílův prostředkem výpočtu na nejbližší bod nebo i na několik sousedních bodův, trigonometricky určených.

Následující řádky obsahují nejprv číselný přehled a původ materiálu, při sestavení tohoto spisku měřených výšek užitého, k čemuž poznamenávám, že v něj pojatý jsou pro úsporu místa toliko výsledky početní, totiž výšky nadmořské v metrech a vídeňských střevecích, z těch pak také ne všechny, nýbrž jen takové body, jež jsouce samy od sebe důležitější, dají se nad to snadněji na mapách vyhledati, any body takové, jež co pomocné k sestavení mapy patrové sloužily, mlčením jsou pominuty. Bylo-li místo některé rozličnými osobami měřeno, vešly jsou v obsah spisku buď měření nejspolehlivější nebo střední vývod ze všech. Tak nalezá se na př. udáno při bodech triangulačních měření katastru čili rakouského generálního štábu, jakkoli všechna místa taková měřena jsou byla také od členův, pro výskum Čech v té příčině zřízených. Na prvním místě stůjtez zde vlastní měření členův těchto, načež následují teprv měření jiného, nebo staršího původu.

- a) Od samého *spisovatele* této knihy pochází největší díl měření v prostranství, na přiložené mapě umístěném; vykonalť zejména sám r. 1867 ve vlastních Krkonoších v nejužším slova toho smyslu 432 měření; v horách Jizerských a ve východním podhoří Krkonošském (v krajině totiž Svatoňovické a Broumovské) provedl r. 1868 celkem 556 měření, r. 1870 v hořejším údolí Úpském a Labském 27, r. 1871 v jižním podhoří (ve vůkolí Jičína a Dvora Králové) 560, posléze roku 1874 v sousedství Hirschperka a Teplic slezských (Warmbrunn) na slezské půdě 81 měření; v hromadě vykonal tedy spisovatel v řečeném prostranství 1656 měření, z nichž 1424 bylo polotrigonometrických a 232 barometrických.
- b) Pan *Gabriel Hendrych*, za oné doby assistent geodæsie při vysokých školách technických v Praze, na ten čas professor v hospodářském učilišti v Liebverdu u Děčína, změřil r. 1860 krajiny okolo Kostelce, Skalice, Náchoda a Nového Hrádku i provedl tam 296 polotrigonometrických měření.
- c) Pan *Frant. Müller*, professor geodæsie na české polytechnice pražské, provedl r. 1867 v krajině mezi Josefovem a Dvorem Králové 158 polotrigonometrických a 16 barometrických měření.
- d) Lesní příručí pan *Horděk* zdělil mně několik trigonometrických měření výšek, jež od lesního úřadu v Jilemnici ve vůkolí Harachovic vykonány jsou byly.
- e) Stavební správa slavné společnosti státní železnice, pro novou trať z Chocné do Valdenburka zřízená, poskytla mně zprávu o vykonaném nivelování této trati, z něhož bylo lze vypočísti výšku nadmořskou všech stanic této dráhy, k čemuž ještě připomínám, že jsem udání její o nadmořské výšce východiště oné dráhy, totiž Chocné, poopravil o + 13,7 metrů, aby měřené výšky mohly býti uvedeny ve shodu s body trigonometrickými.

- f) Slavná generální správa rakouské železnice severozápadní zdělila mně podélný profil nových tratí svých, z něhož také jdou na jevo výšky nadmořské stanic jejich, jež jsem ale v podobné příčině, co nahoře, poopravil o veličinu + 3,9 metrů. Oprava kót při nivelování dráhy Pardubicko-Liberecké vzpomenuta jest již při prvním dílu těchto prací topografických.
- g) V příčině končin prusko-slezských užil jsem vedlé vlastních měření ještě hrubého spisku, v němž nalezá se sestaveno asi 500 měření výšek z pruského Slezska. Spisek tento propůjčil mně k svobodnému užítí vysoce zasloužilý plukovník pruského generálního štábu *von Sydow*, pohřbchu nyní již se světem se rozžehnavší, i obsahují se v něm jednak výsledky nivelování železnic, silnic a řek, jednak výsledky barometrických měření výšek skrze původce rozličné, zvláště Prudla a Filse.
- h) Mimo tento materiál užil jsem ještě sem a tam měření, jež uvádějí se v novějších a lepších knihách i mapách, o Krkonoších jednajících, pokud totiž nevedou původu svého z pramenův, předkem již jmenovaných, jak o tom níže ještě při výkladu skratek se poví.

Výšky nadmořské udávají se i metry i vídeňskými střevisi, a sice dle poměru: 1 meter = 0,5273 víd. sáhů = 3,1638 víd. střevisi; vzdálenosti jeví se v kilometrech, 1 km. = 527,3 víd. sáhů, plochy v hektarech, 100 H. A. = 173,77 rak. jiter

Seřazení měření, v následujícím spisku obsažených, dělo se týmž pravidlem, jakého zachováno v prvním dílu oddělení topografického a kteréž okázalo se býti velice způsobilé k praktickému užítí.

Ve spisku obsahují se tudíž jen taková místa a polohy, jež vyskytují se zároveň v přiložené mapě patrové, odd. III. Hledá-li se tedy nadmořská výška některého z nich, třeba prvé z mapy seznati, v kterém totiž čtverci leží. K tomu konci je mapa zase na čtverce rozdělena, jež omezují se poledníky od 10 do 10 minut a rovnoběžníky od 5 do 5 minut. Že pak minuty na rámci mapy jsou pojmenovány, nebude s obtíží prostředkem mezních těch čar, jež lze učiniti buď v myslí buď tužkou, ustrojiti sobě ihned čtverec, v kterémž nalezne se místo hledané. Protíná-li však některá z těchto čar jisté místo, ku př. rozlehlejší osadu, pak ať se nahlédne pro jistotu také do čtverce sousedního co společného. Čtverce č. 1, 2, 3, 7, 12, 20, 28 a 35, spadají dílem také do odd. II. mapy patrové a místa jejich měřená naleznou se tedy v prvním spisku výšek, zejména v čtvercích č. 4, 10, 18, 26, 36, 45, 54 a 63.

Co se posléze tkne percentních podílův půdy po rozličných patrech výše od 100 do 100 metrův, tož vztahují se tyto jediné k prostranství, příslušným čtvercem obemknutému; toliko výšky ve spisku, připadající do čtvercův pohraničních, rozmnoženy jsou ještě výškami ze sousedního Slezska. Za příležitostí posouzení prvního dílu, před několika lety již vyšlého, vysloveno jest se strany povolane mínění, jakoby pracné vypočítávání percentních podílův pater i pro čtverce mapy bylo s nadbytkem, poněvadž prý již v předchozím pojednání podávají se percentní podíly takové pro přírodní oblasti půdy. Já však kladu velikou váhu právě na to, aby takové percentní podíly pater poznány byly netoliko v příčině velkých těchto oblastí, nýbrž i pro menší obvody stejné rozlohy či velikosti. Neboť takovým počínáním vyhoví se skutečné potřebě žádoucího porovnání rozličných dílův země s hledišťe které-



kolivěk i připravuje se nad to materiál k příštím studiím jak o dobrotě půdy, tak o klimatických i geologicko-montanistických poměrech ve spojení s polohou nadmořskou, což asi skoumatelům bude tím vítanější, čím nesnadněji dovedou si to sami způsobiti. Střední obsah plošný takového čtverce drží (násobí-li se totiž délka 4·8 kilom. s výškou 9·2 kilom.) celkem 10·856 hektarů čili 1,886 starých rakouských mil čtverečních. \*)

### Výklad skratek v následujícím spisku výšek.

- Koš. = Kořistka } Takto znamenaná místa změřena jsou od jmenovaných na str. 124  
Hd. = Hendrych } osob. Z čísel, jež na jmena tato následují, znamená první skrácené  
Müll. = Müller } číslo rok vykonaného měření, druhé pak zase řadové číslo příslušného protokolu měřického. Udává-li se více čísel řadových, pak znamená číslo výšky arithmetickou střední ze všech měření. Tak znamená na př. (Koš. 68. 235.) tolik co: změřil Kořistka r. 1868, čís. 235 protokolu měřického. Písmena Bar. praví, že měření bylo barometrické; kde jich není, bylo měření trigonometricky provedeno.
- (Triang. Austr.) = Určení rakouské triangulace (tak zv. měření generálního štábu) za příležitosti katastrálního rozměrování země české.
- (F. St. H.) = Měření lesního úřadu v Jilemnici (trigonometrická).
- (E. N. St. E. G.) = Nivelování železničné společnosti rakouské dráhy státní. Koleje stanice.
- (E. N. O. N. W. B.) = Nivelování železničné společnosti rakouské dráhy severozápadní. Koleje stanice.
- (E. N. S. N. D. V.) = Nivelování železničné dráhy Pardubicko-Liberecké. Koleje stanice.
- (Sen.) = Spisek měřených výšek v Čechách od Vojt. Senonera (Jahrbuch d. geologischen Reichsanstalt. 1852.)
- (Preuss. E. N.) = Pruské nivelování železničné.
- (Preuss. Fl. N.) = Pruské nivelování říčné.
- (Preuss. St. N.) = Pruské nivelování silničné.
- (Preuss. Verm.) = Pruské měření bez určitéjšího udání ze spisku Sydova.
- (Prud.) = Prudlova barometrická měření v Slezích.
- (Fils.) = Novější měření barometrická, vykonaná A. Filsem, majorem v. v.
- (Reym. K.) = Reymanova speciální mapa Německa.
- (Lieb. K.) = Spec. mapa Krkonoš od Liebenova.
- (Falck. K.) = Mapa Krkonoš od V. z Falkenšteina.
- (Letz. Rgb.) = Wegweiser durch d. Riesengebirge von D. Letzner. 1869.
- (Mosch) = Das Riesengebirge von Karl Fried. Mosch. 1858.

K vůli úplnosti jmenoval jsem zde všechny prameny, jichž užil jsem jakýmkoli způsobem v následujícím spisku výšek; jinak nahlédne laskavý čtenář brzo, že material, jehož pramenové tito poskytují, jakkoli zasluhuje uznání, přece není v nižádném poměru s počtem a rozlohou plošnou míst, skrze členy výskumu samého ustanovených.

\*) V tomto smyslu třeba také opravití omylné udání, v I. dílu prací topografických na stejném místě se přihodivší.

# 1. Nové město (a Frydeberk v Prusku).

Zeměpisná šířka: 50° 55' až 51° 0'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Mimo to ještě krajina východně ležící.

Z plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 3·5 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| " | " | " | " | 300—400 | " | 54·7 | " |
| " | " | " | " | 400—500 | " | 33·9 | " |
| " | " | " | " | 500—600 | " | 7·9  | " |

Nadm. výška v met. Ve víd. stf.

1. Nové město (Neustadt), makovice na kostelní věži (Koř. 67. 343.) 505·7 . . . 1600
2. " dům poblíž kostela (Koř. 67. 344.) . . . 475·7 . . . 1505
3. " střelnice (Koř. 67. 345.) . . . 456·2 . . . 1444
4. " nejdolejší domy u potoka (Koř. 67. 346.) . . . 454·9 . . . 1449
5. " východně odtud mlýn na silnici (Koř. 67. 348.) . . . 499·5 . . . 1581
6. " východně odtud myslivna u silnice (Koř. 67. 349.) . . . 516·1 . . . 1633
7. " severozápadně odtud dvůr „am Stemerich“ (Koř. 67. 347.) . . . 467·4 . . . 1478
8. Silnice z Nového města do Strassberku; na mezíku mezi Čechy a Pruskem (Koř. 67. 550 Bar.) . . . 514·6 . . . 1628
9. Nové město, východně odtud kříž na cestě z Nového města do Dittersbächlu (Koř. 67. 342.) . . . 503·0 . . . 1591
10. Lesnatý vrch mezi Blasburkem a Novým městem (Koř. 67. 341.) 567·4 . . . 1795
11. Heinersdorfský les, nejvyšší vrch (Koř. 67. 340.) . . . 563·0 . . . 1781
12. Dittersbächel, nejdolejší domy u mlýna (Koř. 67. 361.) . . . 400·2 . . . 1266
13. Heinersdorf, kostel, základ (Koř. 67. 354.) . . . 385·1 . . . 1217
14. " severně odtud nejvyšší místo cesty do Wünschendorfu, lesnatý vrch (Koř. 67. 358.) . . . 395·5 . . . 1251
15. Wünschendorf, jižní domy na cestě do Heinersdorfu (Koř. 67. 356.) . . . 347·5 . . . 1099
16. " nejhořejší západní domy na cestě do Bärnsdorfu (Koř. 67. 355.) . . . 353·4 . . . 1117
17. " domy v údolí nedaleko hranice (Koř. 67. 357.) . . . 287·2 . . . 908
18. Písečná (Sandberg), severovýchodně od Heinersdorfu, nejvyšší lesnatý vrch (Koř. 67. 360.) . . . 454·3 . . . 1436
19. Schwerta, silnice do Heinersdorfu na zemské hranici (Preuss. Verm. 270.) . . . 438·3 . . . 1387
20. " nejhořejší dům u silnice z Heinersdorfu (Koř. 67. 364.) . . . 372·0 . . . 1175
21. Polní domky (Feldhäuser), nejhořejší dům (Koř. 67. 365.) . . . 397·2 . . . 1256

|                                                                                             | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 22. Lesnatý hřbet na cestě z Polních domků do dolních Gebhartic (Koř. 67. 366.) . . . . .   | 401·9 . . .        | 1271         |
| 23. Kvidza, řeka u Lysé (Marglissa) (Preuss. Verm. 240.) . . . . .                          | 256·3 . . .        | 811          |
| 24. Frydeberk, hlavní silnice na náměstí (Preuss. Verm. 269.) . . . . .                     | 402·2 . . .        | 1271         |
| 25. Kvidza, řeka u Frydeberka pod silničním mostem (Preuss. Verm. 239.) . . . . .           | 384·0 . . .        | 1215         |
| 26. Ullersdorf, hlavní silnice na dolejší konci tohoto místa (Preuss. Verm. 268.) . . . . . | 437·0 . . .        | 1383         |
| 27. Wiegandsthal, kostel, základ (Koř. 67. 362.) . . . . .                                  | 394·0 . . .        | 1246         |

*Poznámání.* Zdá se, že měření, pod jmenem (Preuss. Verm.) zde obsažená, brala příliš vysoký porovnávací horizont, jelikož proti měření spisovatele ukazují stálý rozdíl as 30 metrů.

## 2. U Obrazku (a Flinsberk v Prusích).

Zeměpisná šířka: 50° 50' až 50° 55'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Mimo to místa východně odtud ležící.

Z plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od | 300— 400 metrů | 10·4 procent. |
|----------------------|----------------|---------------|
| " " " "              | 400— 500 "     | 9·2 "         |
| " " " "              | 500— 600 "     | 11·1 "        |
| " " " "              | 600— 700 "     | 11·9 "        |
| " " " "              | 700— 800 "     | 12·2 "        |
| " " " "              | 800— 900 "     | 19·7 "        |
| " " " "              | 900—1000 "     | 16·8 "        |
| " " " "              | 1000—1100 "    | 6·5 "         |
| " " " "              | 1100—1200 "    | 2·2 "         |

|                                                                                                                                         | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Lusdorfský kopec, kamenný signal (Triang. Aust.) . . . . .                                                                           | 481·9 . . .        | 1525         |
| 2. Lusdorf, kostel, základ (Koř. 67. 350.) . . . . .                                                                                    | 444·1 . . .        | 1405         |
| 3. " dům na východní straně pod Svinnou horou v sedle (Koř. 67. 351.) . . . . .                                                         | 482·1 . . .        | 1525         |
| 4. Sedlo ve Fischbachu, severně od Weissbachu pod horou Kalmrichovou (Koř. 67. 554. Bar.) . . . . .                                     | 605·0 . . .        | 1914         |
| 5. Svinná hora (Sauberg), u skalných trosk na vrchu (Koř. 67. 353.) . . . . .                                                           | 768·2 . . .        | 2431         |
| 6. Kupferberk, nejhořejší skalný štít (Koř. 67. 352.) . . . . .                                                                         | 770·3 . . .        | 2437         |
| 7. Nad Rapickým kopcem u severní straně hory „u obrazku“ při mezníku č. 140 (Koř. 67. 551. Bar.) . . . . .                              | 790·6 . . .        | 2502         |
| 8. Na Volském hřebeni, dolní okraj lesa (Koř. 67. 552. Bar.) . . . . .                                                                  | 1005·3 . . .       | 3181         |
| 9. U obrazku (Tafelfichte), pyramida na hoře 5 kilom. jihovýchodně od N. Města a 450 metrů od pruských hranic (Triang. Aust.) . . . . . | 1124·5 . . .       | 3557         |
| 10. Weissbach (Běla), prostřední výška místa (Koř. Bar. 1868) . . . . .                                                                 | 451·4 . . .        | 1428         |
| 11. Jižně od Weissbachu, a sice na stezce odtud, nejhořejší most přes Černý potok (Koř. 68. 175. Bar.) . . . . .                        | 928·6 . . .        | 2922         |
| 12. Na Kotli, hřeben mezi „Vítkovou horou“ a „Vyhliďkou“ (Koř. 68. 174. Bar.) . . . . .                                                 | 1010·6 . . .       | 3197         |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

13. „Na Vyhliďce“ (Siehhübel), pyramida na nejvyšší skále této hory  
1·5 kilometrů jihovýchodně od Wittighausu (Triang.  
Aust.) . . . . . 1121·8 . . . 3549
14. Wittighaus (Vítkovy domky), krčma na cestě z Weissbachu do  
Malé Jizery (Koř. 68. 172. Bar.) . . . . . 830·3 . . . 2627
15. Od Vítkovy krčmy západně, prameny Smědé (Koř. 68. 173. Bar.) . . . . . 990·8 . . . 3157
16. Východně od Vítkovy krčmy na vozové cestě do Malé Jizery  
(sedlo) (Koř. 68. 171. Bar.) . . . . . 898·3 . . . 2842
17. Zimrova stráž, pyramida na nejvyšším klepu středního hřebene  
Jizerského, asi 1·4 kilom. severovýchodně od myslivny  
Malojizerské (Triang. Aust.) . . . . . 1017·0 . . . 3218
18. Jizerská louka, prostřední výška slatiny, jihozápadně od Domků  
na hřebeni (Kammhäuser) (Letz. Rgb.) . . . . . 753·3 . . . 2383
19. Domky na Jizerském hřebeni, tak zvané „Kammhäuser“ a sice  
Senderova bouda (Mosch.) . . . . . 931·6 . . . 2947
20. „ výšina západně od těchto domků na hřebeni Herrens-  
dorfském (Reym. K.) . . . . . 931·8 . . . 2948
21. Vysoký kámen (Hochstein), hora u Schreiberhau (Falck. K.) . . . . . 879·6 . . . 2783
22. „ „ „ „ „ (Mosch.) . . . . . 963·3 . . . 3048
23. Schreiberhau, Bílý kámen (Weissstein), nejvyšší bod (Fils 312.) . . . . . 771·4 . . . 2440
24. Řeka Kvidža (Queiss), prameny její (Preuss. Verm. 235.) . . . . . 843·6 . . . 2669
25. Sedlo mezi řekami Kvidžou a Zackenem (Mosch.) . . . . . 803·3 . . . 2542
26. Řeka Kvidža, ústí potoku Trenke (Preuss. Verm. 236.) . . . . . 556·7 . . . 1761
27. Flinsberk, podlaha v lázních (Prud. 327.) . . . . . 546·3 . . . 1728
28. „ hlavní silnice u kostela (Preuss. Verm. 267.) . . . . . 474·5 . . . 1502
29. Řeka Kvidža u Egelsdorfu (Preuss. Verm. 238.) . . . . . 424·8 . . . 1344

### 3. Albrechtsdorf.

Zeměpisná šířka: 50° 45' až 50° 50'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od |   |   |   | 400— 500 metrů | 0·7 procent, |
|----------------------|---|---|---|----------------|--------------|
| "                    | " | " | " | 500— 600 "     | 6·8 "        |
| "                    | " | " | " | 600— 700 "     | 20·5 "       |
| "                    | " | " | " | 700— 800 "     | 27·4 "       |
| "                    | " | " | " | 800— 900 "     | 30·5 "       |
| "                    | " | " | " | 900—1000 "     | 12·5 "       |
| "                    | " | " | " | 1000—1100 "    | 1·6 "        |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

1. Wennerskaspersbruch (Lom Kašpara Wenera), lesnatá kupa, zá-  
padně od Zadní Suširny (průměr z 152 a 170) (Koř.  
68. 152. 170.) . . . . . 900·7 . . . 2849
2. Grosskamm (Veliký hřeben), lesnatý vrchol (střední výška z 149  
169) (Koř. 68. 149. 169.) . . . . . 1006·9 . . . 3201
3. Brdo (Farbenberg), lesnatý vrchol severně od Marienberka (Koř.  
68. 150.) . . . . . 879·3 . . . 2782
4. Mariánská hora (Marien-Berg), nejvyšší vrchol lesnatý severozá-  
padně od Marienberka (Triang. Austr.) . . . . . 868·4 . . . 2747

|                                                                                                                               | Nadm. výška v met. | Ve vid. stf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5. Marianská hora, její nejzápadnější a nejnižší vrchol (Koř. 68. 146.)                                                       | 767·3              | 2428         |
| 6. „ a sice myslivna na jižní stráni této hory (Koř. 68. 147.)                                                                | 689·3              | 2181         |
| 7. „ domy ležící v sedlu k ř. Desné (Koř. 68. 151.)                                                                           | 717·5              | 2270         |
| 8. Josefthal, kostel, základ (Koř. 68. 163.)                                                                                  | 600·0              | 1898         |
| 9. Hora Buková u Maxdorfu, nejvyšší lesem porostlý vrchol (Koř. 68. 144.)                                                     | 854·8              | 2705         |
| 10. Georgenthal, myslivna na jižní stráni hory Bukové (Koř. 68. 168.)                                                         | 728·8              | 2306         |
| 11. „ dolní domy v údolí (Koř. 68. 161.)                                                                                      | 511·5              | 1619         |
| 12. Albrechtsdorf, nejvyšší skupenina domů v sedle na silnici u hospody (Koř. 68. 51. Bar.)                                   | 625·8              | 1980         |
| 13. Od Brandu severně se nalézající železný kříž u dvou líp na vozové cestě z Tannwaldu do Albrechtsdorfu (Koř. 68. 50. Bar.) | 534·8              | 1692         |
| 14. Západně od Brandu se nalézající sedlo, mezi tímto a mlýnem lesním (Buschmühle) (Koř. 68. 53. Bar.)                        | 632·5              | 2001         |
| 15. Špičák (Spitzberg) u Tannwaldu, nejvyšší skála (Koř. 68. 122.)                                                            | 817·1              | 2585         |
| 16. Tiefenbach, domy v údolí jižně od mostu na silnici do Tannwaldu, as 5—10 m. výše než údolí (Koř. 68. 173.)                | 492·1              | 1557         |
| 17. Dolní Polubny, ústí údolí řeky Desné (Koř. 68. 154.)                                                                      | 650·3              | 2057         |
| 18. Desná (Dessendorf), horní mlýn v lesní úžlabině (Koř. 68. 171.)                                                           | 650·9              | 2059         |
| 19. Slap řeky Desné, jižně od přední Suširny, a sice počátek slapu nahore (Koř. 68. 172.)                                     | 631·2              | 1997         |
| 20. Neustück, hořejší domy u kraje lesa (Koř. 68. 153.)                                                                       | 790·9              | 2503         |
| 21. Lesnatý vrch, ležící severozápadně od „Horních Poluben“ a severovýchodně od „Neustücku“ (Koř. 68. 155.)                   | 799·0              | 2528         |

#### 4. Harachovice.

Zeměpisná šířka: 50° 45' až 50° 50'

Zeměpisná délka: 33° 0' až 33° 10'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od | 500— 600 metrů | 1·5 procent, |
|----------------------|----------------|--------------|
| „ „ „ „ 600— 700 „   | 10·0           | „            |
| „ „ „ „ 700— 800 „   | 29·0           | „            |
| „ „ „ „ 800— 900 „   | 35·3           | „            |
| „ „ „ „ 900—1000 „   | 10·7           | „            |
| „ „ „ „ 1000—1100 „  | 7·0            | „            |
| „ „ „ „ 1100—1200 „  | 3·8            | „            |
| „ „ „ „ 1200—1300 „  | 2·7            | „            |

Nadm. výška v met. Ve vid. stf.

|                                                                                                       |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1. Malá Jizera (Wilhelmshöhe), hostinec „u pyramid“ na silnici (prům. z 2 měř.) (Koř. 68. 167. Bar.)  | 825·1 | 2610 |
| 2. „ nejvyšší dům čís. 26 na vozové cestě do Weissbachu (Koř. 68. 169. Bar.)                          | 835·3 | 2643 |
| 3. Východně od Malé Jizery řeka Velká Jizera, při ústí menšího potoka jizerského (Koř. 68. 166. Bar.) | 760·0 | 2404 |
| 4. Birnbaumova skála, lesnatý vrchol severozápadně od hory „na zámcích“ (Koř. 68. 156.)               | 989·3 | 3130 |

Nadm. výška v met. Ve vřd. stř.

|                                                                                 |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>zámcích (Schlössersteine), nejvyšší vrchol, 1·1 kilometru jiho-</b>          |                         |             |
| <b>západně od Kobelovy boudy (Triang. Aust.) . . . . .</b>                      | <b>1004·5 . . . . .</b> | <b>3178</b> |
| <b>ní Polubny, makovice věže farního kostela (Triang. Aust.) . . . . .</b>      | <b>807·7 . . . . .</b>  | <b>2555</b> |
| <b>ní Polubny, nejhořejší rozstup údolí, kdež silnice do Schenken-</b>          |                         |             |
| <b>hahnu počíná stoupat (Koř. 68. 133.) . . . . .</b>                           | <b>602·9 . . . . .</b>  | <b>1908</b> |
| <b>abny, jižně ležící lesnatý hřbet „Hüttenberg“ (Koř. 68. 130.) . . . . .</b>  | <b>766·9 . . . . .</b>  | <b>2427</b> |
| <b>ckerlehne, triangulační bod na hranici mezi mezníky č. 220</b>               |                         |             |
| <b>a 221 (F. St. H.) . . . . .</b>                                              | <b>769·0 . . . . .</b>  | <b>2433</b> |
| <b>enkenhahn, křižovatka silnic z Přichovic a Tannwaldu (Koř.</b>               |                         |             |
| <b>68. 128.) . . . . .</b>                                                      | <b>778·5 . . . . .</b>  | <b>2463</b> |
| <b>ckerhäuser, východně odtud most přes velkou Jizeru (F. St. H.) . . . . .</b> | <b>555·7 . . . . .</b>  | <b>1758</b> |
| <b>ov (Johannesthal), prah jezu u pily (F. St. H.) . . . . .</b>                | <b>573·4 . . . . .</b>  | <b>1814</b> |
| <b>šebe, nejvyšší severovýchodní dům v lesním koutě (Koř.</b>                   |                         |             |
| <b>68. 32.) . . . . .</b>                                                       | <b>936·3 . . . . .</b>  | <b>2962</b> |
| <b>ova skála na Čertově stráni (F. St. H.) . . . . .</b>                        | <b>988·5 . . . . .</b>  | <b>3127</b> |
| <b>ova skála, 2·3 kilometrů jižně od sklárny Nového světa</b>                   |                         |             |
| <b>(Triang. Aust.) . . . . .</b>                                                | <b>1021·3 . . . . .</b> | <b>3231</b> |
| <b>rachovice, kostel, základ (Koř. 68. 159. Bar.) . . . . .</b>                 | <b>668·8 . . . . .</b>  | <b>2116</b> |
| <b>ř svět, skelná huť, základ (Koř. 68. 158. Bar.) . . . . .</b>                | <b>645·0 . . . . .</b>  | <b>2041</b> |
| <b>„ mezník lesa číslo 42 na rohu lesa „Kiefern“ (F.</b>                        |                         |             |
| <b>St. H.) . . . . .</b>                                                        | <b>671·4 . . . . .</b>  | <b>2124</b> |
| <b>enbach, prah jezu mlýna, č. 217 (F. St. H.) . . . . .</b>                    | <b>700·3 . . . . .</b>  | <b>2216</b> |
| <b>„ horní domy na východní obrubě lesa nedaleko myslivny</b>                   |                         |             |
| <b>(Koř. 68. 163 Bar.) . . . . .</b>                                            | <b>790·6 . . . . .</b>  | <b>2501</b> |
| <b>livna v Seifenbachu, mezník číslo 46 pod myslivnou (F.</b>                   |                         |             |
| <b>St. H.) . . . . .</b>                                                        | <b>809·8 . . . . .</b>  | <b>2562</b> |
| <b>enberg, myslivna ležící v sedle mezi Brandem a Kalten-</b>                   |                         |             |
| <b>bergem (Koř. 68. 34.) . . . . .</b>                                          | <b>927·0 . . . . .</b>  | <b>2933</b> |
| <b>shkamm, lesní hřbet, střední výška (Koř. 68. 37.) . . . . .</b>              | <b>1186·7 . . . . .</b> | <b>3754</b> |
| <b>„ Mumlavy, dolejší konec dolejšího slapu (Koř. 68. 161. Bar.) . . . . .</b>  | <b>702·8 . . . . .</b>  | <b>2224</b> |
| <b>„ hořejší počátek hořejšího slapu (Koř. 68. 160 Bar.) . . . . .</b>          | <b>758·0 . . . . .</b>  | <b>2398</b> |
| <b>rachovice, východně odtud most na cestě podél Mumlavy,</b>                   |                         |             |
| <b>kde se Lubošský potok ústí (F. St. H.) . . . . .</b>                         | <b>869·8 . . . . .</b>  | <b>2752</b> |
| <b>nelberg, nejvyšší bod (F. St. H.) . . . . .</b>                              | <b>1210·9 . . . . .</b> | <b>3831</b> |
| <b>hora (Weisser Berg), severně od Harachovic (F. St. H.) . . . . .</b>         | <b>948·1 . . . . .</b>  | <b>2999</b> |
| <b>pěšince z novosvětské skelné huti do Karlovy sklárny vedoucí,</b>            |                         |             |
| <b>při zemské hranici (Koř. 68. 162. Bar.) . . . . .</b>                        | <b>715·6 . . . . .</b>  | <b>2264</b> |
| <b>ká hranice na silnici z Nového světa do Marienthalu (Koř.</b>                |                         |             |
| <b>68. 157. Bar.) . . . . .</b>                                                 | <b>816·3 . . . . .</b>  | <b>2583</b> |
| <b>yší místo kr. silnice (Sedlo) mezi Novým světem a Schrei-</b>                |                         |             |
| <b>berhauem (Koř. 68. 156 Bar.) . . . . .</b>                                   | <b>841·0 . . . . .</b>  | <b>2661</b> |
| <b>šovy boudy, silnice při kamenném mostě (Koř. 68. 155. Bar.) . . . . .</b>    | <b>814·0 . . . . .</b>  | <b>1575</b> |
| <b>ní Schreiberhau, pruský celní úřad na silnici z Nového světa</b>             |                         |             |
| <b>do Josefíniny hutě (Koř. 68. 154. Bar.) . . . . .</b>                        | <b>763·0 . . . . .</b>  | <b>2414</b> |
| <b>sthal, jižně odtud, kde se pěšinka z Nového světa spojuje se</b>             |                         |             |
| <b>silnicí, z Hoffnungsthalu do Carlsthalu vedoucí, na hře-</b>                 |                         |             |
| <b>bení (Koř. 68. 164. Bar.) . . . . .</b>                                      | <b>844·0 . . . . .</b>  | <b>2670</b> |
| <b>sthal, sklárna (Koř. 68. 165. Bar.) . . . . .</b>                            | <b>788·0 . . . . .</b>  | <b>2493</b> |

### 5. Sedm dolů, Vysoké kolo a údolí Zackenské.

Zeměpisná šířka: 50° 45' až 50° 50'

Zeměpisná délka: 33° 10' až 33° 20'

Mimo to ještě krajina, jež severně odtud leží.

Z plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od |   | 300— 400 | metrů     | 0·5 | procent, |
|----------------------|---|----------|-----------|-----|----------|
| "                    | " | "        | 400— 500  | "   | 2·5      |
| "                    | " | "        | 500— 600  | "   | 11·7     |
| "                    | " | "        | 600— 700  | "   | 15·3     |
| "                    | " | "        | 700— 800  | "   | 9·0      |
| "                    | " | "        | 800— 900  | "   | 6·7      |
| "                    | " | "        | 900—1000  | "   | 7·8      |
| "                    | " | "        | 1000—1100 | "   | 6·8      |
| "                    | " | "        | 1100—1200 | "   | 18·7     |
| "                    | " | "        | 1200—1300 | "   | 6·8      |
| "                    | " | "        | 1300—1400 | "   | 12·5     |
| "                    | " | "        | 1400—1500 | "   | 1·7      |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

1. Holý vrch (Mumelberg), (Koř. 67. 216.) . . . . . 1354·7 . . . 4268
2. Kotel (Kesselberg), lysý vrchol 1300 metrů východně od nejvyšší boudy Dvorecké (Triang. Austr.) . . . . . 1435·1 . . . 4540
3. Pod vrchem Kotlem v dolu Kotelském při dolním konci jeho (Koř. 67. 215.) . . . . . 1038·5 . . . 3286
4. Krkonoš, skalnatý hřbet, nejvyšší místo (Koř. 67. 203.) . . . . . 1409·4 . . . 4459
5. Hofbaudengraben, kde údolí toto do Labe vchází (F. St. H.) . . . . . 833·1 . . . 2636
6. Labský důl (Elbgrund), bezprostředně pod vodopádem Labe (Koř. 67. 205.) . . . . . 1050·1 . . . 3322
7. Bouda u slapu Labského (Elbfallbaude) (Koř. 67. 534. Bar.) . . . . . 1284·3 . . . 4064
8. Labská Louka (Elbwiese), nejnižší místo sedla (Koř. 67. 204.) . . . . . 1258·2 . . . 3981
9. Slap potoka Pučavy, hořejší kamenná chalupa strážníková (Koř. 67. 535. Bar.) . . . . . 1295·3 . . . 4098
10. Sedm dolů, bouda „Pudlova“, základ (Koř. 67. 206.) . . . . . 1299·5 . . . 4112
11. „ bouda Mõhwaldova neb Martinova pod velikým Šišákem (F. St. H.) . . . . . 1060·6 . . . 3356
12. „ střední bouda Heinrichova aneb dvorecká bouda (Hofbaude) základ. (Koř. 67. 208.) . . . . . 1068·7 . . . 3380
13. „ Bradlerova bouda (Koř. 67. 207.) . . . . . 1155·2 . . . 3655
14. „ Tipeltova bouda severně od vrchu „na šancích“, základ. (Koř. 67. 196.) . . . . . 983·2 . . . 3111
15. „ „Na šancích“ (Festungsberg), lesnatý vrch, západně od Leyerových bud (Koř. 67. 197.) . . . . . 1017·2 . . . 3218
16. „ myslivna nad Leyerovými boudami, základ (Koř. 67. 527. Bar.) . . . . . 922·0 . . . 2917
17. „ hořejší nová Spindlerova bouda (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 528. Bar.) . . . . . 1214·6 . . . 3843
18. Malý Šišák (Kleine Sturmhaube), (Koř. 1867 čís. 102, 1868 čís. 56, 1871 čís. 16) . . . . . 1440·4 . . . 4557
19. Sedlo, nejnižší místo na hřebeni mezi Spindlerovou boudou a Petrovou boudou (Koř. 67. 529. Bar.) . . . . . 1164·3 . . . 3684
20. Petrova či Petermannova bouda (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 530. Bar.) . . . . . 1288·3 . . . 4076

Nadm. výška v met. Ve víd. stří.

|                                                                                                                 |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 21. Dívčí kameny (Mädelsteine), na nejvyšším místě vrchu, klepy jsou ještě as 7—8 m. vyšší (Koř. 67. 531. Bar.) | 1390·6 | 4400 |
| 22. Mládenčí kameny (Männersteine), skály 1·4 kilom. západně od Petrovy boudy (Triang. Austr.)                  | 1408·0 | 4455 |
| 23. Sedlo mezi Dívčími kameny a Velkým Šišákem (Koř. 67. 532. Bar.)                                             | 1330·7 | 4210 |
| 24. Velký Šišák, klepy na vrcholu (Koř. 67. 202.)                                                               | 1422·2 | 4500 |
| 25. Sedlo mezi Velkým Šišákem a Vysokým kolem (Koř. 67. 533 Bar.)                                               | 1369·9 | 4334 |
| 26. Vysoké Kolo, kamenitý vrchol, východně od boudy Březenské signal. kámen (Triang. Austr.)                    | 1506·7 | 4767 |
| 27. Mešný kámen (Veigelstein), jižně od Vysokého kola (Sen. Bar.)                                               | 1401·0 | 4433 |
| 28. Špičák (také Vogelsberg), vrchol západně od boudy nad Březny (Falck K.)                                     | 1353·6 | 4283 |
| 29. Špičák, nejvyšší skála (Koř. 71. 12.)                                                                       | 1465·5 | 4637 |
| 30. Sedlo mezi horami: Reifträger a Spitzberg (Koř. 71. 10.)                                                    | 1279·6 | 4049 |
| 31. Reifträger (Sinná hora), nejvyšší bod (Koř. 71. 9. 47.)                                                     | 1353·6 | 4283 |
| 32. Nová slezská bouda (Falck K.)                                                                               | 1171·6 | 3707 |
| 33. Slap Zackenský na hořejším začátku (Prud. 344.)                                                             | 827·8  | 2619 |
| 34. „ na dolejší konci (Prud. 345.)                                                                             | 801·6  | 2536 |
| 35. Řeka Zacken, při ústí tak zvaného potoka „Zackerle“ (Preuss. Verm. 230.)                                    | 620·2  | 1963 |
| 36. Slap Chuchelský (Kochel-Fall) (Fils 319.)                                                                   | 521·8  | 1651 |
| 37. Řeka Zacken, při ústí Chuchelné (Preuss. Verm. 231.)                                                        | 518·0  | 1639 |
| 38. Chuchelské domky na cestě k ochrannému domu (Koř. 68. 150. Bar.)                                            | 526·6  | 1666 |
| 39. Huť Josefínina, kr. silnice při kamenném mostě přes V. Zacken vedoucím (Koř. 68. 153. Bar.)                 | 663·3  | 2099 |
| 40. Marienthal, hostinec p. Königa 1. posch. (Koř. 68. 151. Bar.)                                               | 599·7  | 1896 |
| 41. „ Hohlenstein, skalnatý vrch u Marienthalu (Mosch)                                                          | 685·7  | 2169 |
| 42. „ nejvyšší dům (Fils 309.)                                                                                  | 717·0  | 2268 |
| 43. Schreiberhau, dolní konec vesnice u pyramidy vedlé mýta (Koř. 68. 149. Bar.)                                | 427·6  | 1353 |
| 44. „ kamencová huť, silnice (Fils 307.)                                                                        | 439·0  | 1389 |
| 45. „ evangelický kostel, základ (Fils 320.)                                                                    | 563·6  | 1783 |
| 46. „ ústav pro zanedbanou mládež (Rettungshaus) (Mosch.)                                                       | 598·5  | 1893 |
| 47. „ myslivna (Prud. 341.)                                                                                     | 619·0  | 1958 |
| 48. „ skalnatá hora „Rabenstein“ (Fils 310.)                                                                    | 727·6  | 2302 |
| 49. „ dům číslo 88. na jižním svahu Hochsteinu (Fils 317.)                                                      | 833·0  | 2635 |
| 50. „ hlavní silnice, nejvyšší místo v sedlu na Černé Hoře (Fils 313)                                           | 754·6  | 2388 |
| 51. „ sedlo mezi Černou Horou a Vysokým Kamenem (Fils 315.)                                                     | 943·0  | 2983 |
| 52. „ Černá Hora v Jizerském pohoří (Fils 314.)                                                                 | 957·7  | 3030 |
| 53. „ Kozí skály, 600 kroků od Vysokého Kamene (Fils 316.)                                                      | 1006·0 | 3183 |
| 54. Vysoký Kamen (Hochstein *), krajní skála (Mosch)                                                            | 1038·3 | 3285 |
| 55. Bouda u sněžných Březén, základ (Koř. 71. 45.)                                                              | 1498·8 | 4743 |
| 56. Věcí sněžné březno, hořejší okraj skal na západní straně Vysokého kola (Sen. Bar.)                          | 1491·0 | 4717 |
| 57. „ dolní okraj jeho (Sen. Bar.)                                                                              | 1124·0 | 3556 |
| 58. Černá března, horní okraj jejich (Falck. K.)                                                                | 1348·0 | 4265 |

\*) Výšku Vys. kamene spisovatel neměřil, udává se od rozličných autorů všelijak a sice v mezích od 886 až do 1100 metrů.



|                                                                                    | Nadm. výška v met. | Ve vid. stf. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 59. Korálový kámen, jihozápadně od Agnetendorfu (Falck K.) . . .                   | 858·0 . . .        | 2715         |
| 60. Široký kopec (Breite Berg), jihozápadně od Kieseowaldu (Fils 323.) . . .       | 730·4 . . .        | 2311         |
| 61. Homole (Hummelberg) u Kieseowaldu, jižní kupa (Fils 321.) . . .                | 685·0 . . .        | 2167         |
| 62. Vrch Holzberg, západně od Kieseowaldu (Fils 325.) . . .                        | 698·2 . . .        | 2209         |
| 63. Vrch Mühlberg u Kieseowaldu (Fils 322.) . . .                                  | 737·3 . . .        | 2333         |
| 64. Kieseowald, hořejší konec vesnice, myslivna (Fils 324.) . . .                  | 648·0 . . .        | 2050         |
| 65. Kieseowald, dolejší konec vesnice, dům č. 29 (Fils 326.) . . .                 | 546·0 . . .        | 1727         |
| 66. Kynast, základ hlavní věže na hradě (Koř. 71. 33.) . . .                       | 633·7 . . .        | 2005         |
| 67. Sedlo mezi vrchem Heerdberg a Kynastem (Fils 292.) . . .                       | 564·6 . . .        | 1786         |
| 68. Vrch Heerdberg u Hermsdorfu, severní vrchol (Fils 291.) . . .                  | 680·0 . . .        | 2151         |
| 69. Agnetendorf, severní konec tohoto místa dům č. 113 (Fils 283.) . . .           | 463·0 . . .        | 1465         |
| 70. „ jižní konec tohoto místa, dům č. 106 (Fils 284.) . . .                       | 595·0 . . .        | 1882         |
| 71. Turně (Thurmstein), jižně od Agnetendorfu (Fils 285.) . . .                    | 710·3 . . .        | 2247         |
| 72. Široký vrch mezi Agnetendorfem a Haynem (Fils 287.) . . .                      | 690·7 . . .        | 2185         |
| 73. Vrch Fuknerův, západně od Menclova vrchu (Fils 305.) . . .                     | 640·7 . . .        | 2127         |
| 74. Sedlo mezi vrchem Fuknerovým a Menclovým vrchem (Fils 306.) . . .              | 615·7 . . .        | 1948         |
| 75. Menclov vrch mezi Haynem a dolním koncem Agnetendorfu<br>(Fils 289.) . . .     | 663·0 . . .        | 2098         |
| 76. Sedlo mezi Menclovým vrchem a vrchem Herdberg (Fils 290) . . .                 | 566·5 . . .        | 1793         |
| 77. Saalberg, ves, jižní dům č. 63 (Fils 297.) . . .                               | 646·3 . . .        | 2045         |
| 78. „ nejdolejší dům č. 8 (Fils 301.) . . .                                        | 434·0 . . .        | 1373         |
| 79. Háje (Hayn), nejvyšší dům na cestě na Malý Šišák (Koř. 71. 17.) . . .          | 620·1 . . .        | 1962         |
| 80. Černý kopec, lesnatá hora jižně od Haynu (Koř. 71. 14. 65.) . . .              | 1099·0 . . .       | 3477         |
| 81. Semmeljunge, vrch jižně od Černé Hory (Falck. K.) . . .                        | 1258·6 . . .       | 3982         |
| 82. Hermsdorf, silnice u kostela, základ (Koř. 68. 147. Bar.) . . .                | 358·1 . . .        | 1133         |
| 83. Petrovice, silnice do Schreiberhau přes most (Kořistka 68.<br>148. Bar.) . . . | 374·6 . . .        | 1185         |
| 84. „ u kostela (Preuss. Verm. 259.) . . .                                         | 403·0 . . .        | 1275         |

## 6. Warmbrunn (Teplice) a Arnsdorf.

Zeměpisná šířka: 50° 45' až 50° 50'

Zeměpisná délka: 33° 20' až 33° 30'

Mimo to ještě krajina, jež severně odtud leží.

Z plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od | 300— 400  | metrů | 14·3 | procent, |
|----------------------|-----------|-------|------|----------|
| „ „ „ „              | 400— 500  | „     | 25·3 | „        |
| „ „ „ „              | 500— 600  | „     | 10·0 | „        |
| „ „ „ „              | 600— 700  | „     | 13·2 | „        |
| „ „ „ „              | 700— 800  | „     | 10·4 | „        |
| „ „ „ „              | 800— 900  | „     | 6·8  | „        |
| „ „ „ „              | 900—1000  | „     | 6·4  | „        |
| „ „ „ „              | 1000—1100 | „     | 5·5  | „        |
| „ „ „ „              | 1100—1200 | „     | 2·8  | „        |
| „ „ „ „              | 1200—1300 | „     | 3·3  | „        |
| „ „ „ „              | 1300—1400 | „     | 0·7  | „        |
| „ „ „ „              | 1400—1500 | „     | 0·7  | „        |
| „ „ „ „              | 1500—1600 | „     | 0·6  | „        |

|     |                                                                                                                                          | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Hirschberg, na náměstí (Preuss. Verm. 246.) . . . . .                                                                                    | 330·7 . . .        | 1046         |
| 2.  | „ domy blíž nádraží (Koř. 71. 31.) . . . . .                                                                                             | 344·3 . . .        | 1089         |
| 3.  | „ ústí řeky Zackenu do Bobravy (Prud. 336.) . . . . .                                                                                    | 312·5 . . .        | 989          |
| 4.  | Vrch „Na šancích“, holý skalistý vrchol západně od Hirschberka (Koř. 71. 4.) . . . . .                                                   | 420·9 . . .        | 1332         |
| 5.  | Gotschdorf, ves, dolní konec u domku č. 1 (Fils 274.) . . . . .                                                                          | 363·8 . . .        | 1151         |
| 6.  | Teplice pruské (Warmbrunn), dům u 3 lilií, přízemek, rámy u oken (Fils 271.) . . . . .                                                   | 335·4 . . .        | 1061         |
| 7.  | „ farní kostel, základ na severní straně (Koř. 71. 29.) . . . . .                                                                        | 346·5 . . .        | 1097         |
| 8.  | „ malé lázně (Prud. 347.) . . . . .                                                                                                      | 351·3 . . .        | 1111         |
| 9.  | „ vrch Weyrichsberg, v kavárně (Fils 273.) . . . . .                                                                                     | 375·7 . . .        | 1188         |
| 10. | „ vrch Scholzenberg východně odtud, nejvyšší místo (Fils 272.) . . . . .                                                                 | 433·0 . . .        | 1370         |
| 11. | Stonsdorf, silnice u Niederhofu (Fils 275) . . . . .                                                                                     | 359·0 . . .        | 1136         |
| 12. | Štěpánův vrch, severovýchodně od Stonsdorfu, nejvyšší místo (Fils 276.) . . . . .                                                        | 445·3 . . .        | 1410         |
| 13. | Prudlova hora u Stonsdorfu (Falck. K.) . . . . .                                                                                         | 470·7 . . .        | 1489         |
| 14. | Hrad Jindřichův (Heinrichsburg), jižně od středního Stonsdorfu, pata hradu (Fils 277.) . . . . .                                         | 497·5 . . .        | 1574         |
| 15. | Dolní Giersdorf, nejdolejší dům (Fils 293.) . . . . .                                                                                    | 340·5 . . .        | 1078         |
| 16. | Horní Giersdorf, u hospody „zum hohlen Stein“ (Fils 294.) . . . . .                                                                      | 379·3 . . .        | 1200         |
| 17. | Merzdorf, silnice před domem č. 26 (Fils 278.) . . . . .                                                                                 | 364·0 . . .        | 1152         |
| 18. | Vrch Březina (Birkigt), severozápadně od Saalbergu (Fils 300.) . . . . .                                                                 | 493·4 . . .        | 1561         |
| 19. | Háj (Hayn), vesnice, hostinec, č. 1 (Fils 295.) . . . . .                                                                                | 474·0 . . .        | 1500         |
| 20. | „ dům č. 60 (Fils 296) . . . . .                                                                                                         | 615·0 . . .        | 1946         |
| 21. | Slap potoka Hájského, spodní voda, povrchoň před mostem (Fils 299.) . . . . .                                                            | 545·2 . . .        | 1725         |
| 22. | Domy zvané „Mummelhäuser“, jižně od Háje (Falck. K.) . . . . .                                                                           | 553·6 . . .        | 1752         |
| 23. | Železná hora (Eisenberg), vrch blízko vsi „Mummelhäuser“ (Mosch) . . . . .                                                               | 555·4 . . .        | 1757         |
| 24. | Ptačí kámen (Vogelstein) nad vsí „Mummelhäuser“ (Mosch) . . . . .                                                                        | 571·0 . . .        | 1807         |
| 25. | Vrch Hostýn (Hoistein), blízko vsi „Mummelhäuser“ (Mosch) . . . . .                                                                      | 576·8 . . .        | 1825         |
| 26. | Hora „Gellner Berg“, jihovýchodně od Saalberka (Fils 303.) . . . . .                                                                     | 612·3 . . .        | 1937         |
| 27. | Domky Bavorovy (Baberhäuser), hoř. skupení domů (Koř. 71. 22.) . . . . .                                                                 | 679·0 . . .        | 2148         |
| 28. | Seydorf, prostřední výška toho místa (Letz. Rgb.) . . . . .                                                                              | 361·0 . . .        | 1142         |
| 29. | Hora Scheibenberg, jižně od Seidorfu (Koř. 71. 21.) . . . . .                                                                            | 751·2 . . .        | 2377         |
| 30. | Hora „Sammelstein“, severozápadně od Arnsdorfu (Koř. 71. 20. 55.) . . . . .                                                              | 877·9 . . .        | 2778         |
| 31. | Kameny Kravařovy (Krabersteine), (Koř. 71. 19.) . . . . .                                                                                | 681·6 . . .        | 2157         |
| 32. | Hora Kravařova (Krabersberg), západně od Arnsdorfu (Koř. 71. 18.) . . . . .                                                              | 798·4 . . .        | 2526         |
| 33. | Lomnice, řeka, ústí do Bobravy (Preuss. Verm. 224.) . . . . .                                                                            | 341·3 . . .        | 1080         |
| 34. | Lomnice u Erdmannsdorfu, kostel, základ (Koř. 71. 62.) . . . . .                                                                         | 393·8 . . .        | 1247         |
| 35. | Erdmannsdorf, hostinec „Schweizer Haus“ (Fils 279.) . . . . .                                                                            | 377·2 . . .        | 1194         |
| 36. | Hora Ameisenberg u Erdmannsdorfu (Koř. 71. 61.) . . . . .                                                                                | 498·1 . . .        | 1576         |
| 37. | Niederhof, severně odtud nejvyšší bod silnice z Hirschberka do Erdmannsdorfu (Preuss. Verm. 246.) . . . . .                              | 378·6 . . .        | 1198         |
| 38. | Arnsdorf, evangelický kostel, základ (Koř. 71. 56.) . . . . .                                                                            | 449·0 . . .        | 1421         |
| 39. | Kvířl, kde se silnice dělí (Preuss. Verm. 248.) . . . . .                                                                                | 391·4 . . .        | 1238         |
| 40. | Buchwald, kostel (Prud. 329.) . . . . .                                                                                                  | 435·6 . . .        | 1378         |
| 41. | Buchwald, vrch Hopfenberg u paty věže (Prud. 330) . . . . .                                                                              | 493·0 . . .        | 1560         |
| 42. | Ruhberg, letohrádek severozápadně od Schmiedeberka (Mosch) . . . . .                                                                     | 432·0 . . .        | 1370         |
| 43. | Schmiedeberk, na severozápadním začátku města na silnici (Druhé body týkající se Schmiedeberka viz v čísle 11.) Koř. 74. Bar.) . . . . . | 424·8 . . .        | 1344         |

|                                                                                                    | Nadm. výška v met. | Ve vid. stž. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 44. Buschvorwerk, dvůr západně od Schmiedeburka (Reym. K.)                                         | 470.6              | 1489         |
| 45. Steinsejfy, vesnice, u krčmy (Mosch)                                                           | 532.0              | 1683         |
| 46. Horní-Steinsejfy, nejvyšší domy blíže lesa (Koř. 71. 25.)                                      | 617.1              | 1952         |
| 47. Lomnický potok u Kversejfu (Preuss. Verm. 221.)                                                | 552.7              | 1749         |
| 48. Krummhübel, poslední hořejší domky (Letz. Rgb.)                                                | 627.6              | 1986         |
| 49. Brückenberk, hořejší domy (Koř. 71. 57.)                                                       | 829.2              | 2624         |
| 50. Kostel Wang v Brückenberku (Mosch)                                                             | 764.7              | 2419         |
| 51. Bouda Schnurbartova, jihozápadně od Krummhüblu (Falck. K.)                                     | 731.6              | 2315         |
| 52. Šlinglova bouda, základ. (Koř. 71. 53.)                                                        | 1078.5             | 3412         |
| 53. Hamplova bouda, základ domu (Falck. K.)                                                        | 1213.3             | 3839         |
| 54. Menší čili Pstruží stav (Sen. průměr ze 2 bar. měř.)                                           | 1178.2             | 3728         |
| 55. Horní okraj skal nad menším stavem (Sen. průměr z 5 bar. měř.)                                 | 1343.3             | 4250         |
| 56. Velký stav, střední výška povrchně vody (Koř. 67. 99.)                                         | 1249.5             | 3954         |
| 57. Horní okraj skal na jižním břehu velkého stavu (Sen. průměr z 4 bar. měř.)                     | 1374.0             | 4347         |
| 58. Polední kámen, severně pod touto horou horní konec lesa (Koř. 71. 28.)                         | 1197.7             | 3798         |
| 59. „ (Mittagstein), na stráni Lán (Falck. K.)                                                     | 1357.6             | 4295         |
| 60. „Na Lanech“ (Lahnberg), nejvyšší bod (Koř. 71. 27.)                                            | 1520.5             | 4811         |
| 61. Malá Sněžka, severozápadně od Velké Sněžky (Lieb. K.)                                          | 1333.6             | 4220         |
| 62. Smrková stráž (Schmiedeberský hřeben) východní vrchol, nedaleko mezníka č. 120 (Koř. 67. 110.) | 1286.6             | 4071         |
| 63. „ západní vrchol (skalnatý) nedaleko mezníku č. 130 (Koř. 67. 109.)                            | 1285.1             | 4066         |
| 64. Volská hora (Ochsenberg), lesnatý vrch jihozápadně od Schmiedeburgu (Koř. 71. 52.)             | 1031.7             | 3264         |
| 65. Lesní boudy (Forstbauden) pod smrkové stráni, nejvyšší domy (Koř. 71. 26.)                     | 891.3              | 2820         |
| 66. Vlčí paseka (Wolfshau), prostřední výška místa (Lieb. K.)                                      | 707.0              | 2237         |

## 7. Tannwald.

Zeměpisná šířka: 50° 40' až 50° 45'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od | 300—400 metrů | 0.9 procentů, |
|----------------------|---------------|---------------|
| „ „ „ „              | 400—500 „     | 22.7 „        |
| „ „ „ „              | 500—600 „     | 39.0 „        |
| „ „ „ „              | 600—700 „     | 29.1 „        |
| „ „ „ „              | 700—800 „     | 7.5 „         |
| „ „ „ „              | 800—900 „     | 0.8 „         |

|                                                                          | Nadm. výška v met. | Ve vid. stž. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Nová ves, nejvyšší domy na silnici do Smržovky, sedlo (Koř. 68. 140.) | 647.4              | 2048         |
| 2. Smržovka, mlýn „Buschmühle“, základ (Koř. 68. 160.)                   | 460.3              | 1456         |
| 3. „ tkalna na bavlnu pana Ungera (Koř. 68. 137.)                        | 505.2              | 1599         |
| 4. „ skupina domů 300 m. východně od zámku ležící (Koř. 68. 142.)        | 569.6              | 1802         |
| 5. „ domy v údolí východně od kostela (Koř. 68. 138.)                    | 570.3              | 1804         |

|     |                                                                                                                    | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6.  | Smržovka, kostel, základ. (Koř. 67. 337.) . . . . .                                                                | 650·4 . . . 2057                |
| 7.  | „ bání kostelní věže (Triang. Aust.) . . . . .                                                                     | 691·1 . . . 2186                |
| 8.  | „ hospoda „Kreuzschenke“, základ (Koř. 68. 167.) . . . . .                                                         | 631·6 . . . 1998                |
| 9.  | „ poslední nejvyšší domy na dolejších kraji lesa Studnického na cestě do Hořejšího Hamru (Koř. 68. 135.) . . . . . | 679·4 . . . 2149                |
| 10. | „ nejvyšší domy na vozové cestě do Černé Studnice u myslivny (Koř. 68. 136.) . . . . .                             | 750·7 . . . 2375                |
| 11. | „ návrší mezi papírnou a mlýnem „Buschmühle“ (Koř. 68. 141.) . . . . .                                             | 607·1 . . . 1920                |
| 12. | „ lesnatý vrchol ležící severozápadně od mlýna „Buschmühle“ (Koř. 68. 143.) . . . . .                              | 641·6 . . . 2030                |
| 13. | Brand, brustna pana Ullmanna (Koř. 68. 49. Bar.) . . . . .                                                         | 473·2 . . . 1497                |
| 14. | Tannwald, hostinec vedle kamenného mostu (Č. p. 115) (průměr z 4 měř.) (Koř. 68. 56. Bar.) . . . . .               | 450·4 . . . 1425                |
| 15. | „ pod přádelnou na bavlnu náležející Priebšchovi, základ (Koř. 68. 126.) . . . . .                                 | 577·5 . . . 1828                |
| 16. | Návrší zvané „Terezin vrch“ u Tannwaldu (Koř. 68. 119.) . . . . .                                                  | 622·2 . . . 1969                |
| 17. | Hora Muchovská, nejvyšší skála (Koř. 67. 310. et 68. 92) . . . . .                                                 | 781·5 . . . 2473                |
| 18. | Na Studnické hoře, východně odtud sedlo mezi ní a Muchovskou (Koř. 67. 310.) . . . . .                             | 743·5 . . . 2353                |
| 19. | Závrchy, osamělý dům na Studnické hoře (Koř. 68. 184.) . . . . .                                                   | 718·4 . . . 2273                |
| 20. | Beran, boudy na jihovýchodní straně Studnické hory (Koř. 67. 307.) . . . . .                                       | 761·9 . . . 2411                |
| 21. | Hora Studnická (Schwarzbrunnberg), hora jižně od Smržovky, nejvyšší bod (Triang. Aust.) . . . . .                  | 869·4 . . . 2751                |
| 22. | Sedlo mezi Studnickou horou a Šumburkem (Koř. 67. 546. Bar.) . . . . .                                             | 685·0 . . . 2167                |
| 23. | Přední zbytky, střední výška domů (Koř. 67. 308.) . . . . .                                                        | 690·3 . . . 2184                |
| 24. | Domy „Buschhäuser“, na jižní straně Studnické hory (Koř. 67. 312.) . . . . .                                       | 608·6 . . . 1926                |
| 25. | Hut (Labau), nejdolejší jihovýchodní dům (Koř. 67. 313.) . . . . .                                                 | 510·7 . . . 1616                |
| 26. | Pěncov, nejdolejší dům (Koř. 67. 314.) . . . . .                                                                   | 528·0 . . . 1670                |
| 27. | Bratříkov, horní mlýn (Koř. 67. 336.) . . . . .                                                                    | 454·0 . . . 1436                |
| 28. | Halšovice, největší dům ve středu tohoto místa (Koř. 67. 315.) . . . . .                                           | 506·8 . . . 1604                |
| 29. | Kříž na cestě ze Šumburka do Dupandy W. H. (Koř. 67. 316.) . . . . .                                               | 616·1 . . . 1949                |
| 30. | Dupanda, hospoda, základ. (Koř. 67. 317.) . . . . .                                                                | 532·6 . . . 1685                |
| 31. | Skuhrov, nejvyšší bod na hřebetě severovýchodním od jmenovaného místa, triangulační bod. (Koř. 71.) . . . . .      | 590·2 . . . 1868                |
| 32. | Těpeř, severně odtud „U břízy“, holé návrší (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 305.) . . . . .                             | 554·8 . . . 1756                |
| 33. | Místo při dělení se údolí loužnického a bratříkoveckého u břídičných lomů (Koř. 67. 547. Bar.) . . . . .           | 407·6 . . . 1290                |
| 34. | Loužnice, mlýn na horním konci tohoto místa (Koř. 67. 335.) . . . . .                                              | 456·8 . . . 1446                |
| 35. | Zásada, kostelíček, základ. (Koř. 67. 311.) . . . . .                                                              | 531·4 . . . 1681                |
| 36. | Hamr hořejší, první skupina domů na vozové cestě ze Zásady do Tannwaldu (Koř. 68. 120.) . . . . .                  | 598·5 . . . 1893                |
| 37. | „ jižně odtud se nalézající lesnatý vrch na vozové cestě odtud do Zásady (Koř. 68. 97.) . . . . .                  | 596·8 . . . 1887                |
| 38. | Svárov, skupina domů na dolejších kraji lesa u vozové cesty do Tannwaldu (Koř. 68. 121.) . . . . .                 | 471·2 . . . 1491                |
| 39. | Plavy, horní řada domů na jihozápadní straně (Koř. 68. 99.) . . . . .                                              | 488·7 . . . 1547                |
| 40. | „ západně odtud u dělení se údolí pod „Hamrem hořejším“ (Koř. 68. 98.) . . . . .                                   | 453·2 . . . 1434                |

|                                                                                                                  | Nadm. výška v met. | Ve vid. stě. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 41. Dřikov, kostel, u paty věže (Koř. 68. 96.) . . . . .                                                         | 500·6 . . .        | 1584         |
| 42. „ jihuovýchodní lesnatý vrch (Koř. 68. 89.) . . . . .                                                        | 561·6 . . .        | 1777         |
| 43. Machlov, nad mlýnem (Koř. 68. 87.) . . . . .                                                                 | 463·2 . . .        | 1466         |
| 44. Plchovský les, tam kde se křížuje silnice z Navarova se silnicí<br>do Jilového (Koř. 68. 88.) . . . . .      | 529·2 . . .        | 1675         |
| 45. Jilové, domy v severovýchodním koutě tohoto místa (Koř. 68. 85.)                                             | 514·2 . . .        | 1627         |
| 46. Vlastiboř, domy na horském hřebetu u vozové cesty k Machlov-<br>skému mlýnu vedoucí (Koř. 68. 84.) . . . . . | 464·4 . . .        | 1532         |
| 47. Navarov, ústí lhoteckého potoka do Kamenice, 3 m. nad hladinou<br>řeky (Koř. 68. 33. Bar.) . . . . .         | 364·7 . . .        | 1154         |
| 48. „ zámek, vedle kamenné sochy sv. Jana (Koř. 68. 32. Bar.)                                                    | 442·2 . . .        | 1399         |
| 49. „ východně ležící horský hřbet, severovýchodní roh lesa<br>(Koř. 68. 91.) . . . . .                          | 512·4 . . .        | 1621         |
| 50. Lhotka, první západní dům na vozové cestě odtud k Navarovu<br>(Koř. 68. 35. Bar.) . . . . .                  | 483·3 . . .        | 1529         |
| 51. Dolní Lhotecký mlýn, základ. (Koř. 68. 34. Bar.) . . . . .                                                   | 388·5 . . .        | 1229         |
| 52. Bohdalovice, nejvyšší domy ležící severovýchodně na čerenu (Koř.<br>68. 174.) . . . . .                      | 768·0 . . .        | 2430         |
| 53. Popelnice, severně odtud ležící skalnatý a lesnatý vrch (Koř. 68.<br>118.) . . . . .                         | 664·4 . . .        | 2101         |
| 54. Šumburk, na vozové cestě do Přichovic, kaplička pod domem č.<br>203 (Koř. 68. 46. Bar.) . . . . .            | 553·1 . . .        | 1750         |
| 55. „ východně odtud ležící lesnaté návrší jihozápadně od<br>Přichovic (Koř. 68. 117.) . . . . .                 | 737·8 . . .        | 2335         |

### 8. Vysoké a Rokytnice.

Zeměpisná šířka: 50° 40' až 50° 45'

Zeměpisná délka: 33° 0' až 33° 10'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od | 400— 500 metrů | 9·8 procent, |
|----------------------|----------------|--------------|
| „ „ „ „ 500— 600 „   | 21·5 „         |              |
| „ „ „ „ 600— 700 „   | 35·5 „         |              |
| „ „ „ „ 700— 800 „   | 18·5 „         |              |
| „ „ „ „ 800— 900 „   | 9·5 „          |              |
| „ „ „ „ 900—1000 „   | 3·7 „          |              |
| „ „ „ „ 1000—1100 „  | 1·3 „          |              |
| „ „ „ „ 1100—1200 „  | 0·2 „          |              |

|                                                                                                                            | Nadm. výška v met. | Ve vid. stě. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Stará ves, domy v údolí při dělení se vozové cesty k Jesenické<br>silnici (Koř. 68. 65) . . . . .                       | 587·7 . . .        | 1859         |
| 2. „ severozápadně od ní na horském hřebetu, kde se vozová<br>cesta do Jesenické silnice ústí (Koř. 68. 66.) . . . . .     | 638·2 . . .        | 2020         |
| 3. „ západně od ní poněkud lesem porostlé návrší (Koř.<br>68. 67.) . . . . .                                               | 648·1 . . .        | 2050         |
| 4. Humberk, výšina na polích 400 kroků severovýchodně od nejvyš-<br>ších chalup v Ruprechticích (Triang. Austr.) . . . . . | 694·3 . . .        | 2197         |
| 5. Vysoké, domy na jihovýchodním konci města (Koř. 68. 63.) . . . . .                                                      | 699·1 . . .        | 2211         |
| 6. „ hostinec na poště, vjezd (prům. z 6 měř.) (Koř. 68.<br>21 Bar.) . . . . .                                             | 704·8 . . .        | 2230         |

|                                                                                                                                 | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7. Vysoké, bání věže farního kostela (Triang. Austr.) . . . . .                                                                 | 723·1 . . . 2287                |
| 8. Petruškovy vrchy u Vysokého, nejvyšší bod (Koř. 68. 101.) . . . . .                                                          | 714·3 . . . 2260                |
| 9. Na severní straně „Petruškových vrchů“ silný pramen (Koř. 68. 39. Bar.) . . . . .                                            | 665·7 . . . 2106                |
| 10. Od „Petruškových vrchů“ severozápadně na nejvyšším rozchodu potoka Počáteckého (Koř. 68. 37. Bar.) . . . . .                | 496·2 . . . 1570                |
| 11. Trojanka, skupina domů u hospody (Koř. 68. 90.) . . . . .                                                                   | 596·6 . . . 1887                |
| 12. Stanové, východně od něho se nalézající osamělý hostinec „u Pece“ na silnici do Vysokého (Koř. 68. 64.) . . . . .           | 666·1 . . . 2107                |
| 13. Haratice, východně od nich ležící lesnatá výšina na hřbetu (Koř. 68. 100.) . . . . .                                        | 547·8 . . . 1734                |
| 14. Třič, domy nalézající se na hřbetě, jihozápadně tohoto místa (Koř. 68. 41.) . . . . .                                       | 663·3 . . . 2099                |
| 15. „ severně od něho, hřbet na cestě do Sklenářic (Koř. 68. 42.) . . . . .                                                     | 683·1 . . . 2161                |
| 16. Sklenářice (Glaserstorf), kde se Jablonecká silnice do cís. silnice Vysoké a Přichovické ústí (Koř. 68. 38. Bar.) . . . . . | 613·6 . . . 1941                |
| 17. Tomášův kopec, severně od Sklenářic lesnatý hřbet, nejvyšší bod (Koř. 68. 29) . . . . .                                     | 704·9 . . . 2230                |
| 18. Čermákov, severně od Sklenářic, skupina domů nedaleko, kde se silnice stará od nové dělí (Koř. 68. 22.) . . . . .           | 698·1 . . . 2206                |
| 19. Olešnice, na dolejší konci této vesnice, kde se údolí nedaleko mlýna u hospody dělí (Koř. 68. 36. Bar.) . . . . .           | 448·3 . . . 1418                |
| 20. „ západní pořadí domů na čepenu mezi touto a Bohdalo-<br>lovici (Koř. 68. 114.) . . . . .                                   | 597·0 . . . 1888                |
| 21. „ kaplička na cestě odtud do Přichovic, v sedlu (Koř. 68. 115.) . . . . .                                                   | 667·1 . . . 2110                |
| 22. „ severovýchodně, kde se nová Přichovická silnice na<br>čepenu otáčí (Koř. 68. 23.) . . . . .                               | 720·9 . . . 2281                |
| 23. Javorník, hora u Rejdic (Koř. 68. 24.) . . . . .                                                                            | 811·4 . . . 2567                |
| 24. Počátky, východně, kde stará silnice od Vysoké přes sedlo vede (Koř. 68. 25.) . . . . .                                     | 805·7 . . . 2549                |
| 25. Rejdický vrch, výška silnice na hřbetu, v stejné výši s vrchem, sedlo jest as o 5 m. nižší (Koř. 68. 43. Bar.) . . . . .    | 814·3 . . . 2572                |
| 26. Paseky, domy vedle kostela (Koř. 68. 111.) . . . . .                                                                        | 640·2 . . . 2026                |
| 27. „ nejvyšší skupina domů nalézající se v rohu lesa severo-<br>západně od kostela (Koř. 68. 27.) . . . . .                    | 776·1 . . . 2455                |
| 28. Přichovice, veliký jednopatrový dům kamenný v údolí k Tiefen-<br>bachu (Koř. 68. 129.) . . . . .                            | 705·2 . . . 2231                |
| 29. „ domy vedle kostela (Koř. 67. 333.) . . . . .                                                                              | 788·2 . . . 2494                |
| 30. „ farní kostel, základ věže (Koř. 68. 44. Bar.) . . . . .                                                                   | 792·7 . . . 2508                |
| 31. „ myslivna pod Štěpánskou hůrou (Koř. 68. 127.) . . . . .                                                                   | 899·7 . . . 2846                |
| 32. Libštát, vesnice jižně od Přichovic, dům na cestě ku Světlé (Koř. 68. 116.) . . . . .                                       | 622·2 . . . 1969                |
| 33. Šumburk na hranici proti Světlé na hřbetu, hostinec „u labutě“ (Koř. 68. 45. Bar.) . . . . .                                | 672·6 . . . 2128                |
| 34. Štěpánská hůra, východně od Přichovic (Triang. Aust.) . . . . .                                                             | 958·1 . . . 3031                |
| 35. Vrch Heidstein, východně od Přichovic nejvyšší skalní vrchol jeho (Koř. 68. 26.) . . . . .                                  | 960·8 . . . 3040                |
| 36. Hřbet Heidstein, nejvyšší bod na jeho východním konci (Koř. 68. 28) . . . . .                                               | 902·1 . . . 2854                |
| 37. Obora, dolejší skalní pláň na východním kraji vrchu Heidsteinu (Koř. 68. 30.) . . . . .                                     | 652·5 . . . 2065                |

|     |                                                                                                                | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 38. | Zabylé, nejvyšší skupina domů nalezající se na cestě k Jestřebí (Koř. 68. 50.) . . . . .                       | 652·9 . . .                     | 2066 |
| 39. | Jestřebí, nejhořejší skupina domů pod horou Kobylou (Koř. 67. 226.) . . . . .                                  | 866·5 . . .                     | 2740 |
| 40. | Dušnice dolní, dům v údolí nalezající se nad posledními k Jestřebímu patřícími domy (Koř. 68. 49.) . . . . .   | 498·0 . . .                     | 1576 |
| 41. | „ domy nalezající se na východní straně u Jízery na cestě k Františkovu (Koř. 68. 48.) . . . . .               | 514·8 . . .                     | 1629 |
| 42. | Horní Dušnice, dům na výšině západní obruby lesa (Koř. 68. 46.) . . . . .                                      | 733·4 . . .                     | 2320 |
| 43. | „ západně na holém hřebetu k Hejlovu (Koř. 68. 43.) . . . . .                                                  | 826·2 . . .                     | 2614 |
| 44. | Vojtěšice, jižně od tohoto místa roztroušené chalupy na horním hřebetu (Koř. 68. 47.) . . . . .                | 517·9 . . .                     | 1639 |
| 45. | „ východně lesnaté návrší (Koř. 68. 44.) . . . . .                                                             | 682·4 . . .                     | 2159 |
| 46. | Bratrouchov, skupina domů na jižní straně dle pěšinky do Horních Dušnic (Koř. 68. 45.) . . . . .               | 659·3 . . .                     | 2086 |
| 47. | Buřany, nejvyšší domy na hřebetě (Koř. 68. 40.) . . . . .                                                      | 568·9 . . .                     | 1800 |
| 48. | Končiny, jižně na lesnatém úbočí, hořejší okraj lesa (Koř. 68. 39.) . . . . .                                  | 657·5 . . .                     | 2081 |
| 49. | Strážnice (Wachsteinberg), jižně od Dolní Rokytnice (Koř. 68. 38.) . . . . .                                   | 773·2 . . .                     | 2447 |
| 50. | Franzenenthal, císařská silnice, první dům na staré silnici z Rokytnice do Jilemnice (Koř. 68. 110.) . . . . . | 778·6 . . .                     | 2463 |
| 51. | Sahlenbach, malá kaplička na západním konci tohoto místa na kopci (Koř. 68. 105.) . . . . .                    | 645·7 . . .                     | 2043 |
| 52. | „ dolní domy, kde se údolí dělí (Koř. 68. 107.) . . . . .                                                      | 610·0 . . .                     | 1930 |
| 53. | „ nejvyšší chalupy na západní straně Vlčího hřebenu (Koř. 68. 109.) . . . . .                                  | 839·4 . . .                     | 2655 |
| 54. | Dolní Rokytnice, poslední skupina domů na silnici k Machovu (Koř. 68. 104.) . . . . .                          | 510·3 . . .                     | 1615 |
| 55. | „ střední výška domů na západním konci silnice, do Jablonce vedoucí (Koř. 68. 103.) . . . . .                  | 520·5 . . .                     | 1647 |
| 56. | „ kostel, základ. (Koř. 68. 102.) . . . . .                                                                    | 530·5 . . .                     | 1679 |
| 57. | Horní Rokytnice, domy nalezající se u Černého potoka při hořejším roztoku ramen jeho (Koř. 68. 36.) . . . . .  | 700·9 . . .                     | 2218 |
| 58. | „ nejvyšší domy v lesním koutě na čertově pláni (Koř. 68. 35.) . . . . .                                       | 941·6 . . .                     | 2979 |
| 59. | Grenzdörfel, vesnice u Rokytnic, nejvyšší skupina domů (Koř. 68. 33.) . . . . .                                | 750·0 . . .                     | 2373 |

### 9. Svatý Petr (Spindelmühle).

Zeměpisná šířka: 50° 40' až 50° 45'

Zeměpisná délka: 33° 10' až 33° 20'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od |   | 500— 600 metrů | 0·7  | procent, |
|----------------------|---|----------------|------|----------|
| „                    | „ | 600— 700       | 11·0 | „        |
| „                    | „ | 700— 800       | 16·0 | „        |
| „                    | „ | 800— 900       | 26·8 | „        |
| „                    | „ | 900—1000       | 16·8 | „        |
| „                    | „ | 1000—1100      | 15·3 | „        |

|                                      |     |          |
|--------------------------------------|-----|----------|
| v nadmořské výšce od 1100—1200 metrů | 7.0 | procent, |
| " " " " 1200—1300 "                  | 5.0 | "        |
| " " " " 1300—1400 "                  | 0.8 | "        |
| " " " " 1400—1500 "                  | 0.6 | "        |

Nadm. výška v met. Ve víd. stří.

1. Horní Dvorecké boudy, pod Lysou horou (Koř. 67.) . . . 1182.1 . . . 3740
2. Dolní Dvorecké boudy, při Vlčím hřebenu (Koř. 67. 217.) . . . 1045.5 . . . 3308
3. Vlčí hřeben, severní skalný vrchol (Koř. 67. 218.) . . . 1150.7 . . . 3641
4. Hřeben „Kužel“, lesnatý vrchol, severozápadně od Tří domů  
(Koř. 67. 210.) . . . 1116.4 . . . 3532
5. Rezek (Jerusalem), myslivna na silnici z Jilemnice do Franzensthalu  
(Koř. 67. 220.) . . . 871.2 . . . 2757
6. „ severně odtud lesnatý vrch (Koř. 67. 219.) . . . 1041.6 . . . 3295
7. Tři domy, střední dům pod cestou, základ. (Koř. 67. 211.) . . . 802.8 . . . 2540
8. Kuželské údolí u Hutí (Koř. 67. 233.) . . . 752.8 . . . 2382
9. Vítkovice, nejhořejší dům pod lesem (Koř. 67. 235.) . . . 843.9 . . . 2670
10. „ domy pod vrchem Sv.-Janským u západního kraje lesa  
(Koř. 67. 234.) . . . 829.0 . . . 2623
11. „ kostel, základ věže, (Koř. 67. 230.) . . . 671.2 . . . 2123
12. „ v údolí východně od kostela (Koř. 67. 236.) . . . 632.0 . . . 2000
13. „ jihozápadně od kostela, návrší (Koř. 67. 229.) . . . 796.9 . . . 2521
14. Roudnice, skupina domů, pod cestou z Křeslic do Vítkovic na  
dolejším kraji lesa (Koř. 67. 227.) . . . 713.1 . . . 2256
15. Benecko, nejhořejší dům pod Heidlovým vrchem (Koř. 67. 228.) . . . 958.9 . . . 3034
16. Hora Klíč (Schüsselberg aneb Beerhübel), lesnatý vrch na vý-  
chodním konci Krkonoše (Koř. 67. 198.) . . . 1240.6 . . . 3925
17. Boudy „Schüsselbanden“, jižně odtud, lávka přes potok Jizeru  
(Koř. 67. 212.) . . . 812.9 . . . 2572
18. Hořejší „Schüsselbanden“, východně v sedle na cestě do Kraus-  
ových bud (Koř. 67. 536. Bar.) . . . 1016.0 . . . 3214
19. Kozí hřbet, štít na západním jeho konci (Koř. 67. 209.) . . . 1321.9 . . . 4183
20. „ nejvyšší místo pěšiny mezi ním a Studničnou (Koř.  
68. 57.) . . . 1409.7 . . . 4460
21. Sv. Petr, dolní meze lesů na cestě k Rennerově boudě (Koř. 71.  
Bar. 34.) . . . 892.0 . . . 2822
22. „ kaplička západně odtud, základ. (F. St. H.) . . . 834.0 . . . 2638
23. Sloup sv. Petra na rozcestí západně od sv. Petra (F. St. H.) . . . 871.8 . . . 2758
24. Sedm dolů, u stoku potoka Labe s Bílou vodou (Koř. 67. 526. Bar.) . . . 768.0 . . . 2430
25. Spindelmühle, východně od kostela na cestě k Sv. Petru v sedle  
(Koř. 67. 201.) . . . 900.0 . . . 2847
26. „ kostel, u vchodu, základ (průměr z 2 měř.) (Koř. 67.  
525. Bar.) . . . 761.3 . . . 2449
27. „ hostinec Erlebachův, základ. (F. St. H.) . . . 722.8 . . . 2287
28. „ na mostě přes Labe (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 524. Bar.) . . . 709.3 . . . 2244
29. Bedřichov (Friedrichsthal), most přes strouhu u pily na silnici  
do Vrchlabí (F. St. H.) . . . 690.1 . . . 2183
30. Mooshübel aneb Kreuselberg, nejvyšší bod (F. St. H.) . . . 1081.0 . . . 3419
31. Hora Svojsická (Schwozer Koppe), západně od Krausových bud  
(Koř. 67. 214.) . . . 1052.8 . . . 3331
32. Krausovy boudy, nejvyšší první dům na lesní cestě od Schüssel-  
ských bud k č. 18 (Koř. 67. 537. Bar.) . . . 817.3 . . . 2586
33. „ mlýn u švýcarského domku v údolí (prům. z 3 měř.)  
(Koř. 67. 523. Bar.) . . . 665.8 . . . 2105



Nadm. výška v met. Ve vid. stf.

34. Šerý Kámen (Finsterstein), lesnatý vrchol východně od Vítkovic (Triang. Austr.) . . . . . 1010·7 . . . 3197
35. Michlův mlýn pod vrchem Klauseberg (Koř. 67. 522. Bar.) . . . 642·3 . . . 2032
36. U Žezhulčí lávky nad soutěskou labskou a pod Volským dolem (Ochsengraben). (Koř. 67. 521. Bar.) . . . . . 601·0 . . . 1901
37. Herlikovice (Hackelsdorf), soutěska Labe, na silnici. (Řeka o 5 m. hlouběji (Koř. 71. Bar. 39.) . . . . . 564·0 . . . 1784
38. Na německém Heidelberku, sedlo mezi ním a Janským vrchem (Koř. 67. 539. Bar.) . . . . . 917·0 . . . 2901
39. Heidlova hora (Heidelberg), lesnatý vrchol západně od Herlikovic (Triang. Austr.) . . . . . 1035·0 . . . 3275
40. Přední boudy na cestě na Heidelberg, druhá nejvyšší bouda Č. 62. (Koř. 67. 538. Bar.) . . . . . 722·6 . . . 2286
41. Hora Stoh (Heuschober), východně od sv. Petra (Koř. 67. 257.) 1308·2 . . . 4139
42. Jahodí hora (Beerenberg), jihozápadně od Dvorecké boudy (Koř. 67. 261.) . . . . . 1306·1 . . . 4132
43. Na planině (Planur-Berg), lesnatá vysočina jižně od sv. Petra (Triang. Austr.) . . . . . 1189·5 . . . 3763
44. Boudy „Schönelahn“, přední na stráni (Koř. 67. 268.) . . . 896·6 . . . 2837
45. Heidelberg, lesnatý vrchol východně od Herlikovic (Triang. Austr.) 931·3 . . . 2946
46. „ na jihovýchodní stráni tohoto vrchu, kraj lesa nad domy Seidlovými (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 253.) . . . 863·0 . . . 2730
47. Husí boudy, nejhořejší bouda ve východním koutě (Koř. 67. 255.) 823·8 . . . 2607
48. Lahrový boudy, střední výška (Koř. 67. 256.) . . . . . 1076·7 . . . 3406
49. Mlýnský vrch (Mühlkoppe), lesnatý skalní vrchol severně od Dolních dvorů přír. půda (Koř. 67. 259.) . . . . . 831·0 . . . 2629
50. Boudy „Füllenbanden“, nejdolejší dům, základ. (Koř. 67. 254.) 797·2 . . . 2523
51. Hanapetrův Háj, lesnatý vrch severně od Dol. dvorů. (Koř. 67. 258.) 884·5 . . . 2799
52. Rudolfův důl, bouda na horské cestě z Niederhofu k Husím boudám (Koř. 67. 285.) . . . . . 835·9 . . . 2645

## 10. Sněžka.

Zeměpisná šířka: 50° 40' až 50° 45'

Zeměpisná délka: 33° 20' až 33° 30'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od |   |   | 600— 700 metrů | 5·3 procent, |
|----------------------|---|---|----------------|--------------|
| "                    | " | " | 700— 800       | 5·8          |
| "                    | " | " | 800— 900       | 13·5         |
| "                    | " | " | 900—1000       | 16·0         |
| "                    | " | " | 1000—1100      | 21·5         |
| "                    | " | " | 1100—1200      | 13·0         |
| "                    | " | " | 1200—1300      | 10·5         |
| "                    | " | " | 1300—1400      | 10·0         |
| "                    | " | " | 1400—1500      | 3·7          |
| "                    | " | " | 1500—1600      | 0·7          |

Nadm. výška v met. Ve vid. stf.

1. Zlatá hůra (Goldhöhe), nejhořejší boudy (Koř. 67. 260.) . . . 944·3 . . . 2988
2. Boudy Tuří (Auerwiesbanden), na ŠV Niederhofu (Koř. 67. 238.) 1010·0 . . . 3195

Nadm. výška v met. Ve víd. stří.

3. Bobí boudy (Bohnwiesbauden), nejhořejší na hřbetu (Koř. 67. 93.) 1106·8 . . . 3502
4. Velké Typlovky boudy, pod Forstberkem horní domy (Koř. 67. 105.) 986·3 . . . 3121
5. Bertholdův vrch, hrádek v Dunkelthalu, základ věže (Koř. 67. 140.) 734·1 . . . 2322
6. Lesnatý vrch blízko bud Umrlčích („Todtenbauden“) (Koř. 67. 106.) . . . 1037·9 . . . 3283
7. Velká Úpa, III. díl, Urlagovy boudy v údolí (Koř. 67. 103.) . . . 919·6 . . . 2910
8. „ boudy na sedle mezi Liščím vrchem a Slatinou straní (Moorlehne) (Koř. 67. 91.) . . . 1089·8 . . . 3448
9. Liščí vrch, 3·5 kilom. západně od hospody u Pecra (Triang. Austr.) 1362·6 . . . 4311
10. „ nejdolejší konec východního pole sněžného v srpnu 1867. (Koř. 67. 96.) . . . 1255·8 . . . 3974
11. Berovy horní boudy, nejhořejší domky (Koř. 67. 101.) . . . 1120·4 . . . 3487
12. Bouda uhlířů pod Baumberkem (Koř. 67. 100.) . . . 945·5 . . . 2992
13. Baumberg, vrch jihovýchodně od „Studničné hory“ ležící (Koř. 67. 97.) . . . 1150·7 . . . 3641
14. Richtrovy boudy, východní a horní bouda (Koř. 67. 104.) . . . 1244·2 . . . 3937
15. Boudy Studničné, dolní boudy (Koř. 67. 98.) . . . 1012·5 . . . 3204
16. Studničná (něm. Brunnberg), západní kupa tohoto hřbetu, pod jmenem „Hinterwiesenberg“ známá, 1300 metrů jihozápadně od Loučné boudy (Triang. Austr.) . . . 1554·4 . . . 4918
17. „ nejvýchodnější vrchol u „zahrádky Krakonoše“ (Koř. 67. 94.) . . . 1551·7 . . . 4909
18. „ sněhové pole, na jižní straní zahrady Krakonoše, horní konec (v srpnu 1867) (Koř. 67. 83.) . . . 1528·9 . . . 4822
19. „ dolní hranice t. pole (Koř. 67. 84.) . . . 1476·4 . . . 4661
20. Rennrova bouda, základ. (Koř. 71. Bar. 32.) . . . 1392·0 . . . 4404
21. Loučná bouda (Wiesenbaude), základ. (Koř. 71. Bar. 31.) . . . 1388·0 . . . 4392
22. „ (Sen. průměr z 8 rozličných měření.) . . . 1393·0 . . . 4407
23. Krčma „Kreutzschänke“ na cestě z Maršova do Velké Úpy (Koř. prům. z 3 měř. v r. 1867, 68.) . . . 632·0 . . . 2000
24. Velká Úpa, hospoda „u Pröllera“ blíže kostela (Koř. 67. Bar. 19.) 697·3 . . . 2206
25. Hospoda „u Pecra“, základ. (Koř. prům. ze 4 bar. měření v r. 1867, 68, 71) . . . 756·3 . . . 2391
26. Domy „Bantehäuser“, u lesa na cestě do Obřího dolu nad posledním domem (Koř. průměr z 4 bar. měření v roce 1867. 68. 71.) . . . 851·0 . . . 2692
27. Obří díl (Riesengrund), na dolejší konci u Schmidtlehnera u lávky přes Úpu (Koř. 71. Bar. 23.) . . . 888·0 . . . 2809
28. „ na hořejším konci, pod slapem Úpy (Koř. průměr ze 2 bar. měření v r. 1867. 71.) . . . 932·3 . . . 2950
29. „ krčma „u kovářny“ (Bergschmied) na cestě k Sněžce (Koř. průměr z 2 bar. měření v r. 1867. 71.) . . . 1010·3 . . . 3210
30. Sněžka, rokle na cestě od „kovárny“ na Sněžku (Koř. průměr z 2 bar. měř. v r. 1867. 71.) . . . 1218·6 . . . 3856
31. Obří bouda, bouda u paty Sněžky základ, (Koř. průměr z 2 bar. měření v r. 1867. 71.) . . . 1383·0 . . . 4376
32. Sněžka, vrchol střechy kaple, jež na nejvyšším místě stojí. (Triang. Austr.) . . . 1615·1 . . . 5110
33. „ základ této kaple (Triang. Austr.) . . . 1601·3 . . . 5066
34. „ horní plocha nového kamene signálního, 14 kroků jižně od kaple. (Nové evropské měření stupňové) . . . 1599·5 . . . 5060
35. „ hostinec na pruské straně, základ, přízemek. (Koř. 67. 111.) . . . 1582·3 . . . 5006

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

36. Sněžka, na východní patě u mezníka č. 172 (Koř. 67. 108.) . 1448·7 . . . 4583
37. Černá kupa, výšina na hlavním hřebtu 2·3 kilom. východně od Sněžky (Triang. Austr.) . . . . . 1410·6 . . . 4463
38. Nejnížší místo sedla mezi Černou kupou a Smrkovou stráni (Koř. 67. 504. Bar.) . . . . . 1168·8 . . . 3697
39. Lesní růže (Waldrose), vrch jižně od Sněžky (Koř. 67. 88.) . 1394·2 . . . 4412
40. Leišnerovy boudy, pod lesní růží, střední výška (Koř. 67. 90.) 1265·6 . . . 4004
41. Lvi hora (Löwenberg), lesnatý vrchol, jižně od Černé kupy (Koř. 67. 120.) . . . . . 1192·7 . . . 3773
42. Kraví hora (Kuhberg), lesnatý vrch západně od kostela sv. Petra průměr z 2 měření (Koř. 67. 119.) . . . . . 1091·8 . . . 3454
43. Bouda Braunova, vrch na začátku skalního hřebene, severovýchodně odtud (Koř. 67. 123.) . . . . . 1195·3 . . . 3782
44. Sagastrovy boudy, jilní domek (Koř. 67. 122) . . . . . 1288·3 . . . 4076
45. Pěnkaví hora (Finkenberg), vrch východně od Sagastrových bud (Koř. 67. 121.) . . . . . 1107·5 . . . 3504
46. Špičák (Spitzberg), v Dunkelthalském údolí, nad průsmykem (Koř. 67. 130.) . . . . . 877·8 . . . 2778
47. Dlouhý vrch, lesnatý vrchol 3 kilom. severně od zámku v Maršově (Triang. Austr.) . . . . . 1019·0 . . . 3224
48. Horní Kolbendorf, dům v údolí východně pod Dlouhým vrchem (Koř. 67. 131.) . . . . . 686·9 . . . 2173
49. „ dům s dřevěnou věžičkou na západní straně údolí, pod cestou z Malé Úpy do Michelsdorfu (Koř. 67. 130.) 939·0 . . . 2971
50. Sedlo mezi Dlouhým vrchem a Kolbenberkem na silnici (Koř. 67. 118.) . . . . . 1004·6 . . . 3178
51. Kolbenberg, lesnatý vrchol, příz. páda (Koř. 67. 117.) . . . 1187·3 . . . 3757
52. Malá Úpa, dům nedaleko stoku „malé Úpy“ s „Černým potokem“ (Koř. 67. 128) . . . . . 787·7 . . . 2492
53. „ horní dům na západním konci údolí pod lesem (Koř. 67. 127.) . . . . . 918·0 . . . 2904
54. „ horní dům u lesa, východní stráně údolí, as 800 m. od kostela, jihových. (Koř. 67. 126.) . . . . . 951·9 . . . 3012
55. „ hospoda u kostela ve výšce kostela (Koř. 67. 506. Bar.) 977·6 . . . 3093
56. Pod poslední boudou Černovodskou, dřevěná lávka přes struhu Fichtiggraben (Koř. 67. 505. bar.) . . . . . 930·8 . . . 2944
57. Rutterovy boudy, u sv. Petra nejhořejší (Koř. 67. 115.) . . . 1015·8 . . . 3214
58. Rennerovy boudy, u sv. Petra, nejvyšší u lesa (Koř. 67. 116.) . 1064·8 . . . 3369
59. Pfützensgrube, bouda na hřebtu před lesem (Koř. 67. 112.) . . 1001·7 . . . 3169
60. Pomezí boudy (Grenzbauden), mezní koly u silnice, základ. (Koř. 67. 113.) . . . . . 1052·5 . . . 3330
61. Lesnatý vrchol nad novými domky na hranici (Koř. 67. 114.) . 1098·0 . . . 3473

## 11. Königshan (a Schmiedebek v Prusku).

Zeměpisná šířka: 50° 40' až 50° 45'

Zeměpisná délka: 33° 30' až 33° 40'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 400— 500 metrů 5·3 procent,

„ „ „ 500— 600 „ 40·0 „

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| v nadmořské výšce od | 600— 700 metrů | 27·5 procentů, |
| " " " "              | 700— 800 "     | 7·2 "          |
| " " " "              | 800— 900 "     | 15·3 "         |
| " " " "              | 900—1000 "     | 4·7 "          |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|                                                                                                        |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ledlo k severovýchodu Valbeřic mezi hoř. Valbeřici a Michalovicí (Michelsdorf) (Koř. 67. 507. Bar.)    | 885·6  | 2802 |
| ledlo na silnici z hořejších Valbeřic do Opavy, kamenný sloup (Koř. 67. 508. Bar.)                     | 853·0  | 2699 |
| Ioř. Kolbendorf, hřbet k východu odtud u tří smrků v poli (Koř. 67. 133.)                              | 852·6  | 2698 |
| Ioř. Valbeřice, dřevěný kříž na rozcestí do Opavy (Koř. 67. 132.)                                      | 752·0  | 2379 |
| Valbeřice, dolejší díl nad ústím „Suchého Dolu“ (Koř. 67. 134.)                                        | 679·5  | 2150 |
| Typlovy kameny, východně Suchého Dolu, nejvyšší klepy (Koř. 67. 136.)                                  | 1002·5 | 3172 |
| Bobravská stráň, nejvyšší lesnatý vrchol na východ Kvintentalu (Koř. 68. 261.)                         | 894·3  | 2829 |
| Bobrava (řeka), prameny její (Preuss. Verm. 210.)                                                      | 741·0  | 2344 |
| Bobrava (vesnice), nejdolejší chalupa při severovýchodním konci vsi (Koř. 68. 270.)                    | 574·5  | 1818 |
| Černá voda, dům vlastníka dolů, dolejší rámec oken v přízemí (Koř. 68. 271.)                           | 611·0  | 1933 |
| Ioř. Černá voda, střední výška domů v údolí (Koř. 68. 273.)                                            | 538·9  | 1705 |
| Na šancích“ u Černé vody, 1·6 kilom. k severozápadu nádraží v Königshanu, holá výšina (Triang. Austr.) | 595·5  | 1884 |
| Na jih Königshanu, rozhraní vod nedaleko křižatky železné dráhy a čís. silnic (Koř. 68. 331.)          | 518·8  | 1642 |
| Königshan, nádraží, koleje (E. N. S. N. D. V. B.)                                                      | 517·4  | 1637 |
| " severně odtud stojící sloup pomezí při čís. silnici a na hranicích Pruských (Koř. 68. 283.)          | 493·5  | 1562 |
| Trančí hory, lesnatý vrch k severovýchodu hory Špičáku (Koř. 68. 284.)                                 | 855·6  | 2707 |
| Čočná hora ve Vraních horách (Prud. 384.)                                                              | 823·7  | 2606 |
| Bobrava, k severovýchodu odtud stojící vrch při cestě do Čepšdorfu na hranicích (Koř. 68. 280.)        | 657·3  | 2080 |
| Čepšdorf, u rychtáře (Prud. 376.)                                                                      | 604·3  | 1912 |
| " „Na hřebenech“, nejvyšší místo na hřebeti k jihozápadu odtud (Prud. 377.)                            | 635·6  | 2010 |
| Kunčice (Kunzendorf), domy na silnici od Bobrovy (Koř. 68. 262.)                                       | 604·3  | 1912 |
| Opava, špiče kostelní věže (Koř. 68. 264.)                                                             | 642·0  | 2031 |
| " nejnižší východní skupenství domů (Koř. 68. 267.)                                                    | 574·4  | 1817 |
| " severně odtud poněkud lesem porostlý vrchol na čerění (Koř. 68. 265.)                                | 749·3  | 2371 |
| " severně odtud nejvyšší místo silnice do Michalovic (Michelsdorfu) (Koř. 68. 268.)                    | 594·8  | 1882 |
| Michalovice (Michelsdorf), domy na dolejší konci vsi (Koř. 68. 269.)                                   | 538·0  | 1702 |
| Létské (Städtisch), jihozápadně odtud stojící „Vysoká hora“ (Koř. 68. 266.)                            | 938·9  | 2971 |
| Na syrovátkách“ (Molkenberg), na jih Schmiedeberka (Koř. 71. 66.)                                      | 943·5  | 2985 |
| Molkenberg, na jih Schmiedeberka, střední výška vsi (Koř. 71. 69.)                                     | 628·0  | 1987 |
| Schmiedeberk, severní konec při silnici (Preuss. Verm. 249.)                                           | 424·7  | 1343 |



Nadm. výška v met. Ve vid. stf.

|                                                                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 2. Jirkov, holá výšina 460 m. k severovýchodu posledních chalup tohoto místa (Triang. Austr.)                | 599·9 | 1898 |
| 3. „ chalupy na jižním konci (Koř. 67. 331.)                                                                 | 536·2 | 1697 |
| 4. Kamenice, severovýchodní skupenství domů (Koř. 71. 144.)                                                  | 447·4 | 1415 |
| 5. Velké Horky, nejhořejší chalupy (Koř. 67. 327.)                                                           | 413·7 | 1309 |
| 6. Skalský mlýn, výška silnice (Koř. 67. 548. Bar.)                                                          | 339·6 | 1075 |
| 7. Těpeře, u prostřed této vsi při ohybu cesty (Koř. 67. 545. Bar.)                                          | 444·3 | 1406 |
| 8. Bzí, výška domů u kostela (Koř. 67. 318.)                                                                 | 428·3 | 1355 |
| 9. Veselí, nejhořejší dům, základ (Koř. 67. 319.)                                                            | 456·7 | 1445 |
| 10. Brod Železný, kostel sv. Jana Nep., základ (průměr z 2 měř.) (Koř. 67. 323.)                             | 360·6 | 1141 |
| 11. „ severně odtud „Kněžsko“, socha panny Marie (Koř. 67. 544. Bar.)                                        | 357·8 | 1132 |
| 12. „ hostinec u pošty, základ (Koř. 67. 543. Bar.)                                                          | 281·3 | 890  |
| 13. „ nádraží, základ (E. N. S. N. D. V.)                                                                    | 287·7 | 910  |
| 14. Vrat, chalupy u prostřed vsi (Koř. 67. 320.)                                                             | 438·1 | 1386 |
| 15. Loučky Zadní, kostel, základ (Koř. 71. 132.)                                                             | 417·6 | 1321 |
| 16. Smrčí, skupenství chalup prostřed místa (Koř. 71. 133.)                                                  | 366·3 | 1159 |
| 17. Klokočí, chalupy v údolí (Koř. 71. 134.)                                                                 | 372·0 | 1177 |
| 18. Radštýn, prostřední výška vsi (Koř. 71. 125.)                                                            | 411·7 | 1302 |
| 19. „ hřbet k západu odtud (Koř. 71. 126.)                                                                   | 450·4 | 1425 |
| 20. Lochtuše, skupenství chalup na jižním konci vsi (Koř. 71. 137.)                                          | 390·6 | 1236 |
| 21. Chloundov, nejhořejší chalupy (Koř. 67. 321.)                                                            | 447·5 | 1416 |
| 22. Hamrštýn, skupenství chalup na holém, k jihu se kladoucím hřbetě (Koř. 71. 136.)                         | 532·8 | 1686 |
| 23. „ leanatá homole jihovýchodně odtud (Koř. 71. 135.)                                                      | 611·0 | 1933 |
| 24. Prackov, hořejší skupenství chalup na severozápadní straně (Koř. 71. 139.)                               | 546·4 | 1728 |
| 25. „ sedlo na cestě do Záhoří (Koř. 71. 153.)                                                               | 555·8 | 1759 |
| 26. Kozákov, holá výšina na nejvyšším místě tohoto hřbetu, 800 m. k severu vesnice Kozákova (Triang. Austr.) | 744·6 | 2356 |
| 27. „ nejvyšší vrchol, osamělý strom (Koř. 71. 4.)                                                           | 744·5 | 2365 |
| 28. Radostný, mlýn pod Kozákovem, hráz u rybníka (Koř. 71. 138.)                                             | 553·4 | 1751 |
| 29. Kozákov, nejdolejší domy ve vsi (Koř. 71. 520.)                                                          | 500·7 | 1584 |
| 30. „ k jihových. vesnice, skupenství domů, nazvané „u Lhoty“ (Koř. 71. 128.)                                | 511·6 | 1617 |
| 31. Komárov, prostřední výška vsi (Koř. 71. 154.)                                                            | 644·4 | 2038 |
| 32. Lhota, západní skupenství domů na cestě do vsi Kozákova, na hřbetě (Koř. 71. 91.)                        | 628·2 | 1988 |
| 33. Chuchelná, chalupy v údolí prostřed místa (Koř. 71. 164.)                                                | 445·5 | 1411 |
| 34. Slaná, chalupy v údolí na východ. konci (Koř. 71. 183.)                                                  | 859·0 | 1136 |
| 35. Světla, severně odtud místo na vysočině (Koř. 71. 184.)                                                  | 586·0 | 1854 |
| 36. Podmoklice, skupenství domů na jižním konci vsi (Koř. 71. 167.)                                          | 401·8 | 1272 |
| 37. „ dům nad dolejší mlýnem v ohbu silnice (Koř. 71. 151.)                                                  | 358·4 | 1118 |
| 38. Za Žlabem, u Záhoří, střední výška místa (Koř. 71. 149.)                                                 | 488·9 | 1547 |
| 39. Smrčí, hořejší domy při silnici (Koř. 71. 150.)                                                          | 499·1 | 1579 |
| 40. Dlouhé, hořejší domy nahoře na rovině (Koř. 67. 324.)                                                    | 504·8 | 1598 |
| 41. Brodec, při ústí do jizerského údolí (Koř. 67. 325.)                                                     | 280·9 | 889  |
| 42. Pelechov, střední výška (Koř. 67. 326.)                                                                  | 364·8 | 1155 |
| 43. Proseč, hořejší chalupy (Koř. 67. 330.)                                                                  | 426·5 | 1350 |
| 44. Horní Spalov, domy prostřed tohoto místa (Koř. 67. 328.)                                                 | 428·1 | 1354 |
| 45. Janíček, ves, střední výška (Koř. 68. 79.)                                                               | 505·1 | 1598 |
| 46. Janíčkův vrch, holá hůra, záp. vesnice téhož jména (Koř. 68. 80.)                                        | 544·0 | 1721 |

|                                                                                         | Nadm. výška v met. Ve vid. stf. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 47. Na Vrších, střední výška místa (Koř. 71. 143.) . . . . .                            | 459·5 . . . 1454                |
| 48. Bitouchov, střední výška domů na rovině (Koř. 71. 147.) . . .                       | 414·3 . . . 1311                |
| 49. Semily, prostřední výška města na náměstí (Sen. průměr ze 4<br>bar. měř.) . . . . . | 267·6 . . . 847                 |
| 50. „ stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.) . . . . .                               | 334·8 . . . 1059                |

### 13. Semily (východní díl) a Poniklé.

Zeměpisná šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměpisná délka: 33° 0' až 33° 10'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 11·8 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| „ | „ | „ | „ | 400—500 | „ | 40·2 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 500—600 | „ | 38·5 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 600—700 | „ | 9·5  | „ |

Nadm. výška v met. Ve vid. stf.

|                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Semily, východně odtud kaple při vysoké cestě do Benešova (Koř.<br>71. 165.) . . . . .                                                                                    | 433·6 . . . 1372 |
| 2. Boskov, fara, (zdanlivý základ) (Koř. 68. 78.) . . . . .                                                                                                                  | 497·4 . . . 1573 |
| 3. „ domy na jihu kostela (Koř. 71. 143.) . . . . .                                                                                                                          | 477·5 . . . 1511 |
| 4. „ holé návrší severovýchodně kostela (Koř. 68. 72.) . . . .                                                                                                               | 518·4 . . . 1640 |
| 5. Roztoky, hořejší domy na rovině (Koř. 68. 68. a 71. 145.) . .                                                                                                             | 518·6 . . . 1642 |
| 6. Severně Franctálu u Jesen ležící místo v údolí při pěšině z Vy-<br>sokého do Jesen (Koř. 68. 30. Bar.) . . . . .                                                          | 474·4 . . . 1501 |
| 7. Severovýchodní stráň nedaleko obruby lesa na polní cestě do<br>Roztok (Koř. 68. 73.) . . . . .                                                                            | 585·3 . . . 1852 |
| 8. Jeseny, zámek, viditelný základ (Koř. 68. 82.) . . . . .                                                                                                                  | 443·4 . . . 1402 |
| 9. „ nejsevernější chalupy při stezce do Navarova, u kamen-<br>ného kříže (Koř. 68. 31. Bar.) . . . . .                                                                      | 436·8 . . . 1382 |
| 10. „ domy v sedle proti Franctálu u mlýna (Koř. 68. 83.) . . . .                                                                                                            | 500·9 . . . 1585 |
| 11. Škodějov, nejhořejší domy na cestě do Příkrého (Koř. 68. 71.) .                                                                                                          | 556·8 . . . 1762 |
| 12. „ holá výšina k západu silnice do Příkrého (Koř. 71. 146.) .                                                                                                             | 606·7 . . . 1919 |
| 13. Lesnaté návrší severně od cesty ze Škodějova do Příkrého (Koř.<br>68. 69.) . . . . .                                                                                     | 607·1 . . . 1920 |
| 14. Příkré, chalupy v střední poloze tohoto místa (Koř. 68. 96.) .                                                                                                           | 498·4 . . . 1577 |
| 15. „ nejhořejší chalupa (Končinky) (Koř. 68. 70.) . . . . .                                                                                                                 | 522·2 . . . 1747 |
| 16. Benešov, domy na jižním kraji místa, na hřbetě (Koř. 71. 168.)                                                                                                           | 435·7 . . . 1378 |
| 17. Benešovský vrch, holá výšina k severu Benešova, triangulační<br>bod (Koř. 71. 140.) . . . . .                                                                            | 561·4 . . . 1776 |
| 18. Rybnice, hořejší domy na hřbetě (Koř. 71. 161.) . . . . .                                                                                                                | 509·1 . . . 1610 |
| 19. „ holá výšina 800 metrů severně odtud (Koř. 71. 160.) . . . .                                                                                                            | 552·6 . . . 1748 |
| 20. „ 1·4 kilom. severně odtud lesnatá výšina (Koř. 68. 12.) . . .                                                                                                           | 590·6 . . . 1869 |
| 21. Ruprechtice, kostel, základ (Koř. 68. 14.) . . . . .                                                                                                                     | 557·0 . . . 1762 |
| 22. „ nejvyšší domy v ohbu silnice blíže průtoku (Koř. 68.<br>19. Bar.) . . . . .                                                                                            | 639·1 . . . 2022 |
| 23. „ 450 m. západně od kostela, holé návrší (Koř. 68. 15.) . . . .                                                                                                          | 622·8 . . . 1971 |
| 24. „ severozápadně odtud ležící holé návrší, 155 kroků zá-<br>padně od nejvyššího místa silnice, vedoucí z Vysokého<br>do Škodějova — „na Svatově“ (Koř. 68. 60.) . . . . . | 667·5 . . . 2112 |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|                                                                                                                           |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 25. Ruprechtice, východně odtud holé návrší na cestě do Dol. Sitového (Koř. 68. 13.) . . . . .                            | 612·9 . . . . . | 1939 |
| 26. Kopanský mlýn, na silnici z Nové vsi do Ruprechtic (Koř. 68. 18. Bar.) . . . . .                                      | 482·3 . . . . . | 1526 |
| 27. Přivlaky, chalupy při ústí Ponikelského dolu, v údolí (Koř. 71. 261.) . . . . .                                       | 490·1 . . . . . | 1550 |
| 28. Hořejší Sitové, severně odtud stojící lesnatá výšina na horském hřebetu (Koř. 68. 58.) . . . . .                      | 608·1 . . . . . | 1924 |
| 29. Poniklé, skupenství domů na severovýchodní straně 600 kroků k severovýchodu kostela (Koř. 68. 51.) . . . . .          | 540·1 . . . . . | 1708 |
| 30. Starohorská, jižně odtud stojící svobodné návrší (Koř. 68. 53.) . . . . .                                             | 544·7 . . . . . | 1723 |
| 31. Nová ves, kamenný most přes Jizeru, asi 5 m. nad povrchní řeku (Koř. 68. 17. Bar.) . . . . .                          | 383·7 . . . . . | 1214 |
| 32. Víchov, holý vrch severovýchodně této vsi (Triang. Austr.) . . . . .                                                  | 675·7 . . . . . | 2138 |
| 33. " na dolejší konci v údolí u domu č. 40 pod školou (Koř. 68. 15. Bar.) . . . . .                                      | 420·1 . . . . . | 1332 |
| 34. K západu Víchova na stezce k Nové vsi v sedle u lípy (Koř. 68. 16. Bar.) . . . . .                                    | 515·2 . . . . . | 1630 |
| 35. Víchovská Lhota, západně odtud holý vrch (Koř. 68. 16.) . . . . .                                                     | 622·0 . . . . . | 1968 |
| 36. Hanušova skála, vrch u Křeslic (Koř. 68. 55.) . . . . .                                                               | 768·9 . . . . . | 2433 |
| 37. Ernstál, výška silnice u panské hospody (Koř. 68. 11.) . . . . .                                                      | 392·3 . . . . . | 1241 |
| 38. " jihozápadně 800 metrů odtud na stezce do Jilemnice (Koř. 68. 10.) . . . . .                                         | 463·3 . . . . . | 1466 |
| 39. Sitové, vých. odtud výška hřebetu (Koř. 71. 262.) . . . . .                                                           | 454·4 . . . . . | 1437 |
| 40. Dol.-Sitové, dům na pravé straně proti Peřimovu (Koř. 71. 264.) . . . . .                                             | 454·3 . . . . . | 1437 |
| 41. Peřimov, dům prostřed vsi (Koř. 71. 158.) . . . . .                                                                   | 392·1 . . . . . | 1240 |
| 42. Háje, chalupy na východním konci vsi (Koř. 71. 157.) . . . . .                                                        | 404·3 . . . . . | 1279 |
| 43. Benešov, jižně odtud v údolí Jizery (Koř. 71. 170.) . . . . .                                                         | 348·0 . . . . . | 1101 |
| 44. Čikvazka, hořejší chalupa na hřebetě (Koř. 71. 155.) . . . . .                                                        | 465·8 . . . . . | 1474 |
| 45. Valdice, dům prostřed místa (Koř. 71. 179.) . . . . .                                                                 | 451·5 . . . . . | 1429 |
| 46. " 1000 kroků odtud lesnaté návrší (Koř. 71. 171.) . . . . .                                                           | 491·5 . . . . . | 1555 |
| 47. Bystrá, chalupy na jihozápadním konci vsi (Koř. 71. 156.) . . . . .                                                   | 510·9 . . . . . | 1617 |
| 48. Dechník (Dehetník), lesnaté návrší asi 500 metrů k jihozápadu nejhořejších chalup v Bystré (Triang. Austr.) . . . . . | 556·4 . . . . . | 1760 |
| 49. Skalice, lesnaté návrší 1 kilom. k východu nejhořejších chalup v Bystré (Triang. Austr.) . . . . .                    | 579·7 . . . . . | 1834 |
| 50. Hájisko, kopec v lese asi 2 kilom. západ-severo-západně kostela v Mříčném (Triang. Austr.) . . . . .                  | 596·5 . . . . . | 1887 |
| 51. Vrch Hájisko, jihovýchodně odtud sedlo na cestě z Háje do Mříčného (Koř. 71. 180.) . . . . .                          | 536·1 . . . . . | 1696 |
| 52. Mříčné, kostel, viditelný základ (Koř. 71. 263.) . . . . .                                                            | 442·4 . . . . . | 1399 |
| 53. Cimrova hospoda k východu Kunratic na pokraji lesa (Koř. 71. 176.) . . . . .                                          | 452·6 . . . . . | 1432 |
| 54. Kunratice, domy v údolí prostřed místa (Koř. 71. 175.) . . . . .                                                      | 392·7 . . . . . | 1242 |
| 55. „U Klimenta“, holé návrší 300 m. jižně od nejjižnějších chalup Mříčenských (Triang. Austr.) . . . . .                 | 512·1 . . . . . | 1620 |
| 56. Kozinec, lesnatý hřbet jižně Dolánek (Koř. 71. 159.) . . . . .                                                        | 559·5 . . . . . | 1771 |
| 57. Jilemnice, západně odtud holé návrší (Koř. 71. 252.) . . . . .                                                        | 571·8 . . . . . | 1810 |



## 14. Jilemnice a Vrchlabí.

Zeměpisná šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměpisná délka: 33° 10' až 33° 20'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 400—500 metrů 44·0 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| " | " | " | " | 500—600 | " | 25·5 | " |
| " | " | " | " | 600—700 | " | 17·8 | " |
| " | " | " | " | 700—800 | " | 12·5 | " |
| " | " | " | " | 800—900 | " | 0·2  | " |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

1. Martinice u Jilemnice, stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) 481·4 . . . 1523
2. Jilemnice, špička věže farního kostela (Triang. Austr.) . . . 505·7 . . . 1600
3. " hostinec u české koruny (průměr z 2 pozorování.) (Koř. 68. 11. Bar.) . . . 460·8 . . . 1458
4. Hrabačov, hořejší domy na západní straně (Koř. 71. 253.) , . . 477·4 . . . 1510
5. " most přes malou Jizeru (Koř. 68. 13. Bar.) . . . 422·6 . . . 1337
6. Dolní Štěpanice, jižně odtud stojící vrch (Hrabačovská hůra) (Koř. 71. 260.) . . . 582·5 . . . 1843
7. Víchov, ves, východně od ní holé návrší, 240 kroků k západu lesa (Koř. 68. 1.) . . . 624·0 . . . 1974
8. " východně odtud sedlo na stezku do Hořejších Štěpanic (Koř. 68. 17.) . . . 588·1 . . . 1860
9. Stará silnice z Jilemnice do Horní Rokytnice, ohebná na vršku nad Dolními Štěpanicemi (Koř. 68. 14. Bar.) . . . 576·8 . . . 1825
10. Křeslice, kostel, makovice na věži (Koř. 67. 222.) . . . 738·1 . . . 2335
11. " základ kostela u věže (Koř. 67. 221.) . . . 718·7 . . . 2274
12. " domy v údolí pod kostelem (Koř. 67. 223.) . . . 706·9 . . . 2237
13. " výška silnice pod Hanšovou skalou (Koř. 68. 225.) . . . 772·9 . . . 2445
14. Hoř. Štěpanice, dolejší dům při rozstupu údolí k Merklovu (Koř. 68. 6.) . . . 549·3 . . . 1738
15. " nejhořejší domy západně kostela (Koř. 68. 4.) . . . 663·6 . . . 2099
16. " osamělý dům na jihovýchodní straně (Koř. 68. 5.) . . . 610·7 . . . 1932
17. Merklov, západní domy na hoře na rovině (Koř. 68. 7.) . . . 653·2 . . . 2067
18. Něm. Heidelberg, lesnatý vrchol 5 kilom. severo-západně kostela Vrchlabského (Triang. Austr.) . . . 1035·0 . . . 3275
19. Český Heidelberg, lesnatý vrchol jižně předešlého (Koř. 67. 540. Bar.) . . . 1026·6 . . . 3248
20. Domky na Heidelbergu, nejsevernější z nich na východní straně hory (Koř. 67. 294.) . . . 742·0 . . . 2348
21. Kněžice, nejhořejší domy (Koř. 67. 249.) . . . 711·6 . . . 2251
22. " kříž na rozcestí odtud do Merklova (Koř. 67. 241.) . . . 704·5 . . . 2229
23. " jihovýchodně odtud holé návrší (Koř. 67. 248.) . . . 699·8 . . . 2215
24. " porostlé návrší k jihozápadu odtud (Koř. 67. 250.) . . . 837·2 . . . 2649
25. Žaly, skupenství chalup na jihovýchodní straně Heidelberka (Koř. 67. 237.) . . . 832·4 . . . 2633
26. Pommerndorf, nejhořejší bouda v jihozápadní straně (Koř. 67. 267.) . . . 728·2 . . . 2304
27. U domků Seidlových, v sedle mezi Vachourem a Heidelbergem (Koř. 67. 541. Bar.) . . . 773·3 . . . 2447
28. Vachour, lesnatý vrch, přír. půda (střední z 2 měř.) (Koř. 67. 241.) . . . 817·4 . . . 2586
29. " jihových. odtud stará vápenice v sedle (Koř. 67. 264.) . . . 740·5 . . . 2343

|                                                                                                             | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 30. Sedlo mezi Vachourem a Jankovým vrchem (Koř. 67. 542. Bar.)                                             | 625·6 . . . 1979                |
| 31. Jankův vrch, nejvyšší bod. Průměr z 2 měření. (Koř. 67. 279.)                                           | 690·4 . . . 2184                |
| 32. Při vzniku potoka Raubachu, nejhořejší bouda (Koř. 67. 293.)                                            | 743·0 . . . 2351                |
| 33. Dolní dvůr (Niederhof), nejhořejší chalupa na cestě k Hanapetrově stráni (Koř. 67. 284.)                | 667·1 . . . 2110                |
| 34. " na hořejším konci vsi, ústí potoka od Husích bud do Heilbachu (Koř. 67. 269.)                         | 640·2 . . . 2032                |
| 35. " západně odtud vrch lesem porostlý (Koř. 67. 265.)                                                     | 787·8 . . . 2493                |
| 36. Horní Lanov, na hořejším severním konci vsi k Dolnímu dvoru, mlýn, v údolí (Koř. 67. 283.)              | 517·3 . . . 1637                |
| 37. " u lávky, na cestě odtud do Vrchlabí (Koř. 68. 7. Bar.)                                                | 506·1 . . . 1603                |
| 38. " severo-západně odtud kamenný kříž na cestě od staré vápenice (Koř. 67. 282.)                          | 573·3 . . . 1814                |
| 39. „Na šancích“ (Schanzenberg) na východ Vrchlabí. Střední ze 2 měření. (Koř. 67. 247.)                    | 543·5 . . . 1720                |
| 40. Hoř. Vrchlabí, jez pod Krausovým mlýnem, výška silnice (Koř. 67. 520 Bar.)                              | 546·3 . . . 1728                |
| 41. " západně odtud vrch v lese Hamerichově (Koř. 67. 252.)                                                 | 626·5 . . . 1983                |
| 42. Vrchlabí, špička věže farního kostela (Triang. Austr.)                                                  | 542·9 . . . 1661                |
| 43. " zámek hraběte Morzina, základ (Koř. 67. 244.)                                                         | 480·2 . . . 1520                |
| 44. " základy domů na náměstí, proti radnici (Koř. 67. 245.)                                                | 478·8 . . . 1515                |
| 45. " velký most silniční na jižním konci města (Koř. 67. 195.)                                             | 474·8 . . . 1503                |
| 46. " stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.)                                                             | 466·4 . . . 1474                |
| 47. " západně odtud stojící kamenný kříž pod Staffelberkem (Koř. 68. 8. Bar.)                               | 526·0 . . . 1664                |
| 48. Dol. Vrchlabí, východně odtud silnice do Středního Lanova u potoka Raubachu při průtoku (Koř. 67. 280.) | 481·8 . . . 1525                |
| 49. " jihovýchodně odtud holé návrší (Koř. 67. 274.)                                                        | 496·3 . . . 1570                |
| 50. Jilem, východně při silnici, východní roh lesa u Brabence (Koř. 71. 254.)                               | 526·6 . . . 1666                |
| 51. Tři domky (Dreihäuser), na západ Vrchlabí, nejhořejší domek (Koř. 67. 277.)                             | 529·2 . . . 1675                |
| 52. Valteřice, lávka přes potok na stezce do Vrchlabí (Koř. 68. 10. Bar.)                                   | 504·5 . . . 1596                |
| 53. " severozápadně odtud malý zarostlý vrch (Koř. 68. 8.)                                                  | 689·4 . . . 2181                |
| 54. U Susánka, holé návrší 400 m. západně Valteřic (Triang. Austr.)                                         | 613·8 . . . 1942                |
| 55. Branná, skupenství domů k severozápadu kostela (Koř. 71. 250.)                                          | 501·8 . . . 1588                |
| 56. " skalnatý hřeben „Výšplacha“ řečený, severovýchodně odtud nejvyšší bod (Koř. 67. 276.)                 | 569·3 . . . 1801                |
| 57. Sedlo na stezce z Branné do Vrchlabí (Koř. 68. 9. Bar.)                                                 | 544·6 . . . 1723                |
| 58. Principálek, holé návrší, 800 metrů vých.-jiho-východně od dvora v Branné (Triang. Austr.)              | 521·6 . . . 1650                |
| 59. Dolní Branná, kostel, základ (Koř. 71. 234.)                                                            | 433·0 . . . 1370                |
| 60. " jihovýchodně odtud lesnatý hřbet (Koř. 71. 244.)                                                      | 496·7 . . . 1571                |
| 61. Harta, přádelna, základ (Koř. 71. 235)                                                                  | 433·8 . . . 1372                |
| 62. " lesnatý hřbet jihovýchodně odtud (Koř. 71. 245.)                                                      | 491·3 . . . 1554                |
| 63. Kunčice (Pelsdorf), stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.)                                           | 416·1 . . . 1316                |
| 64. Nejvyšší místo silnice mezi Středním Lanovem a Vrchlabím (Koř. 67. 194.)                                | 494·0 . . . 1563                |
| 65. Střední Lanov, silniční most (Koř. 67. 193.)                                                            | 470·0 . . . 1487                |
| 66. Dolní Lanov, špička kostelní věže (Triang. Austr.)                                                      | 499·7 . . . 1581                |
| 67. " kostel, základ (Koř. 67. 271.)                                                                        | 463·3 . . . 1466                |
| 68. " místo v údolí, výška silnice nedaleko mlýna u kostela (Koř. 67. 273.)                                 | 438·8 . . . 1389                |

|                                                                          | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 69. Dolní Lanov, východně kostela na návrší železný kříž (Koř. 67. 296.) | 496·1              | . . . 1569   |
| 70. Cirmův kopec, 500 metrů východně Horního Lanova (Triang. Austr.)     | 613·3              | . . . 1940   |

### 15. Teplice Svatojanské a Vrajt.

Zeměpisná šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměpisná délka: 33° 20' až 33° 30'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od | 400—  | 500 metrů | 29·5 procent, |
|----------------------|-------|-----------|---------------|
| " " " "              | 500—  | 600       | 19·8          |
| " " " "              | 600—  | 700       | 17·7          |
| " " " "              | 700—  | 800       | 9·8           |
| " " " "              | 800—  | 900       | 5·5           |
| " " " "              | 900—  | 1000      | 7·7           |
| " " " "              | 1000— | 1100      | 4·3           |
| " " " "              | 1100— | 1200      | 5·2           |
| " " " "              | 1200— | 1300      | 0·5           |

|                                                                                            | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Schmidtdorf, domy na náhorní rovině u lesa (Koř. 71. 242.)                              | 529·3              | . . . 1675   |
| 2. " nejvyšší místo silnice (Koř. 67. 192.)                                                | 496·0              | . . . 1569   |
| 3. Čistá (Lauterwasser), silniční most ve vsi (Koř. 67. 191.)                              | 479·6              | . . . 1517   |
| 4. Silnice ze Sejf do Čisté, nejvyšší místo v lese (Koř. 67. 188.)                         | 501·8              | . . . 1588   |
| 5. Forst, bane na kostelní věži (Koř. 71. 318.)                                            | 486·7              | . . . 1540   |
| 6. " ve vesnici, most silniční přes potok (Koř. 67. 190.)                                  | 446·0              | . . . 1411   |
| 7. " jihovýchodně odtud nejvyšší místo silnice do Lázní (Forstbad) (Koř. 67. 190a.)        | 450·0              | . . . 1424   |
| 8. Lázně (Forstbad), střední výška na silnici (Koř. 67. 190b.)                             | 423·0              | . . . 1338   |
| 9. Kupa, návrší v lese 1·7 kilom. jihozápadně od zámku ve Forstu (Triang. Austr.)          | 524·4              | . . . 1659   |
| 10. Polkendorf (Bolkov) severo-západně odtud lysý vrch (Koř. 67. 303.)                     | 714·7              | . . . 2261   |
| 11. Sejfy (Hermannseifen), špička věže kat. kostela (Triang. Austr.)                       | 489·9              | . . . 1550   |
| 12. " fara, vedlé katolického kostela, základ (Koř. 67. 148.)                              | 438·9              | . . . 1389   |
| 13. " protestantský kostel, základ (Koř. 67. 149.)                                         | 517·4              | . . . 1637   |
| 14. " východně odtud, ovčinec (Koř. 67. 151.)                                              | 480·7              | . . . 1521   |
| 15. " návrší jihovýchodně od kat. kostela (Koř. 67. 304.)                                  | 496·9              | . . . 1572   |
| 16. " holé návrší, východně od protestantského kostela, velký strom v poli (Koř. 67. 150.) | 575·1              | . . . 1819   |
| 17. Johannesgunst, nejdolejší domy u lesa (Koř. 67. 152.)                                  | 455·0              | . . . 1440   |
| 18. Javorník horní (Helfendorf), nejhořejší dům, základ (Koř. 67. 165.)                    | 727·2              | . . . 2301   |
| 19. " zarostlý vrch, 1000 m. jihovýchodně odtud (Koř. 67. 161.)                            | 656·2              | . . . 2076   |
| 20. Javorník dolní (Mobren), dům při silnici na jižním konci vesnice (Koř. 67. 166.)       | 404·7              | . . . 1280   |
| 21. " farní kostel, základ u věže (Koř. 67. 156.)                                          | 468·1              | . . . 1481   |
| 22. " kamenný pomník, východně kostela na cestě do Hertvikovic (Koř. 67. 163.)             | 485·5              | . . . 1536   |

|                                                                                                                      | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| avorník dolní, vrch na hřbetě severozápadně kostela, při okraji lesa (Koř. 67. 153.) . . . . .                       | 490·8 . . . 1553                |
| „ lesem zarostlý vrch, severozápadně 400 m. od nejhořejších domů (Koř. 67. 155.) . . . . .                           | 656·9 . . . 2078                |
| a Žabím (Krötenpfedelsturz), návrší s lesíkem 1250 m. k severovýchodu kostela Javornického (Koř. 67. 162.) . . . . . | 542·6 . . . 1717                |
| ortvíkovice, škola (Koř. 67. 185.) . . . . .                                                                         | 467·0 . . . 1477                |
| eplice svatojanské (Johannisbad), mlýn v údolí (Koř. 68. 97. Bar.) . . . . .                                         | 557·3 . . . 1764                |
| „ villa „Belle vue“, vchod od silnice (prům. z 20 bar. poz. Koř. 68. 81. Bar.) . . . . .                             | 572·7 . . . 1812                |
| „ hostinec naproti kolonádě, přízemí (Koř. 68. 95. Bar.) . . . . .                                                   | 599·3 . . . 1895                |
| „ hůra Františka Josefa, glorietek (Koř. 68. 96. Bar.) . . . . .                                                     | 638·3 . . . 2018                |
| „ hospoda „Waldschenke“ (Koř. 68. 94. Bar.) . . . . .                                                                | 641·0 . . . 2028                |
| „ západně odtud pod Hofmannovou jedlí, hořejší konec údolí (Koř. 68. 307.) . . . . .                                 | 727·3 . . . 2301                |
| „ západně odtud Hofmannova jedle (sedlo) (Koř. 68. 306.) . . . . .                                                   | 785·1 . . . 2484                |
| „ myslivna pod Černou Horou nad sv. Janskými Teplícemi, základ (Koř. 67. 170.) . . . . .                             | 797·0 . . . 2522                |
| varcenberk, ves, první selský dvůr na cestě ze Svatoj. Teplíc (Koř. 67. 145.) . . . . .                              | 645·9 . . . 2044                |
| odrá kámen, skály nad vsí Švarcenberkem (Koř. 67. 178.) . . . . .                                                    | 951·4 . . . 3010                |
| l.-Janský vrch (zarostlý), jižně Svatojanských Teplíc (Koř. 67. 164.) . . . . .                                      | 740·2 . . . 2342                |
| a Ladech (Ladig), vysoký smrk (Koř. 67. 515. Bar.) . . . . .                                                         | 762·0 . . . 2411                |
| ápenný vrch, jižně Černé Hory u Svatojanských Teplíc (Koř. 67. 516. Bar.) . . . . .                                  | 836·3 . . . 2646                |
| mrčí hůra (Fichtenkoppe), holý vrch 600 metrů východně Švarctálu (Triang. Austr.) . . . . .                          | 685·4 . . . 2168                |
| Černém dolu, lávka přes potok „Fichtenwasser“ východně Švarctálu (Koř. 68. 6. Bar.) . . . . .                        | 661·7 . . . 2095                |
| arctál, náměstí, výška silnice při východní straně jeho (Koř. 67. 299.) . . . . .                                    | 591·2 . . . 1871                |
| „ západně odtud vápenné lomy v horském hřbetu (Koř. 67. 302.) . . . . .                                              | 696·9 . . . 2205                |
| „ holý vrch, jihozápadně odtud (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 298.) . . . . .                                            | 693·3 . . . 2194                |
| ová ves, hořejší konec při rozstupu hořejších údolí Černé Hory (Koř. 67. 300.) . . . . .                             | 733·8 . . . 2319                |
| ouda Pinerova (západní), základ (Koř. 67. 289.) . . . . .                                                            | 626·9 . . . 1984                |
| ouda Preislova, základ (Koř. 67. 286.) . . . . .                                                                     | 722·2 . . . 2285                |
| ouda v Medvědí Zahradě, základ (Koř. 67. 287.) . . . . .                                                             | 625·0 . . . 1977                |
| mešův vrch, východně Dolních dvorů, nejvyšší lysý vrchol (prům. z 2 měř.) (Koř. 67. 239.) . . . . .                  | 1013·5 . . . 3206               |
| a Benešově vrchu, jihovýchodní vrchol u Nové vsi (Koř. 67. 288.) . . . . .                                           | 993·7 . . . 3144                |
| mešovy boudy, základ (střední z 2 měř.) (Koř. 67. 240.) . . . . .                                                    | 877·9 . . . 2778                |
| a Benešově vrchu, jihozápadní hřbet, lesnatý vrchol nad Preislovou boudou (Koř. 67. 263.) . . . . .                  | 772·1 . . . 2442                |
| ofmannova bouda, základ (Koř. 67. 169.) . . . . .                                                                    | 812·3 . . . 2570                |
| a Černé Hoře, západní hřbet, skalitý hřeben proti Benešovu vrchu (Koř. 67. 301.) . . . . .                           | 969·0 . . . 3066                |
| olní Špiglovy boudy na Černé Hoře (Koř. 67. 292.) . . . . .                                                          | 903·2 . . . 2858                |

|                                                                                                                        | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 56. Nejhořejší Špiglový boudy na Černé Hoře (Koř. 67. 295.) . . .                                                      | 1120·7 . . .                    | 3546 |
| 57. Horní Zinkova bouda " " " (Koř. 67. 171.) . . .                                                                    | 1121·9 . . .                    | 3550 |
| 58. Malé Kühnlovy boudy " " " (Koř. 67. 174.) . . .                                                                    | 1037·5 . . .                    | 3282 |
| 59. Velké Kühnlovy boudy, tři chalupy v západní stráni hory Forstberka (střední z 2 měření) (Koř. 67. 35.) . . .       | 1138·0 . . .                    | 3601 |
| 60. Černá Hora, západní stráž na cestě k Špiglovým boudám (střední z 2 měření) (Koř. 67. 297.) . . .                   | 1194·4 . . .                    | 3779 |
| 61. Černá Hora (Spiegel), nejvyšší bod na ploše této hory severozápadně od Teplic Svatojanských (Triang. Austr.) . . . | 1299·4 . . .                    | 4111 |
| 62. Sedlo mezi Černou horou a Forstberkem (Koř. 67. 36.) . . .                                                         | 1175·8 . . .                    | 3758 |
| 63. Forstberk, vrchol (střední z 2 měř.) (Koř. 67. 34.) . . .                                                          | 1258·2 . . .                    | 3981 |
| 64. Hartenštejn, velká skála na vrchu „Forstberku“ (Koř. 67. 172.) . . .                                               | 828·9 . . .                     | 2607 |
| 65. Hořejší Krausovy boudy, v jihovýchodní stráni Forstberka, střední výška (Koř. 67. 143.) . . .                      | 947·0 . . .                     | 2996 |
| 66. Krausovy boudy, nad Maršovským kostelem (Koř. 67. 142.) . . .                                                      | 755·2 . . .                     | 2390 |
| 67. Maršov (Marschendorf), kostel, vchod (Koř. 67. 141.) . . .                                                         | 603·0 . . .                     | 1910 |
| 68. „ zámek, základ (Koř. průměr z 5 měř. v roce 1867. 68. 71.) . . .                                                  | 572·0 . . .                     | 1810 |
| 69. „ lesnatý vrchol k severovýchodu proti kostelu (Koř. 67. 146.) . . .                                               | 666·7 . . .                     | 2109 |
| 70. Kraví hora, kupa asi 550 metrů od Vrajtu (Triang. Austr.) . . .                                                    | 681·0 . . .                     | 2155 |
| 71. Sedlo mezi loukou Rýchorskou a Kraví horou a Vrajtu (Koř. 67. 513. Bar.) . . .                                     | 644·6 . . .                     | 2039 |
| 72. Wehrhübel, vrch západně od Vrajtu (Koř. 67. 517. Bar.) . . .                                                       | 616·0 . . .                     | 1949 |
| 73. Vrajt (Freiheit) stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . .                                                   | 511·5 . . .                     | 1619 |
| 74. „ Štův hostinec u mostu, zákl. (prům. z 3 měř. (Koř. 67. 502. Bar.) . . .                                          | 510·0 . . .                     | 1614 |
| 75. „ pramen sv. Víta pod svatovítskou kapličkou ve Vrajtu (kaplička 8—10 m. výše) (Koř. 67. 514. Bar.) . . .          | 613·6 . . .                     | 1942 |
| 76. Buky Mladé, bání kostelní věže (Koř. 68. 309.) . . .                                                               | 553·4 . . .                     | 1751 |
| 77. „ dům vedle kostela, základ (Koř. 67. 176.) . . .                                                                  | 501·1 . . .                     | 1585 |
| 78. „ výška silnice na starém můstku v údolí Úpy (Koř. 67. 177.) . . .                                                 | 481·6 . . .                     | 1524 |
| 79. „ kaplička jižně kostela na silnici do Břecšteinu (Koř. 67. 175.) . . .                                            | 528·0 . . .                     | 1670 |
| 80. „ severozápadně odtud návrší na pěšince do Svatojanských Teplic (Koř. 67. 183.) . . .                              | 573·4 . . .                     | 1814 |
| 81. Břecštejn (Silberstein) západně odtud lesnatý vrch s gloriem (Koř. 67. 64.) . . .                                  | 504·5 . . .                     | 1597 |
| 82. „ lesem porostlá skála západně odtud (Koř. 67. 168.) . . .                                                         | 515·4 . . .                     | 1630 |
| 83. Vlčice, lesem obrostlá skála severně od nejhořejších chalup (Koř. 67. 160.) . . .                                  | 543·6 . . .                     | 1720 |

## 16. Zaclěr.

Zeměpisná šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměpisná délka: 33° 30' až 33° 40'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 400— 500 metrů 29·3 procent,

" " " " 500— 600 " 42·8 "

|                      |      |           |               |
|----------------------|------|-----------|---------------|
| v nadmořské výšce od | 600— | 700 metrů | 11·0 procent, |
| " " " "              | 700— | 800 " "   | 7·0 "         |
| " " " "              | 800— | 900 " "   | 4·7 "         |
| " " " "              | 900— | 1000 " "  | 5·2 "         |

|                                                                                                    | Nadm. výška v met. | Ve vzd. stří. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| plův vrch, holá výšina 1600 metrů jihovýchodně od kostela v Mladých Bukách (Triang. Austr.)        | 581·6              | 1840          |
| rtovy domky, západně od Hoř. Starého města, nejhořejší dům v údolí (Koř. 67. 518. Bar.)            | 404·6              | 1280          |
| Čertových domků, lesnatý vrchol vých.-západně odtud, jihozápadně od vrchu Seplova (Koř. 67. 22.)   | 542·3              | 1716          |
| ř. Staré Město, kostel, makovice věže (Koř. 67. 25.)                                               | 574·8              | 1819          |
| " dům při silnici u kostela, základ (Koř. 67. 24.)                                                 | 441·7              | 1398          |
| " stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.)                                                        | 448·9              | 1420          |
| " cihelny, jihozápadně kostela (Koř. 67. 23.)                                                      | 447·0              | 1414          |
| " lesnaté návrší, severo-východně odtud při vrchu Scharte (Koř. 67. 27.)                           | 473·3              | 1497          |
| ví hora, severo-východně stanice Staroměstské (Koř. 67. 181.)                                      | 550·1              | 1740          |
| ify dolní, nejhořejší dům pod lesem (Antonienthal) (Koř. 67. 178.)                                 | 555·0              | 1756          |
| lenařovice (Glasendorf), nejdolejší selský dvůr na cestě do Klinge (Koř. 67. 180.)                 | 607·6              | 1922          |
| stel, vrch západně Sklenařovic (Koř. 67. 179.)                                                     | 816·2              | 2583          |
| jihořejší vápenice západně pod horou Seifenberkem (Koř. 67. 512 Bar.)                              | 885·0              | 2800          |
| chory (Rehhorn), ves, selská chalupa na cestě od vápenic do Kvintentálu (Koř. 67. 509. Bar.)       | 858·6              | 2717          |
| lká vápenice nad vesnicí Rýchory (Koř. 67. 510. Bar.)                                              | 931·3              | 2946          |
| chory (Rehhorn), selský dvorec, hořejší skupenství domů (Koř. 67. 39.)                             | 872·9              | 2762          |
| " jiho-východně odtud, kde údolí se dělí (Koř. 67. 40.)                                            | 636·6              | 2014          |
| " na jižní straně, severo-východně vsi Klinge, hořejší konec velkého lesa (Koř. 67. 305.)          | 707·6              | 2239          |
| " plasa pod dvoreckým lesem (Hofbuschberg) (Koř. 67. 41.)                                          | 923·1              | 2920          |
| orecký les (Hofbuschberg), nejvyšší bod vrchu Rýchorského (Triang. Austr.)                         | 1022·7             | 3236          |
| chorské louky, nejvyšší místo (Koř. 67. 147.)                                                      | 1006·9             | 3186          |
| ála Quetschenstein, východně od Maršova na louce Rýchorské (prům. z 3 měř.) (Koř. 67. 129.)        | 1000·2             | 3165          |
| chý Důl, železný kříž na cestě z Rýchor (Koř. 67. 135.)                                            | 891·8              | 2822          |
| rnířovice, jiho-západně odtud ležící lesík, ve straně ku Trautenbachu (Koř. 67. 38.)               | 731·2              | 2314          |
| " (Wernsdorf), střední výška domů (Koř. 68. 251.)                                                  | 685·6              | 2169          |
| " jiho-východně odtud stojící lesnatý vrch (Koř. 68. 252.)                                         | 710·9              | 2275          |
| autenbach, kaplička prostřed této vsi, základ (Koř. 68. 301.)                                      | 520·5              | 1663          |
| " nejhořejší chalupa při vozové cestě do Vernířovic (Koř. 68. 299.)                                | 666·6              | 2109          |
| " severně odtud ležící nejvyšší místo silnice k Zacléri v sedle, (průměr z 2 měř.) (Koř. 68. 254.) | 646·7              | 2046          |
| " severo-západně odtud louka v údolí u roha lesa (Koř. 68. 302.)                                   | 570·2              | 1804          |
| šina leskem porostlá, severo-západně od Trautenbachu, jihozápadně od Vernířovic (Koř. 68. 303.)    | 737·0              | 2332          |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|     |                                                                                                                                      |             |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 32. | Zacléř, k jiho-západu odtud nejnižší místo silnice do Trautenbachu u horních domků v Malém Krinsdorfu (Chřenově) (Koř. 68. 75. Bar.) | 536·7 . . . | 1698 |
| 33. | „ farní kostel, základ, (střed 2 výměř.) (Koř. 68. 245.)                                                                             | 607·3 . . . | 1921 |
| 34. | „ makovice kostelní věže (Koř. 68. 298.)                                                                                             | 644·9 . . . | 2040 |
| 35. | „ hostinec pana Breyera „u purkmistra“ (Koř. 68. 69. Bar.)                                                                           | 603·4 . . . | 1909 |
| 36. | „ přádelna na severním konci města (Koř. 68. 279.)                                                                                   | 593·1 . . . | 1876 |
| 37. | „ zámek na kopci (Koř. 68. 246.)                                                                                                     | 654·2 . . . | 2070 |
| 38. | „ východně odtud místo na hřbetu u kraje lesa (Koř. 68. 249.)                                                                        | 630·7 . . . | 1995 |
| 39. | „ jiho-východně odtud leanatý vrch, západně od Velkého Krinsdorfu (Chřenova) (Koř. 68. 250.)                                         | 590·8 . . . | 1870 |
| 40. | „ severo-západně odtud nejvyšší místo příkrého hřebene řečené „auf der Kuppe“ (Koř. 68. 274.)                                        | 724·8 . . . | 2294 |
| 41. | Bobravská stráň, prameny řeky Bobravy (Koř. 68. 260.)                                                                                | 779·4 . . . | 2466 |
| 42. | Šachta „sv. Jiří“ u Zacléře náležící svob. pánu ze Silberšteina (Koř. 68. 72. Bar.)                                                  | 606·1 . . . | 1927 |
| 43. | Lampertice, chalupy při hořejším konci údolí (Koř. 68. 285.)                                                                         | 511·8 . . . | 1620 |
| 44. | „ domy při dolejších konci údolí nad mlýnem (Koř. 68. 286.)                                                                          | 477·7 . . . | 1511 |
| 45. | Dvůr (Hof), východně Lampertic, střední výška (Koř. 68. 287.)                                                                        | 542·9 . . . | 1718 |
| 46. | Velký Chřenov (Krinsdorf), u prostřed tohoto místa při rozchodu údolí (Koř. 68. 244.)                                                | 475·6 . . . | 1505 |
| 47. | „ železničný most, koleje (E. N. d. S. N. V. B.) (Koř. 68. 328.)                                                                     | 471·6 . . . | 1492 |
| 48. | „ železničný most, v žlabu údolí (E. N. d. S. N. V. B.) (Koř. 68. 327.)                                                              | 454·4 . . . | 1438 |
| 49. | Malý Chřenov (Krinsdorf), dolejší chalupy na západním konci této vsi (Koř. 68. 300.)                                                 | 560·5 . . . | 1774 |
| 50. | „ východně odtud ležící holé návrší (Koř. 68. 243.)                                                                                  | 545·4 . . . | 1725 |
| 51. | Vrch „Reusse“ lesem obrostlý, 350 metrů severně Stachelberku (Koř. 68. 253.)                                                         | 629·9 . . . | 1993 |
| 52. | Ježová hora (Stachelberg), holý vrchol východně Trautenbachu (Triang. Austr.)                                                        | 622·7 . . . | 1970 |
| 53. | Trutnovský les, lysina na nejvyšším zarostlém vrcholu 840 metrů jižně Stachelberka blíž Trautenbachu (Koř. 68. 293.)                 | 674·5 . . . | 2134 |
| 54. | Sedlo mezi Gabersdorfem a Trautenbachem (Koř. 68. 77. Bar.)                                                                          | 616·4 . . . | 1950 |
| 55. | Gabersdorf, výška údolí poblíž kostela (Koř. 68. 315.)                                                                               | 438·2 . . . | 1387 |
| 56. | „ železničný most, koleje (Koř. 68. 326.)                                                                                            | 425·2 . . . | 1345 |
| 57. | „ železničný most, místo v údolí pod mostem (Koř. 68. 325.)                                                                          | 406·3 . . . | 1286 |
| 58. | „ jižně od kostela zarostlý vrch mezi touto vsí a Voletiny (Koř. 68. 316.)                                                           | 537·4 . . . | 1700 |
| 59. | Na Pruské cestě, návrší 1200 metrů sev.-sev.-východně Nového Dvoru u Trutnova (Triang. Austr.)                                       | 578·0 . . . | 1813 |
| 60. | Voletiny, hořejší domy na severo-západním konci (Koř. 68. 236.)                                                                      | 454·2 . . . | 1437 |
| 61. | „ dolejší domy v údolí (Koř. 68. 235.)                                                                                               | 429·6 . . . | 1360 |
| 62. | Bezděkov, nejvyšší domy poblíž lesa (Koř. 68. 313.)                                                                                  | 532·1 . . . | 1683 |
| 63. | Lhota, severně odtud stojící skalitý vrch (Koř. 68. 210.)                                                                            | 533·0 . . . | 1686 |
| 64. | Petrkovice, dům č. 19., Burkertův hostinec, základ. (Střed z 2 poz.) (Koř. 68. 65. Bar.)                                             | 428·1 . . . | 1338 |
| 65. | „ jiho-východně odtud stojící holý hřbet (Koř. 68. 218.)                                                                             | 534·9 . . . | 1692 |

|     |                                                                                                           | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 66. | Na sv. Janském vrchu, lesík, ležící na jiho-západním výběžku této hory, západně Petřkovic (Koř. 68. 217.) | 579·0                           | 1832 |
| 67. | Svatojanský vrch, na hranicích severo-západně Valberic pruských (Triang. Austr.)                          | 695·9                           | 2201 |
| 68. | Debrné, chalupy v hořejším ohbu údolí (Koř. 68. 312.)                                                     | 510·5                           | 1631 |
| 69. | Dolní les, nejvyšší lesnatý vrchol u Debrného (Koř. 68. 216.)                                             | 585·8                           | 1854 |
| 70. | Špitalský les, západně Dobrného stojící nejvyšší zarostlý vrch (Koř. 68. 233.)                            | 518·6                           | 1641 |
| 71. | Olešná (Goldenöls), přádelna při dolejších konci údolí (Koř. 68. 237.)                                    | 431·9                           | 1367 |
| 72. | „ hořejší chalupy za kostelem (Koř. 68. 242.)                                                             | 494·3                           | 1564 |
| 73. | „ bání kostelní věže (Koř. 68. 241.)                                                                      | 516·9                           | 1636 |
| 74. | „ jiho-západně odtud stojící nejvyšší vrchol ve hřebetu u Tří domků (Koř. 68. 239.)                       | 548·4                           | 1735 |
| 75. | „ západně odtud nízké sedlo mezi touto vsí a Chřenovským údolím, u cihelny (Koř. 68. 240.)                | 490·3                           | 1551 |
| 76. | „ jiho-východně odtud se nalézající sedlo na čeřenu, ku Debernému směřujícím (Koř. 68. 234.)              | 522·3                           | 1653 |
| 77. | Nejvyšší místo cís. silnice mezi Olešnou a Bernarticemi (Koř. 68. 68. Bar.)                               | 546·5                           | 1729 |
| 78. | Na Křížatkách, holé návrší v lese, severo-východně Olešné (Triang. Austr.)                                | 617·6                           | 1954 |
| 79. | Bernartice, jiho-východně odtud stojící kaplička na cestě do Beckova (Koř. 68. 194.)                      | 557·6                           | 1764 |
| 80. | „ kostel (zdánlivý základ) (Koř. 68. 288.)                                                                | 492·1                           | 1557 |
| 81. | „ hostinec u zlaté koruny (Koř. 68. 66. Bar.)                                                             | 476·3                           | 1507 |
| 82. | „ železničný most, žlab údolí                                                                             | 467·8                           | 1480 |
| 83. | „ železničný most, koleje                                                                                 | 496·6                           | 1571 |
| 84. | Berggraben, myslivna (základ) (Koř. 68. 289.)                                                             | 554·8                           | 1756 |
| 85. | Dlouhý důl, mezi Špičákem a horou Kočnou (Prud. 385.)                                                     | 625·5                           | 1979 |
| 86. | Špičák, lesnatá hora k severo-východu Bernatic (Triang. Austr.)                                           | 874·1                           | 2765 |
| 87. | Omšena (Omsen-Hügel), lesnatá rovina, střední výška (Koř. 68. 290.)                                       | 824·6                           | 2609 |

### 17. Aberspach (a Šumperk v Prusku.)

Zeměp. šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměp. délka: 33° 40' až 33° 50'

Mimo to ještě kraj, severně odtud ležící.

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží:

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| v nadmořské výšce od | 400—500 metrů | 13·3 procent, |
| „ „ „ „              | 500—600 „     | 55·5 „        |
| „ „ „ „              | 600—700 „     | 27·0 „        |
| „ „ „ „              | 700—800 „     | 4·0 „         |
| „ „ „ „              | 800—900 „     | 0·2 „         |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|                                                                               |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1. Beckov, domy uprostřed tohoto místa, poblíž vápenných pecí (Koř. 68. 192.) | 489·6 | 1549 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|



Nadm. výška v met. Ve vid. stž.

|                                                                                                                     |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 2. Beckov, severovýchodně odtud stojící lesný hřbet „Velká stráň“ („die Grosse Lehne“) řečený (Koř. 68. 193.) . . . | 736·8 . . . | 2332 |
| 3. Valbeřice (Albendorf) domy blíž zámku (Reym. K.) . . .                                                           | 437·3 . . . | 1384 |
| 4. Bertelsdorf (Pertoltice) kostel, základ (střední z 2 měř. v Prusích) (Koř. 68. 190.) . . .                       | 386·6 . . . | 1223 |
| 5. „ k severu kostela ležící porostlý vrch, východně od silnice do Šumperku (v Prusku) (Koř. 68. 191.) . . .        | 496·9 . . . | 1572 |
| 6. Horní Pertoltice (Bertelsdorf), hora „Waschberg“ při hranicích českých (Prud. 348.) . . .                        | 657·0 . . . | 2079 |
| 7. Voigtsdorf, kaplička ve vsi (Prud. 380.) . . .                                                                   | 551·3 . . . | 1744 |
| 8. „ pramen nad touto vsí (Prud. 381.) . . .                                                                        | 584·0 . . . | 1848 |
| 9. Šumperk (v Prusku), farní kostel, základ (Koř. 68. 188.) . . .                                                   | 525·3 . . . | 1662 |
| 10. „ východně odtud kaplička sv. Anny (Prud. 372.) . . .                                                           | 591·0 . . . | 1870 |
| 11. „ východně odtud hora Streitberg (Prud. 373.) . . .                                                             | 702·7 . . . | 2223 |
| 12. Ullendorf u Líbova, kostel (Prud. 378.) . . .                                                                   | 508·2 . . . | 1608 |
| 13. Líbov, na náměstí (Preuss. Verm. 242.) . . .                                                                    | 509·7 . . . | 1613 |
| 14. „ přádelna na severozápadním konci města (Koř. 68. 272.) . . .                                                  | 486·8 . . . | 1541 |
| 15. „ řeka Bobrava (Preuss. Verm. 214.) . . .                                                                       | 466·3 . . . | 1475 |
| 16. „ východně odtud hora „Steinerberg“ (Prud. 379.) . . .                                                          | 693·6 . . . | 2195 |
| 17. Lindenava, hořejší konec vsi (Prud. 366.) . . .                                                                 | 538·6 . . . | 1704 |
| 18. „ dolejší konec vsi (Prud. 367.) . . .                                                                          | 478·7 . . . | 1514 |
| 19. Hora Lindenberg mezi Líbovem a Lindenavou (Prud. 368.) . . .                                                    | 614·5 . . . | 1945 |
| 20. Hora Scholzenberg, východně od Líbova (Lieb. K.) . . .                                                          | 646·0 . . . | 2044 |
| 21. Horní Blasdorf (Blažejov), střední výška (Prud. 349.) . . .                                                     | 470·6 . . . | 1489 |
| 22. „ řeka Bobrava (Preuss. Verm. 215.) . . .                                                                       | 460·6 . . . | 1457 |
| 23. Dolní Blasdorf, řeka Bobrava (Prud. 350.) . . .                                                                 | 455·7 . . . | 1442 |
| 24. Heinersdorf bohatý, kostel (Prud. 360.) . . .                                                                   | 473·3 . . . | 1497 |
| 25. Heinersdorfský kopec (Prud. 361.) . . .                                                                         | 606·2 . . . | 1918 |
| 26. Dlouhý kopec u boh. Heinersdorfu, jižní díl (Prud. 362.) . . .                                                  | 636·6 . . . | 2014 |
| 27. Lancut, na náměstí (Preuss. Verm. 241.) . . .                                                                   | 443·3 . . . | 1402 |
| 28. „ povrcheň řeky Bobravy (Preuss. Verm. 216) . . .                                                               | 431·2 . . . | 1365 |
| 29. Buková (Buchberg), východně od Lancutu (Lieb. K.) . . .                                                         | 586·3 . . . | 1855 |
| 30. Forstberg, nejvyšší vrchol této hory východně od Lancutu ((Lieb. K.) . . .                                      | 622·6 . . . | 1970 |
| 31. Hermsdorf, most přes potok Zieder (Prud. 358.) . . .                                                            | 435·6 . . . | 1378 |
| 32. Křížové (Grüssan), střední výška tohoto místa (Koř. 68. 189.) . . .                                             | 443·9 . . . | 1405 |
| 33. „ klášter, na dvoře (Prud. 355.) . . .                                                                          | 455·5 . . . | 1442 |
| 34. „ kaple sv. Anny (Prud. 856.) . . .                                                                             | 570·4 . . . | 1804 |
| 35. Neuen, kostel (Prud. 370.) . . .                                                                                | 469·4 . . . | 1485 |
| 36. Heinersdorf malý, most přes potok (Prud. 359.) . . .                                                            | 469·3 . . . | 1485 |
| 37. Hora Rämpelberk, východně od Kratzbachu (Lieb. K.) . . .                                                        | 598·3 . . . | 1892 |
| 38. Kindelsdorf, prostřední výška (Lieb. K.) . . .                                                                  | 529·3 . . . | 1675 |
| 39. Trautliebersdorf, na dolejší konci vsi (Lieb. K.) . . .                                                         | 529·5 . . . | 1676 |
| 40. „ kostel (Prud. 375.) . . .                                                                                     | 547·5 . . . | 1733 |
| 41. „ nejvyšší místo cesty od Frydlantu (Prud. 374.) . . .                                                          | 567·6 . . . | 1796 |
| 42. Raspenava, vrch jiho-východně odtud (Koř. 68. 393.) . . .                                                       | 697·9 . . . | 2208 |
| 43. Hřbet k severu od Raspenavy se táhnoucí, rozhraní vod (Koř. 68. 395.) . . .                                     | 662·1 . . . | 2094 |
| 44. Rosenava, střední výška (Koř. 68. 394.) . . .                                                                   | 576·4 . . . | 1823 |
| 45. Libná (Liebenau), nejvyšší dům na silnici do Šumperka (Koř. 68. 402.) . . .                                     | 610·1 . . . | 1930 |
| 46. „ severozápadně odtud ležící porostlé návrší pod vrchem Straží (Koř. 68. 343.) . . .                            | 644·3 . . . | 2038 |
| 47. Stráž (Wachberg) u Libné (Koř. 68. 344.) . . .                                                                  | 721·9 . . . | 2284 |

|                                                                                                                  | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ná hora, lesnatý vrch severně od Libně (Koř. 68. 328.)                                                           | 704·9 . . . 2230                |
| „ jihovýchodní dolejší kraj lesa nedaleko myslivny (Koř. 68. 329.)                                               | 640·6 . . . 2027                |
| hý kopec, holé návrší 600 metrů k jihu myslivny Libenské (Triang. Austr.)                                        | 696·4 . . . 2203                |
| Dlouhém kopci, vrchol ve východním hřbetu 1500 m. severo-západně od Zdoňova (Koř. 68. 340.)                      | 639·2 . . . 2023                |
| í krčma (Feldkretschén), západně od Abršpachu (Koř. 68. 104. Bar.)                                               | 589·3 . . . 1864                |
| pná Hora, skalnatý vrch 1200 metrů východo-severo-východně od Chvalče (Triang. Austr.)                           | 703·8 . . . 2227                |
| ipadní stráni Krupné hory a sice u kraje lesa při silnici (Koř. 68. 221.)                                        | 554·7 . . . 1755                |
| ro-východně od Chvalče nejvyšší místo silnice (sedlo) do Abršpachu (Koř. 68. 103. Bar.)                          | 636·3 . . . 2013                |
| leč, výška silnice do Abršpachu, u kostela (Koř. 68. 102. Bar.)                                                  | 497·0 . . . 1572                |
| „ myslivna východně odtud ležící (prům. z 2 měř.) (Koř. 68. 186.)                                                | 585·5 . . . 1853                |
| „ jihozápadně odtud ležící holý hřbet, nejvyšší místo na voznici do Radvanic, u osamělého stromu (Koř. 68. 219.) | 574·9 . . . 1819                |
| í návrší na pěšině z Chvalče do Valbeřic (Koř. 68. 224.)                                                         | 574·3 . . . 1817                |
| wald, nejvyšší dům na hřebeni (Koř. 68. 198.)                                                                    | 597·9 . . . 1891                |
| rně od Grünwaldu u Chvalče ležící skalistý hřbet (Koř. 68. 211.)                                                 | 603·4 . . . 1909                |
| vice, myslivna na kraji lesa (Koř. 68. 368.)                                                                     | 559·7 . . . 1771                |
| ří, vynikající skalnatý vrchol, západně na horakém hřbetu tamtéž (Koř. 68. 357.)                                 | 735·7 . . . 2328                |
| ické skály, hostinec „u hamru“, 1. poschodí (střední z 4 měř.) (Koř. 68. 122. Bar.)                              | 471·0 . . . 1490                |
| „ ozvěna před vchodem do skal (Koř. 60. 176.)                                                                    | 521·6 . . . 1651                |
| „ Švýcarský domek, základ, (Koř. 68. 124. Bar.)                                                                  | 611·3 . . . 1934                |
| „ „na tržišti“ (Koř. 60. 177.)                                                                                   | 605·3 . . . 1915                |
| „ „u chrámu“ (Koř. 60. 178.)                                                                                     | 640·1 . . . 2028                |
| Kraví hoře, severní výběžky proti Kamenci (Stegreifen) (Koř. 68. 360.)                                           | 683·1 . . . 2161                |
| níšův důl (Braunisch-Graben) (Koř. 68. 346.)                                                                     | 668·5 . . . 2115                |
| passké skály, u stříbrného pramene. Teplota pramene + 4·5 (Koř. 68. 107. Bar.)                                   | 501·3 . . . 1586                |
| „ Vlčí důl, povrch plesa (Koř. 68. 108. Bar.)                                                                    | 533·3 . . . 1687                |
| „ skalnatý hřbet jihozápadně od „stříbrného pramene“ (Koř. 68. 356.)                                             | 621·2 . . . 1966                |
| ý zámek (Althaus), skalnatý vrch 850 metrů západně od zámku v Dolním Abršpachu (Triang. Austr.)                  | 675·1 . . . 2136                |
| ipach dolní, pila (Koř. 68. 355.)                                                                                | 496·1 . . . 1569                |
| „ hostinec „u skalného města“ 1. posch. (střední z 4 měř.) (Koř. 68. 106. Bar.)                                  | 504·8 . . . 1598                |
| „ zámek, základ (Koř. 68. 109. Bar.)                                                                             | 514·3 . . . 1627                |
| enná socha sv. Václava u stezky z Abršpachu dolního do Zdoňova (Koř. 68. 113. Bar.)                              | 574·0 . . . 1816                |
| ipach horní, kostel, základ (Koř. 68. 105. Bar.)                                                                 | 552·0 . . . 1746                |
| ipach horní, severně odtud nejvyšší místo voznice do Voigtadorku (na hranici) (Koř. 68. 367.)                    | 637·8 . . . 2018                |

|                                                                                                              | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 81. Holský kopec, nejvyšší skály (Koř. 68. 354.)                                                             | 665·2              | 2105         |
| 82. Lesnatý hřbet, k východu od Buchwaldsdorfu (Koř. 68. 363.)                                               | 540·0              | 1708         |
| 83. Zdoňov, bání kostelní věže (prům. z 2 měř.) (Koř. 68. 353.)                                              | 555·3              | 1757         |
| 84. „ domy při silnici v prostředku vsi pod kostelem (Koř. 68. 119. Bar.)                                    | 506·3              | 1600         |
| 85. „ nejhořejší domy nedaleko větrního mlýna na silnici do Frydlantu (Koř. 68. 118. Bar.)                   | 535·0              | 1692         |
| 86. „ pazderna na rohu lesa pod vrchem „Heidehöhe“ (Koř. 68. 352.)                                           | 550·6              | 1742         |
| 87. Nejvyšší místo silnice ze Zdoňova do Libně (Koř. 68. 342.)                                               | 612·1              | 1936         |
| 88. Raucherův kopec (Ranchers-Berg), holé návrší 1300 metrů východně od kostela Zdoňovského (Triang. Austr.) | 609·2              | 1927         |
| 89. Buchwaldsdorf, hořejší konec vsi při rozchodu silnice do Teplic u kamenného kříže (Koř. 68. 121. Bar.)   | 479·3              | 1516         |
| 90. Od Bukové hory k západu v úpatí jejím ležící lesík (Koř. 68. 347.)                                       | 582·6              | 1843         |
| 91. „Heidehöhe“, od Zdoňova jižně ležící lesem zarostlý vrch (Koř. 68. 351.)                                 | 615·8              | 1949         |
| 92. Teplice (Weckelsdorf), zámecká zahrada blíž zámku (Koř. 60. 179.)                                        | 468·3              | 1482         |
| 93. Teplice horní, severo-západně odtud návrší s lesíkem (Koř. 68. 350.)                                     | 584·6              | 1850         |

### 18. Broumov (a Frydlant v Prusích).

Zeměpisná šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměpisná délka: 33° 50' až 34° 0'

Mimo to krajina, jež k severu toho čtverhranu leží.

Z plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 15·0 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| „ | „ | „ | „ | 400—500 | „ | 30·5 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 500—600 | „ | 36·8 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 600—700 | „ | 12·5 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 700—800 | „ | 5·2  | „ |

|                                                                                          | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Teplice (Weckelsdorf), stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                        | 460·0              | 1455         |
| 2. Bohdašín (Bodisch), stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                           | 491·3              | 1554         |
| 3. „ severo-východně odtud nejvyšší místo železné dráhy v sedle (E. N. St. E. G.)        | 492·2              | 1558         |
| 4. „ u kříže na silnici do Březové, sedlo (Koř. 68. 132. Bar.)                           | 527·3              | 1668         |
| 5. Kostelní kopec (Kirchberg), výšina 1·8 kilom jiho-východně Bohdašína (Triang. Austr.) | 688·5              | 2178         |
| 6. Hutberk, nejvyšší místo polické silnice (Koř. 68. 135. Bar.)                          | 595·6              | 1884         |
| 7. Nový dvůr, nejhořejší chalupy (Koř. 68. 133. Bar.)                                    | 561·3              | 1776         |
| 8. Severo-východně od Nového Dvora, lesnatý vrch (Koř. 68. 134. Bar.)                    | 587·6              | 1859         |
| 9. Vernéřovice něm. (Deutsch Wernersdorf), špice kostelní věže (Triang. Austr.)          | 502·9              | 1591         |
| 10. Buková (Buchberg), nejvyšší vrchol u Buchwaldsdorfu (Koř. 68. 358.)                  | 644·9              | 2040         |
| 11. Schmidtsdorf, most přes Stenavu (Preuss. Str. N. 54.)                                | 487·6              | 1543         |
| 12. Frydlant, kostel na kopečku (Koř. 68. 468.)                                          | 519·0              | 1642         |

|                                                                                                       | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 13. Frydlant, město, radnice na tržišti (Prud. 143.) . . . . .                                        | 445·3 . . . . .                 | 1410 |
| 14. Starý Frydlant, most přes Stenavu (Preuss. Str. N. 55.) . . . . .                                 | 439·3 . . . . .                 | 1390 |
| 15. Stenava, potok, na hranicích českých (Preuss. Str. N. 13.) . . . . .                              | 415·3 . . . . .                 | 1312 |
| 6. Nová ves (Neudorf), hořejší chalupy (Koř. 68. 471.) . . . . .                                      | 512·0 . . . . .                 | 1620 |
| 7. Vyšeňov (Wiese), domy u kostela (Koř. 68. 474.) . . . . .                                          | 464·2 . . . . .                 | 1469 |
| 8. Neusorge, hořejší domy na silnici (Koř. 68. 470.) . . . . .                                        | 449·5 . . . . .                 | 1423 |
| 9. Halbštat, holé návrší jiho-západně kostela Vyšeňovského (Triang. Austr.) . . . . .                 | 479·2 . . . . .                 | 1516 |
| 0. Halbštat, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.) . . . . .                                        | 427·0 . . . . .                 | 1351 |
| 1. „ zámek, dolejší kraj střechy (Koř. 68. 477.) . . . . .                                            | 449·5 . . . . .                 | 1423 |
| 2. Eichelfur, lesnatý vrch k východu Halbštatu (Koř. 68. 476.) . . . . .                              | 472·7 . . . . .                 | 1495 |
| 3. Mlýn „Kiefermühle“, blíže Halbštatu (Koř. 68. 482.) . . . . .                                      | 434·2 . . . . .                 | 1374 |
| 4. Vernířovice německé, dolejší chalupy západně od kříže na silnici (Koř. 68. 479.) . . . . .         | 450·0 . . . . .                 | 1424 |
| 5. „ severně od dolejšího dílu vesnice dřevěný kříž v sedle (Koř. 68. 478.) . . . . .                 | 481·0 . . . . .                 | 1522 |
| 6. Od Vernířovic severně u kraje lesa, poloha (Koř. 68. 480.) . . . . .                               | 483·6 . . . . .                 | 1530 |
| 7. Vernířovice, k východu lesnaté návrší (Koř. 68. 481.) . . . . .                                    | 477·0 . . . . .                 | 1509 |
| 8. Ruprechtice, nejhořejší domy v údolí u lesa (Koř. 68. 485.) . . . . .                              | 510·6 . . . . .                 | 1616 |
| 9. „ střední výška domů při rozchodu silnice k Heřmánkovici (Koř. 68. 484.) . . . . .                 | 482·6 . . . . .                 | 1527 |
| 0. Hynčice, kostel, zdánlivý základ (Koř. 68. 483.) . . . . .                                         | 440·9 . . . . .                 | 1424 |
| 1. Nejvyšší místo lesnatého hřbetu mezi Hejtmánkovici a Hynčici (Koř. 68. 486.) . . . . .             | 521·4 . . . . .                 | 1649 |
| 2. Hejtmánkovice, na hořejším konci vsi, domy na výšině (Koř. 68. 446.) . . . . .                     | 449·5 . . . . .                 | 1423 |
| 3. „ v hořejším díle vsi, domy v údolí (Koř. 68. 447.) . . . . .                                      | 437·5 . . . . .                 | 1385 |
| 4. „ na dolejší konci, most broumovsko-náchodské silnice (Koř. 68. 448.) . . . . .                    | 397·9 . . . . .                 | 1259 |
| 5. Dittersbach, chalupy pod dvorem v údolí (Koř. 68. 443.) . . . . .                                  | 452·5 . . . . .                 | 1432 |
| 6. „ jižně odtud dřevěný kříž u silnice k Broumovu (Koř. 68. 442.) . . . . .                          | 478·0 . . . . .                 | 1512 |
| 7. Na Šancích (Schanzen-Berg), holé návrší 900 metrů východně Dittersbachu (Triang. Austr.) . . . . . | 492·3 . . . . .                 | 1557 |
| 8. Dvůr Schlegelův, západně Broumova (Koř. 68. 444.) . . . . .                                        | 481·4 . . . . .                 | 1523 |
| 9. Broumov, špička věže při klášterním kostele (Triang. Austr.) . . . . .                             | 457·5 . . . . .                 | 1447 |
| 0. „ věž kostela klášterního, osa rafijí na ciferníku (Koř. 68. 450.) . . . . .                       | 435·8 . . . . .                 | 1380 |
| 1. „ klášter, západní křídlo, dolejší rámec oken, 1. poschodí (Koř. 68. 452.) . . . . .               | 414·4 . . . . .                 | 1311 |
| 2. „ dům č. 213, západní konec, základ (Koř. 68. 454.) . . . . .                                      | 404·5 . . . . .                 | 1280 |
| 3. „ hřbitov, branka západní (Koř. 68. 455.) . . . . .                                                | 399·7 . . . . .                 | 1264 |
| 4. „ stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.) . . . . .                                                | 372·0 . . . . .                 | 1177 |
| 5. „ západně odtud v polích, kamenná muka (Koř. 68. 449.) . . . . .                                   | 407·3 . . . . .                 | 1289 |
| 6. „ severo-západně odtud druhý kříž na silnici do Náchoda (Koř. 68. 445.) . . . . .                  | 422·7 . . . . .                 | 1337 |
| 7. Heřmánkovice, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.) . . . . .                                    | 390·3 . . . . .                 | 1235 |
| 8. „ špička kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                                  | 494·4 . . . . .                 | 1564 |
| 9. „ hořejší domy při rozstupu silnice k Janovicům (Johannisberg) (Koř. 68. 494.) . . . . .           | 458·3 . . . . .                 | 1450 |
| 0. „ nejhořejší chalupy (Prud. 149.) . . . . .                                                        | 520·6 . . . . .                 | 1647 |
| 1. Kohlberg, lesnatý vrch 1 kilom. severně Heřmánkovice (Triang. Austr.) . . . . .                    | 546·0 . . . . .                 | 1727 |

|                                                                                                                     | Nadm. výška v met. | Ve vřd. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 52. Rokle v lese severo-západně pod Kohlberkem (Koř. 68. 488.)                                                      | 462.1              | 1462         |
| 53. Dolní kraj lesa na hřbetu pod Lomnickou horou, severo-západně od hořejších domů Hermánkovických (Koř. 68. 489.) | 612.6              | 1938         |
| 54. Severo-východně Ruprechtic, dlejší obruba lesa na hřbetu pod Špičákem (Koř. 68. 487.)                           | 656.0              | 2075         |
| 55. Široká hůra, severo-východně Ruprechtic (Koř. 68. 490.)                                                         | 837.3              | 2649         |
| 56. Vyšehov, nejhořejší chalupy u lesa (Koř. 68. 396.)                                                              | 568.9              | 1800         |
| 57. Pomeznice (Grenzörfel), hořejší chalupa u silnice z Vyšehova do Ruprechtic (Koř. 68. 475.)                      | 509.8              | 1613         |
| 58. Březová hora (Birkenberg), severně od Grenzörfu (Koř. 68. 472.)                                                 | 765.3              | 2421         |
| 59. Špičák, lesnatá hora 1 kilom. sev.-sev.-východ. od hořejších chalup v Ruprechticích (Triang. Austr.)            | 879.2              | 2782         |
| 60. Lomnická hůra, jiho-západní vrchol její (Koř. 68. 492.)                                                         | 801.2              | 2535         |
| 61. " k jihu vystupující lesnatý čeren (signalový strom) (Koř. 68. 493.)                                            | 696.0              | 2202         |
| 62. Freudenburk, blíže hořejšího konce vsi (Reym. K.)                                                               | 632.3              | 2001         |
| 63. Donnerau, hora Donnersberk (Prud. 138.)                                                                         | 507.3              | 1605         |
| 64. Reimswaldau, hostinec u kostela (Prud. 154.)                                                                    | 602.0              | 1905         |
| 65. " jižně odtud myslivna mezi Heidelbergem a Suchými vrchy (Prud. 148.)                                           | 842.6              | 2666         |
| 66. " jižně odtud Cukrová homole (Zuckerberg) (Prud. 168.)                                                          | 878.3              | 2779         |
| 67. Heidelberg, jižně vsi Reimswaldau (Letz. Rgb.)                                                                  | 910.3              | 2880         |
| 68. Roh (Hornberg), zámek Hornschloss, jiho-východně vsi Reimswaldau (Letz. Rgb.)                                   | 816.0              | 2582         |
| 69. Donnerau, vrch Schindelberk, východní vrchol (Prud. 139.)                                                       | 790.0              | 2499         |
| 70. Blitzgrund, prostřední výška vsi (Lieb. K.)                                                                     | 497.3              | 1573         |
| 71. Kirchlehne, hřbet jižně Blitzgrundu (Lieb. K.)                                                                  | 520.3              | 1644         |
| 72. Waltersdorf dolní, silnice na jižním konci (Preuss. Str. N. 53.)                                                | 529.3              | 1673         |
| 73. Čáp (Storchberg), hora jiho-východně od Waltersdorfu (Lieb. K.)                                                 | 798.0              | 2525         |
| 74. Waltersdorf dlouhý, kostel (Prud. 164.)                                                                         | 566.6              | 1793         |
| 75. Prameny Stenavy u Dlouhého Waltersdorfu (Preuss. Fl. N. 10.)                                                    | 649.3              | 2054         |
| 76. Hora Buschberk u Dlouhého Waltersdorfu (Prud. 135.)                                                             | 885.0              | 2800         |
| 77. Nejvyšší místo silnice vedoucí ze Slezského Frydlantu do Waldenburku, sedlo (Koř. 68. 14. Bar.)                 | 631.6              | 1998         |
| 78. Felhammer, škola (Prud. 141.)                                                                                   | 524.6              | 1669         |
| 79. Hora Velký Wildberg, jiho-západně od Felhammru (Lieb. K.)                                                       | 822.0              | 2601         |
| 80. Hora Wäldchenberg, západně Rothenbachu (Lieb. K.)                                                               | 614.6              | 1945         |
| 81. Starý Lässig, hostinec (Prud. 151.)                                                                             | 521.0              | 1648         |
| 82. Gottesberk, katolický kostel (Prud. 145.)                                                                       | 561.8              | 1778         |
| 83. " nádraží (Preuss. E. N. 387.)                                                                                  | 536.2              | 1697         |
| 84. Vysoká hora (Hoher Berg) západně Gottesberka (Lieb. K.)                                                         | 680.3              | 2152         |
| 85. Waldenburk, město, evangelický kostel (Prud. 161.)                                                              | 435.6              | 1378         |
| 86. " prachárna na Ovčí hůře (Prud. 162.)                                                                           | 507.7              | 1606         |
| 87. Nové Háje (Neu-Hayn), silnice na severním konci (Preuss. Str. N. 51.)                                           | 638.0              | 2019         |
| 88. Zámek Neuhaus, letohrádek u zříceniny (Prud. 153.)                                                              | 613.4              | 1940         |
| 89. Hora Blitzberk, jiho-západně od Waldenburka (Lieb. K.)                                                          | 591.0              | 1870         |
| 90. Salzbrunn, povrch zřídla (Prud. 155.)                                                                           | 401.3              | 1270         |
| 91. Dittersbach, nádraží (Preuss. E. N. 388.)                                                                       | 507.0              | 1604         |
| 92. Reussendorf, most u hospody (Preuss. Str. N. 48.)                                                               | 490.6              | 1552         |
| 93. Údolí Bärengrund, hospoda u medvěda (Prud. 134.)                                                                | 513.6              | 1625         |
| 94. Štola sv. Bernarda v Bärengrundu (Preuss. Verm. 130.)                                                           | 489.0              | 1547         |
| 95. Steingrund, u hospody (Prud. 160.)                                                                              | 487.3              | 1542         |

# 19. Šonov (a Ludwigsdorf v Prusku.)

Zeměpisná šířka: 50° 35' až 50° 40'

Zeměpisná délka: 34° 0' až 34° 10'

Mimo to krajiny severně a východně odtud ležící.

Z celé, v tomto čtverhranu obsažené plochy leží

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| v nadmořské výšce od 300—400 metrů | 2.5 procent, |
| " " " " 400—500 "                  | 13.6 "       |
| " " " " 500—600 "                  | 48.5 "       |
| " " " " 600—700 "                  | 30.2 "       |
| " " " " 700—800 "                  | 5.2 "        |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Šonov, špička kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                                                      | 498.0 . . . 1575 |
| " kostel, hořejší okraj nejdolejšího okna ve věži (Koř. 68. 460.) . . . . .                                                 | 470.4 . . . 1488 |
| " hořejší domy v údolí při voznici ku čtyřem dvorům (Koř. 68. 508.) . . . . .                                               | 499.0 . . . 1579 |
| " severových. od kostela porostlé návrší pod Šolcovou horou (Koř. 68. 462.) . . . . .                                       | 550.2 . . . 1741 |
| Rosenthal, domy při broumovsko-šonovské silnici (Koř. 68. 505.) . . . . .                                                   | 418.3 . . . 1323 |
| " nejhořejší domy v údolí (Koř. 68. 506.) . . . . .                                                                         | 489.8 . . . 1550 |
| Východně od hořejších domů Rosenthalských ležící návrší s lesíkem (Koř. 68. 507.) . . . . .                                 | 589.0 . . . 1863 |
| Strassenau, nejhořejší chalupy u silnice (Koř. 68. 502.) . . . . .                                                          | 465.6 . . . 1473 |
| Lesnaté návrší severně od voznice z Heřmánkovic do Strassenavy vedoucí (Koř. 68. 495.) . . . . .                            | 491.6 . . . 1555 |
| Broumovice, kostel, základ (Koř. 68. 498.) . . . . .                                                                        | 644.2 . . . 2038 |
| " nejhořejší chalupy na silnici do Giersdorfu (Koř. 68. 497.) . . . . .                                                     | 618.8 . . . 1958 |
| " západně odtud Bajerův mlýn (Koř. 68. 496.) . . . . .                                                                      | 517.6 . . . 1638 |
| " severně odtud výška sedla v silnici (Koř. 68. 500.) . . . . .                                                             | 660.3 . . . 2089 |
| " Janovický vrch lesem obrostlý (Koř. 68. 499.) . . . . .                                                                   | 784.2 . . . 2481 |
| Sídelberk, lesnatý vrch severně od Rosentálu (Koř. 68. 501.) . . . . .                                                      | 738.7 . . . 2337 |
| Sídelberk, lesnatý vrch severně od Šonova (Koř. 68. 503.) . . . . .                                                         | 725.4 . . . 2295 |
| Šolcova hůra, lesnatý vrch na zemských hranicích 2.5 kilomet. severovýchodně od kostela v Šonově (Triang. Austr.) . . . . . | 750.9 . . . 2375 |
| Šarkgrund, mezník zemský č. 396 (Preuss. Verm. 123.) . . . . .                                                              | 716.0 . . . 2265 |
| Šnigswald-Beatengrund, hranice při silnici (Preuss. Str. N. 39.) . . . . .                                                  | 719.3 . . . 2276 |
| Šnigswalde, makovice na kostelní věži (Preuss. Verm. 124.) . . . . .                                                        | 600.6 . . . 1900 |
| " kde silnice do Broumova dělí se od hlavní silnice (Preuss. Str. N. 38.) . . . . .                                         | 603.3 . . . 1909 |
| " hospoda (Prud. 173.) . . . . .                                                                                            | 561.0 . . . 1775 |
| " sklárna (Prud. 150.) . . . . .                                                                                            | 469.3 . . . 1485 |
| " silnice u mostu (Preuss. Str. N. 37.) . . . . .                                                                           | 463.4 . . . 1780 |
| " jižně odtud hora Špičák (Prud. 174.) . . . . .                                                                            | 755.6 . . . 2391 |
| Štři dvory, nejhořejší domek (Prud. 181.) . . . . .                                                                         | 591.6 . . . 1872 |
| Lesnatý vrch, jiho-východně hory Šolcovy na jih cesty ze Šonova do Krainsdorfu (Koř. 68. 463.) . . . . .                    | 641.5 . . . 2029 |
| Krainsdorf, návrší k západu od hořejšího konce vesnice (Preuss. Verm. 119.) . . . . .                                       | 710.7 . . . 2248 |
| Šerova hůra, kopec u Krainsdorfu (Preuss. Verm. 107.) . . . . .                                                             | 669.0 . . . 2117 |

|                                                                                    | Nadm. výška v met. Ve vid. st. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 30. Zaugholz, stráž severo-východně vsi (Preuss. Verm. 117.)                       | 631·6                          | 1998 |
| 31. Fišerova hůra (Fischerkoppe) u Zaugholze (Preuss. Verm. 105.)                  | 574·0                          | 1816 |
| 32. Volpersdorf, makovice na kostelní věži (Preuss. Verm. 115.)                    | 511·0                          | 1617 |
| 33. „ silnice nedaleko kostela (Preuss. Str. N. 49.)                               | 426·0                          | 1348 |
| 34. Kunzendorf blíž Neurode, střední výška (Prud. 175.)                            | 392·6                          | 1242 |
| 35. Henšlova hůra (Henschelkoppe), vrch u Kunzendorfu (Preuss. Verm. 114.)         | 542·6                          | 1717 |
| 36. Ludwigsdorf, makovice kostelní věže (Preuss. Verm. 121.)                       | 494·0                          | 1563 |
| 37. „ silnice u kostela (Preuss. Str. N. 36.)                                      | 483·2                          | 1529 |
| 38. Hora Pfaffenberg, blíž vsi Mölke, jižně od mezníka č. 29. (Preuss. Verm. 122.) | 556·6                          | 1761 |
| 39. Hora Grundberg, blíž Herrengrundu (Preuss. Verm. 125.)                         | 679·3                          | 2149 |
| 40. Nové Mölke, střední výška (Prud. 176.)                                         | 551·0                          | 1743 |
| 41. Hausdorf, kostel, základ (Prud. 172.)                                          | 471·3                          | 1491 |
| 42. „ makovice kostelní věže (Preuss. Verm. 129.)                                  | 503·6                          | 1593 |
| 43. Wurzelendorf, návrší severně vesnice (Preuss. Verm. 127.)                      | 582·3                          | 1842 |
| 44. Falkenberg, hostinec (Prud. 140.)                                              | 522·0                          | 1652 |
| 45. Eule, osada blíž Falkenberku, hořejší chalupy (Prud. 171.)                     | 558·8                          | 1768 |
| 46. Nový Giersdorf, u hospody (Preuss. Str. N. 41.)                                | 743·2                          | 2352 |
| 47. Pustý Giersdorf, u bělidla pod katolickým kostelem (Preuss. Str. N. 43.)       | 481·3                          | 1521 |
| 48. „ u pohraniční celnice (Preuss. Str. N. 42.)                                   | 534·6                          | 1692 |
| 49. „ potok Bystřice, na mostě (Preuss. Str. N. 44.)                               | 453·0                          | 1433 |
| 50. Pramen Schauderquelle u Pustého Giesdorfu (Preuss. Fl. N. 20.)                 | 545·8                          | 1726 |
| 51. Dolní Giersdorf, potok pod mostem (Preuss. Fl. N. 22.)                         | 449·3                          | 1422 |
| 52. Pustý Valtersdorf, evangelický kostel (Prud. 166.)                             | 512·0                          | 1620 |
| 53. „ severně odtud dolní mlýn u Neugerichtu (Prud. 167.)                          | 448·0                          | 1418 |
| 54. Dolní Tannhausy, potok u krčmy Erlenkretscham (Preuss. Fl. N. 25.)             | 372·6                          | 1179 |
| 55. Střední Tannhausy, potok u celního domku (Preuss. Fl. N. 24.)                  | 392·0                          | 1240 |
| 56. Horní Tannhausy, potok pod mostem (Preuss. Fl. N. 23.)                         | 433·4                          | 1371 |
| 57. Hausdorf, štola Arnoštova u kostela (Preuss. Verm. 133.)                       | 444·6                          | 1407 |
| 58. Sofienau, rybník (Prud. 157.)                                                  | 437·3                          | 1384 |
| 59. „ jižně odtud hora Lorbeer-Berg (Prud. 158.)                                   | 616·6                          | 1951 |
| 60. Charlottenbrunn, na náměstí u zřídla (Preuss. Str. N. 46.)                     | 460·0                          | 1455 |
| 61. „ nejvyšší místo silnice do Reussendorfu (Preuss. Str. N. 47.)                 | 558·0                          | 1765 |
| 62. „ štola „Augustovo štěstí“ (Preuss. Verm. 131.)                                | 467·3                          | 1478 |
| 63. „ Dlouhá hora (Langer Berg) nejvyšší místo (Prud. 137.)                        | 566·6                          | 1793 |

## 20. Rovensko.

Zeměp. šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměp. délka: 32° 50' 33" až 0'

Z celé v tomto čtverhranu obsažené plochy leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 15·2 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| „ | „ | „ | „ | 300—400 | „ | 57·1 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 400—500 | „ | 20·4 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 500—600 | „ | 6·4  | „ |
| „ | „ | „ | „ | 600—700 | „ | 0·9  | „ |

Nadm. výška v met. Ve víd. stř.

|                                                                                              |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| osky, nejhořejší hrana východní tvrze hradu (Baby) (Koř. 71. 103.) . . . . .                 | 517·6 . . . . . | 1638 |
| „ zřícenina v předhradí, základ (Koř. 71. 516.) . . . . .                                    | 483·1 . . . . . | 1528 |
| „ chalupa na úpatí hradu jižně odtud (Koř. 71. 75.) . . . . .                                | 438·9 . . . . . | 1389 |
| d Troskami, na poli pod Pannou (Koř. 71. 527.) . . . . .                                     | 441·2 . . . . . | 1396 |
| ár, myslivna (Koř. 71. Střed z 84. 525.) . . . . .                                           | 329·3 . . . . . | 1042 |
| ouhá ves, základ domů (Koř. 71. 82.) . . . . .                                               | 312·2 . . . . . | 988  |
| vensko, domy na náměstí východně od kostela, základ (Koř. 71. 104.) . . . . .                | 308·8 . . . . . | 977  |
| „ domy v údolí (Koř. 71. 521.) . . . . .                                                     | 267·3 . . . . . | 846  |
| rek, Nový mlýn, jiho-západně odtud, základ (Koř. 71. 124.) . . . . .                         | 267·1 . . . . . | 845  |
| „ dům při silnici, jiho-východně odtud (Koř. 71. 83.) . . . . .                              | 282·2 . . . . . | 893  |
| anice, střední výška domů při silnici (Koř. 71. 123.) . . . . .                              | 270·4 . . . . . | 855  |
| španovice, hořejší domy na západním konci vsi (Koř. 71. 80.) . . . . .                       | 356·2 . . . . . | 1127 |
| atce, holé návrší 200 metrů severo-západně od vesnice téhož jména (Triang. Austr.) . . . . . | 382·6 . . . . . | 1211 |
| atce, východně odtud na úpatí příkré stráně, při ústí rokle v údolí (Koř. 71. 78.) . . . . . | 322·8 . . . . . | 1022 |
| „ severní skupenství chalup (Koř. 71. 77.) . . . . .                                         | 383·9 . . . . . | 1215 |
| dřvanovice, hořejší chalupy na hřebetě (Koř. 71. 81.) . . . . .                              | 399·7 . . . . . | 1264 |
| stoňovice, východní chalupy (Koř. 71. 122.) . . . . .                                        | 334·3 . . . . . | 1058 |
| řtkovice, ovčín, základ (Koř. 71. 121.) . . . . .                                            | 396·2 . . . . . | 1254 |
| stkov, západní skupenství domů při potoce (Koř. 71. 95.) . . . . .                           | 339·1 . . . . . | 1073 |
| tobity, špička kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                      | 451·6 . . . . . | 1429 |
| „ kostel, základ (Koř. 71. 93.) . . . . .                                                    | 423·7 . . . . . | 1340 |
| šbek, samota (chalupa) k západu při cestě do Proseče (Koř. 71. 117.) . . . . .               | 473·0 . . . . . | 1496 |
| clavy, chalupy při ústí cesty z Volavec (Koř. 71. 92.) . . . . .                             | 347·9 . . . . . | 1101 |
| kořice, chalupy uprostřed vsi v údolí (Koř. 71. 115.) . . . . .                              | 300·7 . . . . . | 951  |
| n nad Rovenskem, severně Rovenska, makovice na kostelní věži (Koř. 71. 79.) . . . . .        | 354·6 . . . . . | 1122 |
| řensko, dům při dolejší konci lesa (Koř. 71. 162.) . . . . .                                 | 390·6 . . . . . | 1236 |
| háň, severozápadně odtud ohyb silnice na hoře na hřebetě (Koř. 71. 119.) . . . . .           | 490·6 . . . . . | 1552 |
| zděčín, střední výška místa (Koř. 71. 118.) . . . . .                                        | 467·0 . . . . . | 1477 |
| oseč Veliká, severní chalupy (Koř. 71. 116.) . . . . .                                       | 393·7 . . . . . | 1245 |
| lá Proseč, skupenství domů na horské cestě do Hořenska (Koř. 71. 96.) . . . . .              | 516·5 . . . . . | 1635 |
| selá, chalupy tam. kde se údolí dělí (Koř. 71. 109.) . . . . .                               | 387·0 . . . . . | 1224 |
| ěčovice, severo-západní skupenství chalup na rovině (Koř. 71. 97.) . . . . .                 | 377·4 . . . . . | 1194 |
| ár, východně Rovenska, hořejší chalupy (Koř. 71. 708.) . . . . .                             | 421·4 . . . . . | 1333 |
| ota Semínova, chalupy na západním konci (Koř. 71. 106.) . . . . .                            | 312·9 . . . . . | 987  |
| áň, střední výška vsi (Koř. 71. 114.) . . . . .                                              | 356·7 . . . . . | 1128 |
| lí kotce, střední výška místa (Koř. 71. 522.) . . . . .                                      | 409·4 . . . . . | 1295 |
| „ Petr, prostřední skupenství chalup (Koř. 71. 532.) . . . . .                               | 373·6 . . . . . | 1182 |
| buň, severo-západní skupenství domů při silnici (Koř. 71. 530.) . . . . .                    | 317·0 . . . . . | 1003 |
| lenice, dům na severo-východním konci, na hřebetě (Koř. 71. 110.) . . . . .                  | 548·6 . . . . . | 1736 |
| ažov, dolejší domy (Koř. 71. 120.) . . . . .                                                 | 497·5 . . . . . | 1574 |
| rná, skupenství chalup na severo-západním úpatí (Koř. 71. 87.) . . . . .                     | 582·0 . . . . . | 1841 |
| ačov, severo-západní skupenství chalup (Koř. 71. 88.) . . . . .                              | 547·3 . . . . . | 1732 |
| unovsko, hořejší domky (Koř. 71. 90.) . . . . .                                              | 488·0 . . . . . | 1544 |



|                                                                                                 | Nadm. výška v met. Ve víd. stf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 44. Tuhaň, jižně odtamtud sedlo na silnici mezi Tuhaní a Stružincem<br>(Koř. 71. 89.) . . . . . | 558·6 . . . 1767                |
| 45. „ nejvyšší bod lesnatého hřbetu severo-východně odtud<br>(Koř. 71. 186.) . . . . .          | 578·4 . . . 1830                |

## 21. Lomnice.

Zeměpisná šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Z celé plochy, v tomto čtverhranu obsažené leží:

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 11·3 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| " | " | " | " | 400—500 | " | 62·2 | " |
| " | " | " | " | 500—600 | " | 24·0 | " |
| " | " | " | " | 600—700 | " | 2·5  | " |

|                                                                                                                        | Nadm. výška v met. Ve víd. stf. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nedvěž, prostřední skupenství domů (Koř. 71. 163.) . . . . .                                                        | 439·8 . . . 1392                |
| 2. Skuhrov, holé návrší, 500 metrů severo-východně odtud (Triang.<br>Austr.) . . . . .                                 | 590·3 . . . 1868                |
| 3. Popelka u Rvačova, sedlo na cestě do Staré Lomnice k severu<br>(Koř. 71. 11.) . . . . .                             | 566·5 . . . 1793                |
| 4. Vrch Hrádek, východní vrchol (Koř. 71. 185.) . . . . .                                                              | 636·7 . . . 2014                |
| 5. Mořinov, nejvyšší bod na hoře na rovině (Koř. 71. 512.) . . . . .                                                   | 665·3 . . . 2105                |
| 6. Nouzov, chalupy v sedle při silnici do Lomnice (Koř. 71. 510.) . . . . .                                            | 564·8 . . . 1787                |
| 7. Tábor, hora, špička věže kaple jiho-západně Chlumu (Triang.<br>Austr.) . . . . .                                    | 706·1 . . . 2234                |
| 8. „ 50 kroků od jiho-východ. rohu kostela (Koř. 71. 35.) . . . . .                                                    | 684·2 . . . 2165                |
| 9. Chlum, v jiho-východ. úpatí hory Tábor, střední výška (Koř. 71.<br>107.) . . . . .                                  | 608·6 . . . 1926                |
| 10. Peklo, dolejší skupenství chalup (Koř. 71. 511.) . . . . .                                                         | 405·6 . . . 1283                |
| 11. Žďár, jihovýchodně Lomnice, hořejší chalupy na západním konci<br>vsi (Koř. 71. 44.) . . . . .                      | 524·2 . . . 1659                |
| 12. Nová ves, skupenství domů na severo-západním konci vsi (Koř.<br>71. 7.) . . . . .                                  | 450·2 . . . 1425                |
| 13. „ kostel, základ u věže (Koř. 71. 8.) . . . . .                                                                    | 433·2 . . . 1371                |
| 14. Lomnice, špička kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                                           | 501·2 . . . 1586                |
| 15. „ náměstí, v severozápadním rohu (Koř. 71. 9.) . . . . .                                                           | 484·7 . . . 1533                |
| 16. „ základ továrny Mastného na jiho-západním konci místa<br>(Koř. 71. 6.) . . . . .                                  | 496·8 . . . 1572                |
| 17. Stará Lomnice, nejhořejší skupenství domů na severo-západním<br>konci, při silnici (Koř. 71. 99.) . . . . .        | 561·5 . . . 1777                |
| 18. Lomnice, severo-východně odtud samotná hospoda u silnice do<br>Libštátu, na pokraji lesa (Koř. 71. 98.) . . . . .  | 482·3 . . . 1526                |
| 19. „ lesnaté návrší jižně as 1000 kroků od města (Koř.<br>71. 12.) . . . . .                                          | 541·3 . . . 1713                |
| 20. Hrábka, holá hůra, 2 kilom. východně Lomnic (Triang. Austr.) . . . . .                                             | 730·1 . . . 2310                |
| 21. Želechy (Rudolfovice), chalupy na západním konci vsi (Koř. 71. 100.) . . . . .                                     | 461·0 . . . 1459                |
| 22. Stransko, holé, lesem otočené návrší, 400 metrů k severo-východu<br>mlýna Stružineckého (Triang. Austr.) . . . . . | 508·2 . . . 1608                |
| 23. Libštát, makovice na kostelní věži (Koř. 71. 173.) . . . . .                                                       | 399·8 . . . 1265                |

|                                                                                     | Nadm. výška v met. Ve víd. stž. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Libštát, kostelní věž, dolejší hrana střechy (Koř. 71. 14.) . . .                   | 394·1 . . . 1247                |
| „ dům na severním konci městečka v údolí (Koř. 71. 174.) . . .                      | 362·4 . . . 1146                |
| „ stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.) . . .                                   | 385·5 . . . 1219                |
| „ jiho-východně odtud dolejší kraj lesa na hoře na rovině<br>(Koř. 71. 191.) . . .  | 490·2 . . . 1551                |
| „ lesík na hřbetě mezi Libštátem a Kruhem poblíž stezky<br>(Koř. 71. 192.) . . .    | 528·6 . . . 1672                |
| Košťálov, makovice kostelní věže (Koř. 71. 194.) . . .                              | 378·9 . . . 1199                |
| „ domy vedlé kostela (Koř. 71. 195.) . . .                                          | 344·9 . . . 1091                |
| „ místo v údolí u nejdolejšího mlýna na západním konci<br>vsi (Koř. 71. 193.) . . . | 322·4 . . . 1020                |
| Kunratice, jižně odtud výška náhorní roviny (Koř. 71. 177.) . . .                   | 513·8 . . . 1626                |
| Hoř. Kruh, myslivna na hořejším konci místa (Koř. 71. 274.) . . .                   | 455·0 . . . 1440                |
| Kruh dolní, stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . .                         | 417·6 . . . 1321                |
| Bělá, skupenství domů na severním konci vsi, na rovině (Koř.<br>71. 15.) . . .      | 442·5 . . . 1400                |
| „ severně odtamtud při stezce do Svojků, holá rovina<br>(Koř. 71. 34.) . . .        | 472·9 . . . 1502                |
| Svojek, skupenství chalup na hořejším konci vsi (Koř. 71. 275.) . . .               | 473·7 . . . 1498                |
| Tamplé, skupenství chalup v severní stráni (Koř. 71. 276.) . . .                    | 392·8 . . . 1243                |
| Babka, holá výšina, 700 metrů západně Karlova (Triang. Austr.) . . .                | 547·2 . . . 1731                |
| Jiva (vrch), jižně od vrcholu téhož jména, na pokraji lesa<br>(Koř. 71. 265.) . . . | 569·4 . . . 1801                |
| Paká stará, stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . .                         | 418·5 . . . 1323                |
| „ kostel, základ (Koř. 71. 18.) . . .                                               | 420·3 . . . 1330                |
| Ústí, skupenství domů u mostu železničního (Koř. 71. 16.) . . .                     | 417·6 . . . 1321                |
| Brodek, mlýn, základ (Koř. 71. 13.) . . .                                           | 410·3 . . . 1298                |
| Brdo, větrný mlýn severo-západně ode vsi (Koř. 71. 23.) . . .                       | 535·3 . . . 1694                |

## 22. Horka (Falgendorf.)

Zeměp. šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměp. délka: 33° 10' až 33° 20'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| v nadmořské výšce od 300—400 metrů | 9·0 procent, |
| „ „ „ „ 400—500 „                  | 63·3 „       |
| „ „ „ „ 500—600 „                  | 27·0 „       |
| „ „ „ „ 600—700 „                  | 0·7 „        |

|                                                                                                | Nadm. výška v met. Ve víd. stž. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Podlevín, dům uprostřed vsi při voznici (Koř. 71. 20.) . . .                                   | 492·3 . . . 1558                |
| Rokytná, dům severně při silnici vedlé průkopu (Koř. 71. 21.) . . .                            | 448·3 . . . 1418                |
| „ skupenství chalup v údolí na hořejším jiho-východním<br>konci (Koř. 71. 205.) . . .          | 461·7 . . . 1461                |
| Vidochov, domy při silnici na západ. konci místa (Koř. 71. 230.) . . .                         | 516·5 . . . 1635                |
| Stapná, domy v údolí na hořejším konci vsi (Koř. 71. 227.) . . .                               | 408·2 . . . 1292                |
| Levín, hrad, jiho-vých. kraj hořejší plochy k severo-vých. Pod-<br>levína (Koř. 71. 22.) . . . | 571·3 . . . 1808                |
| Levín (Olešnice), sedlo mezi horami Levinem a Císařovou (Koř.<br>71. 436.) . . .               | 511·0 . . . 1617                |

|     |                                                                                                          | Nadm. výška v met. Ve vid. stf. |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 8.  | Císařův chlum, holý, lesem obroubený vrchol severo-západně Vidochova (Triang. Austr.) . . . . .          | 605·4 . . .                     | 1915 |
| 9.  | " východní, samotný a lesem zarostlý vrchol (Koř. 71. 217.) . . . . .                                    | 592·0 . . .                     | 1873 |
| 10. | Horka (Falgendorf), železniční stanice (Koř. 71. Bar.) . . . . .                                         | 518·5 . . .                     | 1641 |
| 11. | " podle nivellování železničního . . . . .                                                               | 496·1 . . .                     | 1570 |
| 12. | Nedaře, hořejší skupenství domů (Koř. 71. 239.) . . . . .                                                | 492·6 . . .                     | 1559 |
| 13. | Borovnice, makovice kostelní věže (Koř. 71. Nr. 223 et 396.) . . . . .                                   | 508·1 . . .                     | 1608 |
| 14. | " větrný mlýn na holém hřbetě, jiho-vých. vsi, základ (Koř. 71. 225.) . . . . .                          | 346·4 . . .                     | 1096 |
| 15. | Čistický vrch, lesnatá kupa mezi Čistou a Borovnicí (Triang. Austr.) . . . . .                           | 569·9 . . .                     | 1803 |
| 16. | Studenec, skupenství chalup při silnici na jiho-vých. konci místa (Koř. 71. 216.) . . . . .              | 513·9 . . .                     | 1626 |
| 17. | " kostel, základ (Koř. 71. 240.) . . . . .                                                               | 530·2 . . .                     | 1678 |
| 18. | Vrch Horka, větrný mlýn, základ (Koř. 71. Nr. 215 et 392.) . . . . .                                     | 599·3 . . .                     | 1896 |
| 19. | Stráž (Wachberg), lesnatý vrchol, 750 metrů jiho-západně Rovnačova (Triang. Austr.) . . . . .            | 629·1 . . .                     | 1991 |
| 20. | Rovnačov, skupenství domů na západním svahu hory Stráže, nad silnicí (Koř. 71. 258.) . . . . .           | 560·0 . . .                     | 1772 |
| 21. | Lištná, lázně (Koř. 71. 315.) . . . . .                                                                  | 505·8 . . .                     | 1601 |
| 22. | Žďár, severo-vých. odtud samotný lesnatý vrch (Koř. 71. 270.) . . . . .                                  | 549·4 . . .                     | 1738 |
| 23. | Ždírec, skupenství domů u dolejšího mlýna v údolí (Koř. 71. 268.) . . . . .                              | 451·7 . . .                     | 1429 |
| 24. | " severně 350 met. od mlýna lesnaté návrší (Koř. 71. 269.) . . . . .                                     | 537·5 . . .                     | 1701 |
| 25. | Roztoky, základ zdi u hřbitova na západní straně (Koř. 71. 257.) . . . . .                               | 433·6 . . .                     | 1372 |
| 26. | Dolní Branná, jiho-západně odtud při silnici v lese, nedaleko kamenného stromu (Koř. 71. 255.) . . . . . | 494·6 . . .                     | 1565 |
| 27. | Lhota Zálesí, hořejší chalupy na hřbetu (Koř. 71. 379.) . . . . .                                        | 426·8 . . .                     | 1465 |
| 28. | Červený pahorek, les, sedlo na cestě z Bukoviny do Lhoty zá-lesní (Koř. 71. 241.) . . . . .              | 517·9 . . .                     | 1639 |
| 29. | Karlov, myslivna (Koř. 71. 393.) . . . . .                                                               | 411·1 . . .                     | 1300 |
| 30. | Čistá, dvůr při silnici, prostřed místa (Koř. 71. 229.) . . . . .                                        | 466·4 . . .                     | 1475 |
| 31. | Čistá, kostel, základ (Koř. 71. 222.) . . . . .                                                          | 430·4 . . .                     | 1361 |
| 32. | Dolní Kalná, kostel, základ (Koř. 71. 221.) . . . . .                                                    | 380·5 . . .                     | 1204 |
| 33. | Horní Kalná, skupenství domů na „Prašivce“ (Koř. 71. 238.) . . . . .                                     | 446·1 . . .                     | 1411 |
| 34. | Slemeno, domy dole v kotlině (Koř. 71. 376.) . . . . .                                                   | 393·5 . . .                     | 1245 |
| 35. | " severně odtud na hřbetě kamenná muka na cestě do Lhoty klášterské (Koř. 71. 237.) . . . . .            | 471·3 . . .                     | 1491 |
| 36. | Přední Ždírnice, dům na severním konci, v údolí (Koř. 71. 372.) . . . . .                                | 410·1 . . .                     | 1297 |
| 37. | Zadní Ždírnice, západně odtud na hořejším kraji vysokého lesa (Koř. 71. 382.) . . . . .                  | 522·5 . . .                     | 1654 |

### 23. Hostinný a Pilínkov.

Zeměpisná šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměpisná délka: 33° 20' až 33° 30'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| v nadmořské výšce od 300—400 metrů | 40·3 procent, |
| " " " " 400—500 "                  | 54·0 "        |
| " " " " 500—600 "                  | 5·7 "         |

|                                                                                                                         | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Na pískách (Sandhübel), chalupa u Borovničky (Koř. 71. 398.)                                                            | 473·7 . . . 1498                |
| Dobří (Eichhübel), lesnatý vrch 700 metrů severně od východních chalup v Borovničce (Triang. Austr.)                    | 505·3 . . . 1599                |
| Olešnice, makovice na kostelní věži (Koř. 71. 246.)                                                                     | 404·4 . . . 1279                |
| Vysoká stráž (Hochstrass), holé návrší na hřbetu mezi střední Olešnicí a vsí Dobrou myslí (Guthsmuths) (Triang. Austr.) | 447·7 . . . 1416                |
| Od Hostinného jižně na hřbetu kříž u cesty do Bestřve (Koř. 71. 378.)                                                   | 436·8 . . . 1382                |
| Vrch Bradlo, lesnatý vrchol 1·3 kilometrů od Nových zámek (Triang. Austr.)                                              | 520·1 . . . 1646                |
| Debrná Olešnice, vesnička severně od Debrného, chalupy východně cesty (Koř. 71. 287.)                                   | 429·7 . . . 1359                |
| Nové zámky, makovice na věži zámecké (Koř. 71. 375.)                                                                    | 410·3 . . . 1298                |
| „ jiho-východně odtud mlýn, základ (Koř. 67. 68.)                                                                       | 363·7 . . . 1150                |
| Bestřev (Neustadt), silnice u mostu přes Labe tamtéž (Koř. 71. 377.)                                                    | 320·5 . . . 1014                |
| Hostinný, makovice farní věže (Koř. 67. Nr. 52. et 381.)                                                                | 401·9 . . . 1272                |
| „ stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.)                                                                             | 349·9 . . . 1107                |
| „ továrna 1500 kroků východně od města v údolí (Koř. 71. 383.)                                                          | 339·1 . . . 1073                |
| Prosečné, dolejší domy v údolí (Koř. 71. 380.)                                                                          | 371·2 . . . 1175                |
| Vrch Scheiba, východně Prosečného, zdánlivý nejvyšší bod (Koř. 71. 385.)                                                | 492·1 . . . 1557                |
| Od Arnsdorfu východně na cestě do Čermné, nejvyšší vrchol v lese (Koř. 71. 389.)                                        | 505·3 . . . 1599                |
| Pereziéntál, při silnici do Forstu (Koř. 67. 189.)                                                                      | 384·3 . . . 1216                |
| Lejfy, hlavní silnice u mlýna Klugova (Koř. 67. 187.)                                                                   | 392·0 . . . 1240                |
| Červený kopec, holé návrší severo-východně od Arnsdorfu a jižně Leopoldova (Triang. Austr.)                             | 518·9 . . . 1642                |
| Od Hostinného severně na hřbetu hořejší kraj lesa (Koř. 71. 384.)                                                       | 455·5 . . . 1442                |
| Čermná, nejvyšší chalupy na planině v severo-východním konci tohoto místa (Koř. 67. 56.)                                | 483·0 . . . 1528                |
| „ chalupy v údolí as 1500 m. severo-západně od kostela (Koř. 67. 55.)                                                   | 429·7 . . . 1359                |
| „ kostel, základ (Koř. 67. Nr. 54. et 386.)                                                                             | 386·4 . . . 1223                |
| „ severně odtud 2000 kroků od kostela holé návrší na hoře na rovní (Koř. 71. 387.)                                      | 487·5 . . . 1543                |
| „ východně odtud stojící kříž u cesty od kostela k domkům „Buschhäuser“ (Koř. 67. 58.)                                  | 440·9 . . . 1395                |
| Janův dvůr, severo-západně odtud lesnatá hůra, nejhořejší skála (Koř. 67. 157.)                                         | 535·6 . . . 1695                |
| „ severo-západně odtud hůra, spodek skály (Koř. 67. 158.)                                                               | 489·0 . . . 1547                |
| „ severně odtud lesnatý vrch, nejvyšší skály (Koř. 67. 59.)                                                             | 542·5 . . . 1717                |
| Vlčice, špička kostelní věže (Triang. Austr.)                                                                           | 417·5 . . . 1321                |
| „ zámek, základ (Koř. 67. 60.)                                                                                          | 378·5 . . . 1198                |
| „ domy u cesty z Javorníka (Koř. 67. 65.)                                                                               | 402·5 . . . 1274                |
| „ cihelny severně odtud k Břecšteínu (Koř. 67. 63.)                                                                     | 399·7 . . . 1264                |
| „ holé návrší, západně od nejhořejších domů (Koř. 67. 159.)                                                             | 508·3 . . . 1610                |
| „ skála východně od nejhořejších chalup (Koř. 67. 167.)                                                                 | 525·1 . . . 1661                |
| Mlýn kamenný (Steinmühle), jižně Vlčic, základ (Koř. 67. 62.)                                                           | 366·2 . . . 1159                |
| Pílníkov, makovice věže farního kostela (Koř. 67. 70.)                                                                  | 416·2 . . . 1317                |
| „ kostelní věž, hořejší rám okna (Koř. 67. 71.)                                                                         | 387·3 . . . 1225                |
| „ hořejší domy na náměstí, severo-východně od kostela (Koř. 67. 67.)                                                    | 407·7 . . . 1290                |

|                                                                                                            | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 39. Pilínkov, dolejší díl města k mostu (Koř. 67. 501 Bar.) . . .                                          | 369·6 . . .                     | 1169 |
| 40. " stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . .                                                      | 357·2 . . .                     | 1130 |
| 41. Stráň (Leitenberg), holé návrší 860 metrů severně od kostela<br>v Pilínkově (Triang. Austr.) . . . . . | 412·8 . . .                     | 1306 |
| 42. Vrch Geyerglocke, holé návrší u lesa severně od Kunčic (Koř.<br>67. 57.) . . . . .                     | 447·5 . . .                     | 1416 |
| 43. Karlseck, nejhořejší domy (Koř. 67. 51.) . . . . .                                                     | 437·6 . . .                     | 1385 |
| 44. " jižní dům v sedle (Koř. 71. 388.) . . . . .                                                          | 494·1 . . .                     | 1373 |
| 45. Chotějovice, makovice na kostelní věži (Koř. 67. 46.) . . . .                                          | 415·2 . . .                     | 1314 |
| 46. " kostel, základ (Koř. 67. 47.) . . . . .                                                              | 368·2 . . .                     | 1165 |
| 47. " stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . . . .                                                  | 342·2 . . .                     | 1083 |
| 48. " nejvyšší chalupy nahoře na rovině severozápadně od<br>tohoto místa (Koř. 67. 50.) . . . . .          | 399·9 . . .                     | 1265 |
| 49. k návrší u kamenného lomu jiho-západně od kostela (Koř.<br>67. 53.) . . . . .                          | 392·8 . . .                     | 1243 |
| 50. Sv. Kateřina, špička věže kostela sv. Kateřiny jižně Chotě-<br>jovic (Triang. Austr.) . . . . .        | 541·0 . . .                     | 1711 |
| 51. " základ kostela na východní straně (Koř. 67. 43.) . . . .                                             | 522·8 . . .                     | 1655 |
| 52. Kateřinky, v údolí jižně pod kostelíkem sv. Kateřiny (Koř. 67. 79.)                                    | 406·7 . . .                     | 1287 |
| 53. " dům u dolejšího kraje lesa na severní straně vrchu sv.<br>Kateřiny (Koř. 67. 49.) . . . . .          | 411·6 . . .                     | 1302 |
| 54. Lysá hora (KahlerBerg), jiho-východně Chotějovic (Koř. 67.<br>Nr. 76. et 291.) . . . . .               | 546·3 . . .                     | 1728 |
| 55. Stráž vrch, holé návrší jiho-západně Pilínkova (Koř. 67. 75.) .                                        | 446·5 . . .                     | 1413 |
| 56. Na šibenici (Galgenberg), jižně Pilínkova (Koř. 67. 73.) . . .                                         | 477·5 . . .                     | 1511 |
| 57. Fichtenberg, lesnatý vrch 3·6 kilom. jižně Pilínkova (Triang. Austr.)                                  | 583·4 . . .                     | 1846 |

## 24. Trutnov.

Zeměp. šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměp. délka: 33° 30' až 33° 40'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 11·8 procent,

" " " " 400—500 " 74·0 "

" " " " 500—600 " 14·2 "

|                                                                                                             | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1. Vrch Topfberg, jihovýchodně Pilínkova, holá výšina u lesa<br>(Koř. 67. 72.) . . . . .                    | 446·9 . . .                     | 1414 |
| 2. " lesnatý hřbet 1·2 kilom. jiho-západně odtud (Koř. 67. 74.)                                             | 543·9 . . .                     | 1721 |
| 3. Georgengrund, prostřední výška místa (Koř. 68. Bar. 482.) . . .                                          | 431·4 . . .                     | 1365 |
| 4. Dolní Staré Buky, kde silnice spojuje se se silnicí trutnovsko-<br>pilníkovskou (Koř. 67. 66.) . . . . . | 443·4 . . .                     | 1402 |
| 5. Horní Staré Buky (Ob. Altenbuch), dolejší domy při cestě k ovčínu<br>(Koř. 68. Bar. 487.) . . . . .      | 413·6 . . .                     | 1309 |
| 6. " nejhořejší domy u cesty do Stráže (Koř. 68. Bar. 486.)                                                 | 447·1 . . .                     | 1414 |
| 7. Ovčín u Starých Buků (Altenbuch) (Koř. 68. Bar. 488.) . . . .                                            | 465·9 . . .                     | 1474 |
| 8. Humburky (Hohenbruk), chalupy u silnice do Trutnova, severní<br>konec (Koř. 68. Bar.) . . . . .          | 441·5 . . .                     | 1397 |
| 9. " nejdolejší domy v údolí (Koř. 67. 11.) . . . . .                                                       | 414·8 . . .                     | 1313 |

|                                                                                                              |             | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| . Humburky, jiho-západně odtud stojící holé návrší (Koř. 67. 12.)                                            | 473·5 . . . | 1182                            |
| . Obřanov (Kaltenhof), nejvyšší chalupy (Koř. 67. 14) . . .                                                  | 460·3 . . . | 1456                            |
| . „ jiho-východně odtud stojící holé návrší (Koř. 67. 13.)                                                   | 471·2 . . . | 1491                            |
| . Weigelsdorf, výška silnice u mostu, při posledním východním domku tohoto místa (Koř. 67. 15.) . . .        | 421·5 . . . | 1334                            |
| . „ holé návrší severo-západně odtud (Koř. 67. 18.) . .                                                      | 465·6 . . . | 1473                            |
| . Na pastvinách (Schäferberg), holá výšina 1·3 kilom. východně od Vlčic (Triang. Austr.) . . .               | 442·0 . . . | 1398                            |
| . Mlýn Stachelmühl, východně od Vlčic, základ (Koř. 67. 61.) .                                               | 372·6 . . . | 1179                            |
| . Čertovy domky (Höllenhäuser), holé návrší v lese, jižně odtud (Koř. 67. 17.) . . .                         | 508·2 . . . | 1608                            |
| . Horní Staré město, jiho-západně odtud stojící holý vrch v lese nad stezkou ke kostelu (Koř. 67. 20.) . . . | 502·5 . . . | 1590                            |
| . Dolní Staré město, jiho-západně odtud a západně od přádelny (Koř. 67. 19.) . . .                           | 482·1 . . . | 1522                            |
| . „ přádelna, západní vjezd od silnice (Koř. 67. 26.) . .                                                    | 422·5 . . . | 1337                            |
| . Trutnov, povrch Úpy u mlýna v Dolejším Předměstí (Koř. 67. 45.) . . .                                      | 409·7 . . . | 1296                            |
| . „ stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . .                                                          | 416·9 . . . | 1319                            |
| . „ výška mostu u prostřední brány přes mlýnskou strouhu vedoucího (Koř. 67. 82.) . . .                      | 420·4 . . . | 1330                            |
| . „ radnice, práh vchodu z náměstí (Koř. 67. 81.) . .                                                        | 425·9 . . . | 1348                            |
| . „ hostinec „u bílého koně“, I. poschodí (Koř. 67. 80.)                                                     | 435·0 . . . | 1376                            |
| . „ kostelní věž, osa hodinových rafik (Koř. 67. 4.) . .                                                     | 466·5 . . . | 1476                            |
| . „ farní kostel, makovice věže (Koř. 67. 3.) . . .                                                          | 488·4 . . . | 1545                            |
| . „ střelnice (Koř. 67. 32.) . . .                                                                           | 415·0 . . . | 1313                            |
| . „ dům Hummelhof, základ (Koř. 67. 30.) . . .                                                               | 430·0 . . . | 1360                            |
| . „ Gablenzova hůra u Trutnova (dříve na Šibenici), signálový kámen před postavením pomníku (Triang. Austr.) | 505·7 . . . | 1600                            |
| . „ kamenný pomník, základ (Koř. 68. 230.) . . .                                                             | 506·7 . . . | 1603                            |
| . „ pomník, hořejší konec pyramidy (Koř. 68. 231.) . .                                                       | 527·8 . . . | 1670                            |
| . „ kaplička sv. Jana, makovice věže (Koř. 67. 9.) . .                                                       | 528·7 . . . | 1672                            |
| . „ dolní hrana střechy na věži (Koř. 67. 10.) . . .                                                         | 515·7 . . . | 1631                            |
| . Chřiblické předměstí u Trutnova, nejhořejší domy v údolí (Koř. 68. Bar.) . . .                             | 457·0 . . . | 1446                            |
| . Holé návrší k severovýchodu předměstí Chřiblického v Trutnově (Koř. 67. 7.) . . .                          | 452·2 . . . | 1431                            |
| . U Trutnova holé návrší, 1000 m. k severovýchodu od střelnice (Koř. 67. 31.) . . .                          | 505·2 . . . | 1599                            |
| . U dolního Starého města, návrší k severovýchodu přádelny (Koř. 67. 28.) . . .                              | 494·7 . . . | 1565                            |
| . Nový dvůr, jiho-východně odtud skupenství domů při cestě do Trutnova (Koř. 67. 182.) . . .                 | 441·4 . . . | 1396                            |
| . Poříčí, západně odtud přádelna, základ (Koř. 67. 6.) . . .                                                 | 407·3 . . . | 1289                            |
| . „ domy v jižní straně (Koř. 68. 232.) . . .                                                                | 414·3 . . . | 1311                            |
| . „ severo-západně od přádelny, hořejší okraj lesa nahoře na rovině (Koř. 67. 5.) . . .                      | 474·8 . . . | 1503                            |
| . „ lesnaté návrší jiho-východně od přádelny (Koř. 67. 8.)                                                   | 512·1 . . . | 1620                            |
| . „ v údolí pod železničním mostem (E. N. d. S. N. V. B.) (Koř. 68. 322.) . . .                              | 386·3 . . . | 1222                            |
| . „ železniční most vedoucí přes Petřkovický potok u nádraží (E. N. d. S. N. V. B.) (Koř. 68. 323.) . . .    | 406·2 . . . | 1285                            |
| . Petřkovice, domy u silnice v ohbu jejím (Koř. 68. 100 Bar.) .                                              | 393·8 . . . | 1246                            |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|     |                                                                                                                                       |             |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 47. | Kozí hůrka (Ziegenberg), nejvyšší severní skála na lesnatém vrchu (Koř. 68. 202.) . . . . .                                           | 601·2 . . . | 1902 |
| 48. | „ dolní okraj lesa na východní straně této hory, na cestě do Markouše (Koř. 68. 201.) . . . . .                                       | 533·0 . . . | 1686 |
| 49. | Bohušnice, chalupy při Úpě (Koř. 68. Bar. 477.) . . . . .                                                                             | 383·5 . . . | 1214 |
| 50. | Starý Rokytník, kostel, základ (Koř. 68. 204.) . . . . .                                                                              | 404·8 . . . | 1281 |
| 51. | „ nejhořejší domy v údolí u cesty do Trutnova (Koř. 68. Bar. 491.) . . . . .                                                          | 440·5 . . . | 1394 |
| 52. | Nový Rokytník (N. Rognitz), domy u cesty do St. Rokytníka (Koř. 68. Bar. 490.) . . . . .                                              | 500·5 . . . | 1584 |
| 53. | Vrch Hranná, holá výšina 600 metrů severo-severo-západně od hořejších domů v Střitěži (Triang. Austr.) . . . . .                      | 552·4 . . . | 1747 |
| 54. | Hůrka Plattenberg, holé návrší na okraji lesa 1·8 kilom. jiho-východně od hořejších domů v Novém Rokytníku (Triang. Austr.) . . . . . | 530·4 . . . | 1678 |
| 55. | Sorge, severo-západní domky této vsi, západně od N. Rokytníka (Koř. 68. Bar. 489.) . . . . .                                          | 522·1 . . . | 1652 |
| 56. | Střitěž (Burgersdorf), domy uprostřed místa u silnice (Koř. 68. Bar. 485.) . . . . .                                                  | 514·7 . . . | 1628 |
| 57. | „ jižně odtud nejvyšší bod silnice k Zárovu (Koř. 68. Bar. 484.) . . . . .                                                            | 555·1 . . . | 1756 |
| 58. | Rubínovice (Rudersdorf), na rozcestí do Radčel a do Suchovršíce (Koř. 68. Bar. 476.) . . . . .                                        | 394·8 . . . | 1250 |
| 59. | „ jižně odtud u kamenného kříže (Koř. 68. Bar. 499.) . . . . .                                                                        | 449·3 . . . | 1422 |
| 60. | „ jižně odtud nejnižší místo cesty do Horního Radčel (Koř. 68. Bar. 498.) . . . . .                                                   | 432·3 . . . | 1368 |
| 61. | Dolní Zárov, severně odtud lesnatý vrch (Koř. 68. Bar. 483.) . . . . .                                                                | 527·1 . . . | 1667 |
| 62. | Studenec, nejvyšší chalupy na cestě do N. Rokytníka (Koř. 68. Bar. 496.) . . . . .                                                    | 507·3 . . . | 1605 |
| 63. | „ nejdolejší domy v údolí (Koř. 68. Bar. 495.) . . . . .                                                                              | 479·7 . . . | 1517 |
| 64. | Hora Radčel, odkud vychází cesta vedoucí do Rubínovic (Koř. 68. Bar. 497.) . . . . .                                                  | 431·8 . . . | 1367 |
| 65. | Cesta z Kyj (Kaile) do Hoř. Radčel, na rozcestí do Studence (Koř. 68. Bar. 494.) . . . . .                                            | 488·6 . . . | 1546 |
| 66. | Dolní Radčel, chalupy na dolejší konci místa, kde se údolí dělí (Koř. 68. Bar. 493.) . . . . .                                        | 376·0 . . . | 1190 |
| 67. | Úpice, 1 kilom. západně nejvyšší bod hřbetu horského (Hd. 68. 26.) . . . . .                                                          | 439·4 . . . | 1390 |
| 68. | Severně Suchovršíce železničný tunel skrze skálu Ruprechtovu, koleje (E. N. S. N. d. V. B.) (Koř. 68. 320.) . . . . .                 | 410·6 . . . | 1299 |
| 69. | Sedm domků u Sedloňova starého, a sice ten, který nejvíce k severozápadu leží (Koř. 68. 209.) . . . . .                               | 424·3 . . . | 1342 |
| 70. | „ lesnatý vrch jižně odtud (Hd. 68. 11.) . . . . .                                                                                    | 482·6 . . . | 1527 |

## 25. Svatoňovice.

Zeměp. šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměp. délka: 33° 40' až 33° 50'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 10·8 procent,

„ „ „ „ 400—500 „ 33·0 „

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| v nadmořské výšce od 500—600 metrů | 36·3 procent, |
| " " " " 600—700 "                  | 18·7 "        |
| " " " " 700—800 "                  | 1·2 "         |

Nadm. výška v met. Ve vid. stř.

|                                                                                                                                   |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Úpice, domy u mostu přes řeku (Koř. 68. Bar. 492.)                                                                                | 349·5 | 1106 |
| " výšina 1 kilom. východně od města (Hd. 68. 196.)                                                                                | 384·6 | 1217 |
| Sichrov, přádelna, základy (Hd. 68. 7.)                                                                                           | 320·3 | 1013 |
| Záleší, kostelíček, základy (Hd. 68. 3.)                                                                                          | 347·9 | 1101 |
| " výšina jižně od vsi (Hd. 68. 14.)                                                                                               | 423·1 | 1339 |
| Suchovršice, roh lesa nad jižními chalupami této vsi (Hd. 68. 25.)                                                                | 391·6 | 1239 |
| " vrch 600 metrů západně odtud (Hd. 68. 24.)                                                                                      | 469·8 | 1486 |
| Suchovršice, výšina 250 metrů východně odtud (Hd. 68. 12.)                                                                        | 460·0 | 1455 |
| Sedloňov starý, domy ležící na jižním konci vsi, na čepení u silnice (Koř. 68. 207.)                                              | 377·0 | 1194 |
| Markouš, domy poblíž cesty do Bezděkova (Koř. 68. 205.)                                                                           | 420·6 | 1331 |
| " severo-západně odtud ležící nejvyšší bod vozové cesty do Bezděkova (Koř. 68. 200.)                                              | 538·7 | 1705 |
| Bezděkov, jiho-východně odtud ležící nejvyšší skalnatý vrch „na pustínách“ u Slatiny (Koř. 68. 199.)                              | 706·9 | 2237 |
| Paseka, nejhořejší domek (Koř. 68. 195.)                                                                                          | 561·0 | 1775 |
| " západně odtud se táhnoucí nejvyšší hřbet k Markouši (Koř. 68. 197.)                                                             | 647·2 | 2048 |
| Študénka, severně odtud táhnoucí se hřbet k Slatině (Koř. 68. 196.)                                                               | 584·0 | 1848 |
| Radvanice, severozápadně odtud, kde se silnice k Chvalči odděluje (Koř. 68. 185.)                                                 | 584·4 | 1849 |
| Od Radvanic 1500 m. severně ležící skalnatý vrch, jižní výběžky hory Krupné (Koř. 68. 184.)                                       | 701·0 | 2218 |
| Od Radvanic východně se nalézající sedlo mezi horou Krupnou a Radčem (Koř. 68. 183.)                                              | 593·4 | 1877 |
| Radeč, lesem zarostlý vrchol, západně od Vernířovic dolních (průměr 2 měř.) (Koř. 68. 181.)                                       | 690·3 | 2184 |
| Žaltman (Hexenstein), nejvyšší skály horského hřbetu toho, 2·1 kilometrů severně od zámku v Malých Svatoňovicích (Triang. Austr.) | 721·5 | 2283 |
| Kvičala, výšina západně od Vel. Svatoňovic (Hd. 68. 2a.)                                                                          | 437·2 | 1383 |
| " sedlský dvůr, na jižním svahu této výšiny (Hd. 68. 22.)                                                                         | 412·0 | 1303 |
| " kříž, jihovýchodně od jmenované výšiny (Hd. 68. 21.)                                                                            | 404·8 | 1268 |
| Veliké Svatoňovice, jižní domy na cestě do Úpice (Hd. 68. 49.)                                                                    | 362·1 | 1146 |
| " kde se železnice s údolím křížuje, hloubka údolí (E. N. S. N. D. V. B.) (Koř. 68. 319.)                                         | 390·1 | 1234 |
| " kříž 300 metrů odtud na polní cestě (Hd. 68. 15.)                                                                               | 368·0 | 1164 |
| Svatoňovice, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.)                                                                            | 412·7 | 1303 |
| Malé Svatoňovice, kostel, makovice věže (Hd. 68. 4.)                                                                              | 435·3 | 1387 |
| " kříž na cestě odtud do Batňovic (Hd. 68. 17.)                                                                                   | 365·6 | 1157 |
| " severně odtud „Milina štola“, staré opuštěné doly pod Žaltmanem (Koř. 68. 60 Bar.)                                              | 447·6 | 1416 |
| Kyselův Kopec, výšina 400 metrů jiho-východně od Malých Svatoňovic (Hd. 68. 5.)                                                   | 466·9 | 1477 |
| Homole, výšina 400 metrů severo-západně od Malých Svatoňovic (Hd. 68. 1a.)                                                        | 549·6 | 1739 |
| Čertova hůra, výšina 850 metrů severně od Batňovic (Hd. 68. 10.)                                                                  | 380·7 | 1205 |
| Holcárka, lesnatý vrch 200 metrů severně od nejhořejších domků Petrovických (Triang. Austr.)                                      | 688·8 | 2179 |



|     |                                                                                                         | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 35. | Straškovice, východní domy na stráni (Hd. 68. 33.) . . . . .                                            | 503·6 . . .                     | 1593 |
| 36. | " domy při jihozápadním konci (Hd. 68. 46.) . . . . .                                                   | 475·4 . . .                     | 1504 |
| 37. | Vodolov, severní sedlský dvorec na cestě odtud do Straškovic<br>(Hd. 68. 40.) . . . . .                 | 558·9 . . .                     | 1768 |
| 38. | Poledný, kopec, nejvyšší bod (Hd. 68. 34.) . . . . .                                                    | 682·2 . . .                     | 2158 |
| 39. | Rtyně, domy na cestě do Vodolova (Hd. 68. 35.) . . . . .                                                | 380·8 . . .                     | 1205 |
| 40. | " domy na východním konci místa (Hd. 68. 37.) . . . . .                                                 | 403·6 . . .                     | 1277 |
| 41. | Bohdašín, kaple, základ (Hd. 68. 191.) . . . . .                                                        | 512·8 . . .                     | 1622 |
| 42. | Rokytník, uprostřed vsi (Hd. 68. 60.) . . . . .                                                         | 463·0 . . .                     | 1465 |
| 43. | Turov, výšina 450 metrů severně od nejhořejších chalup Rokyt-<br>nických (Triang. Austr.) . . . . .     | 599·2 . . .                     | 1895 |
| 44. | Bystré, dům Boudišův, střecha na severo-východním svahu hory<br>Turova (Hd. 68. 58.) . . . . .          | 502·2 . . .                     | 1589 |
| 45. | " domy na cestě do Kostelce (Hd. 68. 54.) . . . . .                                                     | 489·3 . . .                     | 1548 |
| 46. | " výšina 200 metrů východně od severního konce místa<br>(Hd. 68. 63.) . . . . .                         | 575·4 . . .                     | 1820 |
| 47. | " výšina 100 metrů západně od severního konce místa<br>(Hd. 68. 56.) . . . . .                          | 479·4 . . .                     | 1517 |
| 48. | " začátek lesa na cestě odtud do Kostelce, 550 metrů<br>odtud (Hd. 68. 64.) . . . . .                   | 504·2 . . .                     | 1595 |
| 49. | Starkov, dolní domy v údolí u mostu přes potok (průměr z 2<br>měř.) (Koř. 60. 173.) . . . . .           | 422·3 . . .                     | 1336 |
| 50. | " kostel, základ (Hd. 68. Bar.) . . . . .                                                               | 447·6 . . .                     | 1416 |
| 51. | " kostel, makovice věže (Hd. 68. 78.) . . . . .                                                         | 470·4 . . .                     | 1488 |
| 52. | " nejhořejší kaple na Kalvarii (Hd. 68. 53.) . . . . .                                                  | 526·1 . . .                     | 1664 |
| 53. | Vápenka, hořejší domy v údolí (Koř. 68. 376.) . . . . .                                                 | 480·0 . . .                     | 1519 |
| 54. | " severo-východně odtud roh lesa na rovině západně od<br>Skalky (Koř. 68. 374.) . . . . .               | 621·5 . . .                     | 1967 |
| 55. | Vernířovice Dolní, bělidlo, základ (Koř. 68. 371.) . . . . .                                            | 474·3 . . .                     | 1501 |
| 56. | Od Vernířovic Dolních k západu stojící kříž při cestě do skelné<br>hutě (Koř. 68. 370.) . . . . .       | 530·1 . . .                     | 1677 |
| 57. | Od Horních Vernířovic, východně nejvyšší místo cesty do Stu-<br>dnice v sedle (Koř. 68. 375.) . . . . . | 575·8 . . .                     | 1822 |
| 58. | Skalka, chalupy prostřed této vsi a údolí (Koř. 68. 380.) . . . . .                                     | 496·5 . . .                     | 1571 |
| 59. | Lesnatý vrch mezi Skalkou a Javorem (Koř. 68. 381.) . . . . .                                           | 591·8 . . .                     | 1873 |
| 60. | Kamenný kříž u cesty ze Skalky do Javoru (Koř. 60. 174.) . . . . .                                      | 573·0 . . .                     | 1813 |
| 61. | Studnice, nejdolejší chalupy v údolí (Koř. 68. 372.) . . . . .                                          | 515·8 . . .                     | 1632 |
| 62. | Silnice ze Studnice do Skal (Bischofstein) vedoucí, kříž v sedle<br>(Koř. 68. 377.) . . . . .           | 646·8 . . .                     | 2047 |
| 63. | Kočičí skála u Skal (Koř. 68. 378.) . . . . .                                                           | 707·3 . . .                     | 2238 |
| 64. | Skály (Bischofstein), zámek, hořejší kraj střechy (Kořistka<br>68. 379.) . . . . .                      | 667·8 . . .                     | 2113 |
| 65. | " rozhraní vod proti Teplici (Koř. 68. 128. Bar.) . . . . .                                             | 701·6 . . .                     | 2220 |
| 66. | Čapí hora (Storch - Berg) 900 metrů západně Skal (Triang.<br>Austr.) . . . . .                          | 785·1 . . .                     | 2484 |

## 26. Police.

Zeměp. délka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměp. šířka: 33° 50' až 34° 0'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 2·5 procent

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| " | " | " | " | 400—500 | " | 46·8 | " |
| " | " | " | " | 500—600 | " | 34·0 | " |
| " | " | " | " | 600—700 | " | 14·0 | " |
| " | " | " | " | 700—800 | " | 2·7  | " |

Nadm. výška v met. Ve víd. stří.

|     |                                                                                          |       |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1.  | Javor, domky u potoka (Koř. 60. 175.)                                                    | 451·3 | 1428 |
| 2.  | Metuj-Dědové, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                                    | 457·7 | 1448 |
| 3.  | Česká Metuj, domy na stráni (Hd. 68. 76.)                                                | 471·7 | 1492 |
| 4.  | " dolejší domy v údolí uprostřed vsi (Koř. 68. 385.)                                     | 454·0 | 1436 |
| 5.  | Maršov, výšina 500 metrů západně odtud (Hd. 68. 100.)                                    | 531·3 | 1706 |
| 6.  | Veliké Petrovice, mlýn u mostu, základ (Hd. 68. Bar.)                                    | 425·4 | 1346 |
| 7.  | " dům při západním konci místa (Hd. 68. 86.)                                             | 498·4 | 1577 |
| 8.  | Končina, výšina 1 kilom. západně od Vel. Petrovic (Triang. Austr.)                       | 541·4 | 1713 |
| 9.  | Machov, první pila ve vsi, základ (Hd. 68. Bar.)                                         | 373·0 | 1180 |
| 10. | Lhota (Mölsen), domky při západním konci (Hd. 68. Bar.)                                  | 377·8 | 1195 |
| 11. | " domky při jiho-východním konci (Hd. 68. Bar.)                                          | 403·0 | 1275 |
| 12. | Dolní Srbská, domy na stráni severo-západní (Hd. 68. Bar.)                               | 447·2 | 1415 |
| 13. | " výšina asi 600 metrů severo-východně od jmenovaného místa (Hd. 68. 116.)               | 589·5 | 1865 |
| 14. | Bezděkov, špiče kostelní věže (Triang. Austr.)                                           | 515·9 | 1633 |
| 15. | " chalupa při severo-východním konci místa na silnici (Hd. 68. 75.)                      | 496·9 | 1572 |
| 16. | Bílá, výšina 350 metrů severozápadně odtud, na stráni porostlá (Hd. 68. 92.)             | 608·0 | 1924 |
| 17. | Od Bezděkova, severně kříž na silnici odtud do Police (Hd. 68. 74.)                      | 490·2 | 1553 |
| 18. | Police, špiče kostelní věže klášterské (Triang. Austr.)                                  | 474·5 | 1501 |
| 19. | " prostřední výška města (Koř. 68. Bar.)                                                 | 443·8 | 1404 |
| 20. | " stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                                                | 390·1 | 1234 |
| 21. | " druhý kříž na západní stráni blíže silnice do Žďaru (Hd. 68. 83.)                      | 480·2 | 1519 |
| 22. | " kříž při severním konci města (Hd. 68. 69.)                                            | 516·7 | 1635 |
| 23. | Ledhuj, uprostřed vsi (Hd. 68. 73.)                                                      | 469·6 | 1486 |
| 24. | Suchdol, mlýn, základ (Hd. 68. Bar.)                                                     | 499·3 | 1580 |
| 25. | " nejhořejší chalupy v údolí (Koř. 68. 416.)                                             | 548·1 | 1734 |
| 26. | " jižně odtud kříž na cestě do Bílého, v sedle (Koř. 68. 417.)                           | 576·9 | 1825 |
| 27. | Hlavnov, nejdolejší chalupa u mlýna (Koř. 68. 413.)                                      | 474·6 | 1502 |
| 28. | " nejhořejší chalupy na jiho-východ. konci (Koř. 68. 414.)                               | 516·6 | 1635 |
| 29. | Kluček, lesnatý vrch k jihu od Hlavnova (Koř. 68. 415.)                                  | 619·4 | 1959 |
| 30. | Žďár, hořejší chalupy u silnice z České Metuje (Koř. 68. 386.)                           | 456·9 | 1446 |
| 31. | " nejhořejší chalupy na hoře při severním konci vsi (Koř. 68. 412.)                      | 470·2 | 1488 |
| 32. | Špuláky, kříž u vozové cesty z Metuje české do Pěkova u paty hory Ostaše (Koř. 68. 384.) | 463·7 | 1467 |
| 33. | Ostaš, vysoká skalnatá hora k východu Dědové, severní vrchol (Triang. Austr.)            | 688·2 | 2177 |

|     |                                                                                                                          | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 34. | Ostaš, jiho-západní vrchol (Koř. 68. 410.) . . . . .                                                                     | 650·8 . . . 2059                |
| 35. | „ dolejší konec severního skalného srázu (Koř. 68. 409.) . . . . .                                                       | 663·2 . . . 2099                |
| 36. | „ vesnice, dolejší chalupy (Koř. 68. 408.) . . . . .                                                                     | 575·1 . . . 1819                |
| 37. | Lachov, sedlský statek Kraftův, čís. 35 (Koř. 68. 129. Bar.) . . . . .                                                   | 550·6 . . . 1742                |
| 38. | „ vých. odtud ležící sedlský dvůr Theerův (Koř. 68. 405.) . . . . .                                                      | 560·5 . . . 1774                |
| 39. | Vrch Heyde-Berg (na Pasece) blíž Javoru (prům. z 2 měření)<br>(Koř. 68. 349.) . . . . .                                  | 634·9 . . . 2009                |
| 40. | Pěkov (Hvězda), pole při dolejších konci vsi na východní straně<br>(Koř. 68. 407.) . . . . .                             | 534·1 . . . 1686                |
| 41. | „ severo-západně odtud kamenná boží muka na cestě ke<br>dvorci Theerovu (Koř. 68. 406.) . . . . .                        | 567·2 . . . 1795                |
| 42. | „ severozápadně odtud hořejší konec lesíka nahoře na<br>hřbetě (Koř. 68. 404.) . . . . .                                 | 572·3 . . . 1811                |
| 43. | Hutberk, ves, zvonice (Koř. 68. 136 Bar.) . . . . .                                                                      | 566·6 . . . 1793                |
| 44. | Na Žaltmanském hřbetě, nejvyšší skalnatý vrch jižně Hutberka<br>a severo-východně Hvězdy (Koř. 68. 403.) . . . . .       | 688·8 . . . 2180                |
| 45. | Hvězda, vížka kaple, v prostředku hvězdy na ní (Koř. 68. 399.) . . . . .                                                 | 683·8 . . . 2164                |
| 46. | „ základ kostela (Koř. 68. 389.) . . . . .                                                                               | 674·9 . . . 2136                |
| 47. | „ myslivna, balkon na východní straně (Koř. 68. 401.) . . . . .                                                          | 666·4 . . . 2108                |
| 48. | Geyerskorb (Hůra Alžbětina), nejvyšší bod skalnatého hřbetu<br>950 metrů jiho-východně Hvězdy (Triang. Austr.) . . . . . | 701·1 . . . 2218                |
| 49. | Na Žaltmanském hřbetě, skalnatý výpustek 2150 m. vých. od Alžbě-<br>tiny hůry (Koř. 68. 436.) . . . . .                  | 693·0 . . . 2193                |
| 50. | Slavné, střední výška vsi (Koř. 68. 388.) . . . . .                                                                      | 598·3 . . . 1892                |
| 51. | Ringelkoppe (Na Špici) skalnatý vrchol 1·1 kilom. severně od<br>myslivny Božanovské (Triang Austr.) . . . . .            | 757·3 . . . 2396                |
| 52. | „ pata této hory u dolejšího konce lesa, 1 kilom. severně<br>od Lhoty (Mölsen) (Hd. 68. 119.) . . . . .                  | 528·7 . . . 1673                |
| 53. | Martínkovice, hořejší domy v údolí nad třetím mlýnem (Koř.<br>68. 434.) . . . . .                                        | 473·0 . . . 1496                |
| 54. | Skřince, jižně odtud stojící domek na dolejších výpustku lesa<br>při polní cestě k Hvězdě (Koř. 68. 435.) . . . . .      | 421·3 . . . 1333                |
| 55. | „ nejhořejší domek na západním konci tohoto místa neda-<br>leko lesa (Koř. 68. 441.) . . . . .                           | 436·7 . . . 1381                |
| 56. | „ chalupy u druhého mlýna při silnici ke Kremžským<br>domkům (Krimshäuser) (Koř. 68. 439.) . . . . .                     | 389·8 . . . 1234                |
| 57. | „ jižně odtud dřevěný kříž nedaleko cihelny (Koř. 68. 437.) . . . . .                                                    | 409·0 . . . 1294                |
| 58. | „ silnice u mostu blíž mlýna Kremžského (Koř. 68. 438.) . . . . .                                                        | 379·4 . . . 1200                |
| 59. | „ severně odtud dřevěný kříž na vozové cestě k cihelně<br>u chalup Kremžských (Koř. 68. 440.) . . . . .                  | 461·3 . . . 1460                |

## 27. Božanov (a Radkov v Prusku).

Zeměpisná šířka: 50° 30' až 50° 35'

Zeměpisná délka: 34° 0' až 34° 20'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 32·0 procent,

„ „ „ „ 400—500 „ 62·3 „

„ „ „ „ 500—600 „ 4·7 „

„ „ „ „ 600—700 „ 1·0 „

|                                                                                                      |  | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------|
| Silnice ze Skřinec do Martinkovic vedoucí, druhý kříž (Koř. 68. 430.)                                |  | 507·4                           | 1605 |
| Martinkovice (Merzdorf), špiče kostelní věže (Triang. Austr.)                                        |  | 421·6                           | 1334 |
| " kostel sv. Jiří, základ (Koř. 68. 431.)                                                            |  | 378·3                           | 1197 |
| " prostřed vsi dům na silnici ku Skřincům (Koř. 68. 429.)                                            |  | 382·3                           | 1210 |
| Božanov (Barzdorf), špiče kostelní věže (Triang. Austr.)                                             |  | 444·2                           | 1405 |
| " domy východně kostela, na protější straně (Hd. 68. 104.)                                           |  | 397·6                           | 1258 |
| " první kříž nad Božanovským kostelem (Hd. 68. 106.)                                                 |  | 414·8                           | 1312 |
| " 400 metrů odtud při hořejší cestě do Martinkovic pod vrchem Ringelkoppe (Hd. 68. 108.)             |  | 421·7                           | 1334 |
| " lesík jihovýchodně kostela nahore na hřbetě (Koř. 68. 424.)                                        |  | 460·1                           | 1455 |
| " výšina 1·8 kilom. jižně kostela Božanovského, 220 m. k západu hranice zemské (Triang. Austr.)      |  | 489·5                           | 1549 |
| Studená (Kaltwasser), mlýn, základ (Hd. 68. Bar.)                                                    |  | 426·3                           | 1349 |
| " pomezí tabule při pruských hranicích na cestě do Radkova (Hd. 68. Bar.)                            |  | 418·3                           | 1313 |
| Nový dvůr, severo-východně Božanova (Hd. 68. 109.)                                                   |  | 448·1                           | 1418 |
| Ottendorf, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                                                   |  | 355·1                           | 1123 |
| " sedlský dvorec při ústí Rosentálského potoka (Koř. 68. 433.)                                       |  | 356·7                           | 1128 |
| Od Ottendorfského kostela 800 m. jižně, kraj lesa nahore na rovině (Koř. 68. 428.)                   |  | 417·4                           | 1320 |
| V Ottendorfském lese k východu Velké vsi, poněkud lesem porostlé návrší (Koř. 68. 458.)              |  | 431·8                           | 1367 |
| Velká ves (Grossdorf), dům u silnice k Rosentálu nedaleko mostu (Koř. 68. 456.)                      |  | 381·5                           | 1207 |
| " dvůr Popelův (Popelbauer), základ stavení (Koř. 68. 457.)                                          |  | 404·3                           | 1279 |
| Teuberova hůra, výšina východně Broumova a 400 m. východně od dvoru Popelova (Triang. Austr.)        |  | 427·5                           | 1352 |
| Šonov, sedlské dvorce v údolí prostřed vsi (Koř. 68. 459.)                                           |  | 411·7                           | 1302 |
| " východně odtud dvorec Kinzlův (Kinzelbauer) (Koř. 68. 464.)                                        |  | 429·7                           | 1359 |
| " západně od dolních domů tohoto místa holé návrší, severo-západně od mezníka č. 38. (Koř. 68. 461.) |  | 424·3                           | 1342 |
| Neurode, makovice kostelní věže (Preuss. Verm. 116.)                                                 |  | 429·6                           | 1359 |
| " na náměstí pod radnicí (Preuss. Str. N. 35.)                                                       |  | 392·3                           | 1241 |
| " signál u lomu červeného pískovce (Preuss. Verm. 106.)                                              |  | 584·3                           | 1849 |
| " kaplička sv. Anny (Preuss. Verm. 112.)                                                             |  | 635·3                           | 2010 |
| Bochov, návrší 300 kroků k severu vesnice (Preuss. Verm. 113.)                                       |  | 515·0                           | 1629 |
| Ebersdorf, makovice kostelní věže (Preuss. Verm. 111.)                                               |  | 509·9                           | 1613 |
| " kostel, základ (Prud. 170.)                                                                        |  | 478·3                           | 1513 |
| Od Ebersdorfu k sev.-záp., Kamenná hora (Stein-Berg) (Reym. K.)                                      |  | 659·8                           | 2087 |
| Schlegel, makovice kostelní věže (Preuss. Verm. 108.)                                                |  | 443·8                           | 1404 |
| " zámek, základ (Prud. 179.)                                                                         |  | 403·6                           | 1277 |
| Kaple všech Svatých u Schleglu (Preuss. Verm. 110.)                                                  |  | 637·3                           | 2016 |
| Řeka Stenava, na hranici Čech u vesnice Scheidewinkel (Preuss. Fl. N. 16.)                           |  | 336·0                           | 1063 |
| Tanschendorf, kostel (Prud. 205.)                                                                    |  | 346·6                           | 1097 |
| " řeka Stenava pod kostelem (Preuss. Fl. N. 17.)                                                     |  | 332·3                           | 1051 |
| " kolonie Endegut, mezník č. 146 na hranici (Preuss. Verm. 101.)                                     |  | 424·0                           | 1341 |

|                                                                                             | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 39. Geyerberg u Tunschendorfu (Preuss. Verm. 102.) . . . . .                                | 438·5 . . . . .    | 1388         |
| 40. Scharfeneck, špiče zámecké věže (Preuss. Verm. 99.) . . . . .                           | 385·0 . . . . .    | 1218         |
| 41. Řeka Stenava v Horní Stenavě u kostela (Preuss. Fl. N. 18.) . . . . .                   | 322·4 . . . . .    | 1020         |
| 42. Prostřední Stenava, kostel (Prud. 204.) . . . . .                                       | 314·0 . . . . .    | 993          |
| 43. Řeka Stenava, při dol. konci Střední Stenavy (Preuss. Fl. N. 19.) . . . . .             | 318·2 . . . . .    | 1005         |
| 44. Prostřední Stenava, makovice kostelní věže (Preuss. Verm. 96.) . . . . .                | 357·3 . . . . .    | 1130         |
| 45. Od vesnice Scheidewinkel jižně, holé návrší (Koř. 68. 426.) . . . . .                   | 493·1 . . . . .    | 1560         |
| 46. Reichenforst, hořejší chalupy (Koř. 68. 425.) . . . . .                                 | 432·1 . . . . .    | 1367         |
| 47. Radkov (Wünschelburg), město, hostinec u černého orla na náměstí (Prud. 206.) . . . . . | 381·0 . . . . .    | 1205         |
| 48. „ věž radnice (Preuss. Verm. 91.) . . . . .                                             | 422·3 . . . . .    | 1336         |
| 49. „ vrch Marbodův (Preuss. Verm. 94.) . . . . .                                           | 454·3 . . . . .    | 1437         |
| 50. Mlýn „Feldmühle“ na cestě z Leierdörfu do Radkova (Prud. 203.) . . . . .                | 418·6 . . . . .    | 1324         |
| 51. Rateň, špiče zámecké věže (Preuss. Verm. 92.) . . . . .                                 | 388·6 . . . . .    | 1230         |
| 52. „ výšina severně od zámku (Preuss. Verm. 95.) . . . . .                                 | 454·0 . . . . .    | 1436         |

## 28. Prachov a Podhradí

Zeměpisná šířka: 50° 25' až 50° 30'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 15·4 procent,

„ „ „ „ 300—400 „ 79·7 „

„ „ „ „ 400—500 „ 4·9 „

|                                                                                                            | Nadm. výška v met. | Ve vid. stř. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Šlikova ves, dolejší skupenství chalup při cestě (Koř. 71. 63.) . . . . .                               | 285·8 . . . . .    | 905          |
| 2. „ nejhořejší chalupa nahoře na hřbetě (Koř. 71. 62.) . . . . .                                          | 332·6 . . . . .    | 1052         |
| 3. Podhradí, chalupy při západním konci místa (Koř. 71. 490.) . . . . .                                    | 366·9 . . . . .    | 1161         |
| 4. „ jinak Velišský kopec, nejvyšší bod na hřbetě jižně vsi Podhradí (Triang. Austr.) . . . . .            | 430·8 . . . . .    | 1363         |
| 5. „ západně odtud kaple Loretánská, základ (Koř. 71. 489.) . . . . .                                      | 417·4 . . . . .    | 1320         |
| 6. Chřelina, jižní skupenství chalup na výšině (Koř. 71. 488.) . . . . .                                   | 372·8 . . . . .    | 1180         |
| 7. Nadslav, makovice kostelní věže (Koř. 71. 549.) . . . . .                                               | 345·9 . . . . .    | 1095         |
| 8. Netolice, střední výška vsi (Koř. 71. 546.) . . . . .                                                   | 380·9 . . . . .    | 1205         |
| 9. Příchvojí, hořejší severní skupenství chalup (Koř. 71. 545.) . . . . .                                  | 373·5 . . . . .    | 1182         |
| 10. Čakovský kopec, výšina na nejvyšším místě vozové cesty z Radkova do Zajakur (Triang. Austr.) . . . . . | 396·9 . . . . .    | 1256         |
| 11. Na Šalandě, hospoda západně Samšiny (Koř. 71. 538.) . . . . .                                          | 373·3 . . . . .    | 1067         |
| 12. Ohařice, dolejší skupenství chalup u silnice (Koř. 71. 487.) . . . . .                                 | 338·2 . . . . .    | 1070         |
| 13. Samšina, kostel, základ (Koř. 71. 526.) . . . . .                                                      | 321·4 . . . . .    | 1017         |
| 14. „ mlýn při severovýchodním konci vsi (Koř. 71. 537.) . . . . .                                         | 315·0 . . . . .    | 997          |
| 15. Betlem, nejhořejší chalupy (Koř. 71. 536.) . . . . .                                                   | 331·8 . . . . .    | 1050         |
| 16. Hubojedy, mlýn, základ (Koř. 71. 542.) . . . . .                                                       | 265·8 . . . . .    | 841          |
| 17. Zámostí, při jižním konci vsi (Koř. 71. 541.) . . . . .                                                | 287·3 . . . . .    | 909          |
| 18. Mladějov, okraj střechy na kostele (Koř. 71. 523.) . . . . .                                           | 329·8 . . . . .    | 1044         |
| 19. „ prostřední výška chalup nahoře na rovině (Koř. 71. 85.) . . . . .                                    | 334·6 . . . . .    | 1059         |
| 20. Střelce, střední výška vsi (Koř. 71. 535.) . . . . .                                                   | 329·5 . . . . .    | 1043         |
| 21. Velká hůra, lesnatý vrch 240 m. východně od myslivny Střelecké (Triang. Austr.) . . . . .              | 459·0 . . . . .    | 1452         |

|                                                                                                                          | Nadm. výška v met. | Ve víd. stř. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 22. Libunec, mlýn (Koř. 71. 531.) . . . . .                                                                              | 284·5 . . .        | 901          |
| 23. Kntžnice (Kněhynice), střední výška vsi (Koř. 71. 111.) . . . . .                                                    | 369·7 . . .        | 1169         |
| 24. Javornice, chalupy v údolí (Koř. 71. 50.) . . . . .                                                                  | 347·9 . . .        | 1101         |
| 25. Lhota Pařezská, větrný mlýn nahore na rovině (Koř. 71. 533.) . . . . .                                               | 406·9 . . .        | 1288         |
| 26. Prachovské skály, severní výška hřbetu (Koř. 71. 534.) . . . . .                                                     | 425·4 . . .        | 1346         |
| 27. „ jižní výška hřbetu (Koř. 71. 484.) . . . . .                                                                       | 461·9 . . .        | 1462         |
| 28. „ dolejší úpatí skal u Horního Lochova (Koř. 71. 485.) . . . . .                                                     | 379·6 . . .        | 1201         |
| 29. Dolní Lochov, výška silnice západně vsi (Koř. 71. 486.) . . . . .                                                    | 314·0 . . .        | 993          |
| 30. Sv. Anna, kaplička 300 metrů jihozápadně nejjižnějšího skupenství chalup v Dolním Lochově (Triang. Austr.) . . . . . | 372·0 . . .        | 1177         |
| 31. Prachov, hořejší chalupy v sedle (Koř. 71. 480.) . . . . .                                                           | 380·8 . . .        | 1205         |
| 32. Přivýšín, vrch 700 metrů východně od myslivny Prachovské (Triang. Austr.) . . . . .                                  | 465·6 . . .        | 1473         |
| 33. Brada, kostel, základ (Koř. 71. 39.) . . . . .                                                                       | 407·2 . . .        | 1289         |
| 34. Rybníček, dolejší skupenství domů (Koř. 71. 479.) . . . . .                                                          | 287·0 . . .        | 908          |
| 35. Holyně, dolejší chalupa (Koř. 71. 64.) . . . . .                                                                     | 263·2 . . .        | 833          |
| 36. Ohaveč, nejdolejší skupenství chalup (Koř. 71. 481.) . . . . .                                                       | 263·9 . . .        | 835          |
| 37. Ostružno, kostel, základ (Koř. 71. 482.) . . . . .                                                                   | 272·5 . . .        | 863          |
| 38. „ jižně odtud mlýnský rybník, povrch vody (Koř. 71. 483.) . . . . .                                                  | 264·7 . . .        | 837          |
| 39. Březina, chalupa při severním konci místa (Koř. 71. 65.) . . . . .                                                   | 276·1 . . .        | 873          |
| 40. Vokšice, základ severních stavení hospodářských (Koř. 71. 60.) . . . . .                                             | 287·2 . . .        | 909          |

## 29. Jičín a Železnice.

Zeměp. šířka: 50° 25' až 50° 30'

Zeměp. délka: 33° 0' až 33° 10'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| v nadmořské výšce od 200—300 metrů | 24·8 procent, |
| „ „ „ 300—400 „                    | 52·0 „        |
| „ „ „ 400—500 „                    | 21·7 „        |
| „ „ „ 500—600 „                    | 1·5 „         |

|                                                                                                              | Nadm. výška v met. | Ve víd. stř. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Dílce, chalupy při jižním konci vsi (Koř. 71. 51.) . . . . .                                              | 285·3 . . .        | 903          |
| 2. Kbelnice, hostinec při silnici (Koř. 71. 52.) . . . . .                                                   | 276·6 . . .        | 876          |
| 3. Žebinská hora, kaple na kopci severovýchodně od Jičína u Kartouz. Základ kaple (Triang. Austr.) . . . . . | 407·6 . . .        | 1289         |
| 4. Kartouzy, severových. od Jičína, severových. roh vnější zdi obvodní (Koř. 71. 27.) . . . . .              | 326·8 . . .        | 1034         |
| 5. Jičín, špiče hlavního farního kostela (Triang. Austr.) . . . . .                                          | 320·4 . . .        | 1013         |
| 6. „ náměstí na jihovýchodním rohu (Koř. 71. Bar.) . . . . .                                                 | 292·7 . . .        | 926          |
| 7. „ Holínké náměstí na severním konci (Koř. 71. Bar.) . . . . .                                             | 283·8 . . .        | 898          |
| 8. „ stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . . . .                                                     | 274·4 . . .        | 868          |
| 9. „ Valdické předměstí, poslední dům na východním konci (Koř. 71. 56.) . . . . .                            | 279·6 . . .        | 885          |
| 10. Čejkovice, rozpoutí silnic (Koř. 71. 59.) . . . . .                                                      | 278·5 . . .        | 882          |
| 11. Popovice, kostel, základ (Koř. 71. 459.) . . . . .                                                       | 282·0 . . .        | 892          |
| 12. „ výšina 500 metrů jihovýchodně této vsi (Triang. Austr.) . . . . .                                      | 284·5 . . .        | 900          |

|     |                                                                                                  | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 13. | Horpí Robousy, makovice věže, střed ze 2 měření (Koř. 71. 296.)                                  | 325·3                           | 1029 |
| 14. | " kostel, základ (Koř. 71. 458.)                                                                 | 293·9                           | 930  |
| 15. | " dům v údolí při silnici (Koř. 71. 57.)                                                         | 278·2                           | 881  |
| 16. | Řehč, skupenství domů u potoka (Koř. 71. 471.)                                                   | 282·8                           | 895  |
| 17. | Úlibice, baň kostelní věže (Koř. 71. 70.)                                                        | 327·1                           | 1035 |
| 18. | Lužany, dům na hořejším konci vsi severně od silnice do Chotče (Koř. 71. 473.)                   | 347·0                           | 1098 |
| 19. | " západně odtud kaple sv. Máří, nahoře na rovině (Koř. 71. 475.)                                 | 314·9                           | 996  |
| 20. | " východně odtud nejvyšší bod silnice k Chotči (Koř. 71. 426.)                                   | 327·0                           | 1035 |
| 21. | Lužanská pila a šrotovna nedaleko silnice (Koř. 71. 472.)                                        | 307·0                           | 971  |
| 22. | Radím, špiče kostelní věže (Triang. Austr.)                                                      | 349·8                           | 1106 |
| 23. | " kostel, povrchní základ (Koř. 71. 26.)                                                         | 307·2                           | 972  |
| 24. | Dřevenice, dvůr, základ (Koř. 71. 30.)                                                           | 312·0                           | 987  |
| 25. | Tužín, hořejší skupenství domů (Koř. 71. 476.)                                                   | 347·2                           | 1099 |
| 26. | Lhán, domy na severovýchodním konci vsi (Koř. 71. 477.)                                          | 343·3                           | 1086 |
| 27. | Soběraz, severní skupenství domů (Koř. 71. 55.)                                                  | 355·1                           | 1123 |
| 28. | Těšín, střední výška místa (Koř. 71. 66.)                                                        | 336·0                           | 1063 |
| 29. | Železnice, prostřední výška náměstí (Koř. 71. 24.)                                               | 327·1                           | 1035 |
| 30. | Valcha, mlýn, západně od železnice (Koř. 71. č. 38 a 53)                                         | 287·2                           | 909  |
| 31. | Zámezí, dům na severním konci vsi (Koř. 71. 48.)                                                 | 310·7                           | 983  |
| 32. | Habřiny, severní chalupa při zemi (Koř. 71. 54.)                                                 | 337·6                           | 1068 |
| 33. | Březka u Cidlíny, skupenství chalup poblíž silnice (Koř. 71. 47.)                                | 362·2                           | 1146 |
| 34. | Kyje, skupenství domů na jihových. konci místa (Koř. 71. 46.)                                    | 444·1                           | 1405 |
| 35. | Lhota Bradlecká, údolí, chalupy nad mlýnem (Koř. 71. 45.)                                        | 357·9                           | 1132 |
| 36. | Bradlec, zřícenina, hořejší hrana zdi (Koř. 71. 42.)                                             | 561·1                           | 1775 |
| 37. | Kumburk, lesnatá hora, 1·8 kilom. východně hospody Klepandy, Starý hrad, základ (Triang. Austr.) | 630·9                           | 2027 |
| 38. | " hrana vysoké věže (Koř. 71. č. 73 a 272)                                                       | 643·5                           | 2036 |
| 39. | Chaloupky, střední výška (Koř. 71. 444.)                                                         | 474·6                           | 1502 |
| 40. | Sířenov, myslivna severozápadně od Kumburka (Koř. 71. 43.)                                       | 444·2                           | 1406 |
| 41. | Brdo, domy na jihozápadním konci vsi (Koř. 71. 202.)                                             | 526·9                           | 1667 |
| 42. | Za Přisnicí, dům na jihovýchodním konci místa (Koř. 71. 201.)                                    | 473·0                           | 1496 |
| 43. | Vlkov, samotná chalupa na vých. hřebetě (Koř. 71. 203.)                                          | 542·5                           | 1717 |
| 44. | " samotná chalupa na jižním kraji stráně (Koř. 71. 429.)                                         | 479·9                           | 1518 |
| 45. | Proseč, východní skupenství chalup (Koř. 71. 445.)                                               | 435·7                           | 1378 |
| 46. | Úbyslavice, kostelík na vrchu, základ (Koř. 71. 31.)                                             | 398·5                           | 1245 |
| 47. | " jihovýchodně odtud nahoře na rovině (Koř. 71. 32.)                                             | 447·3                           | 1415 |
| 48. | Újezd, dům na jižním konci místa u silnice (Koř. 71. 33.)                                        | 459·6                           | 1454 |
| 49. | " severně odtud na polní cestě kaplička, základ (Koř. 71. 448.)                                  | 459·3                           | 1453 |
| 50. | " jihozápadně Nové Paky, větrní mlýn, základ (Koř. 71. 67.)                                      | 459·0                           | 1452 |
| 51. | " výšina 120 metrů západně od větrného mlýna (Triang. Austr.)                                    | 460·8                           | 1458 |
| 52. | " krkavčí dům, základ (Koř. 71. 68.)                                                             | 412·2                           | 1304 |
| 53. | Stav, hořejší dům v rozstupu údolí (Koř. 71. 446.)                                               | 341·9                           | 1082 |
| 54. | Dřevenice, lesem porostlá homole vých. odtamtud (Koř. 71. 447.)                                  | 393·4                           | 1244 |
| 55. | Kaple sv. Petra a Pavla na silnici z Paky do Jičína (Koř. 71. 449.)                              | 395·1                           | 1250 |
| 56. | Lužany, lesnatý vrch 900 metrů severně od nejhořejších domů v Lužanech (Triang. Austr.)          | 458·5                           | 1450 |

## 30. Paka Nová a Bělohrad.

Zeměp. šířka: 50° 25' až 50° 30'

Zeměp. délka: 33° 10' až 33° 20'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od 200—300 metrů |   |   |         | 7·3 procent, |
|------------------------------------|---|---|---------|--------------|
| "                                  | " | " | 300—400 | " 35·5 "     |
| "                                  | " | " | 400—500 | " 50·5 "     |
| "                                  | " | " | 500—600 | " 6·7 "      |

Nadm. výška v met. Ve víd. stř.

1. Nová Paka, klášterský kostel, makovice věže (Koř. 71. Nr. 19, 199, 219, 266, 424 und 431.) . . . . . 478·3 . . . 1514
2. " klášterský kostel, základ (Koř. 71. 19.) . . . . . 436·0 . . . 1379
3. " kostel na hřbitově, základ (Koř. 71. 200.) . . . . . 469·4 . . . 1485
4. " stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . . . . 436·1 . . . 1379
5. " vých. odtud sedlo na cestě z Rokytne do Stupného (Koř. 71. 206.) . . . . . 498·6 . . . 1578
6. Stikov, hořejší domy na hoře na rovině (Koř. 71. 404.) . . . . . 475·5 . . . 1505
7. Heřmanice, samotný dům při polní cestě z Nové Paky k jihu na pokraji lesíčka (Koř. 71. 204.) . . . . . 484·8 . . . 1534
8. Přibyslav, silnice u hořejších chalup (Koř. 71. 427.) . . . . . 480·4 . . . 1520
9. " lesnatá výšina na nejvyšším bodě silnice od Přibyslavě do Studinky (Triang. Austr.) . . . . . 492·4 . . . 1558
10. Radkyně, severozápadní skupenství domů (Koř. 71. 428.) . . . . . 413·3 . . . 1308
11. Bělá, domy u silnice (Koř. 71. 441.) . . . . . 358·2 . . . 1134
12. " povrcheň Zlatého potoka (Koř. 71.) . . . . . 340·2 . . . 1077
13. Uhlíře, nejhořejší chalupa při silnici (Koř. 71. 433.) . . . . . 402·6 . . . 1274
14. Dolejší Javoří, hořejší mlýn (Koř. 71. 435.) . . . . . 347·7 . . . 1416
15. Valdov, střední výška místní (Koř. 71. 434.) . . . . . 432·6 . . . 1369
16. Hřidelec, chalupa na severozápadním konci místa (Koř. 71. 420.) . . . . . 369·4 . . . 1168
17. Lány, severní skupenství domů (Koř. 71. 425.) . . . . . 324·2 . . . 1026
18. Okrouhlík, dvůr, stodoly na jižní straně, základ (Koř. 71. 321.) . . . . . 312·3 . . . 988
19. Újezd Svatojanský, špiče kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . . 330·9 . . . 1047
20. " střední výška místa (Koř. 71. 322.) . . . . . 310·7 . . . 983
21. Choteč, mlýn, základ (Koř. 71. 419.) . . . . . 298·9 . . . 946
22. Mlázovice, chalupy na severním konci místa (Koř. 71. 323.) . . . . . 304·1 . . . 962
23. Bělohrad, makovice zámecké věže (Koř. 71. 319.) . . . . . 339·9 . . . 1076
24. " stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . . . . 300·3 . . . 950
25. " myslivna západně odtud (Koř. 71. 320.) . . . . . 283·9 . . . 898
26. Nový dvůr, dvůr východně Bělohradu (Koř. 71. 418.) . . . . . 344·4 . . . 1089
27. Byšičky, kostel východně Bělohradu, základ (Koř. 71. 422.) . . . . . 348·5 . . . 1103
28. Vlkanov, západní konec vsi (Koř. 71. 410.) . . . . . 366·5 . . . 1160
29. Vřesník, skupenství chalup při severozápadním konci místa (Koř. 71. 409.) . . . . . 434·2 . . . 1374
30. Bakovina, severní chalupy (Koř. 71. 402.) . . . . . 499·0 . . . 1579
31. " západně odtud výšina na pokraji lesa (Koř. 71. 403.) . . . . . 516·1 . . . 1633
32. Hořejší Javoří, prostřední výška místní (Koř. 71. 210.) . . . . . 472·4 . . . 1494
33. " lesnaté návrší jihových. od místa (Koř. 71. 430.) . . . . . 516·2 . . . 1634
34. Arnoštov, výšina 400 metrů severovýchodně od osady toho jména (Triang. Austr.) . . . . . 530·4 . . . 1678
35. Kaly, skupenství domů na hořejším západ. konci (Koř. 71. 317.) . . . . . 467·8 . . . 1480



|                                                                                                         | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36. Kalský mlýn, základ (Koř. 71. 408.) . . . . .                                                       | 387·0 . . . 1224                |
| 37. Pecka, makovice věže farního kostela (Koř. 71. Nr. 207. u. 281.) . . . . .                          | 463·8 . . . 1468                |
| 38. " domy na náměstí (Koř. 71. 440.) . . . . .                                                         | 393·8 . . . 1246                |
| 39. " kostel na hřbitově, základ (Koř. 71. 209.) . . . . .                                              | 422·3 . . . 1336                |
| 40. " zříceniny hradu na vrchu, základ (Koř. 71. č. 208. 316 a 437.) . . . . .                          | 462·1 . . . 1462                |
| 41. Stupné, kostel na hřbitově, základ (Koř. 71. 220.) . . . . .                                        | 454·2 . . . 1437                |
| 42. " 600 kroků, východně odtud samotná náhorní rovina se zarostlými stráněmi (Koř. 71. 213.) . . . . . | 514·3 . . . 1627                |
| 43. Staňkov, nejhořejší dům (Koř. 71. 439.) . . . . .                                                   | 446·6 . . . 1413                |
| 44. Klepce (Klebs) u Borovničky, dolejší chalupy na stráni (Koř. 71. 226.) . . . . .                    | 485·2 . . . 1535                |
| 45. Vidonice, kostel, zdánlivý základ (Koř. 71. 282.) . . . . .                                         | 468·0 . . . 1481                |
| 46. Horní Brusnice, větrný mlýn na jihozápadním konci vsi, základ (Koř. 71. 325.) . . . . .             | 510·0 . . . 1614                |
| 47. " domy na západ. konci místa v sedle (Koř. 71. 312.) . . . . .                                      | 505·8 . . . 1601                |
| 48. Bezník, prostřední výška hořejších chalup (Koř. 71. 407.) . . . . .                                 | 453·6 . . . 1435                |
| 49. " západně odtud holé návrší (Koř. 71. 405.) . . . . .                                               | 461·6 . . . 1461                |
| 50. Borek u Bezníka, západní hořejší skupenství domů (Koř. 71. 411.) . . . . .                          | 438·5 . . . 1071                |
| 51. " výšina 200 metrů severovýchodně od osady toho jména při rozpici (Triang. Austr.) . . . . .        | 500·9 . . . 1585                |
| 52. Želejov, nejhořejší dům (Koř. 71. 417.) . . . . .                                                   | 449·1 . . . 1421                |

### 31. Dvůr Králové.

Zeměp. šířka: 50° 25' až 50° 30'

Zeměp. délka: 33° 20' až 33° 30'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| v nadmořské výšce od 200—300 metrů | 4·5 procent, |
| " " " " 300—400 "                  | 28·3 "       |
| " " " " 400—500 "                  | 50·5 "       |
| " " " " 500—600 "                  | 15·2 "       |
| " " " " 600—700 "                  | 1·5 "        |

|                                                                                       | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Mostek, stanice železná dráhy (E. N. S. N. D. V.) . . . . .                        | 447·0 . . . 1414                |
| 2. " v údolí u mostu přes Borovnický potok (Koř. 71. 310.) . . . . .                  | 441·9 . . . 1398                |
| 3. " lázně, nejhořejší jihozápadní skupenství domů v lese (Koř. 71. 288.) . . . . .   | 530·8 . . . 1680                |
| 4. Mastín u Mostku, nejhořejší chalupy nahoře na rovině (Koř. 71. 397.) . . . . .     | 528·3 . . . 1671                |
| 5. Mostek zadní, nejhořejší dům při silnici (Koř. 71. 289.) . . . . .                 | 477·0 . . . 1509                |
| 6. Mostek přední, severových. skupenství domů (Koř. 71. 374.) . . . . .               | 492·7 . . . 1559                |
| 7. Debrné (Olešnice), bod silnice na úpatí vrchu v údolí (Koř. 71. 373.) . . . . .    | 326·6 . . . 1033                |
| 8. Dvořáčky, hořejší skupenství domů (Koř. 71. 324.) . . . . .                        | 407·7 . . . 1290                |
| 9. Hoř. Brusnice, kostel, dolejší kraj střechy (Koř. 71. 311.) . . . . .              | 488·0 . . . 1544                |
| 10. Zvůčina, špice věže kostela sv. Jána na této hoře (Triang. Austr.) . . . . .      | 693·2 . . . 2194                |
| 11. " kostel, základ (Koř. 71. 2.) . . . . .                                          | 671·4 . . . 2123                |
| 12. " v jižní stráni asi 325 m. od kostela vzdálený pahorek (Koř. 71. 327.) . . . . . | 656·7 . . . 2077                |

Nadm. výška v met. Ve víd. stř.

|     |                                                                                                    |       |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 13. | Zvičina, ves, skupenství domů na hřbetě blíže dolejšího konce vsi (Koř. 71. 214.)                  | 670·6 | 2122 |
| 14. | „ na západní straně pod vesnicí u kříže na rozcestí (Koř. 71. 399.)                                | 574·0 | 1816 |
| 15. | „ západně pod vsí na rozcestí do Kal a Brusnice (Koř. 71. 326.)                                    | 591·5 | 1872 |
| 16. | „ jižní stráň náhorní roviny nad Chroustovem, 2500 kroků jižně kostela Zvičinského (Koř. 71. 354.) | 580·5 | 1837 |
| 17. | Chroustov, skupenství domů na vých. straně místa (Koř. 71. 355.)                                   | 441·3 | 1396 |
| 18. | Úhlejov, dům na jihozápadním kraji místa (Koř. 71. 356.)                                           | 435·4 | 1377 |
| 19. | Borek, lázně, základ (Koř. 71. 357.)                                                               | 355·3 | 1124 |
| 20. | Zdobeň, severozápadní skupenství domů na hřbetě (Koř. 71. 358.)                                    | 412·3 | 1304 |
| 21. | Třebihošť, hořejší chalupa při severozápadním konci místa (Koř. 71. 353.)                          | 491·1 | 1553 |
| 22. | „ nejdolejší chalupy v údolí (Koř. 71. 351.)                                                       | 429·9 | 1360 |
| 23. | „ severně odtud lesnatý vršek, jihových. Zvičiny (Koř. 71. 352.)                                   | 588·4 | 1861 |
| 24. | Bílá Třemešná, jižně odtud sedlo na cestě do Doubravice (Müll. 67. 138.)                           | 441·0 | 1395 |
| 25. | Hoř. Dehtov, nejhořejší dům na cestě do Třemošné (Koř. 71. 349.)                                   | 503·5 | 1593 |
| 26. | Dolejší Dehtov, domy v sedle (Koř. 71. 350.)                                                       | 456·5 | 1445 |
| 27. | Zálesí, nejvyšší bod silnice od Zálesí do Doubravice (Triang. Austr.)                              | 450·5 | 1425 |
| 28. | Třemešná, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.)                                                | 377·4 | 1194 |
| 29. | „ Bílá, hořejší domy vsi (Müll. 67. 142.)                                                          | 363·1 | 1148 |
| 30. | „ u zámku (Müll. 67. 145.)                                                                         | 345·6 | 1094 |
| 31. | „ východní skupenství domů nad údolím labským (Müll. 67. 135.)                                     | 349·9 | 1107 |
| 32. | Těšínský mlýn, jižně Nemaňova (Koř. 71. 303.)                                                      | 305·9 | 968  |
| 33. | Novolesí, domy na západním konci (Müll. 67. 146.)                                                  | 351·5 | 1112 |
| 34. | Zahájí, prostřed vsi (Müll. 67. 140.)                                                              | 346·3 | 1096 |
| 35. | Lipnice, skupenství domů v údolí (Koř. 71. 306.)                                                   | 326·5 | 1033 |
| 36. | Borek, jihovýchodně Dvora Králové, prostřední výška místa (Müll. 67. 159.)                         | 324·7 | 1027 |
| 37. | Dvůr Králové, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.)                                            | 344·5 | 1090 |
| 38. | „ farní kostel, makovice věže (Müll. 67. 126.)                                                     | 345·0 | 1092 |
| 39. | „ hostinec u lva na náměstí (průměr z 2 měř.) (Koř. 67. 500 Bar.)                                  | 302·8 | 958  |
| 40. | „ dolní předměstí, prostřední výška (Müll. 67. 125.)                                               | 291·9 | 924  |
| 41. | „ domy v Hradištském předměstí (Müll. 67. 131.)                                                    | 290·3 | 919  |
| 42. | „ Podhradské předměstí, nejvýš položený dům (Müll. 67. 130.)                                       | 343·1 | 1085 |
| 43. | Podhájí, nejhořejší samotný dům u obecního lesa (Müll. 67. 133.)                                   | 403·8 | 1278 |
| 44. | „ prostřed místa (Müll. 67. 134.)                                                                  | 345·4 | 1093 |
| 45. | Bukovina, výška chalup při severozápadním konci vsi (Müll. 67. 151.)                               | 440·2 | 1393 |
| 46. | Huntřívov, domy prostřed vsi při silnici (Koř. 71. 297.)                                           | 449·5 | 1428 |
| 47. | „ východně odtud na hřbetě kamenná boží muka (Müll. 67. 149.)                                      | 465·0 | 1471 |
| 48. | Domky „Stückhäuser“ řečené, záp. od Huntřívova (Koř. 71. 296.)                                     | 478·5 | 1514 |
| 49. | Hofgut, trigonometrický bod 200 metrů západně od nejhořejších chalup Bukovinských (Triang. Austr.) | 480·2 | 1519 |
| 50. | „ roh lesa severně od pyramidy (Müll. 67. 148.)                                                    | 497·0 | 1572 |
| 51. | Horní Nemaňov, domy na hořejším svahu (Müll. 67. 144.)                                             | 423·0 | 1338 |

|                                                                      | Nadm. výška v met. | Ve víd. stž. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 52. Horní Nemaňov, myslivna, základ (Koř. 71. 302.) . . . . .        | 442·2 . . .        | 1399         |
| 53. Nový Nemaňov, nejhořejší chalupa na rohu lesa (Müll. 67. 143.)   | 415·5 . . .        | 1315         |
| 54. Debrné (Starobucké), severní skupenství domů (Koř. 71. 301.) .   | 455·8 . . .        | 1448         |
| 55. Labský vrch, lesnatý vrch u Král. Debrného (Koř. 71. 309.) .     | 506·6 . . .        | 1603         |
| 56. Debrné (Královské), chalupy na západní straně údolí, pod lesč-   |                    |              |
| kem (Koř. 71. 284.) . . . . .                                        | 450·7 . . .        | 1426         |
| 57. Království, skupenství domů na severovýchodním konci místa (Koř. |                    |              |
| 71. 292.) . . . . .                                                  | 529·6 . . .        | 1676         |
| 58. Nové domky, větrný mlýn u silnice, základ (Koř. 67. 77.) . .     | 511·2 . . .        | 1618         |
| 59. " západně odtud, lesem porostlý vrch (Koř. 67. 78.) . .          | 551·9 . . .        | 1746         |
| 60. Kocléřov, kostel, základ (Koř. 71. 293.) . . . . .               | 495·6 . . .        | 1568         |
| 61. Domky Freudenthálské, východně Kocléřova (Koř. 71. 294.) .       | 499·9 . . .        | 1582         |
| 62. Zábोří, chalupy v údolí prostřed vsi (Koř. 71. 295.) . . . .     | 474·9 . . .        | 1503         |
| 63. Dolní Zábोří, severní chalupy (Müll. 67. 154.) . . . . .         | 483·8 . . .        | 1531         |
| 64. Komárov, jižně Zábोří, chalupy na jižním konci místa (Koř. 71.   |                    |              |
| 300.) . . . . .                                                      | 436·6 . . .        | 1381         |

### 32. Hradiště a Brusnice německá.

Zeměpisná šířka : 50° 25' až 50° 30'

Zeměpisná délka : 33° 30' až 33° 40'

Z celé plochy toho čtverhrannu leží

| v nadmořské výšce od 200—300 metrů |   |   |   | 6·5 procent,     |
|------------------------------------|---|---|---|------------------|
| "                                  | " | " | " | 300—400 " 20·3 " |
| "                                  | " | " | " | 400—500 " 50·2 " |
| "                                  | " | " | " | 500—600 " 22·3 " |
| "                                  | " | " | " | 600—700 " 0·7 "  |

|                                                                       | Nadm. výška v met. | Ve víd. stž. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Horní Zárov, kostel, základ (Koř. 68. Bar. 481.) . . . . .         | 488·6 . . .        | 1546         |
| 2. " nejhořejší větrný mlýn, vých. silnice (Müll. 67. 164.)           | 541·1 . . .        | 1712         |
| 3. Bída ženská, severní konec této vesnice (Müll. 67. 166.) . . .     | 533·6 . . .        | 1688         |
| 4. Nové Zábोří, prostřední výška vsi (Müll. 67. 155.) . . . . .       | 522·6 . . .        | 1654         |
| 5. Dolní Zábोří, východně odtud lesem porostlý vrch „Dobrá voda“      |                    |              |
| řečený (Müll. 67. 152.) . . . . .                                     | 532·1 . . .        | 1683         |
| 6. Německá Brusnice (D. Praussnitz), domy na západním konci vsi       |                    |              |
| při silnici (Müll. 67. 165.) . . . . .                                | 495·0 . . .        | 1566         |
| 7. " při cestě, jež do Stříteže (Burgersdorf) vede (Koř. 68.          |                    |              |
| Bar. 480.) . . . . .                                                  | 497·8 . . .        | 1541         |
| 8. Kyje (Kaile), při cestě do N. Rokytníka (Koř. 68. Bar. 479.)       | 484·6 . . .        | 1533         |
| 9. " severovýchodně odtud větrný mlýn na holém návrší                 |                    |              |
| (Koř. 68. Bar. 478.) . . . . .                                        | 509·2 . . .        | 1611         |
| 10. Brusnická hora (Gamberg), nejvyšší bod skalistého hřbetu severo-  |                    |              |
| východně Haindorfu. (Triang. Austr.) . . . . .                        | 607·4 . . .        | 1922         |
| 11. Na Brusnické hoře (na Gamberku), asi 2000 metrů odtud k zá-       |                    |              |
| padu stojící skalistý vrch (Müll. 67. 161.) . . . . .                 | 585·2 . . .        | 1852         |
| 12. Haindorf, na království (Müll. 67. Bar.) . . . . .                | 563·1 . . .        | 1781         |
| 13. Nesyty (Nimmersatt), silnice prostřed vesnice, v údolí (Müll. 67. |                    |              |
| Bar.) . . . . .                                                       | 429·3 . . .        | 1358         |
| 14. Komárov, silnice na západním konci místa (Müll. 67. Bar.) . .     | 489·6 . . .        | 1549         |

|                                                                                                   | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Komárov, výšina jihovýchodně od silnice (Müll. 67. 182.)                                          | 501·3                           | 1586 |
| Krupná hora, návrší severně Mezilečí (Hd. 68. 211.)                                               | 564·9                           | 1787 |
| Šmířická strana na Kopné, lesnatá hora 800 m. jižně od východních domů v Maršově (Triang. Austr.) | 548·6                           | 1736 |
| Kočeň (Rettendorf), střední výška místa (Müll. 67. Bar.)                                          | 458·0                           | 1449 |
| Nová Kočeň (Rettendorf), velký dům, základ, na severním konci místa (Koř. 71. 299.)               | 470·7                           | 1489 |
| „ severně odtud, při Trutnovské silnici na rozpoutí do Kokotova (Müll. 67. Bar.)                  | 524·3                           | 1659 |
| Ústří, severně odtud, kde se silnice do Trutnova s cestou do Komárova křížuje (Müll. 67. 157.)    | 387·2                           | 1225 |
| Boží (Renzahn), hospoda (Müll. 67. 41.)                                                           | 253·5                           | 802  |
| „ údolí západně od posledních chalup (Müll. 67. 128.)                                             | 296·6                           | 938  |
| Hradiště Choustníkovo, kostel, makovice věže (Müll. 67. 33.)                                      | 338·5                           | 1071 |
| „ kostel, základ (Müll. 67. 33.)                                                                  | 290·0                           | 918  |
| „ východně odtud ovčinec (Müll. 67. 34.)                                                          | 311·5                           | 986  |
| „ kamenná boží muka jižně odtud (Müll. 67. 33.)                                                   | 282·0                           | 892  |
| Účhotka, dvůr jihozápadně od Hradiště (Müll. 67. 188.)                                            | 276·0                           | 876  |
| Šašparova hůra, severně Hradiště (Müll. 67. Bar.)                                                 | 356·3                           | 1127 |
| Úd Vlčkovice k severu, roh lesa při cestě do Kokotova (Müll. 67. 186.)                            | 360·5                           | 1141 |
| Velká Bukovina, výška domů na západní straně (Müll. 67. 180.)                                     | 328·6                           | 1040 |
| Kladruby, prostřední výška vsi (Müll. 67. 176.)                                                   | 432·3                           | 1368 |
| „ návrší, 600 kroků jižně odtud (Kladrubská hůra) (Triang. Austr.)                                | 436·8                           | 1382 |
| Kokotov, špiče věže kostelní (Müll. 67. 172.)                                                     | 456·6                           | 1445 |
| „ kostel, základ (Müll. 67. 172.)                                                                 | 433·7                           | 1372 |
| „ hřbitov (Müll. 67. 173.)                                                                        | 444·5                           | 1407 |
| „ jihozápadně od kostela, kamenná boží muka nahoře na hřbetě (Müll. 67. 170.)                     | 450·6                           | 1426 |
| „ severně odtud dolejší konec lesa „na království“ (Müll. 67. 178.)                               | 492·5                           | 1559 |
| Nový Kokotov, u hospody při silnici (Müll. 67. 171.)                                              | 476·3                           | 1507 |
| Úhnanov, západně odtud roh lesa (Müll. 67. 177.)                                                  | 479·8                           | 1518 |
| Úlonů, v údolí (Müll. 67. Bar.)                                                                   | 423·4                           | 1339 |
| Orní Harcov, chalupy u potoka (Müll. 67. Bar.)                                                    | 410·1                           | 1297 |
| Hlístov, návrší 400 metrů severně odtud (Hd. 68. 181.)                                            | 448·3                           | 1418 |
| Úchý dvůr, jižní domy (Hd. 68. 208.)                                                              | 386·4                           | 1223 |
| Hvalkovice, domy v údolí při silnici (Preuss. Verm.)                                              | 310·1                           | 980  |
| Ořičky, špiče kostelní věže (Triang. Austr.)                                                      | 460·9                           | 1458 |
| „ kostel, zdánlivý základ (Hd. 68. 180.)                                                          | 437·6                           | 1384 |
| „ prostřední výška (Sen. Bar.)                                                                    | 438·3                           | 1387 |
| „ roh lesa severně odtud u Kalousova (Müll. 67. 184.)                                             | 448·3                           | 1418 |
| Osadov, nejhořejší chalupy na severní straně (Hd. 68. 210.)                                       | 451·9                           | 1430 |
| „ návrší 500 metrů severozápadně odtud (Hd. 68. 212.)                                             | 475·0                           | 1503 |

## 33. Kostelec a Náchod.

Zeměp. šířka: 50° 25' až 50° 30'

Zeměp. délka: 33° 40' až 33° 50'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

| v nadmořské výšce od 200—300 metrů |   |   |         | 6·5 procent, |
|------------------------------------|---|---|---------|--------------|
| "                                  | " | " | 300—400 | 20·3         |
| "                                  | " | " | 400—500 | 50·2         |
| "                                  | " | " | 500—600 | 22·3         |
| "                                  | " | " | 600—700 | 0·7          |

Nadm. výška v met. Ve

1. Na písku, výšina 100 metrů severně Libnětova (Hd. 68. 201.) 448·3 . .
2. Havlovice, prostřed vsi (Hd. 68. 200.) . . . . . 221·7 . .
3. Končiny, roh lesa 200 metrů západně vsi (Hd. 68. 174.) . . . 329·2 . .
4. " 1 kilom. severně odtud lesnaté návrší (Hd. 68. 159.) 491·3 . .
5. Bohušín, kostel, základ (Hd. 68. 170.) . . . . . 362·7 . .
6. " 400 m. jihozáp. odtud, začátek rokle (Hd. 68. Aner.) 312·3 . .
7. Slatina, chalupy při cestě do Bohušína (Hd. 68. 168.) . . . 351·9 . .
8. " na začátku cesty odtud do Litoboře (Hd. 68. 167.) . . . 392·5 . .
9. " hřbet mezi Slatinou a Končinami (Hd. 68. 172.) . . . 364·2 . .
10. Škopovka, návrší 500 metrů jižně Slatiny (Hd. 68. 202a.) . . . 391·3 . .
11. Litobor, 600 metrů jiho-západně odtud při cestě do Hoříček (Hd. 68. 163.) . . . . . 402·8 . .
12. Světlá, silnice u cesty do Hostyně (Preuss. Verm.) . . . . . 331·5 . .
13. Hostyně, chalupy při cestě do Světlé (Preuss. Verm.) . . . . . 359·0 . .
14. Ratibořice, zámek, základ (Preuss. Verm.) . . . . . 277·4 . .
15. Vesce, výšina 800 metrů východně odtud (Hd. 68. 206.) . . . 335·0 . .
16. Heřmanice, dvůr, základ (Hd. 68. 205.) . . . . . 319·1 . .
17. Žernovy, domy na severní straně místa (Hd. 68. 173.) . . . 374·1 . .
18. " výšina 100 metrů západně odtud (Hd. 68. 214.) . . . 356·3 . .
19. Dvůr Ryzmberk u Žernov, základ (Hd. 68. 222.) . . . . . 326·0 . .
20. Všeliby, prostřed místa (Hd. 68. 220.) . . . . . 363·6 . .
21. Červená hůra, prostřed místa (Hd. 68. 176.) . . . . . 362·5 . .
22. U lipky, návrší 600 metrů západně Olešnic (Triang. Austr.) . 407·0 . .
23. Mstětín, hospoda 800 metrů východně od místa při silnici do Skalice (Hd. 68. 183.) . . . . . 407·2 . .
24. Stoliny, prostřed vsi (Hd. 68. Aner.) . . . . . 414·3 . .
25. " 1 kilom. severně od Mstětína a 300 metrů západně od Stolin (Hd. 68. 160.) . . . . . 430·7 . .
26. Lhota Zákostelská, na konci aleje (Hd. 68. 47.) . . . . . 410·5 . .
27. " návrší 500 m. západně tohoto místa, na nejvyšším bodě silnice od Červené hůry do Rtyně (Triang. Austr.) . 429·8 . .
28. Kobylínek, návrší východně od toho místa (Hd. 68. 50.) . . . 503·9 . .
29. Bordišův kopec, návrší 750 metrů jižně od východního konce Kostelce (Triang. Austr.) . . . . . 528·6 . .
30. Kostelec, kostel na stráni, prostředek makovice věže (Hd. 68. 44.) 452·1 . .
31. " jiho-západní domy na stráni (Hd. 68. 43.) . . . . . 397·6 . .
32. " stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.) . . . . . 429·5 . .
33. " kříž při cestě odtud do Lhoty (Hd. 68. 36.) . . . . . 408·1 . .
34. " výšina 300 metrů severo-západně odtud (Hd. 68. 13.) 508·5 . .
35. " roh lesa severně od rybníka „Špinky“ při cestě do Zábrodí (Hd. 68. 193.) . . . . . 408·5 . .

|                                                                                              | Nadm. výška v met. Ve víd. stř. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36. Horní Radechov, západní domy (Končiny) (Hd. 68. 192.) . . .                              | 513·6 . . . 1625                |
| 37. Čertovina, kříž při cestě do Horního Radechova (Hd. 68. 146.)                            | 427·6 . . . 1353                |
| 38. Zábrodí, kříž při polní cestě severo-východně odtud (Hd. 68. 189.)                       | 419·2 . . . 1326                |
| 39. „ dům na výšině asi 1400 metrů severo-západně od místa<br>(Hd. 68. 194.) . . . . .       | 408·1 . . . 1291                |
| 40. „ výšina 480 metrů k západu jižního konce rybníku Špinky<br>(Hd. 68. 187a.) . . . . .    | 423·3 . . . 1339                |
| 41. „ u Koňků, stavení u rybníka Špinky, slemeno (Hd. 68. 195.)                              | 418·5 . . . 1324                |
| 42. Olešnice, prostřed místa (Hd. 68. 150.) . . . . .                                        | 448·9 . . . 1420                |
| 43. „ jižní konec místa (Hd. 68. 217.) . . . . .                                             | 363·3 . . . 1149                |
| 44. „ 500 metrů východně odtud začátek lesa (Hd. 68. 186.)                                   | 441·5 . . . 1397                |
| 45. Horní rybník, 600 metrů jiho-východně rybníka lesnaté návrší<br>(Hd. 68. 185.) . . . . . | 457·3 . . . 1447                |
| 46. Trubějov, při jižním konci místa (Hd. 68. 215.) . . . . .                                | 412·7 . . . 1306                |
| 47. Dolní Radechov, silnice při severo-západním konci místa (Hd.<br>68. 144.) . . . . .      | 429·7 . . . 1360                |
| 48. „ lesnaté návrší mezi tímto místem a Trubějovem (Hd.<br>68. 148.) . . . . .              | 409·4 . . . 1295                |
| 49. „ Pavlišov, prostřed vsi (Hd. 68. 134.) . . . . .                                        | 481·6 . . . 1524                |
| 50. Lhotky, kaple při cestě, základ (Hd. 68. 141.) . . . . .                                 | 401·9 . . . 1271                |
| 51. „ cesta jižně od vsi, 300 metrů od lesa (Hd. 68. 216.)                                   | 418·3 . . . 1323                |
| 52. Kramolná, severně odtud lesnatá výšina (Hd. 68. 147.) . . .                              | 466·5 . . . 1476                |
| 53. „U Turka, hospoda při silnici z Náchoda do Studnice (Hd.<br>68. 140.) . . . . .          | 453·4 . . . 1434                |
| 54. Podhorní mlýn severně Náchoda (Hd. 68. 143.) . . . . .                                   | 349·1 . . . 1104                |
| 55. Náchod, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.) . . . . .                                | 336·8 . . . 1066                |
| 56. „ hostinec u zlatého beránka, základ (průměr z 2 měř.)<br>(Koř. 71. Bar. 2.) . . . . .   | 332·5 . . . 1052                |
| 57. „ farní kostel, prostředek makovice východní věže (Hd.<br>68. 138.) . . . . .            | 376·2 . . . 1190                |
| 58. „ kostel na jižním konci města, základ (Hd. 68. 151.)                                    | 343·2 . . . 1086                |
| 59. „ zámek, základ (Hd. 68. 139.) . . . . .                                                 | 404·9 . . . 1281                |

### 34. Hronov (a Chudoba v Prusku).

Zeměp. šířka: 50° 25' až 50° 30'

Zeměp. délka: 33° 50' až 34° 0'

Mimo to krajina na východní straně mezující.

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 300—400 metrů 33·3 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| „ | „ | „ | „ | 400—500 | „ | 30·2 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 500—600 | „ | 15·5 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 600—700 | „ | 9·8  | „ |
| „ | „ | „ | „ | 700—800 | „ | 8·0  | „ |
| „ | „ | „ | „ | 800—900 | „ | 3·2  | „ |

Nadm. výška v met. Ve víd. stř.

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Náchod, celnice, severo-východně odtud u mostu (Koř. 71. Bar. 3.) | 341·0 . . . 1079 |
| 2. Běloves, mlýn a pila (Hd. 68. Aner.) . . . . .                    | 332·5 . . . 1052 |

|                                                                                                         | Nadm. výška v met. | Ve vzd. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 3. Babí, západní chalupy (Hd. 68. Aner.) . . . . .                                                      | 401·0 . . . . .    | 1266         |
| 4. „Na vrchách,“ holé návrší 850 metrů severně od Pavlíšova<br>(Triang. Austr.) . . . . .               | 499·3 . . . . .    | 1580         |
| 5. Žabokrký, asi 400 metrů západně odtud lesnatá výšina (Hd.<br>68. 123.) . . . . .                     | 621·8 . . . . .    | 1651         |
| 6. Od Hronova k západu 500 metrů vzdálené návrší (Hd. 68. 124.) . . . . .                               | 467·9 . . . . .    | 1483         |
| 7. Hronov, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.) . . . . .                                            | 357·5 . . . . .    | 1131         |
| 8. „ prostřed městečka (Hd. 68. 126.) . . . . .                                                         | 353·0 . . . . .    | 1116         |
| 9. „ kostel, základ (Hd. 68. 122.) . . . . .                                                            | 369·0 . . . . .    | 1168         |
| 10. „ návrší mezi Hronovem a Zlickem (Hd. 68. 125.) . . . . .                                           | 510·4 . . . . .    | 1615         |
| 11. Poříčí velké, mlýn nedaleko silnice, severozápadně od hory Vrchů<br>(Hd. 68. Aner.) . . . . .       | 347·7 . . . . .    | 1109         |
| 12. Poříčí malé, na mostě silničním (Hd. 68. Aner.) . . . . .                                           | 334·5 . . . . .    | 1058         |
| 13. Bručí, jižní chalupy při cestě (Hd. 68. 130.) . . . . .                                             | 371·0 . . . . .    | 1174         |
| 14. Vysoká Srbská, severovýchodní chalupy při silnici (Hd. 68. 94.) . . . . .                           | 475·8 . . . . .    | 1506         |
| 15. „ výšina, 600 metrů západně odtud (Hd. 68. 95.) . . . . .                                           | 513·2 . . . . .    | 1624         |
| 16. Zdárek, chalupy při cestě do Zadní Chudoby (Hd. 68. 127.) . . . . .                                 | 385·1 . . . . .    | 1218         |
| 17. „ návrší mezi tímto místem a Mokřinami (Hd. 68. 121.) . . . . .                                     | 503·4 . . . . .    | 1593         |
| 18. Mokřiny, prostřed místa (Hd. 68. 129.) . . . . .                                                    | 422·3 . . . . .    | 1336         |
| 19. Machov, výšina 800 metrů jižně od Machova ve směru k Vysoké<br>Srbské (Hd. 68. 112a.) . . . . .     | 584·6 . . . . .    | 1850         |
| 20. Bukovina, lesnatý vrch na hranicích 2 kilom. jižně Machova<br>(Triang. Austr.) . . . . .            | 696·8 . . . . .    | 2206         |
| 21. Pustá jeskyně (Wildes Loch), východně Bukoviny (Reym. K.) . . . . .                                 | 802·3 . . . . .    | 2538         |
| 22. „Za vrchy,“ výšina mezi Závrchy a Bukovinou v Prusku (Hd. 68.) . . . . .                            | 687·9 . . . . .    | 2176         |
| 23. Stružné, severně vesnice na dlouhém hřbetu (Preuss. Verm. 68.) . . . . .                            | 605·0 . . . . .    | 1914         |
| 24. Jakubovice, návrší 300 kroků východně zvonice (Preuss. Verm.<br>66.) . . . . .                      | 619·3 . . . . .    | 1959         |
| 25. Čermná německá, vrch Epheuberg, severně vesnice při zemské<br>hranici (Preuss. Verm. 65.) . . . . . | 521·6 . . . . .    | 1650         |
| 26. „ makovice na věži (Preuss. Verm. 64.) . . . . .                                                    | 418·0 . . . . .    | 1322         |
| 27. „ domy blíže kostela (Reym. K.) . . . . .                                                           | 395·0 . . . . .    | 1250         |
| 28. Chudoba, hostinec „u slunce,“ podjezd (Koř. 71. Bar. 5.) . . . . .                                  | 390·0 . . . . .    | 1234         |
| 29. „ zámecký kopec (Preuss. Verm. 64.) . . . . .                                                       | 477·6 . . . . .    | 1511         |
| 30. Zadní Chudoba, u parní pily (Koř. 71. Bar. 6.) . . . . .                                            | 433·0 . . . . .    | 1370         |
| 31. „ při silnici do Rychnova, u obrazu sv. Františka (Koř.<br>71. Bar. 7.) . . . . .                   | 556·0 . . . . .    | 1759         |
| 32. Chudobský les, při silnici do Rychnova, u obrazu sv. Josefa<br>(Koř. 71. Bar. 8.) . . . . .         | 665·0 . . . . .    | 2104         |
| 33. Malá Čermná, jižní dům při cestě (Hd. 68. 131.) . . . . .                                           | 365·1 . . . . .    | 1155         |
| 34. Zakše (Sakisich), domy při silnici do Chudoby (Koř. 71. Bar. 4.) . . . . .                          | 380·0 . . . . .    | 1202         |
| 35. „ makovice věže kostelní (Preuss. Verm. 61.) . . . . .                                              | 402·3 . . . . .    | 1271         |
| 36. Slané, most na počátku svém (Preuss. Str. N. 32.) . . . . .                                         | 322·3 . . . . .    | 1018         |
| 37. „ návrší severně vesnice (Preuss. Verm. 62.) . . . . .                                              | 385·6 . . . . .    | 1220         |
| 38. Georgsdorf, výšina, západně této vesnice (Preuss. Verm. 58.) . . . . .                              | 479·0 . . . . .    | 1515         |
| 39. Březovice, návrší 300 kroků severně vesnice u lesa (Preuss.<br>Verm. 60.) . . . . .                 | 493·0 . . . . .    | 1560         |
| 40. Jelení (Gellenau), tabule s jmenem vsi u bělidla (Prud. 207.) . . . . .                             | 389·3 . . . . .    | 1232         |
| 41. „ návrší 300 kroků jihozápadně odtud (Preuss. Verm. 59.) . . . . .                                  | 444·3 . . . . .    | 1406         |
| 42. Hora „Rabenkoppe“ u Dornichova, jehlanec kamenný (Preuss.<br>Verm. 63.) . . . . .                   | 683·6 . . . . .    | 2163         |
| 43. V Kotli, $\frac{1}{4}$ míle severně od vesnice téhož jména (Preuss.<br>Verm. 67.) . . . . .         | 749·7 . . . . .    | 2372         |

Nadm. výška v met. Ve Víd. stř.

|                                                                                                                                |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 44. Hora Spiegelberg u Nuzného, jihovýchodní konec hořejší planiny (Koř. 68. 419.) . . . . .                                   | 922·0 . . . . . | 2917 |
| 45. „ severozápadní konec (okraj) náhorní planiny (Koř. 68. 418.) . . . . .                                                    | 848·9 . . . . . | 2686 |
| 46. Rychnov (Karlsberg), první domy při cestě z Dušníků (Koř. 71. Bar. 10.) . . . . .                                          | 760·0 . . . . . | 2404 |
| 47. „ jižně odtud při staré silnici do Dušníků, kde se odděluje cesta do Chudoby, kamenný sloup (Koř. 71. Bar. 9.) . . . . .   | 819·0 . . . . . | 2591 |
| 48. Paseky (Passendorf), jižně odtud ležící náhorní rovina mezi Hejšovinou a Bukovinou, rozhraní vod (Koř. 68. 420.) . . . . . | 774·0 . . . . . | 2449 |
| 49. Veliká Hejšovina, při tak zvaném stole (Tafelstein), u hostince (Koř. 71. Bar. 11.) . . . . .                              | 889·4 . . . . . | 2814 |
| 50. „ nejvyšší skála (Koř. 71. Bar. 142.) . . . . .                                                                            | 910·3 . . . . . | 2880 |
| 51. Malá Hejšovina, nejvyšší bod (Koř. 71. 144.) . . . . .                                                                     | 886·3 . . . . . | 2804 |
| 52. Vambeřice (Albendorf), makovice věže poutnického kostela (Preuss. Verm. 89.) . . . . .                                     | 414·3 . . . . . | 1311 |
| 53. „ mlýnská strouha (Prud. 197.) . . . . .                                                                                   | 353·0 . . . . . | 1117 |
| 54. Vrch Harteberg, západně od Vambeřice (Preuss. Verm. 88.) . . . . .                                                         | 522·3 . . . . . | 1653 |
| 55. Kladsko, město, při Nise (Letz. Rgb.) . . . . .                                                                            | 279·3 . . . . . | 884  |
| 56. „ zámecké nádvoří hlavní tvrze (Prud. 169.) . . . . .                                                                      | 347·6 . . . . . | 1100 |
| 57. Rycharec (Rückerts) silnice na východním konci vsi (Preuss. Str. N. 26.) . . . . .                                         | 470·3 . . . . . | 1488 |
| 58. „ makovice věže kostelní (Preuss. Verm. 80.) . . . . .                                                                     | 509·0 . . . . . | 1610 |
| 59. „ hrad Valdštejn, jihozápadní věž jeho (Preuss. Verm. 81.) . . . . .                                                       | 584·3 . . . . . | 1849 |
| 60. Utschendorf, 1000 kroků západně od hranice mezi dvorci Schubertovým a Taubertovým (Preuss. Verm. 83.) . . . . .            | 570·0 . . . . . | 1803 |
| 61. Friedrichsgrund, kaple u Rycharce (Preuss. Verm. 85.) . . . . .                                                            | 650·8 . . . . . | 2059 |
| 62. Friedrichsdorf, kostel (Prud. 192.) . . . . .                                                                              | 613·6 . . . . . | 1941 |
| 63. Keulendorf, severovýchodně od rychty (Preuss. Verm. 82) . . . . .                                                          | 740·0 . . . . . | 2341 |

## 35. Kopidlno (severně odtud).

Zeměpisná šířka: 50° 20' až 50° 25'

Zeměpisná délka: 32° 50' až 33° 0'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 32·7 procent,

„ „ „ „ 300—400 „ 67·3 „

Nadm. výška v met. Ve Víd. stř.

|                                                                                                      |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1. Važice, jižně odtud poslední dolejší mlýn v údolí (Koř. 71. 557.) . . . . .                       | 238·7 . . . . . | 755  |
| 2. Libáň, holé návrší na rozcestí z Libáně do Dolan a z Bystřice do Zliva (Triang. Austr.) . . . . . | 317·7 . . . . . | 1005 |
| 3. Bystřice, makovice kostelní věže (Koř. 71. 900.) . . . . .                                        | 333·0 . . . . . | 1054 |
| 4. „ severových. odtud sedlo k Třevači (Koř. 71. 501.) . . . . .                                     | 307·9 . . . . . | 974  |
| 5. „ severozáp. odtud holé návrší při cestě do Važic (Koř. 71. 503.) . . . . .                       | 319·7 . . . . . | 1011 |
| 6. Třevač, ovčinec (Koř. 71. 492.) . . . . .                                                         | 301·1 . . . . . | 952  |
| 7. „ mlýn jižně odtud (Koř. 71. 493.) . . . . .                                                      | 276·7 . . . . . | 875  |
| 8. „ severozápadně odtud na hřebetě roh lesa u kaple při cestě do Nadslavě (Koř. 71. 502.) . . . . . | 328·0 . . . . . | 1038 |



|                                                                                              | Nadm. výška v met. | Ve víd. stř. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 9. Chyjice, kostel, zeď hřbitova (Koř. 71. 494.) . . . . .                                   | 304·6 . . . . .    | 964          |
| 10. Bukovice, domky blíže kostela (Koř. 71. 491.) . . . . .                                  | 347·7 . . . . .    | 1100         |
| 11. Velíř, kostel, základ (Koř. 71. 496.) . . . . .                                          | 326·3 . . . . .    | 1032         |
| 12. „ jihozápadně odtud velký rybník (Koř. 71. 495.) . . . . .                               | 298·5 . . . . .    | 945          |
| 13. Vesce, střední výška místní (Koř. 71. 497.) . . . . .                                    | 299·0 . . . . .    | 946          |
| 14. „ jižně odtud myslivna (Koř. 71. 499.) . . . . .                                         | 293·4 . . . . .    | 928          |
| 15. Kostelec, střední výška místní (Koř. 71. 498.) . . . . .                                 | 306·4 . . . . .    | 969          |
| 16. Dolany, kostel, základ (Koř. 71. 575.) . . . . .                                         | 247·8 . . . . .    | 784          |
| 17. Keteň, severozáp. odtud roh lesa nahore na rovině (Koř. 71. 504.) . . . . .              | 317·7 . . . . .    | 1005         |
| 18. Ondrnice, rybník na severozápadním konci místa (Koř. 71. 550.) . . . . .                 | 267·7 . . . . .    | 847          |
| 19. Drahoraz, západní skupenství chalup (Koř. 71. 551.) . . . . .                            | 290·5 . . . . .    | 920          |
| 20. „ holé návrší 900 m. východně odtud (Triang. Austr.) . . . . .                           | 299·1 . . . . .    | 947          |
| 21. Únětice, střední výška místa (Koř. 71. 568.) . . . . .                                   | 278·1 . . . . .    | 880          |
| 22. Ledkov, nejhořejší skupenství domů na silnici (Koř. 71. 560.) . . . . .                  | 240·3 . . . . .    | 760          |
| 23. „ vých. odtud lesnatý hřbet, roh lesa (Koř. 71. 571.) . . . . .                          | 245·0 . . . . .    | 743          |
| 24. Zliv, domy prostřed místa (Koř. 71. 562.) . . . . .                                      | 216·3 . . . . .    | 684          |
| 25. Bilsko, domy na jihozápadním konci místa (Koř. 71. 567.) . . . . .                       | 260·4 . . . . .    | 823          |
| 26. Libáň, náměstí, základ domů na jihových. straně (Koř. 71. 558.) . . . . .                | 230·3 . . . . .    | 729          |
| 27. „ makovice kostelní věže (Koř. 71. 554.) . . . . .                                       | 263·4 . . . . .    | 833          |
| 28. Stará, dvůr, západní roh stodoly (Koř. 71. 559.) . . . . .                               | 244·2 . . . . .    | 773          |
| 29. „ severně od Libáně, stráž jihozáp. od dvora (Koř. 71. 555.) . . . . .                   | 274·2 . . . . .    | 868          |
| 30. Nový dvůr, dvůr východně od Pšenic (Koř. 71. 553.) . . . . .                             | 222·1 . . . . .    | 702          |
| 31. Kopidlno, skupenství domů na záp. konci městečka (Koř. 71. 566.) . . . . .               | 220·6 . . . . .    | 698          |
| 32. „ makovice kostelní věže (Koř. 71. Nr. 507. et 565.) . . . . .                           | 262·9 . . . . .    | 832          |
| 33. Vinice, holé návrší 960 metrů jihozáp. od zámku kopidlenského (Triang. Austr.) . . . . . | 262·3 . . . . .    | 830          |
| 34. Kamenský dvůr, západně od Kopidlna (Koř. 71. 552.) . . . . .                             | 215·7 . . . . .    | 682          |
| 35. Pšoves (Pše), dolejší jihových. konec místa (Koř. 71. 569.) . . . . .                    | 222·9 . . . . .    | 705          |
| 36. V Pšovském lese, při cestě do Česova, v sedle (Koř. 71. 573.) . . . . .                  | 272·0 . . . . .    | 861          |
| 37. Bartošov, domy při silnici (Koř. 71. 570.) . . . . .                                     | 221·4 . . . . .    | 670          |
| 38. Labouň, střední výška místní (Koř. 71. 506.) . . . . .                                   | 257·6 . . . . .    | 815          |
| 39. Žitětín, střední výška místní (Koř. 71. 505.) . . . . .                                  | 244·9 . . . . .    | 775          |

### 36. Jičíněves a Konecchlumí.

Zeměpisná šířka : 50° 20' až 50° 25'

Zeměpisná délka : 33° 0' až 33° 10'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 89·7 procent,

„ „ „ „ 300—400 „ 10·3 „

|                                                                            | Nadm. výška v met. | Ve víd. stř. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Holberk, holé návrší 700 m. záp. od Líbeznic (Triang. Austr.) . . . . . | 320·4 . . . . .    | 1013         |
| 2. Veselí horní, makovice kostelní věže (Koř. 71. 580.) . . . . .          | 309·0 . . . . .    | 978          |
| 3. „ západně od dvora, nahore na rovině (Koř. 71. 576.) . . . . .          | 288·8 . . . . .    | 914          |
| 4. Libišice, dolejší skupenství domů (Koř. 71. 508.) . . . . .             | 264·5 . . . . .    | 837          |
| 5. Volanice, severzápad. odtud Nový dvůr, základ (Koř. 71. 509.) . . . . . | 289·7 . . . . .    | 916          |
| 6. Žeretice, chalupy na jihozápadním konci (Koř. 71. 465.) . . . . .       | 269·3 . . . . .    | 852          |
| 7. Slatiny, domky na blízku kostela (Koř. 71. 462.) . . . . .              | 285·0 . . . . .    | 902          |
| 8. Jičíněves, zámek, okraj střechy (Koř. 71. 513.) . . . . .               | 299·7 . . . . .    | 948          |
| 9. „ dům na jihovýchodním konci místa (Koř. 71. 572.) . . . . .            | 260·4 . . . . .    | 823          |

|                                                                                                        | Nadm. výška v met. | Ve vid. stf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 10. Jičíněves, myslivna (Koř. 71. 514.) . . . . .                                                      | 292·8 . . . . .    | 927          |
| 11. Milčeves, špice zámecké věže (Triang. Austr.) . . . . .                                            | 291·5 . . . . .    | 922          |
| 12. „ severní skupenství domků (Koř. 71. 469.) . . . . .                                               | 272·0 . . . . .    | 861          |
| 13. Nemojčeves (Němyčeves), špice kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                             | 322·4 . . . . .    | 1020         |
| 14. „ kostel, základ (Koř. 71. 460.) . . . . .                                                         | 292·2 . . . . .    | 925          |
| 15. Vítiněves, domy při silnici (Koř. 71. 461.) . . . . .                                              | 265·9 . . . . .    | 841          |
| 16. Staré Město, domy vedlé kostela, základ (Koř. 71. 58.) . . . . .                                   | 289·1 . . . . .    | 914          |
| 17. Hubalov, jižní konec místa (Koř. 71. 466.) . . . . .                                               | 275·5 . . . . .    | 872          |
| 18. Lhota, domy na severním konci místa (Koř. 71. 474.) . . . . .                                      | 274·3 . . . . .    | 868          |
| 19. Konecchlumí, domky u kostela (Koř. 71. 70.) . . . . .                                              | 307·0 . . . . .    | 971          |
| 20. „ dvůr, základ (Koř. 71. 586.) . . . . .                                                           | 273·9 . . . . .    | 867          |
| 21. Kovač, ovčín, základ (Koř. 71. 585.) . . . . .                                                     | 262·4 . . . . .    | 830          |
| 22. Tuř, střední výška místa (Koř. 71. 467.) . . . . .                                                 | 255·4 . . . . .    | 808          |
| 23. „ stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . . . .                                              | 265·4 . . . . .    | 839          |
| 24. Butoves, při západním konci místa (Koř. 71. 467.) . . . . .                                        | 268·8 . . . . .    | 851          |
| 25. „ sedlo v Dubském lese na cestě z Butovsi do Vrbice<br>(Koř. 71. 468.) . . . . .                   | 273·4 . . . . .    | 865          |
| 26. Vrbice, střední výška místa (Koř. 71. 464.) . . . . .                                              | 298·0 . . . . .    | 943          |
| 27. Hradištko horní, špice kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                    | 300·7 . . . . .    | 951          |
| 28. „ domy na blízku kostela (Koř. 71. 463.) . . . . .                                                 | 280·2 . . . . .    | 887          |
| 29. Lhota veselá, severovýchodně odtud okraj lesa na výšině (Koř.<br>71. 588.) . . . . .               | 275·2 . . . . .    | 871          |
| 30. Horka, holé návrší 700 m. západně od severních domů Starých<br>Smrkovic (Triang. Austr.) . . . . . | 275·5 . . . . .    | 872          |
| 31. „ na jihozáp. úpatí jeho kamenná muk (Koř. 71. 589.) . . . . .                                     | 273·0 . . . . .    | 864          |
| 32. Chomutice velké, špice kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                    | 272·9 . . . . .    | 863          |
| 33. „ kostel, zdánlivý základ (Koř. 71. 583.) . . . . .                                                | 246·5 . . . . .    | 780          |
| 34. Třténice, domy na jihovýchodním konci místa (Koř. 71. 584.) . . . . .                              | 252·0 . . . . .    | 797          |
| 35. „ vých. odtud roh lesa u kaple sv. Anny (Koř. 71. 587.) . . . . .                                  | 270·8 . . . . .    | 857          |
| 36. Kabáty, jižní skupenství chalup (Koř. 71. 591.) . . . . .                                          | 262·4 . . . . .    | 830          |

### 37. Hořice.

Zeměp. šířka: 50° 20' až 50° 25'

Zeměp. délka: 33° 10' bis 33° 20'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 59·3 procent,

„ „ „ „ 300—400 „ 35·7 „

„ „ „ „ 400—500 „ 5·0 „

|                                                                            | Nadm. výška v met. | Ve vid. stf. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Vojice, nejhořejší skupenství domů (Koř. 71. 515.) . . . . .            | 365·5 . . . . .    | 1157         |
| 2. „ jižně odtud, kde se obě silnice křížují (Koř. 71. 592.) . . . . .     | 275·6 . . . . .    | 872          |
| 3. Újezd podhorní, chalupy na jihozápadním konci (Koř. 71. 593.) . . . . . | 287·6 . . . . .    | 910          |
| 4. Ostroměř, stanice železné dráhy (E. N. O. N. W. B.) . . . . .           | 263·6 . . . . .    | 834          |
| 5. „ na západním konci místa v údolí (Koř. 71. 596.) . . . . .             | 256·7 . . . . .    | 812          |
| 6. Sobčice, špice kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                 | 284·9 . . . . .    | 903          |
| 7. „ jiho-západní konce místa (Koř. 71. 595.) . . . . .                    | 256·7 . . . . .    | 812          |
| 8. Obora, dvůr, základ (Koř. 71. 594.) . . . . .                           | 246·8 . . . . .    | 781          |
| 9. Domaslavice, dvůr, základ (Koř. 71. 606.) . . . . .                     | 269·4 . . . . .    | 852          |

|                                                                                                                    | Nadm. výška v met. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10. Domaslavice, východně odtad myslivna (Koř. 71. 605.) . . . . .                                                 | 301·0 .            |
| 11. Újezd Sylvarův, na jihovýchodním konci místa (Koř. 71. 604.) . . . . .                                         | 265·0 .            |
| 12. Terezín (Theresienstadt), chalupy při cestě do Újezdu (Koř. 71. 601.) . . . . .                                | 248·8 .            |
| 13. Nové Ohnišťany, dvůr Františkov (Koř. 71. 603.) . . . . .                                                      | 245·0 .            |
| 14. Liskovice, dvůr, základ (Koř. 71. 602.) . . . . .                                                              | 262·4 .            |
| 15. Dobrávoda, horní mlýnský potok (Koř. 71. 616.) . . . . .                                                       | 269·8 .            |
| 16. Dobrovodská hůra, výšina 900 metrů východně od vesnice Dobré<br>vody dolní (Triang. Austr.) . . . . .          | 282·8 .            |
| 17. Velká Třeboučev, východní skupenina domů (Koř. 71. 613.) . . . . .                                             | 271·5 .            |
| 18. Malá Třeboučev, východní skupenství domů (Koř. 71. 614.) . . . . .                                             | 283·5 .            |
| 19. Kamenec, holé návrší 580 metrů severovýchodně od kapličky<br>prostřed Třeboučevsi (Triang. Austr.) . . . . .   | 299·6 .            |
| 20. Chvalina, jižní skupenství chalup (Koř. 71. 615.) . . . . .                                                    | 292·7 .            |
| 21. Chodovice, domy vedle kostela (Koř. 71. 599.) . . . . .                                                        | 330·2 .            |
| 22. „ špiče kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                                               | 356·9 .            |
| 23. Holovousy, zámek, základ (Koř. 71. 598.) . . . . .                                                             | 312·6 .            |
| 24. Chlum, domy na jižním konci místa (Koř. 71. 600.) . . . . .                                                    | 350·6 .            |
| 25. Blisko, domy u silnice (Koř. 71. 618.) . . . . .                                                               | 292·3 .            |
| 26. Libenice, severovýchodní chalupy (Koř. 71. 617.) . . . . .                                                     | 294·3 .            |
| 27. Hořice, makovice na věži farního kostela (Koř. 71. 621.) . . . . .                                             | 361·7 .            |
| 28. „ prostřední výška města (Sen. průřez ze 2 bar. měř.) . . . . .                                                | 289·0 .            |
| 29. „ nejhořejší dům na severní straně města (Koř. 71. 619.) . . . . .                                             | 391·9 .            |
| 30. „ holé návrší na nejvyšším místě pěšiny z Hořic k ho-<br>spodě Duchovské u kapličky (Triang. Austr.) . . . . . | 403·1 .            |
| 31. Sv. Gothart, vrch vých. Hořic, špiče kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                  | 373·6 .            |
| 32. „ kostel, základ (Koř. 71. 365.) . . . . .                                                                     | 341·4 .            |
| 33. Duchov, hostinec, základ (Koř. 71. 333.) . . . . .                                                             | 366·0 .            |
| 34. Doubrava, hořejší chalupy na západní straně (Koř. 71. 416.) . . . . .                                          | 373·9 .            |
| 35. Les Lošanka, nejvyšší místo v podobě vrcholu (Koř. 71. 335.) . . . . .                                         | 383·5 .            |
| 36. Jeníkov, první mlýn jižně ode dvora v údolí (Koř. 71. 336.) . . . . .                                          | 308·1 .            |
| 37. Chlum, severně Holovous lesnatý vrch (Koř. 71. 364.) . . . . .                                                 | 437·0 .            |
| 38. Libín, výška hřbetu západně vsi (Koř. 71. 412.) . . . . .                                                      | 360·9 .            |
| 39. Konecchlumí, lesnatý vrch 1·5 kilom. východně od místa tohoto<br>jmena (Triang. Austr.) . . . . .              | 411·1 .            |
| 40. Mlázovice, špiče kostelní věže (Triang. Austr.) . . . . .                                                      | 338·5 .            |
| 41. „ výška domů u kostela (Koř. 71. 600.) . . . . .                                                               | 307·2 .            |
| 42. Lhota Šarovcova, střední výška u potoka (Koř. 71. 366.) . . . . .                                              | 267·3 .            |
| 43. Pertoltka, velký rybník tamtéž, povrcheň jeho (Koř. 71. 212.) . . . . .                                        | 271·9 .            |
| 44. Dobrží, západní skupenství domů (Koř. 71. 363.) . . . . .                                                      | 362·0 .            |
| 45. Červená Třemešná, kostel, zdánlivý základ (Koř. 71. 361.) . . . . .                                            | 356·7 .            |
| 46. Jahodná, základ prostředních domků (Koř. 71. 332.) . . . . .                                                   | 329·3 .            |
| 47. Miletín, střední výška (Koř. 71. 360.) . . . . .                                                               | 334·4 .            |

### 38. Miletín a Vřeštov.

Zeměp. šířka: 50° 20' až 50° 25'

Zeměp. délka: 33° 20' až 33° 30'

Z celé plochy tohoto čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 34·5 procent,

„ „ „ 300—400 „ 54·8 „

„ „ „ 400—500 „ 10·7 „

|                                                                                 | Nadm. výška v met. Ve vřd. stř. |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1. Miletín, špice věže farního kostela (Triang. Austr.)                         | 368·7                           | 1166 |
| 2. " zámek, základ (Koř. 71. 331a.)                                             | 337·6                           | 1068 |
| 3. Trotina, domy u silnice (Koř. 71. 359.)                                      | 366·0                           | 1158 |
| 4. Zábřeží, hořejší chalupy při silnici (Koř. 71. 347.)                         | 421·0                           | 1332 |
| 5. Od Zábřeží jihovýchodně myslivna (Müll. 67. 116.)                            | 385·9                           | 1221 |
| 6. Velehrádek, severně odtud cihelna (Müll. 67. 114.)                           | 357·6                           | 1131 |
| 7. Bílé Poličany, dvůr u zámku, základ (Koř. 71. 343.)                          | 302·6                           | 957  |
| 8. Dolenecký dvůr, při zemi (Koř. 71. 338.)                                     | 320·1                           | 1012 |
| 9. " východně odtud nejvyšší bod cesty do Lhotky (Koř. 71. 341.)                | 343·8                           | 1088 |
| 10. U písku, vrch, glorietek, základ (Koř. 71. 342.)                            | 353·4                           | 1118 |
| 11. Chlum, lesnatý hřbet severně Chloumku (Koř. 71. 339.)                       | 427·0                           | 1351 |
| 12. Bohánka, hořejší domy na hřbetě (Koř. 71. 340.)                             | 403·2                           | 1276 |
| 13. " holé návrší 200 metrů jižně odtud (Triang. Austr.)                        | 417·1                           | 1319 |
| 14. Chloumek, jihových. skupenství chalup (Koř. 71. 609.)                       | 362·3                           | 1146 |
| 15. Jeřice, zámek, základ (Koř. 71. 612.)                                       | 272·0                           | 861  |
| 16. " severně odtud kraj lesa na výšině (Koř. 71. 620.)                         | 388·6                           | 1230 |
| 17. Cerekvice, domy jižně kostela (Koř. 71. 611.)                               | 270·0                           | 854  |
| 18. " špice věže kostelní (Triang. Austr.)                                      | 319·9                           | 1012 |
| 19. Žiželoves, kostel, základ (Müll. 67. 94.)                                   | 230·6                           | 749  |
| 20. " špice kostelní věže (Müll. 67. 94.)                                       | 262·6                           | 831  |
| 21. Lužany, hořejší domy na severní straně (Müll. 67. 96.)                      | 274·0                           | 867  |
| 22. " jiho-východně odtud lesnatý kopec (Müll. 67. 97.)                         | 295·8                           | 936  |
| 23. Vřeštov malý, údolí (Müll. 67. 98.)                                         | 269·0                           | 851  |
| 24. Vřeštov veliký, makovice kostelní věže (Müll. 67. 90.)                      | 301·0                           | 952  |
| 25. " kostel, základ (Müll. 67. 90.)                                            | 277·8                           | 879  |
| 26. " jiho-východně odtud kopec (Müll. 67. 91.)                                 | 308·2                           | 975  |
| 27. " kamenná muka na západním konci toho místa (Müll. 67. 106.)                | 290·2                           | 924  |
| 28. Zátorov, prostřední výška domů (Müll. 67. 105.)                             | 302·2                           | 956  |
| 29. " povrchu rybníka severozápadně odtud (Koř. 71. 344.)                       | 295·7                           | 935  |
| 30. " západně odtud kopec (Müll. 67. 107.)                                      | 324·5                           | 1027 |
| 31. Červený dvůr u Poličan (Müll. 67. 108.)                                     | 290·2                           | 925  |
| 32. Lanžov, kostel, základ (Koř. 71. 346.)                                      | 330·1                           | 1044 |
| 33. Sedlec, jižní konec místa (Koř. 71. 347.)                                   | 301·6                           | 954  |
| 34. " severně odtud mlýn (Müll. 67. 110.)                                       | 281·7                           | 891  |
| 35. Vilantice, severně odtud holá výšina u lesa (strom v poli) (Müll. 67. 100.) | 334·1                           | 1057 |
| 36. " západně odtud roh lesa (Müll. 67. 67.)                                    | 324·2                           | 1026 |
| 37. Chotěborky, makovice věže kostelní (Müll. 67. 64.)                          | 355·1                           | 1123 |
| 38. " vesnice, střední výška (Müll. 67. 60.)                                    | 325·6                           | 1030 |
| 39. " holé návrší 300 metrů západně odtud (Triang. Austr.)                      | 340·6                           | 1077 |
| 40. " jiho-západně odtud hájek (remíz) v polích (Müll. 67. 91.)                 | 298·0                           | 943  |
| 41. Hustiřany, chalupy v jižním konci vsi (Müll. 67. 82.)                       | 269·2                           | 852  |
| 42. " severně odtud holé návrší u kamenných sloupů (Müll. 67. 85.)              | 302·5                           | 957  |
| 43. Podhradský mlýn pod Hustiřany (Müll. 67. 79.)                               | 239·3                           | 757  |
| 44. Od Velchov severozápadně kopec (Müll. 67. 88.)                              | 339·0                           | 1073 |
| 45. Habřina, severovýchodně odtud kostel sv. Václava, základ (Müll. 67. 2.)     | 275·7                           | 872  |
| 46. " severně odtud kopec (Müll. 67. 78.)                                       | 287·4                           | 909  |
| 47. Dubenec, špice kostelní věže (Müll. 67. 58.)                                | 329·9                           | 1044 |
| 48. " severně odtud roh zdi hřbitovní (Müll. 67. 69.)                           | 310·8                           | 984  |

|                                                                                                                                 | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 49. Dubenec, na jižním konci vsi (Müll. 67. 59.) . . . . .                                                                      | 286·2 . . . 906                 |
| 50. " roh lesa při cestě do Hustiřan (Müll. 67. 61.) . . .                                                                      | 333·0 . . . 1054                |
| 51. " severo-východně odtud návrší na cestě do Libotova<br>(Müll. 67. 57.) . . . . .                                            | 349·1 . . . 1104                |
| 52. Mířejov, severo-východně odtud nejvyšší bod silnice do Dubence<br>(Müll. 67. 109.) . . . . .                                | 340·1 . . . 1076                |
| 53. " jižně odtud kopec, lesem porostlý (Müll. 67. 113.) . .                                                                    | 374·7 . . . 1185                |
| 54. Hvězda, větrný mlýn (Müll. 67. 60.) . . . . .                                                                               | 326·4 . . . 1032                |
| 55. Hřibojedy, holá výšina sev. odtud, 200 m. severozáp. od nejvyššího<br>bodu vozové cesty odtud do Podstráně (Triang. Austr.) | 413·4 . . . 1308                |
| 56. Libotov, jihovýchodně odtud větrný mlýn (Müll. 67. 65.) . .                                                                 | 406·3 . . . 1286                |
| 57. " severně odtud větrný mlýn (Müll. 67. 66.) . . . . .                                                                       | 420·5 . . . 1331                |
| 58. Podhoří (Silberleit), domy při cestě do Doubravice (Müll. 67. 120.)                                                         | 431·3 . . . 1365                |
| 59. Doubravice, hořejší roh lesa západně odtud (Müll. 67. 118.) .                                                               | 432·7 . . . 1369                |

### 39. Jaroměř a Josefov.

Zeměpisná šířka: 50° 20' až 50° 25'

Zeměpisná délka: 33° 30' až 33° 40'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 58·0 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| " | " | " | " | 300—400 | " | 41·0 | " |
| " | " | " | " | 400—500 | " | 1·0  | " |

|                                                                                                | Nadm. výška v met. Ve vid. stř. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Hřibojedy, severně odtud „Nová hospoda“ (Müll. 67. 55.) . . .                               | 404·2 . . . 1279                |
| 2. Kašov, roh lesa „ve vlaštovkách“ (Müll. 67. 30.) . . . . .                                  | 297·8 . . . 942                 |
| 3. " severozáp. odtud vrch řečený „na stráni“ (Müll. 67. 32.)                                  | 423·6 . . . 1340                |
| 4. Litice, kostel, základ (Müll. 67. 3.) . . . . .                                             | 318·7 . . . 1008                |
| 5. Nová Amerika, dvůr severovýchodně Litic (Müll. 67. 54.) . . .                               | 315·0 . . . 997                 |
| 6. Velchovy, makovice kostelní věže (Müll. 67. 52.) . . . . .                                  | 337·0 . . . 1066                |
| 7. " kostel, základ (Müll. 67. 52.) . . . . .                                                  | 307·2 . . . 972                 |
| 8. " střední výška (Müll. 67. 86.) . . . . .                                                   | 294·2 . . . 931                 |
| 9. Vesce, západně odtud roh lesa (Müll. 67. 51.) . . . . .                                     | 312·9 . . . 990                 |
| 10. Rtyň, výšina východně odtud (Müll. 67. 49.) . . . . .                                      | 275·2 . . . 871                 |
| 11. Záloňov (Salney), kostel, základ (Müll. 67. 4.) . . . . .                                  | 300·9 . . . 952                 |
| 12. " náhorní rovina východně odtud (Müll. 67. 24.) . . . . .                                  | 307·5 . . . 973                 |
| 13. Na Chmelíku, špice kostelní věže na výšině východně od Vesce<br>(Triang. Austr.) . . . . . | 328·2 . . . 1038                |
| 14. U Čertovy hospody, kamenný sloup na rozcestí (Müll. 67. 26.)                               | 314·4 . . . 994                 |
| 15. " výšina východně odtud (Müll. 67. 25.) . . . . .                                          | 326·4 . . . 1032                |
| 16. Kuks, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.) . . . . .                                  | 310·5 . . . 982                 |
| 17. " zahrada klášterní, základ (Koř. 71. Bar. 46.) . . . . .                                  | 303·4 . . . 960                 |
| 18. " klášterní kostel, makovice věže (Müll. 67. 29.) . . . . .                                | 324·0 . . . 1025                |
| 19. " severní hořejší domy vsi (Müll. 67. 35.) . . . . .                                       | 289·3 . . . 915                 |
| 20. " most přes Labe, 4 metry nad povrchní řeky (Koř. 71.<br>Bar. 47.) . . . . .               | 275·0 . . . 870                 |
| 21. Žitč, zámek, základ (Müll. 67. 38.) . . . . .                                              | 289·5 . . . 916                 |
| 22. Vlčkovice (Wölsdorf), bání kostelní věže (Müll. 67. 21.) . . .                             | 316·7 . . . 1002                |
| 23. " domy nad kostelem (Müll. 67. 187.) . . . . .                                             | 282·4 . . . 893                 |

|                                                                                 | Nadm. výška v met. | Ve vzd. stř. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 24. Vlčkovice, domy na západním konci (Müll. 67. 36.)                           | 277·7              | 878          |
| 25. „ výšina jižně odtud na pěšince do Krabčic (Müll. 67. 20.)                  | 334·6              | 1059         |
| 26. Střeziměřice, západní domy vesnice (Müll. 67. 22.)                          | 331·9              | 1050         |
| 27. Chvalkovice, báh věže kostelní (Müll. 67. 17.)                              | 353·2              | 1118         |
| 28. Mízkolezy, dvůr, základ (Hd. 68. 282.)                                      | 325·7              | 1030         |
| 29. Krabčice, severových. odtud mlýn „Plapmühle“ (Müll. 67. Bar.)               | 299·0              | 946          |
| 30. „ výšina západně toho místa (Müll. 67. 16.)                                 | 314·7              | 995          |
| 31. Svinišťany, dvůr, základ (Hd. 68. 285.)                                     | 283·5              | 897          |
| 32. „ holé návrší 250 metrů jihozápadně od ovčína tohoto místa (Triang. Austr.) | 315·3              | 997          |
| 33. Sebuč, hořejší domy u silnice (Müll. 67. 19.)                               | 316·3              | 1001         |
| 34. Bělouň, hořejší svah blíž jižních chalup (Müll. 67. 15.)                    | 263·4              | 833          |
| 35. Vinice, hospoda severně od Heřmanic (Müll. 67. 10.)                         | 295·0              | 933          |
| 36. Heřmanice, makovice věže kostelní (Müll. 67. 9.)                            | 270·2              | 855          |
| 37. Hořenice, hospoda severně odtud na silnici do Heřmanic (Müll. 67. 12.)      | 271·2              | 858          |
| 38. „ návrší nad mlýnem (Müll. 67. 8.)                                          | 260·7              | 824          |
| 39. Jaroměř, špiče věže farního kostela (Triang. Austr.)                        | 289·5              | 916          |
| 40. „ prostřední výška města (Koř. 71. Bar.)                                    | 260·2              | 823          |
| 41. „ stráň západně od města (Müll. 67. 11.)                                    | 279·9              | 886          |
| 42. Josefov, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.)                          | 259·8              | 822          |
| 43. „ velké náměstí prostřed města (Koř. 68. Nr. 57. u. 71. Nr. 45. Bar.)       | 275·0              | 870          |
| 44. „ špiče věže hlavního kostela pevnosti (Triang. Austr.)                     | 313·7              | 993          |
| 45. „ údolí Labe u Šifnerova mlýna (Hd. 68. 272.)                               | 238·0              | 753          |
| 46. Rtyň, východně odtud kamenný sloup na cestě do Jaroměře (Müll. 67. 50.)     | 257·3              | 814          |
| 47. Od Josefova západně, prachárna č. 1. (Müll. 67. 46.)                        | 271·4              | 858          |
| 48. Libina, výšina 720 m. sev.-záp. od prachárny č. 3. (Triang. Austr.)         | 295·3              | 934          |
| 49. Rožnov, východně odtud výšina (Müll. 67. 74.)                               | 268·4              | 849          |
| 50. Neznašov, střední výška (Müll. 67. 72.)                                     | 252·0              | 797          |
| 51. Skořitka, žlab údolí (Müll. 67. 75.)                                        | 245·4              | 776          |
| 52. Semonice, silnice nad tímto místem (Müll. 67. 71.)                          | 249·6              | 790          |
| 53. Starý Ples, základ domů u rybníka (Hd. 68. 292.)                            | 240·4              | 772          |
| 54. „ cesta na jižním svahu místa u hospody v směru k Jesenému (Hd. 68. 313.)   | 260·4              | 835          |
| 55. Rychnovek, 500 m. jihových. odtud malá výšina (Hd. 68. 288.)                | 266·1              | 842          |
| 56. Zvole, špiče kostelní věže (Triang. Austr.)                                 | 289·0              | 914          |
| 57. „ kostel, základ (Müll. 67. 14.)                                            | 268·1              | 848          |
| 58. „ severně odtud údolí Úpy (Müll. 67. 44.)                                   | 243·8              | 771          |
| 59. Dolany, severní domy (Müll. 67. 43.)                                        | 267·5              | 847          |
| 60. Doubravice, dvůr, základ (Hd. 68. 286.)                                     | 270·2              | 860          |

#### 40. Skalice a Nové Město n. M.

Zeměpisná šířka: 50° 20' až 50° 25'

Zeměpisná délka: 33° 40' až 33° 50'

Z celé plochy toho čtverhranu leží

v nadmořské výšce od 200—300 metrů 63·0 procent,

|   |   |   |   |         |   |      |   |
|---|---|---|---|---------|---|------|---|
| „ | „ | „ | „ | 300—400 | „ | 26·8 | „ |
| „ | „ | „ | „ | 400—500 | „ | 10·2 | „ |

|                                                                                               | Nadm. výška v met. Ve víd. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Arenda, výšina 1·6 kilom. vých. od Mízkolez (Triang. Austr.)                               | 335·6 . . . 1              |
| 2. Třebešov, domy na východním konci (Hd. 68. 283.)                                           | 278·3 . . .                |
| 3. Skalice, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.)                                         | 292·9 . . .                |
| 4. " na náměstí (Hd. 68. 255.)                                                                | 288·0 . . .                |
| 5. Malá Skalice, makovice kostelní věže, prostředek (Hd. 68. 256.)                            | 307·4 . . .                |
| 6. " na silnici asi 700 m. severně města (Hd. 68. 254.)                                       | 305·1 . . .                |
| 7. Říkov, 700 m. jihovýchodně odtud holé návrší (Hd. 68. 281.)                                | 284·5 . . .                |
| 8. Spyta, prostřední výška místa (Preuss. Verm.)                                              | 300·9 . . .                |
| 9. Františkov kopec, 400 m. východně od hořejších domů v Jesenici (Triang. Austr.)            | 293·0 . . .                |
| 10. Jesenice, makovice kostelní věže (Hd. 68. 275.)                                           | 294·5 . . .                |
| 11. " domy pod Františkovou hůrou na stráni (Hd. 68. 276.)                                    | 276·8 . . .                |
| 12. " prostřed cesty odtud k Loučinskému lesu (Hd. 68. 273.)                                  | 281·5 . . .                |
| 13. Nový dům u Volovky, základ (Hd. 68. 277.)                                                 | 266·2 . . .                |
| 14. Městec, dvůr, základ (Hd. 68. 278.)                                                       | 277·2 . . .                |
| 15. Šestajovice, u mlýna (Hd. 68. 287.)                                                       | 253·5 . . .                |
| 16. Lhota, výšina 500 m. západně odtud (Triang. Austr.)                                       | 281·6 . . .                |
| 17. Nahořany, domy na západní straně při silnici do Josefova (Hd. 68. 242.)                   | 278·1 . . .                |
| 18. Domkov, chalupy na východním konci místa (Hd. 68. 233.)                                   | 265·5 . . .                |
| 19. Šeřeč, domy na jižním konci (Hd. 68. 239.)                                                | 260·6 . . .                |
| 20. Provodov, hořejší domy na jižním konci místa (Hd. 68. 232.)                               | 283·6 . . .                |
| 21. Kleny, domy na severním konci místa, u silnice (Hd. 68. 238.)                             | 273·1 . . .                |
| 22. " 500 m. odtud na silnici do Skalice (Hd. 68. 241.)                                       | 281·9 . . .                |
| 23. Dubno, dvůr, základ (Hd. 68. 240.)                                                        | 288·4 . . .                |
| 24. Pastvina, výšina 600 m. severozáp. od Starkoče (Triang. Austr.)                           | 368·9 . . . 1              |
| 25. " aleje na jižním hřebetu (Hd. 68. 219.)                                                  | 345·6 . . . 1              |
| 26. " sedlo na straně k Starkoči (Hd. 68. 218.)                                               | 385·3 . . . 1              |
| 27. Starkoč, stanice železné dráhy (E. N. S. N. D. V.)                                        | 345·2 . . . 1              |
| 28. Vysokov u Náchoda, nejvyšší bod na silnici k Náchodu (sedlo) (Koř. 71. Bar. 1.)           | 407·0 . . . 1              |
| 29. " domy na jižní straně (Hd. 68. 231.)                                                     | 359·3 . . . 1              |
| 30. Václavice, špice kostelní věže (Triang. Austr.)                                           | 399·6 . . . 1              |
| 31. " stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                                                 | 360·4 . . . 1              |
| 32. Bražec, 600 metrů západně odtud na silnici do Starého Města (Hd. 68. 235.)                | 426·0 . . . 1              |
| 33. Přibyslav, asi 100 m. odtud na cestě k Vrchovinám (Hd. 68.)                               | 448·9 . . . 1              |
| 34. " lesnatý hřbet mezi tímto místem a Bražcem (Hd. 68. 251.)                                | 437·9 . . . 1              |
| 35. " výšina, 400 metrů severovýchodně odtud (Hd. 68. 250.)                                   | 503·5 . . . 1              |
| 36. Vrchoviny, prostřed místa (Hd. 68. 228.)                                                  | 361·3 . . . 1              |
| 37. " výšina 1 1/4 kilom. severně odtud a východně od silnice do Starého Města (Hd. 68. 246.) | 406·0 . . . 1              |
| 38. Nové Město nad Metují, stanice železné dráhy (E. N. St. E. G.)                            | 299·0 . . . 1              |
| 39. " kaple raduické věže, špice (Triang. Austr.)                                             | 376·0 . . . 1              |
| 40. " zámek, základ (Hd. 68. 226.)                                                            | 339·6 . . . 1              |
| 41. " lesnatý hřbet asi 1 kilom. jihových. odtud (Hd. 68. 154.)                               | 499·4 . . . 1              |
| 42. Krčín, kaple na stráni, makovice vížky, prostředek (Hd. 68. 244.)                         | 319·3 . . . 1              |
| 43. " povrchu řeky Metuje pod mostem železničním (E. N. St. E. G.)                            | 276·1 . . . 1              |





podobně vystínil jsem všechny strmější sklony křídou, maje to za potřebné zvláště při rovnějších polohách v příčině pravého posouzení reliéfu půdy. Mapa tato přidržuje se měřidka 1 : 200 000, obsahující černým tiskem veškeru situaci, t. j. síť říčnou, silniční a železniční, všechna osídlená místa, jakož i sílu čísel výškových, jež udávají výšku místa, kroužkem znamenáného, nad povrchní moře jaderského, a sice měrou metrickou. Mimo to je všecken terrain mapy prokládán červenými čarami buď plnými, buď tečkovanými. Jsoutě to vrstevnice t. j. čáry spojující místa stejné výše nadmořské; že pak rozdílné tyto výšky ze stupnice výšek, při rámci mapy umístěné, snadno lze poznati, bude také neméně lze za pomoci její posouditi prostou i poměrnou výšku všelikého místa mapy samé. Červené čáry silně vytažené znamenají pokaždé plná sta metrův nad povrchní mořskou i jsoutě tato sta ciframi stovými (bez nul) mezi čáry, jimž svědčí, přeskáčkou vepsána. Červeně tečkované čáry mezi dvěma sty znamenají vždy padesáté metry, slabé čáry červené pak, jež ale v prostých výškách nad 500 metrův přestávají, udávají pětadvacítky metrů stových. Aby pak hned při celkovém obrazu mapy lísily se krajiny rozličné výše od sebe, dávají se takto místa rychlejšímu rozeznání rozličné vyvýšenosti kraje, v rámci mapy obsahující, pokryty jsou hlavní vrstvy barvami rozdílnými. Tak objevuje se zejména všechno prostranství, v prosté výši 250 až 400 metrů položené, v postupných tónech barvy nahnědlé; prostranství mezi 400 až 700 metrů má barvu zelenou, mezi 700 až 1000 metrů fialovou, mezi 1000 až 1400 metrů modravou; místa ještě výše zůstávají bílá. Že pak v listu tomto drží vrch jakýsi ton tmavý a pošmourný, pochází odtud, že zrovna do rámce jeho připadají nejvyšší kraje české; takové rozvržení barev bylo však nezbytné, aby zbyla pro vrstvy mnohem nižší, v ostatních listech mapy panující, ještě rozeznatelná stupnice barev.

Co tuto řečeno, platí vyšší ještě měrou o druhé menší mapě, kteráž zobrazuje vlastní Krkonoše, tedy nejvyšší vůbec končiny země, a při kteréž nesměl jsem sobě dovoliti jiné stupnice barev, než v hlavním listě, ač chtěl-li jsem zůstatí důsledným. Mapa tato má měřidko dvojnásobně menší, t. j. 1 : 100 000; obsahující, pak mezi jiným i nejoblíbenější část Krkonoší s nejschůznějšími steznicemi po nich, bude asi (tak aspoň naději se) vítaným přídatkem všem pocestným z ochoty. Na obou mapách pak dostalo se jak jižnímu, tak severnímu svahu a podhoří Krkonoší jednotejného vypracování.

Jestliť tomu více jak 10 let, co ve zprávách c. k. geografické společnosti ve Vídni vyšla na veřejnost vrstevní mapka hor Krkonošských, od profesora a říšského geologa Jokely-ho zdělaná, jejíž kresba nalezena jest také po smrti tohoto učence mezi pozůstalými jeho rukopisy. Daremně snažil jsem se dopátrati se měřidel na jichž základě mapa tato asi byla sestavena. Byltě to nejspíše jen návrh, který učinil sobě Jokely k vlastnímu orientování a s použitím nemnoho v tomto kraji četných měření triangulace rakouské a jež hodlal později asi zevrubněji provést. Co se mne tkne, nepoužil jsem této mapy, zanášej se kresbou mapy vlastní,



rel

Černá Kupa  
Seify






V Kameny






-----




*Prum.*





|               |               |
|---------------|---------------|
| z.Hirschbergu | z.Hirschbergu |
|---------------|---------------|





1





# PRÁCE GEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

pro

## výskum země České

obsahující:

- Dra. A. FRÍČE: Fauna kamenouhelného útvaru v Čechách se 4 tab.  
KARLA FEISTMANTLA: Uhlé pánve u Malých Pířlep, na Lisku, na Štílci, u Holoubkova,  
Mirešova a Letkova s 9 dřevoryt.  
JOS. VÁLY a R. HELMHACKERA: Ložistiř železných rud u Prahy a Berouna, s 9 dřevoryt,  
6 tab. a 1 mapou.  
R. HELMHACKERA: Geognostický popis krajiny mezi Benešovem a Sázavou s 1 tab. a 1 mapou.  
Dra. EM. BOŘICKÉHO: Petrografická studia v oboru ředičů českých s 8 chromolith. tab.

S 18 dřevoryt., 19 tab. a 2 mapami.

(ARCHIV PRO PŘÍRODOVĚDECKÉ PROSKOUMÁNÍ ČECH. II. DÍL, II. ODDĚLENÍ.)





# **ZVÍŘECTVO**

**kamenouhelného útvaru v Čechách.**



## UVOD.

Více příčin přimělo mne k tomu, že jsem se pokusil o nové vylíčení skrovných ale tím zajímavějších pozůstatků zvířat, která za doby kamenouhelné v Čechách žila.

Předně rozmnožilo se toto odvětví sbírky musejní za posledních let dílem dary, dílem pracemi od komitetu pro výskum Čech vykonanými. Když se přikročilo k studování a určování nově nalezených otisků, musely též starší a již popsané exempláře býti znova proskoumány, při čemž se ukázalo, že nové spracování všeho, co posud z odboru toho známe, velmi bude užitečno. Nově nalezené otisky skorpionů naučily nás, že lépe rozumíme nyní otiskům od Cordy popsaným. Tak zejména poznán v rodu *Mikrolabis* jen mladý skorpion bez ocasu a klepet, a nové vypracování z kamena známého skorpiona šternberského umožnilo zhotovení správnějšího výkresu než byl onen, který dle Cordovy kresby přešel do větší části příručních knih geologických.

Další příčinou, pro kterou jsem se k novému tomuto vylíčení odhodlal, jest roztroušenost článků o věci té pojednávajících po různých těžko přístupných časopisech a akademických pojednáních. Doufám tedy, že se zavděčím příznivcům domácí palaeontologie, když podám jim článek, v němž naleznou vše pohromadě, co až posud známo jest ze zvířectva kamenouhelného útvaru v Čechách a dle něhož budou moci poznati a určiti vše, co by podobného v Čechách se nalézti mohlo.

Až posud známe následujících sedm druhů členovců, kteří žili v lesích za doby kamenouhelné:

| Korýši.                                                                   | Naleziště.       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. <i>Gampsonichus parallelus</i> , Fr.                                   | Lísek u Berouna. |
| 2. <i>Lepidoderma Imhoffi</i> , Reuss.                                    | Vlkýši u Plzně.  |
| Pavoukovití.                                                              |                  |
| 3. <i>Palaranea borassifoliae</i> , Fr.                                   | Sviná u Radnic.  |
| 4. <i>Cyclophthalmus senior</i> ( <i>Microlabis Sternbergii</i> ), Corda. | Chomle u Radnic. |
| Hmyz.                                                                     |                  |
| 5. <i>Acridites priscus</i> , Andrée.                                     | Strádonice.      |
| 6. Chodby vrtavého hmyzu <i>Xyloryctes septarius</i> .                    | Sviná u Radnic.  |
| 7. Chodby. <i>Xyloryctes planus</i> .                                     | Nyřany u Plzně.  |

Práce o tom uveřejněné jsou v pořádku chronologickém následující:

1835. Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. Beilage I. Ueber den in der Steinkohlenformation bei Chomle gefundenen fossilen Scorpion.
  - a) Urtheil der Commission bei der Naturforscherversammlung in Stuttgart, pag. 35;
  - b) Mikroskopische Untersuchung, Abbildung und Beschreibung von A. Corda, pag. 36.
1836. Verhandlungen d. G. d. v. Mus. Insectengänge im Blatte der Flabellaria borassifolia; pag. 34.
1839. Verhandlungen d. G. d. v. Mus.; pag. 14. Beilage A. Ueber eine fossile Gattung der Afterscorpione von A. Corda.
1856. Palaeontologische Miscellen von A. E. Reuss. Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften in Wien: Ueber eine neue Krustenspecies aus der böhmischen Steinkohlenformation *Lepidoderma Imhoffi*; pag. 83 (13).
1859. „Lotos“; pag. 79. Eine neue Crustacee aus der böhmischen Steinkohlenformation von J. Krejčí.
1864. Neues Jahrbuch für Miner. u. Geol. K. Andree: Die Versteinerungen der Steinkohlenformation von Stradonic; pag. 160. (*Acridites priscus*.)
1864. „Živa“; pag. 231. Zvířectvo kamenouhelné doby od dra. Ant. Friče.

V tomto poslednějším článku činí se též zmínka o otisku hmyzu z kamenouhelného útvaru u Berouna, který jakýsi turista prodal britickému museu. Když jsem byl r. 1857 v Londýně, dal jsem si exemplář ten okázati i poznal jsem, že nikterak z Čech nepochází, nýbrž že jest to druh koryšů z vrstev Raibelských v Korutansku, jak je byl prof. Reuss ve zvláštním pojednání popsal.

### **Gampsonychus parallelus.**

Tab. 3. Výkr. 1. a Tab. 4.

Druh tento byl posud nalezen jen jednou a sice na pokraji malé pánvičky blíže Lísku u Berouna. Nalezl jej lesní p. Frant. Jiruš nad mlýnem Dybří zvaným a naše museum obdrželo jej darem od p. Feistmantla. Velmi jemný otisk nalézá se na šedožluté břidlici a neliší se barvou nikterak od břidlice samé, čímž skoumání velmi obtížným se stalo.

Měření vykazalo následující míry:

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Délka těla od předního kraje hlavy až ke konci štítu ocasního | 18 mm.; |
| šířka těla na přední části . . . . .                          | 2 "     |
| šířka části ocasní . . . . .                                  | 2 1/2 " |
| vnitřní tykadla i s bičíkem . . . . .                         | 3 "     |
| základní část zevnějších tykadel . . . . .                    | 2 1/2 " |
| bičík zevnějších tykadel . . . . .                            | 8 1/2 " |

Hlava jest asi o 1/2 mm. širší než následující článek těla; na její přední půli pozorujeme na každé straně vejčité drsné místo, které naznačuje bez pochyby polohu očí, neb při světle se strany padajícím možno pozorovati cosi čočkám hromádkových očí podobného.

Po prostoru mezi oběma očima táhne se k zadnímu trochu vykrojenému kraji vyvýšená lištna.

Na předním kraji hlavy spatřujeme čtyři páry ústrojů, totiž vnitřní a zevnitřní tykadla, pak jakýsi na stopce sedící plátek a konečně nějaký článkovaný přívěsek, který snad náleží k ústrojům ústním.

Vnitřní pár tykadel má základní článek opatřený na zevnějším okraji tupým ostnem, kdežto druhý článek má na vnitřním kraji do předu čnějící ostrý trn. Na třetí článek následuje bičík na zevnějším kraji nepravidelně trnitý. Zevnější pár tykadel má základní článek dvakrát tak dlouhý jako široký a na zevnějším kraji hrbolem opatřený, druhý článek jest čtverhranný a má na předním pravém úhlu tupý ostn; třetí článek jest též čtverhranný a na jeho předním kraji objeví se při silném zvětšení a šikmo padajícím světle zřetelné zoubkování.

Jednotlivé články bičíku mnohem jsou delší než širší a vesměs na předním kraji vroubkovány; napočítal jsem jich asi 30, možno však, že jich bylo ještě mno-



hem více. Nad prvními třemi kroužky bičsku leží podlouhlý plátek, který jest žilkovaný, šikmo od zevnějšího kraje k spodní části vnitřního.

Třetí ústroj leží pod druhým základním článkem zevnějších tykadel; jest to slabě naznačený úzký plátek, který je na konci zašpičatělý a který tutéž délku má, co následující článkovaný přívěsek.

Čtvrtý ústroj, který můžeme rozeznati na hlavě, leží též pod zevnějšími tykadly, má čtverhranný základní článek na tenké stopce upevněný a na něm podlouhlý tříčlánkový, na konci súžený přívěsek.

Zdá se, že oba poslední ústroje náležejí ke kusadlům.

Tělo skládá se ze sedmi stejných, srdcovitých článků, které byly, jak se zdá, z větší části v jeden celistvý štít srostly. Alespoň nelze při slabém zvětšení pozorovati žádného rozhraní a při silném zvětšení naznačeno jest pouze nezřetelně při posledních třech člancích.

Přední kraj každého takového článku jest jeden milimeter široký, něco nad polovicí obnáší největší šířky  $1\frac{1}{2}$  mm.; zadní súžený kraj přechází znenáhla v následující článek. Na zadním okraji 6. a 7. článku lze jest spatřiti šest tupých zoubků, to však jen při třicetkrátém zvětšení a při dobrém postranním osvětlení.

Ocas skládá se ze 6 článků a z pětiplátkové ploutve a upomíná v celku na tvar téhož ústroje u raka obecného. První až čtvrtý článek rovnají se co do velikosti a podoby jeden druhému, jsou  $2\frac{1}{2}$  mm. široké a 1 mm. vysoké. Na zadním okraji 3. a 4. článku spatřil jsem zbytky zoubkování, které k tomu poukázovaly, že po celé šířce článku bylo asi 14 zoubků, z nichž prostřední byly největší.

Ozdobné rýhy a hrbolky na těchto člancích nejsou dostatečně zachovány, aby připustily popisování slovy.

Rozhraní mezi 5. a 6. článkem jest nezřetelné.

Ploutev ocasní skládá se z pěti plátek, z nichž jest prostřední nejkratší a oba nejkratší nejdelší. Střední plátek má podobu pódlouhlého, na spodním kraji zaokrouhleného čtverhranu, jehož šířka se má k délce jako 2 : 5. Na svrchním kraji má plátek ten úzký výběžek, pomocí kterého se připojuje na poslední článek ocasní. Souběžně s celým okrajem plátku táhne se mělká rýha; podél celého kraje posázena jest řada brv, které od shora dolů vždy většími se stávají, tak že na spodním kraji, kde jsou největší, jich stojí pouze 16.

První pár postranních plátek jest táhle vejčitý, má poblíž zevnějšího okraje zřetelnou, žebrovitou vyvýšeninu, jež by přesahovala přeložena jen o málo střední plátek; kraj jest velmi jemně řasnatý.

Druhý zevnější pár plátek má též táhlý vejčitý tvar, jest ale o třetinu delší než plátek prostřední. Zřetelné žebro táhne se z počátku poblíž zevnějšího kraje, obrací se pak do středu plátku a stávajíc se vždy užší připojuje se k trojhrannému oblouku, jímž konec plátku označen jest. Obrvení krajů jest velmi jemné, neb jednotlivé brvy mají sotva čtvrtinu délky oněch na středním plátku.

Z končetin zachovaly se nám jen velmi nezřetelné zbytky při druhém, třetím

a pátém článku těla; přece z nich možno ale poznati, že byly nožky krátké, slabé a že neměly na koncích klepátka.

### Porovnání druhu *Gampsonichus parallelus* s jiným *Gampsonichus fimbriatus*, nalezeným u Saarbrücku.

Porovnání toto zakládá se z jedné strany na práci, kterou uveřejnil Jordan v časopise „Palaeontografica 1856“, ku které proskoumal více než sedmdesát exemplářů druhu *G. fimbriatus*, z druhé strany pak na jediném svrchu popsaném exempláři od *G. parallelus*.

#### *Gamps. parallelus.*

Tělo skládá se ze srdcovitých, nezřetelně od sebe oddělených článků.

Vnitřní pár tykadel nemá dlouhých ostnů na základním článku.

Zevnější tykadla mají krátký, silný bičík.

První pár noh jest nejkratší.

Šestnácte brv na spodním kraji prostředního plátku ocasního, jež jsou stejně velké.

Zevnější plátek ploutve ocasní jest široký, vejčitý a bez přívěsků na spodním kraji.

#### *Gamps. fimbriatus.*

Tělo ze širokých nízkých, zřetelně od sebe oddělených článků.

Vnitřní pár tykadel má na základním článku velmi dlouhé ostny.

Zevnější tykadla mají tenký, velmi dlouhý bičík.

První pár noh ze všech jest nejdelší.

Čtyři brvy na spodním kraji středního plátku ocasního mnohem jsou větší a tlustší než ostatní.

Zevnější plátek ploutve ocasní jest ouzký a na konci dvěma přívěsky opatřen.

Mohlo by se za to míti, že pro rozličnost nožek a mnohých jiných ústrojí by zasluhoval náš český ráček popsán býti co zvláštní rod; jelikož ale v tvaru ploutve ocasní jakož i ve způsobu zoubkování zadních krajů článků těla souhlasí s rodem *Gampsonichus*, tedy opomenul jsem učiniti z něho nový rod a odložil to na dobu, až objevení se četnějších a lepších otisků nás lépe poučí o tvaru nožek a kusadel.

Co nejdříve budu míti příležitost popsati nový druh rodu *Gampsonichus*, který jsem objevil v uhlí nyřanském, k útvaru permskému náležejícím, při čemž se mi snad poskytne příležitost k utvoření samostatné čeledi *Gampsonichidae*, čítající několik rodů.

### **Lepidoderma Imhoffi, Reuss.**

Palaeontologische Miscellen. (Denkschriften der k. Academie der Wissenschaften, 1856, X. Band, pag. 82. Separatabdruck pag. 11.)

Tab. III. Výk. 22.

Korýš ten, jenž náleží ku hrotnatým rakům do čeledi „Eurypterus“, byl nalezen v černošedých břidlicích, pocházejících ze stropu nad uhlím v Lindheimových dolech u Vlkyše nedaleko Plzně a byl našemu museu darován od pana Imhoffa. Protiotisk, na kterém zachoval se též poslední článek ocasní (Reuss Taf. IV.), byl poslán do dvorské sbírky vídeňské. Podám zde výtah z popisu prof. Reusse a míry dle nového měření v millimetrech na místě v desetinách pařížských palců.

Sploštělý štít hlavy má skoro tvar polokruhu a jest napřed obloukovitě zakrouhlen, po stranách skoro rovný; na zadním kraji, kde splývá s trupem v jedno, jest rovný. Výška obnáší 10 mm. a šířka na zadním kraji 16 mm. V přední půli štítu leží dvě malá ledvinovitá očka. Tělo skládá se ze zřetelných článků a súžuje se znenáhla až na konec; trup skládá se ze 6 článků, které vesměs mají výšku 2 mm. a šířku 17 mm. Boky článků těch prodlužují se na zad v tupé ostny. Ocas skládá se ze 6 článků, z nichž dva první jsou 3 mm. vysoké a 9 mm. široké. Třetí článek jest 5 mm. vysoký a 9 mm. široký. Čtvrtý článek jest 4 mm. vysoký a 6 mm. široký, na zadním kraji vykrojený. Pátý a šestý článek, jež jsou naznačeny pouze na protiotisku, jsou ještě užší než 4. článek. Konečný osten má 10 mm. délky a súžuje se rychle. Na štítu hlavy, jakož na prvních 4 člancích těla lze pomocí zvětšujícího skla spatřiti velmi malé, nestejně zakrouhlené šupinky, jejichžto okraj jest něco vyvýšen a na zad obrácen.

Bližší udání o nálezišti sdělil p. H. Wanke v časopise Lotos 1855, str. 27.

### **Palaranea borassifoliae, Fr.**

Tab. II. Výkr. 7.

Jmeno toto dal jsem otisku pavouka nalezenému na listu rostliny kamenouhelné Flabellaria borassifolia Stbg. (Cordaites borassifolia, Ung.) v článku svém: Zvěřectvo kamenouhelné doby v Živě 1864, str. 233.

Není pravdě podobno, žeby Sternberg neb Corda byli sobě otisku tohoto povšimli, neb se o něm nikde nezmiňují. Teprv prof. Reuss připomíná jej ve svých spisech (Palaeontologische Miscellen a Kurze Uebersicht der geognostischen Verhältnisse Böhmens), nedává však ani popisu ani vyobrazení.

Od té doby byl nalezen krásný, dobře zachovalý otisk pavouka ve vrstvách kamenouhelného útvaru horního Slezska a popsán od prof. F. Römera pod jmenem Protolycosa anthracofila (Neues Jahrbuch für Mineralogie und Geologie, 1866, pag. 136). Tím vyskytla se možnost ku porovnání našeho ač nezřetelného otisku, který přec byl první pravý pavouk, jenž byl objeven v útvaru kamenouhelném.

Tělo má délku 22. mm. a souhlasí co do podoby s Lycosami, které za našich dnů náležejí mezi nejsilnější u nás žijící pavouky. Na předním kraji hrudníhlavy pozorujeme otisky dvou laloků, které bezpochyby odpovídají naduřeným makadlům pavoučích samců.

Hrudníhlava jest 9 mm. dlouhá, 7 mm. široká a na povrchu jejím lze jest pozorovati podobné rýhy, jaké Römer popisuje u pavouka ze Slezska.

Břich jest hruškovitý, 12 mm. dlouhý a má na nejširším místě 10 mm.

Co se týče končetin, tu spatřujeme naznačeny všechny 4 páry noh a ačkoliv jejich konce nejsou dobře zachovány, tož přece můžeme souditi, že byly poměrně krátké a silné, podobně jak to u nyní žijících Lycos spatřujeme.

Od Protolycosy ze Slezska liší se náš otisk značnější velikostí, neb ona má pouze 11 mm. dlouhé tělo; dále pak tlustším břichem a kratšími nohami.

Podrobnější rozdíly tvaru těla, které jsou u Protolycosy překrásně zachovány, nelze porovnávat, protože se z nich na našem exempláři ničeho neudrželo.

### **Cyclophthalmus senior, Corda (Microlabis Sternbergii, Corda).**

Tab. I. Výkr. 1—8. Tab. II. Výkr. 1—6. Tab. III. Výkr. 4.

#### **Předběžné poznámky.**

Od té doby, co slavný hrabě Kaspar Sternberg v červnu 1834 objevil tento druh v Chomli u Radnic, uplynulo více než 30 let a nenašlo se ani v Čechách ani kde jinde na zemi v útvaru kamenouhelném jakých otisků z čeledi štírů čili skorpionů. Teprv 1868, tedy za 34 léta byl opět v červnu nalezen krásný skorpion v Kralupech, později pak tamtéž ještě více úlomků, což vesměs zdokonalilo velice naše vědomosti o podobě tohoto praotce všech skorpionů.

Myslím, že zavděčím se čtenářům našim, sdělím-li jim bližší okolnosti o nalezení této drahocenné skameněliny.

O svatodušních svátcích výše jmenovaného roku učinil jsem výlet do okolí kralupského, bych blíže ohledal náleziště vrstev korycanských. Tu dověděl jsem, že malý kopec v Kralupech, Červená Hůrka zvaný, má býti rozkopán, aby poskytl staveniště pro jakousi továrnu. Tato Červená Hůrka jest výběžek kladenské pánve kamenouhelné i dolovalo se tu před časy na uhlí a později na rudu železnou (Sphaeresiderit), od kteréžto poslednější jest povrch místnosti té vždy červeně barven. V šedých lupcích zpozoroval jsem tu krásné otisky rostlin kamenouhelných. Umínal jsem si, že tu dám nějaký čas pracovati, abych pro sbírky musejní vyčernal toto náleziště, dříve než stavbami nepřístupným se stane. Když byl náš obetný skalník Josef Štáska po čtyři dni tu pracoval, našel krásný exemplář skorpiona, jehožto výkres na tab. I. podávám. Dal jsem pak mnoho neděl na témže místě pracovati, obdržel jsem však jen úlomky, které sice dokazují, že v této krajině byli skorpionci za doby kamenouhelné žádnou vzácností, ale málo přispěly ku dokončení našich vědomostí o druhu tomto.

Ještě roku 1870 dal jsem na jednom ještě nezastaveném místě více než týden pracovati, obdržel jsem však jen nezřetelné úlomky.

V celku se ukázalo, že asi na prostoru 3 □° ležely zbytky více než 30 kusů skorpionů.

Minulého léta nalezl p. Otokar Feistmantel v pánvi plzeňské otisk skorpiona na haldě šachty lazarské u Kamenného Újezda. Ačkoliv se o tomto úlomku nedá zjistiti, zdali náležel k témuž druhu co *Cyclophthalmus senior*, přece vidíme, že jest naděje na odkrytí nových nalezišť skorpionů v Čechách.

### Popis štirů nalezených v Kralupech.

Nejlépe zachovalý exemplář představuje nám skoro celé zvíře, které na hřbetě ležíc obráceno jest ku pozorovateli stranou břišní; schází mu pouze levé klepeto a poslední dva články ocasní. Kusadla a přední část hrudihlavy nelze dobře rozeznati; za to ale jsou hřebínkové plátky výborně zachovány, což tím jest výhodnější, jelikož se jich používá při určování nyní žijících druhů.

#### Rozměry.

Doplňme-li si scházející dva články ocasní dle jiných exemplářů, poznáme, že délka celého těla i s ocasem obnášela 78 mm.; tělo samo zaujímá 38 mm. a plátky břišní mají 12 mm. šířky. Že se zdá tělo širší, má příčinu v tom, že při smačknutí se pošinula ještě část štítků hřbetních k jedné straně.

Tyto rozměry, vzaté od nejlépe zachovalého exempláře, nejsou však ty největší, jakých druh tento dosáhl; neb dle úlomku vyobrazeného na tab. 2. čís. 1. vidíme, že náležel k exempláři, který měl od čela až na konec ocasu 135 mm., tak že předčí v ohledu tomto i Šternbergův exemplář z Chomle.

Nejmenší exemplář z kralupských vyobrazený na tab. 2. vykr. 5. měl délku 62 millim.

#### Tělo.

Čelisti zachovaly se nám pouze na úlomku vyobrazeném na tab. I. čís. 4., kde vidíme ale jen jejich zubaté konce, kdežto základní článek se nezachoval.

Zvětšený výkr. č. 6. podává dobrý pojem o tvaru zubů na vnitřní straně čelistí.

O zevnější podobě hrudihlavy poučují nás kralupské exempláře velmi málo, a též o postavení očí nemohl jsem nic důkladného vypátrati; jen exemplář na tab. I. čís. 3 vyobrazený ukazuje, že obě velké střední oči byly silně ku přednímu kraji pošinuty. O vedlejších očích, které u *Cyclophthalmus* v kruhu jsou rozestaveny, nemohl jsem ničeho spatřiti.

O podobě předního břicha poučuje nás výborně hlavní kralupský exemplář tab. I. výk. 1. Především stávají se nám nápadnými dvě hřebínkovité plošky upevněné na druhém článku břišním. Co do tvaru jsou kratší a vyšší než u nyní žijících druhů. Každý plátek čítá asi 30 zoubků (tab. I. čís. 7.), což souhlasí s nyní

žijícím *Androctonus* — s tímže, ku kterému Corda postavil rod *Cyclophthalmus* dle podobného počtu očí.

Pro značnou šířku zakrývají tyto plátky skoro úplně třetí článek břišní; následující tři články, 4., 5. a 6., jsou skoro stejné, 12 mm. široké,  $4\frac{1}{2}$  mm. vysoké. Na spodním kraji jsou trochu vykrojeny a na každé straně vidíme šikmo položený otvor ústrojů dýchacích.

Sedmý článek jest na spodním konci súžený, neb an má jeho přední kraj 8 mm., měří zadní kraj pouze 6 mm.

Osmý až jedenáctý článek, které vesměs ocasem nazýváme, zachovaly nám spodní svou plochu na hlavním exempláři kralupském; na jiných otiscích (tab. I. výkr. 3. a 5., tab. II. výkr. 1. a 5.) spatřujeme celý ocas od článku 8.—13. se strany zachovalý.

Všechny tyto články byly zdobený zvýšenými lištnami, jejichžto kraje však byly hladké a nikoli zrnité, jak to u mnohých nyní žijících druhů nacházíme.

Mnoho-li těchto lišten bylo, není lze s určitostí poznati; postranní dvě vidíme na tab. II. výkr. 5. dobře zachovalé a tři spodní strany na tab. I. výkr. 1.

V celku muselo jich býti na obvodu každého článku alespoň sedm.

Třináctý článek opatřen byl jedovým ostnem, který byl tak dlouhý jako článek sám. U kořene nebyl opatřen ostnem, jaký u nynějších druhů nalézáme.

Co se týče rozměru jednotlivých článků, pozorujeme, že byl 8. vždy nejkratší a 10. vždy nejdelší. Exemplář vyobrazený na tab. II. výkr. 5. vykazuje následující míry:

| Článek             | Délka mm.                | Šířka mm.      |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| 8. . . . .         | 4 . . . . .              | 4              |
| 9. . . . .         | 5 . . . . .              | $4\frac{1}{2}$ |
| 10. . . . .        | $5\frac{1}{2}$ . . . . . | $4\frac{1}{2}$ |
| 11. . . . .        | 5 . . . . .              | $4\frac{1}{4}$ |
| 12. . . . .        | $4\frac{1}{2}$ . . . . . | 3              |
| 13. i s ostnem . . | 6 . . . . .              | 2              |

#### Končetiny.

Klepetovitá makadla nezachovala se nám na žádném otisku z Kralup dosti dobře a pouze na tab. I. výkr. 2. vidíme, že klepeto bylo podobně utvořeno jako u šternbergského exempláře z Chomle a že palec měl též  $\frac{2}{3}$  délky celého klepetu.

Z nožek zachovaly se nám po levé straně hlavního exempláře kralupského všechny čtyři a souhlasí co do tvaru s oněmi skorpiona z Chomle. Zvláště dobře zachovaly se trny nad kloubními ohyby (tab. I. výkr. 8., tab. II. výkr. 4.); i musíme si jich obzvláště povšimnouti, jelikož dle nich porozumíme domnělému klepetu, vyobrazenému od Cordy pro rod *Microlabis*.

Veškeré otisky kralupské jsou úplně do jedné plochy stlačeny, pročež nemůžeme pojednávat o tvaru jednotlivých částí, jak bysme toho sobě přáli, anobrž jen o obrysech. Na šedé břídlíci jeví se nám otisky co rudohnědé vrstvy chitinové,

které při osychání s kamena oprýskávají a jistě by byly zmizely všechny tyto otisky, kdybych je byl záhy nenapustil slabým roztokem gummy arabské.

Drobnohledné skoumání této vrstvy chitinové objevilo, že se posud zachovala buňkovatost právě tak dokonale, jak to byl Corda pozoroval u exempláře z Chomle.

#### Vejce od *Cyclophthalmus senior*.

Na mnohých kusech šedého lupku, na kterých se otisky skorpionů nalezly, byla pozorována též četná kulatá tělíska v průměru dvou millimetrů a téže rudohnědé barvy, jaké vidíme na otiscích samých. Jest pravdě podobno, že není to nic jiného než vejce skorpiona.

#### O šternberském exempláři skorpiona z Chomle. (*Cyclophthalmus senior*.)

Při studování a porovnávání kralupských skorpionů byl jsem nucen prohlédnouti si důkladně proslulé šternberské exempláře z Chomle a mohu nyní připojiti ku popisům Cordovým některé dodatky. Obrys těla objevil se teprve v pravé podobě, když jsem opatrným udeřením na dlátko odstranil semeno Cykadey, které jej s levé strany krylo; nyní lze dobře poznati, že tvar těla souhlasí jak s hlavním exemplářem kralupským, tak též s nyní žijícími skorpiony, o čemž dle dřívějších výkresů Cordových nikdo patričního pojmu nabyti nemohl.

Čelisti, z nichž levé jest u Cordy o 2 mm. širší kresleno, než v skutku jest, nejsou ze svého položení pošinuty, jak Corda myslil, anobrž oběma schází zevnější půle.

Pochopiti nemohu, jak mohl Corda popsati stranu břišní, když exemplář z Chomle nám jen hřbetní zachoval. Já mohl na hřbetní straně rozeznati zřetelné místo, na kterém velké střední oči upevněny byly a za nimiž se dvě podlouhlé bradavky nacházely.

Zbytků z hřebínkovitých plátek, o kterých se Corda zmiňuje, nemohl jsem se dopátrati.

Na člancích břicha lze jest spatřiti postranní ozdoby, které ale neodpovídají otvorům dýchacích ústrojů, ústících vždy jen na břišní straně.

Na dvou člancích ocasních zachovaly se postranní dvě lištny zcela podobné oněm, jak jsem je u kralupského exempláře popsal.

#### O *Microlabis Sternbergii*, Corda.

Již od mnoha let nedůvěřoval jsem udání Cordovu, že skamenělina tato by měla býti z příbuzenstva oněch malých štírů, které u nás v mechu a mezi starými

papíry nacházíme (Obisium a Chelifer); zvláště tvar klepet, jak jej Corda vykreslil, měl cosi nepřirozeného do sebe.

Když jsem nyní poznovu originál důkladně prohlédl a s úlomky skorpionů v Kralupech nalezenými porovnal, nabyl jsem přesvědčení, že skamenělina r. 1838 u Chomle nalezená a od Cordy pod jmenem *Microlabis Sternbergii* popsaná, jest pouze mladý exemplář skorpiona *Cyclophthalmus senior* bez klepet a bez ocasu.

Abych čtenářům usnadnil porozumění této mé domněnky, zhotovil jsem nový výkres té skameněliny silně zvětšený a umístil vedle něho věrný patisk kresby Cordovy.

Hruď jest čtverhranná a lze na ní pozorovati obě místa, kde velké střední oči umístěny byly. Po levé straně více na zad zachovalo se i několik malých oček, která u rodu *Cyclophthalmus* v kruhu rozestavena jsou. Na předním kraji hrudi vidíme zachovalé kusadlo, které velmi souhlasí s výkresem jednoho kralupského exempláře. Tab. I. čís. 4. a. Na drobnosti těchto kusadel zakládal Corda z části nový rod *Microlabis*; věc se ale vysvětluje tím, že tu zachovaly se pouze špičky kusadel, kdežto u *Cyclophthalmus* vidíme též základní části jejich.

Z břišních článků zachovala se při prvním a druhém strana hřbetní, kterou i částečně při pravé straně 3.—6. článku spatřiti lze.

Podoba celého článku 3.—7. zachovala se nám jen co otisk břišní strany. Zvláště z tvaru článku 7. můžeme poznati, že nám tu jest jednati pouze s tělem skorpiona a čtenář nechť porovná s ním též článek na výkresech kralupských skorpionů tab. I. výkr. 1., tab. II. výkr. 1. β., jakož i skorpiona šternberského tab. III., výkr. 2.

Klepetovitá makadla scházejí úplně, a co Corda vykreslil a popsal co klepeto, není nic než úlomek 1. páru noh, na němž se zachoval trn obyčejně nad kloubním místem skorpionů umístěný. (Porovnej tab. I. výkr. 8., tab. II. výkr. 4.). Nyní se vysvětluje, proč tvar domnělých klepet těch nechtěl souhlasiti s tvarem klepet u *Chelifer* a *Obisium*. Ostrá hrana, kterou popisuje Corda co po středu klepet se táhnoucí, jest tatáž, kterou vidíme na nožkách skorpionů na př. tab. I. výkr. 8. β.

Porovnáme-li zvětšený výkres Cordův tab. II. výkr. 2. a. s týmž místem na mém, s největší bedlivostí zhotoveném výkresu tab. II. výkr. 3. x., poznáme, že prvnější povstal hlavně rozohněnou fantasií Cordovou. Že mimo tento první pár noh napočítal Corda ještě čtyři páry jiné, vysvětluje se tím, že přední okraj špatně zachovalého druhého páru měl za první pár noh, zadní okraj pak téže nohy za druhý pár.

Tyto opravy týkající se rodu *Microlabis* staly se možnými teprv nyní po objevení se četných skorpionů kralupských a po odstranění semena cikadeového z exempláře šternberského a nemůžeme z té příčiny pokládati Cordovi za velkou to vinu, že v tomto případě utvořil zbytečně nový rod.












2.



$\beta$



2 a.



$\gamma$

$\alpha$

3.



4.






7.




5.







Taf. IV.



*Gampsonychus parallelus*, fr.





# Vysvětlivky tabulí

## ku zvířeně kamenouhelného útvaru v Čechách.

---

### Tab. I.

1. **Cyclophthalmus senior.** Celý exemplář z Kralup, břišní strana se zřetelně zachovalými hřebínkovitými ploškami.
2. **Cyclophthalmus senior.** Klepetovitá makadla a úlomky noh, při nichž ze viděti dlouhé ostny kloubní; přiroz. velikost. Kralupy.
3. **Cyclophthalmus senior.** Neúplný exemplář, na němž jest viděti v pravo postavení středních očí a ocas se strany s jedovým bodcem na posledním článku; přirozená velikost. Kralupy.
4. **Cyclophthalmus senior.** Úlomky nožek (zvětšených u č. 8.) a čelist (zvětšená při č. 6.); přiroz. velikost. Kralupy.
5. **Cyclophthalmus senior.** Břich ze spodu a ocas se strany s jedovým ostnem; přiroz. velikost. Kralupy.
6. Zvětšená čelist (z výkresu 4).
7. Zvětšená ploška hřebínková (z výkresu 1).
8. Zvětšené nožky (z výkresu 4).

### Tab. II.

1. **Cyclophthalmus senior.** Úlomek největšího v Kralupech nalezeného exempláře v přirozené velikosti; část břicha ze spodu, ocas s ostnem jedovým ze strany.
2. **Cyclophthalmus senior.** (*Microlabis Sternbergii* Corda). Neúplný exemplář bez klepetových makadel a bez ocasu (kopie dle Cordy); v přiroz. velikosti. Chomle.
  2. a) Zvětšený výkres domnělého klepetu téhož exempláře dle Cordy.
3. Tentýž exemplář z Chomle; znova dle přírody v dvojnásobném zvětšení kreslený (Od A. Friče). Osten kloubní prvního páru noh (x) napodobňuje zdánlivé klepítko.
4. **Cyclophthalmus senior.** Dvě nožky se zachovalými ostny kloubními, ivakráte zvětšené; z Kralup.
5. **Cyclophthalmus senior.** Ocas ze strany okazuje podélné lištny. Z Kralup.
7. **Palaranea borassifoliae.** Nezřetelný otisk pavouka, který se nalézá na istu Flabellarie z Radnic; v přirozené velikosti.

### Tab. III.

*Fig. 1. Gampsonychus paralellus.* Fr. z Dibří u Berouna, trojnásobně zvětšený.

*Fig. 2. Lepidoderma Imhoffi.* Z Nyřan u Plzně. Nově kreslené obrysy dle originálu v českém Museu.

*Fig. 3. Acridites priscus.* Ze Strádonic u Berouna. Kopie dle André.

*Fig. 4. Cyclophthalmus senior.* Od Sternberga nalezený a od Cordy popsán exemplář z Chomle. Po odstranění plodu Cycadei, který jej částečně zakrýval, znova kreslen (od A. Friče) v přirozené velikosti.

*Fig. 5. Xyloryctes planus.* Chodby vrtavého hmyzu na povrchu Sigillarie z Nyřan, v přirozené velikosti.

*Fig. 6. Xyloryctes septarius.* Domnělé chodby hmyzu na listu Flabellarie z Radnic. Nová kresba v přirozené velikosti.

### Tab. IV.

**Gampsonychus paralellus.** Z Dibří; silně zvětšený.



# Uhelná ložiska

u

**Malých Přílep, na Lísku, u Stílce, Holoubkova,  
Mirešova a u Letkova.**

Sepsal

**KAREL FEISTMANTEL.**



## Uhelná ložiska

**u Přílepu, Lísku, Stílce, Holoubkova, Mirešova a Letkova.**

Kamenouhelné vrstvy, jež v západní části Čech Rakovnicko-Slánskou a Plzeňskou pánev zaujímají a jež od Kralup, na levém břehu Vltavy přes Kladno, Rakovník až skoro k Plasům, pak po krátké přestávce dále od Káznova přes Plzeň, Stankov až k Merklínu zasahají a dosti rozsáhlé prostory pokrývají, provázeny jsou skoro rovnoběžně se severovýchodní hranicí v rozličné 6000 až 12000 sáhů obnášející vzdálenosti, jednotlivými oddíly uložení kamenouhelného, jež v nížádném spojení vespolek se nenalézají, při pohledu na polohu a rozšíření českého kamenouhelného uložení na západě co k němu náležející se osvědčují, ale od nejhlavnějších jeho skupenin, nejhlavněji nepatrnou rozsáhlostí každé jednotlivé, nápadně se liší. — Ohledem na tuto nepatrnou rozsáhlost souhlasí jen s pánvičkami, v okolí Radnickém uloženými, jež ale menšími vzdálenostmi od sebe odděleny jsou a dosti blízko okolo většího, z pánvičky Břasské, Němčovické a Vejvanovské sestávajícího uložení rozestaveny, s tímto skupeninou tvoří, jež se zjevně co k sobě náležející osvědčuje, kdežto tomu při dříve naznačených jednotlivých částech uhelného útvaru v nížádném ohledu tak není.

Tyto oddělené části uložení uhelného jsou následující:

- I. Pánvička uhelná u *Přílepu*, nedaleko Lodenic.
- II. Pánvička uhelná na *Lísku*, mezi vesnicemi Hýskovem, Zlejcinou, Strádonicemi a Hudlicemi, severozápadně od Berouna.
- III. Pánvička uhelná u *Stílce*, západně od Žebráku.
- IV. Pánvička u *Holoubkova*, bezprostředně severně a západně od vesnice stejného jména.
- V. Pánvička uhelná u *Mirešova*, tato rozprostírá se jižně od města Rokycan, u vesnice Mirešova.
- VI. Pánvička u *Letkova*; západně od Rokycan, mezi vesnicemi Ejpovicemi, Timákovem a Letkovem.

Jednotlivé tyto pánvičky leží skoro v jedné čáře mezi Prahou a Plzní za sebou, která má směr od severovýchodu k jihozápadu. Z tohoto směru jsou jen více na západ uložené pánvičky u Holoubkova a Letkova něco na sever vyšínuty. — Nejvýchodnější uložená pánvička jest u Přílepu, nejzápadnější u Letkova. Západně

od Letkova vystupující vrstvy uhelného útvaru náleží již rozsáhlému uložení Plzeňskému.

Vzdálenost pánvičky Lísecké od Přílepské obnáší v rovné čáře něco nad 2000 sáhů; vzdálenost pánvičky Stilecké od Lísecké okolo 8000 sáhů; pánvičky Holoubkovské od Stilecké taktéž okolo 8000 sáhů; pánvičky Mirešovské od Holoubkovské asi 4000 sáhů a vzdálenost pánvičky Letkovské od Holoubkovské nad 7000 sáhů, tak že jest nejvýhodněji uložená pánvička u Přílep od oné u Letkova asi 28000 sáhů vzdálena.

Od Mirešova jest Letkovská pánvička asi 6000 sáhů vzdálena, ale v severozápadním směru, kdežto Holoubkovská pánvička severovýchodně od Mirešova uložena jest, tak že tyto tři pánvičky nejsou uloženy v rovné čáře, nýbrž tvoří něco nestejnostranný trojec, jehož úhel, nejdelší straně oproti ležící, k jihu směřuje a vesničkou Mirešovem tvořen jest, která jediná leží v čáře, ostatními pánvičkami u Přílep, Lísku a Stilce položené.

Veškerých šest pánviček uloženo jest na vrstvách útvaru silurského, a sice z většího dílu na křemencích a křemenitých břidlech, dílem též na diabasech (zelenokamech) étage D Barrandeovy, kdežto hlavní uložení českého uložení uhelného na západě na břidlech étage B, dílem na žule spočívá. — Jen západní pánvičky u Mirešova a Letkova uloženy jsou již dílem na břidlech étage B.

S osou podélní pánve silurské tvoří totiž směr, v němž tyto oddělené pánvičky uloženy jsou, úhel, tak že nejvýhodnější připadají severní polovici křemencového uložení, západní pak v jižní polovici, dílem již mimo ni.

Nepatrnou touto rozsáhlostí nemají jednotlivé tyto pánvičky žádného zjevného vlivu na tvoření se povrchu a na tvar povrchu v okolí; vyplnily jen ve vrstvách, na nichž spočívají, se nalézající vřazy a kotliny a vyrovnaly je; samy jsou jen málo proryty, takže jen zřídka jest možno pozorovati jich rozčlenění a vlastnosti jich hornin.

Jen v Lísecké pánvi lze v jednotlivých výmelech, jež ještě posud trvajícím vymíláním se prohlubují, zkoumati blíže uložení vrstev.

V ostatních jest poznání sledu a vlastností vrstev možno jen stávajícími doly neb lomy, z nichžto ale prvnější pro svůj sešlý stav většího dílu neschůdné jsou a takto jen na jednotlivých místech pozorování dovolují, z něhož se sice dá utvořití pojem sledu vrstev, ale zřídka, neb mnohem nedokonaleji o poměrech vrstev těchto v rozšíření jejich po celé rozsáhlosti pánve.

Před tím, než uhelné sloje, ve vrstvách jednotlivých těchto pánviček známy byly, neměly pro svou nepatrnou rozsáhlost i na nejbližší okolí, ani nápadným utvořením povrchu, ani rozšířenou změnou půdy značného vlivu. Jen později započaté dolování na uhlí způsobilo tehdejší způsobem dolování, totiž raziti mnoho malých šachet vedle sebe, nevyhnutelné rozrytí polností a tím na obmezené prostře jednotlivých pánviček uhelných změnu v zevnější povaze krajiny, již ještě podnes i tam, kde dolování k úplnému zaniknutí se blíží, jako u Přílep a u Stilce, z neplodných hald a lomů, jež se co také již z dálky osvědčují, poznati lze, jež ale tam, kde jako u Mirešova dolování teprve víc a více vývinu svého se dodělává, v očividně rostoucím pokračování se nalézá.

Jak lze z toho, co o dolování na jednotlivých těchto pánvích známo jest, soudit, počalo ve velmi rozličném čase.

Nejdříve bylo uhlí v pánvičce Přílepské poznáno. Neb v listu, jenž se nalézá v Pražském konsistorialním archivu, na nějž upozornil český dějepisec Frant. Palacký p. prof. Krejčího, jenž jej v celém obsahu svém uveřejnil v „časopise Musea království českého 1865,“ uděluje tehdejší nejvyšší purkrabí Pražský, Zdeněk ze Šternberka, Václavu Henuku z Bochova, Mikuláši Dalekodomovi a Hanušovi, zedníku z Malé strany, na žádost jejich povolení k dolování na uhlí u Přílep a u Železné nedaleko Berouna s tou ale výminkou, by lidé z Železné tím poškození nebyli a by spláceli potomkům jeho plný desátek nalezeného a t. d. Povolení toto jest dáno a psáno na hradě Pražském léta od narození syna božského 1463 dne 6. května.

V témž archivu nalézá se podobné povolení na dobývání uhlí u Přílep z roku 1463, v úterý den S. Kříže nalezení (14. září). Počátky dolování na uhlí Přílep jsou tedy alespoň 400 roků známy.

Bylo-li i na počátku tehdejšího dolování a v brzo následující době množství vyráběného uhlí, při ještě tenkrátě obmezeném upotřebení jeho, zajisté velmi skromné, jest přece lehce pochopitelno, že podnes ze slojí u Přílep uložených jen pozůdkých zbytků zůstalo a celé zásoby, až na některé pilíře, jež nepravděpodobností dolování státi zůstaly, vybrány jsou. V tyto zbytky dělí se nyní více majitelů většími neb menšími podíly a udržují nepatrné dolování buď k vlastní potřebě, k udržování malého parního mlýnu, jenž zde postaven jest, aneb k zasílání do nejbližšího okolí.

Mnohem později setkáváme se se zprávami o započatí dolování u Stílce.

V pojednáních soukromé společnosti v Čechách nadepsaných: „Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte und der Naturgeschichte, zum Druck befördert von Ignaz Edlen von Born, Herrn auf Altgedlitzsch, Jochau etc., I. Bd. mit VIII. Kupfertafeln, Prag 1775, im Verlage der Gerlischen Buchhandlung“ vysvitá z jednoho listu p. hraběte z K. . . panu Bornovi, v němž mu o některých zájmovostech nerostopisných zprávu dává, na straně 250—251 následující:

„Na prostore mezi Stitzemi a Serovitzemi odkryta byla asi před 20 roky šťastnou náhodou uhelná sloj. Později byla sloj tato i u Hořovic dostihnuta. Nejsvrchnější uložení pod ornicí a pískovcem, pod touto se nalézajícím, sestává z uhlí, na němž častěji rostlinné otisky spatřiti lze. Sloj jest mocná 6 láter ale pod ní leží pak **lupek**. Rozprostírá se v značné délce, tak že již na 115 láter se šíří. Doluje se malými šachtami a štolami. Horníci rozumí výtečně čistému vybírání uhlí, tak že nenechávají ani pilířů státi, nýbrž na místo nich strop trámy a prkny podepírají. Majitel Hořovských uhelných dolů těží z nich všelikerým způsobem, upotřebuje uhlí v pivovárnu, v sklenné huti, v cihelně a t. d.

Ačkoliv v zprávě této o Žebráku neb Stílci nižádné zmínky se nečiní, jest přece patrné, že se nálezem uhlí na prostore mezi Stitzemi a Serovitzemi a u Hořovic vyznačuje jen uložení u Žebráku mezi Zdicemi a Cerhovicemi, jediné to



známé přicházení vrstev uhelných v krajině této, a tak by padal počátek dolování na uhlí v této pánvi asi do roku 1755 a bylo by tedy as 110 roků známo.

Za nynější doby jest dolování zcela opomenuto, a nezdá se, že by byly ještě pozůstaly zbytky uhlí, jimiž by se další dolování vyplácelo. Opětovné pokusy, jež se v novější době k nalezení dolování hodných slojí, hlavně v severní části, děly, zůstaly bez povzbuzujících výsledků. Jen v nejjihnější části vyrábí se ještě sem tam ze starých pilřů něco uhlí.

Na Lísku mělo uhlí, jak se vypravuje, roku 1810 o Hromnicích být nalezeno náhodou v malé pánvičce, jež co oddělená na jižním svahu hřebenu uložena byla, a sice tím, že na holi, jež v zemi zaražena byla, zůstala vězet zvláštní černá půda, což zavdalo příčinu k dalšímu bádání a zkoumání této půdy a k nalezení uložení uhelného. Započaté dolování obmezovalo se z počátku jen na sloj, na jižním svahu uloženou a teprve později přešlo i na severní svah, ve vlastní, mnohem rozsáhlejší Líseckou pánev, kde až podnes stává a ještě v držení dědiců prvního podnikatele na Lísku se nalézá. Děly se sice později i od jiných podnikatelů v severnější části pánve jako u Zlejciny blíže Strádonic a též nad Hýskovem pokusy dolování, ale všude zůstaly bez výsledku, hlavně pro nepotřebnost dostíženého uhlí a tak jsou tyto dnešního dne všechny opuštěny a zanedbány a jen osamělé haldy a sem tam sesutá štola značí pokusy marného dolování. Dřím děly se, jako u Strádonic, pokusy ty na takých místech, kde vychází jen hlubší, pod slojí uložené vrstvy pískovcové, takže byly hned z počátku bez naděje na nějaké uspokojující výsledky.

O mnoho později dokázána sloj uhelná u Mirešova. Ještě roku 1842 čítal pan prof. Zippe v pojednání svém „Kamené uhlí, cena, důležitost jeho vůbec a rozšíření v Čechách“ pánvičku sv.-Jakubskou na panství Mirešovském mezi taková uložení, v kterých tehdejšího času ještě uhlí nalezeno nebylo. Ale již po několika rocích daly se pokusy k nalezení uhelné sloje v pánvi Mirešovské. — Těmito nalezena roku 1855–56 sloj uhelná na jižním konci pánve, blíže Dobřiva, a sice v hloubi 6 sáhů. Jelikož ale sloj tato byla slabá a špatná, prodali první podnikatelé, již z Vejvanova prý pocházeli, svůj podnik jinému dolování milovnému, pozdějšímu majiteli největší části Mirešovských dolů, p. Jahnlovi, jenž více v severní části novou šachtou v jedenáctém sáhu dostihl uhelnou sloj větší mocnosti a lepší jakosti, a takto nynější, dosti čilý dolování v pánvi Mirešovské založil. Dolování, z počátku jen na východní část pánve obmezené, postupovalo znenáhla dále, ale teprv roku 1866 dokázáno rozprostírání se uhelné sloje až do západního křídla pánve u Holubšho Koutu a též zde dolování započato.

Ještě několik roků později nalezena byla slabá sloj u Letkova několika majetníky z vesnice Kyšice u Rokycan, již zde r. 1859 a 1860 hledati počali. Právě dolování ale nedělo se dlouho a vyvinulo se poněkud teprve v posledních letech, takže se zde dobývá uhlí pro potřebu nejbližšího okolí.

### I. Pánvička Přílepská.

O této pánvičce zmiňuje se již prof. Zippe v své „Uebersicht der Gebirgsformationen in Böhmen,“ Praha roku 1831 u Bohumila Haase synů, bez bližšího,

speciálního popsání, taktéž v pojednání svém z roku 1842: „Die Steinkohlen, ihr Werth und ihre Verbreitung in Böhmen.“

Obšírněji pojednává p. prof. Krejčí o ní v „Živě 1853 I.“ v článku o „Kameném a hnědém uhlí“. — Mimo uložení sloje uhelné a vlastnosti vrstev uvádí se zde též hojně objevování se Stigmarie a kapradin a též se činí zmínka o hojných přerušeniích vrstev.

Roku 1854 uveřejnil prof. dr. A. E. Reuss pojednání: „Kurze Uebersicht der geognostischen Verhältnisse Böhmens“, v němž ale se o Přílepech jen mimochodem zmiňuje, beze všeho bližšího vysvětlování.

Konečně nachází se v ročníku geologického říšského ústavu z r. 1861 a 1862 sv. XII. na stránce 519. a t. d. velké pojednání Lipolda: „Das Steinkohlengebiet im nordwestlichen Theile des Prager Kreises in Böhmen“, v němž pánvička Přílepská trochu blíže pojednána jest. V pojednání tomto udána jest výška vesnice „Malé Přílepy“ na 205', výška východně odtud v údolí ležící vesnice Chrastenice na Kačickém potoce na 136'6 sáhu, a z otisků rostlinných uvedeny *Stigmara ficoides* Bgt., *Calamites communis* Ettgh., a *Cordaite borassifolia* Ung. Zároveň činí se zmínka o třech slojích mocnosti 6—7 a 2 stop, jež ve východní části pánve této nad sebou uloženy jsou.

Pánev Přílepská leží v rovné čáře asi půl hodiny severo-západně od Lodenic a asi dvakrát tak daleko severovýchodně od Berouna na planině, jež západně od potoka Kačického k Lodenicům tekoucího vystupuje a na níž se nalézají vesnice Lhotka, Železná a Malé Přílepy. Slabý potok teče od Železné východním směrem a vlévá se nad Chrastenicemi do potoka Kačického. S údolíčkem, tímto způsobem tvořeným, běží více severněji v témž východním směru jiné údolí skoro rovnoběžně, na jehož otvoru v Kačický potok vesnice Nenačovice leží. Na hřebenu, jenž takto oběma údolími povstává, od východu k západu směr svůj bere a v pláň u Železné a Lhotky se ztrácí, stojí vesnice Malé-Přílepy a bezprostředně na její jižní straně prostírá se až k Železenskému potoku rozsáhlá pánev, jež na východní a západní straně ohraničena jest pahorky, sestávajícími z křemitých břidlic Barrandeova pásma D.

V tuto pánev jest vloženo Přílepské uhelné ložisko, jehož povrch se ku potoku sklání, tedy jižně nakloněn jest. Nejsevernější hranice táhne se u vesnice Přílep, jejíž nejjižnější domy ještě stojí na pokraji pánve uhelné, táhne se na východ jen málo přes vesnické hranice, pak se obrací jižně až k potoku, překročuje jej na jistou vzdálenost až do svahu, na pravém břehu potoka vystupujícího, může se pak kousek cesty k západu sledovati, a jde pak nejprve v severním, pak v severovýchodním směru až zas skoro k výši vesnice. — Dále pak překračuje západně od vesnice ležící pahorek Chrast, jehož nejjižnější nejvyšší bod ale není zaujat vrstvami uhelnými, nýbrž z lavic křemenců se skládá, táhne se na západním, k Železné nakloněném svahu tohoto pahorku opět k Železenskému potoku, tam pak se obrací v nepravidelném kruhu k severu a východu a vrací se v tomto směru opět k vesnici Přílepy.

Podoba pánvičky jest tedy podlouhlá podle směru od východu k západu, jest na východní konci na jih silně rozšířena a při přechodu přes pahorek Chrast

zúžena. Severní hranice tvoří skorem rovnou čáru, jež počínajíc u Přílep až k západnímu konci pánve podle cesty z Přílep na Železnou vedoucí sledována býti může a jež se na nízký, západně od vesnice se táhnoucí hřeben přikládá. Jižní hranice na to tvoří křivou, na koncích více méně vystupující, u prostřed naproti vesnici Přílepům vtažený oblouk tvořící čáru.

Délka pánve této může se na 800 sáhů páčiti, šířka její však jest velmi rozličná, a může ve východní části více než 300, v západní sotva 200 a v zúžení na pahorku Chrastu méně než 100 sáhů obnáseti.

Největší výška jest blíže pahorku Chrastu. z něhož jen můžeme pánev celou přehlednouti. Odtud se sklání dosti příkře západně k Železné a zaujímá jen něco menší výšku v směru k Přílepům. Vesnice tato stojí dle udání geolog. říšsk. ústavu ve výšce 1230 stop; dle prof. Kořistky (hypsometrické práce v okolí Pražském 1858) 1206 stop (nejvyšší bod silnice ve vsi). Tak vysoko leží tedy též pánev v severní části, ale sklání se též dosti příkře mimo na západ též na jih, tak že se nalézá na Železenském potoce zajisté 40 sáhů hlouběji pod vesnicí Přílepy.

Hranice a vrstvy, na nichž spočívá, tvoří všude křemence a břidle pásma Barrandeva D. Všude vycházejí tyto vrstvy na pokrajích pánve na den a sice v hřebenu, jenž se táhne od Přílep k Železné, na jehož západním svahu šachticemi pokusnými dostiženy a vyveženy byly; v rokli, jež táhne vesnicí Přílepy a k Nenačovicům se sklání; pak na pahorcích, pánev západně a východně obklopujících, v nichž ale z většího dílu křemencové vrstvy se nacházejí, kdežto na prvnějších místech slídnaté břidle převládají. V jižním ohraničení spatřiti lze silurské vrstvy buď na břehu potoka vycházejí, neb je nacházíme na haldách starých šachtic vyveženy.

Křemence a břidle směřují od severovýchodu k jihozápadu asi v hod. 3—15, a zapadají k jihovýchodu, ale pod rozličným úhlem; tak na pahorku Chrast pod úhlem 35 stupňů; o mnoho příkřeji až pod 60 stupni v rokli, jež se táhne vesnicí.

Vrstvy ale, jež skládají útvar kamenouhelný, mají se v tomto ohledu jinak. Jest to sice jen malý počet bodů, kde vycházejí na den, jelikož větší zářezy tvořením se údolí a roklí scházejí a jen na některých místech, kde vrstvy výchozí tvoří aneb lomy otevřeny jsou, jest pozorování možné. Ale i tento malý počet podává již pojem o uložení vrstev uhelné pánve.

V části, jež se západně k Železné sklání, byly blízko u pahorku Chrastu na slojích pískovcových lomy založeny, z nichž se dá poznat směr podle hodiny 21 s úklonem 15 stupňů. V mělkém vodomeli, jenž se táhne na východním svahu pahorku Chrastu v údolí, vycházejí poblíž hranice pánve šedo-modré lupky, jež ukazují směr podle hod. 24, a při tom východně pod 15 stupni zapadají, tedy protivně vrstvám pískovcovým na západním svahu pahorku Chrastu.

Skoro severně od těchto vycházejících lupků nalézá se, blízko u silnice, kousek v směru od Přílep k Železné na severní straně silnice, výchozí uhelné sloje, jež zde v mělkém příkopě na den vychází a visutým pokryta jest, jež poblíž uhlí z mocné pískovcové vrstvy sestává, nad níž běložluté a šedé, dílem brouskovité lupky uloženy jsou. Celé souvrství má zde směr podlé hod. 22, a zapadá úklonem 15 stupňů k jiho-západu. Na východním kraji pánve konečně ukazují

v malé strži vrstvy hrubozrné, pískovité-hlinité horniny mírné zapadání k severo-západu, jež odpovídá tedy směr k severo-východu.

Již z těchto málo bodů, jež se na dni pozorovati mohou, vysvitá uložení vrstev uhelných, jež se liší zcela od vrstev silurských, na nichž prvnější spočívají. Mezi sebou pak souhlasí vrstvy uhelné tím, že mají jeden směr, s malými úchylkami, od severozápadu k jihovýchodu. Zapadání ale stává se brzo k západu, brzo k východu, a sice v západní části k západu, na západní straně lože, jež se pod Přílepy rozprostírá, k východu, na východní straně téže k západu, a na severní straně k jihozápadu, tak že vrstvy zde zapadají vůbec od okrajů pánve k hloubi; vrstvy, jež pánev tuto skládají, jsou dílem lupky dílem pískovce, v něž vložena jest uhelná sloj.

V šachtice, nedaleko od východního svahu pahorku Chrastu zaražené, pro-  
raženy tyto vrstvy v následujícím pořádku:

1. Vrstva ornice a hlíny, mocná . . . . . — sáh 3 stopy
2. kaolinický pískovec v mocnosti . . . . . 1 " — "
3. modrošedé a žlutavé, pevné lupky, v nichž vložena jest  
v slabých vrstvičkách pevnější tmavější hornina brous-  
kovitá . . . . . 5 " — "
4. vrstva dosti pevného, stejnozrného, světlo-bělo-šedého  
pískovce, s bělým kaolinickým vazem (horníci nazývají  
ji „Košile“) . . . . . — " 2-2½ "
5. tmavé, pevné lupky co bezprostřední strop uhelné sloje — " 3-6 palců
6. konečně sloj uhelná asi . . . . . 1 " 3 stopy

Na tomto místě byla tedy sloj v hloubce 7 sáhů pod povrchem dostižena.

Jinými šachtami v téže části byla sloj v hloubi 8—9—10 sáhů dostižena.


Na sever odtud k Přílepsko-Železenské silnici přišlo se v některých šachtách již v 4 sáhu na uhlí, které, jako v dříve zmíněném příkopě vedle silnice na den vycházejí. Na východ ale, kde pak i lože Přílepské nejhlubší svou polohu má, musili se šachty hloubit až na 18 a 20 sáhů, by uhelná sloj odkryta býti mohla. Mimo tuto nejhlubší část nebyly ve východním směru vzdor vystupujícímu povrchu šachty hlouběji, místy i méně hluboko až na sloj raženy, což svědčí o vystupování uhelné sloje u východním směru. Z toho vysvitá, že uhelná sloj v prohlubíně, jež od Přílep k potoku se táhne, ložiskovitě vložena jest a sice na severním okraji zapadáním k jihu, na západním kraji k východu a na východním úpadem k západu a že nejhlubší místa padají v pánev, jež se běře od Přílep směrem jiho-západním v dół.

Na přechodu pánve přes pahorek Chrast jsou šachty až na uhlí mělčí; uhelná hlec vystupuje zde tedy, odpovídajíc tvaru povrchu, ale sklání se pak v části pánvi, jež pokračuje na západním svahu pahorku dále, dosti silně, jelikož vzdor sklánějícímu se povrchu šachty do hloubi 7 až 15 sáhů zaraženy býti musely, by byla sloj dostižena. Ale i zde jest ke krajům mělčí, a lze jí dosáti v menší hloubi.

V podálné ose pánve od východu k západu má tedy sloj uhelná v celku vlnité uložení jelikož od východního okraje k západu zapadá, největší hloubi do-


sáhne, k pahorku Chrastu opět vystupuje, přes něj se přehýbá a pak opět k západu se kloní. (Fig. I.)

Fig. I.



V směru ale od severu na jih, na příč přes pánev, jest pánvovitě uložena, tak že leží severní kraj o mnoho výše nežli jižní, tudíž, v celku pozorována, v tomto směru dosti silně k jihu nakloněna jest. (Fig. II.)

Fig. II.



V části více na západ ležící rozprostírá se uhelná sloj skoro přes celou šíři pánve, od severního kraje až k jižnímu. Ve východní části ale jest od jižního ohraňování dosti vzdálena a vrstvy, jež se pod slojí nalézají, sahají dále nežli ona sama. Nalézáme od potoku k Přílepům vystupující vysoko ve svahu visuté uhelné sloje vycházející na den.

Uložení ale uhelné sloje není veskrze bez přerušení, v jednoduché čáře. Naopak, dosti často jest sloj přetrhána, přerušena a přeházena, dílem přfkře postavena. Ačkoliv jest jen několik míst přístupných, kde takové přerušení pozorovati lze a pozorování v dolech, jež z většího díla nepřístupny jsou a jen krátké prostory prorážejí, nestačí k bližšímu poznání převratů v uhelné sloji, přece nasvědčuje mimo zprávy horníků, již ještě z dřívějších časů v těchto dolech se vyznaží, již porovnání rozličných hloubí, často sobě dosti blízkých šachtic dosti zjevně tomu, že se zde nacházejí dosti značné převraty a přerušení, jelikož se rozdílly v hloubích obyčejným úklonem sloje a vzdáleností od povrchu šachtic vysvětliti nedají.


Nemalé přehození ostatně spatřiti lze na sloji samé na jednom výchozí. Na jižní straně cesty, jež vede z Přílep do Železné, jsou asi v místech, kde severně

od cesty dříve zmíněné výchozí se nalézají, vrstvy najednou v skoro kolmé, asi 2 sáhy vysoké stěně vyhrabány, pod kterou a vedle které pak vrstvy pravidelným úklonem k jihu se sklánějí.

V této stěně vychází uhelná sloj na den a sice jen asi v hloubi 6 stop pod ornici. Tímto vykopáním jest vedlé stěny též kus sloje s úklonem k jihu odkryt, na kterém jest vidět, jak jest sloj značně ohnuta a jak se silným ohybem do hloubi kloní. (Fig. III.)

Časté střídání se v sloj uhelnou vložených hlinitých lupků s vrstvami uhelnými, podporuje mnoho poznání skroucených vrstev sloje uhelné, jež z počátečního úklonu 12–15 stupňů pojednou v úklon 60–80 stupňů přecházejí a při tom nejroztlačněji přetrhány a zohýbány jsou. V krátké vzdálenosti pak na jih nachází se sloj, vzdor tomu že i pánev na povrchu stejně se sklání, již v hloubi 12 sáhů, což může být docíleno dalším značným úpadem sloje uhelné aneb značnými přesmyky. Přerušení uhelné sloje na naznačeném místě sestává tedy z ohybu sloje, čím přichází po jednou a prudce ve větší hloubi, anižby snad byla souvislost sloje zrušena aneb snad obě části, jež v nestejně hloubi leží, byly podle nějaké plochy v sebe pošinuty. Taková místa, na kterých by uhelná sloj podle vržení a skoků přehozena byla, nelze nikde vidět v oboru této pánve na den vycházet. Že ale takových vskutku stává, učí zkušenosti, při odkrývání sloje nabyté.

Fig III.



Mocnost uhlí může se průměrně na 9 stop udati, ačkoliv v některých šachtách brzo větší, brzo menší prý pozorována byla a sice mezi 6–12 stopami. Větší mocnost lze vysvětliti na blízku některých šachtic měřením diagonaly na místech příkře zapadajících, ačkoliv větší mocnost místy též naduřením a nadržetím sloje při přerušení povstati mohla. Taktéž není dostatečně zjištěno, jestli sloj sem tam vskutku v menší mocnosti, než obyčejně vyvinuta byla, aneb jestli to bylo jen horníky, již cení jen část odkrývání hodnou, následkem zhoršení stropu a zpodá, tak udáno.

Tolik ale se může s jistotou přijmouti, že stálého ubývání neb přibývání sloje v jistém směru nestává a sloj uhelná v celé své rozsáhlosti, až na některé výminky, dosti stejnotvárně uložena byla.

Však dle udání starých horníků měly ve východní části pánve býti dvě, ano i tři sloje nad sebou uloženy. V pojednáních geologického říšského ústavu udává se mocnost těchto tří slojí na 6–7 a na 2 stopy, ale o mocnosti opuk, jednotlivé sloje dělicích, není nic udáno. — Za nynější doby nedá se pravost toho více ujistiti, a též se nedá dokázat, jestli tyto tři sloje mají býti považovány co samostatné aneb zdali povstaly na východním kraji jen rozštěpením v ostatní části pánve uložené jedné sloje, znenáhly přibýváním mocnosti opuk.

Jakost uhlí jest jen méně dobrá, nemajíce ani zřetele k tomu, že se nyní dobývá jen ze starých, pozůstalých piliřů, v kterých již dlouholetým zvětráním a stálou proměnou mnoho utrpělo. Neb i v čistém stavu zmenšuje se čistota uhlí tím, že v sloji jest mnoho vrstviček lupků a hořláků vloženo, s kterými se

střídají ustavičně tenké vrstvy čistějšího, lesklého uhlí, jež se v kostkách láme. V sloji jest horní část lepší jakosti než spodní, kde více hořláků a hlinitých, 1 až 1½ palce mocných vrstev vloženo jest, tak že takové sloje se zde, jako v okolí Radnickém, „Kanafas“ nazývají.

Uhlí se ostatně dá jen k topení upotřebit; vlastnost, v ohni se spékati, totiž vlastnost koksování mu nepřipadá. Za dnešních dob jest množství uhlí, jež se z jednotlivých šachet vydobývá, jen nepatrné a nejisté, jelikož se při rozptýlení sloje nesčíslnými přesmyky, a při všeobecném již rozrytí v celém rozšíření a tím, že sloj na mnohých místech zapálena jest, šachtou započatému dolování brzo překážky vstříc kladou, takže se musí od toho ustát.

Kde oheň horní již uhasl, nacházíme uhlí v stavu zuhelnělém, koksovitém. Na výchozí, jakož i dále na přerušených místech jest uhlí špatnější, obyčejně měkce drobitvé.

Nad uhlím uložené vrstvy jsou, jak jsme se již dříve zmínili, nejbližší nad slojí samou vrstva tmavého listnatého, na uhlí bohatého lupku, jež skoro v ni přechází a nad touto vrstva pískovce, asi 2—2½ stopy mocná, jež se hlavně tím vyznamenává, že zůstává v celém rozšíření vzhledem k mocnosti jak i k složení stejnou a že se všude nalézá nad slojí uhelnou. Pískovec v této vrstvě **obsažený** jest vždy světlé, žlutavé neb šedo-bělé barvy a obsahuje mnoho otisků rostlinných.

Má mnoho podoby s pískovci, jež tvoří v Radnické pánvi též stálou slabou vrstvu nad spodní slojí uhelnou. Nad těmito pískovci následují pak lupky, jež jsou z většího dílu pevné, nezřídka písčité, brzo žlutavé, brzo modro-šedě zbarvené a často tenkými vrstvičkami temnějších, pevných a hustých proloženy, čímž obdržují vzhled a vlastnost brouskových lupků, jež z pánve Radnické známy jsou a nad druhou slojí stále se objevují. Upomínají na tyto ještě tím, že v nich přicházejí velmi často malé neznalé úlomky zrušených rostlin mnohdy hojně vedle sebe, druh fossilního steliva, z nichž ale jen velmi zřídka možno poznati druh, ku kterému patřily. Souhrn těchto lupků zdá se, že podléhá, vzhledem k mocnosti, rozličným změnám a jest hlavně k okrajům pánve méně mocný.

Nad těmito lupky leží konečně opět pískovce, jež se ale patrně od hlubších rozeznávají více hrubozrným složením, patrněji vyloučeným kaolinickým vazivem menší pevností a přimísením jednotlivých stříbrobělých lístků slídy, jakož i v celku menší hutností a sypčím tvarem, čímž se blíží více vrstvám „moltýře“, jak se v Radnických pánvích nachází. Mocnost se mění na jednotlivých místech pánve; na povrch přecházejí často ve vrstvu drobného štěrku, jemuž přimíšen jest větší štěrk. Větší tento štěrk v těchto pískovcích náleží k obyčejným horninám, rozličným druhům křemenů, křemenců a bulízků, jak všeobecně v pískovcích uhelného útvaru přicházejí.

Celá mocnost nad uhlím uložených vrstev obnáší na nejmenších místech jen 20 sáhů. Tím ale není uložení Přílepské pánve ukončeno. Pod slojí totiž jsou ještě v nemalé mocnosti lupky a pískovce uloženy. Mezi lupky a pískovci tvoří se mimo to nezřídka přechodní horniny, jež vystupují co lupkovité pískovce neb písčité lupky. Nacházejí se mimo to žluté, červené, šedé a pestře zbarvené lupky. Pískovce těchto vrstev, jež podkládají uhelnou sloj, stávají se místy **slepencovitými** a i slídnaté, písčité lupky přijímají, čím hlouběji uloženy jsou, tím častěji málo okulacené

úlomky křemenců, jak v okolních hřebenech vystupují, v smíšeninu svou a přecházejí sem tam v slepence, jichž vazivem jest hlinitá, často silně červená, železitá hmota.

V tyto vrstvy není žádná sloj uhelná více vložena; ale geody hlinitého sferosideritu nacházejí se v nich dosti zhusta a přicházejí v rozličných hloubkách. Objevily se sice častěji v jednotlivých vrstvách, takřka v jedné výšce uloženy, však ne výhradně, vždy po různu, ačkoliv brzo více, brzo méně na jedno místo stěsnány. Možno je dobře pozorovati ve východní části pánve ve svahu k potoku, kde jsou ve vycházejících vrstvách na mnohých místech odkryty. Zde jsou ale z většího dílu již proměněny v hydraty, čím se dají tím lehčeji rozeznati od okolní horniny, kdežto ze vnitra vrstev přicházejí tak zbarvené jako tyto. Částečné jich nahromadění zavdalo podnět, je místy hornicky dobývati a je v nejbližších vysokých pecích Kladenských a Krivoklátských roztaviti. Jsou z většího dílu hrubě soustředně listnaté, jádro jest namnoze rozpukané a tvoří dutiny.

Soujem vrstev, pod uhlím vyvinutých, jest zajisté po celou pánev rozšířený; přece však nachází se největší mocnost jeho ve východní části pánve; zde jest také více východně a jižně vystrčen nežli sloj uhelná a než její visuté, tak že celý východní pokraj a ona část jižního, jež až k potoku a pak přes potok do protějšího, lesem porostlého svahu zasáhá, jen z hlubších, pod slojí uložených vrstev sestává. Tyto vrstvy byly zkoumány šachtou, na pravém břehu potoka v jižním směru hnanou, kterou se dostihly nejprve dílem pestré, žluté, červené a šedé jíly, dílem pevnější slídnaté písčité lupky, čím dále ale tím více slepencovité vrstvy, jež obsahovaly mnoho křemencovitých úlomků, jichž vazivo více a více rudohnědě zbarvené bylo, až konečně železité vrstvy křemencovité dostiženy byly, jež co zkamenělinu jeden druh rodu *Orthis* obsahovaly, načež stola opuštěna byla. Tato dosáhla tedy beze vši pochybnosti vrstev silurských a překročila takto hranici pánve uhelné.

Sferosiderity jsou též z jiných míst pánve známy a nejsou jen na východní část obmezeny, byť by i zde převládaly; z většího dílu pak přicházejí ve vrstvách pod uhlím uložených, ačkoliv jednotlivé sferosiderity též ve visutém uhelné sloje se nacházejí. Mocnost vrstev pod uhlím obnáší na některých místech 15 až 20 sáhů, z čeho vyplývá největší celková mocnost Přílepské pánve asi 40 sáhů, jež ale, jak se zdá, se nachází hlavně ve východním rozšíření pánve, na to ale k západu ubývá, tak že nacházíme zde hlavně ležaté uhelné sloje v menší míře vyvinuté než východně a ubývání celkové mocnosti pánve může se hlavně tomu přičítat, že vrstvám v ležatém ubývá.

Dle vlastností mohou se vrstvy, v pánvi Přílepské uložené, zcela oprávněně ve dvě skupeniny rozdělit; a sice jednu zpodní, jež neobsahuje žádné uhelné sloje, z více hrubozrnných až slepencovitých vrstev sestává, jež často v zpodních oddílech jen málo ohlazené úlomky křemenců zahrnují a sferosiderity u větší míře obsahují; pak v jednu svrchní, do které by náležela sloj uhelná a její visuté, jež se vyznačuje vesměs jemnozrnnými horninami, jež svědčí o ukládání za klidných poměrů. Tato svrchní skupenina jeví vlastnosti sloje uhelné, často hořláký prostoupené, pak pevnými, světlými, písčitými brouskovitými lupky, jež ve visutém se vyskytují a konečně slabou vrstvou pískovce, jež v celé rozsáhlosti strop uhlí



bezprostředně provází a všude v skoro stejné mocnosti vystupuje, velkou příbuznost se spodní skupeninou uhelnou pánví uhelných v okolí Radnic.

Za těmito v předešlém naznačenými hranicemi této pánve uhelné dále se před několika roky, hlavně v směru od nejzápadnější části k Železné aneb více na sever k Libečovu, více dolovních pokusů, by se dokázalo, zdali snad uhelný útvar v tomto směru ještě dále zasahuje, však bez všelikých výsledků v tomto ohledu. V jedné pokusné šachtě, jež ještě poblíž hranice západní části pánve uhelné zaražena byla, dostiženy konečně mandlovcovité diabasy, jež tedy zde, podobně jako dále západně pod Železnou a u Hýskova, pod křemenci uloženy jsou.

Otisky rostlinné nevyskytují se v uhelné pánvi Přílepské hojně. Vrstvy otisky skoro přeplněné, jak je v okolí Radnickém nacházíme, nelze zde nikde pozorovat. Nejhojněji nacházíme otisky ve vrstvě pískovcové, 2—2½ stopy mocné, nad uhlí uložené v také zachovalosti, že možno jednotlivé druhy dosti jistě určit. Vzácněji vystupují v lupcích a písčitých vrstvách svrchnější se vyskytující a jen sem tam lze v těchto spatřiti ještě stopu nějakého určitelného zbytku rostlinného.

Taktéž obsahují slabé vrstvy uhelných lupků, bezprostředně nad uhlím uložených hojně zbytky rostlinné; však tyto jsou v těchto lupcích z většího dílu nezřetelné a v takém stavu zachovalé, jaký určení jich více méně činí nesnadným. Taktéž přicházejí otisky v opukách a slabých vrstvičkách lupkovitých, v uhelnou sloj vložených, a jsou dílem i v sloji samé k poznání.

Ze soujemu vrstev z ležatého jsou zbytky rostlinné v celku mnohem méně známy, což by se ale z většího dílu tomu přičítati mohlo, že zde schází příčných místností, kde by se tyto vrstvy blíže skoumati mohly. — Však i tam, kde vrstvy tyto na den vycházejí, se velmi málo zbytků rostlinných nachází, tak že se přece zdá, že větší hojnost otisků se obmezuje na vrstvy, jež bezprostředně na blízku uhlí uloženy aneb v ně vloženy jsou, kdežto ve vrstvách visutých, dále od sloje vzdálených jakož i v ležatých jen pořídku se vyskytují.

V rozličných vrstvách těchto nalezeny posud následující druhy:

#### *Equisetaceae.*

1. *Calamites Cisti* Brongn. zřídka v jednotlivých exemplárech.
2. *Calamites approximatus* Schloth. V pískovci a v lupcích, hojněji než ostatní druhy Calamitů.
3. *Calamites cannaeformis* Schloth. V lupcích.

#### *Asterophyllitae.*

4. *Asterophyllites grandis* Stbg. sp. *Volkmannia gracilis* Stbg. Vers. I. tab. XV. fig. 1., 2., 3. V jednotlivých úlomcích stonků, jakož i s plodními klasy, ve vrstvě pískovcové ve visutém.
5. *Asterophyllites foliosus* Lindl. sp. Neznalý úlomek stonku v pískovci pod slojí.
6. *Asterophyllites rigidus* Stbg. sp. Nežřídka ve vrstvách visutých.
7. *Asterophyllites equisetiformis* Schloth. sp. Často v dobře zachovalých exemplářích; vyznačuje se jemnými, štětinovitými lístky, jež se hojně v úzce rozestavených větenech seřadují a ku konci postranních větviček jsou

četnější než na počátku. Mezi jednotlivými vyobrazeními, jež rozliční autorové podali, souhlasí tyto Přilepské nejlíp s oněmi, jež se u Germara, seš. II., tab. VIII., fig. 3., a pak u Lindley a Hutton. tab. 191 nacházejí; v prvním udání ale jen ohledem na hořejší část vyobrazeného exempláru. Tímto úkazem, jenž na všech, dosti hojně nalezených exemplárech vždy stejným zůstal, totiž objevování se těchto jak jemných tak tuhých lístků vřetenových, jakož i lístků v kolénkových pochvách, bylaby snad, v porovnání s vyobrazeními tohoto druhu u jednotlivých autorů (jako u Schlotheima, Germara, Sternberga, Lindleye, Geinitze a j.) jež se vyznačují vždy většími a řídčeji rozestavenými lístky, podmíněna nová odrůda druhu *Asterophyllites equisetiformis*.

8. *Sphenophyllum saxifragaefolium* Stbg.; druh tento nalezen z většího dílu jen v jednotlivých lístcích vřetenovitých ve vrstvách visutého.

#### *Filices.*

9. *Sphenopteris obtusiloba* Brongnt. V znalých úlomcích nezřídka.  
 10. *Sphenopteris Hönighausi* Brongnt. Nezřídka, však z většího dílu méně pěkně zachovaná.  
 11. *Sphenopteris Bronni* Gutb. Jediný, nezřetelně zachovalý úlomek lístku.  
 12. *Sphenopteris elegans* Brongn. V jednotlivých, ale dobře vyznačených lístcích.  
 13. *Sphenopteris irregularis* Stbg. Neznalý exemplář.  
 14. *Sphenopteris Asplenites* Gutb. (*Asplenites elegans* Ettingsh.), dobře zachovalé lístky; zřídka.  
 15. *Hymenophyllites furcatus* Brongnt. sp. dosti zhusta; z většího dílu v podobě, jak ji Geinitz ve svém díle „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“ na tab. XXIV., fig. 8—9 vyobrazil.  
 16. *Schizopteris Gutbieriana* Presl; zřídka.  
 17. *Neuropteris flexuosa* Stbg. Dosti často části vějířů. Žilky v lístečcích zřídka zřetelné.  
 18. *Neuropteris Loshi* Brongnt. Jednotlivé lístky.  
 19. *Neuropteris gigantea* Stbg. Zřídka, v úlomcích.  
 20. *Odontopteris britannica* Gutb. Nedobře zachovalý úlomek lístku.  
 21. *Cyclopteris varians* Gutb. Málo nezřetelně zachovalých otisků lístků.  
 22. *Cyatheites dentatus* Brongn, zřetelné zbytky; zřídka.  
 23. *Cyatheites Oreopterides* Gopp. Zřídka.  
 24. *Cyatheites Miltoni* Artis sp. Jediná konečná část lístečku.  
 25. *Dictyopteris neuropteroides* Gutb. Zřídka.  
 26. *Lonchopteris rugosa*. Sem a tam v jednotlivých úlomcích mezi ostatními druhy.  
 27. *Alethopteris erosa* Gutb. Jediný, pochybný úlomek.  
 28. *Alethopteris Serli* Brongn. Druh tento objevuje se velmi často v pěkně a dobře zachovalých exemplárech skoro po celé pánvi, nezřídka na jednom místě zhusta při sobě.  
 29. *Alethopteris aquilina* Schloth. Nezřetelně a zřídka.

Všechny posud uvedené druhy kapradí nalezeny výhradně ve vrstvě pískovcové, jež nad uhlím uložena a až 2 stopy mocná jest, vyjma *Cyatheites dentatus*, *Cyatheites Miltoni* a *Cyatheites Oreopteridis*, jakož i *Sphenopteris elegans*, které v jednotlivých úlomcích též v lupcích svrchněji uložených nalezeny byly.

#### *Lycopodiaceæ.*

30. *Lepidophyllum majus*, Brongnt. Dobře znalý otisk, jenž souhlasí s vyobrazením v Geinitzově díle „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“ na tab. III. fig. 5. Ve vrstvě pískovcové 2 stopy mocné.
31. *Lepidostrobis variabilis* Lindl. a Hutt. Dva otisky, jež ve velikosti daleko od sebe se liší. Ve vrstvě pískovcové 2 stopy mocné.
32. *Lepidophylloides laricinum* Stbg. (*Lepidodendron laricinum* Stbg.). Dostí zhusta, rozličné podoby, jizvy rozličné velikosti. Z většího dílu ve vrstvě pískovcové 2 stopy mocné; dílem též v lupcích nad ní uložených.
33. *Cardiocarpum marginatum* Artis sp. Často v dobře zachovalých exemplárech. Ve vrstvách visutých mezi jinými otisky.
34. *Halonias punctata* Lindl. & Hutt. Nedobře znalý exemplář, jenž nejlip souhlasí s vyobrazeními u Geinitze „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“ na tab. IX. fig. 2. Ve vrstvě pískovcovité nad uhelnou slojí.

#### *Sigillariæ.*

35. *Sigillaria* Brongnt. Sp.? Zbytky *Sigillarií* objevily se několikrát co dosti široce rýhované, však nezřetelně udržené, *Syringodendron* podobné otisky v uhlí, na nichž ale rod určit nebylo možno.
36. *Stigmaria ficoides* Brongn. Přichází často, nejvíce na vrstvách lupku v uhlí samém; taktéž ve sferosideritech z ležatého uhelné sloje.

#### *Neggerathia.*

37. *Cordaites borassifolia* Stbg. sp. Dostí hojně v jednotlivých úlomcích listů. Taktéž přicházejí zde u Přílep otisky, jež se co části kmene neb co jádra dřevová *Cordaita* považují a *Artisia* nazvány byly.
38. *Neggerathia Beinertiana* Göpp. Tento druh objevil se v jednotlivých lístečkách rozličné zachovalosti nezřídka u Přílep.

#### *Coniferæ.*

39. *Araucarites carbonarius* Göpp. Vláknoté čili tak zvané minerální dřevěné uhlí, jak v největší části uhelných slojí přichází, jest i na sloji uhelné u Přílep dosti obvyklým nálezem, taktéž nacházejí se jednotlivé v špi vytažené zuhelnělé stonky rostlinné téže vlastnosti mezi jinými rostlinami ve vrstvě vysuté, 2 stopy mocné a lze je poznat ihned podle jejich aksamitového lesku. Jednotlivá vlákna takovýchto zbytků rostlin-

ných pod drobnohledem zkoumána, ukazovala dobře udržené buňky, dvěma až i třemi řadami buněk dupkových opatřené a sice se takto objevují ve velkém množství, čímž rod tento zcela podmíněn a oprávněn jest.

Při přehledu otisků u Přílep nalezených napadá hlavně scházení otisků korových *Sagenaria* a zřetelných zbytků *Sigillariif*, čímž obdržují druhy kapradinové převahu ve květeně pánve Přílepské.

Arci jsou náleziště v původní hornině vzácná a sběratel jest poukázán jen na materiál z hor vyvezený; možno tedy, že se později ještě mnohý rod najde, který odtud dosud znám nebyl. — Nejvíce zbytků rostlinných se vyváží s vrstvou pískovcovou ve visutém, 2 stopy mocnou; ale v porovnání s rozsáhlostí otisků v jiných pánvích uhelných, kde přicházejí druhy skoro ze všech řádů a rodů ještě též ve vrstvách visutých sloje uhelné, jest úplně scházení otisků korových rodu *Sagenaria* nápadné a zdá se, že svědčí o nepatrném vyvinutí rodu tohoto. — Že ale rod tento nescházel úplně, dosvědčuje vyskytování se *Lepidophylla*. *Sigillarie*, ačkoliv v nezřetelném a neurčitém stavu, nejsou nikoliv vzácné, hlavně na trhlínách v sloji, nesmí se ale zároveň zapomenout, že změnami v uhlí samém otisky tyto korové, jako jinde, tak i zde na jasnosti a zřetelnosti v zachování značně utrpěti mohly.

*Stigmaria* za to jest v dobře udržených exemplárech velmi hojná a všeobecný úkaz na vrstvách v uhelné sloji samé. Ohledem na tuto okolnost jakož i na to, že stopy *Sigillariif* nejsou nikterak tak vzácné, musíme uložení toto u Přílep považovat co zonu *Sigillariovou*.

Uložení počalo, jak se zdá, z počátku většími a silnějšími proudy, jichž následkem se hrubozrné a dílem slepencovité usazeniny tvořily, v něž byly hlavně z počátku tvoření se uzavřeny hojné úlomky z křemencovitých vrstev, jež na blízku na den vystupují, dílem z nejbližšího okolí, jak to dosvědčují úlomky, často ještě dosti ostrohranné. Teprve později ukládaly se vrstvy za klidnějších poměrů a tak povstaly jemnější pískovce a lupky s uhelnou slojí, jež ale později značných změn utrpěly. — Že ale tyto změny se děly v době, kde vrstvy ještě nebyly ztvrdlé, ztuhlé, naopak když ještě podajné býti musily, o tom svědčí znamenité ohyby a záhyby v sloji, jež povstati mohly, anižby trhy a lomy v sloji byly povstaly.

## II. Pánev uhelná Lísecká.

V jiho-západním směru od pánve Přílepské, asi půl hodiny v dálí od ní, setkáváme se opět severně od vesnice Hýskova s vrstvami pískovců a lupků, jež náleží pánvi Lísecké, která se bez přestávky přes Stradonice a Lísek až k Hudlicům prostírá.

O bližších poměrech této uhelné pánve bylo až posud jen málo pojednáno.

Hrabě Sternberg uvádí ve svém díle „Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt“ I., seš. 4., str. XXXVI., tab 8., fig. 1. otisk, jenž z Lísku pocházejí má a staví jej k palnám.

Prof. Zippe ve svém přehledu útvarů v Čechách z r. 1831 zmiňuje se o přicházení abissinského uhelného útvaru ve vesnicích Hýskovu a Zlejcíně.

Obšírněji pojednává tentýž učenec pánev tuto ve svém pojednání „Die Steinkohlen, ihr Werth und ihre Verbreitung in Böhmen 1842“, jež co zvláštní otisk z encyclopaedického časopisu průmyslové jednoty vyšlo a ohraničuje ji již ve východním směru přes Zlejcín, Stradonice a Hýskov, až k Rabenberské myslivně a uvádí též, že ji Berounka prorývá a že se uhlí nalézá jak na Lísku tak i u Hýskova.

Prof. dr. Aug. Em. Reuss uvádí ve svém krátkém přehledu geognostických poměrů v Čechách, jenž roku 1854 vyšel, jen tolik, že se na Lísku u Hudlic a u Stradonic blíže Starých hutí uhelné pánvičky nalézají.

Důkladnější pojednání Lísecké pánve podává pan prof. Krejčí v časopise „Živa“ 1853, I. ročník, v pojednání „O kamenném a hnědém uhlí“. Zde se uvádí poprvé pánev co úzký pruh, jenž přes Lísek a Zlejcín až k Starým Hutím u Hýskova zasáhá a jež Berounka protéká.

Zároveň se činí zmínka o obou pánvičkách na Lísku, jež tak nestejně vyvinuty jsou a též o rozdílnosti vrstev, jež pánev tu skládají.

Roku 1852 uveřejnil C. z Ettinghausenů v pojednáních c. k. geolog. říšského ústavu svou kamenouhelnou floru Stradonickou. Práce tato jest výhradně palaeontologická a uvádí se v ní 18 rozličných druhů, jež ale pocházejí vesměs z jediného naleziště blíž Stradonic.

Později r. 1864 rozmnožil R. Andrae v článku o otiscích v útvaru uhelném u Stradonic nalezených, jež v časopise pro mineralogii, geologii a t. d., vydávaném od Leonharda a Bronna uveřejnil, počet tento o 12 druhů; o geognostických poměrech ale podává jen velmi neúplné zprávy, ba nechce o rozprostírání se pánve uhelné na levý břeh Berounky ničeho vědět.

Jdeme-li od Berouna podlé řeky vzhůru, dosáhneme vesnici Hýskov asi za hodinu cesty; před tím musili jsme ale překročit vrstvy křemencovité z Barrandeova pásma  $D_2$ , jež řeka proráží a jež na obou březích vrchy Vostřý, Pěník a Plešivec tvoří. Ve vesnici samé, jakož i kus cesty odtud na sever vycházejí pak mandlovcovité diabasy, bezprostředně v ležatém vrstev křemencových. Nad tím pak rozprostírají se brzo pískovce a lupky útvaru uhelného. Tyto lze lehce stopovat v údolí „Libina“, jež se táhne mezi Hýskovem a vrchem Plešivcem od Železné, kde se až pod půdu údolí sklánějí, aniž by dosáhly někde levý svah údolí. Vidíme pak všude vrstvy pískovcové uhelného útvaru na východním spádu křemencového pahorku „Kluk“ a zasahají severně od něho až k údolíčku „Jakobinka“, jež se tam v důli táhne. Můžeme je pak dále, na jižní spád Kluka se příkládající, v západním směru až k Rábenbergu (Krkavím horám) stopovat, kde překročí údolí

(v rybníčkách) jež pod Stradonicemi se otvírá a v severním směru k Rábenbergu se rozprostírá; pak se táhnou něco západně od tohoto údolí až k Berounce. Tam jsou ale na březích řeky uloženým diluviem pokryty.

Od Hýskova se táhne mimo to hranice pískovců uhelných v jihozápadním směru dolů a dosahuje kus cesty nad nejzápadnějšími staveními Starých Hutí řeku.

Bychom mohli stopovati další rozšíření uhelného útvaru za řekou, na pravém břehu, jest potřebí krátkého vyličení terrainních poměrů tamější krajiny. Tato tvoří v celku svah, jenž od řeky nejprve silně, pak mírněji na jih vystupuje; svah tento dosahuje své největší výšky v hřebenu křemencovém, jenž na vrchu „Pěšík“ u Zlejciny počíná, pak za vesnicí touto v jiho-západním směru se táhne a u Lísku ke dni vystupuje; odtud se sklání pohoří dlelem jižně do Královodvorského údolí, dlelem pak jiho-západně k Hudlicům v mírně nakloněné vysočině.

Svah k řece jest proryt třemi roklemi. Jedna z nich, přicházejíc od Zlejciny, táhne se co nejvýchodnější, v rovném směru k řece a oustí blízko nad Starými Hutěmi; jest to rokle Zlejcinská. Západně od této oustí pod vsí Stradonicemi druhá větší rokle do údolí říčního; tato rokle ale dělí se brzo před oustím a tvoří dvě menší rokly, z nichž západnější a kratší končí v polích obce Stradonické, východnější ale po delším běhu a rozličnými závinu až k Lísecké myslivně zasáhá. — Jsou to západní a východní rokly Stradonické.

Ve svahu mezi oustím Zlejcinské a Stradonické rokly vidíme pak opět pískovce uhelné se přikládat na diabasy, a jak zapadají v směru k západu nakloněným až pod podlahu údolí, tak že rokly Stradonické jen v těchto pískovcích zaryta, Zlejcinská ale v diabasu vymleta jest; jen na levém svahu této rokly přikládají se též pískovce. — V tomto svahu lze hranici mezi pískovcem a diabasem dosti daleko nahoru stopovati, až asi v poloviční výšce rokly pískovce tuto překročí, k svrchnímu konci vesnice Zlejciny se rozprostírají, kde ostatně útvar uhelný několika starými haldami naznačen jest; pak táhnou v jihovýchodním směru k Lísecké výši, kde bezprostředně pod hřebenem křemencovým na blízku bytu Líseckého poddůlného vycházejí.

Západní hranice uhelných vrstev na pravém břehu nalézá se blízko nad oustím Stradonické rokly, drží se pak blízko podlé západní strany západní rokly, překročí ji ale ještě před jejím zakončením, napřed v jihovýchodním, pak v jižním směru, obrací se pak dále jihozápadně k Lísecké myslivně, jež stojí skoro úplně na hranici pískovců; odtud pak se táhne ještě kousek západně až na počátek svahu Lísecké výše, k potoku Otročínskému nakloněné, pak na návrší, jež se vypíná bezprostředně severně nad mlýnem Dibří, jenž leží pod vsí Hudlicemi; na návrší tomto nacházíme v rozsáhlých lomech pískovce a lupky v hojném množství, které opět bezprostředně na diabasech uloženy jsou. Zaujímají skoro celou šíři návrší Dibříského; hranice uhelných pískovců nepřekročujíc malou z Líseckých lesů zrovna k mlýnu Dibřískému se táhnoucí rokličku, vrací se pak opět až k hřebenu křemencovému u Líseckého poddůlného, čím jest ohraničeno rozšíření vrstev, jež Líseckou uhelnou pánev skládají.

Na jižním svahu nalézá se ale zcela blízko u bytu Líseckého poddůlného, mimo pánev, nyní ohraničenou, ještě jiná, osamělá, mnohem menší pánvička. — Rozsáhlost její jest větší od jihu na sever, než od východu k západu, sklání se

v vrstvě pohorí k jihu není ale ani východními vrstevmi ani vedlejšími blízkými pozorování přístupná: však dnesního dne není ani dobře přístupná, jelikož uhelná ložiska, jež v ní uložena byla, zcela vyčerána jsou. Zvláštního jména tato pánvička nemá.

Uložena jest v ní na vrstvách křemencových pásma Barrandevova  $D_2$  jež od severo-východu k jiho-západu směřují a jich východně zapadají.

Vlastní pánev Lisecká jest ale uložena na rozličných horninách. Již jsme se zmínili, že u Zlejštiny a Hýskova na diabasy a namísto se přikládá. Tyto tvoří skoro v ní na levém břehu řeky základ pánve: jen na severo-východní straně spočívají vrstvy pánve na vrstvách křemencových pahorků „Kluků“ na místě, kde se západní jich hranice řece blíží, podkládá je část brdla sílurského, jež od Stradonic se přes řeku na protější stranu táhne.

Na téže brídli spočívá pánev uhelná: též na pravém břehu řeky se svou severo-západní hranicí od Stradonic až k Dibřím a setkává se skoro sem tam s malými kupami boliznických, jinných brázd protáhnuta jest. Teprve na návrší Dibrčském ukládá se pánev uhelná opět na diabasy: tyto jsou pokračování diabasů, jež od Starých hutí k Zlejštině se táhnou a na den vycházejí. Brzo ale přikládá se hranice uhelné pánve, přes diabasy zcela přesahující, opět na křemencové vrstvy, jež táhnou od Liseckého hřebene a teprve nad Zlejštinou vycházejí opět diabasy mezi pánví uhelnou a mezi křemenci.

Diabasy tyto náležejí k onomu pruhu, jenž provází železná ložiska, jež následují na nejspodnější členy pásma křemencovitého a dilem mezi Hýskovem a Zlejštinou uloženy jsou a jenž se táhne od Svarova přes Chýňavu, Hýskov, Stradonice, Hudlice a t. d., tak že pánev uhelná přesně u hraniční čáry mezi pásmo křemencové a diabasy, pod ní následující, tedy mezi  $D_2$  a  $D_1$  uložena jest.

Dle vylíčeného ohraničení tvoří pánev úzký, od severo-východu k jiho-západu sahající pruh, jenž jenom na jiho-západním konci mezi Dibrčím a Liseckou myslivnou větší rozsáhlostí nabývá. Můžeme přijmouti, že délka obnáší osm- až devětkrát tolik než šířka. — Prvnější může obnášeti asi 3000, poslední asi 300 až 400 sáhů. — O poměrech výšek v pánvi této jest jen málo známo. V ročníku geologického říšského ústavu udává se ve zprávě o geologických pracích v okolí Pražském a Berounském od prof. Krejčího výška Lisku na 1042 stopy. Měření na jiných bodech v oboru této pánve nejsou známá. Dle udání pana prof. Kofistky v přírodovědeckém časopise „Lotos“ z roku 1860 určena jest výška nadmořní Starých Hutí na Berounce na 752 stop. V téže výšce leží asi řeka na tom místě, kde prorývá uhelnou pánve, tak že mezi půdou údolí a mezi Lískem by obnášel rozdíl ve výškách 850 stop. Niveau údolí leží ve výměli ve vrstvách pánve uhelné: netvoří tedy žádné měřítko pro sklon povrchu pánve uhelné z Lisku k Hýskovu. Neb terrain z pískovců na levém břehu řeky zdvihá se ihned dosti značně, přec ale obnáší postup k Hýskovu a k pahorku Kluku o mnoho méně, nežli onen na pravém břehu k Lisku a obnáší sotva polovici výšky této.

Dle udání geologického říšského ústavu obnáší výška kupy severně od Hýskova 219.9 sáhu = 1319 stop. Timto se může vyrozumívati jen pahorek Kluk,

na jehož svah Hýskovský podíl Lísecké pánve se přikládá, což se dle přibližujícího počtu asi až k výšce 1100—1200 stop děje.

Povrch Lísecké pánve, myslíme-li si jej v souvislosti, padá tedy dosti souměrně, od Líseckého hřebene počato, z výšky 1600 stop v směru k severnímu konci u pahorku „Kluk“ asi o 400 až 500 stop. Pánev ale jest údolím Berounky pod Stradonicemi přetržena, čímž jest větší část svrchních vrstev na místě tomto odplavena a souvislost obou, v pravo a v levo od řeky se nalézajících částí jest jen hlouběji uloženými pískovcovými vrstvami naznačena.

K jiho-západu táhne se povrch pánve v souvislé, málo nakloněné rovině až k Dibří a nabývá jen na západním, k Otročínskému potoku upadajícím svahu většího sklonu.

V této poslední, dosti rozsáhlé části, nenalézáme nižších údolí neb vodotečí, jež by vrstvy pánve uhelné prorývaly, a jimiž by se do uložení vrstev nahlédnouti dalo. Však jest to alespoň dílem možno v lomech, jež na nejjihnější konci pánve nad Dibřím otevřeny jsou a pak v jiném, jenž se v západním směru od Lísku zcela na pokraji pánve nalézá a co Lísecký lom znám jest.

Bližší pohled do uložení vrstev lze dosíci jen v roklích výše naznačených, totiž v roklích u Zlejciny a u Stradonic. Dílem můžeme též vrstvy sledovat na levém břehu řeky, v údolíčku (v rybníčkách zvaném), jež se k Rabenbergu táhne, pak ve vodomeli, jenž se táhne v jižním směru od pahorku „Kluk“ k Hýskovu, jenž prorývá díl pánve uhelné a diabasů, pod ní uložených; konečně v pravém svahu údolí Libiny nad Hýskovem, jakož i v lomech, jež na patě Kluku otevřeny jsou.

Vstupneme-li do Stradonické rokle, tu nalézáme na oustí oběstranné svahy, hlavně z hrubozrnných, slepencovitých vrstev pískovcových a štěrkových složené. Na levém svahu jest zde lom otevřen, v němž lze pozorovati střídání se více méně slepencovitých vrstev.

Po rozvětvení se této rokle vidíme, jak v západním odvětví pískovcové vrstvy místy bezprostředně spočívají na břidli silurské, jež zde co základní hornina pánvi uhelné slouží, tak že tyto pískovce se na těchto místech co nejzpodnější, nejstarší vrstvy pánve uhelné osvědčují. — Při dalším postupování v této západní rokli Stradonické vidíme dílem žlutavé trochu písčité, hlavně ale modrošedé lupky vycházející na den. Tyto lupky jsou ony, z nichž pocházejí zbytky rostlin, jež sloužily Fittingshausenovu dílu o fosilní flóře Stradonické a pak dalším zprávám o fosilní květeně Stradonické za základ; přícházení jejich ale na tomto místě bylo již dávno před tím, již r. 1841, následkem zde k účelu stavby zavedeného lámání kamene spisovateli známo a později pak bylo zde dále čerpáno.

Dále na hoře v rokli převládají opět slepence, na něž se dílem přikládá hlinitý jemnozrný písčitý lupek, jemuž hojně lístky slídy přimíšeny jsou, ale jenž vzácné otisky rostlinné obsahuje, nad nímž pak následují ku konci rokle východí nečistě, hojně lupky prostoupené sloje, pak opět jen málo mocné, tmavé lupky a konečně drobný štěrk a písčitá hlína. Sloj uhelná sama nalézá se zde sotva s až 9 stop pod orníci. Sledujeme-li druhé východní odvětví Stradonické rokle od počátku až ku konci, sestávají oběstranné svahy nejprve též ze slepencovitých vrstev pískovcových. Vycházejí zde, hlavně na počátku rokle, ve větší mocnosti



ke dni; lupky ale jak jsme je pozorovali v západní rokli, nenalézají se zde více a zdá se, že leží hlouběji. Vyše na hoře setkáváme se s vrstvami slidnatého písčitého lupku, a na podlaze rokle vychází nad nimi opět sloj uhelná silně lupky prostoupená ke dni. V hořejších pak částech sestávají svahy rokle, většinou dlu vegetací pokryty, z vrstev dosti stejnoznámého pískovce.

Tentýž sled vrstev můžeme konečně pozorovat v Zlejcinské rokli. — Stoupáme-li z důlů nahoru, setkáváme se, když jsme byli nejprve diabasy překročili, s vrstvami slepencův, které bezprostředně na těchto uloženy jsou; v slepencích těchto vloženy jsou jednotlivé, slabé vrstvičky lupků s jednotlivými otisky. V dosti značné výši vychází pak opět na slepencových vrstvách uložena uhelná sloj na den, podobné jakosti a stejné znečištěna vrstvičkami lupků, jako na obou dříve naznačených místech.

Uhelná sloj jest tmavým lupkem v mocnosti 1 až 2 stop bezprostředně pokryta. Tyto lupky obsahují hojné zbytky rostlinné, dobře zachovalé. — Nad nimi pak následují žlutavé, dosti stejnoměrné, málo hrubozrné pískovce co nejvyšší vrstvy, jež až pod ornici zasahují, několik sáhů mocny jsou a nejsou více žádnou, jinak utvořenou horninou prostoupeny.

Ve všech třech roklich u Stradonic a u Zlejciny, jež arci dosti blízko sobě leží, nalézáme tedy tentýž sled vrstev vyvinut; totiž nad skupeninou slepenců, k nimž se přidružují světle zbarvené lupky, uhelná sloj, silné lupky prostoupena, nad níž málo mocné tmavé lupky uhelné a konečně zrnité pískovce uloženy jsou.

V dolech, výše v Líseckém lese, k účelu dolování na uhlí otevřených, proraženy nejprve ze zhora v důli více méně mocné vrstvy pískovců, pak lupky, nežli sloj dostižena. Jest tedy i zde tentýž sled vrstev nad uhlím dokázán, jak jsme to i při níže ležících výchozích seznali. Pod sloj ale naznačené doly nejdou, tak že o vrstvách pod slojí ležících nic bližšího seznati se nedá.

V lomech u Dibří, na jiho-západním konci pánve převládají slepence, hlavně v západní části lomů těchto. — Dále na východ pak vystupují lupky, světlé barvy, jež obsahují dosti hojné zbytky rostlinné. V nejhořejší poloze východní části lomů nalézá se vrstvička tmavšího, trochu uhelnatého lupku, jenž se může pozorovat co obdoba lupku uhelné sloje u Lísku a u Zlejciny vyvinutého.

Co se konečně lomu, západně od Lísecké myslivny, na pokraji pánve otevřeného týče, nenalézáme v něm žádných slepenců, nýbrž jen vrstvy stejnoznámého, světle zbarveného pískovce v celkové mocnosti asi šesti sáhů, bez otisků; tyto pískovce zdají se náležeti vrstvám visutého, po kterých zde ale ani stopy. Vrstvy pískovcové spočívají bezprostředně na břidlicích silurských, jež zároveň s těmito v lomu odkryty jsou.

Na levém břehu v údolí (v rybníčkách), jež zrovna naproti Stradonické rokli se otevírá, vycházejí pouze slepencovité pískovce, téže vlastnosti, jako na břehu pravém. Ni lupky ni stopy nějaké sloje uhelné nelze zde pozorovat.

U Hýskova setkáváme se, když ve vodomeli, jenž se táhne od Kluka vdůli, stoupáme vzhůru, nejprve s vrstvou tmavých, uhelnatých lupků, jež na diabasech spočívají a jež hojné slabými vrstvičkami uhlí prostoupeny jsou, tak že jsme v rozpacích, zdáli se mají považovat co lupky velmi uhelnaté, aneb co sloj velmi lupkem znečištěná. Tento uhelnatý lupěk zapadá k severu; před lety hnána v údolí,

pod pahorkem Klukem k Hýskovu se táhnoucím, po něm stola; vyvezených tím hald lupku tohoto lze až po dnes pozorovati; štola tato ale byla následkem nepotrebnosti vyvezeného materiálu opuštěna a nedolovalo se v ní dále.

Nad těmito lupky uhelnými následují pak nejprve lupky nepatrné mocnosti, pak pískovce kaolinovité a stejnozrné, jež v tak zvaných Hýskovských lomech dostatečně odkryty jsou.

Od podlahy údolí byla pánev, kde sahá až pod ni, též štolou skoumána. Štola tato jest na oustí ražena v šedém, hlinitém pískovci, nad nímž pak leží slabá vrstva slepenců, jež sestávají z ostrohranných úlomků křemencových. — V pískovci jsou uloženy jednotlivé sferosiderity. Ze štoly ale vyváženy pěkně vrstvované, světle modrošedé lupky, jež se zcela podobají oněm ze západní Stradonické rokle a taktéž v nich nalezenými otisky těmto Stradonickým lupkům zcela odpovídají.

Tytéž lupky pak nalézáme na haldě, jež se nachází na jižním svahu pahorku „Kluk“; tyto jsou vyvezeny z šachty, která zde před lety zaražena byla, aniž by však sloj zde nalezena byla. Mimo lupky ale leží na též haldě zbytky světle zbarveného, stejno- a jemnozrného pískovce.

V části pánve Lísecké, na levém břehu řeky uložené, jsou tedy tytéž vrstvy a v témže pořádku uloženy, jak jsme to na pravém břehu poznali, totiž nejzpodněji slepencovité pískovce s lupky, pak nečistá sloj uhelná, nad ní málo lupků uhelných a pak rozličně vyvinuté, stejnozrné pískovce.

Celý souhrn vrstev, jež Líseckou pánev vyplňuje, dělí se tedy ve dvě hlavní části, a sice jednu pod uhelnou slojí, jež sestává hlavně ze slepenců a jednu nad uhlím, jež sestává z více jemnozrných pískovců. V obou částech jsou vloženy lupky podřízeného vyvinutí; ony ve spodní části rozeznávají se od oněch v hořejší části tím, že neobsahují tolik uhelné hmoty, následkem čehož jsou světleji zbarveny.

Sloje slepencové pod uhlím jsou dílem světlošedé, dílem žlutavé, dílem bílé, jen zřídka přihnědlé; sestávají z více hrubozrné hmoty pískovcové s kaolinovým vazivem, v níž vloženy jsou štěrky a úlomky rozličných hornin rozličné velikosti brzo v menším, brzo ve větším množství; někdy převládají. Štěrky sestávají hlavně z rozličných druhů křemene, nezřídka z křemenů z nejrozmanitějších loží; mezi tím nalézají se buližňsky, úlomky břidlic; často též dosti velké kusy, podobny kamencové břidli, jednotlivé křemeny železité; mimo to, hlavně na jiho-západním konci pánve a v oustí Stradonické rokle, porfyrové štěrky, jež většího dílu náležejí zelenavé odrůdě se vtroušenými malými bělavými zrnky kaolinovými; upomínají velmi na porfyry, jež vycházejí v okolí Pliskova u Zbirova a ve Vidřiduchu u Holoubkova; však i tmavošedé odrůdy s černými zrnky vloženými lze zde pozorovat.

Křemence a břidlice nalézají se jen málo omleté, více méně ostrohranné; poslední, totiž břidlice skoro vždy na ten způsob; křemence ale jen místy, jako v údolí nad Hýskovem, pod křemencovými kupami Klukem a Plešivcem, a svědčí o tom, že se nenalézají daleko od původního lože svého. Mezi pískovými zrnky nalézá se mimo to slída v malých bělých lístečkách vložena.

V slepencích jsou mimo to vloženy sferosiderity, ne sice velmi hojně, však též ne zřídka. Jsou nepravidelně rozloženy, neobmezují se na jistou polohu, co do velikosti jsou rozličně vyvinuty. Trochu hojněji, ale ne v také velikosti jako

jinde, objevující se v lomech slepencových u Dibří. Většího dílu jsou proměněny v hydraty a z více koncentrických vrstev složeny, jež obsahují vždy více méně písčitou základní hmotu. Poblíž Hýskova byly též po kratší dobu předmětem hornického vyrábění pro železnou buť v Kladně. Tam ale dobývány sferosiderity více hlinité povahy; zároveň s nimi vyvážen onen modrošedý lupek, jenž jest vložen ve vrstvy slepencové. Sferosiderity tyto byly zde dílem šedé, dílem hnědé barvy, některá místa v nich též červená, skoro jen z kyslíčnicku železitého; skoro všechny byly uvnitř nepravidelně a dosti silně rozpukány; plochy puklin často obloženy a potaženy bílou, hlinitou hmotou.

Mezi kusy sferosideritů, jež po delší čas na haldě ležely, nalézal se též kus Sigillariového kmene, též co sferosiderit, jenž dílem již v hydrat železitý proměněn byl; na kmeně tomto byly rýhy podélné většího dílu ještě dosti znale zachovalé, jizvy ale nedokonale udrženy aneb již zcela zrušeny, jen na některých místech bylo lze ještě je poznati. — Průměr kusu toho byl asi 15 palců a váha značná, tak že by doprava při špatné zachovalosti se nebyla vyplatila a odměnila. Dle útvaru jednotlivých, ještě znatelných jizev, zdá se, že kmen tento náležel rodu *Sigillaria oculata* Schloth.

V slepencovitých pískovcích přicházejí otisky rostlinné velmi zřídka; jemnější částky ani se neobjevují; ale skoro všude, kde vrstvy pozorovati můžeme, spatřujeme v nich tenké vrstvičky velmi drobného uhlí, v podobě rour, více méně nepravidelných, elliptických neb mnohorožných, někdy též podivně stlačených: v těchto nalézá se vždy jádro pískovcové, tak že se osvědčují tyto vrstvičky uhlí, vždy co zuhelnělá kůra kmenů v pískovci zachovalých. Tyto zbytky kmenů jsou v celé hmotě pískovců slepencových nepravidelně roztroušeny, rozličného průměru, často silně zkrouceny, ne vždy, ale z většího dílu k vrstvování rovnoběžně vloženy, a nezřídka značné délky. — Na vrstvě uhlí nelze nikdy nějakou znalou kresbu povrchu jejich poznati; taktéž se nezachoval v hornině, je obklopující nižádný otisk, jenž by dal seznati druh, k němuž náležely. Prostora, jež se nalézá mezi jádrem těchto kmenů a mezi horninou je obklopující, jest často větší, než by hmota ještě udržené vrstvy uhlí vyžadovala, tak že ji úplně nevyplňuje; zdá se tedy, že dílem se zevrkla neb jinak vymizela.

Mnohem častěji zanechala vnitřní část uhlí vrstvy otisk, jež seznati lze na povrchu jádra; tvoří takto vnitřní otisk kůry. Takovými otisky zjištěno přicházení *Calamitů* mezi těmito, nepravidelně v slepencích roztroušenými zbytky kmenů: mezi nimi bylo možno určit druhy *Calamites approximatus* Schloth. a *Calamites* *Cisti* Brgt.

Mimo to nalézají se mezi těmito jádry ony otisky, jež co *Artisia transversa* Presl známy jsou a jež již Sternberg od Hýskova uvádí; popisují se tyto otisky co jádra dřevová rodu *Cordaites* co odpovídá způsobu zdejšího objevování se.

Však nepodařilo se posud určit jiných druhů; můžeme ale při bedlivém pozorování jáder z uhlí kůry vyňatých skoro na každém seznati povrch více méně plochý a jemnými rýhami a zcela nízkými vráskami dílem podél dílem přes přičvrstělý: na vráskách těchto ale nelze spatřiti nižádnou pravidelnost a zdá se, že představují jen otisky vláken z vnitřní plochy kůry. Taktéž nalezl jsem uvnitř takových kmenových jáder neurčitelné zbytky stonků, jakož i v jednotlivá vlákna

rozdělené a rozluštěné úlomky rostlinné, jež byly velmi slabou vrstvičkou uhelnou potaženy.

Zbytky nyní naznačených kmenů přicházejí v obou Stradonických roklich, jakož i pod Zlejcínou, pak v údolí (v rybníčkách) na levém břehu řeky všude v slepenci; řidčeji objevují se v oněch, jež v lomech u Dibří odkryty byly.

V lupcích ale, jež v slepencích uloženy jsou, jsou zbytky rostlinné dosti hojně obsaženy. — Jestli ale hojnost jich na rozličných místech též rozličná a darmo hledáme na některých místech, kdežto na jiných v plné hojnosti se nacházejí. Co nejbohatší se posud objevily lupky v západní rokli Stradonické. — Lupky tyto jsou z větší části modrošedé, řidčeji žlutavé, lehce štipatelné; místy ukazují náklonnost k sferickým vyloučením. Až podnes známo z těchto vrstev 48 druhů rozličných zbytků rostlinných, jež většího dílu kapradinám náležejí, kdežto *Sigillarie*, *Stigmarie* a *Lepidodendra* v nich nepřicházejí neb jen pořádku naznačeny jsou. Vždy přicházejí zde jen v úlomcích a nejsou v ploše uloženy, nýbrž rozličně v hornině roztroušeny.


Lupky u Hýskova odkryté osvědčují se jak petrografickými vlastnostmi, tak povahou v nich obsažených rostlinných zbytků co identické s oněmi u Stradonic. V západní rokli Stradonické ale vychází nad vrstvami, na otisky hojnými, mezi vrstvami pískovcovými světloušedý, dílem běle skvrnitý jemnozrný písčitý lupek v málo mocných vrstvách ke dni, na lupku tomto nalézají se v jednotlivých polohách velké množství neznalých, rozdrolených a nepravidelně vtroušených rostlinných úlomků, podobných fossilnímu stelivu.

Nad uhelnou slojí jsou lupky uhelné, v něž se zdá že uhlí přechází, tmavě zbarvené, což pochází od větší bohatosti na uhelnou hmotu, čímž se stávají pravými lupky uhelnými. Často obsahují slídlu, ale v malých sotva poznatelných lístečcích. Obsahují zbytky skoro všech, uhelnou dobu vyznačujících řádů rostlinných. Tímto, jakož i tmavší barvou liší se dobře ode všech ostatních v slepencích vložených lupků. Všude kde můžeme sloj uhelnou pozorovat, tvoří její bezprostřední visuté. Na den vycházejí nad uhelnou slojí v Stradonické rokli, u Zlejciny, kde obsahují hojně otisky; pak u výchozí uhelné nad Hýskovem. Slabá vrstva jich zdá se pak, že jest lupek tmavý, jenž v lomech u Dibří nad slepencovými vrstvami přichází a též otisky obsahuje.

Vrstvy pískovců, jež pak nad lupky těmito v rozličné mocnosti a bez dalšího přerušení uloženy jsou, lze na mnohých místech pozorovati. Všude při dolování se musí prorazit a jsou západně od Lísecké myslivny, v tak zvaném Líseckém lomu, v hoření části Zlejcinské rokli a na mnoze v Hýskovských lomech odkryty. Všude jsou dosti stejného, více hrubého zrna; vazivo jest kaolinické, jež dosti často převládá; mimo to obsahují vtroušené lístky slídlu a jsou zjevně v rozličné mocných, nikdy zcela slabých vrstvách uloženy. Co se barvy týče, tu převládá světloužlutavá neb šedá i bílá. Vrstvy štěrků nescházejí, však nepřicházejí jen řidčeji, než pod uhlí, nýbrž nejsou též nikdy mocné, jednotlivé štěrky nejsou velké a obmezují se přísně na jisté vrstvy, nad a pod kterými pískovec jest úplně prost štěrku. — Nežádka vidíme takové menší štěrky na podlaze vrstvy pískovcové, v jedné ploše vedle sebe rozestaveny, tak že při průřezu stěny v jedné čáře vedle sebe seřaděny se zdají. Sem tam tvoří dvě až tři takové polohy nad sebou na podlaze vrstvy

pískovcové, aniž by lze bylo jediný větší štěrk nad těmito nalézt. Kde vyplňují větší vrstvu, jsou i touto přísně ukončeny a následují pak opět vrstvy bez štěrku. (Fig. IV.)

Fig. IV.



Stěna v lomu Hýskovském.

Nepravidelně ve vrstvách roztroušeně vložené úlomky kmenů, jako v slepencových slojích pod uhlím nelze pozorovati. Přece ale nescházejí zde docela stopy kmenů. Objevily se též v nepravidelně stlačených, drobnou uhelnou korou obklopených jádrech na jednom místě u Hýskova, ale jen na jediném místě mezi dvěma na se následujícími vrstvami rovnoběžně uloženým.

Častěji pak se objevují sferoidické tvary; jsou dílem jen hydratem železitým více méně tmavě zbarvené, soustředně kruhové kresby, jež nezřídka celé stěny pískovcové pokrývají, dílem ale geody, jež se od okolní horniny úplně odlučují. Ve vrstvě pískovcové, více hlinité a na slídu bohaté, jež v Hýskovských lomech odkryta byla, objevily se takové geody dosti hojně; tyto známy jsou tím, že na puklinách uvnitř chovají četné, někdy dosti značné krystaly barytu. Pukliny uvnitř

těchto geod jsou mimo to často hustě pokryty malými, hnědými, čočkovitými krystalky ocelku a na tomto jest někdy pak teprvé hnědel v malých, polokulovitě seřazených krystalech vyloučen. — V některých těchto geodech nalézá se červený kyslíčník železitý v podobě prášku v dutině uzavřený. — Sem tam nalézají se ve sferosideritech stopy zbytků rostlinných, hlavně nezřetelné otisky stonků.

V pískovcích samých jsou otisky rostlinné velmi vzácné; posud jest teprvé jen několik exemplářů z rodu *Calamites*, a v hlinitějších odrůdách pískovců u Hýskova *Sphenophyllum* a *Pinnularia* známo.


Co se uložení vrstev týče, jest zapadání jich poblíž hřebene Líseckého v směru severním. Taktéž k severu, jen něco k východu nakloněné, zapadají vrstvy v nejjižnější části pánve, v lomech u Dibří, ale pod menším úhlem. — V lomu Líseckém, tedy na západním kraji pánve, zapadají vrstvy mírně k východu. Níže pak v západní rokli Stradonické může se v celku přijmout směr vrstev od severo-východu k jiho-západu při více méně nakloněném zapadání k jiho-východu, což se i ve východní Stradonické rokli, jakož i v Zlejcinské opakuje. V Stradonickém lomu mají vrstvy mírné zapadání k východu a směřují od severu k jihu. V údolí na levém břehu řeky zdá se, že mají vrstvy slepencové směr od severo-západu k jiho-východu s rozličným zapadáním, pokud to na nezřetelných vrstvách pozorovati lze; zdá se, že zde stává trochu vlnité uložení vrstev. — Teprvé v lomech a na výchozích vrstev u Hýskova lze zapadání a směr opět pozorovati. V lomech jest směr podle h. 21 až 22 při zapadání k jiho-východu pod úhlem 10 stupňů. Též výchozí nad Hýskovem směřuje podle h. 21, zapadá ale opačně, totiž k severo-východu, a sice pod úhlem 15 stupňů. Tentýž směr a totéž zapadání ukazují též vrstvy pískovcové, nad tímto výchozím uložené.

kož ale lomy tyto severně od výchozí a skoro na nejsevernějším konci pánve  
ženy jsou, má tedy tato severní část pánve uhelné opačné zapadání k vrstvám  
ižnější části pánve.

V celku jest pánev nakloněna jednak od jihu k severu, jinak od západu  
východu, třebaž ne stále a souměrně, přece takým způsobem, že stejnorodé  
ty leží v jižní části pánve o mnoho výše než v severní a že mladší vrstvy  
k východnímu kraji pánve vytlačeny jsou než k západnímu. — Podobné  
věry lze též na sloji samé pozorovati (fig. V.).

Poblíž hřebene Líseckého, kde se na sloj uhelnou doluje, jsou šachty, jež  
blízku hřebene leží, 10 až 12 sáhů hluboké; dále ale na sever musí se vzdor  
onu povrchu v stejném směru do 18 až 19 sáhů hloubit, by sloj dostihly.  
ování jest odtud o mnoho více na východ k Zlejcíně rozšířeno, než na západ.  
ězáme pak dále bezprostředně na blízku Zlejciny na nejvýchodnějším kraji  
ve staré haldy po šachtách, jichž zde jednou stávalo, které nyní ale zcela  
štěny jsou.

Fig. V.



Staré tyto haldy lupku uhelného a zasypaných šachet rozprostírají se dále  
dli mezi Zlejcinskou a východní roklí Stradonickou, ne ale mezi touto a zá-  
ní roklí Stradonickou, ačkoliv též na konci této výchozí uhlí se nalézají. Větší  
lí uhelné sloje nalézají se více ve východní polovině pánve a byl též štolou  
hodní rokle Stradonické zkoumán. V dalším severním směru přestává zde na  
vém břehu sloj uhelná, jakmile se povrch k jisté hloubce sklonil a vystupují  
ud až k řece jen vrstvy, pod slojí uložené. V stejné výšce pak vystupuje sloj  
t na levém břehu řeky, ale též jen ve východní části pánve, za Hýskovem,  
žto západně odtud nic o nějaké sloji není známo, ani ničeho není k spatření.

Uhlenná sloj není ve své mocnosti stálá a obnáší 6—9 stop, což se řídí dle  
o, v jaké míře se musí vrstvy v ležatém a visutém více méně k lupkům při-  
ati. Uhlí samo se hodí málo k technickému upotřebení; jednotlivé vrstvy jeho  
ž střídají se tak často s lupky, že vlastní mocnost uhlí tím velmi trpí. Vrstvy  
f ale samy v sobě jsou dosti často pěkné, čisté uhlí lesklé, černé barvy a s krych-  
itým směrem puklin; vždy ale jsou jen slabé mocnosti a jsou často mocnějšími  
tvami lupků od sebe odděleny.

Poměru lupků k uhlí v směru k severu vždy přibývá a stává se znenáhla  
ým, že uhlí konečně představuje jen souhrn lupků uhelných a tím zcela nepo-

třebným se stává, kdežto uhlí, v jižnější části dobyté, arci po částečném vyloučení lupku ve vápenkách dosti hojně se upotřebuje. Ještě více převládá lupek v nejsevernější části sloje uhelné u Hýskova.

Při dobývání v Líseckých dolech láme se uhlí vzdor tomu, že jen v slabých vrstvách přichází, následkem spoludobývání pevnějšího lupku hlavně ve velkých kusech, které i po delším ležení na vzduchu v drobné uhlí se nerozpadají.

Opuky, v sloj uhelnou vložené, nejsou nikoliv tak stálé, že by sloj celou v jistých obzorech provázely a zvláštní povahou se všude opět poznat daly. Naopak jsou velmi nepravidelně rozděleny a nemají v rozšíření svém stálé mocnosti a jsou brzo slabší brzo mocnější, někdy se i zcela vyklínají. Sloj podává všude obraz nepravidelného sledu lupků a pásem uhelných.

Podobné vlastnosti, zdá se, že měla též sloj uhelná, jež byla v malé, samostatné pánvičce jižní uložena, což se ovšem nyní nedá více pozorovat, ale z velkého množství lupku listnatého, s nímž se na hojných roztroušených hromádách (haldách) zde setkáváme, dá se soudit, že i v této sloji přehojně vyvinut byl. Sloj tato měla mít 9 stop mocnosti.

Zvláštnost uhelné sloje Lísecké jest nemalý počet zbytků rostlinných, jež lze na vrstvách této pozorovat. Ačkoliv se nacházejí z největší části v stavu zrušení a vtažení, čímž se stává určení obtížné, i někdy nemožné, přece jest dosti často možné a poznány mezi zřetelněji udrženyými otisky, co převládající, *Sigillarie*, *Stigmarie*, *Lepidodendra* a *Kalamity*; vzácnější jsou *Asterophyllity*; kapradě se neobjevily.

Možno, že tyto, při jemnějším tvaru svém, nebyly schopny zuhelnění přetrvati: přece ale jest přicházení otisků z prvnějších řádů pamětihodno a ukazuje k tomu, že rostliny stromovité k nim náležející značného podílu na květeně v době ukládání se Lísecké uhelné sloje braly.

*Sigillarie* přicházejí většího dílu, jako i na jiných místech, mezi vrstvami uhelnými více méně v neúplném stavu a jsou hlavně na rovnoběžném ryhování otisků kárových k poznání. Z určitelných otisků jest *Sigillaria angusta* Brgt. nejhojnější druh. Z řádu *Lepidodendrei* přichází nejhojněji *Sagenaria aculeata* Stbg. a *Lepidodendron dichotomum* Stbg., neřídka objevují se též otisky rodu *Halonias regularis* Lindl. et Hutt., vyznačené velkými, kulatými, v spirálách rozestavenými jizvami. — Nejhojněji ale ze všech zbytků rostlinných nachází se *Stigmaria ficoides* Brgt.; někdy jest výtečně zachovalá, někdy jen při zvláštní pozornosti lze jej poznati, jak v uhlí, tak v čistém lupku otiskem. Na vrstvách uhelné sloje pozorovány mimo to *Calamites*, *Asterophyllites* a *Selaginites*.

Třebať se otisky rostlinné v sloji uhelné nalézají hlavně v Líseckých dolech, nescházejí přece také na jiných místech docela. Hlavně stopy *Stigmarie* a *Sigillarie* lze všude pozorovati, kde máme přístup k vrstvám sloje uhelné a musíme to hlavně na takových místech připisovati zvětrání lupku uhelného, že jen zřídka takových otisků nalézáme. — Též na výchozí uhelné sloje u Hýskova a na haldách zde vyvezeného lupku nalézáme otisky, hlavně *Stigmarie* v také mře, že musíme přijmouti rozšíření tohoto druhu po celé pánvi uhelné v hojných exemplárech.

Mezi lupky, jež uhelnou sloj prostupují, jest mnoho jednotlivých vrstev, jež jsou silně železité, sferosideritické. Přijímají dílem sami přiblížené sferickou

podobu, alespoň tak dalece, jak vrstvy přijímají čočkovité obrysy a dílem uzlovitými se stávají. Též v těchto železitých lupcích jsou dosti často zbytky rostlinné obsaženy. Na haldách zbarvují se takovéto lupky znenáhlym okysličováním červeně a lze je pak lehce poznati.

Mezi vrstvami uhelnými nalézají se často kým železný vtroušen a nezřídka jsou pukliny malými plochými krystaly sádry, co nového výrobku, pokryty.

Vzhledem jak k tvaru hornin ve vrstvách, tak i k druhům, obsažených zbytků rostlinných může se lože Lísecké ve dvě skupení rozdělit. Z těchto nemá spodní žádné sloje uhelné, sestává hlavně ze slepencovitých pískovců a obsahuje květeny, v níž kapradě převládají, jak již Ettingshausen ve své floře Stradonické uvádí; svrchní skupení jest naopak složeno z jemnozrných hornin, v nich se zdá, že hrubé šterky úplně scházejí a jest bohaté na Stigmarie, Sigillarie a Lepidodendrovitě rostliny, tak že kapradě jsou podřízené.

K tomuto skupení musí se též přičítat malá samostatná pánvička na jižním svahu hřebene Líseckého uložená. Sloj zde uložená byla pokryta jen něco písčítými lupky v nepatrné mocnosti 3 sáhů, a nikde není pozorovati stopy slepenců, ba ani pískovců. Též základ uhelné sloje byly zde lupky, jež spočívaly bezprostředně na silurských vrstvách křemencových. — V lupcích, jež se ještě sem tam na haldách nalézají, poznány, ač špatně zachovalé, přece ještě znatelné úlomky Stigmarie, Lepidodendra a stopy Sigillarie, což též svědčí pro vyšší polohu vrstev těchto. Kapradě nebyly nalezeny.

Z obou těchto skupení jest spodní, starší, mnohem rozšířenější než svrchní, jež sloj obsahuje, jak již ohraničení sloje této naznačuje; hlavně jsou vrstvy tohoto skupení v západní části pánve odkryty, kdežto ve východní části se hlavně s vrstvami svrchního skupení na povrchu setkáváme. Tak náleží vrstvy v lomech u Dibří, lomy v dolejší části západní rokle Stradonické, jakož i lomy v části pánve západně od Hýskova k skupení slepenců. — Jen v části pánve, jež se k myslivné Lísecké rozprostírá, nevycházejí vrstvy tyto na den; tento díl zaujímají pak pískovce svrchního skupení, jež též v Líseckém lomu na západním kraji pánve odkryty jsou a jelikož bezprostředně na vrstvách silurských spočívají, vrstvy spodního skupení přesahují. — Naproti tomu pak náleží vrstvy, jež východně od myslivny Lísecké na den vycházejí, jakož i ony u Zlejciny a u Hýskova, tedy ve východní části pánve, vesměs svrchnímu skupení zároveň s uhelnou slojí.

Přerušení vrstev v oboru pánve Lísecké nescházejí úplně a lze je pozorovati jak na sloji uhelné, tak na ostatních vrstvách. — Poznati je lze hlavně z přesmyků vrstev; však při nedostatku dosti odkrytých prostor a stěn lze je jen v úlomcích pozorovati, aniž by se mohly ve všech výjevech v celé rozsáhlosti sledovat. — V celku ale nezdají se přerušení v pánvi této značnými a nezpůsobila žádných značných změn. — Přesmyky, jak se obyčejně v dolech Líseckých pozorují, jsou jen nepatrné a i na jiných jsou přesmyky v jednotlivých vrstvách jen zřídka značnější. — Jeden přesmyk vyskytuje se něco nad středem východní Stradonické rokle. Trochu hlinitý, na slídu bohatý, písčítý lupek, jenž se blízko pod uhlím nalézá, jest zde totiž tak uložen, že by při pokračování od severu k jihu oproti zapadání uhelné sloje na touto ležet musil, v kterou polohu jen pozdějším přerušením částí, jež dříve souvisely, se dostati mohl. Směr přesmyku



nelze pro svah drnem a krovím obrostlý poznati. Ale nad vyšší severní částí vrstev nenalézají se více sloje uhelné a zdá se, že poměr tento spolu přispěl k scházení sloje uhelné v části blíže řeky na pravém jejím břehu uložené, jelikož zvýšené části uhelné sloje a visutého lehčeji odemlety býti mohly.

Mimo to ale jsou pukliny kolmé v lavicích dosti hojné jak ve vrstvách nad uhelnou slojí tak i pod ní; nezdá se, že jsou vyplněny hydratem železitým.

Těž stlačeniny následkem nerovnosti vlnitých vyvýšenin základní horniny se vyskytují a podmiňují místní zmenšení mocnosti následující vrstvy. Na jednom místě v Zlejcinské rokli lze takové zmenšení v mocnosti sloje uhelné pozorovati. Zde se zdá, že se vrstvy uložily nad částí ležatého, jež hrbolovitě se vyvýšila, s ní stejnosměrně, ale k výši s ubývající mocností, čím mocnost v pravo a v levo od vyvýšeniny nad ní značně se zmenšila, tak že sloj uhelná na povrchu méně vypouklou čáru tvoří než na půdici. Tato vypouklina pískovců svědčí buď o nestejném uložení hornin v jisté prostora aneb o nestejném přerušení dříve usazených vrstev, jež se již před počátkem ukládání sloje uhelné dalo.

Ve východní Stradonické rokli setkáváme se mimo to ještě s jiným výjevem. — Na dvou místech, hlavně ale na dolejší z nich, přechází pískovec zpodního skupení v horninu skoro hustou, křemitou, v níž jednotlivá zrna skoro úplně mizí a jež napadá nejen pevností svou, nýbrž i tím, že jest prostoupena hojnými puklinami, jež potaženy jsou hustým rohovitým, hnědě zbarveným křemitým povlakem.

Celá hmota pískovcová jest zde více celistvá, balvanitá, nežli vrstevná a plochy puklin ukazují, hlavně na dolejší místě, mnoho rovnoběžných ryh a vrásek, čímž tvoří plochu sesutí, jako by byly bývaly vydány tření povstalému pohybem hmot po sobě.

Tato, více křemitá hornina, nalézají se mezi ostatními vrstvami pískovcovými skoro chodbovitě a zdá se, že byla vydána měničím vlivu mezi rovnoběžnými puklinami, jimiž jest od ostatní horniny odloučena. Rýhy na plochách sesutí mají směr k západu. Na hořejším místě jest hornina vyznačena jen větší tvrdostí a mizivým zrnitým tvarem, nelze jí ale tak dobře pozorovati, jelikož v menší míře odkryta jest. U obou míst tvoří na podloze rokli se nalézající vodoteč příkré svahy. — Jak daleko obě tyto křemité stěny zasahují, nedá se určitě zjistit; přece ale zdá se, že hořejší zasahuje až do Zlejcinské rokli a tím tedy až na východní hranici pánve, kde můžeme v stejném směru podobnou stěnu pozorovat. Na této nalezen jednou vyloučený leštěnec antimonový.

Přehledneme-li nyní pánev Líseckou, dle jednotlivosti vyličenou, tu zůstanou pamětihodny: hlavně úzká, podélná poloba směrem od severovýchodu k jihozápadu, patrné rozdělení vyplňujících ji vrstev ve dvě skupení, ve zpodní, bezuhelné a svrchní, uhelné: pak znenáhla vystupující zhoršení se sloje uhelné v směru od jihu k severu zvětšeným přibýváním hlinitých opuk.

Nemenší pozornosti zasluhuje pánev tato dosti značným počtem organických zbytků, jež na poměrně malém, již zaujatém prostoru se vyskytují, a oběma organickým řisím náležejí. — Objevily se sice mezi nalezenými zbytky teprve dva zvířecí otisky, ale považíme-li, že zbytky zvířat v českém útvaru uhelném vůbec k vzácnostem patří, musíme pánev Líseckou, v které dva, již posud zvláštní druhy

nalezeny, v tomto ohledu k přednějším čítati. — Jednotlivé druhy, jež ve vrstvách  
 Lisecké posud nalezeny, jsou v následujícím seznamu obsaženy.

### A. Zvířata.

1. *Gompsonychus parallelus* Frič. Jest to korýš, jenž dříve považován za totožný s druhem *Gompsonychus fimbriatus* Burm.; dle zkoumání p. dr. Ant. Friče ale objevil se co nový druh a nazván *G. parallelus*. -- Nalezen byl v lomech u Dibří (viz přírodovědecký časopis „Lotos“ 1859: Joh. Krejčí, „Eine neue Crustacee aus der böhm. Steinkohlenformation“).
2. *Acridites priscus* Andrae. Křídélko kobylky z lupků u Stradonic. Viz „Leonhard & Brown Jahrbuch 1864“.

### B. Rostliny.

#### I. *Equisetaceae*.

1. *Calamites Suckowi* Bgt. Nezřídka u Dibří, na Lísku, u Zlejciny, též z lupků ve visutém u Hýskova, pak u Stradonic.
2. *Calamites approximatus* Schloth. Nalezen na Lísku a v slepencích v Stradonické rokli.
3. *Calam. cannaformis* Schloth. V slepencích u Stradonic a na Zlejcíně, jakož z pís-kovečů ve visutém u Hýskova.
4. *Calamites Cisti* Bgt. Jen v úlomech ze slepenců u Stradonic.
5. *Cyclodadia major* Lindl. & Hutt. V jednotlivých otiscích na lupku z Lísku a Dibří.
6. *Huttonia spicata*. Stbg. Malý úlomek, jenž ale přece nejlíp k tomuto, od Sternberga popsanému druhu se připojit dá, nalezen v lupcích. jež v rokli Zlejcinské nad slojí uhelnou na den vycházejí.

#### II. *Asterophylliteae*.

1. *Asterophyllites grandis* Stbg. sp. *Volkmannia gracilis* Stbg. *Bechera grandis* Stbg. Většího dílu v úlomech stonků, ale též v plodných klasech u Zlejciny, Hýskova, na Lísku, jakož v lupcích u Dibří.
2. *Asterophyllites rigidus* Stbg. U Hýskova, Zlejciny a Dibří.
3. *Asterophyllites longifolius* Stbg. Zřídka u Hýskova a Dibří.
4. *Asterophyllites foliosus* Ldl. & Hutt. *Bechera Dubia* Stbg.; *Asterophyllites gallioides* Ldl. & Hutt. Z lupků u Hýskova a u Stradonic. Hlavně na prvním místě hojně a v pěkných exemplárech.
5. *Annularia longifolia* Bgt. V lupcích u Stradonic a Dibří dobře zachovalá, nezřídka. — Vedle stonků s vřeteny listovými přicházejí též plodné klasy, popsané co *Bruckmannia tuberculata* Stbg. Stopy tohoto druhu nalezeny též u Hýskova.
6. *Sphenophyllum Schlotheimi* Bgt. Dostí zřídka v lupcích u Stradonic a z visu-tého u Zlejciny a u Hýskova.

15. *Pinnularia capillacea* Ldl. & Hutt. Otisky, jež dle zjevu svého nejlíp tomuto, od Lindl. a Hutt. ve fossilní flóře Britt. na tab. 11 vyobrazenému druhu připojiti se dají, objevily se několikráte v hlinitolupkovitých vrstvách visutých u Hýskova: vzácněji u Stradonic.

### III. Filices.

16. *Sphenopteris coralloides* Gutb. *Sphenopteris Heidingeri* Ettgsh. Druh tento jest dosti hojný v lupcích u Stradonic, jakož i u Dibří.
17. *Sphenopteris decipiens* Lesqx. U Stradonic v lupcích, jen v několika exemplárech.
18. *Sphenopteris obtusiloba* Bgt. V několika úlomech u Zlejciny.
19. *Sphenopteris tridactylites* Bgt. U Stradonic zřídka.
20. *Sphenopteris macilenta* Ldl. & Hutt. *Sphenopteris lobata* Gutb.: vzácná. Exempláry u Stradonic a Dibří nalezené blíží se více vyobrazením, jak je Gutbier podal.
21. *Sphenopteris Hönighausi* Bgt. *Sphen. Hönighausi* Ldl. & Hutt. tab. 204. Z lupku u Stradonic, vzácná, ale ve velmi dobře zachovalých exemplárech.
22. *Sphenopteris meifolia* Stbg. Dost hojna v lupcích u Zlejciny nad slojí uhelnou.
23. *Sphenopteris Bronni* Gtb. *Sphenopteris intermedia* Ettingsh. Vzácná u Stradonic.
24. *Sphenopteris irregularis* Stbg. *Sphenopteris trifoliata* Bgt. Z lupků Stradonických.
25. *Sphenopteris muricata* Schloth.: vzácná, též od Stradonic.
26. *Sphenopteris Asplenites* Gtb. *Asplenites elegans* Ettingsh.; u Hýskova v lupku: vzácněji u Dibří; velmi hojný, někdy ve velmi dlouhých větvích, v lupcích u Stradonic: zde nejobyčejnější otisk.
27. *Sphenopteris* n. sp. Posud neurčený druh, jenž se vyskytl pouze v jednom exempláru a s žádným již známým druhem se spojit nedá.
28. *Hymenophyllites furcatus* Bgt. sp. *Sphenopteris acutiloba* Stbg. V několika exemplárech z lupku Stradonických známy. Úlomky též u Zlejciny.
29. *Hymenophyllites quercifolius* Göpp. Jediný otisk z lupků u Zlejciny, jenž se nejlíp na tento Göppertem popsáný a vyobrazený druh vztáhnouti dá. (Göppert: die fossilen Farrenkräuter; tab. XIV., fig. 1., 2.).
30. *Asplenites Reussi* Ettingsh. Dost hojný v Stradonických lupcích; (Ettinghausen: „die Steinkohlenflora von Stradonic in Böhmen“ tab. I., fig. 8., 9.).
31. *Schizopteris Gutbieriana* Presl. Vzácná u Stradonic, taktéž u Zlejciny.
32. *Schizopteris caryotoides* Stbg. *Palmacetes caryotoides* Ettgsh. Též u Stradonic; dosti vzácný otisk.
33. *Cyclopteris tenera* Ettingsh. V jednotlivých úlomech z lupků u Stradonic. (Ettingshausen: „Steinkohlenflora v. Stradonic in Böhmen,“ tab. I., fig. 5.).
34. *Cyclopteris rhomboidea* Ettgsh. Dost hojná u Stradonic, hlavně v žlutavé odrudé lupků; (Ettingshausen: „Steinkohlenflora von Stradonic in Böhmen,“ tab. II., fig. 5.).
35. *Cyclopteris varians* Gutb. V jednotlivých exemplárech nalezen u Dibří.

6. *Adiantites giganteus* Göppt. Neznalý exemplár, jenž nejlíp souhlasí s *Adiantites giganteus* u Göpperta v jeho: „Fossile Farrenkräuter“ tab. VII., nalezen u Stradonic.
7. *Neuropteris acutifolia* Bgt.; Bgt.: Histoire de végét. foss. tab. 64., fig. 6. Geinitz: „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“ tab. 27, fig. 8; vzácná u Stradonic; hojná v lupcích u Dibří.
8. *Neuropteris angustifolia* Bgt. Brongnt: Hist. de végét. foss., tab. 64, fig. 3, 4. U Dibří, dosti vzácná.
9. *Neuropteris Loshi* Bgt. Nalezena u Stradonic, častěji u Dibří.
10. *Neuropteris gigantea* Stbg.; jak u Stradonic tak u Dibří a u Zlejciny v lupcích; není hojná.
1. *Neuropteris tenuifolia* Bgt.; Histoire d. végét. foss. tab. 72. fig. 3. V lupcích u Stradonic a u Hýskova ve vzácných úlomcích.
2. *Neuropteris flexuosa* Stbg. Jednotlivé lístečky druhu tohoto objeveny u Dibří.
3. *Neuropteris coriacea* Ettingsh. „Steinkohlenflora von Stradonic in Böhmen“ tab. II., fig. 4. U Stradonic a též sem tam u Hýskova a u Dibří v lupcích.
4. *Odontopteris Reichiana* Gutb.; „Abdrücke und Versteinerungen“, tab. IX. fig. 7; v dosti hojných, dobře zachovalých exemplárech z lupků u Stradonic a u Dibří, zřídka u Zlejciny.
5. *Odontopteris Böhmi* Gtb. l. c., tab. IX., fig. 12, zřídka se objevila u Stradonic.
6. *Odontopteris Schlotheimi* Gtb.; l. c. tab. IX., fig. 6. Jediný úlomek druhu tohoto nalezen v lupcích u Stradonic.
7. *Odontopteris britannica* Gtb., l. c. tab. IX., fig. 8, 9, 10, 11. Známa ve více exemplárech ze Stradonic a od Dibří.
3. *Lonchopteris rugosa* Bgt. Objevila se ve více, dílem velmi pěkných exemplárech u Stradonic.
1. *Dictyopteris Brongniarti* Gutb. „Abdrücke und Versteinerungen“ tab. XI, fig. 7, 9, 10. Geinitz: „Die Versteinerungen d. Steinkohlenformationen v. Sachsen“, tab. XXVIII., fig. 4, 5. Jednotlivé lístečky u Stradonic.
1. *Dictyopteris neuropteroides* Gtb. *Neuropt. squarrosa* Ettingsh. Geinitz: „Versteinerung der Steinkohlenformationen v. Sachsen“, tab. XXVIII., fig. 6. Hojnější než předešlá u Stradonic, u Dibří a u Hýskova.
1. *Cyatheites arborescens* Schloth. Druh tento vyskytl se dosti hojně u Dibří a Stradonic. Exempláry s plodními větví nejsou docela vzácné.
2. *Cyatheites dentatus* Brgt. „Histoire de végét. foss.“ tab. 121, 122, 123, *Cyatheites plumosus*, *Cyatheites silesiacus*, *Cyatheites dentatus* Göpp. Z lupků u Stradonic, jakož i z lupků ve visutém sloje u Zlejciny.
3. *Cyatheites Miltoni* Artis sp. Z lupků u Dibří, zřídka. Hojněji u Zlejciny v lupcích visutého sloje uhelné.
1. *Alethopteris Serli* Brongnt., Histoire de végét. foss., tab. 85; zřídka v lupcích ze Zlejciny.
1. *Oligocarpia Guthieri* Göppt. V Geinitz: „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“, tab. XXXIII., fig. 6, 7; tab. XXXV., fig. 9. Jest dosti hojný otisk u Stradonic v lupcích, mezi *Sphenopteris asplenites*.

### Kapradě stromovité.

56. *Caulopteris Cisti* Bgt. sp. *Sigillaria Cisti* Bgt. tab. 100, fig. 2. Geinitz: „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen tab. 34, fig. 1, 2. Jednotlivé, neznale zachovalé otisky, jež zajisté k nějaké *Caulopteris*, nejspíše pak ke *Caulopteris Cisti* Bgt. náležejí, vyskytly se ve vrstvách nad uhlím v západní rokli Stradonické, jakož i u dolů Líseckých.

### IV. *Lycopodiaceæ*.

57. *Lycopodites Selaginoides* Stbg. V jednotlivých nepatrných úlomcích z lupků u Zlejciny a v jednotlivých stopách na Lísku.
58. *Selaginites Erdmanni* Germ., tab. 26. Geinitz: „Verstein. der Steinkohlenf. von Sachsen“, tab. I, fig. 5—6. Trochu neznalý otisk z Lísku.
59. *Sagenaria (Lepidodendron) elegans* Stbg. sp. *Lepidodendron lycopodioides* Stbg. I., V. tab. XVI, fig. 1, 2, 4. Dosti hojná na Lísku v korových otiscích a klasu podobný konec součku v lupcích u Hýskova.
60. *Lepidodendron dechotomum* Stbg. Otisky korové na Lísku z lupků ve visutém sloje uhelné a u Zlejciny.
61. *Sagenaria aculeata* Stbg. V jednotlivých dobře zachovalých otiscích na lupcích v uhelnou sloji na Lísku vložených.
62. *Bergeria quadrata (rhombica)* Presl v Sternberg: Vers. II., tab. 68, fig. 19. Znalý exemplár otisku korového tohoto druhu vyskytl se na lupcích visutého sloje uhelné v dolech Líseckých.
63. *Aspidiaria undulata* Stbg. Vers. I. tab. X. fig. 2. Otisky druhu tohoto nacházejí se sem tam roztroušené v lupcích visutého sloje uhelné na Lísku.
64. *Lepidostrobus variabilis* Ldl. & Hutt. Plodné klasy, jež přináležejí rodu *Lepidodendron*, byly dosti často nalezeny, jak v lupku visutého sloje uhelné na Lísku, tak i, ač vzácněji, v lupcích u Stradonic.
65. *Lepidophyllum majus* Bgt. Otisky druhu tohoto, z větší části ne zcela zřetelně zachovalé, vyskytly se v lupcích sloje uhelné na Lísku, vzácněji u Zlejciny.
66. *Lepidophlojos laricinum* Stbg. (*Lepidodendron laricinum* Stbg.) Nalezen v několika exemplárech na lupcích visutého sloje uhelné u Zlejciny.
67. *Halonia regularis* Ldl. & Hutt. Druh tento přichází dosti často; z větší části se zrušeným otiskem korovým, vždy ale zřetelně zachovalými otisky jizvovými, ve větších neb menších úlomcích na lupcích, jež uhelnou sloj na Lísku prostupují.

### Plodové šupiny *Lycopodiaceæ*.

68. *Cardiocarpon orbiculare* Ettingsh.: „Steinkohlenflora von Stradonic in Böhmen tab. VI. fig. 4.“ *Cardiocarpon marginatum* Artis sp. Z lupků u Stradonic a Dibří, nezřídka.
69. *Cardiocarpon Guthieri* Gein. „Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“ tab. XX. fig. 23—25. V jednotlivých exemplárech u Dibří.

*Carpolithes corculum* Stbg., Vers. I. tab. 7. fig. 6. Jednotlivé otisky plodové šupiny této nalezeny v lomech u Dibřf.

#### V. *Sigillarieae*.

*Sigillaria angusta* Brgt.: Histoire do végét. foss. tab. 149. fig. 3. Dosti hojná na lupcích se slojí uhelnou se střídajících v Líseckých dolech.

*Sigillaria alternans* Stbg. Vers. I. tab. LVIII. fig. 2. Geinitz: „Verstein. d. Steink. von Sachsen“ tab. 8. fig. 3. Vzácnější, na lupcích z Lísecké sloje uhelné.

*Sigillaria catenulata* Ldl. & Hutt. Flora foss. of grt. Brtt. tab. 58. V jednotlivých exemplárech z Lísku.

*Sigillaria distans* Gein.: „Verstein. der Steinkohl. von Sachsen“ tab. VIII. fig. 4. Jeden exemplár nalezen v lupcích visutého sloje uhelné u Zlejcin.

*Sigillaria oculata* Schloth. Syringodendron complanatum Stbg. Vers. I. tab. XXVI. fig. 1. Geinitz: „Verstein. der Steinkohl. v. Sachsen“ tab. V. fig. 10—12. Kousek kmene druhu tohoto z lupků u Hýskova.

*Stigmara ficoides* Bgt. Velmi hojná; všude, kde se sloj nalézá, na vrstvách nad a pod ní u Stradonic, Zlejcin, Lísku a u Hýskova.

#### VI. *Gramineae*.

*Graminites Volkmanni* Gein. *Calamites Volkmanni* Ettgsh. „Steinkohlenflora v. Stradonic in Böhmen“ tab. V. fig. 1., 2., 3., 4. tab. VI. fig. 1. Tento druh, jež Ettingshausen čítal ku *Calamites*, Geinitz ale ke *Graminites* staví, kam bezpochyby dle útvaru klasu náleží, vyskytl se ve více otiscích v lupcích u Stradonic.

*Antholithes triticum* Ondr. Též i tento otisk, jenž též klas představuje, přináleží nejspíše *Gramineae*. Několik otisků, jež dle toho, zdali konci klasu neb počátku přináležejí, rozličné vzezření ukazují, nalezeno v lupcích u Stradonic a u Hýskova.

*Antholithes Pictairniae* Ldl. & Hutt. The fossil flora of gr. Britt. tab. 82. Exemplár, jenž se jen s oním u Lindleye pod tímto jmenem popsaným a vyobrazeným porovnávati dá a kterému jest velmi podobný, nalezen v lupcích u Stradonic.

Jelikož posud není zjištěno, ku kterému řádu tento druh náleží, ponechal jej prozatím u *Gramineae*.

#### VII. *Nöggerathieae*.

*Nöggerathia Beinertiana* Göpp. „Gattungen fossiler Pflanzen V., VI. Tab. XII, fig. 3. Druh tento objevil se posud v jediném exempláři u Stradonic.

*Cordaites borassifolia* Ung. Listy druhu tohoto objevují se buď jednotlivě, neb ve vějířích, větším dílem ale jen v úlomcích roztroušené v lupcích, ve vrstvy slepencové vložených, jak u Hýskova, tak u Stradonic a Dibřf.

*Artisia transversa* Stbg. *Sternbergia approximata* Ldl. & Hutt. Tab. 224 a 225. Tyto zbytky rostlinné, jež se považují za dřen druhu předešlého, při-

cházejí velmi často, jak v lupcích skupení slepenců, tak i v těchto samých, pak obyčejně slabou vrstvou uhelnou obklopeny; druh tento jest obyčejně kulatý neb více méně ovální, nikdy ale zplosklý, jak to obyčejně v lupcích bývá. — Povrch není nikdy hladký, nýbrž buď více, buď méně příčně zvráštělý neb podél rýhovaný. U Stradonic, Hýskova a Dibří.

### VIII. Coniferae.

83. *Araucarites carbonarius* Göpp. Též sloj uhelná na Lísku obsahuje často slabé vrstvičky vláknitého Anthracitu, rozličně roztroušeného, v němž při drobnohledném zkoumání dupkovité buňky seznati lze, čímž jest přicházení tohoto druhu mezi zbytky rostlinnými v pánvi Lísecké úplně stvrzeno.

Z 83 druhů organických zbytků, jež jsme v předešlém seznamu uvedli, náleží tedy 81 výhradně rostlinstvu. V tom jest z 30 druhů, jež dřívější autorové uvádějí, jen 27 obsaženo; neuveden totiž dřívější *Chondrites Goppertianus* Ettingsh., což jest velmi pochybný druh, nejspíše bezlistný vějíř kapradový, pak *Annularia sphenophylloides* Znk. (již Andree uvádí, ale jež se po zkoumání originálu co *Antholithes triticum* Andr. osvědčila) a *Cyatheites aequalis* Brgt., jenž dle porovnání původního exempláře není nic jiného než *Cyatheites dentatus* Bgt.

Z příčiny této jest tedy počet u Stradonic nalezených otisků 46 na místě 49, jak bylo v časopise „Lotos“ z roku 1869 na stránce 51 uvedeno. Tam totiž považovány ještě tyto tři jinými autory uvedené druhy za samostatné.

Oba zbytky zvířecí nalezeny na lupcích náležejících spodnímu skupení slepenců.

Z 81 druhů rostlinných, jež až posud poznány, přináleží 60 soujmu lupků, pod sloji uhelnou uložených, 36 pak sloji uhelné a vrstvám nad ní. Z těchto mají spodní a svrchní skupení 15 druhů společných a má tedy spodní skupení 45, svrchní jen 21 druhů zvláštních. Z 60 druhů, v spodním skupení nalezených, přináležejí 4 druhy slepencům, 58 pak lupkům a mají obě tyto horniny dva druhy společné.

Zpodní skupení tedy jest na druhy rostlinné mnohem bohatší. Však nestává podobného poměru vzhledem k hojnosti otisků těchto druhů, jelikož přicházejí v lupcích v sloji uhelné a nad ní často u veliké hojnosti, ano místy vyplňují vrstvy skorem úplně, kdežto ve vrstvách spodního skupení jen porůznu, sem tam arci hojněji, vždy ale roztroušeně přicházejí, někdy po velkých prostorách však skoro úplně scházejí. K tomu jsou ještě druhy ze spodního skupení uvedené větším dílem jen velmi vzácné, některé objevily se jen jedenkrát a můžeme k tomu poukázat, že zrovna tyto lupky spodního skupení to byly, jež po dlouhá leta tak často prohledány a prozkoumány byly, kdežto se to u lupků v sloji uhelné a na ní teprve novějšího času dalo, tak že při dalším ještě zkoumání vrstev těchto na rozličných místech zajisté ještě větší bohatství druhů očekávati se dá.

Další zvláštnost pamětihodná jest ještě ta, že jednotlivé druhy na některých místech velmi hojně, skoro výhradně se objevují, kdežto v krátké zcela vzdálenosti

nepřichází aneb alespoň vzácností jsou, tedy na některých místech výhradně ují, jak na př. *Sphenopteris asplenites* Gutb. a *Cyclopteris rhomboidea* . v dolejším konci západní rokle Stradonické.

k na příklad určeny z 181 nalezených zde exemplářů, jež v poměrně krátké na tomto místě sebrány byly, následující druhy:

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <i>Sphenopteris asplenites</i> Gutb. . . . .     | 59 kusů |
| <i>Cyclopteris rhomboidea</i> Ett. . . . .       | 43 „    |
| <i>Oligocarpia Gutbieri</i> Göpp. . . . .        | 25 „    |
| <i>Odontopteris Reichiana</i> Gutb. . . . .      | 18 „    |
| <i>Sphenopteris coralloides</i> Gutb. . . . .    | 8 „     |
| <i>Cordaites borassifolia</i> Stbg. . . . .      | 6 „     |
| <i>Cardiocarpum orbiculare</i> Ett. . . . .      | 6 „     |
| <i>Dictyopteris neuropteroides</i> Gutb. . . . . | 5 „     |
| <i>Annularia longifolia</i> Bgt. . . . .         | 2 kusy  |
| <i>Neuropteris gigantea</i> Stbg. . . . .        | 2 „     |
| <i>Neuropteris coriacea</i> Ett. . . . .         | 2 „     |
| <i>Neuropteris Loshi</i> Bgt. . . . .            | 1 kus   |
| <i>Lonchopteris rugosa</i> Bgt. . . . .          | 1 „     |
| <i>Graminites Volkmani</i> Ett. . . . .          | 2 kusy  |
| <i>Antholites triticum</i> And. . . . .          | 1 kus   |

*Sphenopteris asplenites* a *Cyclopteris rhomboidea* se skoro vzájemně vylučují, ostatní druhy rozličně roztroušeny se objevily.

Podobná přehledka rodů při sbírce rostlinných zbytků z lupků visutého sloje na Zlejcíně vykazala následující výsledek :

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <i>Cyatheites dentatus</i> Bgt. . . . .        | 25 kusů |
| <i>Sphenopteris meifolia</i> Stbg. . . . .     | 13 „    |
| <i>Cyatheites Miltoni</i> Art. sp. . . . .     | 12 „    |
| <i>Asterophyllites rigidus</i> Stbg. . . . .   | 9 „     |
| <i>Sphenophyllum emarginatum</i> Bgt. . . . .  | 7 „     |
| <i>Neuropteris gigantea</i> Stbg. . . . .      | 6 „     |
| <i>Lepidodendron dichotomum</i> Stbg. . . . .  | 6 „     |
| <i>Sphenopteris obtusiloba</i> Bgt. . . . .    | 4 kusy  |
| <i>Calamites Suckowi</i> Bgt. . . . .          | 3 „     |
| <i>Odontopteris Reichiana</i> Gutb. . . . .    | 3 „     |
| <i>Stigmaria ficoides</i> Bgt. . . . .         | 2 „     |
| <i>Huttonia spicata</i> Stbg. . . . .          | 1 kus   |
| <i>Lepidophyllum majus</i> Bgt. . . . .        | 1 „     |
| <i>Schizopteris Gutbieriana</i> Presl. . . . . | 1 „     |
| <i>Hymenophyllites furcatus</i> Bgt. . . . .   | 1 „     |
| <i>Asterophyllites grandis</i> Stbg. . . . .   | 1 „     |

Proti nestejnému počtu v obou skupeních Lísecké pánve nalezených a na zvláštních druhů jest rozdílnost, v jaké řady, k nimž jednotlivé tyto rostlinné přináležejí, v každém z těchto skupení zastoupeny jsou, pamětihodná. Z 21 druhů, svrchním vrstvám zvláštních, náleží 9 druhů *Lycopodiaceis*



5 druhů *Sigillarií*m, rovněž přichází *Araucarites* jen ve vrstvách tohoto svrchního skupení.

Jelikož posud v celku, vyjma některá, ještě k neznámým druhům náležející semena, 11 druhů *Lycopodiaceí* a 6 *Sigillarií* z pánve Lísecké určeno býti mohlo, vysvítá, v jaké převaze zbytky těchto stromovitých rostlin se jen na svrchní vrstvy obmezují. Tento převládající poměr objeví se ještě jasněji, pomyslíme-li, že *Lycopodiaceae*, ze spodního skupení uvedené, jakož i *Sigillaria oculata*, posud jen po jednom neb alespoň jen ve velmi vzácných exemplárech nalezeny byly, kdežto jednotlivé druhy ve vrstvách svrchního skupení v hojných otiscích nad sebou a vedle sebe přicházejí.

Jednotlivé tyto úkazy druhů z uvedených řádů v spodním skupení nejsou nikterak s to, by braly vlivu na povahu květeny tomuto skupení zvláštní, jež hlavně z kapradin sestává, svědčí jen o tom, že při ukládání vrstev spodního skupení *Lepidodendreae* a *Sigillariae* úplně nescházely, ale že buď byly vskutku jen vzácné, neb že žily za takých poměrů, že málo přispívaly k zachování ve vrstvách, zároveň se ukládajících.

Jinak se má tento poměr v době ukládání se sloje uhelné a vrstev nad ní, kde bohatá květena *Lycopodiaceí* a *Sigillarií* vyvinuta byla, a hlavně *Stigmaria ficoides* všeobecně se rozšiřovala.

Pozorujeme-li ale při spodním skupení vrstvy slepencové s úlomky kmenů v nich zahalenými, jež ale větším dílem nejsou určitelné, a pomyslíme-li, že tyto zajisté jen stromovitým rostlinám z doby uhelné náležeti mohou, musíme soudit, že se scházení zbytků rostlinných z řádu *Lycopodiaceí* a *Sigillarií* může jen přepisovat způsobu, jakým se nám zachovaly, ne ale úplnému scházení ve květeně doby tehdejší. V skutku zdá se, že zbytky rostlinné v spodních vrstvách pánve Lísecké připravené jsou, a že z většího dílu nerostly na místě; zajisté platí to o úlomcích kmenů nepravidelně ve vrstvách slepencových zahalených a musí se tyto co dříví připravené považovat. Hrubozrná, nescíslné šterky obsahující hornina svědčí o větším proudu vod, jenž jedině tyto látky připravit mohl a kterým musily i tyto úlomky kmenové z dále zároveň připraveny býti. Tento silnější proud za doby usazování se spodních vrstev pánve vyznačuje se co po celé rozsáhlosti pánve činný a rozšířený, konglomeraty, jež všude základ pánve tvoří a v nich obsaženými úlomky kmenů. — Přece ale svědčí v těchto slepencích uložené lupky o pokojnějším pohybu vody, jenž časem nastoupil. Že tyto lupky stejnočasné a za stejných poměrů uloženy byly, o tom vydávají v nich obsažené zbytky rostlinné dostatečného svědectví.

Povaha převládání otisků kapradových a skoro úplné scházení zbytků z řádu *Lycopodiaceí* a *Sigillarií* spojuje lupky z Hýskova a Dibří nejúplněji. U Dibří a u Hýskova nalezené druhy k tomu ještě skoro vesměs nalezeny v lupcích u Stradonic.

Až do dnešního dne totiž známo od Dibří 27 druhů; od Hýskova z lupků spodního skupení 15 druhů, kdežto počet u Stradonic nalezených druhů 46 obnáší. Z těchto 27 u Dibří nalezených druhů jest ale 20 s oněmi od Hýskova a Stradonic, z 15 u Hýskova nalezených 13 s oněmi ze Stradonic a Dibří společných, tak že, jak u Hýskova, tak u Dibří, velmi málo samostatných druhů zbývá, jež

le, vyjma u Hýskova nalezenou Sigillarii, k řádům náležejí, jež i na obou ostatních místnostech zastoupeny jsou.

Jiná povaha vyznačuje se brzo ve vrstvách, jež sloj uhelnou tvoří a jež nad ní uloženy jsou. Již vlastnost jemnozrné, málo písčité hmoty, podobné více někdejšímu uložení bahnitému svědčí o zcela klidnějším pochodu při ukládání se těchto vrstev. Rovněž pak nacházejí se zbytky rostlinné nestejně hojně na tutéž vrstvu stěsnány a hornina sama jest jemnými částkami uhelnými proniknuta, takže v ohni ztrácí svou tmavou barvu.

Povaha zbytků rostlinných, mezi jimiž nepřevládají více kapradiny, nýbrž Lepidodendra, Sigillaria a Stigmarie, a jimž se přidružuje Araucarites, změnil se tím způsobem, že ihned upomíná na jiné podmínky, za kterých tyto uloženy býti musely, než jak to v spodním skupení vrstev se díti mohlo. — Vše ukazuje tomu, že větší část zachovalých zbytků rostlinných na tom místě růsti museli, kde je dnes bahnem, v lupek ztvrdlým, pokryty nalézáme.

Podobnému, a snad ještě klidnějšimu pochodu, zdá se, že děkuje na jižním svahu Líseckého hřebene uložené ložisko uhelné povstání své, u kterého celá povaha zbytků někdejších vrstev o velmi zmenšených bahnitých látkách svědčí, ač i celá pánvička rašelinovému uložení nasvědčovati se zdá.

Hojnost, v jaké v pánvi Lísecké zbytky Stigmarií a Sigillarií nalézáme, vyvolávají jí místo v pásmu Sigillariiovém dle prof. Geinitze, a časté a hojné vyskytování se otisků z uvedených rodů v sloji uhelné činí to pravdě podobným, že tyto rostliny značně k uložení sloje přispívaly, jež ale bylo často značným ukládáním bahna přerušeno, a tímto způsobem lupky tak značně znečištěno.

Těž toto střídání se nesčíslných vrstev lupkových s vrstvami uhelnými, jakož i časté vyskytování se Stigmarií a stop sigillariiových v nich, jsou zároveň dalšími důkazy k tomu, že sloj u Hýskova uložená k Lísecké sloji náleží, ačkoliv poměr vrstev uhelných k lupkovitým ještě o mnoho nepříznivější jest než na Lísku; ale již zde lze pozorovati znenáhle přibývání lupků v severním směru, tak že větší rovinnování se jich v další vzdálenosti nikoliv nesmí býti nápadným, k čemuž ostatně nalézáme obdobu na mnohých místech v slojích uhelných, v okolí Radničském uložených.

Jen místy uloženy na pánvi uhelné tvary diluviální, jež sestávají z vrstev písčivých a štěrkových a jen zřídka z hlíny. — Takové diluvium nalézáme za prvé na levém břehu řeky, na oustí údolíčka, jež se od Rabenberga v důli táhne. Jest dlelem na slepencích uhelných, dlelem na břidlici silurské, jež na západní hranici těchto vystupuje, uloženo.

Druhý podobný tvar jest mnohem výše, severně od Hýskova uložen, a vodotečí, jež od pahorku Kluka táhne a též uhelný útvar prorývá, odkryt.

Diluvium toto pozůstává hlavně z vrstev písčivých a štěrkových, jež se dlelem hlinitými stávají a vodorovné uložení mají. — Látky jsou velmi řídko spojeny, z většího dílu bez spojení a netvoří žádnou pevnou horninu. Jak úplné scházení kaolinových látek v směru tomto, tak i způsob, jakým jednotlivé horniny

mezi štěrky zastoupeny jsou, svědčí o tom, že látky k těmto vrstvám diluviálním nepocházejí ze zrušených vrstev pánve uhelné, nýbrž z vyšších vrstev oboru říčního připlaveny byly.

Kde jsou vrstvy pískové trochu pevnější, tu mají hlinitě-železitě vazivo, kteréž jednotlivá zrna písková spojuje. Vrstvy jednotlivé nemají žádné značné mocnosti a střídají se velmi často, tak že následují na vrstvy nejjemnějšího písku hned zas vrstvy štěrku, ačkoliv štěrky nejsou vždy obmezeny na zvláštní vrstvu, nýbrž i v písku jiných vrstev vtroušeny se nacházejí.

Tak nalézáme v stěně, nad Hýskovem odkryté zhora dolů,  
nejprve hlinitý písek,  
pak vrstvu štěrku,  
pak zcela jemný písek  
trochu hrubší písek,  
písek hrubého zrna a  
konečně opět vrstvu štěrku.

Štěrky sestávají z křemene rozličného druhu, dosti omletého, pak z úlomků břidlic, tyto často jen málo, jen na hranách omleté, z křemenců, z úlomků bulžnickových černé a červené barvy, často rohovitých, dále z červených a žlutých porfyrů, jež dílem patrně vtrusy chovají, dílem husté a stužkovitě rýhované jsou, z patrných diabazů, afanitů, z kusů rozličných pískovců i slepenců a jednotlivých úlomků žulových.

V afanitech přicházejí vtrusy, dílem již v hydrát železitý proměněné; diabazy nalézají se více méně v rozkladu, aneb jsou alespoň, jako některé štěrky břidlicové na povrchu slabou, hnědou vrstvou hydrátu potaženy, anižby rozklad hlouběji zasahal. V písku jsou mimo to často malé bílé lístky slídové přimísleny. Na severovýchodním svahu Kluk přikládají se na pánev uhelnou v směru k údolíčku Jakubinka dílem lože hlinitá. Taktéž vidíme na východu západní rokle Stradonické na uhelných pískovcích hlínu uloženu. — Hlína tato obsahuje dílem shluky vápnité, jak se s nimi vesměs v hlínách okolí setkáváme.

Již rozličným, z většího dílu vodorovným uložením vrstev náplavu dají se tyto lehce rozeznati od vrstev pánvi uhelné přináležících; kde by toto nemělo dosti patrné býti, tu poskytuje úplné scházení kaolinu v směsu hornin, jakož i řídké jich spojení, dostatečných známek rozdílových.

Již dříve zmínili jsme se o tom, že pánev byla vymletím dílem přerušena. Jednak proryla si řeka na příč pánvi cestu svou; jinak ale vyryly vody z oboustranných svahů odtékající rokle u Stradonic, u Zlejciny a pod Rabenbergem dosti hluboko ve vrstvy pánve uhelné; zároveň svezly se tímto balvany výše uložených hornin hluboko v údolí, jak o tom balvany bulžníků, v rokli Stradonické se nacházející, jež z kupy bulžnickové u Lísecké myslivny pocházejí a někdy několik centů váží, nasvědčují.

Mezi změnami a tvary, jež teprve později a v poměrně nové době na vrstvách pánve uhelné se tvořily, jsou jen upomenutí hodny: soustředění hydrátu železitého, často ve velkých soustředných kruzích na vrstvách pískovce, hojně dendrity na lupcích, hlavně na oněch od Dibří, a pak tenké povlaky malých, hvězdovitě uložených plochých krystalků sádrových na puklinách v sloji uhelné.

Tvary diluviální v oboru pánve uhelné upotřebují se co štěrk a písek ku avbě.

Pískovce a slepence pánve uhelné a upotřebují se po dlouhou řadu let obyčejný stavební kámen, co kámen křový v hutích železných nejbližšího okolí, co kvádry při důležitějších stavích a dobývají se v lomech u Hýskova, Stradonic (fig. V.), u Lísku a u Dibří.

Uhlí ale, jež se výhradně poblíž hřebene Líseckého dobývá, upotřebuje se pro nepatrnou jen výhřevnost, jen při pálení vápna a rozváží se k tomu želu k vápenkám u Berouna a Zdic. — Brzo po objevení sloje uhelné upotřebeno uhlí též při vitriolové huti, níž potřebný kámen vitriolový z břidle křemencové u Hracholusk, jihozápadně od Křivokláta vyráběn byl, jež ale brzo po klesnutí dřívějších příznivých cen vitriolu opuštěna byla. — Stopy po této huti udržely se ještě v hromadách tak zvaného „caput mortuum“ poblíž Lísecké myslivny.

Fig. V.



Lom Stradonický na kvádry.

### III. Pánev Stilecká.

O pánvičce té zmiňují se též již prof. Zippe a prof. Reuss v dříve uvedených pojednáních, aniž by bylo bližšího něco o poměrech jejich připojeno.

V ročníku geologického říšského ústavu z roku 1861 a 1862 mluví se o ní trochu obsírněji, určuje se blíže poloha a velikost její, líčí se rozčlenění její; není však žádný druh rostlin fossilních uveden.

Taktéž zmiňuje se pan prof. Krejčí v uvedeném již článku „o kamenném a nedém uhlí“ v Živě 1853 jen krátce o pánvi této. Činí se zde ale již zmínka o tiscích v Stilecké či Žebrácké pánvi, ač jmenovitě uvedeny nejsou.

Pánev tato uložena něco přes čtvrt hodiny jiho-západně od Žebráku, v směru Cerhovicům a Záluží, z většího dílu v rovině, jež se rozprostírá mezi Žebrákem a Cerhovicemi; dílem se přiklání na svah, jenž od Mlýnského potoku zponenáhla vystupuje. Svah tento tvoří méně vystupující pokračování hřebene, jenž bezprostředně jižně u města Žebráku vystupuje a jenž sestává ze slidnatých břidlic a v nich ložených tenkých slojí křemencových, pásma dle Barrandeova rozdělení; tyto břidle obsahují zkameněliny, což můžeme pozorovati ve vodoteči pod rybníkem, kde vrstvy na světlo vycházejí, a též na jiných místech, kde tyto přístupny jsou. Tytéž vrstvy tvoří též západní pokračování zmíněného hřebene až pod pánev Stileckou a zdá se, že zasahají ještě dále na sever, tak že je můžeme považovati za jedinou základní horninu pánve uhelné.

Pánev sama o sobě má podlouhle kulatou podobu, jejíž delší osa od severu

k jihu směřuje. Severní polovice pánve leží v rovině mezi Žebrákem a Cerhovicemi, jižní ale v malé kotlině, jež ve svahu, na pravém břehu „Mlýnského potoka“ vystupujícím, sotva znatelně vhloubena jest.

Potok tento, jenž přichází od Záluží, protéká v směru k Žebráku pánvičku tuto na příč, aniž by ale tvořil nějaký výmel, v němž by se, třeba jen dílem, vrstvy pozorovati mohly.

Absolutní výška nad mořem pánve této udává se v geologickém říšském ústavu na 1143 stop. — Rozsáhlost od severu k jihu nechtě obnáší 500 až 600 sáhů, šířka její od východu k západu asi jen 300 sáhů na severním konci, o mnoho méně však na jižním. — Jižní konec pánve sáhá až k rovině, v níž svah na pravém břehu potoka vybíhá; severní konec až přes silnici, jež ze Žebráka k Cerhovicím vede.

Nižádné vodomely neprorývají pánev, v nichž by vrstvy její pozorování přistupny byly, aniž stává lomů, v nichž by se pozorovati mohly, a obeznámení se s členy pánve obmezuje se tedy jen na nepatrné doklady, jež velmi slabé dolování poskytuje. — S tímto se dějí jen pokusy na jižním konci, z většího dílu na nejjižnějším kraji, k vydobytí pozůstalých ještě pilířů uhelných. — V celé severní části zanechány i tyto pokusy, kdežto se ještě před několika lety na nejsevernějším konci za silnicí uhlí dobývalo a na jiných místech marné pokusy děly.

V celé této severní části nezachovaly se nižádné stopy někdejšího dolování; naproti tomu poskytuje jižní část na svahu, jenž se k severu sklání, obraz silně rozryté půdy a hromada vedle hromady pozůstalých lupků uhelných, jimž přimísěny horniny visuté z jednotlivých hojných vrstev, tvoří prostoru neúrodné půdy, podobně oné u Přílepu. — Jižní pokraj pánve vystupuje asi 15 až 20 sáhů nad potokem; však i severní díl pánve vystupuje od potoka, byť i jen znenáhla a nejnižší místo na povrchu pánvičky jest tedy ono, kudy potok teče.

V šachtách, na jižním kraji prohloubených, dostiženy následovní horniny: Nejprve jemný štěrk, písek, hlína a štěrk, rozličné, nevelké mocnosti, pak 9 stop až 2 sáhy mocné lupky rozličného tvaru, jež rozděleny jsou ve více skupení. Svrchní pozůstává z jemných, modrošedých lupků, následující z šedých, písčitých lupků, nejzpodnější z brouskovitých lupků. Na místě nazvány jsou křídlicové (? břidlicové), popelkové a kvarcové lupky. Pod lupky pak následuje vrstva písčivcovce, jež provází všude sloj uhelnou, jež pak následuje, co bezprostřední, visuté a nazvána jest „vrstvou písčivcovou.“

V sloji uhelné, jež pak následuje, leží nejsvrchněji několik palců mocná vrstva velmi pevného lupku, černé barvy, jenž obsahuje množství neurčitelných úlomků zbytků rostlinných, jenž v ohni trochu doutná a do světla se vypálí; k tomuto lupku přikládá se zcela tenká vrstva lupku šedého, jenž není uhelnými částkami prostoupen, a který též rostlinné zbytky obsahuje; pak následuje sloj uhelná v mocnosti 7 až 7½ stop, pak 6 palců mocný, sypký, šedý lupek, jenž obsahuje jen neznalé otisky rostlinné; pak 3 stopy uhlí, pak opět asi 3 palce mocná vrstvička šedých lupků a konečně poslední slůjka uhlí 1½ stopy mocná.

Úplná mocnost sloje uhelné i s její opukami obnáší tedy zde 2 sáhy až 2 sáhy a 1 stopu; mezi tím 15 palců opuk. — Ze slojí uhelných jest svrchní lepší, zpodnější pak jest špatnější jakosti, hlavně nejzpodnější pak jest nečistá, hojnými vrstvami opuk prostoupena.

V uhlí přicházejí stopy zbytků rostlinných, mezi jinými *Stigmaria*, *Lepidodendron* a *Sigillaria*.


Stále vloženými vrstvami lupků rozeznává se sloj u Stilce od oné u Přílep a na Lísku uložené. Vřak nezdá se, že tyto vrstvy lupků měly všude uvedenou mocnost, nýbrž že v úklonu mocnosti jim přibývalo, čímž vrstvy uhelné více od sebe vzdáleny byly.

Mocnost vrstev visutých, jež na jižním kraji pánve 2 sáhy obnáší, nabývá dále do vnitř pánve větší mocnosti a šachty jsou u prostřed jižní části 6 sáhů a více hluboké, nežli dostihnou sloj uhelnou; a hloubky této v severním směru přibývá; přičem-li k tomu ještě úklon svahu, tu vysvitá, že sloj uhelná jest na jižním kraji v největší výši a k severu zapadá. Vřak vystupuje zároveň k západnímu a východnímu kraji, a má tedy v celku podobu pánve k severu nakloněné. Vystupování sloje uhelné jest zcela patrně k pozorování na západním kraji v jižní části, kde sloj vychází skoro až na den, kde jest odkryta a dosti příkře k východu zapadá.

V severní části pánve zdá se že byla sloj uhelná hlouběji uložena, vyjma u krajů, kde se v malé hloubi nalézala, jako v pravo od silnice z Žebráka do Cerhovic, z čehož souditi lze, že úklon severní, sloji obyčejný, zde dílem v jižní přecházejí musel. Při větší hloubi uhelné sloje přibývá mocnosti vrstev visutých. Vřak přibývání toto nezasáhá prý až k vrstvě pískovcové, jež sloj bezprostředně ve visutém provází a která nikde mocnosti tří stop nepřesahuje. Naproti tomu vyvinovaly se vrstvy lupků vždy více a více, což již vysvitá z hromad u někdejších šachet udržených.

Kdežto totiž nacházíme na hromadách v nejjihnějším dílu pánve v nejvyšší její poloze hlavně jen zbytky uhelného lupku a rozdrobeného uhlí, jimž jen sem tam, vyjma balvany z vrstev visutých pískovcových, málo úlomků lupků přimíšeno jest, přibývá těchto více a více, čím dále od jižního kraje k severu se vzdalujeme, a konečně převládají úlomky těchto z vrstev visutých vyvezených lupků. Poskytují hezké odrůdy výtečně se štípajících lupků, jež pocházejí ze všech tří, výše uvedených druhů, z nichž hlavně šedomodré dobře zastoupeny jsou. Vřak marně bys hledal ve všech těchto druzích lupků zbytky rostlinné; skoro ničeho neb jen velmi nezřetelné stopy tam nalezněš. Též sferosiderity nebyly skoro nikdy pozorovány. — Tímto nedostatkem zbytků rostlinných souhlasí lupky pánve Stilecké s oněmi u Přílep, jakož i ostatní povahou a uložením nad slojí uhelnou, od níž jen slabou vrstvou pískovce odděleny jsou. Nad lupky konečně uložen jemnozrný pískovec, co nejvyšší vrstva, která tam, kde jen slabě vyvinuta jest, v drobný štěrk a písek se rozpadá (fig. VI.).

Fig. VI.



Sloj uhelná uložena bezprostředně na zrušených lupcích, dílem na plastické hlíně, jež pak spočívají na vrstvách silurských. — O jiných pak vrstvách ležatých, jež by ještě útvaru uhelnému náležely, není ničeho známo a nenalezáme tudíž žádných slepenců, které v ostatních uvedených pánvích tak hojně vyvinuty jsou, ni pod ni nad uhelnou slojí, což svědčí o velmi klidných poměrech při ukládání se vrstev, pánev tuto vyplňujících.

Mocnost celé pánve jest velmi nepatrná; po krajích obnáší sotva 4 až 6 sáhů a nepřesahuje u vnitř 15 až 20 sáhů. V celé této mocnosti vystupují jen jemnozrné odrůdy hornin. Nejen lupky, z nichž modrošedé hlavně hlinité povahy jsou, kdežto ostatní, hlavně ony, co „popelkové“ známé, vlastně velmi kaolinickou a jen málo a jemně písčitou horninu tvoří, nýbrž i pravé pískovce složeny jsou jen z velmi drobných látek, v nichž též kaolin značného podílu má. Též vrstva pískovcová ve visutém jest velmi, skoro hlavně kaolinická, při tom dílem poroslá a obsahuje jednotlivé bělé lístky slídové vtroušené.

Na pánvi uhelné uloženy dílem diluviální drobné šterky, jež hlavně na severní části pánve sem tam ji přesahují a takto kraje zakrývají, v jižní části ale hustě až k západnímu kraji přiléhají a zde v malých pahorcích vystupují, jež tvoří malý val na této straně pánve. Tyto naplaveniny zasahají dále v západním směru k Tlusticům a k Záluží.

Poštěstilo se mi něco otisků z pánve této sebrati. Však mohly tyto jen ve vrstvě pískovcové ve visutém sloje uhelné a v této nalezeny býti; větší díl jich obsahuje vrstva pískovcová; v lupcích nad touto vrstvou pozorovány jen velmi zřídka a z většího dílu neurčitelné zbytky.

Až po dnes z pánve této určené druhy jsou následující:

#### A. *Equisetaceæ.*

1. *Calamites Suckowi* Bgt. Nepřichází zřídka, ale nikdy ve velkých exemplárech. Dílem v nejsvrchnějších, tvrdých lupcích uhelných, dílem ve vrstvě pískovcové visuté.

#### B. *Asterophylliteæ.*

2. *Asterophyllites grandis* Stbg. sp. přichází co *Volkmania gracilis* Stbg. Vers. II. tab. XV. fig. 1. Často ve velkých exemplárech, dílem s plodnými klasy ve vrstvě visuté pískovcové.
3. *Asterophyllites rigidus* Stbg. Nepřichází tak hojně. Přicházejí olístěné úlomky stonků jakož i plodní klasy. *Volkmania polystachia* Stbg. Vers. I. tab. LI. fig. 1., dílem v pískovci visutém, dílem v lupku nad uhlí.
4. *Asterophyllites foliosus* L. H. Plodní klasy jeho, podobné vyobrazení v Geinitzově díle: „Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen“ tab. XVI. fig. 4., jakož i úlomky stonků, oboje v pískovci visutém.
5. *Annularia longifolia* Bgt. Jednotlivé úlomky vreten, jakož i roztroušené lístky v pískovci visutém a lupku uhelném.
6. *Sphenophyllum oblongifolium* Germ. V jednotlivých úlomech z lupků nad uhlím.

### C. Filices.

- Sphenopteris elegans** Brongn. Druh tento jest jeden z nejhojnějších z pánve Stilecké a přichází v hojných úlomcích vějířů nepravidelně v pískovci visutém, soudružně s *Asterophyllites*, *Calamites Suckowi* Bgt. a *Alethopteris*.
- Sphenopteris tenella** Brongn.: Hist. de végét. foss. tab. XLIX. fig. 1. Nezřídka přicházejí úlomky druhu *Sphenopteris*, které se nejlíp s druhem *Sph. tenella*, jak jej Brongniart vyobrazuje, spojit dají, v pískovci visutém.
- Sphenopteris Bronni** Gutb. Jednotlivé exempláře druhu tohoto objevily se též v pískovci visutém.
- Hymenophyllites furcatus** Bgt. *Sphenopteris acutiloba* Stbg. V několika exemplárech na vrstvě visuté pískovcové, hlavně v odrůdách, které odpovídají u Geinitze „Verstein. der Steinkohlenf. von Sachsen“ tab. XXIV. fig. 11. a 12. vyobrazeným.
- Schizopteris adnascens** Lindl. & Hutt. Jemné exempláře, jež často na stoncích jiných kapradin, a sice nejhojněji na východu lístečků z hlavního stonku, sedí.
- Diatyopteris Brongniarti** Gutb. Druhu tohoto nalezen jen jeden lísteček v lupcích nad vrstvou pískovcovou, jenž ale byl velmi zachovalý a pěkně znalé žilky měl.
- Alethopteris longifolia** Presl. Druh velmi hojný, dílem v celých vějířích, dílem jen v úlomcích, skoro všude v pískovci visutém. Druh tento jest zde zrovna tak vyvinut jako *Alethopteris Serli* Bgt. u Přílep.
- Alethopteris erosa** Gutb. Jednotlivé úlomky, z většího dílu s zrušenými lístečky, jichž žilky udrženy jsou.

### D. Lycopodiaceæ.

- Lepidodendron dichotomum** Stbg. Jednotlivé, z většího dílu neznalé otisky korové, z lupků v sloji uhelné.
- Lepidodendron elegans** Ldl. & Hutt. Taktéž v jednotlivých úlomcích na lupcích uhelných ze sloje uhelné.
- Lepidodendron laricinum** Stbg. Otisky korové, s malými jizvami na lupcích ze sloje uhelné. Tento druh objevil se posud jen zřídka.
- Lepidostrobis variabilis** Stbg. Úlomky plodných klasů těchto pozorovány v pískovci visutém.

### E. Sigillariæ.

- Sigillaria** sp. ? Stopy *Sigillarii* nescházejí úplně a objevily se v otiscích podobných druhu *Syringodendron*, dílem široce rýhované na lupcích v sloji uhelné. Vsať nebyl žádný otisk tak zachován, by se byl mohl určit.
- Stigmaria ficoides** Bgt. Též zde, jako v dříve uvedených pánvích, jest druh tento velmi obyčejným úkazem, jak v hojných, často jen málo zach-



valých, tak i ve velkých znalých exemplárech; objevil se posud jen na vrstvách ze sloje uhelné.

Vláknitý anthracit jest na vrstvách uhelné sloje podobným úkazem, jako na slojích u Přílep a Lísku; nepodařilo se však posud, jako v anthracitech z Přílep a z Lísku, též u Stílce buňky dupkové v něm naleztí.

Z předdeslaného seznamu vysvitá patrně převládání kapradin mezi otisky v pískovci nad slojí uhelnou a scházení otisků korových z řádů *Lycopodiaceae* a *Sigillarií*, kdežto zrovna opačný poměr panuje ve vrstvách bezprostředně nad slojí neb v ní vložených.

Jest to poměr, v němž všechny tři pánve, Přílepská, Lísecká a Stilecká, se shodují. Vychází z toho, že i pánev Stilecká k pásnu Sigillariovému přináleží.

#### IV. Pánev Holoubkovská.

Uložení, jež v žádném z výše jmenovaných pojednání a spisů uvedeno není, vyjma pouhou zmínku v ročníku geologického říšského ústavu z r. 1856 (Lidl.: „Beiträge zur geognostischen Kenntniss der Steinkohlenformation im Pilsener Kreise von Böhmen“) a jež z většho dílu až posud neznámé zůstalo, jest uložení pravého útvaru uhelného u Holoubkova. Uložení toto, jen málo rozšířené, jež nikde výmely odkryto a hornicky ohledáno není, jest vskutku jen málo schopno, by pozornost geognosta vzbudilo a poskytuje tímto jen málo příležitosti k poznání složení a uložení vrstev.

Pánev tato jest západně a severozápadně od Holoubkova uložena; tím ale, že půda jest lesem a jinou vegetací porostlá, nedá se přesné ohraničení podati. Hraniční a základní horninu tvoří vrstvy silurské, jež dílem přináležejí pásnu  $d_1$ , jež známo jest kuličkami v něm obsaženými, jež hlavně u Voseka mnoho zkamenělin obsahují, dílem křemencům pásma  $d_2$ .

Prvnější můžeme vidět na stránkách podél silnice, západně od vsi Holoubkova na den vycházejí a sice skoro až k počátku lesa. Taktéž sestává dále na západ se nacházející svah, přes nějž se silnice, poblíž hřebene Vydrůdu sklání, z těchže lupků. Na cestě, která z Holoubkova severně k Tesskovu vede, můžeme tytéž lupky pozorovati, jakmile jsme na konci lesa, jenž severně od Holoubkova se táhne, pozemky Tesskovské obce dostihli.

Však i východně od Holoubkova vycházejí na den a lze je poznat z náklonnosti tvořit kuličky, jakož i dílem z již utvořených kuliček, jež, jako u Voseka, z lupků se vylupují. — Kuličky tyto obsahují zde ale velmi zřídka zkameněliny a sezual jsem jen stopy *Hyalolithů*. Hřeben Vydrůdu, jenž severozápadně od Holoubkova se táhne, sestává z porfyrů, na něž se na jižním svahu křemence příkládají. Až k němu nezasahají vrstvy útvaru uhelného. Tento jest naopak obmezen na malou prostoru mezi tímto hřebenem a vesnicí; zasahá východně sotva přes Holoubkov, jelikož tam vycházejí silurské břidlice a nad nimi křemence na den a táhne západně kus na levý bok silnice, jež z Holoubkova k Rokycanům vede. V prostoru této může útvar uhelný poznán býti dílem z odkrývek, jež k dobývání písku otevřeny jsou, dílem z povahy půdy.

Takové pískové odkrývky odkryty jsou v pravo i v levo silnice. V oněch, jež se blíže Holoubkova v pravo od silnice nacházejí, nevychází nic jiného než pískovec, vlivem povětří zvětralý, jemnozrný, světle žlutavě neb běle zbarvený, jenž na 3 až 6 stop mocnosti odkryt jest.

Dále k západu, na hranici vrstev uhelných se silurskými břidlicemi, jest v malém lomu v levo od silnice větší rozmanitost vrstev odkryta; zde vychází na stěně od hora dolů: nejprve žlutavý, jemnozrný, z většího dílu zrušený a zvětralý pískovec, bez štěrku, as 4 stopy mocný; pod ním pak 2 až 3 stopy mocné, tmavé velmi štěpné lupky, s nimiž se střídají několikrát slabé vrstvy uhlí. Lupky jsou tmavošedé a obsahují velmi mnoho zbytků rostlinných, jež ale pro pokročilé značné zvětrání, v němž se lupky nalézají, se určit nedají, tak že se počítá jen málo druhů bez pochybnosti určit. Nejen že lupek jest celý rozdrobený, nýbrž i uhelná hmota, jež zbytky rostlinné pokrývala, jest zrušena tak že jen velmi zřídka podoba rostliny k poznání jest. Všecky druhy ale, které se určit daly, jsou právě rostliny uhelné, čímž jest postavení těchto vrstev u Holoubkova rozhodnuto.

Pod těmito lupky následuje pak vrstva jemnozrných pískovců s železitým tmelem, čímž se co hnědě zbarvené objevují. Mocnost této vrstvy není značná; taktéž se zdá, že v ní přicházejí úlomky rostlinné. Pod touto vrstvou leží konečně, co nejzpodnější hornina, slepence ve vrstvách jen málo mocných. — Jelikož v malé vzdálenosti od těchto slepenců již silurské břidle vycházejí, zdá se, že tyto slepence zastupují nejzpodnější vrstvy uložení uhelného, ačkoliv bezprostřední styk se silurskými břidlemi odkryt není. Hmota základní těchto slepenců jest kaolinický pískovec, v němž hojně štěrky, však ne značné velikosti, vloženy přicházejí. Tyto štěrky pocházejí z rozličných odrůd bulžníků, rozmanitých křemenců a křemenů. Mezi nimi leží, jako u Stradonic, jednotlivá, uhelnou korou opatřená písková jádra, jež dají soudit na kmeny se zuhelnělou korou. Však ni na koře, velmi drobné, ni na hornině, jež ji obklopuje, nelze nějaký otisk poznati.

Nedaleko severně od tohoto lomu pískovcového vycházejí lupky ještě jednou na den a mají při směru k h. 10. severovýchodní úklon, nepatrným západem. Z toho jde, že vrstvy pískovcové, jež poblíž Holoubkova se nacházejí, nad lupky uloženy jsou a že nejspíše přináležejí těmtéž vrstvám, jež v nejzápadnějším lomu, na lupcích uložené, na den vycházejí; jelikož ale odtud ve východním směru k Holoubkovu povrch značně vystupuje, musejí tam již ve větší mocnosti vyvinuty býti.

Na celé ostatní uložení dá se pak jen v severovýchodním směru z povahy půdy souditi a vzdaluje se každému bližšímu pozorování.

Ale z málo míst, na kterých se uložení vrstev pozorovati mohlo, vyplývá podoba zdejších poměrů s oněmi v Lísecké pánvi a lišení se od poměrů v pánvi Přilepské a Stilecké pozorovaných.

Ony druhy, jež se určit daly, jsou následující:

#### I. *Equisetaceæ.*

1. *Calamites* sp.? Nepopíratelné úlomky *Calamitů* vyskytly se mně několikrát, nikdy však v také zachovalosti, jež by druh určit dala. Nejspíše dají se s *Calamites* Suckowi Bgt. aneb *Calamites* *approximatus* Schloth. spojit.

## II. *Asterophyllitæ.*

2. *Asterophyllites grandis* Stbg. sp.; objevily se sice malé ale dobře určitelné úlomky druhu tohoto; mezi nimi patrně rozvětvené, podobné od Sternberga v „Vers. II., tab. XV., fig. 1“ vyobrazenému otisku *Volkmania gracilis*.
3. *Asterophyllites rigidus* Stbg. Trochu nedokonalý úlomek, jenž se nejspíše s tímto druhem spojití dá.
4. *Annularia longifolia* Bgt. Jednotlivé lístečky, jež postavením svým jen k tomuto druhu náležejí.
5. *Sphenophyllum, saxifragae-folium* Stbg. Jeden zcela dobře zachovalý exemplář, s dvěma úplně udrženy vřeteny, jež odpovídají dosti zjevně vyobrazení u Sternberga „Vers. I., tab. LV., fig. 4.

## III. *Filices.*

6. Otisky rostlin, jež k tomuto řádu náležejí, přicházejí zcela nepopíratelně. Udržení ale všech sem náležejících otisků bylo tak nedokonalé, že určení druhu zcela nemožné, řádu pak jen s vyhrazením možné bylo. Jen dva dovolují domněnku, že řády *Sphenopterid* a *Neuropterid* mezi nimi zastoupeny byly.

## IV. *Sigillariæ.*

7. *Stigmaria ficoides* Bgt. Jest patrně zachovalá a z pozorovaných úlomků a zbytků se dá soudit, že byla hojně rozšířena.

## V. *Nöggerathieæ.*

8. *Cordaites borassifolia* Ung. Druh tento jest zastoupen patrným úlomkem listu.

Všecky uvedené druhy nalezeny v lupcích. Z těchto málo otisků, jež v uložení Holoubkovském nalezeny byly, vysvítá, že z našich pánví známé řády i zde zástupců svých čítají, vyjma jediné *Lycopodiaceæ*, z nichž nížádný otisk nalezen nebyl. Z toho ale na úplné scházení jich souditi, nebylo by při malém počtu určitelných otisků ospravedlněno, jakož zároveň z této příčiny na převládání jednoho neb druhého řádu souditi se nedá. Však na jednu věc smíme upozorniti; jest to totiž *Stigmaria ficoides* Bgt., jež se zdá, že jest všude takřka nerozlučitelný průvodce lupku uhlím proniknutého aneb poblíže slojí uhelných vyvinutého.

Zbytky *Sigillarií* nebyly pozorovány; však z poměrů, jak se zde mají, nesmíme soudit, že vskutku zcela scházejí.

Dle bezpochybného rozšíření uložení tohoto, jest povrch jeho z většího dílu rovný, jen v západní části trochu k západu nakloněný a zdá se, že se nikde novější útvary na ně nepřikládají. Výše mořská pro Holoubkov jest v ročníku geologického říšského ústavu VII. 1856 na 219'4 sáhů neb 1316 stop udána; i můžeme tedy přijmout, že výše uložení uhelného málo od toho se liší.

### V. Pánev Mirešovská.

Též o této pánvi jest v dřívějších spisech o rozšíření útvaru uhelného v Čechách málo obsaženo.

Prof. Zippe uvádí sice ve svém spisu: „Uebersicht der Gebirgsformationen in Böhmen 1831“, pánev tuto, ale bez všeliké poznámky; v roce 1842 uvádí tentýž ve spisu: „Die Steinkohlen, ihr Werth etc.“ výslovně, že v pánvi této posud žádné uhlí nalezeno nebylo, ale též, že se zde ještě ani nehledalo a zmiňuje se o upotřebování zde uložených pískovců ve vysokých pecích v okolí.

Též u Reusse v jeho: „Kurze Uebersicht der geognostischen Verhältnisse Böhmens 1854“ jest pánev Mirešovská beze všeho dalšího výkladu jen co pánev v kraji Plzeňském uvedena.

Teprve v pojednáních geologického říšského ústavu z roku 1858 uvádí se něco bližšího o pánvi této. Zde se uvádí, že jest chudá na uhlí a že pro poznání poměrů uložení málo odkryta jest.

Z jedné šachty pokusné blíže lomů Mirešovských uveden následující sled vrstev:

1. Hlína se štěrky . . . . . 7 sáhů
2. Písek . . . . .  $\frac{3}{4}$  sáhu
3. Opuka, písčitá, žlutá . . . . . 2 sáhy
4. Opuka lupkovitá s červenou hlínou  $\frac{1}{4}$  sáhu
5. Pískovec podobný onomu, z něhož se  
v tak zvaných Mirešovských lomech  
výborné splavní kameny vyrábějí etc. 4 sáhy
6. Opuka lupkovitá . . . . .  $\frac{1}{2}$  sáhu
7. Sloj uhelná . . . . . — 18—48 palců.
8. Opuka; nebylo dále vrtáno.

O zbytcích rostlinných není v poznámce této ničeho uvedeno. Za to ale uvádí D. Stur v pojednáních c. k. geologického říšského ústavu 1861—1862 několik u Mirešova uvedených otisků rostlinných.

Konečně zmiňuje se Kuppelwieser v pojednání: „Die Kohlenreviere von Ostrau, Rossitz etc. 1870“ o pánvi Mirešovské; udání jeho ale týká se méně geognostických poměrů, nýbrž hlavně technických a statistických dat. V tomto pojednání udává se délka pánve na 1800 sáhů a šířka na 1600 sáhů a množství obsaženého uhlí pácí se na 150 milionův centů.

Pánev Mirešovská leží jižně od Rokycan, asi hodinu vzdálena, v malé kotlině a skorem kolkolem pahorky a hřebeny vrstev silurských s ní hranířících obklopena. Tyto jsou: na severním kraji hřeben buližníkový sv. Jakuba, na jižním kraji dílem též buližník a silurské břidlice, dílem břidle kamencová mezi Kamínky a Mirešovem, dílem slepence křemencové ve vrchu Zlomnoha, jenž dále východně leží a k Dobřivu se sklání. Východně a západně od hřebene buližníkového u sv. Jakuba blíží se severní hranice pánve uhelné dosti těsně vrstvám silurským pásma D<sub>1</sub>; tyto, mezi Dobřivem a Rakovou, na jižním svahu vrchu „Kotel“ rozšířené, táhnou až k uhelné pánvi; jejich zelenavě a červenavě zbarvené písčité

vrstvy jsou odkryty dílem lomy, dílem na břehách černého potoka, jenž od Dobřiva přitéká, a mají úklon k severu.

Pánev leží v hlavním svém směru od severovýchodu k jihozápadu a rozprostírá se od Dobřiva přes vesnici Mirešov až pod dvůr Kamínky, jenž na hřebenu buližnickovém vystavěn jest. Severovýchodní konec pánve zasahá až poblíž vsi Hrádku, západně od Dobřiva se nacházející. — Na jižní straně ale tvoří pánev vypouklinu v nížině, jež se ke Skořicům podlé potoka, jenž odtamtud přitéká, táhne. Hranice pánve zasahají jižně dosti blízko až k patě sousedních výšin, jdou vsi Mirešovem, jejíž nejzápadnější část již mimo pánev uhelnou na břidlech silurských uložena jest, a táhnou pak v západním směru pod Kamínky, kde se nejzápadnější konec pánve nachází. Severní hranice jest trochu vypouklena, tak že povstávají malé výběžky.

Celá pánev má západní úklon v směru od Mirešova k Dobřivu, při tom leží severní kraj značně výše než jižní. Vyšší nejzápadnější část jest pak více rovná, ano má konečně slabý úklon k západu.

Dle udání geologického říšského ústavu leží Mirešov (kostel) ve výši 227·2 sáhů čili 1363 stop; Dobřiv na černém potoce 1228 stop. Pánev by tedy měla od Dobřiva k Mirešovu stoupání o 135 stop či 22½ sáhu. Jelikož ale západní konec pánve ještě výše leží nežli kostel v Mirešově, můžeme dobře přijmout, že se povrch pánve od západu k východu o 26 až 28 sáhů sklání.

Výše u sv. Jakuba, severně od Mirešova, udává se na 1446 stop, vrch severně od Dobřiva na 1400 stop, vrch severně u Skořic 1789 stop, vrch Skalka jihozápadně od Mirešova 1779 stop. Okolní vrchy přecházejí tedy výše položenou část pánve o 300 až 400 stop.

Vrstvy, jež pánev tuto skládají, nejsou nikde vymletím do také hloubky odkryty, že by pozorování přístupny byly. Lze je seznati jen v dolech, zde založených, v severovýchodní části pak ve velkých lomech, jež po dlouhý čas již otevřeny jsou.

Při dolování ve východní části pánve dostiženy od povrchu pod vrstvou zrušených pískovců, více méně mocnou, kaolinické pískovce, též rozličné mocnosti, zřídka hrubozrného tvaru. Pak následovala vrstva lupků a pod tím sloj uhelná. Pod touto pak leží opět pískovce, jež se střídají se slepenci, dílem lupky prostoupeny jsou, načež pak následuje druhá sloj.

V lomech, jež na severovýchodním kraji pánve založeny jsou, nachází se, a sice v nejvýchodnějším, od hora dolů:

velmi hrubý slepenec;

slabá, v mocnosti se měnící, sem tam mizící vrstva lupků;

pod ní dosti jemnozrný pískovec;

jemnopísčitý, zahnědlý lupek slabý;

výchoz uhlí a pod tím opět pískovec.

V lomu, jenž západně s těmito hraničí, nacházejí se dosti pestře, často červeně zbarvené pískovce, pod nimiž leží velmi hrubé slepence, jež obsahují ohlázky a balvany rozličných odrůd křemene, buližníků a slepencovitého křemence, jak přichází v jižně vystupujících hřebenech. V jiném, ještě západněji založeném lomu, dobývají se pískovce, jež skoro veskrze jemnozrného tvaru, většího dílu běle, řid-


červeně zbarveny jsou a kaolinický tmel mají. Jen zřídka vloženy v nich tvy slepence.

Tyto pískovce náležejí vrstvám visutým svrchní sloje.

Složení pánve vykazuje tedy svrchní sloj, na níž uloženy hlavně jemnozrné kovce a již bezprostřední visuté tvoří málo mocné lupky; pak spodní, druhou, jež od svrchní pískovci a slepenci oddělena jest; a pak soujem pískovců stých, jehož nejzpodnější vrstvy se zdají slepenci býti.

Mocnost jednotlivých vrstev mění se značně a tatáž vrstva nezachovává ve rovinné rozsáhlosti vždy stejnou mocnost; mizí sem tam v takovém stupni, že chní sloj uhelná, na níž pravidelně lupky uloženy jsou, na některých místech prostředně s vrstvami pískovcovými, jež jindy výše leží, se stýká a tyto tedy prostřední visuté tvoří. Povrch vrstvy lupkové nad slojí uhelnou jest alespoň ty vlnitý. — Tentýž úkaz nachází se též na jiných vrstvách lupkových a lze pozorovati na lupcích, jež odkryty jsou v nejvýchodnějších lomech Mirešovch, kde druhá vrstva lupková nad výchozem uhlí na jednom místě mocnost u skoro úplně ztrácí. Fig. VII.

Fig. VII.



Z obou slojí uhelných jest posud jen svrchní blíže známa. Jest to ona, na se posud skoro výhradně doluje.

V severní a východní části pánve sestává s hora dolů z následujících tev:

|                                  |               |         |
|----------------------------------|---------------|---------|
| z vrstvy uhelné, mocné . . . . . | 18            | palců   |
| pak opuky . . . . .              | 1 až 2        | stopy   |
| pak uhlí . . . . .               | 6             | „       |
| opuky . . . . .                  | 5             | „       |
| uhlí (střední sloj) . . . . .    | 2             | stopy   |
| opuky . . . . .                  | $\frac{1}{4}$ | palice  |
| uhlí (spodní sloj) . . . . .     | 1 stopa       | 6 palců |

Z jednotlivých vrstev uhelných jest střední sloj, 2 stopy mocná, výtečné osti.

Týmže sledem vrstev dostížena svrchní sloj též na jiných místech pánve;

schází však hlavně v západní části svrchní, 18 palců mocná vrstva a jsou pak jen vrstvy od čísla 3 až 7 vyvinuty.

Druhá, zpodnější sloj, jest posud ještě málo prozkoumána. Na jednom místě poskytuje následující průřez:

1. Uhlí . . . . 2 stopy mocné
2. opuka . . . . 4 „ „
3. uhlí . . . . 1 stopa 6 palců.

Vrtáním byla tato druhá sloj na rozličných místech dostižena; udání ale o nalezené při tom mocnosti sloje jsou tak rozličná, že dostatečné nahlédnutí v poměry při vodorovném rozšíření možno není.

V západní části pánve byla svrchní sloj šachtou 15 sáhů hlubokou pod povrchem dostižena; pod ní pak proraženy pískovce a 18 sáhů pod svrchní slojí, či 33 sáhů pod povrchem, dostižena druhá sloj, zde byla ale jen 15 palců shledána. Zdá se tedy, že stává v mocnosti této druhé sloje změn, když se i smí přijmouti, že sem tam vrtáním pozorovaná větší mocnost v přesmycích a příkrých úhlech úklonu původ svůj má.


V celku ale zdá se, že ubývá mocnosti sloje uhelné k západu; neb u svrchní sloje schází svrchní vrstva uhelná, a mocnost zpodní sloje ve východní polovici, jež se na 3 až 3½ stopy vykazala, při zkoumání v západní části se neosvědčila a jen na 15 palců dokázána byla.

Uložení slojí uhelných vykazuje se co dosti pánvovité. Svrchní sloj jest několika šachtami dostižena, z nichž jest šachta čísla 2. ve východní polovici 16 sáhů hluboká.

Šachta tato jest dosti stejně od severního a jižního kraje pánve vzdálena. Šachta pak nazvaná „Segengottesschacht“, jež leží více k jižnímu kraji pánve, jest jen ještě 12 sáhů na uhlí; oproti tomu ale šachta na poloviční délce pánve zaražená, 120 sáhů od severního východu vzdálená, 26 sáhů hluboká. V západní části pánve, v krajině Holubí kout nazvané, byla sloj, jak jsme již naznačili, v hloubi 15 sáhů dostižena.

Bereme-li ohled na stoupání povrchu pánve, vysvitá z udané hloubky šachet v směru od východu k západu, že svrchní sloj v západní části pánve značně výše uložena jest než ve východním. Úklon se vykazuje na severním kraji k jihu, na jižním kraji pak k severu a na východním k západu, značí tedy pánvovité uložení. Jen v západní části nachází se dílem zcela vodorovné uložení.

Fig. VIII.



Pánvovitě zapadání vrstev lze též v lomech na severovýchodním kraji poznati. — Vrstvy zde zapadají zjevně k jiho-západu, tedy též ke středu pánve, kde vůbec uhelná sloj nejhlouběji leží a největší mocnost pánve se nachází.

Ale stejnosměrné uložení vrstev nemá, jak se zdá, po celou pánve platnosti. V severní části vesnice Mirešova pozorováno prý při kopání sklepa zapadání ve dvou směrech a sice severně v podélné ose pánve a hned vedle toho jižně ke vsi Mirešovu, takže vrstvy zde tvořily takřka malý od východu k západu směřující hřeben, od něhož se na obě strany skláněly. Jižní zapadání zdá se, že pokračuje v jižní vypuklinu pánve a tvoří zde takřka zvláštní ložisko. — Toto lože jest málo odkryté a poměry uložení jeho málo známé. Přece ale dokázána vrtáním jižně od vesnice Mirešova uhelná sloj, jež ale jest málo mocná a na níž dolovat by se nevyplácelo.

Na severní, východní a jihovýchodní straně vychází sloj znenáhla a nachází se ku kraji v menší hloubi. Na jihozápadní straně pozorováno, že nezřídka se přikládá tupě na hraničné buližnky a pak někdy větší mocnosti nabývá.

Jak podnes známo, vychází svrchní sloj více ku středu pánve, vzdáleněji od krajů nežli spodní sloj uhelná, již výchozí se více krajům přibližuje, tak že od těchto počínajíce, nejprvé se spodní sloj a pak teprvé se svrchní se setkáváme. Svrchní, mladší vrstvy pánve této mají tedy menší vodorovné rozšíření než spodní, starší.

Souvislost vrstev jest ale na mnoze přesmyky přerušena. Přesmyky takové jsou, jak podle směru, tak podle úklonu vrstev známy. Těmito přesmyky, jež místy dolování nemalé překážky způsobují, jest sloj hlavně v směru od západu k východu stupňovitě uložena.

Tak nalezena sloj, která v šachtě poblíž místa Holubí kout v hloubi 15 sáhů se nachází a malým úklonem východně a jižně se rozprostírá v nemalé vzdálenosti za vržením, jež od severu k jihu směřuje, již v hloubi 43 sáhů. Tím způsobena ku středu pánve značně větší hloubka sloje uhelné, než by to dle obyčejného úklonu vrstev býti mělo. Podobné spády sloje za puklinami opakují se častěji a sice v tom způsobu, že sloj uhelná, jak od západního, tak od východního kraje pánve ku středu jejímu za puklinami hlouběji uložena jest.

Ale též v směru od východu k západu vystupují přesmyky, jimiž sloj uhelná ve větší hloubi spadá, než by to býti mělo, tak že se dosti blízko kraji pánve v nepoměrné hloubce nachází.

Však i opak toho přichází a sloj nalézá se následkem přesmyku dále od výchozí v menší hloubi než před tím. — Místy následují zmrsky rychle za sebou a křížují se v směrech svých, čím se sloj na místech takových značně nepravidelně uložena nachází.

Rozsáhlost pánve obnáší v směru od východu k západu, totiž od Dobříše ke Kamínkům as 1800 až 1900 sáhů; v směru na předešlý kolmém, na východním a západním konci as 600 až 700 sáhů, v směru ale jižním vypoukliny ke Skořicům, kde jest rozsáhlost mnohem větší, asi 1600 sáhů.

Vyjma hrubší a drobný štěrk aneb jily, jež sem tam, hlavně po krajích na pánve naplaveny jsou a pod nimiž hlavně balvany buližnsků často se nacházejí, k nimž se přidružují shluky hnědele železitého, jak nezřídka v malých shlucích



u kup buližníkových tamější krajiny přicházejí, nepokrývá žádný jiný mladší útvar pánev tuto.

Zbytky rostlinné známy posud skoro výhradně z lupku visutého svrchní sloje uhelné. — Jelikož tento ale nikde na den nevychází, může jen materiál z hor vyvezený k zkoumání zbytků rostlinných upotřeben býti. Přece ale pozoroval jsem v pískovcích východního lomu Mirešovského Aspidiarii, jež tedy přináležejí oboru spodní sloje uhelné, v níž lom tento založen jest.

Zbytky rostlinné, jež posud z pánve Mirešovské nalezeny a poznány byly, náležejí následujícím druhům:

### I. *Equisetaceæ.*

1. *Calamites Cisti* Brngt. Přichází dosti často, v rozličně velkých exemplárech. Lupek visutý svrchní sloje.
  2. *Calamites approximatus* Schloth. rar. *C. cruciatus* Stbg. *Calamites regularis* Stbg. *Cal. varians* Stbg. *Cal. nodosus* a *ramosus* Stbg. Všecky uvedené odrůdy přicházejí dosti často v ploských otiscích. Lupek visutý svrchní sloje.
- Přicházení Calamitů u Mirešova jest již v pojednáních geologického ústavu říšského r. 1862 druhem: *Calamites communis* Ettgsh vyznačeno.
3. *Calamites Suckowi* Bgt. Zastoupen málo vyznačeným otiskem z lupků visutých svrchní sloje uhelné.

### II. *Asterophylliteæ.*

4. *Asterophyllites equisetiformis* Schloth. Objevil se nehojně, v málo dokonalých exemplárech. Lupky visuté svrchní sloje.
5. *Asterophyllites grandis* Stbg. Ještě vzácnější než druh předešlý v týchž vrstvách.
6. *Annularia longifolia* Bgt. Jednotlivé větvy tohoto druhu, dosti dobře zachovalé, pozorovány několikráte v lupcích visutého svrchní sloje.
7. *Sphenophyllum emarginatum* Bgt. Nezřídka mezi jinými druhy v lupku visutém svrchní sloje. V pojednáních geologického říšského ústavu r. 1862 str. 140., uveden druh *Sphenophyllum Schlotheimi* od Mirešova.

### III. *Filices.*

8. *Neuropteris Loshi* Bgt. Dosti často přicházejí úlomky vějířů druhu tohoto v lupku visutého svrchní sloje uhelné.
9. *Neuropteris tenuifolia* Bgt. V několika jednotlivých exemplárech z lupku visutého svrchní sloje uhelné.
10. *Neuropteris heterophylla* Bgt. Druh tento uveden jest mezi zbytky rostlinnými od Mirešova v pojednáních geologického ústavu říšského r. 1862.
11. *Odontopteris Reichiana* Gutb. Kousek konečného lístku, jenž se nejvíce druhu tomuto a sice vyobrazení u Weisse: „Fossile Flora im Saar- u. Rhein-gebiete“ na tab. I, fig. 8., blíží, nalezen mezi jinými otisky rostlinnými svrchní sloje uhelné.

12. *Cyatheites Oreopteridis* Göpp. Nepřichází hojně a v jednotlivých listcích roztroušený, mezi ostatními druhy v lupku visutého, svrchní sloje.
13. *Cyatheites arborescens* Schloth. Druh tento objevil se velmi často v lupcích svrchní sloje, vždy u velkém počtu jednotlivých exemplářů, pospolně v pravém smyslu slova. Často jsou lístečky s plody a sice ve dvě řady rozestavenými brašničkami, udrženy.
14. *Cyatheites aequalis* Bgt. V jednotlivých, dobře zachovalých exemplářech na lupcích visutého svrchní sloje. V pojednáních geologického říšského ústavu uveden druh tento již r. 1862 co *Pecopteris aequalis* Bgt. od Mirešova.
15. *Cyatheites unitus* Bgt. Druh tento uveden v pojednáních geologického říšského ústavu r. 1862 mezi zbytky rostlinnými od Mirešova.
16. *Alethopteris pteroides* Bgt., *Pecopt. pteroides* Bgt., *Alethopteris Brongniarti* Göpp. Pod posledním jmenem uvedena v pojednáních geologického říšského ústavu r. 1862. V novější době objevil se druh tento v jednotlivých úlomcích v lupku visutého svrchní sloje uhelné.
17. *Alethopteris Pluckenetii* Schloth. Tento druh jest uveden co *Pecopteris Pluckenetii* v pojednáních geologického říšského ústavu r. 1861 od Mirešova; zároveň se uvádí, že jest nejhojnější druh mezi zbytky, geologickému ústavu od Mirešova zaslanými. V novější době ale neobjevil se více.

#### Kapradě stromové.

18. *Megaphytum* Art. sp.? K tomuto rodu, posud ještě jen nedokonale známému, jež prof. Geinitz v díle svém: „Die Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen“ líčí co stromovité kmeny, s dvěma řadami velkých, elliptických jizev a s nescíslnými malými, kulatými hrbolky, a jež v stavu kůry zbaveném hrubě vláknité a podél rýhované jsou, nutno čítat v lupku visutého svrchní sloje u Mirešova nalezený exemplář, jenž se hrubě vláknitým a podél rýhovaným povrchem a přítomností znalé velké, elliptické, na dolejší konci přístřelé a takéž hrubě vláknité jizvy bez pochybnosti k rodu tomuto řadí; druh ale posud neznámý.

#### IV. *Lycopodiaceæ*.

19. *Lepidodendron* (*Sagenaria*) *obovatum* Stbg., druh tento uveden jest v pojednáních geologického říšského ústavu mezi zbytky rostlinnými od Mirešova.
20. *Aspidiaria undulata* Stbg. *Lepidodendron undulatum* Stbg. Vers. I., tab. X., fig. 2. V několika velkých exemplářech z lupku visutého svrchní sloje uhelné a z pískovce nad spodní slojí.
21. *Lepidostrobus variabilis* L. a H. Dlouhý, pěkný, sem náležející plodní klas, nalezen v lupcích visutých svrchní sloje uhelné.
22. *Lepidophyllum majus* Bgt. Vícer, více méně znalých exemplářů mezi jinými zbytky rostlinnými v lupku visutého svrchní sloje uhelné.

23. *Lepidophyllum binerve* Ettgh. Exemplář, jenž dvěma, v listu vyvinutými žilkami se tomuto, *Ettingshausenem* postavenému druhu blíží. V lupcích visutých svrchní sloje.
24. *Lepidophlojos* (*Lepidodendron*) *laricinum* Stbg. Několik větších exemplářů tohoto druhu nalezeno v lupku visutého svrchní sloje uhelné.
25. *Halonía punctata* L. a H. sp. *Bothrodendron punctatum*, Lindley a Hutton, *The fossil flora*, tab. 81. Dostí velký exemplář, s dvěma řadami větších hrbolů a na povrchu s malými tečkovitými neb čárkovitými hrbolky, a na němž ještě sem tam původní, malé rhombické jizvičky k poznání jsou. Lupek visutého svrchní sloje.

#### V. *Sigillarieæ*.

26. *Sigillaria angusta* Bgt. Jednotlivé otisky korové druhu tohoto, dříve ještě s zuhelnělou korou, objevily se v lupku visutého svrchní sloje.
27. *Sigillaria alternans* Stbg. (L. a H.). Otisky korové, jež souhlasí s vyobrazením Geinitzovým v díle: „*Versteinerungen der Steinkohlenformation von Sachsen*“ tab. VIII., fig. 3, vyskytly se v lupku visutého svrchní sloje.
28. *Sigillaria oculata* Schloth. Ve velkých, pěkně zachovalých exemplářech v lupku visutého svrchní sloje uhelné.
29. *Sigillaria elongata* Bgt. Vnitřní otisk korový exempláře, jenž souhlasí s vyobrazením u Brongniarta, *Histoire de végét. foss.*, tab. 145, z lupku vysutého sloje svrchní. Tentýž druh jest od Mirešova již v pojednáních geologického říšského ústavu z r. 1862 uveden.
30. *Sigillaria cyclostigma* Bgt., *Hist. de végét. foss.*, tab. 166., fig. 3. Otisk, jenž se nejvíce tomuto od Brongniarta určenému druhu blíží, objevil se bezprostředně v uhlí svrchní sloje.
31. *Sigillaria* sp.? Mimo uvedené druhy přicházejí v lupcích visutého svrchní sloje, dříve v jemnozrnném, šedém pískovci nad nimi, úlomky kmenů *Sigillarie*, jež pro nedostatečné zachování, hlavně jizev, určení druhu nedovolují, vyvýšenými svými rýhami ale zvláštní druh tvořiti se zdají.
32. *Stigmaria ficoides* Bgt. Vyskytuje se často ve velkých a velkojizvých exemplářech, jak v uhlí samém, tak i v lupku visutého a v pískovci, nad lupky těmito uloženém; nejsou vždy ploché, nýbrž častěji ve více méně kulatém průřezu.

#### VI. *Nögerathieæ*.

33. *Cordaïtes borassifolia* Ung. Úlomky těchto listů jsou dosti hojně mezi ostatními zbytky rostlinnými v lupku vysutého svrchní sloje roztroušeny.

#### VII. *Coniferæ*.

34. *Araucarites carbonarius* Göpp. Vlákňitý anthracit, jak zde dosti často v shlucích a slabých vrstvičkách přichází, vykazuje též zde při zkoumání pod drobnohledem dobře zachovalé buňky dupkové, podobně jako u Přlepu a na Lisku a opravňuje takto určení tohoto druhu též od Mirešova.

Ony tři druhy, jež Sternberg ve svém díle: „Flora der Vorwelt“ z Mirešova uvádí a sice: *Neuropteris flexuosa*, *Neuropteris plicata* a *Neuropteris obovata*, nebyly přijaty do předešlého seznamu, jelikož originály, které Sternberg při popisu před sebou měl, dle kamene, v němž obsaženy jsou, od Dibří, z pánve Lísecké pocházejí.

Při seznamu otisků rostlinných z Mirešova, v nichž skoro všechny řády zastoupeny jsou, jest nápadno úplné scházení čeledě *Sphenopterid*. Ani jeden druh nemohl v materiálu z Mirešova nalezen a určen býti a i když, obdobně s místním přicházením jistých druhů v jiných pánvích se tvrditi nesmí, že by *Sphenopteridy* při dále odkrytých nalezištích nebyly se objevily, jest zajisté pamětihodno, že již roku 1862 mezi druhy z Mirešova, jež v pojednáních geologického říšského ústavu se uvádějí, žádný druh *Sphenopterid* uveden nebyl.

Též *Lycopodiacee*, ačkoliv úplně nechybí, se zdá, že nepřicházely tak často; alespoň zůstávají dle nynějších zkušeností i co do bohatosti druhů i exemplářů za *Sigillariemi*.

Kdežto uhlí z ostatních posud pojednaných pánví zcela špatnější, pro technické upotřebení nedostatečné jest, vykazuje se uhlí svrchní sloje uhelné u Mirešova nejen co velmi dobré, nýbrž má ještě u českého uhlí vůbec vzácnou vlastnost, se spíkat a pěkně steklý koaks tvořiti, takže k upotřebení uhlí v tomto směru zvláštní koaksovní zřízení byly.

Následkem toho vyvinuto již v pánvi této živé dolování a skoro přes celou pánev, vyjma nejhlubší body, rozšířeno. Přece ale děje se posud skoro výhradně na svrchní sloji, kdežto spodní sloj jen na jednotlivých bodech odkryta a tedy posud jen nedokonale známa jest.

Ještě se musíme vzhledem k pánvi Mirešovské zmínit, že rozčlenění, sled vrstev ji vyplňujících, nesouhlasí s žádnou dříve pojednanou pánví, a že se liší od Přílepské a Stilecké chyběním zjevně vytvořených brousek, od Lísecké scházením hlavně ze slepenců sestávajícího souhrnu vrstev pod slojí uhelnou, ačkoliv i zde se zdá, že slepence nejzpodnější ležaté tvoří. Však byly již nad nimi méně hrubozrné pískovce v nemalé mocnosti, jež onu slepenců přesahovala, uloženy, než prvá, spodní sloj uložena a utvořena byla. — Dále není žádného zjevného rozdílu mezi vrstvami nad spodní a nad svrchní slojí, jak to u Radnic přichází, kde již tvar horniny stačí, vrstvy spodnímu skupení přináležející od oněch svrchního skupení rozeznati. U Mirešova nedá se takové rozeznání jen z tvaru hornin provésti.

Ačkoliv scházení mocnějších vrstev lupkových k tomu poukazuje, že při ukládání pánve Mirešovské vlastní uložení bahna málo příležitosti k povstání mělo, musíme přece vzhledem k převládajícímu uložení zrnitých pískovců, a jen podřízenému vyvinutí slepenců k přinešení látek jen málo prudké neb silné proudy předpokládati a pánev celou za klidnějších poměrů povstalou si mysliti.

## VI. Pánev Letkovská.

Konečně nacházíme v severozápadním směru od Mirešova, ve vzdálenosti asi 6000 sáhů, mezi vesnicemi Timákovem, Eipovicemi a Letkovem uložení vrstev

kamenouhelných, v nichž byly v posledních letech, v části blíže vesnice Letkova, slabé sloje uhelné odkryty, z které příčiny uložení toto „pánev Letkovská“ nazváno bylo. \*)

Pánev tato není posud v žádném z dřívějších pojednání o rozšíření tvarů kamenouhelných a o přicházení uhlí kameného uvedena.

Těž pánev tato jest veskrze na silurských vrstvách uložena a jimi ohraničena. Severně příkládá se pánev na hřeben buližňkový „na pohodnici“, jenž se trochu západně od Eipovic vypíná a 1560 stop vysoký jest; jižně stýkají se výchozí vrstev pánve uhelné se hřebenem pásma Barrandeova d', jenž sestává z nečistých diabasů, jež se dílem s rudnými vrstvami střídají. Na východních hranicích vystupují dílem černé slídnaté břidle pásma d<sub>1</sub>, dílem křemence d<sub>2</sub>. Prvnější jsou pokračování břidlic v okolí Rokycan, hojnými, na otisky bohatými kuličkami známých, jež v nejbližším okolí Eipovic dobře vyvinuty vycházejí a na počátku od Eipovic k Timákovu vystupující pánve dobře zachovalé zbytky Trilobitů, hlavně Placoparia Zippei Böck. obsahují. Křemence vystupují nad těmito břidlicemi a tvoří hřeben vrchu „Cilina“, jenž k východu se vyzdvihuje.

Na západní straně ale leží pánev již na břidlech pod pásmem d<sub>1</sub> uložených, jež se dále v směru k Boškovu a Koterovu rozšiřují a zde dílem slabými vrstvami porfyru, dílem břidlemi kamencovými, dílem vápenitými břidlicemi prostoupeny jsou.

Výška mořská pánve této není určena, dle udání ale c. k. geologického říšského ústavu jest ves Timákov na jižním konci pánve 1225·2 stop vysoká; odtud ale vystupuje krajina k Letkovu a k hřebenu buližňkovému „na pohodnici“. Pánev v tomto stoupání uložená může tedy míti výšku 1300 až 1400 stop.

Pánev rozprostírá se v směru od jihozápadu k severovýchodu v délce 1000 až 1200 sáhů v šíři as 500 až 600 sáhů; zdá se ale, že se na východní straně jižně k Timákovu trochu rozšiřuje.

Výmely vodní a větší strže, kde by rozčlenění pánve aneb vrstvy alespoň dílem odkryty byly, scházejí. Sled vrstev a tvar hornin mohou jen obmezeně ze stávajícího dolování poznány býti. Při hloubení jednotlivých šachet proraženy následující vrstvy:

Více méně mocná vrstva ornice a písčité půdy;  
rozpuštěný pískovec;  
pískovce šedožluté, kaolinické a středního zrna;  
slabá vrstva jilovitých lupků;  
sloj uhelná 3 až 4 palce mocná;  
slabá vrstva lupků;  
vrstva pískovcová;  
lupky, prostoupené slabými vrstvičkami uhlí, asi 2½ stopy mocné;  
sloj uhelná 15 až 20 palců mocná;  
pískovce, dílem hlinité, střídající se s vrstvičkami lupků, bezprostředně na vrstvách silurských.

Mocnost vrstev nad slojí uhelnou jest rozličná a přibývá jí ku středu pánve,

---


\*) Doly, v novější době zde započaté, známy pod jmenem „Svatojanakých dolů“.

od severního kraje. Šachty jsou tedy též hlubší. čím dále od kraje ku středu hloubeny jsou.

Ze tří, nyní stávajících šachet, jež v severní pánvi části prohloubeny jsou, jest první, kraji nejbližší 13½ sáhu hluboká; druhé dvě, více uvnitř pánve dosáhly hloubi 19 a 20 sáhů.

Zapadání v těchto šachtách má směr k J. J. Z. a sice pod úhlem 15 stupňů. Zapadají tedy vrstvy ku středu pánve, a jelikož na protějším jižním kraji pánve zapadání k severu směřovati se zdá, jest tedy uložení vrstev úplně pánvovité, s největší hloubí u středu. (Fig. IX.).

Fig. IX.



O poměrech hornin a vrstev uhelných v jižním díle pánve nelze posud ničeho určitého znamenati, jelikož v tomto díle nižádné hornické zkoumání se nedělo a přirozené odkrytí vrstev stržemi a výměli úplně schází.

Pískovce nad uhelnou slojí uložené, s hlinito-kaolinickým tmelem, sestávají z těchže látek, jako jinde, hlavně z křemencových a bulžňkových zrn; sem tam ale jsou vloženy balvany bulžňku, jež nalezáme též jednotlivě roztroušené na povrchu pánve a bezpochyby pocházejí z hřebenu bulžňkového, jenž na blízku se zdvihá.

Lupky ale jsou dvojího způsobu. Bezprostředně nad uhlím a v něm přicházejí lupky černošedé barvy a hlinitého tvaru, jež můžeme považovati cò druh lupku uhelného. Výše pak jsou více písčité povahy, světlé, většího dílu bělavé a pevnějšího tvaru, tak že upomínají na lupky, jež též u Přílep a u Stilce nad slojí uhelnou leží. Jest možno, že slabá vrstva pískovce nad slojí uhelnou jest obdoba pískovců, jež u Přílep a u Žebráka (Stilce) nad uhelnou slojí všude se nacházejí, což se teprve při dalších pracích v pánvi této bude moci určití.

Uhlí, jež se posud jen málo dobývá, dává jen málo dobré, mnoho lupkem prostoupené palivo a nemá vlastnost spékání se. Upotřebuje se ho dílem k pálení lupku vápnitého u Letkova, dílem k domácí potřebě v okolí.

Výroba uhlí zůstane při malé mocnosti sloje uhelné a obmezeném rozšíření uložení jen podřízenou.

Vzhledem k organickým zbytkům není pánve tato ještě prozkoumána. Jeň několik zbytků mohlo v lupcích vyvezených s určitostí dokázáno býti. Náleží k následujícím druhům:

*I. Equisetaceæ.*

1. *Calamites Suckowi* Bgt. V jednotlivých úlomech.

*II. Filices.*

2. *Sphenopteris Hönighausi* Bgt. Malý úlomek, jenž ale byl dosti zřetelný, by k druhu tomuto přičten býti mohl.

*III. Sigillariæ.*

3. *Stigmariæ ficoides* Bgt. Druh tento, jenž naše pánve uhelné vůbec provází, jest též v lupcích u Letkova dosti hojně obsažen, však většího dílu pozorovány jen listovité výběžky.

*IV. Nöggerathieæ.*

4. *Cordaites borassifolia* Ung. Sem tam v jednotlivých úlomech.

Též pánve u Letkova není, vyjma něco šterku z nejokolnějších vrstev, pokryta žádným mladším tvarem geologickým.

Ačkoliv jest jen málo známa a prozkoumána, zdá se přece, že smíme souditi, že pánve tato se má nejspíše jako uložení u Přílepu a u Stílce, oproti tomu ale od pánví u Lísku, Holoubkova a Mirešova v poměrech svých se uchyluje a sice hlavně v útvaru vrstev visutých sloje uhelné.

Uložení u Letkova jest řada pánví, jež větší souhrny vrstev kamenouhelných v západních Čechách jižně a jihovýchodně provázejí, uzavřena.

Co se týče výšky, v níž pánve tyto uloženy jsou, jest jak pro jednotlivé tyto pánve mezi sebou, tak i vzhledem k pánvím u Radnic dosti stejná; převládá ale něco nad všeobecnou výškou pánví u Kladna, Slaného, Rakovníka a u Plzně.

Leží totiž:

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| pánve Přílepská ve výšce . . . . .                   | 1206—1230 stop |
| „ Lísecká mezi 1100 až 1600 stop; v průměru tedy . . | 1350 „         |
| „ Stilecká . . . . .                                 | 1143 „         |
| „ u Holoubkova . . . . .                             | 1316 „         |
| „ u Mirešova . . . . .                               | 1363 „         |
| „ Letkovská 1300 až 1400; v průměru . . . . .        | 1350 „         |

Výška pánví leží tedy mezi 1143 až 1363 stop.

Větší díl ale blíží se až k poslední výšce.

Taktéž jsou pánve v okolí Radnickém mezi 1300 až 1400 stop uloženy.

Naproti tomu udány výšky jednotlivých bodů v okolí Kladna na 926 až 1187 stop. \*)

\*) Kořistka: *Hypsometrische Arbeiten in der Umgegend von Prag* 1858; a: *geologický Hrádký ústav* 1859.

|                            |         |                                   |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| Výška Slaného na . . . . . | 829     | stop (David) — 799 stop (Halaška) |
| „ Votvovic . . . . .       | 635—664 | „                                 |
| „ Podlešná . . . . .       | 966     | „                                 |
| „ Velvar . . . . .         | 582·6   | „                                 |
| „ Lahn (útvár uhelný) . .  | 1257    | „                                 |
| „ Ploskova (jižně od Lán)  | 1266    | „                                 |
| „ Rakovnska . . . . .      | 1128    | „                                 |
| „ Lišan u Rakovnska . .    | 1222    | „                                 |
| „ Plzně . . . . .          | 882—928 | „                                 |
| „ Litic . . . . .          | 953     | „                                 |
| „ Lochotína u Plzně . .    | 1238    | „                                 |
| „ Chotěšova . . . . .      | 1062    | „                                 |

} v okolí Slaného.

} mezi Slaným a Rakovnskem.

} v okolí Plzně.

V celku tedy ubývá vyzdvižení povrchu v západní části Čech uložených pánví k severu a sice více k severo-východu než k severo-západu a v předešlém pojednané pánve mají s oněmi u Radnic relativně největší výši.

Nebylo by tedy neospravedlněné, přijmouti, že vody, jež uložení hornin v našich uhelných pánvích způsobily, se v směru od jihu k severu ztrácely. Celé geognostické členění naší zemi svědčí o podobném pochodu a ukazuje k tomu, že jižnější část již na suchu ležela, kdežto vlny severní část ještě pokrývajících vod po březích jejích zahrávaly.

Naše, nejdále na jich vystrčené, osamělé pánve, přináležejí tedy asi nejjižnějšímu břehu vod, jež v době tvoření se vrstev uhelných přinášením a ukládáním štěrku a jiných látek činný byly. Zdá se však, že tato uložení nedála se všude v stejném způsobu, současně.

Z povahy vrstev v jednotlivých pánvích lze jest lehce poznati souhlas poměrů v pánvích u Přílep, u Stílce a u Letkova mezi sebou a se spodním skupením z okolí Radnic. Nejen, že se všechny vyznamenávají světlými, trochu písčítými, s brousky se střídajícími lupky ve visutém sloje, nýbrž všechny tyto pánve mají slabou vrstvu pískovců za stálého průvodce, bezprostředně nad slojí uhelnou a od uhlí jen slabou vrstvou lupků oddělenou. Souhlas tento v tvaru a sledu vrstev svědčí o současném a za stejných poměrů povstalém uložení u Přílep, Stílce, Letkova a dílem u Radnic.

Odchylující se poměry na to nalézáme v pánvích u Lísku, Holoubkova a u Mirešova a stává i mezi nimi, vyjma výslovné přicházení vrstev slepencových v spodních částech jen málo souhlasu. — Ještě se nejspíše blíží pánev u Holoubkova na oněch místech, jež pozorovati lze, poměrům v pánvi Lísecké.

Ve všech pánvích ale nacházíme, že vrstvy poblíž slojí uhelných uložené, nechť jsou pískovce neb lupky, jemnozrné jsou a že lupky úplně se slojí se stýkají aneb i s vrstvami uhelnými se střídají, z čehož můžeme soudit na klidný pochod při ukládání a na scházení silnějších proudů, jež by za každou podmínkou hrubozrné látky byly přinesly. Úkaz tento souhlasí s poměry, jež se vzhledem k vrstvám poblíž Radnických slojí uhelných pozorovati mohou.

Hlavně ale zaujímají slepence a hrubozrnější vrstvy jen nejzpodnější místa v našich pánvích uhelných a ztrácejí se poblíž slojí uhelný, by ustoupily jemno-



zrnějším vrstvám, ano nevystupují nad uhlím více neb jen velmi podřízeně. Ony silnější proudy, jež hrubší látky a štěrky přinéstí mohly, jsou tedy jen na počátku uložení pánví uhelných k seznání, kdežto se později ukládání vrstev za klidnějších poměrů dělo. Když konečně pánve na sucho vystoupily, nepodlehly více žádnému všeobecnému zaplavení a jen poněkud ale stálým vymíláním byly dílem prority, aneb dílem odplaveny.

Těž i jinými vlivy byly jen málo v původním svém uložení přerušeny neb změněny. Nikde nenalezáme stopy vyvěřelých hornin, jež by je byly prorazily, nikde nenalezáme je prostoupeny chodbami, cizorodnými horninami vyplněnými. — Přerušování a přesmyky, jak je na vrstvách jednotlivých pánví pozorovati můžeme, povstaly buď nenáhlými změnami v niveau základu, neb nestejným ukládáním jednotlivých vrstev samých.

Při úplném scházení vápenců kamenouhelných, jež i ve všech ostatních pánvích v západní části Čech scházejí, není též skoro úplné scházení zbytků zvířecích ve vrstvách našich pánví nápadné. Jen v pánvi Lísecké nalezeny posud zbytky dvou druhů. Naproti tomu jest počet fosilních rostlin, jež v pánvích těchto nalezeny byly, dosti veliký.

V následujícím jest podán seznam všech druhů rostlinných, jak až podnes v jednotlivých pánvích seznány byly a zároveň udáno, které z nich též u Radnic objeveny.

|    |                                              | Práchev | Lísek | Střelec | Holoubkov | Město | Letkov | Okolí | Radnic | Poznámání.                                         |
|----|----------------------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------|
|    | <i>I. Equisetaceen.</i>                      |         |       |         |           |       |        |       |        |                                                    |
| 1  | Calamites Cisti Bgt. . . . .                 | †       | †     | .       | .         | †     | .      | .     | .      | Calamites communis Ettg.                           |
| 2  | Calamites approximatus Schl. . . . .         | †       | †     | .       | †         | †     | .      | .     | †      |                                                    |
| 3  | Calamites cannaeformis Schl. . . . .         | †       | †     | .       | .         | .     | .      | .     | †      |                                                    |
| 4  | Calamites Suckowi Bgt. . . . .               | †       | †     | .       | †         | †     | .      | .     | †      |                                                    |
| 5  | Cyclocladia major L. a H. . . . .            | .       | †     | .       | .         | .     | .      | .     | †      |                                                    |
| 6  | Huttonia spicata Stbg. . . . .               | .       | †     | .       | .         | .     | .      | .     | †      |                                                    |
|    | <i>II. Asterophyllitaceae.</i>               |         |       |         |           |       |        |       |        |                                                    |
| 7  | Asterophyllites grandis Stbg. . . . .        | †       | †     | †       | †         | †     | .      | .     | †      | Bechera grandis Stbg.<br>Volkmannia gracilis Stbg. |
| 8  | Asterophyllites foliosus L. a H. . . . .     | †       | †     | †       | .         | .     | .      | .     | †      | Volkmannia distachya Stbg.                         |
| 9  | Asterophyllites rigidus Stbg. . . . .        | †       | †     | †       | †         | .     | .      | .     | †      | Volkmannia polystachya Stbg.                       |
| 10 | Asterophyllites longifolius Stbg. . . . .    | .       | †     | .       | .         | .     | .      | .     | †      |                                                    |
| 11 | Asterophyllites equisetiformis Schl. . . . . | †       | .     | .       | .         | †     | .      | .     | †      |                                                    |

|                      |                                                   | Přilepy | Lísek | Stilec | Holoubkov | Mřešov | Letkov | Okolí<br>Radnic | Poznamenání.                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 12                   | <i>Annularia longifolia</i> Bgt. . . . .          | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 13                   | <i>Sphenophyllum saxifragae-folium</i> Stbg.      | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Rotularia saxifragae-folia</i><br>Stbg.         |
| 14                   | <i>Sphenophyllum emarginatum</i> Bgt. . . . .     | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Sphenophyllum Schlo-</i><br><i>theimii</i> Ett. |
| 15                   | <i>Sphenophyllum oblongifolium</i> Germ. . . . .  | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 16                   | <i>Pinnularia capillacea</i> L. a H. . . . .      | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| <i>III. Filices.</i> |                                                   |         |       |        |           |        |        |                 |                                                    |
| 17                   | <i>Sphenopteris obtusiloba</i> Bgt. . . . .       | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 18                   | <i>Sphenopteris Hönighausi</i> Bgt. . . . .       | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 19                   | <i>Sphenopteris Bronni</i> Gutb. . . . .          | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Sphenopteris intermedia</i><br>Ett.             |
| 20                   | <i>Sphenopteris tenella</i> Bgt. . . . .          | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 21                   | <i>Sphenopteris elegans</i> Bgt. . . . .          | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 22                   | <i>Sphenopteris muricata</i> Schl. . . . .        | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Alethopteris muricata</i><br>Ett.               |
| 23                   | <i>Sphenopteris irregularis</i> Stbg. . . . .     | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 24                   | <i>Sphenopteris asplenites</i> Gutb. . . . .      | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Asplenites elegans</i><br>Ett.                  |
| 25                   | <i>Sphenopteris coralloides</i> Gutb. . . . .     | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Sphenopteris Haidinger</i><br>Ett.              |
| 26                   | <i>Sphenopteris decipiens</i> Lesq. . . . .       | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 27                   | <i>Sphenopteris tridactylites</i> Bgt. . . . .    | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 28                   | <i>Sphenopteris macilenta</i> L. a H. . . . .     | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 29                   | <i>Sphenopteris meifolia</i> Stbg. . . . .        | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 30                   | <i>Sphenopteris nov. sp.</i> . . . . .            | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 31                   | <i>Sphenopteris sp. indetermin.</i> . . . . .     | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 32                   | <i>Hymenophyllites furcatus</i> Bgt. . . . .      | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Sphenopteris acutiloba</i><br>Stbg.             |
| 33                   | <i>Hymenophyllites quercifolius</i> Göpp. . . . . | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 34                   | <i>Asplenites Reussi</i> Ettg. . . . .            | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 35                   | <i>Schizopteris Gutbieriana</i> Presl. . . . .    | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 36                   | <i>Schizopteris caryotoides</i> Presl. . . . .    | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               | <i>Palmacites caryotoides</i><br>Stbg. a Ett.      |
| 37                   | <i>Schizopteris adnascens</i> L. a H. . . . .     | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 38                   | <i>Neuropteris flexuosa</i> Stbg. . . . .         | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 39                   | <i>Neuropteris Loshi</i> Bgt. . . . .             | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 40                   | <i>Neuropteris heterophylla</i> Bgt. . . . .      | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 41                   | <i>Neuropteris gigantea</i> Stbg. . . . .         | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 42                   | <i>Neuropteris acutifolia</i> Bgt. . . . .        | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 43                   | <i>Neuropteris angustifolia</i> Bgt. . . . .      | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 44                   | <i>Neuropteris tenuifolia</i> Bgt. . . . .        | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 45                   | <i>Neuropteris coriacea</i> Ettg. . . . .         | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 46                   | <i>Odontopteris britanica</i> Gutb. . . . .       | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 47                   | <i>Odontopteris Reichiana</i> Gutb. . . . .       | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |
| 48                   | <i>Odontopteris Böhmii</i> Gutb. . . . .          | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †               |                                                    |

|                       |                                   | Přílepy | Lisek | Stilec | Holoubkov | Mírešov | Letkov | Okolí | Radnic | Poznamenání.                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 49                    | Odontopteris Schlotheimi Gutb.    | +       |       |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 50                    | Cyclopteris varians Gutb.         | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 51                    | Cyclopteris tenera Ettg.          | +       | +     |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 52                    | Cyclopteris rhomboidea Ettg.      | +       | +     |        |           |         |        |       | —      |                                                                                   |
| 53                    | Adiantites giganteus Göpp.        | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 54                    | Cyatheites dentatus Bgt.          | +       | +     |        |           |         |        |       | +      | Pecopteris plumosa,<br>pennaeformis, angustifolia Ett. Aspidites silesiacus Göpp. |
| 55                    | Cyatheites oreopteridis Göpp.     | +       |       |        |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 56                    | Cyatheites Miltoni Art. sp.       | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 57                    | Cyatheites arborescens Schl.      | +       | +     |        |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 58                    | Cyatheites aequalis Bgt.          | +       | +     |        |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 59                    | Cyatheites unitus Bgt.            | +       | +     |        |           | +       |        |       |        |                                                                                   |
| 60                    | Dictyopteris neuropteroides Gutb. | +       | +     |        |           |         |        |       |        | Neuropteris squarrosa Ett.                                                        |
| 61                    | Dictyopteris Brongniarti Gutb.    | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 62                    | Lonchopteris rugosa Bgt.          | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 63                    | Alethopteris pteroides Bgt.       | +       | +     |        |           | +       |        |       |        |                                                                                   |
| 64                    | Alethopteris Pluckeneti Schl.     | +       | +     |        |           | +       |        |       | +      | Sphenopteris bifurcata Ett.                                                       |
| 65                    | Alethopteris erosa Gutb.          | +       | +     |        |           |         |        |       | +      | Asplenites Sternbergi u. Asp. lindsaeoides. Ett.                                  |
| 66                    | Alethopteris Serli Bgt.           | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 67                    | Alethopteris aquilina Schl.       | +       | +     |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 68                    | Alethopteris longifolia Stbg. sp. | +       | +     |        | +         |         |        |       | +      | Asplenites longifolius Ett.                                                       |
| 69                    | Oligocarpia Gutbieri Göpp.        | +       | +     |        |           |         |        |       | +      | Sacheria asplenoides Ett.                                                         |
| Stromovitě kapradiny. |                                   |         |       |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 70                    | Caulopteris Cisti Bgt.            | +       | +     |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 71                    | Megaphytum sp.                    | +       | +     |        |           | +       |        |       |        |                                                                                   |
| IV. Lycopodiaceae.    |                                   |         |       |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 72                    | Lycopodites Selaginoides Stbg.    | +       | +     |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 73                    | Selaginites Erdmanni Germ.        | +       | +     |        |           |         |        |       |        |                                                                                   |
| 74                    | Lepidodendron elegans L. a H.     | +       | +     | +      |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 75                    | Lepidodendron dichotomum Stbg.    | +       | +     | +      |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 76                    | Lepidodendron aculeatum Stbg.     | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 77                    | Lepidodendron obovatum Stbg.      | +       | +     |        |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 78                    | Bergeria quadrata Presl.          | +       | +     |        |           |         |        |       | +      |                                                                                   |
| 79                    | Aspidiaria undulata Stbg.         | +       | +     |        |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 80                    | Lepidophyllum majus Bgt.          | +       | +     |        |           | +       |        |       |        |                                                                                   |
| 81                    | Lepidophyllum binerve Ett.        | +       | +     |        |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 82                    | Lepidostrobus variabilis L. a H.  | +       | +     | +      |           | +       |        |       | +      |                                                                                   |
| 83                    | Lepidophlojos larinum Stbg. sp.   | +       | +     | +      |           | +       |        |       | +      | Lepidodendron larinum Stbg.                                                       |

|                            |                                        | Přílepy | Lísek | Stílec | Holoubkov | Mířšov | Letkov | Okolí | Radnic | Poznámání.                    |
|----------------------------|----------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|-------------------------------|
| 84                         | Halonía punctata L. a H. . . . .       | †       | .     | .      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 85                         | Halonía regularis L. a H. . . . .      | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 86                         | Cardiocarpum marginatum Art. . . . .   | †       | .     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 87                         | Cardiocarpum orbiculare Ett. . . . .   | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      | Cardiocarpum emarginatum Ett. |
| 88                         | Cardiocarpum Gutbieri Gein. . . . .    | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 89                         | Carpolithes corculum Stbg. . . . .     | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | †      |                               |
| <i>V. Sigillarieae.</i>    |                                        |         |       |        |           |        |        |       |        |                               |
| 90                         | Sigillaria angusta Bgt. . . . .        | .       | †     | .      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 91                         | Sigillaria alternans Stbg. . . . .     | .       | †     | .      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 92                         | Sigillaria catenulata L. a H. . . . .  | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 93                         | Sigillaria distans Gein. . . . .       | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 94                         | Sigillaria oculata Schl. . . . .       | .       | †     | .      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 95                         | Sigillaria elongata Bgt. . . . .       | .       | .     | .      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 96                         | Sigillaria cyclostigma Bgt. . . . .    | .       | .     | .      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 97                         | Sigillaria sp. indetermin. . . . .     | †       | .     | †      | .         | †      | .      | .     | .      |                               |
| 98                         | Stigmara ficoides Bgt. . . . .         | †       | †     | †      | †         | †      | †      | †     | †      |                               |
| <i>VI. Gramineae.</i>      |                                        |         |       |        |           |        |        |       |        |                               |
| 99                         | Graminites Vollkmanni Gein. . . . .    | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      | Calamites Volkmanni Ett.      |
| 100                        | Antholites triticum And. . . . .       | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 101                        | Antholites Pictairniae L. a H. . . . . | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| <i>VII. Nöggerathieae.</i> |                                        |         |       |        |           |        |        |       |        |                               |
| 102                        | Cordaítes borassifolia Ung. . . . .    | †       | †     | .      | †         | †      | †      | †     | †      | Flabellaria bor. Stbg.        |
| 103                        | Artisia transversa Stbg. . . . .       | .       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| 104                        | Nöggerathia Beinertiana Göpp. . . . .  | †       | †     | .      | .         | .      | .      | .     | .      |                               |
| <i>VIII. Coniferae.</i>    |                                        |         |       |        |           |        |        |       |        |                               |
| 105                        | Araucarites carbonarius Göpp. . . . .  | †       | †     | .      | .         | †      | .      | .     | †      |                               |
|                            |                                        | 39      | 81    | 20     | 8         | 34     | 4      |       |        |                               |

Pozorujeme-li v předešlém seznamu obsažených 105 rozličných, v našich osamělých pánvičkách posud nalezených zbytků rostlinných, tu nám nejdříve napadá, že ze všech jen Stigmara ficoides sama ve všech pánvičkách přichází, kdežto každá jiná jen v některých neb jen v jedné z nich nalezena byla a v ostatních schází. Měl-li by poměr tento při dalších výzkumech a pozdějšími novými nálezy i v nejširším způsobu změny utrpěti, přece jest jen pamětihodno, že Stig-

*maria ficoides* všude, i na místech, na kterých se posud jen málo druhů vyskytlo, mezi prvními zbytky se nacházela a sice nikoliv v jednotlivých exemplárech, nýbrž v hojných úlomcích se objevila.

Jest to opět důkaz, že sloje uhelné ni vzhledem k mocnosti, ni k jakosti uhlí s vyskytováním se rostliny této nestojí v bezprostřední souvislosti; naopak zdá se, že jest tím jen naznačeno, že podmínky, jež byly vůbec vzniku uhelných slojí příznivé, též vývin *Stigmariae* a bujnění její podporovaly. Všechny výjevy v blízkosti slojí uhelných naznačený stav klidně utvořeného, bahnitého uložení, zdá se že byl též hlavní podmínkou výživy pro *Stigmarii*, aniž by s tím snad zároveň byla spojena nutnost jiné, četné vegetace, jež by byla poskytovala látky k budoucím slojím uhelným.

Vedle *Stigmaria ficoides* přichází pak ještě *Cordaite borassifolia* a *Lepidodendron laricinum* skoro ve všech ostatních pánvích. Hlavně *Cordaite borassifolia* schází posud jen ze Stilecké pánve, jest ale ve všech ostatních v tak hojném počtu úlomků naznačen, že druh tento co po pojednaných pánvích všeobecně rozšířený přijmouti můžeme. — Taktéž přichází *Lepidophlojos* (*Lepidodendron*) *laricinum* i tam, kde otisky korové vůbec scházejí a sice taktéž v dosti hojných exemplárech, tak že můžeme i tento druh co všeobecně po všech našich pánvích rozšířený přijmouti.

Vzhledem k většímu počtu určitelných *Sigillarií* souhlasí pánev Lísecká s Mírešovskou a liší se tyto obě od ostatních, od kterých se též větším dílem vzhledem k tvaru vrstev uchylují. — Ačkoliv z pánviček v okolí Radnickém vedle rodů *Sigillariových*, z osamělých pánviček nalezených, žádné *Sigillarie* uvedeny nejsou, nesmí se to nikoliv scházení jich u Radnic, nýbrž jen tomu připisovati, že tam posud nalezené *Sigillarie* jiným druhům přináležejí, než posud u Lísku a Mírešova se vyskytly. Z okolí Radnického známo posud 12 druhů rozličných a sice mnohem větší část jich z hořejšího skupení. Vzhledem na zbytky rostlinné souhlasí tedy pánev Lísecká a Mírešovská v jistém stupni se svrchním skupením u Radnic a smělo by se z toho soudit na mladší tvar v obou těchto pánvích na proti oněm v pánvích u Přflep, Stilce a Letkova, jež souhlasí více se spodním skupením u Radnic. — Jak se samo sebou rozumí, může se tímto naznačeným rozdílem časovým v povstání jednotlivých pánví uhelných spojití jen prostora času podmiňující jen dřívěji neb později uloženou vrstvu téhož tvoření, jak se to v pánvích Radnických ve spodním a svrchním skupení v bezpřetržné souvislosti vyskytuje, nikoliv ale jinou geologickou periodu.

Prozkoumáním jednotlivých pánví uhelných seznáno mimo to větší rozšíření rodu *Araucarites*, jenž se posud jen z okolí Radnic uváděl. Shluky tak zvaného vláknitého *Anthracita*, v nichž nejprve Göppert prosenchymatosní buňky dřevní objevil, jež obsahují jednu neb dvě, ba i tři řady buněk dupkových a jež porovnával s oněmi u nyní žijícího druhu *Araucaria Cunninghami*, nacházejí se sice všude mezi vrstvami sloje uhelné; však ne všude a ne vždy se poštěstí, dokázati v nich buňky, jak jsou pro sosnovité význačné, jak již dávno a nejprve z českého naleziště u Radnic poznány byly. Mnohonásobné zkoumání objevilo úplně vyvinuté buňky dupkovité a oněm od Radnic zcela podobné též z pánví u Přflep, Lísku a Mírešova. Musíme při tom ale podotknouti, že všechny *Anthracit*, z těchto pánví

pocházející, nevykazuje takové buňky dupkovité a že pídění se po nich dosti často bez všeho výsledku zůstává, kdežto některé části jimi skoro přeplněny jsou. Ukazují k tomu sice již zevnější obrysy, že i jiné rostliny při přechodu do stavu fossilního vlastnosti vláknitého Anthracitu přijímaly; přece ale se tím nevylučuje, že nebyly u všechních konifer, ve vrstvách kameného uhlí zahalených, podmínky při znenáhlem přetvořování příznivy udržení buněk.

Scházení tedy posud zjištěných buněk dupkových ve vláknitém Anthracitu z jedné neb druhé pánve není ještě dosti ospravedlňující příčinou, by se scházení rostliny této ve fossilní flóre na tomto místě co zjištěné považovati mohlo, a zdá se tedy, že by se Araucarites též co rostlina, všeobecně v našich pánvích rozšířená považovati mohl.

Výhradným přicházením fossilních rostlin pozemních a bahenních, úplným scházením mořských tvarů, jak z říše živočišstva, tak rostlinstva, musíme i tyto pánve, jako i ostatní české pánve, za sladkovodní útvary pokládati; vzhledem pak k druhům mezi rostlinami, jež sloj uhelnou provázejí, převládajícím, řadí se k pásmu Sigillariovému dle prof. Geinitze, jež ale není ani s nějakým na jiných místech nad ním vystupujícím pásmem ve spojení, ani provázeno na jiných místech pod ním uloženým pásmem.

Jak vzhledem k těmto poměrům, tak i co do uložení a organických zbytků souhlasí naše malé pánve úplně se souhrnem u Radnic uložených tvarů uhelných a musíme je tedy považovat co uložení, s Radnickými pánvemi uhelnými stejnorodé a za stejných poměrů a podmínek povstalé. A zrovna jako u Radnic, scházejí i zde stopy po vrstvách, jež by se útvaru permskému přičítati mohly, jenž na jiných místech s útvarem kamenouhelným v bezprostředním spojení se nalézají. Vody, z nichž se mladší permské vrstvy uložily, byly toho času již na severnější krajiny obmezeny, jak také vrstvy tyto v severnějších částech nalézáme.



# Rudy železné v krajině mezi Prahou a Berounem.

Sestavili:

**Jos. Vála**, c. k. báňský rada

a

**R. Helmhacker**, báňský inženýr.





# ÚVOD.

---

## Ohraničení vypsané krajiny.

Útvar silurský jest v Čechách nejbohatším zřídlem rud železných a an západně Prahy směrem asi západojižním se táhne, kterýmž směrem též jde silnice pražsko-eňská: jest okolí této silnice, jak na sever tak i na jih, onou částí krajiny, kteréž zde pojednáno bude. Silnice z Prahy do Berouna rozděluje krajinu vymananou rudonosností svou asi ve dvě.

Střed silnice jest sblíženě u Hořelic, střed pak celé krajiny asi u Úhonic daleko severně od Hořelic, kteráž ves asi stejně daleko od rozličných míst, v kterých rudy uloženy jsou, vzdálena jest.

Obvod krajiny naší naznačen jest těmito místy počínaje od Prahy směrem západu: Šárkou, Vokovicemi, Libocí, Hostivicemi, Letovicemi, Hájkem, Červeným zdem, Svárovem, Libečovem, Chyňavou a Hýskovem; odtud pak opět k východu s Lhotku, Vráž, Loděnice, Mezouň, Tachlovice, Zbuzany, Řeporyje, přes Vidovle Praze nazpět.

Délka celé krajiny obnáší asi 3 miriametry, šířka asi 1 miriometr, celá rozloha tedy asi 3 čtverečné miriametry nebo asi 5 našich čtverečných mil.

Na prostřední neb druhé mapě rakouského generálního štábu, jejíž měřítko obnáší:  $\frac{1}{144000}$  neb 1 millimetr = 144 metrů (1 palec =  $\frac{1}{2}$  míle rakouské míry), jest listu č. XIII. z Čech, poznamenaném co „okolí pražské“ naše krajina v čtvrti východní (neb vpravo dále), až na nepatrnou část jihozápadní, úplně obsažena.

Na mapě okolí pražského vydané Maticí českou roku 1851 v měřítku:  $\frac{1}{86400}$  neb 1 millimetr = 86·4 metry (1 palec = 1200 sáhů) jest celá krajina úplně obsažena v čtvrti jihozápadní (neb vlevo dole).

Na velké neb první mapě rakouského generálního štábu, vydané 1868, jejíž měřítko rovná  $\frac{1}{28800}$  neb 1 millimetr = 28·8 metrům (1 palec rakouské míry rovná se 1 sáhům), jest v okolí Pražském sestávajícím z dvaceti listů, obsažena na listu č. XVII. takřka na úplném listu; potom částečně v listech č. XII, I, XIV, XVIII.

Dle této velké mapy sestavena přehledná mapa Tab. I, až na část, kteráž do listu č. XVI vyplněným toliko nápisem připadala a jež zvlášť z map astronomických vložena jest. Čáry naznačující vlak ložisek přeneseny z map přede-

hledních v měřítku katastrálním, rovnajícím se  $\frac{1}{2880}$  (neb 1 palec = 40 sáhům), jakož i z map báňských v měřítku  $\frac{1}{720}$  (neb 1 palec = 10 sáhům) zhotovených.

### Horopisný přehled.

Celá krajina mezi Prahou a Berounem jest vysočinou asi 400 metrů nad hladinou mořskou povýšenou, kteráž se jak na východ, tedy k Vltavě, tak i k západu k Litavce mírně kloní. Nejnížší místa jsou obě řečiště ohraničující vysočinu od východní i od západní strany, nebo Vltava jest u Troje 174 metrů, Litavka u Budňan asi 215 metrů, u Staré hutě 237½ m., nad obzor mořský povýšena. Výška vysočiny nad nejnižšími místy krajiny, kudy řeky se ubírají, obnášela by tudíž asi 200 metrů.

Planina střední jest proryta k východu strmým údolím šáreckým, vedlé něhož mírný úval od Holešovic počínaje až k Chejní a Hostivicům se rozprostírá a u kláštera v Hájků končí. Druhé údolí jest motolské, kteréž berouc počátek svůj u hospody na Radosti západně od Motol a u Řep, jest posledním svahek Bílé Hory a půlnočním lázem Vidovlí až k Smíchovu ohraničeno. Třetí příkré údolí jsou Daleje neb sv.-Prokopské údolí od Řeporyj počínaje až do Hlubočep se táhnoucí.

K severní straně jsou mimo obvod naší krajiny zaryty rokly u přední Kopaniny, Kněžovsi a Hostouně.

K jižní straně jest, od Drahelčic a Hořelic počínaje, až k Tachlovicům mírný počátek údolí naznačen, kteréž ale za Chejnic v příkré prorvané Radotínské údolí přechází.

Nejznačnější všech údolí jest ono Kačického neb Loděnického potoka, kteréž počínajíc daleko severně za obvodem naší krajiny u Braškova a u Dobré, pro zeměznalecké poznání krajiny nejdůležitější jest od Podkozí až k Loděnicům, kdež se rozšiřuje, odkud co těsné strmé údolí sv.-Ivanské až asi proti Tetfnu se vine. V celé západní části převládají vršiny utvořené vedlejšími údolími tohoto Loděnického údolí neb též Litavského.

Celá střední planina jest toliko velmi mírně vlnitá, tak že rozdíly výšek na ní jsou nepatrné. Nejvýchodnější výběžky planiny, kteréž se téměř až k samé Praze rozprostírají, jsou Bílá Hora a Vidovle, ona 378½, tato 365 metrů vysoká.

Vysočina snižující se do úvalu Hostivicko-Dehnického jest na severní straně na Džbáně v Šárce a na Malém vrchu severovýchodně od Hostivic 360 a 375 metrů vyvýšena; pokračování vysočiny k západu jest u Nových dvorů 385½, na Horkách východně od Plotěného Újezdu 406, u Ounoště samého pak 422½ m. vysoké.

V zmíněném již úvalu jsou: železnice v Brusce 226 m., Vokovice 294½ m., Liboc 314½ m., Hostivice 324½ m. vyvýšeny. Jižní planina k tomuto úvalu se sklánějící jest nejvyšší na temně Družového vrchu severně od Dušníku, kterýž dosahující výšky 406½ metru jest zároveň nejvyšším místem celé planiny. Ostatní místa na planině této jsou změřeny u Radosti (hospody) 376 m.; u hřbitova u Stodůlek 366½ m.; u Stodůlek na pískách 388 m.; u Chab střední výška 372 m.; u Chrástán 381 m.; severo-západně od Chrástán 399 m.; u Dušník homole 392½;

v Ouhonicích asi 385 m.; v Hájku v klášteře 400 m.; ve dvoře v Újezdě červeném 403½ m.

Celá vysočina tato složena z vrstev útvaru křídového a kdekoliv vyvýšenost menší jest, tu buď již silurské vrstvy pod křídovými uložené, povrch zemský skládající na den vystupují, jako ve východní části úvalu z Hostivic k Brusce se rozprostírajícího; nebo místa méně vysoká leží buď na okraji neb v samých pískovcích křídových, spodek útvaru skládajících. Vyšší místa pak vesměs na vyšším opukovém pásmě se nalézají. Kdekoliv však nad vysočinu malé kopečky vynikají, jako na Horkách u Plotěného Újezdu nebo na Chaloupkách v Červeném Újezdě, tu se tyto skládají ze skal buližnfkových o něco málo nad povrch vrstev křídového útvaru vynikajících.

Jiná vysočina, jižněji předešlé od této mírným úvalem oddělená, z největší části své leží mimo dosah hranic naší krajiny a skládá se z vápenců vrchního silurského útvaru. Některá místa této vysočiny vápenné jsou: Draha západně od Slivence, jihovýchodně od Řeporyjí 368 m.; Ořech 365 m.; Mezouň 378 m.; Vysoký Újezd 417 m.; nejvyšší temeno vysočiny vyčnívá v Stydlé vodě východně od svatého Ivana do výšky 434 metrů.

V údolí Šáreckém vrytém do vrstev spodního útvaru silurského jest Jenerálka 243 m.; na protějším pravém břehu Vltavy pak Zámeček na skále v Troji 252; skála u Bulovky proti dělostřeleckému terči na pláni Holešovické 309 m. vysoká.

Údolí potoka Kačického jest u Loděnic 246; v Chrustenicích 259; jižně u Nenačovic 262½ m. vysoké; toto hlavní údolí jest příčné, ano přeráží směr všech vrstev skalních, z kterých úbočí jeho složena jsou: na levém svahu údolí vyčnívá nejvýše vrch Blejskava východně od Chrustenic do výše 421 metrů, jí naproti položen jest Hřeben na pravém svahu, kterážto oba vrchy ukončují údolí Kačického potoka, an se toto u Loděnic velice se rozšiřující údolí teprve u Sedlce opět sужuje. Na levém břehu vyčnívá opět nejvýše Karabinský vrch západně od Ptčů do výše 442½ metru.

Z levého břehu hlavního údolí vycházejí pobočná údolí, kteráž rozprostírajíce se asi směrem vlaku vrstev tudíž podélnými údolími jsou. Jedno z nejrozsáhlejších údolí jest údolí u Loděnic k Nučicům se táhnoucí, po jehož k polednímu sklánějícím se lazů jde silnice z Loděnic do Hořelic; úbočí tohoto údolí podélného jsou na severu Blejskava, na jihu táhlý vrch Kolo, jehož výběžek východní přes Tachovice až k Dobříči, zámeček 379, se stopovati dá. Ostatní poboční údolí nejsou tak prostranná jako toto: tak třeba údolí jižně od Nenačovic končící a k Drahelčicům vystupující, potom údolí od Kalousového mlýna k Ouhonicům s postranními svými roklemi; údolí od Podkozského mlýna k Svárovu, pomíjejíc ostatní menší. Údolí břehu levého jsou krátká, toliko asi na půl hodiny cesty sdělí. Delší jsou údolí břehu pravého, údolí od Loděnic k Vraži 306 m., kteréž jest pokračováním údolí z Nučic k Loděnicům; tak mírné údolí od Chrustenic na Lesy a k Lhotce 397½ m. se rozprostírající, údolí severně od Chrustenic končící a podél severně klonícího se lazů, v Březové zvaného, až k malým Přílepům se rozprostírající; úval od Nenačovic k malým Přílepům 378½ m.; nejvyšší bod silnice v malých Přílepech 381 metrů; úval severozápadně od Nenačovic; nejdelší údolí úzké jest

ono, kteréž jižně od Podkozí končíc, podél severně se klonícího srázu Bubové, až za Libecov k Chyňavě se rozprostírá a kterýmž Chyňavský potok se vine.

Všecky vedlejší údolí břehu pravého hlavního údolí kačického potoka vystupují až na předěl vodní mezi pořčím Litavky a kačického potoka, kterýž přes výšiny od Vraže, Lhotkou k Železné až k Chyňavě se stopovat dá. Od vodního předělu se údolí kloní k západu k řece Mži a sice ono od Vraže k Berounu, ono od Lhotky k dvoru Ptáku u Berouna, ona od Přílep a Chyňavy kostel 380 m., kdež mírný úval vytvářejí, přes Vápenici u Železné 356½ m. k Hýskovu a Staré huti. Zároveň s podélnými údolími, kteréž do příčného Kačického ústí, táhne se řada vrchů, jejichž prodloužené hřbety asi jedním směrem se seřadují.

Co pokračování mírné vyvýšeniny jižně u Chráštan 399½ m. a Jinočan na Škrobech 388 m. u Hořelic (kostel) 378 m. jeví se Blejskava a hřeben u Chrustenic jakož i jejich pokračování severně od Vraže přes osadu na Lesích a Lhotku až k Berounu. Nejvíce však vyniká nad ostatní řada vrchů, počínajících západně od Ptíčů Karabinským vrchem a Chrbinským a Bubrovským temenem tato 449½ m., Hůrkou u Libečova, Kameninou severně od Železné 458 m., až k Plešivci u Berouna 437 m. až k Litavce se rozprostírající. Kamenina, ač nejméně nad údolí okolní vyniká, jest přece nejvyšším pustým hřbetem celé naší krajiny.

Všecky tyto vrchy složeny jsou ze skal pásma spodního útvaru silurského.

Mezi vysočinou vápennou, vrchním silurským útvarem, a spodním pásmem silurským dá se sledovat úval počínaje od Butovic přes Narvu ves k Řeporyjům, odtud kolem Zbuzan, kde toliko Krteň kostelíček 343 m. vystupuje až k Dobříci, ač zde do vysočiny se ztrácí, nebo blízké Jinočany jsou již 359 m. vysoké; jihozápadně opět sestupuje úval k Tachlovicům a okolo Letníka kolem vrchu Krahulova uprostřed mezi Hořelicemi a Loděnicemi sestupuje do Lodenického údolí.

Hlavní ráz krajiny podmíněn útvary křídovým a silurským. Na vysočině pak jsou předěly vodní pořčí rozličných. Tak jest předěl mezi potokem Kačickým a Radotínským, kterýž u Ptíčů vzniká, od Ptíčů přes Ouhonice, Drahelčice, Hořelice přes Letník a Mezouň k Vysokému Újezdu. Předěl vodní mezi pořčím Vltavy a Litavky jde rovným směrem od Hájku kláštera k Jinočanům, Dobříci až k zadní Kopanině.

## Geognostický přehled.

Jak již při horopisné povaze krajiny podotknuto bylo, skládá se tato z vrstev hlavně dvou útvarů: silurského a křídového, ku kterým v rozsáhlosti podřízené co třetí útvar též kamenouhelný se druží. Všecky troje útvary obsahují rudy; nejdůležitější ovšem z nich útvar silurský, kterýž složen z pásem rudonosných a bezrudých. Rudonosná pásma jsou v naší krajině ve vysutém spodním, jakož i v ležatém vrchním silurského oddělení uloženy. Nejdůležitější co do rozsáhlosti, i co do množství v nich uložené rudy jsou vysutá pásma spodního oddílu silurského v kterých ruda nejínan než v ložiskách se vyskytuje.

Méně důležitý jest útvar kamenouhelný, v jehož ležatých vrstvách rudy

v shlukách (konkrecích) zároveň uložených se objevují: křídový útvar pak obsahuje toliko v nejnižších vrstvách něco rud, kteréž ale beze vší důležitosti jsou.

### Silurský útvar

jest v obvodu naší krajiny ve dvou od sebe oddělených částkách odkryt; část východní jest vyvinuta kolem Prahy, část západní pak na východ od Berouna uložena jest. Mezi oběma částmi jest útvar křídový, kterýž zasahuje ze severních Čech co široký pás dosti hluboko do krajiny silurské, tuto asi takto obmezuje: Východní hranice útvaru silurského, za kterými se pod křídovým útvarem ukrývá, jdou od Plotěného Újezdu severně od Ounoště asi podél železnice z Plotěného do Červeného Újezdu vedoucí, jsouce jen nepatrně na západ od železničné dráhy pošinuty. Od Červeného Újezdu se sice určitě stopovat nedají, ale možno dle pohledu krajiny za to mít, že podél železnice až asi k Ouhonicům, odtud k Drahelčicům a Dušňákům, pak podél silnice Berounsko-Pražské až k Chrástánům se rozprostírají, odkud přes Třebenice, Chaby a Stodůlky až na Vidovle se sledovat mohou. Východní hranice se zhruba dají sledovat asi od Nebušic kolem Džbánu v Šárce, k Liboci a Třešovicům.

Jak v západní, tak i ve východní části pokrývá na menších prostranstvích útvar křídový na způsob jednotlivých ostrovů útvar silurský; nebo mezi křídovým útvarem zaryté údolí hlubší jako Motolsko-Košfšské sestávají z vrstev silurských.

### Spodní oddíl silurského útvaru.

Nejstarší pásmo silurské, kteréž jakož i celý útvar v naší krajině se vleče k východo-východo-severu a k jihu se kloní, jest *souvrství B*, sestávající z fylitů neb břidlic, prahorním břidlicím nad míru podobných a z břidlic křemenných nebo buližníků. Pásmo toto jest bezrudé a azoické.

Severní hranice pásma *B* s prahorními břidlicemi *A*, nebo s jinou prahorní horninou snad s rudou, nikde patrný nejsou, an je kamenouhelný jakož i křídový útvar pokrývá, což vše mimo dosah naší krajiny leží. Jižní hranice tvoří pásmo *B* u nás veskrze s pásmem *D*, an určitě poznané mezipásmu *C* posud nikde objeveno ještě nebylo.

Hranice jižní dají se asi takto sledovat od západu k východu. Od potůčku mlýnského z obce Chyňavské k Litavce se prýstířsko sleduje se rozhraní přes Jakubinky a Kamennou jižně od Chyňavy, k Libečovu k močidlu, odkud po půlnočně sklonitém srázu vrchu Bubové a Chrbiny podél Chyňavského potoka přes Kačický potok se na severním úklonu Karabinského vrchu jižně od Svárova až k Chaloupkám Červeno-Újezdským táhne, kde pod křídový útvar se skrývá.

Vrstvy sestávají vesměs z břidlic neb fylitů a toliko u Svárova a Červeného Újezda vyčnívají na den z mírně sklonité krajiny menší kupy buližníkové, jak se zdá zároveň s vrstvami okolními uložené.

Ve východní části jest hranice buližníků s pásmem *D* u Liboce a sice jižně

u počátku Debru Vlčho, do kterého údolí šárecké se dělí. Buližnsky v této rokli strmé stěny vytvářejí. Odtud z východu se sleduje hranice dále a buližnsky se v břidlice mění, v kterých nedaleko za Černým Beránkem na silnici z Šárky do Horoměřic se porfyr felditové podřízeně vyskytují. Feldity jsou základní hmoty celistvé, barvy pleťové, šedorůžové a šedavě narudlé, v kterých toliko více neb méně porůznu malé krystaly průhledného křemene vrostlé jsou: jak se v břidlicích objevují porfiry, zdali v žilách, nebo ložiskách, nedá se pro nedostatečné odkrytí jich samých určit. U Podbaby opět buližnsky ohraničují visuté pásmo, jakož i na pravém břehu Vltavy přes Ovenec dolní k Nové Troji a Kobylisům se toliko buližnsky sledují.

Drobové břidlice, fylitům nad míru podobné, jsou barev šedočerných, šedomodravých a šedých, velmi dokonale břidličnatého slohu. Vrstevnatost jejich jest též dokonale vyznačená. Buližnsky jsou přetvrdé, barev šedočernavých, dýmových a bledě šedých, rozličně pruhovaných barvami světlejšími, jakož i bílými žilami křemene; buližnsky barev šedočerných jsou hojnější ostatních. Lom jest velice střepinatý, potažná váha buližnsku barvy dýmové ze Svárova určena s množstvím 3.06 grammů obnášela 2.6344.

Mimo hojně žíly bílé křemenné, v kterých neztídka zvlášť v Šárce v Rokli vlčí větší poloprůhledné krystaly křemene vyhraněny bývají, se též žíly průhledného až čirého vápence hrubozrnného objevují. Na tenkých trhlinách bývají slabé kory bledě zeleného kalaitu, zvlášť v Šárce narostlé, též u Svárova nalezen, však toliko co přeútlé povlaky. Kromě tenounkých černých povláků stromkovité se rozvětvlujícího psilomelanu a nečistých povláků rudého zemitého haematitu v roklích jiných nerostů nenalezeno posud.

Vrstvy pásma visutého, v kterémž se již skameněliny objevují, nepřiléhají bezprostředně na drobové břidlice fylitům přepodobné, nýbrž na vrstvy zvláštní břidlice pásmo *B* ukončující. Břidlice jest šedá a patrně drobnozrná, ač se poznat v ní nemůže složivo, z čeho sestává. Na východím svém promění se barva šedá v šedavou neb žlutošedou; v základní hmotě vtroušeny pak bývají žlutohnědá malická zrnělka, bezpochyby co pozůstatky bělavých, jemných, neprozkoumaných posud zrněček, jež v nezrušené drobové břidlici se objevují.

V celém prostranství naší krajiny od Hýskovských pozemků až po Svárov sledovat se dá toto pásmo záhadných břidlic, jehož mohutnost v Chrbinské štole, kdež přeraženo jest, asi 30 metrů obnáší. Tolikéž i v Šárce v břidlicích hlinitých drobových a tufových, kteréž na pravých břidlicích pásma *B* uloženy jsou, některé vrstvy oněm břidlicím k nepoznání podobné uloženy se vyskytují.

Jestliže tyto břidlice zvláště snad vrstvy pásma *C* zastupují, kteréž, ano hlavně na skamenělinách (a též na uložení) založeno, zde poznáno není proto, že skamenělin pro toto pásmo důležitých není; nebo jestli se břidlice již do ležatých vrstev vyššího pásma *A*, zahrnouti mají, též pro nedůstatek všech skamenělin zcela neurčité jest. Šárecký způsob uložení těchto břidlic by spíše poslednějšímu náhledu svědčil, ač tím i prvý určitě vyloučen není.

Nejlépe když místo v řadě posloupnosti pásem určitě oddělených, které pohraničním těmto drobovým břidlicím přináležejí, prozatím ještě neurčito zůstane.

Pásmo *B* naznačeno na mapě Tab. I pro sebe; na průřezu Tab. II obraz 1

jest na severní straně písmen *bř* naznačeno; bezprostředně pod slepenci *dr* leží zvláštní břidlice zde podotknuté. Na Tab. III obr. 1 a 4 jsou š. b. zvláštní břidlice; na Tab. II obr. 2, 4 a 5 jsou břidlice pásma *B* naznačeny písmenem *b* na Tab. III, obr. 6 však bulžňsky co *bu* na Tab. IV obr. 1 písmenem *b*.

Na pásmu fylitů a bulžňských vesměs azoických není nikde pásmo *C* nesouvrství zvrhenu prvou obsahující objeveno, an bezprostředně po mezeře pásma *C* mohutné pásmo *D* založené na zhytých zvrhenu druhé uloženo se vyskytuje.

Rozsáhlost pásma *D* jest značná, nebo tvoří pruh, jehožto ležaté se dá jižně od Chyňavy, přes Libečov rovně až Červenému Újezdu, dále po neznámé přestávce pod útvarem křídlovým přes Šárku, Podbabu až ke Kobylišům sledovat, visuté ale táhne se jižně od Vraže přes Letňsk, Tachlovice, Dobříč, Řeporyje k Jinonicům a Zlíchovu. Vodorovná šířka celého pruhu ohnází asi  $6\frac{3}{4}$  kilometru uprostřed naší krajiny, tedy asi od Svárova k Vysokému Újezdu, ač celé mocnost souvrství *D* se asi na něco málo více dvou kilometrů odhadnouti může: an však uhel úklonu vrstev veskrz něco málo vyšší jest než  $45^\circ$ , (ovšem s výminkami, kde uhel pod tuto míru klesá), tedy z toho již vysvitá, že pásmo 2 kilometry mocné nikterak v nepřetržitěm uložení vyvinuto není, ana by jinak pro tuto mocnost vodorovná šířka pásu asi něco málo méně 3 kilometrů obnáseti měla: pro celou šířku pásu však, kdyby nepřetrženě uložena byla, měla by zase být mohutnost celého pásma asi něco málo méně 5 kilometrů.

Z hruba možno říci, že vodorovná šířka celého pásma *D* jest asi dvojnásobná míry, jaká vlastní mohutnosti pásu přináleží.

Uložením se to vysvětluje, proč mocnost nesouhlasí s vodorovnou šířkou celého pásu; nebo ač v ležatém pásmu vrstvy všechny až do vodorovné vzdálenosti  $1\frac{1}{2}$  kilometru (počítaje od ležatého směrem k visutému), ve visutém od pásma *D* až do odlehlosti 3 kilometrů ve směru opačném všechny vrstvy zároveň a rovně ukloněny se objevují: představuje střední část nad míru nepravidelné, porušené ba i překocené uložení vrstev, kteréž tudíž v nepořádném a zvráceném svém uložení větší vodorovné prostranství zaujímají, než jaké by jinak vyplňovaly, kdyby neporušeně v stejném slohu na sebe přilehaly.

Části ležaté a visuté mohutného pásma *D* jsou sice též mnohými rozsedlinami přerušeny a pošinuty ze svého pravidelného uložení, což vůbec i při nejpravidelnějším uložení vždy bývá; střední části ale mimo tyto rozsedliny, jež vrstvy tržené pošinují, jinými převelkými vrženými odtrhnuty, potom překoceny a na způsob ohromných vln zohýbány bývají, tak že těmito proměnami uložení pravé až k nepoznání zpotvořeno a geologické ohledání velice znesnadněno jest.

V celé krajině naší není celá rozsáhlost pásma nikde v takové míře odkryta a přístupna, jako v údolí Kačického potoka od Podkozí až k Loděnicům. Údolí hlavní samo jest vytvořeno z dlouhé trhliny příčné; údolí pobočná, kteráž jsou podélnými, opět naznačena bývají buď rozsedlinou neb poddutým uložení vrstev, jež na úbočích údolí v tomto druhém případě zároveň se sklonem svahů uloženy jsou. Postranná údolí pak opět bývají často naznačena příčnými rozsedlinami. Obvykle se skládají všechny vrchy, od východu k západu vedlé údolí se protahující, z vrstev tvrdších křemencových; údolí pak z vrstev měkkých břidličnatých, ač též opak toho, ovšem že mimo pravidlo a v míře menší, se pozoruje nezhůdka.



Pásma  $D$  odděleno v menší pásy od ležatého k visutému  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$ ,  $d_4$  a  $d_5$ ; počnou-li se od ležatého k visutému dle sklonu potoka Kačického pásy tyto rozeznávat, poznává se na stránkách údolí snadno pásmo  $d_1$ ,  $d_2$ , potom  $d_3$  dle povahy břidlic a dle uložení, konečně i pásmo  $d_4$  nad kterým místy se též břidlice objevují, kteréž by jaksi na břidlice pásma  $d_5$  připomínaly dle své podoby, však jest toto poslední zcela záhadné. Čtyry tyto pásy dají se až k pobočnému údolí z Drahelčic se sklánějícímu a jižně od Nenačovic končícímu sledovat; odtud počínaje objevují se opět vrstvy pásma  $d_1$ , což uložení pod křemenci pásma  $d_2$ , jakož i skamenělinami, nezvratně dokázáno jest, pak  $d_3$  kteréž složením svým jakož i skamenělinami poznány jsou;  $d_3$  následující toliko dle uložení seznáno *uv* ale dle skamenělin,  $d_4$  a  $d_5$  následují dále, kteréž určitě poznány, pásmo do visutého ukončují.

Jakkoliv ještě velice mnoho v údolí Loděnickém nepoznáno pozůstává pro nedokonalé odkrytí, pak pro nedostatečné propátrání, znesnadněné spleteným uložení, tož přece se dá tolik seznat, že od ležatého k visutému se všechny vrstvy pěti pásem (až snad na pásmo  $d_5$ , kteréž určitě poznáno ani není) střídají dvakráte po sobě, že tedy na pásmu  $d_4$  určitě poznaném vrcholí opět řada  $d_1$ ,  $d_2$  až  $d_5$  počínaje od nejstaršího k nejmladšímu v pořádku přirozeném.

Nejdůležitějším všech silurských pásem naší krajiny jest pásmo  $D$ , kteréž rudonosné jest v rozličných místech.

Horniny, kteréž pásmo skládají, jsou hlavně křemence, potom drubové břidlice, posléze tufy diabasové a diabasy.

Všecky tyto horniny objevují se ve všech podpásmech (až snad na pásmo  $d_3$ ) v kterých dle toho, v jakém množství jednotlivě vyvinuty jsou, ráz pásmu každému ukládají. —

Že se všechna pásma hlavní pásmo  $D$  skládající dvakráte po sobě opětuji, bude zde i dvakráte o každém pásmu zmínka.

Ležaté pásmo  $d_1$  jest nejen pro naše okolí, nýbrž pro celé Čechy svou rudonosností důležitě; horniny, z kterých pásmo složeno jest, jsou: slepence neb droby a drobové pískovce křemencům přepodobné, tufy diabasové a tufové břidlice, posléze drobové břidlice.

Slepence složeny z malých valounků bílého křemene, spojených drobnými zrnčky písku křemenného, v kterém se podřízeně též břidlice a valounky buližníku objevují; zdrobněním zrna jsou tyto slepence neb droby křemenné spojeny s pískovci drobovými drobno- až jemnozrnitými. Jemnozrné pískovce, v kterýchž se zrno více neroznává, podobající se náramně jednodušné křemenné hmotě, složené z neviditelných zrnček, mohou se krátce křemenci nazvat, kterým na pohled velice až k nerozeznání se přibližují složením svým: Jednotlivé vrstvy křemence zbřidličnatí, přistupuje-li do složení jejich něco rozdrčené hlinité hmoty povstale z břidlic nebo tufů diabasových zrušených. Tímto přibývajícím zbřidličnatěním přechází křemec neb pískovec drobový v břidlice drobové neb tufové.

Tufy diabasové jsou složení až posud záhadného, ač v nich Labrador jakož i nerost augitový (Augit nebo Hyperethen) pozorovány byly. Složeny jsou z zrněk neb úlomků nějaké afanitové aneb diabasové horniny buď prostě, nebo zrnka umenšují se až do předrobná, čímž celistvé až břidličnaté odrůdy tufů diabasových, tedy tufové břidlice se vyvinují.

Je-li tuf diabasový úplně prostoupen vápencem buď žilkami, nebo je-li jím proniknut, tvrdnou trochu tufy a přibližují se tak zvaným „Schalsteinům“ zvláště v Nasavsku poznaným. Jest-li že přistupují do tufů jakýchkoliv, zrnitých neb celistvých, co hrách velké i též menší kuličky vápence bílého, tedy mění-li se sloh malými zevdami neb mandlemi vápence v mandlovcovitý neb amygdaloidický, jmenují se mandlovci (Mandelsteine.) Přistupuje-li do složiva diabasového živec Labrador buď nezrušený neb polo zkaulinovatělý, mění se tuf v diabasový tuf slohu porfyrického. Přistupuje-li do složiva zdobné složivo břidlic drobových, jest tím přechod do břidlic drobových; zrněčky písku křemenného do drob křemenných neb křemenců podmítných. Zdobní-li složivo velice a dostaví-li se zároveň sloh dokonale břidličnatý, povstávají tufové břidlice, kteréž zvápenatěním Schalsteinschieferům se podobají.

Barvy tufů jsou obyčejně šedé, šedozelenavé, zelenavé, bělavé, rudé a šedo-rudé. Břidlice jsou vesměs tence vrstevnaté, tufy jsou vrstevnaté až velmi hrubo vrstevnaté, ba místy se zdají jako by byly nevrstevnatými. Na vzduchu se tufy vesměs snadno rozpadávají a drolí, zkyprující se porušováním součástí, až na ony drobovým břidlicím podobné.

Břidlice jsou černé drobové, přejemně složené, slídnaté, veledokonale břidličnaté a na vzduchu snadno zkyprující se a drolící. Přechod břidlic do jiných hornin vyjma do křemenců, což se dosti náhle děje zpískováním a ztvrdnutím, se nepozoruje.

V pásnu  $d_1$  převládají nad vrstvy slepenců a křemenců (pískovců) vrstvy drobových břidlic černých a tufů diabasových.

Mohutnost celého pásma  $d_1$  jest velice měnivá; jižně od Chynavy obnáší asi něco více  $\frac{1}{4}$  kilometru, v Chrbinské štole západně od Libečova toliko  $1\frac{1}{4}$  hektometrů, u Vojtěšské štolý jihozápadně od Svárova na Karabinském vrchu  $1\frac{3}{4}$  hektometrů, dále k západu u Červeného Újezda zdá se být mocnost ubývající opět. V Šárce ve směru silnice Dehnicko-Nebušícké, tedy u dvora Jenerálky jest mohutnost pásma opět značnější, ana asi něco méně  $1\frac{1}{2}$  kilometru obnáší, u Troje však ve směru přes Zámeček na skále proti Holešovicům jest rozsáhlost pásma dle mocnosti své asi  $5\frac{1}{4}$  hektometrů.

Tak jak se mohutnost pásma mění, tak se proměňuje i mocnost souvrství, kteráž skládají celé pásmo; jednotlivá souvrství složená z křemenců, tufů diabasových neb břidlic drobových, mění se ve své rozsáhlosti znamenitě ale nepravidelně. Ovšem, že v místech, kde bývá mohutnost celého pásma  $d_1$  největší, též některé ze souvrství nejmohutněji vyvinuté podmítnou celou mocnost pásma, aniž by zároveň ostatní pásy hornin rozsáhleji vyvinuty byly; jinak řečeno zmohutňují a seslabují se jednotlivá souvrství pásma skládající nepravidelně, každé zvlášť o sobě, tak že žádného vztahu mezi nimi není v přibývání neb ubývání rozsáhlosti. Přibývá-li mohutnosti jednomu pásu, není tím i přibývání pásu druhého podmíněno, kteréž nejen že třeba ani neubývá ale nezřídka i mohutnosti své potráčí. — Nejnížší souvrství složeno ze slepenců a drob (pískovců) křemenných, kteréž uloženy jsou na zvláštní břidlici vrcholící na břidlicích pásma  $B$ , ostře jsouc od ní odděleny. Vrstvy slepenců co nejnížších vrstev pásma  $d_1$  jakož i ostatní vyšší vrstvy, kteréž se

někdy též místo chybících drob křemenných břidlic azoických dotýkají, jsou s vrstvami pásma *B* zároveň uložené<sup>2)</sup>).

Pás slepenců sestává ve svém ležatém, kterým se visutého azoických břidlic dotýká, ze slepenců hrubovrstevnatých, kteréž čím výše, tím více se zdrobňují, až posléze visuté pásu složeno z drob neb pískovců křemencům pásma *d*<sub>2</sub> přepodobných, v kterých na některých místech jako na močidle východně od Libečova slabší vrstvy tufového pískovce se střídající jedinou skamenělinu tohoto pásu, *Lingula lamellosa* Barr. obsahují. Na místě *L* tab. IV., obr. 1 se vyskytuje skamenělina v křemencích *kř* na levém břehu Chyňavského potoka v ležatém pod rudou spodní *r*.

Pás křemenců jest toliko na některých místech uložen; tak se dá sledovat od Chyňavy, kdež na hranicích Hýskovských se pohřešuje, přes Libečov k Svárovu a Červenému Újezdu. U Liboce severně od Vlčí rokle se opět podobné křemence vyskytují, nejsou ale v Šárce více, aniž se v Troji s jistotou poznávají. Zdali se v Šárce křemenec vyřezuje neb do břidličnatých drobových tufů se proměňuje, není pro nedostatečné odkrytí vrstev pozorovat.

Na tabuli II. obr. 1. jsou v pravo severně k visuté křemence a *dr* ležaté droby toho pásu slabého; na t. III. ob. 2 a 3 jsou severně *kř*, tyto křemence ležaté.

Ostatní pásy hornin, které v celém obvodu vytknuté krajiny se objevují, jsou dvě ohromná lože tufů diabasových, kteréž, odloučeny jsouce břidlicemi drobovými, kterýmiž též pokryty jsou, skládají vlastní rudonosnou část pásma.

Oba pásy tufů rudonosných s jistotou objevené složeny jsou z diabasových tufů, v kterých zároveň s vrstevnatostí se vyskytují vrstvy břidlic tufových, s tufy nevrstevnatými poznenáhlými přechody spojených, v rozličných vzdálenostech od sebe. V břidlicích tufových jsou uloženy vlastní rudní ložiska.

Ložiska složeny jsou obyčejně z rudy Haematitové a sice oolitické neboli semenité v mocnosti  $\frac{1}{2}$  decimetru až 5 metrů i více; na některých místech jsou rudní ložiska zvlášť mohutná a přibližují se až mohutnosti 20 metrů, jsouce složeni z nuznější rudy černošedé, tolikéž oolitické, kteréž se Chamoisit říká.<sup>3)</sup> Ložiska méně mohutná však, na jistých obmezených místech složena jsou z celistvé neb hrubě olitické takřka mískovitě složené přechistě a přebohaté rudy Haematitové. Lože rudní nejsou veskrz vyvinuta tak jako břidlice samy; jednotlivá ložiska rozprostírají se v břidlicích tufových do jistých obmezených vzdáleností, kde se buď vytrácejí zeslábnuvše, aneb kde ve vlaku ložiska místo něho samého vedle sebe táhlé čočky neb krátká ložiska vždy spořeji a obmezeněji a prostraněji se objevují, až celé ložisko rudní tak se vytratí. Na jiných místech opět ložiska znuzujíce se přecházejí v břidlice tufové rudě zbarvené, kteréž posléze, v jalové břidlice se měníce ložisku konec činí, tak že toliko břidlice pouze co jalové pásmo v tufech se objevují, v kterých nevytratí-li se docela nebo nestlačuje-li se mocnost jejich značně, opět rudní ložiska nebo jednotlivé rudní čočky velké se objevit mohou. Ložiska skládají se z jediné neb více vrstev rudních, z nichž každá o sobě rozličné odrůdy rudní obsahuje; jednotlivé vrstvy rudní mění se co do mohutnosti velice, buď některá z nich zmohutnějíc převládá nebo se ostatní vytratí neb v jedinou srazí.

Ložiska se objevují v ohromných ložích tufů diabasových v rozličných obzorech

neurčitých nad sebou uložených. Mohutnost ložisek jest tak nepravidelná, jako mohutnost pásů tufových, v nichž uloženy jsou, a od rozsáhlosti břidlic tufových i tufů zcela neodvislá.

Z obou přeznačných loží diabasových jest v našem obvodu zvlášť ono v ležatém důležité, neb v něm se vyskytují až trojí ložiska rudní nad sebou ve vzdálenostech neurčitých a měnivých, počínaje od Chyňavy k Libečovu, dále k východu mezi Svárovem a Ptíci až k Červenému Újezdu. Lože tufové přeráží Kačický potok jižně od Podkozího; na stráních a svazích údolí Kačáka mezi Svárovem a Libečovem jsou hlavně ne sice velmi mocné, ale tím bohatší rudy báňskými pracemi rozdělaný. Toto spodní pásmo ve východní části své v údolí Šáreckém obsahuje toliko slabé vrstvy nuzné rudy, postrádá tedy důležitosti.

Uloženo jest tufové pásmo ležaté v obci Hýskovské a částečně též v Chyňavské na břidlicích azoických, tolikéž v Šárce a snad i v Troji. V Šárce se ležaté vrstvy jeho skládají z břidlic pevných zvláštních, drobovým břidlicím podobných, v kterých též porfýry felsitové uloženy se objevují. Visuté pásmo tufů rudonosných ve východní části kraje takorůzka známo není, toliko v štolě Chrbinské proraženo v slabé mocnosti, jsouc rudonosné. Za to ale vyvinuje se toto pásmo náramně mezi Vokovicemi až za Dehnice, kde opět dále sledováno není pro nedostatečné odkrytí. U Vokovic jest v něm uloženo ložisko rudy červené, blíže části visuté. Jestli že Vokovické visuté ohromné lože tufů diabasových jest v témže obzoru uloženo jako ono v Chrbinské štolě, kteréž se zdá, že ke Svárovu ani nepřechází, nedá se ovšem určit. Zdá se však, že tuffy diabasové zvlášť lože visuté uložené s břidlicích zaujímají obzor neurčitý. Okolo Svárova a Libečova jsou v nejnižších vrstvách tufových břidlic rudých dotýkajících se ležatých křemenců bílé skameněliny malíckých Brachiopodů nalezeny, jak později zmínka se stane.

Na tab. II. jest jediné ležaté lože diabasu *d* a *l*, *l* ložiska rudní v něm uložena. Na tab. III. jest v obr. 1, 2, 3, 6 *td* jediné ležaté lože tufu a 1, 2, 3 lože rudní; tab. IV. obr. 1 jest *td* tuf a *r*, *r* lože rudy.

Na Tab. III. obr. 4 jest *td*, 1, 2 tuf ležatého lože s ložiskami rudy, *td* pak tuf lože visutého; tab. III. obr. 5 jest *br* ležatá, drobové břidlici podobná část lože tufů diabasových *td1*; *td2* jest visutý pás tufový, v kterémž u *r*? by ruda na den vycházet měla.

Mezi oběma ložemi tufů rudonosných a nad nimi, byť by i toliko jedno bylo, jsou uloženy tence vrstevnaté černé břidlice opět v mohutnosti měnivé. V břidlicích se kromě žilek neb zarostlých kousků celistvé rudy hnědé neb Limonitu nijaká jiná ruda u nás neobjevuje.<sup>4)</sup> Pás břidlic dá se sledovat od Chyňavy a sice pod půlnoční částí hřbetu mezi Chyňavou a Železnou, kdež právě malé kousky Limonitu zarostlé v ní objeveny, přes Libečov, přes Karabinský vrch až severně k Ptíci. U Vokovic jakož i u Dehnic, též v údolí Šáreckém jsou značně vyvinuty, tolikéž i černá skála u císařského mlýna a u bubenečské železniční stanice z nich složena, jakož i pravý břeh Vltavy u Dolního Ovence a Troje, kdež po silnici vedoucí údolím Nové Troje k Kobylisům dobře odkryta jest, skládá.

U Chyňavy a sice blízko kapličky na hřbetu Kamenině nalezeny dolovou prací zkyprné kuličky shluků, obyčejně skameněliny jako u Voseka a Ouval obsahující, zde ale bez zřetelných skamenělin. U Vokovic nalezeny v kuličkách

*Dalmanites attavus* Barr. *Belerophon* a jiné nezřetelné skameněliny. To jsou také jediná dvě místa, kdež vůbec v břidlicích v krajině naší se otisky vyskytly, proto že pásmo, z břidlic snadno se drolicích složené, hlubší místa zaujímá, jsouc pokryto hlínami, není na mnohých místech přístupné, ač snad by ve východní části své více skamenělin v něm se najít dalo.

Na tab. II. obr. 1 jest *čbr* touto břidlicí na Karabinském vrchu, na tab. III. obr. 2, 4, 5, 6 jsou tyto břidlice naznačeny co *čbr* a opětuji se na obr. 5 dvakrát po sobě. —

Chtě něco lepšího utvořit než již Barrande-m uděláno bylo, rozvrhl Lipold celé rudonosné pásmo na tři oddíly a sice na souvrství  $\alpha$  vrstev Krušnohorských, kterými pískovce a droby ležaté naznačeny býti měly, na  $\beta$  neb Komárovské vrstvy tufové s uloženými ložisky rudními a na Rokycanské břidlice černé  $\gamma$ . Vrstvy  $\alpha$  starší než  $\beta$  a tyto opět starší než  $\gamma$  jsou, jak to zřetelně na Krušné hoře uloženo se objevuje, z které pododdělení, z mnohých stran přijaté<sup>3)</sup> a užívané, na celý útvar přenešeno bylo.

Však v skutečnosti se v naší krajině, Krušné hoře přece tak blízké, toto podrozdělování pásma  $d_1$  provést nedá. Nebo již jediné lože *tufů diabasových* rudonosných co  $\beta$  pojmenovaných uložené v černých břidlicích mladších  $\gamma$  v Chrbíně a zvláště mohutné v Šárce vyvinuté dokazuje, že tufy a břidlice neurčitě se střídají, že tedy posloupnost vrstev dle řady  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  v přírodě není vyvinuta. Jednotlivá ohromná lože diabasových tufů se od sebe nikterak co do podstaty petrografické rozeznat nedají, ať jsou již uloženy na břidlicích azoických nebo na křemencích a pískovcích tak zvaných  $\alpha$  nebo uprostřed černých břidlic  $\gamma$  nebo i mezi křemenci pásma  $d_2$ . Spíše se dá soudit, že v pásmu  $d_1$  se objevující ohromné lože tufů diabasových v obzorech zcela neurčitých celé pododdělování pásma  $d_1$  nemožným činí. —

Na pásmu  $d_1$  jsou uloženy vrstvy pásma  $d_2$ , kteréž jest veskrz bezrudé. Horniny pásmo skládající jsou hlavně křemence, vedle nich podřízeně diabasové tufy a ještě podřízeněji drobové břidlice.

Na černých břidlicích drobových obvykle v pásmu  $d_1$  vrcholících jsou buď náhle neb přechody spojené vrstvy křemenců uloženy. Křemence jsou bělavé, žlutavé, naředlé a narudlé velmi pevné a hrubovrstevnaté, takřka celistvé. Vlastně jsou to přejemné pískovce spojené křemennou hmotou vyhraněnou; že pak vyhraněná jemnězrná hmota často velice převládá a to zvláště na místech, kde není ve vrstvách žádných skamenělin, jest tím jmeno křemenců, kteréž se těmito jemným křemenným pískovcům dává, odůvodněno.

Tufy diabasové bývají buď zrnité neb též mandlovcovité, obvykle barev šedo-zelenavých; barvy rudé a břidlice tufové nejsou v nich tak hojné jako v předešlých v pásmu  $d_1$ , od kterých se žádným způsobem, vyjma uložením, nerozeznávají.

Břidlice černé jsou drobové, slídnaté, břidlice buď jemné a oněm v  $d_1$  předobné neb trochu pískovité šedočerné a opět drobovým břidlicím některým z pásma  $d_4$  až k nepoznání podobné.

Nejobyčejněji skládá se pásmo  $d_2$  toliko z hrubých vrstev křemencových, trhajících se ve směrech přímo na vrstevnatost do špalíků; mezi vrstvami objevují se podřízeně břidlice černé neb černošedé slídnaté. Na visutých černých břidlicích

pásma nižšího  $d_1$  buď bezprostředně uloženy jsou aneb se s nimi střídají v tom způsobu, že vrstvy křemencové převládají nad černé břidlice, kteréž se posléze do visutého vytrácejí, kdežto zase ve směru do ležatého mnohosti i rozsáhlosti křemencových vrstev ubývá, až se v břidlicích ztrácejí. Takovým způsobem složena valná část pásma v naší krajině.

Však v obvodu Kačického údolí na místech dobře odkrytých pozoruje se, že nejnižší vrstvy pásma  $d_2$  složeny jsou z tvrdých vrstevnatých křemenců beze všech břidlic, tedy nedělených. Nad těmito křemenci následuje pás tufů diabasových zrnitých jakož i mandlovcovitých, kteréž opět pokryty jsou mohutným pásmem křemenců, v nichž asi pod prostředkem se střídají vrstvy břidličnaté s vrstvy křemence a s ložisky tufů diabasových v neurčitém pořádku.

Toto zde vypsané složení pásma  $d_2$  jest výborně odkryto na Karabinském vrchu západně od Ptíčů horních, nedaleko na jihozápad od Vojtěšské štolý. Nejspodnější křemence skládají úzký hřbet trochu nad ostatní krajinu vyvýšený a dosahují u štolý Vojtěšské, kdež nejlépe odkryty jsou, mohutnosti asi 40 metrů; v Chrbinském vrchu se též poznávají tyto ležaté křemence, však nemožno zde určit, jak daleko k Libečovu neb za Libečov se táhnou, tolikéž i rozprostírání jich východně za Ptíce neznámo pro pokrytí celého povrchu krajiny hlínami a útvarem křídovým.

Zdali tyto křemence a na nich uložené tufy diabasové skutečně do pásma  $d_2$  náležejí, není skamenělinami dokázáno, an v nich toliko dlouhé krásně zachovalé trubky duté, jmenované *Scoecolithus linearis* Hall, kteréž sice pro křemence pásma  $d_2$  dosti význačnými jsou, však z kterých se s určitostí na pásmo  $d_2$  soudit nedá. Soudí se tedy toliko z petrografické povahy, z uložení a z těchto trubek, že by křemence mohly do pásma  $d_2$  náležet.

Na křemencích uložené tufy opět jižně od Vojtěšské štolý na Karabinském vrchu dosti dobře odkryty jsou v mohutnosti asi 60 metrů; jižně od Rojnovského mlýna vycházejí v údolí v stráních na den a táhnou se Chrbinským vrchem daleko přes Bubovou, ač mohutnost jejich neznáma, jakož i všude na den nevystupují.

Křemence a diabasy naznačeny v Karabinském vrchu tab. II. obr. 1 písmeny  $k$  a  $d$ ; dále ve visutém nad mocným pásem křemenců „ $k$ “ se v Čížkové rokli střídají asi tři lože diabasových tufů okolo 2 až 8 metrů mocných  $d$ ,  $d$ ,  $d$  s černými břidlicemi *čbr*, v kterých opět vrstvy křemenců se střídají. Jak daleko se opět tato lože diabasová rozprostírají, nedá se určit; zdali některé mocnější pásy diabasů v Chrbinském vrchu a na Bubové s nimi souvisí, nebo zdali zvláštní lože to jsou, nedá se nikterak posud rozhodnout pro nepříznivé odkrytí.

Pásmo  $d_2$  vrcholí opět v křemencích  $k$  severně od myslivny v údolí Kačickém končících.

Od Chynavy, kde severně od Železného křemence Kameninou nazvaný hřbet skládají (tab. III. obr. 2  $kř$ ), dá se pásmo  $d_2$  hřbety Hůrkou u Libečova po výšinách Bubové a Chrbiny tab. III. obr. 4  $kř$ , přes Karabinský vrch až k Ptíčům sledovat. Mimo údolí Kačické jest mohutnost všude jinde nezjištěna, zde asi  $6\frac{1}{2}$  hektometrů obnáší, jestli že hranice pásma  $d_2$  dobře pojmuty jsou, což pro nedostatek skamenělin toliko z petrografické povahy se soudilo. Od Hvězdy u Velešlavína se opět pásmo křemenců sleduje okolo Třešovic tab. III. obr. 5 k Oře-

chovce (laboratorium dělostřelecké), kdež ve svém visutém všude křídovým útvarem pokryto jest, pročez jeho mohutnost neurčitá.

Na pravém břehu Vltavy objevuje se opět u Troje v skále, na které Zámeček stojí asi v mocnosti  $\frac{3}{4}$  hektometru a posléze na skále u Bulovky u Libně proti dělostřeleckému terči na Holešovické pláni.

Vyšší pásma  $d_3$  složené z černých jemných drobových břidlic zdá se býti toliko v údolí Kačického potoka pouze dle petrografických známek a dle uložení poznáno, nebo skamenělin v něm posud nehledáno. Zdá se, že pásma černých břidlic ne velmi mocných na Rejnovském vrchu asi trochu k severu od písma  $db$  tab. II. obr. 1 přináležejí k  $d_3$ . U Prahy též nejisto, zdali tu tento pás objevuje se, nebo břidlice  $db$  na tab. III. obr. 6 u Troje na křemencích pásma  $d_2$  uložené jsou šedočerné neb černohnědavé a nejisto, zdali do pásma  $d_3$  nebo  $d_4$  náležejí.

Pásma  $d_4$  jest významné tím, že sestává z drobových břidlic střídajících se s křemencovými vrstvami. Křemence jsou mnohdy k nerozeznání, podobné oněm z pásma  $d_2$ , a kde převládají, jest velice nesnadno poznat určité pásma  $d_4$  a rozeznat je od  $d_2$ . Drobové břidlice jsou rozličné, buď jemné černé, neb šedočerné, neb černohnědavé slídnaté, břidličnaté neb písčnaté; těmito písčnatými břidlicemi jest přechod do břidličnatých křemenců a pravých křemenců zprostředkován. V pásmu  $d_4$  převládají na některých místech vrstvy křemencové velice nad břidličnaté, a takovými pásy jest podobnost k pásmu  $d_2$  vyznačena; na jiných místech opět převládají břidlice velice nad křemence nebo toliko výhradně se objevují: jestli že břidlice jsou jemné, tu podobnost k břidlicím pásma  $d_1$  a  $d_3$  převelká až k nerozeznání; tolikéž na jiných místech střídají se břidlice s vrstvami křemenců, což opět k  $d_2$  podobné býti může. Jestli že pásma  $d_4$  jest v uložení velmi nepravidelném jako právě v údolí Kačického potoka u Nenačovic, tož jest zevrubné poznání jeho tím nesnadnější, an se na všech místech s určitostí dle uložení poznat nedá, zdali vrstvy nepřináleží též jiným pásmům ležatým, kteréž snad též jako  $d_4$  v porušeném uložení se objevují.

K rozeznání vrstev pásma  $d_4$  zdají se velice být nápomocny ony pruhy rozvětvující se a mozoulům podobné vyvýšeniny na vrstevních plochách, pocházející jak se zdá od chaluh nedokonale a nezřetelně zachovalých. Podobu zdánlivou mají pruhy rostlinných otisků k *Bythotrephes flexuosa* Hall (Göppert, die fossile Flora der silurischen, devonischen und unteren Kohlenformation oder des sogenannten Übergangsgebirges 1860 tab. XXXV. fig. 6 a p. 452), nebo k *Chondrites antiquus* Brongn. sp. (Brongn. Histoire des vég. aux fossiles. Tom. I, 1828 tab. IV. fig. 1 pag. 63 (*Fucoides antiquus* Brongn.) Göppert, die Flora der Übergangsformation 1852. Tab. I. fig. 1, pag. 81); jestli že ale skutečně velmi nezřetelně zachovalé rostlinné zbytky částečně přehojné ve vrstvách pásma  $d_4$  také těmi rostlinami jsou, jakým se podobají zdánlivě, jest ovšem nejisté.

Sledují-li se vrstvy, kteréž oněm z pásma  $d_4$  nápadně se podobají a jež pod Rejnovským vrchem uloženy jsou směrem jižním až k myslivně u Kalousového mlýna vedle cesty údolím k Ouhonicům vedoucí, tedy se v této části objevují veskrz v přirozené nezrušené poloze (ovšem až na menší přesmyky všude hojně) s úklonem jižním. Od údolí z Ouhonic k mlýnu Kalousovému vedoucímu až k údolí z Drabčic na západ směřujícímu jsou vrchy a stráně údolí složeny z vrstev přenepravidelně

uložených, přesmyknutých a přetrhaných, vlnovitě ohýbaných s úklonem k jihu ne- k severu, ba též tak posouvnutých a překocených vrstev, jejichž úklon odchyľující se od severního neb jižního sklonu v jistých menších částech trochu málo k západu neb východu se otáčí.

Vše to svědčí o ohromných převratech a nepravidelnostech v uložení vrstev. Vrstvy mnohokrát překocené, přehýbané a přehojnými vrženými posouvnuté, bývají přechoasto roztrhány a křemence v samé úlomky roztlačeny, břidličnaté vrstvy pak rozřmoleny a zohýbány, aniž by na nich všude směr a úklon se rozeznával, který těmito převraty zvlášť vedle rozsedin setřen bývá. Že pak vrstvy velice rozdrčeny jsou, jest povrch výchozího jejich pokryt mocnými vrstvami hlíny s přehojnými úlomky křemenců, — a tak tedy celá krajina přese všecko, že pásma vrstev tak rozerváno jest ve svém uložení, neposkytuje tolik odkrytých a k ohledání slohu skal nutných odhalených míst, jak by se z uložení porušeného snad soudit dalo. Toliko některá málo přístupná poboční údolí a postranní rokle hluboko v lesích poskytují částečně trochu náhledu v sloh skalních vrstev; na vlastních úbočích údolí Kačického se pro pokrytí jich málo úspěchů dobude. Vrchy, na kterých se překocení vrstev povstalý úklon k severu pozoruje, jsou zvlášť severo-západně od Nenačovic, kdež na jižním svahu úklon křemenců a břidlic k jihu, na severním svahu úklon vrstev překocených k severu se ukazuje. V jiných údolích skrytých v lesích pak u Nenačovského mlýna a jinde jsou vrstvy k jihu se klonící též hojné.

Že proměny jak ve směru tak i v úklonu vrstev jsou velice hojné, jde snadno na um z porušeného uložení. Tak pozorovány směry mezi hodinou 3. až k hodině 10., ač hlavní směr ostatních vrstev asi k hodině 5. se vleče; úklony od 5° až více 60°, ba až do příkrého pozorovány jak na sever tak na jih. Za každým téměř krokem jest za vržením vždy jiný a opět jiný směr a úklon vrstev patrný.

Pro podobnost křemenců a břidlic pásma  $d_4$  k vrstvám pásem  $d_1$   $d_2$   $d_3$  částečně i  $d_4$  se na všech místech určitě rozeznat nedá, jest-li všecko co pozorováno bylo, jest skutečně pásmem  $d_4$ ; však jest-li že všecko i nesestává z pásma  $d_4$ , tedy alespoň to jest jisté, že pásma  $d_4$  skládá převládajíc největší část tohoto nepravidelně uloženého pruhu, jehož vodorovná šířka dosti značná jest, nebo asi 2 kilometry z hruba obnáší.

Pás nepravidelně uložených vrstev, převládajíc snad z pásma  $d_4$  složený, dá se od Nenačovic na západ sledovat daleko přes Přílepy k Železné, pak přes Ouhonice, odkud pokryt jest křídovým útvarem, dále k východu, Praha sama v severní části své leží na východním pokračování toho pásu porušené složené a ohýbaného. Stráž na Letné a Bruska jsou pokračováním těchto zde vypsanych vrstev. Na obr. 1. tab. II. jsou vrstvy naznačené písmeny  $k$   $hbř$   $kbř$  a  $čbř$  co křemence, hnědočerné, křemenné a černé břidlice střídající se.

V celém pásmu, kteréž takřka bezrudé jest, objevují se jen sem a tam pořídku vrstvy břidlic prostoupené úplně hnědou železnou rudou neb Limonitem, obyčejně na blízku vrstev střídajících se s křemenci. Ruda jest nužná od zahrnuté v ní břidlice drobové, co v hloubce jest, nedá se určit, možná ale, že Chamoisit, nebo v Bubenči v studni pana Lany jak se zdá v pokračování našich vrstev  $d_4$ , vyskytly se malé kule černošedého Chamoisitu, o kterých ještě později se zmínka stane.

Na jiné nerosty jest toto pásmo tolikéž chudé, jen v obci Nenačovické nalezen



v rozsedlině vyplněné rozmělněnou břidlicí ve výchozím jejím v šachtě kutné, v kteréž též slabá vrstva Limonitu nalezena jest byla, Delvauxit. Místo, kde nalezen, jest vedle jedné cesty v lesích severo-západně od Nenačovic. Blíže dá se poloha místa asi tak udat, že jest vzdáleno, jak od Nenačovického tak i od Kalousového mlýna, od každého z nich stejně daleko a dosti přesně  $1\frac{1}{2}$  kilometru; od prvního mlýna směrem k severo-západu, od druhého směrem k západo-jih-západu.

Delvauxit barvy kaštanové, podob ledvinovitých a kulovitých velikosti až pěstě, povrchu hroznovitého, lomu lasturového a lesku mastného, byl toliko prvý čas po vydobytí pevný; za krátko rozpadával se v samé drobtý nepravidelně čtverečné, zvlášť rychle na slunci. Jakkoliv z úplna zjištěno není, že nalezen ve vrstvách  $d_4$ , any tyto z převládajících křemenců složený též pásma  $d_2$  se podobají, zdá se přece mnohem pravdě podobnějším být, že v prvém pásmu se objevuje. \*) Kule pokryty jsou zemitým našedlým slabounkým povlakem, v kterém sem tam zrníčka křemenného písku zarostlá jsou a kterýž obsahuje kyselinu fosforečnou vedle něco kyseliny sírové.

Potažná váha nerostu obnášela, jak byl, tedy i s bublinkami ve vodě z něho se vyvíjejícími: 2·1844 a jiného 2·0741, nerost úplně vodou prosáklý, tedy prost všech bublinek vzdušných, měl hutnoty 2·2308 a 2·3545; prvý, jehož vzato ku zkoušce 2·97 grammů, obsahoval tedy 21% dle objemu dutin vzduchem vyplněných; druhý, jehož vzato 1·46 grmů, však 12·00% dutinek obsahoval.

Jiný kus 1·28 grmů, těžký vyvařený ve vodě, jehož hutnota určena na vlásku na hydrostatické váze, dal 2·25 (dle Bořického „O Delvauxitu z Nenačovic Živa 1866 ročník 13. str. 310 a Lotos 1867 Märzheft).

Sušen pod chloridem vápenatým pozbývá vši vody hygroskopické a potažná váha uveličuje se na: 2·707, 2·696, 2·700 určena množstvím 43, 36 a 10 grammů (Bořický, na udaných místech).

Nerost  $\alpha$  vysušen pod chloridem vápenatým obsahoval  $HO = 12·62\%$ ; vysušená část, jíž bylo 63 grammy, analysována obsahovala:

|                                                        |          |                                                   |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| nerozpustného zbytku neobsahujícího rozpustnou $SiO_2$ | 4·08     | } nerozpust. zbytek 6·78<br>3·33 = všecka $SiO_2$ |
| nerozpustná v kyselině solné $SiO_2$ vyloučená . . .   | 2·70     |                                                   |
| v kyselině solné rozpustná $SiO_2$ . . . . .           | ·63      |                                                   |
| při 100° C prchající $HO$ . . . . .                    | 7·56     |                                                   |
| v žáru prchající $HO$ ostatní . . . . .                | 16·71    |                                                   |
| $Fe_2O_3$ . . . . .                                    | 42·71    |                                                   |
| $CaO$ . . . . .                                        | 4·88     |                                                   |
| $MgO, KN, NaO$                                         | neurčeny |                                                   |
| $PO_3$ . . . . .                                       | 15·62    |                                                   |
| $SO_3$ . . . . .                                       | 2·23     |                                                   |
|                                                        | 97·12    |                                                   |

Z nerostu, v kyselině solné, třeba rozředěné, snadno rozpustného vylučuje se vedle šedého nerozpustného zbytku pocházejícího od zahrnuté rozmělněné břidlice rozsedliny, v níž Delvauxit zarostlý jest, kyselina křemičitá v chomáčcích bílých, an jen nepatrná část jí se rozpouští. Vařením roztokem uhličitanu sodnatého dá se vyloučená kyselina křemičitá odloučit od ostatního zbytku nerozpustného.

Nerosty  $b$  a  $c$ , jichž vzato 54 a 45 grammů, analysovány Bořickým, (na uve-

deném místě) když byly prvé pod chloridem vápenatým hygroskopické vody pozby-  
veny bývaly:

|                                                         |         |        |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| $\text{SiO}_2$ . . . . .                                | 2·390   | 3·053  |
| $\text{HO}$ všecka bez rozdílu teploty, při které prchá | 20·580  | 21·137 |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ . . . . .                       | 50·325  | 49·897 |
| $\text{CaO}$ . . . . .                                  | 6·926   | 6·430  |
| $\text{MgO}$ . . . . .                                  | 1·248   | —      |
| $\text{PO}_3$ . . . . .                                 | 18·374  | 18·135 |
| $\text{SO}_3$ . . . . .                                 | ·429    | —      |
|                                                         | 100·272 |        |

Jak již prvé udáno, jest údolím od Drahelčic k západo-jih-západu vedoucím a jižně od Nenačovic končícím, jakož i v pokračování směru údolí úvalem k Malým Přílepům vedoucím směr převelké rozsídliny nebo ohybu nebo obojího najednou naznačen, kterýmiž se visuté vrstvy pásma  $D$  náhle ukončují, an pokryty jsou vrstvami pásem starších, na kterých opět v přirozeném pořádku od severu k jihu vrstvy mladší, až do ukončení celého pásma  $D$  následují v pořádku neporušeném, tedy v uložení přirozeném s úklonem jižním.

Na ukončení vrstev snad pásma  $d_4$  následují v naznačených údolích *opětované* vrstvy pásma  $d_1$ , kteréž tudíž dvakráte po sobě se v krajině naší objevuje. Hranice určité udat mezi odtrženým neb ohnutým dílem od  $d_4$  a mezi znovu vyzdviženými vrstvami pásma  $d_1$  zevrubně, není na všech místech možné, pro velikou podobnost břidlic pásma  $d_1$  a  $d_4$ ; kde se křemence pásma  $d_4$  stýkají s černými drobovými břidlicemi, tu rozdíl ovšem snadnější, ač i zde pro veliké převraty v uložení jest znesnadněný velmi. Na svahu k severu se klonícím v údolí od Nenačovických luk k Drahelčicům vedoucím jsou břidlice černé pásma  $d_1$  veskrz pravidelně k jihu skloněné, však v jižně sklonitém lazu částečně k severu sklánějí se, ač určitě rozhodnuto není, jsou-li břidlice tyto z pásma  $D$  ležatého neb z pásma středního. V úvalu, kterým pokračování údolí k Malým Přílepům naznačeno jest, je rozdíl v uložení pro rozsáhlé pokrytí hlinami ještě skrytější než prvý.

Z pásma  $d_1$ , zde vystupují toliko břidlice jemné černé, v kterých podřízeně diabasové tufy bezrudé, alespoň v údolí kenačovském, uloženy jsou. Výchozí takového jednoho lože asi 80 metrů mocného jest dosti dobře odkryto na jižním svahu údolí z Drahelcič k Malým Přílepům směřujícím blízko levého břehu kačického potoka.

Kromě břidlic a podřízených loží diabasu není v pásmu  $d_1$  nijakých jiných skal obsaženo a rozeznání pásma  $d_1$  co takového bylo by velice znesnadněné a nikdy zcela určité, kdyby v něm nebyly na jednom místě skameněliny nalezeny.

Místo, na kterém se skameněliny vyskytují, v kuličkách oněm z Voseka u Rokycan nad míru podobných, jest asi u prostřed mezi Malými Přílepy a údolím potoka Kačického na stráni k jihu skloněné, neb na levém břehu potůčka od Malých Přílep ze starých štol se prýstícího; od silnice z Přílep do Chrustenic vedoucí, několik kroků, tedy, nedaleko na jih. Též na polích na vrchu od silnice na sever se kuličky objevují v troušené v ornici polní, na stráni však i zarostlé v břidlicích. Krátký čas trvavším hledáním skamenělin v kuličkách nalezeny následující druhy:

*Placoparia Zippei* Corda., *Dalmanites attavus* Barr., *Ogygia desiderata* Barr., *Calymene* Arago Barr., *Aeglina prisca* Barr., *Iliaenus Katzeri* Barr., pak:

*Bellerophon* sp., *Orthoceras* sp., *Hyalithes* sp., *Discina* sp., *Orthis socialis* Barr., *Nucula bohémica* Barr., a *Encrinus* sp. Těmito skamenělinami nezvratně dokázán ráz černých břidlic co onen pásma  $d_1$ .

Však mimo skameněliny dá se ještě z červené rudy semenité uložené v tufech diabasových odvodit, že břidlice jest skutečně ona z pásma  $d_1$ , byť by i skamenělin v ní objeveno nebylo. Severovýchodně od Hýskova, vedle cesty na vápenici k Železné vedoucí na patě severního svahu Plešivce Berounského jest uložena v břidlicích tufových, kteréž opět v tufech diabasových spočívají seménka v ložisku až 1 metr mocném. Směr rudního ložiska jest z hruba východozápadní a úklon jižní. Ležaté mocného lože tufu diabasového rudonosného není sice přístupné, ano pokryto jest útvarem kamenouhelným, však z odlehlosti se dá soudit, že v ležatém opět snad mladší vrstvy nepravidelně uloženy jsou. Ve visutém nad břidlicemi vystupují opět křemence pásma  $d_2$ , jež na mnohých místech krystaly křemencovými velmi druznaté jsou.

Sleduje-li se vlak Hýskovského rudonosného tufu, nebo vůbec celého pásma  $d_1$ , tož souhlasí úplně s oním bezrudým diabasem v Loděnickém údolí uloženým, ač přes Železnou a Přílepy Malé všude bezprostředně se stopovat nedá pásmo toto. Jestli však i lože diabasové souhlasí co do obzoru s ložem v údolí u Nenačovic v černé břidlici uloženým, to ovšem úplně jest nerozhodnuto. Pás břidlic černých pásma  $d_1$  dá se sledovat k východu podél celého údolí až dosti blízko k Drahelčicům a Hořelicům v šířce dosti značné, ač ne veskrz zevrub známé; zajisté ale jest šířka delší  $\frac{1}{2}$  kilometru.

Od Hořelic a Drahelčic počínaje není dále k východu pás černých břidlic nikde odkryt, toliko u Hořelic samých jest vedlé silnice asi přes 100 kroků na severních lukách nedaleko potoka břidlice s jistotou dohloubena studnou. Na celé vysočině od Hořelic až za Motol jest pás břidlic ukryt a teprvé na jižním svahu Bílé Hory se opět objevuje, nebo v Košířích severně od kapličky v bývalém hrbitůvku košířském (západně od Mlynářky) nalezeny panem Barraudem v břidlicích samých otisky od *Dalmanites attavus*. Že pak podél jižního svahu Bílé Hory a podél silnice se pás přes Smíchov až na Slovany do Prahy táhne, jest dokázáno nálezem *Placoparia Zippei* Corda v základech sklepů Šárovských v Emauzích.

V stráni mezi Chrustenicemi a Malými Přílepy v černé břidlici uloženy malé závalky a žilky Limonitu. Též nalezeny v ní kule povrchu hroznovitého velikosti jablka, barvy žlutavě přihnědlé a patrně již pouhým okem co dutinaté rozeznatelné. Koule nepravidelné jsou *Diadochitem*, nebo rozbořem kvalitativním poznána v nerostu v rozředěné teplé kyselině snadno rozpustným  $PO_3$ ,  $SO_3$  vedlé  $Fe_2 O_3$ , též  $HO$ . Jest to *Diadochit* v nejstarších silurských vrstvách nalezený; později udáno bude, že v mladších o něco pásmech mnohem hojněji se vyskytuje než zde.

Na průřezu tab. II. obr. 1 jest pásmo  $d_1$  uloženo v údolí od Nenačovických luk k Drahelčicům vedoucím na severním svahu vrchu Blejskavy a sice jsou *čbr*, a *čbr* černé břidlice, hranice severního břidličnatého pásu však jsou nejisté, an do velkého území padají,  $d$  jest lože diabasu. Na obr. 2 tab. II. jsou opět *čbr* černé

lice pásma  $d_1$  s trochu nejistými hranicemi, any křídovým pískovcem *křp* poty jsou.

Všude bez výminky jsou nad břidlicemi pásma  $d_1$  uloženy vrstvy pásma  $d_2$ , rež sestávají z převládajících vrstev bělavého křemence s velepodřízenými slami vrstvami černé a černošedé drobové břidlice. V údolí Loděnickém severně Chrštenic vytváří holou příkrou bílou stěnu, v které se štěrk láme.

Pruh pásma  $d_2$  dá se sledovat od Plešivce počínaje přes Lhotku lesem Břeou až do naznačeného místa v Loděnickém údolí severně Chrštenic, kde moc-  
t  $\frac{1}{4}$  kilometru zaujímá. U Lhotky jest částečně pískovci podobný křemenec a  
ahuje skameněliny *Dalmanites socialis* Barr., jakož i *Trinuncleus ornatus* Barr.,  
ž dokázáno, že pás skutečně do pásma  $d_2$  přináleží.

Pruh, co bílá stěna na levém břehu Kačického potoka vystupující vleče se  
e k východu vrchem Blejskavou, kdež ve východní části lesa Blejskavského na  
erním svahu vrchu (severně od silnice Hořelicko-Loděnické) lomy otevřen jest,  
ž vlak jeho 5<sup>h</sup> úklon 47° k jihu obnáší; nedaleko Hořelic přeráží pásmo kře-  
aců silnici a jest opět odkryto bezprostředně východně od Hořelic asi 100 kroků  
e od silnice lomem založeným v mírné vyvýšenině, kdež vlak k 4<sup>h</sup> 4° úklon  
5° na jih směřuje. 7) Od Hořelic počínaje táhnou se mírné táhlé kopečky jižně  
silnice Pražsko-Berounské jižně okolo Dušníků, Chrástán k Třebonicům a Cha-  
n, kdež pod útvarem křídovým se skrývají. Na těchto kopečkách jsou vesměs  
stěné lomy, u Třebonic však lomy posud rozdělané.

Pruh křemenců vystupuje opět v Košířích severně vedle silnice, kde několika  
y otevřen jest; pod Emauzským klášterem na Slovanech a na Hrádku vyčnívá-  
skála křemencová jest pražským pokračováním tohoto pruhu.

Na tab. II. obr. 1 jest *k* pod Blejskavou severní křemenec tohoto pásma,  
obr. 2 jest *k* v zaniklém lomu znamení křemenců.

Černé břidlice uložené na pásmu křemenců zdají se přináležet pásmu  $d_3$ ,  
spoň vše co se z uložení a petrografické povahy soudit dá, poukazuje k tomu,  
by i skameněliny posud vyhledány nebyly. U Lhotky jest známa černá břidlice  
místech, kde by vrstvy pásma  $d_3$  uloženy býti měly; v údolí Loděnickém leží  
křemencích pásma  $d_2$  černé jemné tence vrstevnaté břidlice nevelice mocné na  
II. obr. 1 *čbř* poznamenané, které pásmo  $d_3$  zastupují; na obr. 2 není určitě  
šetřeno, v kterých místech by se vyskytovat mohly, protože tam ani vkresleny  
sou.

Vůbec jemné břidlice ne velmi mohutného pásma  $d_3$  (jehož mocnost snad  
iko 80—100 metrů obnáší, zaujímající nižší místa, pokryty a tudíž málokdy  
ře přístupny bývají.

Pásmo  $d_4$  jest opětovaně velmi mohutně vyvinuto a předůležité svou rudo-  
mostí.

Horniny, z kterých pásmo složeno, jsou křemence obyčejně šedavé a žlutavé  
přechody křemenců do břidlic drobových a slídnatých, černých velice jemných,  
b šedých a hnědošedých, kterými právě přechody do břidlic polokřemenitých  
značeny bývají. Co podřízené horniny objevují se v břidlicích a křemencích  
basy šedozelené, též ruda železná Chamoisit, někdy leckdes v takové mohutnosti,  
ji lze za horninu mít.

Tak jako ležatý pruh pásma  $d_4$ , o kterém dříve řeč byla, skládá se opěťovaný neb visutý pás z křemenců, s kterými se břidlice drobové střídají, neb břidlic se střídajícími se vrstvami křemenců, nebo pouhých drobových břidlic. Že ale visutý pás mnohem méně porušen jest ve svém pravidelném uložení, proto se sled vrstev také určitě sledovat dá, což v pruhu ležatém, převelmi v uložení porušeném, nebylo lze učinit pro překážky uložení se naskytující.

Počínaje od břidlic pásma  $d_3$  pozoruje se v ležatém pásma  $d_4$ , že složeno jest z mocných vrstev křemenců střídajících se s břidlicemi drobovými a křemencovými. Na břidlicích a zvláště na méně pevných křemencích barev šedavých, objevují se opět větvičky vyvýšené pocházející od otisků chaluh Chondritů sp. V některých místech pak v křemencích pískovcům pásma  $d_2$  přepodobných, též skameněliny objeveny, jakož i v břidlicích drobových měkkých. Místa, kde skameněliny objeveny a jaké tyto jsou, později udáno bude.

Nedá se upřít, že celé pásmo  $d_4$  dělí se jaksí v pásy dva od sebe neostře dělené, však předce předobře rozeznatelné; mocnost obou pásů jest si rovná, alespoň v místech, kde ji ocenit možno, jako v údolí Loděnickém a u Nučic. Rozdělení pásma  $d_4$  na dva pásy nedá se u spodního pásma porušené uloženého provést, právě pro uložení nepravidelné, jest ale též naznačen v přírodě.

Spodní pás nebo ležatý skládá se z převládajících vrstev křemenců a břidličnatých křemenců, v kterých toliko podřízeně vrstvy drobových břidlic se střídají. Křemence ležaté vytvářejí, přiléhají-li jednotlivé vrstvy beze všeho dělení břidlicemi k sobě, celé slabé souvrství křemencové oněm z pásma  $d_2$  nad míru podobné a dle znaků petrografických od nich jinak nerozeznatelné, jako  $k$ ,  $k$ ,  $k$ ,  $k$  v Blejskavě u Chrustenic na tab. II. obr. 1. Každý takový pruh křemencový rozeznává se přesnadno, byť by i zcela odkryt nebyl, an skládá vždy hřbet nejvyšší, jehož severní strana příkřejší jest mírněji skloněna strany jižní.

Vrchní pruh neb visutý přechodem s ležatým úzce spojený, složen z černých břidlic drobových, kteréž teprve ve visuté části své, tedy blízko ukončení celého pásma  $d_4$ , trochu tvrdnou zkřemeněním, s podřízenými tvrdšími vrstvami křemenité drobové břidlice se střídajíce.

Pruh ležatý nebo převládající křemenečný skládá vrchy zvláště v západní části krajiny, kde křemenců nad břidlice v spodním pásu v mnohem více převládajícím množství obsaženo jest než v části jeho východní. Vrchy z pod pásma tohoto složené táhnou se severně od Plzeňsko-Pražské silnice od samého Berouna kolem Lhotky a osady Na Lesích severně od Vráže přes Chrustenice až k samým Hořelicům, kdež Hřeben a Blejskavu u Chrustenic a Krahulov u Hořelic skládají.

Pruh visutý neb převládající z břidlic drobových složený jest více v nížině uložen a silnice z Berouna do Prahy vedoucí od Berouna přes Vraž až daleko na východ za Loděnice na něm vedena. Ve východní části krajiny, kde spodní pruh též vyšší místa zaujímá pruhu vrchního, není ten rozdíl tak příkře vyvinut jako právě u Loděnice, kde Hřeben křemencový (spodní) náhle se kloní v strán břidličnatou (vrchní), vedle samého pravého břehu kačického potoka až k Loděnicům se táhnoucí. \*) Na průřezu tab. II. obraz 1 a 2 jest vrchní část pásma  $d_4$  jižně od Blejskavy a jižně od Chrastice písmeny *čbř* a *hbř* naznačena.

Toliko v jedné části vrchního břidličnatého pruhu střídají se křemenité šedo-

černé neb šedohnědé drobové břidlice s břidlicemi měkšími a vyčnívají v řadě pahrbků nad ostatní nižší krajinu vyplněnou měkšími vrstvami tab. II. obr. 1 znamená *kbř* v Loděnicích.

Řada pahrbků počíná od silnice severně od Vraže, a severně proti hospodě na Janské u Loděnic jest nejvyšší pahrbek, v kterémž kule černošedého celistvého vápence co shluky mezi vrstvami zarostlé jsou a skameněliny mnohé, zvláště *Lep-taena aquila* Barr. obsahují. Od Loděnic na východ jde řada pahrbků jižně od silnice až k samému Krahulovu. Pohled na pahrbky s úzkým prodlouženým hřbetem a rovnými svahy, z nichž jižní trochu mírnější severního, jest zvláště překvapující pro pravidelnost průřezu jejich, kterýž jest trojboký a proto, že pata jejich ostře od roviny, na které vystupují, se dělí.

V nejvyšší části pásma tohoto visutého asi blízko styku s břidlicemi pásma  $d_2$  jsou též, jakož i v ležatém břidlic  $d_2$ , zarostlé malé kuličky šedého vápence obsahující skameněliny; tab. II. obr. 1 v Loděnicích na hranici mezi *hbř* a *šbř* naznačeno.

V Loděnicích jest též v pásmu břidličnatém severovýchodně od vesnice a severně od silnice neb jižně od místa mezi oběma štolama číslo I. a III., jejichž místo později zevrubněji udáno bude, v polích obmezená vyvýšenina složená z diabasu, kterýž, jsouc jak se zdá dle směru vrstev co krátký mocný kaban v břidlicích vrostlý, co tvrdší a méně zrušitelný břidlic na den vystupuje.

Rozdíl mezi pásmem nižším křemenitým a vyšším převládajícím břidličnatým, ač vespolečně ostře děleny nejsou, jest proto veledůležitým, jelikož na hranici obou se nalézá uložená vrstva železné rudy Chamoisitů \*)  $\frac{1}{2}$  až 20 metrů mocná, kterouž právě pásmo  $d_4$  tak důležité jest pro svou rudonost. Byť by se i vrstva rudní toliko jen až do jistého obmezeného prostranství, jak k západu tak i k východu rozprostírala, jest přece délka její jakož i důležitost co se mocnosti týče v ohledu bánském přeznačná. Od Vraže, okolo Chrustenic až k Nučicům a Jinočanům dá se vrstva rudní sledovat a všude jsou v ní bány rozdělaný. Však důležitější část všech ostatních jest v nejmohutnějším díle u Nučic, kde též dobývání a práce na rudě soustředěny jsou. Důležitost mocného lože pro průmysl železařský v kraji Pražském jest znamenitá.

Jak ležaté, tak i visuté vrstvy rudní jakož i Chamoisit sám obsahují skameněliny významné pro pásmo  $d_4$  a není žádného rozdílu poznaného co se týče skamenělin mezi ležatými a visutými vrstvami.<sup>10)</sup> Skameněliny sice leckdes na povrchu skal se nalézají, však hlavní podmínku poznání a vyhledávání jich dlužno toliko v rozdělení bánském hledat, kdež na příhodných místech po nich pátráno.

Pásmo  $d_4$  táhne se od Berouna k východu a leží na něm Vraž, Lhotka jest blízko něho, Chrustenice a Lodenice, pak Hořelice, dále se táhne mezi Dušňky a Nučicemi, přes Jinočany, Měřešice a Stodůlky, přes Vidovle, Radlice k Vyšehradu, který se z pásu břidličnatého skládá. Vodorovná šířka jeho obnáší u Chrustenic a Loděnic asi 1½ kilometru, z níž na spodní a vrchní část asi půlka připadne; u Nučic jest šířka o něco málo menší předešlé.

Mimo rudu chamoisitovou, kteráž se všude na výchozím co Limonit, do kterého proměněna jest, jeví, vyskytuje se ve vrstvách tohoto pásma zvláště v oné části, kde nepřevládají značné vrstvy křemenců, krátké lože nečisté žluté rudy podobné oné, která se na mnohých místech též v ležatém pásmu  $d_4$  u Nenačovic a jinde

nachází. Krátké lože rudy žluté jakož i krátké žilky objevují se však co břidlice úplně Limonitem prostouplé, jsou tudíž rudou toliko nuznou. Na Vidovli jakož i v cestě z Hluziny u Stodůlek na Vidovle jest mnoho takových krátkých kabantů uložených a to mnohdy s hranicemi dosti neurčitými, an se rudní část vytrácí poznenáhla. Ve Vraži též se na krátko slabá ložiska limonitu nečistého pod hlavním ložiskem Chamoisitu dosti hluboko uložená objevují mezi vrstvami břidlic křemencových a mezi křemenci.

Celé pásmo jest přemnohými a nezřídka dosti značnými vrženými posouvnuté, čímž vlak vrstev jakož i úklon jejich k jihu proměnlivým se stává. Sledováním ložiska prací dolovou mnoho vržení objeveno.

V části Vražské nedaleko lože rudního objeveny koule celistvých vápenců šedých, celistvých ve dvou blízkých vedle sebe obzorů vtroušených mezi vrstvami; koule obsahují skameněliny a možná, že náležejí do kolonie nějaké. Později ještě více o tom uvedeno bude.

Nejvyšší pásmo  $d_5$ , kteréž celému spodnímu útvaru silurskému vrcholí, a jež v spodních pásmech vržených s jistotou poznáno posud nebylo, ač některé břidlice nápadně oněm, kteréž opětované pásmo skládají, se podobají; uloženo jest bezprostředně na břidlicích černých pásma  $d_4$ . Že ale obyčejně břidlice drobové ve visutém jak pásma  $d_4$  tak i ležaté pásma  $d_5$ , kterými se obě pásma vespolně stýkají, pro svou drolivost jen velezřídka na den vystupují, není v obvodu naší krajiny rozhraní pásem  $d_4$  a  $d_5$  s jistotou známo.

Horniny, které pásmo  $d_5$  skládají, jsou světlé drobové jemné břidlice tencevrstevnaté, barvy šedozelenavé a žlutavězelenavé, pak pískovce jemnozrnné křemenné, přepevné, hrubovrstevnaté. Některé vrstvy velmi jemnozrnného pískovce podobají se až k nerozeznání křemencům pásma  $d_4$ , nebo jako v těchto přistupují do složiva pískovců přejemné zpotvořeně vyvinuté kryštálky křemene, kteréž na lomu jemnozrnném na slunci lesknouce se příčinou velmi nepatrného třpytění lomu jsou. Jakkoliv vrstvy pískovce od vrstev břidlic částečně ostře odděleny jsou, pozorují se přece mezi břidlicemi a pískovci přechody slabšími vrstvami pískovcovitými neb křemencovou břidlicí. — Podřízeně v těchto světlých vrstvách objevují se tmavé vrstvy, a sice šedozelený diabas v ložích a černá graptolitová břidlice. Ložiska diabasů však nedosahují takové mohutnosti, v jakéž se teprve v ležatém vrchního útvaru silurského vyvinují. Graptolitové břidlice jsou vrstevnaté a předokonale břidličnaté a objevují se v ložiskách buď s diabasy neb drobovými břidlicemi se střídající.

Podřízeně uložené graptolitové břidlice a diabasy ve svém souhrnu vytvářejí kolonie zvrženiny a pásem vrchního silurského útvaru, uložené do vrstev pásma  $d_5$ . Pásmo  $d_5$  jsouc bezrudé, má toliko vědeckou důležitost právě svými koloniemi.

Ležaté vrstvy pásma  $d_5$  skládají se z převládajících břidlic, visuté neb visutému velmi blízké vrstvy pak z křemenců a pískovců buď samo o sobě souvrství skládajících, nebo střídajících se s břidlicemi. Protož také ležaté pásmo  $d_5$  bývá nižší visuté, kteréž obyčejně na temenech vrchů se vleče.

Pásmo  $d_5$  dá se sledovat na temeni a svahu severním vrchu Kola u Loděnic až blízko k Letníku, kdež ukryto jest v nížícím se k Tachlovicům úvalu a vystupuje opět severně pod samou vsí Tachlovic a uvnitř jí pak mezi Tachlovicemi a

Nučicemi a dá se sledovat výšinou až k Dobříci, odtud okolo Zbuzan až k Řepovýům a dále na východ.

Na mnohých místech celého půlnočního svahu vrchu Kola, který četnými zmolami proryt jest, vystupují břidlice na den; čím výše do vrchu, tím více přibývá v břidlicích vrstev pískovcových, až samé téměř vrchu výhradně z nich se skládá. Na jih pak klonící se temeno opět složeno ze střídajících se pískovců s břidlicemi, kteréž samy o sobě se zdají útvar pásma  $d_3$  ukončovat, nebo nad nimi již mocné lože diabasu s graptolitovými břidlicemi, tedy vrstvy vrchního silurského útvaru spočívají.

Na temenu jest pískovec a křemenec řadami buď opuštěných nebo posud rozdělaných lomů odkryt; v některých lomech jsou vrstvy jeho tak kypřé, že se tlakem ruky rozžmolují, v nich pak hojně zarostlé pruhy limonitu hnědého se spatřují; limonitové pruhy bývají pevnější ostatního kypřého pískovce.

Na cestě a silnici z Nučic do Tachlovic jsou severně před samými Tachlovicemi v zmolkách břidlice na den vycházející vidět v háječku v Doubí zvaném u tachlovické kovárny, jakož odtud po výšině až k Dobříci vystupují tvrdé pískovce na den. V mírně sklánějším se svahu od Doubí na jih jsou u samé kovárny a vedle severozápadních chalup Tachlovických křemenné tvrdé vrstvy pokryty opět břidlicí drobovou.

V této břidlici drobové uložena jest kolonie Tachlovická, kteráž v silničním příkopu silnice z Nučic do Tachlovic vedoucí v severozápadní části chalup mezi kovárnou a hospodou odkryta jest. Kolonie tachlovická popsána panem Barrandem v jeho *Défense des Colonies III.* 1865 (stránka 67—75) skládá se z vrstev graptolitových břidlic na svém východním šedočerných až hnědočerných, nepevných, střídajících se s drobovými břidlicemi, pokrývajících souvrství pískovcové pásma  $d_3$ , barev šedavých, bělavých, žlutavých a narudlých. Zhruba obnáší mocnost graptolitového pruhu kolonie méně  $1\frac{1}{2}$  hektometru, v kterémž v straně jižní, tedy visuté, asi čtyry ložiska diabasu v mocnosti  $\frac{1}{2}$  až 1 metru uložena jsou. Celý pás graptolitových břidlic, v kterých nalezeny některé Graptolity, Graptolites colonus Barr. a Diplograpsus palmeus Barr., vlastní toliko vrchnímu silurskému útvaru a nezřetelné Orthocery, pokryt ložem diabasu mocnějším  $\frac{1}{2}$  hektometru. Celá mohutnost kolonie tedy mnohem menší 2 hektometrů.

Nad kolonií opět následují břidlice pásma  $d_3$ , střídající se s křemenci a pískovci ve vrstvách, což východně od farní stodoly a na cestě k Dobříci, pak pod hřbitovem a kostelem dost dobře vidět je. V údolíčku, kteréž se k lukám od kostela sklání, převládají ve visutém celého pásma  $d_3$  opět břidlice, jež se ukončují u vyvýšeného valu složeného z diabasů několik kroků severně od pivováru (tak zvaného). V těchto šedozelenavých břidlicích, vrcholcích celému pásmu  $d_3$ , jsou uloženy nehluboko pod stykem s diabasy ležatá pásma  $E$  vytvářejícími, tenké stlačené kule skluků vápenných.

Podobné vápencové malé shluky se objevují snad též v ležatých břidlicích pásma  $d_3$ , stýkajících se s břidlicemi pásma  $d_4$  na patě vrchu Kola, východně od Loděnic, jak již dříve podotknuto bylo.

Celá vodorovná šířka pruhu pásma  $d_4$  obnáší na Kolu v místech uprostřed mezi Chrustenicemi a Vysokým Újezdem asi  $\frac{3}{4}$  kilometru, mohutnost pak toliko



asi  $4\frac{1}{2}$  hektometrů. U Tachlovic ale jest celá vodorovná šířka asi 11 kilometrů, mohutnost pak asi 8 hektometrů i s kolonií v pásnu uloženém. Mohutnost pásma pod kolonií se nalezajícího jest méně  $4\frac{1}{2}$  hektometrů a není zcela určitá pro neurčitost rozhraní mezi pásmem  $d_4$  a  $d_5$ ; nad kolonií pak spočívá ještě asi okolo  $1\frac{1}{2}$  hektometrů mocný pruh břidlic a pískovců.

Na tab. II. obr. 1 jsou na vrchu Kolu *šbř*, *šbř* šedo zelenavé břidlice, *P*, *P* pískovce buď samy o sobě souvrství skládající neb s břidlicemi střídající se; *d*, *d* jsou diabasy a *g*, *bř* graptolitové břidlice pásma  $l_1$  z vrchního silurského útvaru. Na tab. II. obr. 2 jsou v obci Tachlovické v doubi *šbř* břidlice šedo zelenavé, pokryté pískovci *p*, na kterých opět břidlice *šbř* leží, kteréž s graptolitovými břidlicemi *gbř* kolonie se střídají. V kolonii samé jsou *gbř*, *gbř* a *d*, *d*, *d*, *d* graptolitové břidlice střídající se s diabasy. Nad kolonií opět uloženy pískovce *P* střídající se s břidlicemi, kteréž též pásmo  $d_5$  ukončují. V Barrandeově Défense des Colonies III. Pl. 1 fig. 6, z kteréž tato jižní část našeho obr. 2 tab. II. přenesena jest, vyznačeno lože diabasu v pásnu  $d_5$  v Tachlovicích pod samým kostelem (eglise) mezi hospodou (Auberge) a pivovárem (grenier); že pak přiložený průřez, ač přenesený, trochu v jiném směru veden jest, v kterémž lože toho diabasu přeráženo nebylo, není též zde naznačeno.

Ve východním pokračování pásma  $d_5$  opět v samých Řeporyjích uložena kolonie „Archiac“ nazvaná a v Défense des Colonies par Joach. Barrande IV. 1870 mistrně popsána.

### Vrchní oddíl silurského útvaru.

V spodním útvaru silurském jest v pásnu *D* takřka výhradně celá rudonost zahrnuta; v pásnu *D* ale opět ležaté  $d_1$  jest nevyčerpatelným zřídlem rud silurských v celých Čechách; v středním pásnu  $d_4$ , ač rudnatost jeho ještě značná jest, není přece po celém útvaru, kde se pásmo  $d_4$  objevuje, rozšířena a toliko na jistý obmezený pruh vázána.

Ve vrchním silurském útvaru jsou rudy co do rozsáhlosti ložišť jakož i co do délky vlaku jejich ještě mnohem obmezenější než ony z pásma  $d_4$ ; nebo toliko v nevelikém prostranství obmezeném asi Zbuzany, Dobříčem a Tachlovicemi se vyskytují výhradně jen v pásmě *E* a sice v spodní části jeho  $e_1$ .

Jakkoliv se rozhraní pásma  $e_1$ , kterýmž vrchní útvar silurský svůj počátek bere od pásma  $d_5$ , kterýmž opět spodní útvar ukončen jest, od Řeporyjí přes Zbuzany, Tachlovice, okolo Letňsku, Vysokého Újezdu až k Sedlci a ještě dále na západ dobře rozeznávat dá, není k účelům zde vytknutým důležitější hranice nad onu ze Zbuzan k Tachlovicům se rozprostírající.

S určitostí se rozhraní mezi  $d_5$  a  $e_1$  na výšině mezi Zbuzany a Dobříčem všude udat nedá, však od Dobříče k Tachlovicům jest pomezí pásem obou uložené pod pomezím luk od Dobříče k Tachlovicům se táhnoucím ve směru jihozápadním. Jihovýchodní pomezí luk s polmi na výšinu jižně od luk vystupující se táhnoucím, jest rozhraním pásem obou, kteréž, vlekcouc se několik kroků severně od bývalého

hrádku a později pivováru Tachlovického a jižně od hřbitova skrz jižní část vsi směrem k Mezouni, na Mezounské výšině se opět s určitostí sledovat nedá.

Nad tímto rozhraním k jihu zaujímá pásma  $e_1$  asi  $\frac{2}{3}$  kilometru široký pruh, sestávající z převládajících diabasů a tuftů diabasových patrně vrstevnatých, v kterých podřízeně vrstvy graptolitových břidlic jakož i vápenců uloženy jsou.

Diabasy, zvláště v ležatém mohutně vyvinuté, jsou pevné, zelenavé, z nerostů drobnozrnných, bílého labradorového a černého augitového složené, snadno na povrchu černým nádechem Psilomelánu jakož i hnědavým Limonitem potaženém, se zkyprující horniny. Pevný, velmi drobnozrnný šedozelený diabas není vrstevnatý nýbrž balvanitý, žilkami i tečkami vápence, zvláště tam, kde není zcela neporušený, protkaný a nad míru podobný ostatním diabasům pásma  $e_1$ , jako onomu u Motol, u Vyskočilk, v Malých Chuchlích a jinde. Nejnižší část jeho u pivováru Tachlovického dotýkající se břidlic  $d_1$  jest malými bílými kuličkami vápence velikosti viky mandlovcovitá; část pak od pivováru na jih tufovitá a vrstevnatá a sice tím dokonaleji vrstevnatá, čím dále k jihu, tak že nejjížnější neb nejvisutější tufy diabasové přeměňují se v břidličnaté tufy a právě břidlice tufové.

Celé pásmo  $e_1$  sestávající z převládajících hornin diabasových odkryto od pivováru počínaje, směrem jihovýchodním, podél levého břehu strouhy potoční až k rybníčku prostředního mlýna, blízko lomů vápenných tak zvaných Dobříčských. V něm též podřízeně uložené vrstvy se spatřují: a sice v jedné třetině asi, počítaje od ležatého k visutému, uložen pruh ani 50 kroků široký šedých břidlic graptolitových.

Pásmo těchto graptolitových břidlic, kteréž se dá odtud sledovat k východu, kdež na mnohých místech pokryto jest prstí, vystupuje opět na nízkém hrbečku jižně od Dobříče vedle cesty z Dobříče do Chejnice vedoucí a sice asi v polovici vzdálenosti a potom na cestách u Zbuzan.

Pruh graptolitových břidlic jest rudonosný, nebo ač v potoku jihovýchodně od pivováru, kde styk břidlic s ležatým diabasem dobře odkryt jest, nížádná ruda se nevyskytuje, nalezá se v připomenutém hrbečku pustém, jižně od Dobříče na rozhraní mezi diabasem ležatým a graptolitovými břidlicemi visutými, mocné ložisko hnědé rudy Limonitu křemenem prostoupeného. Limonitové lože až 6 i více metrů mocné slábne značně, znuzující se zároveň na obě strany vlaku svého, jak k východu tak i k západu. Bezprostředně leží lože na diabasech trochu v tufy nezřetelně vrstevnaté proměněných. Graptolitové břidlice na den nevycházející toliko prací prohledány byly.

Toto ložisko rudní nazváno ložiskem Dobříčským.

Na tab. II. obr. 2 jest  $d_1$  ležatý diabas *gbř*, graptolitová šedá břidlice, na rozhraní obou by měla ruda se vyskytovat, kdyby jí tu bylo, kde průřez naznačen jest.

Nad pásmem graptolitových břidlic následují tufy diabasové hrubozrnné a hrubovrstevnaté, prostoupené hojnými zrny a žilkami vápence; barva tuftů šedozelených jest na výchozím jejich jako u všech ostatních špinavě hnědá.

Asi ve dvou třetinách celé moci pásma  $e_1$  uloženy na tufech těchto diabasových opět vyvinuté vrstvy břidlic graptolitových s táhlými vrstvami šedého vápence, kterýž celé ne velmi mocné souvrství skládá vedle samého ústí potoka

do rybníčku. Toto slabé pásmo vrstev celistvého šedého vápence, kterýž místy též trochu břidličnatý a tufovitý jest, obsahuje hojnost skamenělin významných pro pásmo  $e_1$ , jako:

*Arethusina Koninkii* Barr., *Cheirurus*, *Bronteus*, *Proetus*; *Atrypa reticularis* Linn., *Atrypa Ypsilon* Barr., *Strophomena depressa* Sow., *Leptaena funiculata* M'Coy., *Leptaena euglypha* Dalm., *Spirifer trapezoidalis* Dalm., *Spirifer togatus* Barr., *Pentamerus*, *Terebratula*, *Rhynchonella*; *Orthoceras*, *Conularia*, *Encrinites*, polypy a hojnost mnoho jiných zde objeveno bylo.

Ve visutém tohoto vápence skládají poslední třetinu celé mohutnosti pásma  $e_1$  konečně opět tufy diabasové břidličnaté a tufové břidlice, na výchozím barev špinavě hnědých, jinak ale šedých a šedozelenavých, ve kterých hojně uloženy jsou táhlé koule vápence šedavého, neb vrstvy celé mezi sebou se střídající. Vrstvy vápence jsou trochu sideritem prostoupeny, protože též na povrchu výchozí části své slabě žlutohnědě zbarveny jsou Limonitem, rozkladem ze Sideritu povstalým. Též ve vápencích se nacházejí skameněliny pásma  $e_1$ . Celé visuté pásmo jemných až drobnozrných tufů diabasových s hojně v nich uloženými vrstvami a ččkami vápence jest obdobou graptolitových nečistých břidlic, nebo v dalším svém vlaku východně od Řeporyjů pod Ohrádkou vystupuje opět, an tufy v graptolitové břidlice, vápence pak v hojně vrstvy černošedé proměněny jsou.

V pásmu tomto, nedaleko od visutého celého souvrství jest jedna vrstva vápenná uložena, kteráž ve svém východním vlaku až přes 4 metry zmohutněvši, obsahuje ve svém složivu, veskrz hojně sideritem prostoupeném, na jistých místech převelkou hojnost několika málo druhů brachyspodů. Vrstva tato vápencová, kteráž jak na východ tak i na západ opět slábnouc se vytrácí, nevychází na den vedle rybníku u prostředního mlýna Tachlovického, kdež by v místě písmenem *l* naznačeném tab. II. obr. 2 uložena býti měla. Vrstva vápenatá Sideritem proniknutá jest vlastně rudou, uloženou v nejvyšším pásmu tufů zároveň s ostatními slabšími ččkami a vrstvami vápenců, nebo na výchozím svém jest proměněna v Limonit, pod výchozím pak v Siderit, po vymizelých skamenělinách dutinatým a po vytrativším se vápenci dírkovatě kyprým.<sup>11)</sup>

Ruda pod jménem Zbuzanské rudy známá, proto že se rozprostírá část jejího vlaku k této obci.

Rudou Zbuzanskou rudonosnost vrchního silurského útvaru, kteráž tudíž toliko na pásmo  $e_1$  omezena jest, končí se; všechny vyšší pásma pokrývající  $e_1$  jsou bezrudá.

Na obr. 2 tab. II. jest *d, d, d* diabasový tuf, nejvyšší pak tufy jsou břidličnaté, v nichž u *v* uloženo souvrství vápenných vrstev s hojnými skamenělinami, u *l* pak by výchozí Zbuzanské rudy naleziště se mělo, kdyby se ložisko její až sem rozprostíralo.

Vrstvy pásma  $Ee_2$  pokrývají nad mlýnem prostředním tufové břidlice a jsou zde, jakož i vedle železnice jižně v Tachlovicích lomy otevřené. Vápenec pásma skládá vrstvy mocné, jest bělavý, hrubokrystalinický, beze všech vrstev břidličnatých vložených a v jistých vrstvách s hojnými skamenělinami, dle kterých se co vápenec z pásma  $e_2$  seznává. Ve visutém svém obsahuje souvrství vápence  $e_1$ , asi něco málo více 2 hektometrů mocné slabé vrstvy celistvého, černavého křemene

nebo rohového kamene. Na tab. II. obr. 2 jest pásmo  $c_2$  písmenem  $v$ , pod Dobříčským lomem naznačeno. Všecky ostatní vyšší pásma silurská jsou zcela bezrudá.

### Kamenouhelný a křídový útvar.

Kamenouhelný útvar se objevuje toliko velmi podřízeně, an pokrývá pásmo  $D$  silurské v několika malých nesouvislých pánvích, co pozůstatků nějakého většího a rozsáhlejšího pásma útvaru kamenouhelného, kteréž, jak se zdá, souviselo s útvarem kamenouhelným, jenž z Kralup přes Buštěhrady, Kladno, Rudu až přes Rakovník se táhne. Alespoň mnohé zvláštnosti pozůstalých mnohých malých pánviček k tomu poukazují, že byly kdysi ve spojení s rozsáhlým útvarem Kladenským někdejšími vrstvami, jež dávno zrušeny byly.

Z nynějších pozůstatků se dá soudit, že pánve u Malých Přílep, která se až k Železné táhne a ona u Lhotky byla aneb je snad posud spojena s onou u Hýskova, kteráž opět přetržena toliko řekou Litavkou od pásma kamenouhelného na pravém břehu Berounky u Lísku a Stradonic blíž Starých hutí. Toliko pánvičky u Malých Přílep a na Lísku obsahují sloje uhelné, ostatní jenom uhelné slabé proslojky zahrnují. Vrstvy kamenouhelné jsou vesměs rudonosné, an v nich mocné shluky Sferosideritu uloženy jsou.

Pánvička Malopřílepská jest jaksi nejlépe odkryta a ohraničena, protož později blíže popsána ještě bude.

Útvar křídový má nejméně důležitosti co se rudonosnosti týče a bude krátce ve zvláštním popise zahrnut.

Z tohoto všeobecného vypsání jde, že útvar silurský rudonosností svou nad míru důležitý jest a všechno ostatní bohatstvím rudním zastíní: protož také nejdůležitější část celého pojednání mu věnována jest. Rudy vesměs v ložiskách uložené objevují se v některých zvláštních pásmech rudonosných a protož každé pásmo zvlášť, i rudy v něm obsažené pojednány budou. Že mimo rudy k celkovému seznání všech poměrů, za kterých se tyto vyskytují, i skamenělin si všimati jest, a že nerosty doprovázející ložiska rudní důležitou část, kteráž nepomijitelná jest pro popis samý, skládají, netřeba blíže odůvodňovat.

Popis rud rozpadne se tedy na část rud:

#### **I. obsažených v útvaru silurském.**

Každé pásmo pak samo o sobě probráno bude a rozpadnou se rudy silurské na

**A.** Rudy pásma  $d_1$ ; (v nichž obsaženy rudy v Šárce, u Svárova, u Libečova a Chynavy).

**B.** Rudy pásma  $d_2$ ; (zahrnující v sobě Jinočanské, Nučické, Chrustěnické a Vražské rudy).

**C.** Rudy pásma  $e_1$  a sice ony ve středu, (jako sem ruda Dobříčská náleží).

**D.** Rudy ve visutém pásma  $e_1$ , (jako rudy Zbuzanské a některé jiné méně důležité).

Dále sledovat bude část rud obsažených:

**II. V útvaru kamenouhelném.**

**III. V útvaru křídovém.**

Jelikož i vedle rud nerostů vyskytujících se všímáno si bude a některé z nich buď pro Čechy nebo vůbec nové, jiné opět vcelepamátne, aneb posud málo ohledány a propátrány jsou a zvláštního povšimnutí zasluhují, jakého se jim vedle popisu rud dostat nemůže, tedy jim věnován zvláštní odstavec jednající:

**IV. O některých zvláštních nerostech;**

mezi kterými hlavně prvé místo zaujímají:

**A.** Nerosty silurské, (zvláště ony, kterými rudy doprovázeny bývají).

Jelikož ještě jiné obsahem svým důležité kratičké pojednání týkající se poměrů Čech vybývají, aniž by se přímo mezi některou z částí předcházejících vřadit daly, tedy zahrnuty jsou v dodatku:

**B.** Drobnější zprávy obsahu geognosticko-mineralogického kratší články obsahujícím.

## I. Rudy útvaru silurského.

Jelikož k zevrubnému poznání všeho, cokoliv pozornost na sebe poutá, všestranná známost toho náleží, tedy by zde jakýsi nedostatek se objevoval, kdyby mimo to, co nyní jest, nevšímáno bylo minulosti alespoň v krátkosti nejstručnější. Proto ale právě, že práce báňská jest jediný základ podstatný a nezměnitelný, z kterého celé poznání čerpáno bylo a kteráž na vzájem opět dle poznání z nich hlavně nabytého se řídí a spravuje, tedy slušno jim na prvním místě upomínku věnovat krátkými dějinami.

Mimo tento pevný nezměněný základ celého poznání věd přírodních oboru našeho čerpává se z nabytých zkušeností jiných buď sdělením ústním, ještě obyejněji pak písmem všem přístupným. Tento druh poznání jest velice měnivý a an plyne neb alespoň vyplývat má z nepopíratelné jsoucnosti poskytované nezměnitelnou přírodou, jest základu, z kterého poznání čerpáno, podřízeno, tím více, an se dle rozličných způsobů nebo vlastně nezpůsobů na přírodu hledět a viděné rozumně pojmut řídí, jakož i od předběžného vzdělání, tolikéž i od zkušenosti nabyté po několikráte opěťovaném ohledání, úsudek k skutečnosti nejbližší si utvořit.

### Dějiny bání.

Že jsou báňské práce podniknuté na rudy v naší krajině prastaré, o tom mnohých důkazů uvést možno. Ač se písemných pozůstatků nedostává proto, že vůbec v šedém pravěku toliko rudám kovů vzácných písemní zmínky se dostávalo, možno nicméně za to mít, že jsou byly rudy u Jinočan a zvláště u Zbuzan nejčasněji dobývány a vyhledávány. Ložisko Zbuzanské a Jinočanské jest v jistých částech svých na výchozím složeno z kyprých žlutých polo zemitých rud hnědých nebo okrů, kteréž jakož nádobím nejsnáze se dobyt daly, tak i pro svou kyprost v ohni snadněji ostatních se tavily. Důkaz toho, že v pravěku toliko ze snadno tavitelných čistých rud se železo tavit dalo, jest z mnohých jiných míst dokázáno, a na výchozím právě jsou rudy nejčistší, dlouholetým působením vzduchu a vody vypláknuté, uložené.

Nejstarší způsob dobývání železa děl se v nízkých pecích kdekoli vystavených a hnaných větrem měchu rukou pohybovaných, ovšem nedokonalým způ-

sobem za ztrát přeznačných, ač se v nich pojednou výborné kujné železo z rudy vyrábělo. Pece nízké, podobné nistějším, nazvané selskými nebo vlčími pecemi, dávaly strusku přebohatou na železo tedy černou, těžkou, železnatou, v níž množství drobného uhlí dřevěného zahrnuto. Toliko při nedokonalé práci se místo železa z rud obdržela litina polo litině a polo kujnému železu podobná, pro kteréž jména nemáme zachovaného, ale jež jinde „kraglach“-em nazývají.

Na vysočině Tachlovické nalézají se v přerozličných místech, ale nikde u potoka strusky černé těžké po zrušených rozpadlých a deštěm vyplavených zahrnutých částech dřevěného uhlí, dutinaté, z čehož se soudit dá, že se nedělo vyrábění železa v pecích vysokých, jež jedině vedle toků možné by byly bývaly tehdejší, nýbrž leckdes na vysočině tedy v pecích selských: selské pece nejstarší jsou všech, tedy i průmysl železářský dob nepamětných kolem Zbuzan a Tachlovic nejstarším jest.

Ač velmi staré, jsou přece práce na rudách červených ve vrchu Chrbíně u Libečova mladší předešlých, ač i zde stáří se udat nedá; nebo nalezeny u Rajnovského mlýna v louce pozůstatky bývalých vodovodů pro hamry. Jakkoliv již ani základy po hamrech zachovalé nejsou, a toliko kaluž hluboká místo kola vodního naznačuje, hamr tedy již předávně zrušen jest, zajisté práce v Chrbíně mladší oně z Tachlovic, nebo do nistěji se vodní silou mnohem později foukalo než do pecí nízkých, jakož se i v nistějších toliko obyčejně jen litina v kujné železo zpracovávala. Litina ale v Čechách již do mladší doby padá.

Na počátku tohoto století a v minulém byly rudy červené vyhledávány pro hutě Fürstenberské tedy Krivoklátské. Hlavní počátek nynějšího dolování však padá do doby založení pražské průmyslové společnosti, kteráž u prostřed tohoto století založená vystavením nejprv dvou, potom ještě čtyř v Čechách největších pecí v Kladně koksem hnaných, hutnictví českému posud na uhlí dřevěném založenému, zcela jiný obrat dala.

Již před rokem 1850 dolováno velmi nepatrně pro hutě krivoklátského panství v té krajině zvlášť u Libečova a na Krahulově ale teprve rokem 1853, kdy před nedávnem vyhledaná a předběžně opátraná ložiska pro dobývání rudy do kladenských závodů Pražské železářské společnosti báňskou prací otevřeny byly, počíná se výkvět a úsilovnější dolová práce jevit.

V měsíci květnu 1853 zaraženo první dílo do ložiska Nučického na polích v Chrástici; téhož roku počato též s přípravními pracemi pro dolování u Svárova a v Chrbíně; Libečovské a Chyňavské výchozí rudy krátký čas před tím již otevřeny byly, ač se brzy v práci v nich ustálo. Též v Dobříčské rudě, kteráž pro pece p. Kleina v Sabotíně na Moravě dobývána byla před rokem 1853, přestalo se brzy pracovat.

Tím utěšeněji však pokračovalo otvírání bání v Svárově a v Chrbíně jakož i dobývání rudy v Nučických lomech, ku kterým roku 1856 lom Jinočanský přibyl. Roku 1855 pak počala se Zbuzanská štola hnát a již roku 1858 ruda těžit, ač od roku 1858 až do 1863 díla u Svárova a v Chrbíně zastavena byla. Od roku pak 1861 počalo kutání a práce na rudu v Chrstenicích v roku 1867 v Krahulově pracovat, též v Dobříči opět práce zaražena v ten čas jakož i v Libečově již před tím, konečně ve Vráži roku 1869 práce zaražena.

Aby se zmáhající se potřebou rud v Kladně dovoz usnadnil, kterýž v nepříznivé části roku obtížným byl, vystavena z hutí Vojtěšských roku 1857 báňská železnice až po samá díla u Nučic a k Tachlovicům k lomu vápeného kamene, kterýž železnici koňskou s štolou Zbuzanskou spojen byl.

Celá krajina rozdělena v dva majitele, z nichž Pražská železářská společnost v pásmě rud  $d_1$  má

|                                                          |                |                       |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 38 výměrů báňských; kníže Fürstenberg co majitel panství |                |                       |                 |
|                                                          | krivoklátského |                       | 2 výměry báňské |
| 26                                                       | "              | v pásmě rud $d_4$ asi | 10              |
| 16                                                       | "              | v pásmě rud $E$       | 0               |
| 80 výměrů báňských                                       |                |                       | 12 výměrů.      |

Mimo to krajina množstvím výhradních kutišť pokryta jest. (Výměr jedné míry báňské jest sblíženě 4·51 hektarů, výhradní kutiště kryje plochu asi 56·6 hektarů).

Množství rudy, kteráž vydobyta byla v dolech, jest následující, určena v milionech centech váhy rakouské:

|                                                                                |      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| V Nučicích vytěženo od 1853 do konce 1870:                                     | 10·8 |                          |
| V Jinočanech " " 1856 " " 1870:                                                | ·8   |                          |
| V Chrustenicích a v Krahulově 1867 do konce 1870:                              | ·15  |                          |
| V Krahulově a Nučicích knížecí vydobytí asi                                    | ·5   |                          |
| Celkem vydobyto rudy v pásmu $d_4$                                             |      | 12 $\frac{1}{4}$ mil. c. |
| Ve Svárově vydobyto od 1854 do 1857, potom 1864 do 1870                        | ·47  |                          |
| V Chrbíně " " 1854 " 1857, " 1864 " 1870                                       | ·66  |                          |
| V Chyňavě a Libečově dá se dobývka cenit na                                    | ·1   |                          |
| Všeliké v pásmu $d_1$ vydobyté rudy jest                                       |      | 1 $\frac{1}{4}$ mil. c.  |
| V Zbuzanech vydobyto od 1858 do 1870                                           | ·6   |                          |
| V Dobříči " " 1867 " 1870 něco přes                                            | ·01  |                          |
| V celku vytěženo z pásma $E$ rudy                                              |      | $\frac{2}{3}$ mil. c.    |
| Souhrn vši vytěžené rudy od počátku značnějšího dolování až do konce 1870 jest |      | 14 $\frac{1}{6}$ mil. c. |

Všecky otevřené bány budou ještě po dlouhou dobu roční výtěžek rudy 1 až 1 $\frac{1}{4}$  milionu centů poskytovat, toliko práce v Dobříčském dole se koncem 1870 zastaví, v Zbuzanském dole pak ještě po vydobytí asi 1 až 2 milionů centů se asi roku 1872 dolovat přestane.

### Literatura.

Jak již svrchu podotknuto, jest jediné písmo, tedy nezvratný základ celého bádání, v skalách samých napsán; neunavnou plíši a neskonale bystrým duchem jsou závěrky, kterých se pozorováním skal dočinit lze, zakladatelem slávy světové českého silurského útvaru panem dr. Joach. Barrandem v jeho spisech, ač se přímo našeho předmětu netýkají, pro svou všeobecnou povahu však jmeno zákonníka ve věcech českého silurského útvaru zasluhují, uloženy: jsou to arcidíla;

*Système Silurien du centre de la Bohême Volume I, II, III.*



Pak menší díla:

*Défense des Colonies III., IV.*; *Graptolites de Bohême* a ostatní četné články obsažené v Bulletin de la Société géologique de France.

V těchto spisech tolik nedotknutelných pravd a tolik vysvětlení obsaženo jest, že byt by se bezprostředně naší krajiny nedotýkaly, je přece za jedinou všeobecnou literaturu považovat dlužno jest.

Ostatní literatury dotýkající se blíže naší krajiny jest pramálo, přísně vzato není takřka žádná.

V pojednání: *J. Krejčí: Bericht über die im Jahre 1859 ausgeführten geologischen Aufnahmen bei Prag und Beraun*, obsaženém v Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt 1861—62, Band XII. na str. 223 až 284 jest toliko povšechně a jen mimochodem na str. 242 o Šárce zmínka učiněna.

V pojednání: *M. Lipold: Die Eisensteinlager der silurischen Grauwackenformation in Böhmen*, obsaženém v Jahrbuch der geol. Reichsanst. 1863, Band XIII, od stránky 339 až do 448, jest v úvodu 339—347 nové rozdělení a pojmenování lišící se od užívaného staršího uvedeno; část pak od stránky 347 až 365 týče se krajiny naší.

Z této části zvláštní jeví se chvalitebná snaha, podat něco, co nabyto bylo kraťoučkým pobytem v krajině buď rychlým ohledáním vlastním nebo co z pověstí čerpáno.

Nejnovější pojednání: *Em. Bořický: Zur Entwicklungsgeschichte der in dem Schichtencomplex der silurischen Eisensteinlager Böhmen's vorkommenden Minerale*, obsaženo v Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, I. Abtheil., LIX. Bnd., 1869; potom totéž česky pod názvem: *O nerostech v pásmu železných rud silurských se objevujících*, obsaženo v Živě, sborníku vědeckém Musea král. Českého, odbor přírodovědecký a matematický. II. 1869.

V pojednání, pracovaném s velikou plí, jest přijato nové pojmenování od Lipolda uvedené.

Kdekoliv nějaké nesrovnalosti s mými zkušenostmi se vyskytují, naznačeno na konci spisu a sice uveden bude skráceně Lipoldův spis pod známkou „Lip. Jahrb. XIII. 1863“ a Bořického spis pod záhlavím „Boř. Akad. 1869“ neb „Živa 1869“.

## A. Rudy pásma d,

### Otevření ložisek.

Ložiska červené rudy otevřena na velmi mnoho místech onoho prostranství, kterýmž se vlekou. Vypočítají-li se značnější otvory, kterými rudní ložiska propátrána jsou, obdrží se následující přehled:

Nejzápadněji otevřeno ložisko lomem v obci Chyňavské jižně od západního cípu této vesnice, vedlé nejvýchodnější cesty z Hýskova do Chyňavy vedoucí. V obci Libečovské jest po ložisku hnána štola a sice severovýchodně od vesnice samé, nedaleko místa na pravém břehu Chyňavského potoka, kde tento, ohýbaje se na krátko, náhle k severozápadu teče. — Ještě dále k severovýchodu od Libečova za touto štolou jest na vrchu v lese „Bubové“ opět ložisko v značné délce dle vlaku svého lomem otevřeno. Hlavní však rozdělení nalézají se na pravém a levém břehu Kačického potoka.

Na pravém břehu, tedy západně, jsou ložiska otevřena štolami a šachtami zaraženými. Nejhlubší štola dědičná zaražena vedle samého pravého břehu potoka Kačického, od Rejnovského mlýna asi 550 metrů k severozápadu, aneb od vtoku Chyňavského potoka do Kačického k jihovýchodu asi 360 metrův. — Od této dědičné štoly jsou po celém vrchu směrem od východu k západu zaraženy šachty neb štoly; směr jich jak po sobě následují jest sblíženě záporný se směrem potoka Chyňavského, od kteréhož okolo 90 až 200 metrů k jihu vzdáleny a částečně na svahu severním, kterýž k pravému břehu Chyňavského potoka se příkře kloní, rozpoloženy jsou. Od ústí štoly asi 132 metrů na západ jest šachta č. II., na rozcestí dvou cest, jedné z Podkozí k mlýnu Rejnovskému, kteráž se v jinou k západu k Libečovu směřující, dělí. Od ústí štoly asi 388 metrů k západu jest šachta č. I., od kteréž šachta č. III. toliko asi 91 metrů k západu odlehlá jest. Šachty tyto zřízeny jsou na svahu východním ke Kačickému potoku směřujícím, neb na svahu půlnočním k Chyňavskému potoku se klonícím, kterýž se „Jezovčínem“ nazývá. Od šachty č. III. k západu asi 410 metrů jest ústí štoly Chrbinské, kteráž z ležatého do ložisek hnána jest. Štola v části „Chrbinou“ zvané jest v převelní příkrém svahu půlnočním nad potokem Chyňavským, od něhož toliko asi 90 metrů vzdálena, dle míry vodorovné. Ač ke všem šachtám cesty zřízeny jsou, nedá se místo jich přece nikterak určitěji, než jak právě udáno podati, any se cesty na mapách, byť by sebe větších, vkresleny nenalézají. Štolami, jež dle vlaku ložiska hnány jsou, jest délka, v kteréž ložiska jimi bezpřetrženě otevřena a zvrub proskoumána jsou, asi 1100 metrů tedy více 1 kilometru.

Ve vrchu levého břehu Kačického potoka nejsou ložiska prodělána až něco málo pod temenem Karabinského vrchu štolou Vojtěšskou a šachtami, kteréž vesměs v obci Horno-Ptícké zaraženy jsou.

Štoly zaraženy jsou v Krabinském vrchu a sice v severozápadním jeho svahu, kterýž se „nade mlýnem“ jmenuje, jihovýchodně od pěšiny v průseku v lese, z kteréhož, na temenu vrchu samého, cesta jedna do horních Ptíčů vede. Jsou zde dvě štoly obě asi 60 m. jihovýchodně od průseku vzdálené; nižší jest mimo to asi 680 m., severo-severovýchodně, vyšší, neb Vojtěšská štola jest v témže směru asi 985 m. od Rejnovského mlýna odlehlá.

Šachty pak jsou vesměs na vysočině a sice šachta II., na pomezí lesa s cestou na temeně Karabinského vrchu, jižně od západní části Svárova a západně od jižní části horních Ptíčů, západně vedle maličkého osamotněle stojícího čtverhranného háje. Šachta č. I., severovýchodně od šachty č. II., jest jižně od Svárovského rybníka a západně od horních Ptíčů, v pravo vedle cesty, kteráž nedaleko jižně od Svárova počínajíc, směrem k jihu se táhne; stojí pak v poli nazvaném v „Čoubalovém“. Obě šachty jak č. II., tak č. I., jsou od lomů křemence severně vedle cesty z průseku výše připomenutého vycházející, asi 100 až 150 metrů k jihu vzdáleny. Šachta č. III. jest od šachty č. I. k severovýchodu odlehlá a sice v pravo vedle cesty z Hájků františkánského do Podkozského mlýna vedoucí, asi v dvou pětinach vzdálenosti ve směru mezi Horno-Ptíckou kaluží a Svárovským rybníkem na polích, které se „nad Svárovem“ nazývají. Šachta č. IV. jest od předešlé k severovýchodu mezi cestami z Hájků do Podkozského mlýna a cestou z Chaloupek Červenoújezdských, kteráž za nedlouho severně od horních Ptíčů končí, do cesty z Ptíčů Horních do Červeného Újezda splývající. Od Svárova jest šachta tato, k východu nejposlednější, jihovýchodně na polích „pod skálou“ zvaných, vedle samých mezi obce Ptícké s obcí Červeno-Újezdskou. Od železničního ohybu jest na západ vzdálena.

Štoly a šachty č. II. a č. I. jsou mezi sebou spojeny a jest jimi ložisko na délku 1400 metrů dle vlaku svého zevrub proskoumáno; kdyby se ale celá délka počítala až za III. a IV. šachtu, v kterýchž ložisko na délku 500 metrů proskoumáno jest, byla by celá délka chodníky proskoumaného ložiska asi 2200 metrů, tedy více 2 kilometrů, při čemž toliko jen nepatrně malá část, mezi šachtou I. a šachtou III. posud neznáma jest.

Celá pak délka, v kteréž ložiska zevrubně známa jsou pracemi báňskými, od Chrbinské štoly východně od Libečova počínaje, až k šachtě č. IV. západně od Chaloupek, Červeného Újezda, jest něco málo méně 4000 metrů neb 4 kilometry, v kteréžto délce toliko poměrně velmi malá část v údolí Kačického potoka ještě posud neznáma jest.

### Rozprostírání se rudy, jakož i mocnost její.

Jelikož se ložiska rud červených vyskytují v okruhu celého silurského pásma *D* a sice v nejspodnější jeho části *d*<sub>1</sub>, tedy se vlastně *délka* ložisek rovná rozsáhlosti celého okruhu tohoto rudonosného pásma. Však zde toliko jedna část,

velmi krátká k poměru celé rozsáhlosti pásma vypsána bude, jejíž hranice asi mezi řekami Lítavkou a Vltavou se nacházejí. Tato celá délka tedy mezi oběma řekami obnáší 2·8 myriametrů; z tohoto prostranství toliko ona část od Hýskovsko-Chyňavských hranic až k Červeno-Újezdsko-Horno-Ptčickým hranicím v délce jednoho myriametru lépe proskoumána jest; část od Červeného Újezda až asi k Vokovicům úplně neznáma, an křídovým útvarem pokryta jest; východní část pak, od Vokovic až do Troje, jest na rudu tak chudá a mimo to přeznačnými rozsedlinami, kterýmiž vůbec zemězpyt okolí pražského tak velice znesnadněn jest, tak vržena, že mnohem méně určitých vědomostí o ní nabyto, než o části západně od Červeného Újezda se rozprostírající.

### Rozprostírání a mocnost ložisek.

Hlavní směr ložisek určený z vlaku jich od Chyňavy až k Červenému Újezdu jest  $5^{\circ}0'$ , úklon vesměs k jihu. Na hranicích Hýskovsko-Chyňavských v západní části polí v „Čečichově“ zvaných, v úvalu, v kterémž se potok z „Mlejské“ k západu tekoucí náhle k jihu otáčí, jsou ložiska rudy červené zaraženými v těchto místech výskumnými otvory objeveny. Nejnižší ložisko prvé, mocnosti sice neznámé, ale sotva 3 decimetry přesahující a zajisté mnohem slabší ještě tohoto výměru, jest šachetnými pracemi vysekáno na výchozím; na vrchu úvalu jest ložisko druhé něco méně 2 metrů mocné; ve směru ohybu potůčka jmenovaného k jihu, několik kroků přes cestu z Chyňavy do Hýskova vedoucí jest ložisko třetí na temné straně kamenité slabě křovím porostlé, kteráž pravý břeh úvalu tvoří, v němž potůček z Jakubinek k západu se proudí. Mocnost třetího ložiska, ač neznámá s určitostí, jest zajisté vyšší oné ložiska prvního, ač onu ložiska druhého sotva dosahuje. Směr vlaku ložiska 1ého a 2ého jest  $3^{\circ}5'$ , úklon pak asi  $53^{\circ}$  k jihu; vlak ložiska třetího uchyluje se trochu od tohoto směru, an asi  $3^{\circ}2'$  obnáší. Odlehlost ložisek od sebe jest ve směru dle mohutnosti vrstev od sebe je dělicích tato: ložisko 2ého jest nad ložiskem 1ým 360 metrů a pod ložiskem 3ím 470 metrů. Viz průřez zdělaný dle směru CC na mapě tab. I. a na tab. III. obr. 1.

V „Jakubinkách“, na pozemcích Chyňavských, jest západně od cesty z Chyňavy do Hýskova (číslo cesty 5311) opět ložisko 2ého nad ložiskem 1ým otevřeno lomem. Ložisko 1. sice není žádnou výskumní prací otevřeno, aniž mocnost jeho zjištěna, však místo jeho, kde se nalézati má, s velkou pravdě podobností známa jest; mocnost jeho bude asi jen velmi nepatrná, mocnost pak ložiska 2. jest okolo 2 až 3 metrů, částečně i něco více; směr pak jest určen  $4^{\circ}13'$ , úklon pak  $43^{\circ}$  k jihu; na některých místech, až do směru  $5^{\circ}13'$  pošinuto jest. Odlehlost ložiska 2. nad ložiskem 1ým dle mohutnosti vrstev měřena jest něco málo méně 80ti metrů. Ložisko třetí v těchto místech neznámo.

Směr ložiska 1. jde asi zároveň s cestou právě naznačenou dále k východu, s kterouž se asi v místech, kde pěšinka polní do Železné vedoucí vychází, křížuje; alespoň v tomto místě, jež od oné části cesty, kteráž ložiskem podsednuta a na severovýchod okolo 400 metrů vzdálena jest, objeveny vrstvy, v nichž se ložisko 1vé obyčejně vyskytuje.

Jižně od Chyňavy a tolikéž i od hřbetu, v němž se křemenec láme, jest v „Ouhorově“ tré ložisek naraženo výskumními šachticemi, vesměs vedlé cesty (číslo 5325) z Chyňavy směrem severojižním k Železné vedoucí. Cesta jest toliko asi 120 kroků západně od hranic Chyňavsko-Libečovských. Ložisko 1vé v nepatrné mohutnosti toliko několika málo centimetrů dopátráno. Ložisko 2hé jest 1 metr mocné; ložisko pak třetí jest asi  $2\frac{1}{2}$  metru mocné a sestává asi z 8 jednotlivých plástů rudních, proplásty horniny dělených; mocnost rudních plástů v úhrnku  $\frac{1}{2}$  metru vydá. Směr vlaku bude v celku též asi okolo  $5^h$ , ačkoliv ležaté vrstvy v částech ovšem rozsedlinami vržených, směřují k  $6^h 11^0$  až  $7^h 0^0$  s úklonem  $42^0$ — $41^0$  k jihu. Průřez sdělán podél cesty směrem  $24^h$  dle písmen *EE* tab. I. a tab. III. obr. 3, a obnáší dle toho výška ložiska druhého nad ložiskem prvním 100 metrů, hloubka pod ložiskem 3tím pak 450 metrů.

Asi 430 kroků západně od Libečova, v polích této obce, vedlé cesty do Chyňavy, opět jedno z ložisek prvního vyšších vykutáno, jehož mocnost menší  $\frac{1}{4}$  metru, směr pak vlaku blíže neurčen, ač z hruba se směrem východo-západním se srovnává.

Severovýchodně od Libečova, neb východně asi 250 kroků od můstku cesty Ounoštské přes Chyňavský potok, jest vedlé potoka, kdež se „na močidle“ říká, ložisko 1vé v mocnosti 2 decimetrů objeveno; od toho místa na jih v stráni otevřeno ložisko lomem v mocnosti ač značné, přece ne zcela určité známé. Směr vlaků jest  $6^h 5^0$ , úklon ložiska prvního  $46^0$ , druhého asi  $54^0$ . Asi 150 kroků níže po potoku opět ložisko 1vé, ve stráni pak dosti přtkré ložisko 2hé odkryto, an toto na den v mocnosti 20 metrů vychází. Vlak ložisek se změnil v směr  $4^h 14^0$ , úklon zvýšil se na  $56^0$ . Odlehlost ložisek od sebe jest 45 metrů. Průřez směrem *Ch Ch* na mapě tab. I. a tab. IV. obr. 1.

V severním svahu vrchu Bubové východně od Libečova vleče se pokračování mocného ložiska druhého až na temeno samé, kdež otevřeno lomy v mocnosti 2 až  $2\frac{1}{2}$  metrů. Ložisko první ve svahu vrchu zcela chybí a objevuje se toliko na temeni samém v mocnosti asi  $\frac{1}{4}$  metru i více. Směr ložisek na temeni jest  $5^h 3^0$  až  $5^h 8^0$ , úklon  $52^0$  k jihu. Výška ložiska druhého nad spodním prvním jest 30 metrů. Po celém temenu, nebo i severním svahu Bubové vlekou se ložiska asi též mocnosti a odlehlosti, jsouce toliko na několika místech proraženy, až do Chrbiny, kdež stolou Chrbinskou prodělány jsou. Průřez tab. I. Chrbinská štola tab. III. obr. 4. dle písmen *FF*.

V západní části Chrbinské štoly jsou objeveny troje ložiska rudní; první jest mocné  $1\frac{3}{4}$  až  $\frac{3}{4}$  metru, druhé 2 decimetry, třetí  $\frac{1}{2}$  až 1 metr. Směr vlaku jest  $6^h 9^0$ , úklon  $49^0$ — $54^0$ . Ložisko druhé jest nad spodním 10 metrů a pod vrchním 20 metrů uloženo, počítaje opět dle mohutnosti vrstev. Průřez dle *GG* tab. I., tab. IV. obr. 2.

Ve východní části Chrbinské štoly jsou dvě ložiska s jistotou známa, třetí se tam též objevuje s velikou pravděpodobností. Směr vlaku jest  $3^h 4^0$ , úklon  $60^0$  až  $68^0$ — $50^0$ . Mohutnost ložiska prvního až  $\frac{1}{4}$  metru, druhého tolikéž, ba i někdy něco více, a třetí okolo 2 až 4 decimetrů snad mocné by býti mohlo. Ložisko druhé leží nad ložiskem prvním  $4\frac{1}{2}$  metrů a pod ložiskem třetím by mohlo, dle obdoby s podobným místem nejbližšího obzoru, být asi 20 metrů hluboko.

V západní části šachty č. III. a kolem šachty v Jezovčíně jest směr dvou ložisek  $5^h 12^0$  až  $5^h 13\frac{1}{2}^0$ , sklon  $46^0$ — $30^0$  až  $46^0$ — $20^0$ . Mohutnost pak ložiska prvního

obnáší 2 až 3 decimetry, též ale i až na  $1\frac{1}{2}$  metru zmohutní; visuté ložisko druhé, asi 25 metrů ložiska prvního vyšší, jest toliko 2 decimetry mohutné.

Mezi Jezovčínskou šachtou č. I. a II. jest s určitostí toliko první ložisko proskoumáno; mohutnost jeho od 3 decimetrů do  $1\frac{1}{2}$  metru se mění, hlavní směr v části západní  $5^h$ , v části východní  $6^h 2^0$ ; sklon však  $48^0 30'$  až  $50^0 30'$  obnáší. Ložisko druhé, nebo je-li ložisek více, též ložisko třetí proti šachtě č. II. ve výšce 100 metrů dle mohutnosti vrstev počítaje, posud výskumnými chodničky naraženo není a soudě z vlastností horniny, ještě ani v 120 metrech proraženo býti nemůže.

Na druhé straně potoka Kačického jest ložisko štolou Vojtěšskou otevřeno a sice jest to ložisko druhé, kteréž zde v mocnosti 2 až 4 decimetrů, se sklání pod úhlem  $47^0 50'$  až  $50^0 23'$  k jihu, an směr vlaku jeho  $3^h 12^0$  obnáší. Nad ložiskem prvním, kteréž z několika daleko od sebe oddělených slabých plástů sestává, jejichž jednotlivá mocnost 2 decimetry nepřevyšuje, jest asi 120 metrů výše uloženo.

Kolem Svárovské šachty č. II. známy jsou troje ložiska; první jest opět složeno z málo slabých plástů, daleko od sebe rozlehlých a sotva mocnosti 2 decimetrů dosahujících, druhé jest slabé lože rudy mocnosti asi  $1\frac{1}{2}$  decimetru, třetí pak složeno z rudy 2 až 4 decimetry mocné, jejíž směr jest  $3^h 12^0$  a úklon  $44^0 24'$  opět k jihu. Ložisko druhé leží nad ložiskem prvním asi 96 metrů a pod ložiskem třetím 10 metrů.

Kolem Svárovské šachty č. I. a zvláště k straně západní známa jsou ložiska troje. Ložisko první, nejnižší, se rozprostírá v mocnosti 1 až 2 decimetrů; ložisko druhé má obyčejně mocnosti 2 až 5 decimetrů, zmohutní ale na jednom místě, kteréž asi 200 metrů od šachty č. I. k západu odlehlé jest, až na více než 5 metrů; ložisko třetí se rozprostírá v mocnosti 2 až 7 decimetrů; směr vlaku ložisek jest k západní straně  $4^h 9^0$ , úklon k jihu jako onen u šachty č. II. Ložisko druhé nad ložiskem prvním jest vedle samé šachty 65 metrů výše, a pod ložiskem třetím 6 metrů níže. Odlehlost ložiska třetího od druhého se však mění na jiných místech a obnáší 2 až 12 metrů. Tab. I., průřez dle směru *HH*, tab. IV. obr. 3.

Východně od šachty č. I. toliko jediné ložisko, a sice pokračování třetího k východu známo jest; mocnost jeho od 3 decimetrů až do 3 metrů místy se zmahá. Směr pak vlaku přechází z onoho, jaký dříve udán byl, čím dále tím více v jiný, až posléze ložisko v místech, kde dále sledováno není, k směru  $5^h 3^0$  se vleče a tímžé úklonem  $45^0$ , jako dříve, se kloní.

Kolem šachty č. III. též troje ložiska otevřena jsou. Ložisko první jest 6—8 decimetrů mocné a v onom místě, kde nejmohtnější jest, má směr  $5^h 9^0$ , úklon příkrý velmi kolmému se blížící k jihu, na jednom místě však se k severu kloní přepříkře, takřka kolmo stojíc. Jinak jest ale úklon k jihu mírnější a mění se od  $40^0$  do  $55^0$ . Ložisko druhé, mocné asi 3 decimetry, jakož i ložisko třetí asi  $1\frac{1}{2}$  decimetru mohutné, toliko na krátko sledované jsou, an značnými rozsedinami mnohokrátě vrženy bývají. Ložisko druhé odlehlé dle mocnosti vrstev, měreno od ložiska prvního, asi 16 metrů, pod ložiskem třetím pak 3 metry uloženo jest. Však zdá se, že ložiska od sebe nanejvýš vzdálena jsou v prostoru nevelmi odlehlé, příčiny však, zdali uložení to původní neb následkem vržení jest, [nemožno udát pro nedostatečné proskoumání loží.


U šachty čtvrté též 3 ložiska známa jsou, ale toliko v části východní. Ložisko první jest slabé, toliko 1—3 decimetry, druhé pak toliko  $1\frac{1}{2}$  decimetru, třetí sestává z několika slabých plástů rudních, jejichž úhrnečná mocnost až  $\frac{1}{2}$  metru dosahuje (obr. 1.), obyčejně ale se součet mohutností jednotlivých plástů tomuto číslu ani nevyrovná. Směr vlaku jest  $6^h 30'$ , úklon k jihu málo proměnlivý určen na jednom místě s  $48^\circ 30'$ . Ložisko druhé jest nad prvním 24 metrů a pod třetím 5 metrů, počítá-li se odlehlost dle mohutnosti vrstev jalových. Průřez JJ tab. I. a tab. IV. obr. 4.

Kdekoliv vrstvy rudonosné trochu dokonaleji otevřeny jsou, objevena v nich ložiska tři, kteráž zde poznamenána jsou na průřezích a mapě číslem 1 až 3. Jakkoliv až do jisté vzdálenosti se soudit dá, a též částečně i dokázáno jest, že ložiska stejného čísla jsou totožná mezi sebou; neplatí to zajisté o stejné číslovaných ložiskách od sebe velmi rozlehlých. Nebo ložiska stejné číslovaná mohou býti, a jak se zdá, jsou snad též částečně zcela jiná a od sebe úplně rozdílná, an v jiných obzorech uložené do sebe nesplývají.

Toliko o jediném ložisku, totiž o tom, kteréž číslem prvním naznačeno jest, možno s pravděpodobností takoruka určitou za to mít, že na všech místech, kde vůbec známost o něm nabyta, jest jedno a též ložisko, že tedy toliko v jediném určitém obzoru se rozprostírá. Vesměs tvoří ložisko první spodní hranici pásma rudonosného a leží takřka bezprostředně na ležatých křemencích, kde tyto vůbec uloženy jsou. Na mnohých místech ovšem ložisko zcela chybí, an zeslábnuvši úplně se vytratilo, však tu obyčejně vrstvy, pro ložisko nejnižší význačné, ač třeba též v mocnosti své až do nepatrná zesláblé, přece naznačují určitý obzor, v kterém se ložisko opět objevit může na jiných místech. Jinak jest ovšem s ložisky číslem druhým a třetím poznamenaných; o těch posud nikterak dokázáno není, že jsou ve všech částech prostory rudonosné mezi sebou totožnými.

V obci Chyňavské se zdá, že ložiska číslem 2 poznamenaná jsou snad buď tatáž, aneb, že alespoň v blízkém obzoru vedlé sebe umístěna by býti mohla. V Jakubinkách ložisko třetí není ani známo, což od toho pochází, že snad jest buď velmi slabé, neb docela vytracené v oněch místech, kde by býti mohlo. Jelikož pak vrstvy okolní nikterak vyznačeny nejsou, že by se z jistých vlastností soudit dalo na možnou totožnost ložiska třetího na obou hranicích jak západních tak východních obce Chyňavské, nedá se ničeho určitého říci leda to, že se zdá, jako by ložiska číslo 3 byla buď snad v jediném aneb snad ve dvou nedaleko od sebe odlehlých obzorech.

Zdali ložisko západně od Libečova a mocné ložisko „na močidle“ východně od



*Vysvětlení obrázce 1.:*

Ložisko 3tí východně od šachty IV.: *mrš* mandlovce rudošedé, *čs* červenavo-zelené břidlice, *š* šedé břidlice, *rz* rudé a zelené pestré; *r* rudé, *čs* červené-zelené pestré *č* rudé, *š* šedé rudé a zelenavé, *č* rudé, *r* rudé a zelenavé, *s* zelenavé, *mb* mandlovce bělavé. Rudy: *š* šedivka nuzná polturová ruda, *s*, *s*, *s* semenka drobnoolitická, *v* velkoolitická ruda, *c* celistvá hustá ruda, *r* ruda barvy červené, oolitická, *sem* tam s červenými oolity a černou břidlicí znečištěná.

vesnice souhlasí s některým z Chyňavských ložisek číslo 2 neb 3, nebo zdali jsou úplně rozdílná od nich, nedá se říci.

Však s větší již pravděpodobností se může za to mít, že Libečovské ložisko druhé, táhnoucí se od močidla přes Bubovou do Chrbiny až k Jezovčínu, jest totéž, jako ono, kteréž v Chrbinské štole třetím se jmenuje. V Jezovčíně posud známo není. Obdoba ložiska druhého ve štole Chrbinské již v Jezovčíně samém jakož i ve vzdálenějším Libečově se pohřešuje, tak že snad toto Chrbinské ložisko jest toliko slabým na obou koncích vytrácejícím se plástem rudním.

O Svárovských ložiskách se opět s jistotou tvrdit nedá, že ložisko číslo 2 ve Vojtěšské štole, kteréž se zdá souhlasit s ložiskem tohoto čísla u šachty II., I., III., a IV., má obdobu svou v některém z ložisek Chrbinských. Možná však, že jest uloženo buď v oněch vrstvách, v kterých se Chrbinské ložisko druhé vytratilo, aneb alespoň v okolních jim blízkých vrstvách. O třetím ložisku ve Svárovských šachtách č. II., I., III. a IV. opět možno za to mít, že jsou v jediné vrstvě uloženy, ale souhlasí-li vrstva rudní s onou v Chrbíně pod číslem třetím znamenanou, jest tolikéž nerozhodnuto; tím méně pak, zdali se vrstva rudní až do Chyňavy rozprostírá.

Jestliže skutečně ložiska číslo 2. a 3. jsou ve Svárově a v Chrbíně totožná, aneb jestli se asi v obzorech od sebe málo odlehlých objevují, tož přece mezi sebou nejsou zároveň jako vůbec vrstvy, v kterých uloženy jsou; nebo na některých místech se k sobě přibližují více, jinde opět od sebe rozbíhají se plásty rudní.

Ložisko číslo 2., kteréž se zdá jak ve Svárově tak v Chrbíně v obzorech málo od sebe odlehlých uloženo být (tak jako vyšší ložisko třetí), jest v západní části Chrbiny 10 metrů odlehlé od ložiska prvního, ku kterému se až na 4 metry ve východní části Chrbinské štoly přibližuje, pak ale zase u třetí šachty Jezevčinské na více než 25 metrů vzdaluje; v údolí potoka Kačického, ač posud neznámo zajisté, až se narazí překopem hledacím, bude mnohem vzdálenější 120 metrů; u Vojtěšské štoly opět se přibližuje k ložisku prvnímu, od kterého toliko 120 metrů vzdáleno jest, ještě více na východ u šachty č. II. (106 metrů), ba u šachty č. I. jest ještě přiblíženější (65 m.), až posléze u šachty č. III. a IV. jest opět blízko spodnímu ložisku, an u oné šachty toliko 16 metrů, u této pak 24 metrů výše nad spodním ložiskem uloženo jest.

Ložisko třetí v Chrbinské štole od ložiska druhého 20 metrů odlehlé a dále k východu nepoznané opět v šachtách Svárovských se přibližuje k ložisku druhému, s kterým dosti zároveň se vleče, an toliko 2 až 6 metrů se od něho do výše uchyluje.

Z tohoto patrně, že ložisko druhé a třetí mezi sebou mnohem méně se odchylují než každé z nich, neb obě dohromady od ložiska prvního. — Dle toho se také plásty rudní (alespoň v části, v kteréž se doluje, neb tato nejdokonaleji známa jest) poznávají ve dvou pásmech. V pásmu nižším jest uloženo ložisko první; v pásmu vyšším pak tvoří ložiska druhé a třetí jeden celek. Jak se to dále k Chyňavě má, nedá se určit pro malé rozdělení báňské.

Jako všude v oboru útvaru silurského jsou *rozsedliny pošínující* celé ohromné částky tržené do prostranství odlehlých hojné; tak i ložiska rudní přehojnými menšími



až přeznačnými rozsedlinami vrženy bývají. Menší rozsedliny, ložiska vrhající jsou přehojným zjevem; však i značně dlouhých vržení jest mnoho.

Dlouhé *vržení* se snad nalézá — posud ovšem neodkryto jest — v Chynávi asi v těch místech mezi nejvýchodnější cestou z Hýskova do Chynavy a cestou nejzápadnější z Železné do Chynavy. Směr jeho asi směru severojižnímu blízký by být mohl, sklon rozsedliny bude bezpochyby východní a délka vodorovného vržení zajisté 200 metrů; možná že též několik vržení, jedinému velkému se rovnajících, po sobě následuje.

Z Libečova až do Chrbinské štoly jest velmi mnoho vržení menších, však ve východní části Chrbinské štoly jest takové množství převeliké rozsedlin, kterýmiž do značné vzdálenosti ložisko místy za každým krokem přetrháno a pošunuto mimo to i ze svého vlaku, kterýž ve východní části štoly  $6^{\circ} 9'$  jest, až do směru  $3^{\circ} 4'$  vyrušeno, tolikéž i úklon jeho mnohem příkřejší jest obecného.

Mezi východní částí Chrbinské štoly a západní částí ložiska u šachty č. III. jest přeznačné vržení, kteréž se k jihu v mnohé menší ještě roztrhuje. Směr rozsedliny jest  $24^{\circ} 7'$ , úklon velice příkrý k východu místy i kolmý a délka více 150 metrů. Po bocích rozsedliny spatřují se přetrhnuté ležaté i visuté vrstvy ložisek do vzdáleností značných.

Aby se jakýsi pojem o hojnosti rozsedlin utvořit mohl, budiž zde připomenuto, že v části ložiska od šachty I. až k šachtě II., kteráž poměrně jen nepatrně vržením roztrhána jest, se objevuje 7 rozsedlin vrhajících ložisko na 15 až 7 metrů vodorovné odlehlosti; vržení menší 7 metrů nejsou počítány.

V údolí Kačického potoka zajisté jest dlouhé vržení a možná že i více, směr hlavního vržení souběžný s údolím, úklon jeho bude bezpochyby západní a vodorovná délka ne-li více tedy zajisté 150 metrů obnášet by mohla.

Ve Svárovské části opět vržení za vržením se stíhá v přestávkách více neb méně dlouhých. Z vržení těchto mimo některá jest ono předležitě, kteréž od šachty Svárovské číslo II.  $15\frac{1}{2}$  metru na východ vzdálené ve směru  $23^{\circ} 5'$  a příkrým úklonem na východ ložisko třetí o  $16\frac{1}{2}$  metru pošunuje; nebo v něm nalezeno hojnost rozmanitých nerostů jako v rudní žíle, jak později se číslo nerostů ještě vypočte.

Mezi šachtou č. I. a III. jest též dlouhé vržení směrem asi půlnočně poledním úklonem k východu, ač posud ještě nedostihnuté.

Mezi šachtou III. a IV. jest též dlouhé vržení protínající šachtu tuto vlakem svým  $24^{\circ} 9'$  a úklonem východním. Délka vržení ještě ve více než 150 metrech dosažena není.

Všecka vržení bývají v hornině rudonosné, kteráž z kypřejších diabasů neb diabasových tufů sestává mocnější než v pevnějších a tvrdších vrstvách ležatých jako v křemencích a drobových břidlicích. Mocnost jich vzrůstá někdy až na 2 metry a i více, však obvykle dosahují delší rozsedliny neb jalové žíly mocnosti jednoho metru v mandlovcích samých. Kratší rozsedliny bývají méně mohutné, toliko decimetr neb málo centimetrů ba i ještě méně; někdy kratounké rozsedliny sestávají toliko z pouhé hladiny nebo i prázdné trhliny, ve které se rozličné horniny stýkají.

Všecky rozsedliny jsou pouhé žíly a rozštěpují se tedy jako žíly opět v menší

rozsedliny neb odžilky, kteréž někdy opět vrženými bývají pro okolní vrstvy. Zvláště dlouhé žíly se častokrátě takřka trhají neb roztříštují na jistých místech v samé odžilky. O vyplnění žil později ještě řeč bude.

*Výchozí.* Ložiska rudní vycházejí na mnohých místech na den, an co rudní skála holý povrch zemský skládají. V obci Chyňavské vyskytuje se výchozí ložiska (tam druhého jmenovaného) v Jakubinkách a sice na kamenitých poloholých malých pastvištích uprostřed polí mezi oběma nejvýchodnějšími cestami z Hýskova do Chyňavy vedoucími severně nad prameny ručeje Jakubinského, kteréž částečně z jedné shroucené a ssedlé staré štoly se prýštějí.

Na stráni obrostlé severovýchodně od Libečova na pravém břehu potoka Chyňavského, kde tento značný ale krátký ohyb tvoří, vychází ložisko co skála pevná na den. Tab. IV. obr. 1 *r* u jižní strany. Jinde v naší krajině přirozených výchozů není, poněvadž vrstvy mandlovců, v kterých lože rudní uložena jsou, mocnou vrstvou hlin pokryty bývají.

Památne zjistě to, že nikde na den červená ruda nevychází, ale toliko černá, kteráž sama v sobě je pevná a mnohem méně drobová na vzduchu, než obyčejná červená semena; mimo to pak mnohem trvanlivější jest okolních mandlovců, kteréž se jí dotýkají, jakož na spodku tak i na stropu.

### Ležaté a visuté rudonosného pásma.

**Ležaté pásma** rudonosného skládá se z křemenných drob, pískovců drobových nebo vlastních pískovců. Celé ležaté pásmo tvoří pruh sice nevelice mocný, ale na přemnohých místech patrný: an složen z přepevné horniny, méně porušen bývá než břidlice hlinité podložené neb mandlovce pokrývající jej, tedy vyčnívá v malých pahorcích neb velmi mírných hřbetech i v krajině jinak dosti rovné, velmi často. Od Svárova počínaje táhne se tento pruh podél cesty co mírný dlouhý pahorek, v kterémž lomy na štěrk založeny jsou, lesem přes údolí Kačického potoka, Chrbínou k Libečovu, kdež na potoku „v močidle“ dobře skryt a potokem prorván jest. Za Libečovem jsou mírné pahorky v Ouhorově, složené z tvrdých ležatých vrstev těchto a ačkoliv za nimi více žádný hřbet vyčnívající nad rovinou polí se neobjevuje, seznává se nicméně směr ležatého přesnadno dle pustých míst nuznou travou porostlých, kteréž směrem ležatého v polích na přehojných místech se objevují a jež pro mělkost prsti je pokrývající, rozorát se nemohou.

Ležaté pásma rudonosného, na pomezí Chyňavsko-Hýskovském ale složeno z břidlic hlinitých neb drobových, prahorním břidlicím velice se podobajících, kteréž jsou nejvyššími v pásmu silurském *B*, an v těchto místech pískovce ležaté buď úplně chybí aneb tak nepatrně vyvinuty jsou, že ani na výchozích se nepoznávají.

Nejhlubší vrstvy ležatého pásma možno jmenovat drobami hrubozrnými neb slepenci drobozrnými, nebo jsou složeny z oblásků křemenných velikosti malého ořechu lískového, spojených tmelem zrnitému pískovci se podobajícím. Oblázky křemene jsou vesměs bílé průsvitavé, málokdy přisedlé a skládají asi polovici celé horniny; vedle bílých oblásků jsou valounky černého bulžňku nebo šedé neb šedo zelenavé hlinité břidlice jen zjevem velepodřízeným. Na některých místech bývá povrch

křemenných oblásků pokryt nesmírným množstvím přemalých teček psilomelanových.

Spojivo oblásků jest zrnité a složené opět z zrněk okulacených křemenných velikostí vikve až do drobnosti máku i ještě menší, v kterýchž jen velezřídka se objevuje zrněčko buližníku neb břidlice hlinité; částečně přiléhají zrnka těsně vedle sebe, jsou tedy tmelem křemenným spojeny, částečně ale je spojuje přenepatrně malé množství světle šedozelené měkké látky, kteráž i v zrnkách se v křemenném spojivu objevuje a snad nějakou porušenou břidlicí neb afanitem jest. Částečně též bývají zrněčka spojiva volně vedle sebe srostlá, ponechávající v sobě maličkých mezer, kteréž jsou buď prázdné neb částečně neb úplně psilomelanem hojněji ale rudým haematitem buď jen potaženy neb úplně vyplněny jsou.

Barva drob jest světle šedá, spojivo bývá šedější valounků a někdy slabě tmavě jako potřísněno od vrostlých černých neb černorudých částek psilomelanu neb haematitu. Vrstvy vyšší nejspodnějších složeny jsou z oblásků tím menších čím mladší polohu zaujímají; s přibývajícím drobností oblásků přibývá též drobnějšího zrna v složivu, až se posléze droby úplně v zrnité neb drobnozrné proměňují. V zrnitých neb drobnozrnných drobách, v nichž se toliko zřídka větší valounky křemene objevují, a sice tím značnější čím zrno drobnějším jest, častěji objevuje se spojivo hnědavě zbarvené, než u nejspodnějších vrstev bývá.

Na některých pak místech, jak obzvlášť dobře u štoly dědičné v Jezovčíně na pravém břehu Kačického potoka, potom na hřbetech „v Ouhorově“ u Chyňavy ale ne tak význačně vidět jest, převládá v spojivu drobnozrnném haematit rudý, celistvý, tak nad ostatní zrna křemenu, že se tato zdají být toliko jako vtroušena v základní hmotu tvrdého slabě písčitého haematitu. I celé takové pískovce přijímají ovšem barvy tmavorudé a přecházejí úbytkem krevele a tudíž přibýtkem zrn křemenných poznenáhla v šedou neb šedě přihnědlou drobu.

Vrstvy vyšší jsou mnohem drobnozrnější vrstev nižších, až zrno tak zdrobní, že se droby pískovcům zcela podobají. Pískovce pak čím výše ve vrstvách, tím jemnějšími jsou, až posléze zrna jejich tak rozmělněny, že velmi jemnozrným pískovcům neb křemencům se podobají. Křemence na pohled od šedavých neb přižloutlých křemenců pásma  $d_2$  se nerozeznávají nikterak, leda snad tím, že na jistých místech krátkými pruhy rudými prošlehány bývají, což však i u křemenců  $d_2$ , ač řídkěji, též se objevuje. Nejvyšší pak vrstvy v počtu nepatrném bývají, a to toliko na jistých místech, šedé až světle šedé, sem a tam s řídkými maličkými plátěčky vtroušené slídy muscovitu jakož i žlutými tečkami malými prostouplé. Tvrdé šedé pískovce jemnozrné střídají se s pískovci břidličnatými a méně pevnými barev špinavě šedých, narudlých neb přizelenalých neb hnědých; barvy nezřídka též vedle sebe v jediné vrstvě se střídají; od přístupujících rozmělněných částek snad afanitu, tufovými se stávají a tufovými pískovci, jsou-li tvrdší, neb pískovými tufy nazvány byti mohou, jsou-li měkší a břidličnatější oněch. Souvrství nejvyšší, těmito slabými šedými pískovcovými vrstvami s střídajícími se, tufovými břidličnatými pískovci není mocné, alespoň ne „na močidle“ u Líbečova, kdež nejlépe odkryto jest asi v mohutnosti 3 až 6 metrů.

V těchto některých šedých neb špinavě rudých neb hnědavých křemencích (pískovcích), neb tufových břidličnatých pískovcích nejvyšší, vrstvy pískovcového

Pásmo skládajících nalézají se skameněliny hojně v jednom obzoru ne sice nejvyšším, ale nicméně toliko jen několik málo metrů pod spodem rudonosného pásma vzdáleném. Skameněliny sestávají toliko z jednotlivých slabě lesklých kořápek *Lingula lamellosa* Barr., barvy bělavé, slabě narudle kropenaté neb narudlé a bělavě kropenaté. Skořápky tenké se loupají ve vrstvičky jemnější než heblího papíru. Přepamatné však jest na skořápkách to, že ač vápenité a v kyselinách ublinky kyseliny uhličitě vyvíjející, sestávají ze směsi uhličitanu vápenatého, jakého, všem nemožno určit, zdali arragonitu nebo calcitu s apatitem, nebo kvalitativním rozložením poznává se v nich množství  $PO_4$  vedlé  $CaO$ . V některých vrstvách jest kořápek nad sebou množství převelké nahromaděno, tak že se pískovce tvrdé jemnozrnné toliko od skořápek hrubobřidličnatě lámou. Naleziště jediné této skameněliny jest severovýchodně od Libečova na potoku Chyňavském na onom místě, kde zahýbá e. Tab. IV. obr. 1 u písmeny L.

Pískovců světlózelených, režných, zrnitých, jakéž na Krušné hoře se skamenělinou jinou, této podobnou *Lingula Feistmanteli* Barr., tak hojně jsou, v krajině větší ani v dosti slabé vrstvě vyvinuty nejsou.

Ač vrstvy ležatých pískovců a drob dosti se ztenčují ve visutém pásmu až na  $\frac{1}{2}$  centimetru i méně, jsou slabé vrstvy přece méně hojně mocnějších; vrstvy silnější 4 decimetrů jsou v zrnitých pískovcích uprostřed pásma méně hojně vrstev mocnějších, ležaté droby však mnohokrátě mocnější všech ostatních.

Kdekoliv tvrdé vrstvy rozstoupeny trhlinou, lesknou se na slunci na lomu rubě rovném od krystáleků křemene jako tenký povlak srostlých. V některých rozsedlinách bývají slabounké žílečky červeného křemene neb křemene; jiných neobsahují v drobách není mimo již zmíněné psilomelany, haematity a žluté tečky limonitu.

Mocnost pásma ležatého není značná, však dosti stálá. Sledováním vržením Chrbíně mezi šachtou III. a Chrbinskou štolou prodělány pískovce v mocnosti asi 30—35 metrů, v Chrbinské štolě v mocnosti okolo 25 metrů,<sup>12)</sup> severovýchodně od Libečova „na močidle“ jest mocnost něco menší 30 metrů; všude jinde, kde vrstvy úplně odkryty nejsou, neodchyluje se mohutnost dle pohledu určená značně od těchto čísel, nebo na Karabinském vrchu u Svárova obnáší asi 35 metrů, tolikéž si v Chyňavě.

Že se pásmo křemenců v západní části obce Chyňavské buď velice úzí neb zcela vytrácí, již nahoře řečeno.

Visuté rudonosného pásma sestává vesměs z velmi jemnozrnné, slidnaté, řetence břidličnaté, slabovrstevnaté, černé, drobové břidlice, kteráž na výchozím místě šedá, kyprá a velmi drolivá jest, z kteréžto příčiny na den jen na velmi málo místech vychází, jsouc pokryta valně hlinitým nánosem. Kdekoliv černá břidlice objevena nezrušená, což posud toliko báňskou prací dosaženo, nenalezeno ní žádných skamenělin, jakkoliv se na pohled břidlicím z jiných míst, kteréž skamenělin obsahují a snad totéž pásmo zaujímají, převelmi podobá. Toliko na jediném místě známost nabyta, že se v ní objevují malé shluky podobné oněm

Voseka u Rokycan, kteréž tam tak krásných skamenělin zahrnují a to na hrabích Chyňavsko-Železenských nedaleko pravé cesty z Chyňavy do Železné a jižně od kapličky na kamenitém hřbetu „Kamenina“ zvaném vystavené. Kulovité shluky

jsou mnohem kypřejší oněch z Voseka, ale kromě nezřetelných dutinek táhlých posud nížádná zřetelná skamenělina v nich neobjevena.

Mocnost tohoto pásma břidličnatého s určitostí udat nelze, poněvadž nikde v celé mocnosti své na den nevychází, aniž v celé mocnosti své proděláno jest. Dle pohledu se dá soudit, že ve Svárově, kde ve všech šachtách visuté známo jest, mocnost jeho u šachty II. obnáší asi 55—60 metrů ne-li ještě méně. U Svárovské šachty III. byla mocnost pásma břidlic asi něco méně 50 metrů výskumními pracemi seznána.

V štole Chrbinské celé pásmo břidlic proděláno jest v mocnosti 60 metrů až po samé visuté, kteréž z křemenců složeno jest. V černých břidlicích velmi jemných objevují se co vzácnost sem a tam toliko slabé ojedinělé vrstvičky šedého křemence v mocnosti až tří centimetrů. Však v dvou třetinách mohutnosti břidlic jest uložen plást 10 metrů mocného mandlovce, v kterémž rudy červené semenité v slabších plástech vtroušeny se objevují.

Zdá se, že mohutnost vrstev se značně nemění nebo v Chyňavě na onom místě, kde kuličky se objevují, určena dle pohledu mocnost asi na 50 metrů. Něco bližšího o břidlicích udat nelze, leda to, že i pevnější břidlice v báních vydobyté za krátký čas se podobně drojí na slunci jako břidlice z výchozů a že se zdá, jakoby na některých místech (Chyňava) břidlice obsahovala slabé žilky a závalky celistvého čistého Limonitu.

### Rudonosné pásmo (mandlovec).

Mezi drobami neb pískovci ležatými a černou břidlicí visutou, jest uloženo mocné pásmo horniny přerostanité složeno a v přerostlých odrůdách, kteréž vesměs jmenem *mandlovců* zahrnuty jsou. O těchto horninách se posud velmi málo ví, výjma jména a ještě dráhný čas zajisté neproskoumány zůstanou. Celé pásmo se skládá z horniny zrnité, zajisté ne původní, nýbrž usazené, psamitické a možná že převelmi proměněné, kteráž jmenem vlastních *mandlovců* vyznačena, není vrstevnatá aneb toliko velmi hrubovrstevnatá.

V této velmi hrubovrstevnaté hornině mandlovcové uloženy jsou vrstvy břidličnaté psamitické i pelitické, kteréž co *břidlice* jsou tudíž vyznačeny břidličnatostí více neb méně dokonalou, jakož i velmi vyvinutou vrstevnatostí.

Ostrých mezí mezi mandlovcem nevrstevnatým neb velmi hrubovrstevnatým a břidlicemi nestává, tudíž se přechody z hrubovrstevnatých břidlic do velmi hrubovrstevnatých mandlovců sestavit mohou.

Jestli že se horniny patrně vrstevnaté ještě k břidlicím připočítají, tvoří mandlovec v celku část množství svým převládající v celém pásmu rudonosném; však v jistých místech vyrovná se zajisté i množství břidlic onomu mandlovcu, nebývá-li toto jím i převyšeno.

Co se týče rozřídění toho na mandlovec a břidlice, objeví se důležitost jeho tím, že mandlovec veskrz *jalové*, břidlice ale rudonosnou, tedy *nadějnou* horninou jsou.

Vlastní **mandlovec** jsou horninou přerostlě složenou, kteráž ve velmi mnoha odrůdách se objevuje.

Mandlovce, kteréž asi uprostřed celého pásma uloženy jsou, sestávají z ostroranných kousků horniny barevné, velikosti semence až lískového ořechu, spojených ve svých mezerách bílým vápencem, nanejvýše co stéblo mocným, patrně štípatelným. Kousky horniny převládají značně nad vápenec, kterýž jako rozvětující se pletivo veskrz celou horninu spojuje. Zarostlé kousky hranaté jsou barvy edozelené, ačkoliv též černošedé a špinavě šedoviolové vedle nich se podřízeně objevují. Na lomu jest povrch mandlovce šedozeného, jako protkaného bílými ilkami vápence, podobný na prvý pohled pestré kůži žáby a tudíž rovná se mnohým žabákům, pod kterýmž jmenem se některé tufy diabasové z pásma vrchového silurského *Ec*<sub>1</sub>, zvlášť v Zbuzanech hojně, vyrozumívají.

Z čeho asi se skládají kousky barevné, jest posud záhadné, však podobá se velmi tomu, jakoby spřízněny byly s afanity dioritovými neb diabasovými, neboť jsou složeny z přejemných zrněk rozličně, světleji neb tmavěji zbarvených, edle nichž se někdy větší černé zrno štípatelné, ač posud nezjištěno v jakém měru, objevuje. Zdali zrna černá augitem nebo hypersthenem jsou, posud nerozodnuto; štípatelnost však zdá se být pro augit příliš dokonalá a mimo to a některých kouscích se toliko v jediném směru objevila, což by spíše o jsoucosti hypersthenu než augitu svědectví vydávalo. Ať je černý nerost jakýkoliv, ajisté jest ale z řady augitové. To by bylo složení jedné odrůdy mandlovců a vysvitá již z popisu pouhého, třeba by ještě složivo zrn šedozených úplně nezáhádně bylo, že to jsou *tufy afanitové*, jimž též jméno *tufů diabasových* se přivlastňuje.

Tyto pouhé tufy diabasové skládají značnou část pásma mandlovců a proleňují se v jiné odrůdy.

Buď přistupují do složiva ještě vedlé barevných zrn velkých a žilek vápence ještě labradoritové krystaly, kteréž na lomu co obdélníky se jeví, nebo malé uličky barvy černé neb bílé z vápence sestávající.

Krystaly labradoru dosahují velikost až značného lískového ořechu a počínají d drobných zrněk velikostí maku; však jsou zrna větší hojnější drobnoukých krystalů a vyskytují se zarostlé toliko v drobnozrných tufech a nikdy v žilkách vápence. Památné jest to, že v diabasovém tufu, v kterémž přibývá vrostlých labradoritů, ubývá současně vápence, tak že odrůdy *tufů porfyrických*, kteréž zarostlými krystaly labradoritu slohu porfyrického nabyly, jsou bez žilek vápence, a toliko z tufové základní hmoty velmi drobnozrné, šedozené, toliko vtroušenými malými zrněčky černými prostoupené a z krystalů labradoritu sestávající.

*Labradority* tufů porfyrických bývají barvy světlouzenavé neb nažloutlé, štípatelnost ač patrná, není nikdy tak dokonalá jako u labradoritů vzorných, aniž y i podvojně rýhování patrné bylo na plochách štěpných. Toliko velmi zřídka ví se zároveň slabé čárkování na štěpných plochách. Krystaly jsou s základní motou velmi důkladně srostlé, tak že se i zároveň s ní lámou a na lomu co obdélníky se objevují. Ačkoliv zde popsány tufy porfyrické z hloubky nejznačnější, posud dostižené (více než 40 metrů), přece labradory zajisté nejsou složení vzorného jsou trochu porušeny; porušenost, alespoň částečná se poznává tím, že některé bradority jsou veskrz přemalými žilkami calcitu prostoupeny; některé více

proměněné opět nepatrně štípatelné; opět jiné ještě značněji ztýřelé pak bílé polozrnité a méně tvrdé předešlých.

Tufy diabasové nejlépe vyznačeny jsou proto, že neporušeny v Karabinské štolě mezi oběma pásmy ložisek z hloubky asi 30 metrů, zde též přechody do tufů porfyrických jakož i porfyrické tufy se vyskytují. Největší krystaly labradoritu se našly v štolě Libečovské v tufu šedozeleňm.

Tuf šedozeleň bez žilek vápence z Libečovské kutné štoly má potažné váhy 2·739 určené s 5·25 grammy; v tufu zarostlé krystaly labradoritu dokonale štípatelné, prosté všech žilek vápence, barvy slabě šedavé měly hutnoty 2·6756 určené s 2·28 grammy.

Jakkoliv se zdál být labradorit na pohled dosti čistý, byl nicméně přece již porušený, nebo při 100°C vysušen obsahoval v kyselině octové rozpustných látek určených s množstvím 2·58 grammů:

|           |                |                                                    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| $FeO$     | = 1·24         | } rozpustných látek bylo v kyselině octové 10·00 % |
| $CaO$     | = 2·92         |                                                    |
| $MgO$     | = ·61          |                                                    |
| $Al_2O_3$ | ·64            |                                                    |
| $MnO$     | značné sledy   |                                                    |
| $KO, NaO$ | neurčeny       |                                                    |
| $PO_5$    | nepatrné sledy |                                                    |

Převede-li se toto na uhličitany, bylo by obsaženo v labradoritu

|             |              |                          |
|-------------|--------------|--------------------------|
| $FeO\ CO_2$ | 1·99         | } součet nejméně 13·63 % |
| $CaO\ CO_2$ | 5·21         |                          |
| $MgO\ CO_2$ | 1·28         |                          |
| $MnO\ CO_2$ | značné sledy |                          |
| $Al_2O_3$   | ·64          |                          |
| $KO, NaO$   | neurčeny     |                          |
| $PO_5$      | sledy        |                          |

Poměr uhličitánů vápenatého, železnatého a hořečnatého jest sblíženě jako 5½: 2: 1½, což zhruba se asi sloučenství ankeritu rovná; neprostupují-li tedy uhličitany labradorit, každý zvlášť o sobě, bylo by možné, že jest Labradorit toliko ankeritem v množství více než 8·48 % (proto že nepočítáno  $MnO\ CO_2$ ) proniknut.

Jiný bílý, méně pevný a kyprý labrador lomu zemitého, který tudíž v rozkladu značněji pokročil než předešlý, jenž ještě dokonale štípatelným byl, měl hutnost 2·7056 i s bublinami a 2·7681 bez bublin (určeno s 2·88 grammy). Nerost tedy obsahoval dutin dle objemu: 1·26 %, kteréž vzduchem naplněny byly.

a) Rozbor bílého labradoru zemitého lomu zrušeného Václ. Flamich.

b) Podobný labrador jako předešlý z Libečova Jos. Novák.

c) Labrador jako předešlý asistent Frant. Farský.

Labradority a) b) sušené při 100°C byly vylouhovány chlorovodíkem. Nerost c) sušen při 100° C obsahoval 1·50% vlhkosti. Analýze a) b) jsou zbytky nerozpustné v kyselině chlorovodíkové, c) pak jest rozbor úplný, z něhož vidět je, že je labrador calcitem prostoupělý.

|                         | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i>              |
|-------------------------|----------|----------|-----------------------|
| $\text{SiO}_2$          | 52.40    | 51.84    | 47.09                 |
| $\text{M}_2\text{O}_3$  | 33.46    | 26.90    | 30.24                 |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 1.53     | 2.56     | —                     |
| $\text{FeO}$            | —        | —        | 3.98                  |
| $\text{CaO}$            | 2.67     | 5.96     | 5.97                  |
| $\text{MnO}$            | —        | —        | .32                   |
| $\text{MgO}$            | 2.56     | .80      | 2.17                  |
| $\text{KO}$             | 4.02     | 5.40     | 2.80                  |
| $\text{NaO}$            |          |          | 5.36                  |
| $\text{CO}_2$           |          |          | 1.07                  |
| $\text{HO}$             | 3.82     | 6.33     | 1.87 ztráta při žhání |
|                         | 100.46   | 99.79    | 100.82                |

Od složení nezrušeného labradoritu se rozbor zbytku v kyselině solné nerozpustný dosti značně liší, an zvlášť málo vápna a mnoho vody obsahuje. Valná část vápna porušením labradoritu vyloučená, kteráž co uhličitán vápenatý celý zrušený krystal pronikala, vylouhována kyselinou.

Do složení tufu diabasového přistupuje nezřídka též calcit bílý v kuličkách <sup>13)</sup> velikosti vikve až malého hrachu, buď sám o sobě, tvoře geody, neboli mandle, aneb též zároveň s krystaly labradoritu. Čím více mandlí vápence v tufu zarostlých, tím více ubývá žilek vápencových, tak že při jistém množství kuliček toliko samojediný jemně zrnitý šedozelený tuf celou základní hmotu skládá. Kuličky calcitu podmíněn sloh mandlovcovitý (amygdaloidický) a protož se celá hornina též prostě mandlovcem nazývá, poněvadž *tufy diabasové slohu mandlovcovitého* velmi hojně se objevují.

V tufech diabasových slohu amygdaloidického jsou kuličky vápence vesměs bílé, průsvitavé a složené buď z jediného krystalu (jednotlivce), proto že každá štěpná plocha skrze celou kuličku se rozprostírá, aneb toliko z málo jednotlivých srostlých krystalů vytvořeny jsou. Kuličky bývají obyčejně, když sloh dobře vyznačen jest, od sebe tak daleko, že by se prostora mezi jednotlivými kuličkami, jedinou neb více kuličkami ještě vyplnit dala; ač též takové tufy se vyskytují, kde kulička vedle kuličky leží, jsouc jen slabou korou tufu od okolních dělena. Když v tufech s kuličkami calcitu též krystaly labradoritu zarostlé jsou, jest kuliček toliko po různu vtroušeno; v takových tufech slohu podvojného mandlovcovitého a zároveň i porfyrického ubývá labradoritu, přibývá-li mandlíček calcitových a naopak řídno kuličky calcitové, přibývá-li krystalů labradoritu, tak že se zdá, jako by sloh jeden druhým podmínen byl. V tufech značně mandlovcovitých pohřešují se labradoritové krystaly zcela, spíše se v značně porfyrických tufech kulička calcitu porůznu vyskytne.

Vedle bílého calcitu, aneb též samy o sobě se někdy, ačkoliv vždy toliko velmi podřízeně objevují kuličky velikosti velké vikve, barvy černé, lomu jemnozrnitého, kteréž až posud nezkoušeny, zdají se dle pohledu být vápencem skrytě krystallinickým a černě zbarveným. V černých kuličkách se vyskytují někdy žilky bílého štěpného Calcitu aneb střed jejich skládá se z něho.

Šedozelené neb zelenavě šedé tufy prosté, s žilkami vápence neb bez žilek,



neb tufy slohu mandlovcovitého jakož i porfyrického, podlehají přesnadno rušivé moci vzduchu a vody. Tufů buď nezrušených aneb alespoň na pohled málo proměněných, toliko v hloubkách značných dosíci možno; všechny horniny od povrchu zemského až do značných hloubek 20, ba někdy i ještě více, až i přes 100 metrů jsou toliko porušením těchto právě popsaných tufů vyvinuty.

Že tufy za krátký čas porušení berou, toho nejmakavějším důkazem báňská díla poskytují. Chodníky, kteréž v nezrušených tufech prací namahavou vystříleny byly, se během málo let na bokách svých porušují, měknouce, drolíce se a tlačíce značně. Velmi pevné tufy na haldách za krátký čas několika měsíců okulacují se na hranách zkypřením, měníce barvu částečně.

Porušení tufů jeví se změnou barvy: šedozelená neb zeleně šedá barva základní hmoty kalí se v hnědavou, pevnost trochu umenšuje se; labradorové krystaly neštípou se více, an lom zemitý nelesklý poskytují, barva jich mění se v bílou a později v žlutavou, též bledě ryšavou. Čím dále rozklad tufů pokračuje, tím více ubývá pevnosti základní hmotě, labrador se drolí a zkypří náramně, až konečně úplně zmizí, zanechav po sobě toliko skulin hranolovitých. V povrchu tufů slohu mandlovcovitého, kterýž jest na výchozím obyčejně špinavě hnědošedě zbarven, bývají duté kulaté dirky pozůstalé po kuličkách vápence vylouhovaného vodou, (kyselinou ubličitou slabě nasycenou). Tufy s málo kuličkami jsou tudíž na výchozím svém na svém povrchu dirkovaté, ony s hojnými kuličkami však jakoby houbovitě až do jisté hloubky: nebo rozbijou-li se kusy s dutinatým povrchem, objeví se tento toliko na povrchu asi 1—3 centimetry (někdy i více) dutinatým, vnitřek ale složen ještě z tufů barvy méně proměněné a kuliček calcitových úplných.

Tufy šedé, zelenavé, jsou tvrdší všech ostatních, protož také častěji na den vycházejí; též jsou na prosto jalové, zvlášť ony slohu porfyrického. Vrstevnatost v nich nepozoruje se obyčejně žádná, aneb zřídka jen velice hrubá a nezřetelná.

Vedle těchto šedých neb zelenavých tufů diabasových, zaujímají rovněž veleděležitě místo tufy rudé barvy, tolikéž nevrstevnaté aneb jen velmi hrubovrstevnaté. Základní hmota, z kteréž se skládají, jest drobnozrnná, složená, ač posud neznámo z čeho, barvy obyčejně rudé, šedorudé neb rudošedé; místy vedle zrn šedorudých zrna rudá se objevují v pestré směsici.

Celá základní hmota veskrz jest prostoupena zrnkami, neb nezřetelnými kuličkami neb překrátkými žilkami bílého vápence zřetelně štípatelného, velikosti maku až čočky. Toto jsou právě obecné tufy diabasové mandlovcové.

Do základní hmoty přistupují místy co podřízené složivo nahodilé světle až tmavozelenavé maličké kousky buď zrnité neb celistvé na omak mastné a někdy slabě lesklé. Tmavozelené kousky skládají se ne-li zúplna tedy alespoň z větší části z sideroxenu, světle zelené jsou složení neznámého ale sideroxenem úplně zbarveny. Snad se též delessitu podobají.

Vedle kuliček vápence se též jen velepodřízeně někdy kuličky celistvého, na lomu nerovného a mdle lesklého vápence, barvy slabě bělohnědavé, neb štěpné kuličky dolomitu nebo i sideritu objevují.

Rudý zrnitý tuf diabasový jest s předešlými přechody spojen, nic však méně objevují se obě odrůdy též vedle sebe, jsouce ostře ohraničeny.

Na některých místech uveličují se vrostlá zrnka vápence v mandle a v geody slohu hrubo soustředně mískovitého, až velikosti pěstě i větší a diabasový tuf nabývá velmi význačeného slohu mandlovcovitého velikými geodami vápence. O geodách ještě na místě nižším se zmínka dít bude

Tyto tufy rudé, ačkoliv nevrstevnaté, jsou nicméně s tufy vrstevnatými rozmanitými přechody úzce spojeny; ač tufy ty jalovými jsou, nejsou přece tak veskrz bezrudé jako předešlé zelenavé tufy.

Vedle těchto obou odrůd nevrstevnatých, neb jen nepatrně vrstevnatých, jsou ještě tufy bílé ač zrnitého slohu, přece vrstevnaté. Složivo barvy bělozelenavé, bělošedé neb běložlutavé jest složiva neznámého, slohu drobnozrnitého, v němž opět nezřetelné kuličky a různotvárné malé kousky vápence bílého, štípatelného, velikosti nepřevyšující hrách, s základní hmotou úplně srostly jsou. Vrstevnaté bílé tufy, v nichž někdy též sem tam zelenavý kousek sideroxenu, neb sidorexenem zbarvené základní hmoty vtroušen bývá, nebo v nichž všechny kousky vápence zmizejí a toliko částečně základní hmotu v přejemném rozptýlení úplně pronikují; jsou s břidlicemi ještě mnohem úžeji spojené než předešlé rudé tufy; nebo vrstvy mocnosti 1 decimetru až mnoho metrů, ač též samy o sobě celé souvrství skládají, střídají se též v pořádku přerozmanitém s břidlicemi tufovými: bílé mandlovce jsou, ač obvykle bezrudé, přece méně jalovými než oboje předešlé odrůdy. — Vedle břidlic stýkají se bílé tufy toliko s rudými hrubovrstevnatými tufy diabasovými se slohem neb bez slohu mandlovcovitého; s šedozelenými pak nikdy ve styku se neobjevují.

Ačkoliv bílé mandlovce samy o sobě vyvinuty jsou, sleduje se z nich nicméně částečně též přechod do tufů rudých; nebo na velmi mnoho místech, kde tufy šedorudé rozsedlinami prostoupeny bývají, neb kde zkyprělé a vodou jakoby proniknuté jsou, pozorují se přechody v mandlovec bílý vyblednutím barvy rudé.

Labradoritů vrostlých neobsahují tufy diabasové ni rudé, tím méně bílé.

Jiná proměna zrnitých tufů diabasových jeví se na výchozím, kdež obvykle barva rudá vyblednouc, něco málo se v přihnědlou mění. Poněvadž již nahoře zmíněno bylo, jak snadno kuličky vápence, sloh mandlovcovitý v zelených tufech podmiňující, vodou, poněkud kyselinou uhličitou nasycenou se vyluhují, zůstávajíce po sobě dutin, až do jisté hloubky od povrchu počínaje; nebude nic divného, že se tento úkaz i u mandlovců rudých a bílých objevuje, kdekoli tyto na den vycházejí: že ale kuličky v tufech převládají a tudíž základní hmota místy toliko velmi tenkou skořápku mezi kuličkami tvoří, kteréž mimo to mezi sebou jakoby malými ocásky nezřídka spojeny bývají; jest na bílé dni, že povrch tufů, z nichž vápence vylouhovány byvší zmizely, jen málo spojitosti mají, kyprým bude; protož také rozpadává se v zrna, kdekoli nepokryt až na den vychází, kteréž deštěm smyty byvše, přístup rušivé vodě k mandlovcům nezabraňují. Proto také jen na málo, a to jen zvláště příznivých místech, tyto odrůdy na den vycházejí, an obzvláště často žlutošedou těžkou hlínou, do které se proměňují zkyprené částky povrchu, v mocné vrstvě skryty jsou.

Co se týče břidlic, tož nemožno mezi nimi a zrnitými tufy diabasovými

vrstevnatými ostrých hranic určit; nebo z břidlic velmi jemnozrných s předokonalou štípatelností břidličnatou se mohou sledovat přechody břidlicemi zrnitými do břidlic velmi zrnitých nedokonale břidličnatých, až do vrstev hrubozrných s břidličnatostí převlehlými nedokonale naznačenou, kteréž z zrnitých tufů povstávají.

Zde buďtež nejprve přechody tufů do břidlic vyznačeny.

Jestliže v rudém tufu mandlovcovitěm zmizí vápencová zrnka, tak že zbyde toliko drobnozrná základní rudá hmota samotná, obyčejně nemohutné vrstvy skládající; tož tím přechod do rudých břidlic naznačen; nebo jestli že se zrno ještě trochu zdrobí a břidličnatě uloží, objevují se místo vrstev zrnitých vrstvy břidličnatého slohu, tudíž břidlice. Tento přechod, ač neřídý, jest přece méně hojný následujícího.

Když se v rudých neb šedorudých tufech zrnitých vytrácí vápenec v zrnkách zarostlý, přistupuje-li ale do složiva zelenavá břidlice v kouskách ostrohranných, promění se tuf mandlovcovitěho slohu v tuf jako breccie složený. Těž do bělavých neb žlutavých tufů přistupují ostrohranné zelené kousky neb šedavé, kteréž z tufů pestrá směsice brecciím podobnou způsobují. Seřadí-li se součástky složiva, kteréž jsou buď hrubozrné až drobnozrné dle plochy jedné zároveň, tak že se vyvině nedokonalý sloh břidličnatý, poskytují tyto velmi hrubobřidličnaté vrstvy přechod do břidlic. Vůbec možno za pravidlo určit, že se tufy tím blíže břidlic nalézají, čím více zelených kousků ostrohranných v nich vtoušeno jest; jelikož ale břidlice jsou toliko jedinou a výhradní horninou, v níž lože rudní uloženy jsou, možno i z nepatrných zrnek zelenavých, v tufech byt by i velmi hrubovrstevnatých neb dokonce nevrstevnatých, soudit na možný přechod v břidlice a tudíž na možnost objevení rudy.

Jest na místě zmínit se o zelené hornině vtoušené v přechodních tufech. Zarostlé kousky od velikosti ořechu lískového počínaje až do drobnosti velenepatrné, jsou vždy ostrohranné a úlomkům jiné horniny nad míru podobné; některé jsou drobnozrné, jiné celistvé, opět jiné břidličnaté, barvy světle až trávově zelené. Z čeho se kousky skládají, jest tak nejisté jako z čeho základní hmota tufů složena jest, však o světle zelených možno za to mít, že jsou přejemně v nich rozptýleným sideroxenem zbarveny; v zrnitých kouskách barvy zelenavé se malým zvětšením patrně objevuje přetenké pletivo žileček. barvy trávové, dělicích světle zelenavý zarostlý kousek v samá předrobounká zrnka. Žilečky přejemně jsou sideroxenem. Kousky barvy trávové, celistvého slohu, lomu nedokonale lasturového a natrhaného, poloprůsvitavé na hranách, složeny jsou z čistého sideroxenu. Má se za to, že zelený nerost se delessitu velmi podobá, což u šupinatých odrůd možné jest.

Přechodní zrnité tufy, kteréž složeny jsou z pestré směsice přerostmanitě barvené, jsou buď hrubozrné, složeny z zrn až velikosti malého lískového ořechu, nebo zrnité neb drobnozrné, složeny z zrn menších maků. Čím zrno drobnější, tím bližší obyčejně přechod do vlastní břidlice, ač to všeobecně neplatí.

Směsice různobarevné složeny z kousků barev bělavých, přihnědlých, přišedlých, přizelenalých a zelených a všeobecný ráz jest tedy bělozelenavý; jiné opět složeny z kousků nažloutlých neb nahnědlých s nazelenalými a šedonarudlými a ráz jejich je špinavě šedavý; neb z kousků rudých a zelených a ráz jich jest

šedavorudý neb rudý. Jiných směsíc obyčejně nebývá. Zrnka vápence v přechodních vrstvách velice vzácný jsou, jakož vůbec u tufů, kteréž patrně vrstevnaté bývají.

Tak jako zřídka některé slabší vrstvy, obzvláště bílého tufu diabasového, někdy naskrz dolomitem prostoupeny bývají a nabývajíce tím pevnosti značnější od okolních méně pevných vrstev se liší; tak i některé přechodní vrstvy polobřidličnaté, jsouce prostoupeny dolomitem, tvrdnou nad ostatní. Kdykoliv nějaké vržení neb nějaká trhлина všecky vrstvy rozsedne, tu se povolnější ostatní obyčejně zase uzavírají a toliko tvrdší dolomitem neb vápencem proniknuté vrstvy podržují puklou štěrbinu neb trhlinu, v kteréž obyčejně nerosty v žilách se vyhranující objevují, jako Ankerit, Baryt, Pyrit a jiné, ježto ve vyplužené trhlině měkších hornin nikdy se usadit nemohou.

Od zrnitých břidličnatých tufů se sledují znenáhlé přechody do *břidlic tufů diabasových*, nebo tyto nejsou nic jiného než tufy s zrny velmi rozmělněnými. Právě břidlice jsou barev různých, nejčastěji převládají ovšem rudé jednobarevné, jiné jsou bělavé, jiné nazelenalé, opět jiné našedlé; barva rudá pochází z valné části od haematitu, kterýž přejemně rozptýlen, celou břidlici buď zcela neb částečně barví, zelenavé břidlice pak sideroxenem neb delessitem úplně proniknuty jsou; bělavé a šedavé břidlice jsou buď nezbarvené neb vybledlé břidličnaté tufy.

Břidlice jsou tence až patrně vrstevnaté; vrstvy břidlic počínají mohutností velmi nepatrnou a dosahují až mocnosti  $\frac{1}{2}$  metru. Nejčastěji rudé břidlice vrstvy silnější skládají.

Jakkoliv břidlice jednobarevné barev právě uvedených jsou hojny, tož přece břidlice pestré páskované, rozmanitostí jakož i hojností svou mnohdy ony množstvím svým převyšují čostí značně. Pestré břidlice jsou znamenitým úkazem památným a pro rudonosnost význačným.

Pestrost břidlic pochází od toho, že zároveň s břidličnatostí se objevují tenké pásy jinobarevné; pásy jinobarevné složeny buď opět z břidlic jemných neb přejemných nebo z břidlic zrnitých neb hrubozrnných, složených z zrn rudých a zelených, nebo méně hojně bílých a zelených, kteréž jako z hruba šupinatá pásma v břidlicích tvoří.

Pestré břidlice jsou buď rudé s páskami zárovnými dle břidličnatosti barvy bílé, šedé, zelenavé i zelené; nebo bílé s páskami zelenými, rudými neb šedoviolovými; nebo šedoviolové s páskami šedými, šedozelenavými neb zelenými. Jednotlivé pásy v břidlicích nejsou však vrstvičkami, jelikož se dle směru břidličnatosti hojně vytrácejí a s okolní jinobarevnou břidlicí splývají přechody poznenáhly, též se opět jiné pásy na jiných místech vyskytují. Páskované břidlice všech barev převládajících, jak rudé, tak bílé a šedoviolové do sebe přecházejí, když některé z pásků barevných nad jinými množstvím neb rozsáhlostí vynikají. Rozsáhlost pásků mění se na příčném lomu břidlic od tenkosti přenepatrné, až do šířky prstu i mnohem více ještě.

Mimo tyto jemnozrnné břidlice se též zrnité břidlice a hrubozrnné přechody tufů v břidlice páskované objevují, ovšem že v měře mnohem značnější než břidlice samé.

Některé břidlice jako šupinaté jsou zarostlými kousky jinobarevnými, tak bílé břidlice s zarostlými zelenými tenkými plátkami sideroxenu, neb rudé šupinaté

břidlice s zelenými šupinami. Opět v jiných břidlicích tvoří zelenavý nerost krátké nerovné páky v rudé základní hmotě, neb nerovné pruhy zelené žilkovaté v šedoviolových základních hmotách a takové břidlice objevují břidličnatost nerovnou a nedokonalou, ač základní hmota sama o sobě velmi dokonale jemnobřidličnatou jest.

Jakkoliv složivo břidlic přejemných, na lomu takřka celistvých, jest skryté, tož předce velikým zvětšením zrna některých břidlic šedoviolových seznává se, že složeny jsou z bělozelenavých a šedorudavých zrnčtek; v rudých břidlicích pak se přejemné plátčky slídy lesknoucí se vyskytují. Že břidlice složeny jsou toliko z zrnčtek rudých neb bělavězelených neb i zelených, toho důkazem jsou všechny možné přechody do tufových zrnitých břidlic, v nichž zrnka velikost značnou dosahují; převládá-li některá z obou součástí, tedy se dle toho barvy mění do rudé, bělavé, šedavé, šedorudé, šedoviolové, zelenavé a zelené; barev jiných není, proto že z barev směsi se vyvodit nemohou.

Vryp břidlic rudých jest světlerudý, vryp šedoviolových pak mnohem světleji rudý předešlého, důkaz to zřejmý, že břidlice bohaté jsou na haematit, kterýmž přejemné prostoupeny jsou.

Břidlice hrubo- i jemnozrné jsou vesměs horninou rudonosnou nebo ruda se takorůka výhradně v břidlicích uložena vyskytuje; některé břidlice pak haematitem tak prostoupeny jsou, že samy o sobě nuznou rudou skládají.

Na vzduchu břidlice, nejsou-li dolomitem neb vápencem prostoupeny a tudíž stvrdly, což velmi zřídka též se vyskytuje, rozpadávají se v samé tenké plátky, konečně ale tak zkpří, že se v prach mění, kterýž na dešti v mazavé bláto nabobtnává. Tu opět zrnité břidlice jsou něco málo trvanlivější břidlic jemnobřidličnatých, mezi kterýmiž páskované šedoviolové břidlice nejsnadněji se porušují; za několik málo dní již proměna jeví se v nich, zvlášť je-li nepohoda času.

Vrstvy břidlic střídají se beze všeho pořádku mezi sebou a mezi tufy nedokonale břidličnatými; však možno za pravidlo určit, že břidlice převládají nad tufy a že jemnosti břidlic přibývá na blízku ložisek rudních.

Že břidlice přesnadno rušící se na vzduchu takorůka nikde na den nevycházejí v celé prostře obvodu našeho útvaru, netřeba blíže odůvodňovat.

O lučební podstatě a o podstatě složiva tufů diabasových a tufových břidlic, kteréž též jmenem mandlovců zahrnuty jsou, se velmi málo ví; tyto horniny též jmeny Schalstein (Variolit) a Schalsteinschiefer zvlášť v Nasavsku, kde podobná pásma v útvaru devonského rudu zahrnují, pojmenovány jsou, aniž by též pravá podstata jich byla proskoumána.

**Mohutnost** pásma rudonosného z mandlovců a břidlic složeného mění se rozmanitě. Na západních hranicích Chyňavských v Jakubinkách, kdež celé pásmo v obvodu našem nejmohutněji vyvinuto jest, jsou mandlovce v rozsáhlosti (dle mohutnosti měřené) okolo 430 metrů známy, mocnost sama ale mnohem vyšší jest tohoto čísla. Na jiném místě východní části obce Chyňavské, v Ouhorově nad Kamennou, poznán mandlovec s jistotou až do mohutnosti 360 metrův, mohutnost jeho ale mnohem vyšší této. Uprostřed obce na Ouhorově asi naproti kapliče, která na kamenném temeni hraničícím obcím Železenské a Chyňavské vystavěna jest, mocnost pásma pracemi výzkumními na něco málo méně 500 metrů zjištěna.

V Libečovské obci ubývá mohutnosti pásma velmi značně, ač s jistotou míru

jeho udat nelze pro nejistotu hranic a sice tím značněji, čím dále k východu, tak že ve štole Chrbinské mohutnost jeho na dvou místech s 32 až 24 métry prodělána jest.<sup>14)</sup> Od štoly Chrbinské k východu opět přibývá mocnosti pásma, kteréž mezi Chrbinskou štolou a šachtou III. v Jezevčíně 45—40 metrů měříc v svých rozměrech v údolí potoka Kačického opět náramně se uveličuje, an zajisté větší rozsah 150 metrů zaujímá, do kteréž měry s určitostí posud prodělána jest. Na temeně Karabinského vrchu u šachty druhé možno za to mít, dle pohledu toliko, že mohutnost se rovná asi 150 metrům (totiž jest menší 160 metrů); u Svárovských šachet první a třetí jest opět rozsáhlost v ubývání, an v šachtě IV. v rozměru 40 metrů dle mohutnosti proděláno jest rudonosné pásmo.

Kdekolivěk mohutnost rudonosného pásma značná jest, tam skládá se toto z převládající největší části rozličných odrůd tufů diabasových zrnitých nevrstevnatých; ubývá-li rozsáhlosti jeho, složeno jest z tufů více méně hrubovrstevnatých neb velmi hrubobřidličnatých jako v Chrbinské štole, kdež posud nejmenší mohutnost pásma poznána jest.

Ostatní část pásma složena z břidlic; že pak v celku zevrubněji dvoje pásma rud známá jsou, ležaté ložisko první a visuté ložisko druhé a třetí, tedy i dvoje pásma břidlic se vyskytují v celé rozsáhlosti pásma mandlovců. (U Chyňavy, kdež ložiska snad v třech pásmech každé o sobě se objevují, jsou zajisté troje pásma břidlic; že pak u Chyňavy ložiska báňskou prací rozdělaná nejsou, nemožno nic bližšího o pásmech břidlic udat.) Nejnížší pásmo břidlic, ležatých tedy, uloženo bezprostředně na křemencích neb jemnozrnných pískovcích všude bez výminky.

*Ležaté* celého rudonosného pásma mandlovců *složeno z břidlic*. Břidlice, kteréž převládají, jsou rudé s malíčkými lístečky slídy; v těchto rudých břidlicích též uloženo ložisko první na nejspodnější, takorča na samých křemencích ležící, od kterých toliko vrstvou šedavých břidlic méně 1 decimetru, někdy ale — zřídka toliko břidlicemi rudými v mocnosti až 1 metru odděleno jest. Pod ložiskem, jsou-li pod ním rudé břidlice, což zřídka bývá a nad ložiskem, v rudých břidlicích, aneb v rudých břidlicích samotných, když ložisko úplně schází, jsou na některých místech skameněliny objeveny.

Místa tyto jsou následující: V obci Chyňavské blízko spojených cest; nejvýchodnější do Železné z Chyňavy vedoucí s cestou z Libečova k západu vedoucí a sice západně vedlé cesty první (číslo 5325 mající na polední mezi pole číslo 575); pak v Libečovské štole kutní; na obou místech toliko malíčké Brachyopody z rodu *Obolus* sp. (posud nepopsané) se vyskytují. V ležatých rudých břidlicích šachty číslo I. ve Svárově nalezeny *Obolus* sp., *Discina* sp. a co vzácnost nezřetelné zbytky snad od *Syphonotreta* sp., všechny posud nepopsané. Poslední též nalezena v tufech zrnitých rudých ve visutém rudě. V šachtě Svárovské III. též *Obolus* sp. nalezen. Skořápky skamenělin jsou bílé hebké a protož snadno se na rudé břidlici stírají. Zajisté, že více míst jest, v kterých snad se ještě skameněliny nacházejí.

V břidlicích rudých objevující se ruda bývá obyčejně bezprostředně uložena v tenkých vrstvách přejemných břidlic páskovaných, šedoviolových, rudých neb bělavých s páskami bělavými, zelenavými neb zelenými. Kdekoliv ruda v několik velmi blízkých ložisek se dělí, tu tyto přejemné břidlice páskované mezi rudou skládají proplástky břidličnaté. Proplástky páskované, barvy šedoviolové jsou znamením

bohaté rudy čisté, celistvé. Kdekoliv plásky rudové dále od sebe uloženy jsou, bývají toliko vrstvami rozličných břidlic zrn jemných i hrubších děleny, mezi kterými ovšem rudé břidlice převládají; toliko nejbohatší ložiska páskovanými, a zvláště bohaté, šedoviolovými tenkými, přejemnobřidličnatými vrstvičkami doprovázeny bývají.

Mocnost pásma ležatého mění se obyčejně od 2 do 4 metrů i více, jak asi v Chynavě a Libečově odkryto bylo; však na některých místech, kdež bezrudé jest, až do 1 až 3 decimetrů se rudé břidlice stlačují, jsouce doprovázeny šedozeleňavými tufy, tvrdými, jemnozrnnými, kteréž, zvláště jsou-li od labradorových krystalů vrostlých porfyrické, vždy na jalovou skálu poukazují, jako v některých částech štol Libečovské, kdež ruda v tenkém pásmě břidlic chybí. V Chrbinské štolě pásmo zaujímá, jakož i v celém Jezovčíně, mohutnost 2—3 i více metrů. V Karabinském vrchu jest mohutnost břidlic ležatého neb prvního ložiska veliká a obnáší zajisté více 20 metrů; na šachtě I. Svárovské jest rozsáhlost pásma skládajícího se z břidlic rudých, s kterými se ale i mandlovce střídají, jakož i jinak zbarvené břidlice 20 metrů, v kteréž rozlehlosti troje ložiska rudy uložena jsou. Tab. IV. obrz. 3. Na šachtě III. a IV. mocnost rudých břidlic toliko 1—3 metry obnáší.

*Visuté pásmo* břidlic, v kterémž se objevují ložiska druhé a třetí, jest podobně složeno jako pásmo ležaté z břidlic jemno- až hrubozrnných toliko s tím rozdílem, že rudé břidlice nepřevládají. Mezi oběma ložisky druhým a třetím uložen bývá mandlovec nebo hrubozrnné polobřidličnaté tufy nebo i zrnité vrstvy bílého mandlovce; toliko kolem ložisek rudních jest břidlice větší množství. Břidlice šedoviolové se ani nevyskytují v tomto pásmu, též jest i břidlic páskovaných mnohem méně než v pásmu nižším, ačkoliv úplně nechybí jako třeba v Chrbíně. Vůbec možno udat, že jest ruda pásma visutého uložena častěji do břidlic hrubozrnnějších než jemnozrnných a že tufy zrnité a mandlovce bývají při rudě v mnohem bližším sousedství, než se to kde v spodním pásmu pozoruje. Toliko kde se v rudním pásmu mnoho slabých plástů haematitu jako v šachtě IV. Svárovské vyskytuje obrz. 1., tam převládají okolo samé rudy též břidlice rudé a pestřerudé, tolikéž i páskované.

Mohutnost pásma visutých břidlic rudonosných převyšuje odlehlost ložiska druhého od třetího jen o velmi malou část; u prostřed pak mezi oběma ložisky bývají vrstvy hruběji složené neb i mandlovcovité šedavé, bělavé, šedorudé.

Skamenělin ve visutém pásmu objeveno posud není. Dle toho, jestli že se více ruda ložiska druhého neb třetího vyvine, se též mohutnost vlastních břidlic rudých, ložisko bezprostředně obklopujících řídí; největší mohutnosti rudé břidlice nabývají ovšem tehdaž, když se ložisko z několika rudních plástů skládá. Některé velmi slabé vrstvy břidlic pestrých bývají též slabými páskami Sideritu prostoupeny, neb dolomitem úplně pronikly a tedy velmi pevný.

V Chrbinské štolě předěláno štolou ve visutých černých břidlicích 10 metrů mocné lože mandlovce rudonosného. Mimo hlavní pásmo rudonosných mandlovců jest tedy v Chrbíně s určitou jistotou pásmo rudonosné, ovšem poměrně slabé, ve visutém hlavního pásma mandlovců známé. Střed mandlovcového ložiska jest od spodní hranice břidlic černých, kde se tyto se svrškem mandlovců hlavních stýkají 40 metrů, od vrchní hranice břidlic odpočítaje, místa, kde křemenci pásma  $d_2$  pokryty jsou, asi 20 metrů. Mandlovec jest barvy šedorudé, vrstevnatý a obsahuje též

vrstvy břidlic drobno- až jemnozrnných. V jemnozrnných břidlicích pak vtroušeny jsou plásty a lože rudy červené semenité v rozlehlosti 3 metrů. Plásty rudní buď ostře od břidlic odloučeny, aneb splývají s břidlicí, do kteréž na styku se semenitou rudou též seménka rudy vtroušeny jsou. Plásty a lože hojně nad sebou uložené vytrácejí se často zcela a na místě jich vyskytují se nové. Rudní ložisko sledováno chodníky ač ne do značných dálek. Památne toto lože rudonosných, mandlovců jež jest obdobou mocného pásma mandlovců u Vokovic, toliko na jediném místě v Chrbině odkryto jest; příčina pak, proč jinde v černých břidlicích nic podobného neobjeveno, ta jest, že vůbec břidlice černé, kteréž nikde v našem obvodu na den nevycházejí, poměrně ještě málo proskoumány jsou na rudonosnost.

### Ložiska Svárovsko-Chrbinská.

Jak podotknuto, jsou ložiska uložena ve dvou pásmech; ložiska každého pásma vyznamenávají se svým zvláštním rázem, kterýmž se, je-li tento dobře vyvinut, na první pohled od sebe rozeznávají.

#### Složivo ložiska ležatého (prvého).

Ložisko ležaté, takřka bezprostředně na křemencích ležatých uloženo, jsouc odděleno toliko několik centimetrů mocnou vrstvou šedého břidličnatého tufu diabasového, skládá se v Chrbině a Jezevcíně, to jest v oné části, ve které nejbohatěji vyvinuto jest, obyčejně z plástu jediného, hojněji ale z plástů dvou. Plást spodní jest bohatý, plást visutý bývá chudší předešlého. —

Zde budiž prozatím toliko o *ležatém plástu* řeč: Nejhojněji složen plást ležatý v celé své mohutnosti 2 decimetrů až 1 metru toliko z rudy celistvé neb přejemně drobnozrnné, těžké, barvy tmavošedo rudé neb černorudavé. V jednostejně složeném plástu není jiných přísad mimo rudy, leda by tento oddělen byl v několik slabších plástů tenkými vrstvy pestrých páskovaných břidlic. Drobnozrnné odrůdy tmavorudé neb tmavošedorudé jsou nelesklé; přejemně zrnité až celistvé odrůdy barvy šedočernorudé jsou trochu slabě lesklé. Dle všeho toho vysvítá, že ruda složená z velmi jemnozrnného železovce, což se i potažnou váhou určenou 5·17 grammy velmi drobnozrnného krevele, kteráž 4·6056 obnáší, objevuje. Jiný méně bohatý kousek z ležatého plástu ložiska 1ého měl hodnoty 4·2822 určené s 3·86 grammy. Ruda tato svou čistotou a bohatstvím všechny ostatní předčí a může se co vzor bohaté rudy považovat, an takorůka nižádných znečištěnin, mimo kysličnisk železitý neobsahuje.

Ruda drobnozrnná láme se v hrubé roubíky průřezu rovnoběžníka, jehož jeden úhel asi 80° obnáší, přímo na směr vrstevnatosti; vrstevnatost v rudě nejčistší nebývá naznačena — povrch roubíků potažen zemitým slabým povlakem krevelu zemitého, slabě barvícího, barvy rudé; málo kdy a to toliko v místech vlhkých nebo na výchozím jsou hranoly částečně žlutým zemitým limonitem tenounce povlečeny. Ač šedočerný celistvý haematit též se v hranoly podobné, přímo na směr vrstevnatosti rozpadává, přece nejsou tyto tak zřetelně odloučeny jako předešlé, nebývají též pokryty zemitým haematitem.

V mnohých odrůdách a to zvláště oněch, kteréž jsou celistvé, jest přemnoho



maličkých různě vtroušených skulinek dutých, povrchu nepravidelného, kteréž obyčejně jakož i plochy lomem povstalé pokryty jsouce přejemnou vrstvičkou haematitu jak pouhý nádech mocnou, barvy višňové a lesku heboučkého aksamitu. V některých skulinkách jest povlaku více a skládá se tento patrně z přejemných šupinek haematitu nebo slídy železné barvy višňové, jak se zvětšením patrně rozeznává. Kdekoli v ložisko slaběji vyvinuto bývá, složen přece plást tento z drobnozrnného neb celistvého haematitu barvy rudé jako na mnohých místech ve Svárově.

Plást ležatý, ač převládající část jeho takto čistá a bohata jest, *přechází* v jiné odrůdy a sice:

1. v železovec křemenem proniknutý. V ložisku samém se vyskytují mnohdy slabounké kratičké žilečky bílého křemene, jež se zřídka protínají a jimiž se v plástu rudním ničeho nemění leda to, že se mnohem méně zřetelně v hranolovité kusy rozpadává, než kdyby beze žilek křemenných byl a že haematit v drobnozrnném složení tím více lesklé železné rudě se podobá, čím více křemene obsaženo v něm. Přibývá-li křemene značněji, ne ale v patrných žilkách, nýbrž tím způsobem, že v malých zrnečkách celou rudu pronikuje, tu promění se všecken haematit v železnou lesklou rudu barvy železa, kteráž v malých zrnkách jako vpletena jest do křemene, nad kterýmž převládá. Slabým zvětšením již rozezná se haematit barvy železa a lesku kovového vedlé křemenu co spletená směsice. Propletení haematitu možno toliko porovnat s pletenými vrostlými odrůdami smaltitu neb chloantitu.

Jakkoliv převládá haematit nad křemen, přece ve velkém jsou plásty křemenité barvy šedočerné značně tvrdé a pohřešuje se v nich úplně dělení v hranolovité kusy. Tato odrůda toliko na velmi obmezených místech (jako u Jezevčinské šachty III.) skládá plást spodní.

2. Přechod v sideritický haematit jest uskutečněn v štole Chrbinské. Plást rudní v celku barvy rudé složen z rudých neb šedorudých neb šedých, velmi jemnozrnných takřka celistvých a velmi drobnozrnných součástek, kteréž vedlé sebe beze všeho pořádku uloženy, též v sebe přecházejí. Částky barvy rudé, kteréž obyčejně velmi převládají, složeny z haematitu, šedorudé pak jsou haematitem úplně proniknutým sideritem. Vedlé těchto tmavých rud vtroušeny sem a tam velká zrna zrnité barvy šedožluté neb špinavě hnědožluté, kteréž z čistého sideritu složeny jsou. Mimo to ale se leckdes objevují lesklé štěpné plochy větší, rovnající se velikostí svou čočce, kteréž jsou zarostlými jednotlivými zrny sideritu. Ruda, v kteréž se objevují sem a tam přeslabé pásy šedé, sestávající ze špinavě šedé břidlice Sideritem prostoupené, kterýmiž vrstevnatost naznačena, jest velice tvrdá a křehká a dělí se nedokonale v hranoly přímo na vrstevnatost. <sup>15)</sup>

3. Některá ruda v plástu tenkém, kterýž v šedoviolové břidlici zahrnut bývá, jest nedokonale břidličnatá a rozpadává se na vzduchu jako břidlice v plátky tenké, těžké, rudové. Tato ruda jest prostoupena břidlicí šedoviolovou, buď úplně anebo v ní tenounké pásy skládá a sprostředkován jí přechod do břidlic šedoviolových tím, že do složení břidlic přemalé plátky haematitu barvy višňové (železné slídy) přistupují, kteréž, zatupujíce místo slídy v břidlicích, jemnobřidličnatý sloh podmiňují.

V některých břidlicích tufových, v kterých pouhým okem nižádné částky rudní se nepoznává, jest přece značná část šupin haematitu (slídy železné) rozptýlena,

an se to již pouhou tíží břidlice poznává. Břidličnatou rudou tedy podmíněn přechod do břidlic tufových.

4. Ve valné části vrchu Bubové až k Libečovu jest uložena odrůda velkooolitická. V základní hmotě drobnozrnné, barvy rudé, množstvím svým ale velmi podřízené, jsou srostlé těsně vedle sebe dotýkající se, nebo do sebe též splývající oolithy velikosti bobu až velmi sploštěného vejce s povrchem kulovitým a vlnitým, slohu soustředně mískovitého. Že pak později při odrůdě „Karabinskou rudou“ zvané, kteráž se této odrůdě k nerozeznání podobá, ona ještě popsána bude, tedy netřeba zde se blíže o ní zmínovati.

Kde plást spodní doprovázen bývá *plástem visutým*, pestře páskovanými a rudými břidlicemi odděleným, tu plást vrchní se svou menší potažnou váhou, tedy menší bohatostí na železo od spodního se rozeznává.

Plást visutý skládá se z jemnozrnné bohaté rudy barvy rudé, v které jemnouhké kousky jalové, barvy bílé, bělozelené a zelené hustě vtroušeny jsou. Toliko větší kousky velikosti maku i něco větší se pouhým okem spatřují, ostatní jsou tak malé, že toliko zvětšením se objevují. Menší bohatost rudy tedy podmíněna toliko vrstlými částčkami jalovými. Ostatně se podobá tato ruda zcela oné z plástu ležatého a sice tím více, čím bohatší jest. Dělitelný jest plást nedokonale v hranoly přímo na vrstevnatost, kteréž slabým povlakem barvy višňové potaženy bývají.

*Přechody* této rudy pozorují se dvojí:

1. Uveličují-li se zarostlé jalové částky, což se vždy na úkor základní rudní hmoty děje, tedy se promění visutý plást v pestrou směsici haematitu rudého s bělozelenými až zelenými částkami sideroxenu. Tyto chudší rudy předešlých se podobají některým pestrým rudo- a zelenavým břidlicím zrnitým, od kterých se ale větší tíží svou, jakož i značnější pevností rozeznávají. Některé slabé plásty rudy, uložené v mocně vyvinutém pásmu ležatých břidlic ve Svárově, skládají se z této odrůdy, do které však i v Jezovčíně se plást visutý měnívá. Mocnost plástu jest od několik centimetrů až do 3 decimetrů. Jestli že vedle rudy k zeleným kouskům Sideroxenu též rudé břidlice přistupují, čímž ovšem ruda se nuznou stane, tedy tím podmíněn přechod do pestrých břidlic; nuzná ruda se tím více přibližuje v složivu svém břidlicím, čím více přibývá tufových zrn, kteréž posléze všechna rudní zrnka vytlačí ze složiva, proměnivšího se v jalovou břidlici pestrou.

2. Jestliže do zrnitého složiva rudy přistupují malé oolithy velikosti maku až leného semene i něco málo větší a ubývá-li zároveň jalových částek Sideroxenu; tedy tím naznačen přechod do semenky neboli krevele slohu oolitického. Semenka pak, do které se složivo plástu visutého mění, skládá se z oolithů převládajících, zarostlých v základní hmotě. Je-li semenka zvlášť nuznou, přistupují do složiva též jalové částky sideroxenu, kterýmiž rázu pestrého nabývá. O semence, kteráž v ložiskách visutých tak hojně vyvinuta jest, na příslušném místě řeč bude.

Semenka plástu visutého v mocnosti 2—3 decimetrů jest v Chrbinské štole vyvinuta.

Bohaté rudy plástu ležatého nazývají se zde vůbec „rudami Chrbinskými“.

### Složivo ložisek visutých (druhého a třetího).

Ložiska visutá, kdekoliv jsou mohutněji vyvinuta, skládají se z *oolitického haematitu* nebo ze semenité rudy (semenky).

*Semenka barvy rudé* složena v nejčistších svých odrůdách ze základní hmoty převážně drobnozrnné, barvy rudé, lesku nepatrného, v kteréž těsně vedle sebe zarostlé oolithy, tolikéž rudé barvy a lesku slabého.

Velikost oolithů obvykle rovná se sploštělému máku neb zcela lenému semenu. Sloh oolithů jest přetence soustředně mískovitý. Některé odrůdy obsahují vedle malinkých hojných oolithů velikosti máku též sem tam vtroušené větší, velikosti bohatého máku, což poměrně ale méně hojně se objevuje. V nejčistších odrůdách rovná se jakost základní hmoty asi úplně jakosti rudy oolithů, od kterýchž se toliko nepatrně odchyluje, nebo semenka ze štoly Vojtěšské ve vrchu Karabinském měla hutnoty 3·9570 určené s 1·55 grammy; oolithy v ní vrostlé, velikosti malého máku až leného semene však 3·9358 (určené s 1·14 grammy). Z potažné váhy této nejčistší semenky dá se soudit, že s porovnáním rudy z ležatého ložiska jest semenka chudší na železo. Nejmenší oolithy, kteréž vůbec v rudě zarostlé se vyskytují, jsou drobnosti malého až velkého máku a váží jedna kulička semenky v průměru asi 7·3 milligrammů.

Semenka ač sama o sobě méně bohatá na železo, než celistvé rudy, přece jest chudne více, an se základní hmota proměňuje v rudu nuznou; nepatrnými přechody dá se sledovat, jak základní hmota ustavičně více a více se co do složení přibližuje břidlici tufové, valně Haematitem prostoupené; nejnuznější pak semenky skládají se toliko z oolithů zarostlých v břidličnaté základní hmotě barvy rudé. Že pak do nuzných rud s chudou základní hmotou ještě obvykle kousky zelenavého neb zeleného sideroxenu vrostlé bývají, stává se tím ruda jen ještě nuznější. Že ale konečně břidlice tufové, byť by i rudou veskrz prostouplé byly, se na vzduchu za krátký čas drolí, sdílí nuzná ruda vlastnost tu s nimi a rozpadává se drolením v drobné kousky tím rychleji, čím více základní hmoty obsahuje a čím méně bohatou na rudu základní hmota jest. V některých plástech semenky jsou zároveň s vrstevnatostí více méně mohutné pásy nuzné rudy, neb toliko břidlice sem a tam oolithy prorostlé, uloženy.

V nuzných semenkách bývá všude rudnatost toliko v oolithech obsažena, kteréž se ani v nejchudší základní hmotě pouze břidličnaté nemění. Na doklad toho vybrána oolitická ruda s nuznou základní hmotou z Vojtěšské štoly, z Karabinského vrchu z ložiska druhého, v kteréž vedle oolithu velikosti obvyčné, byly větší oolithy tolikéž soustředně vrstevnaté zarostlé.

Potažná váha základní hmoty určena 1·67 grammy obnášela 2·9925.

V základní hmotě zarostlé oolithy: vážíly jeden průměrně:

|                                                                    | potažná<br>váha | určená<br>grammy |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Oolithy velikosti malého až velkého máku 7·3 milligrammů . . . . . | 4·3748          | 1·21             |
| Oolithy sploštělé velikosti bohatého máku . . . . .                | 4·4937          | 3·43             |

|                                                                                                            | potažná<br>váha | určená<br>grammy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Oolithy podobné převelkému máku až velmi malé více<br>37 milligrammův . . . . .                            | 4·4721          | 1·46             |
| Oolithy podobné velké více až malému hrachu 156 milli-<br>grammův . . . . .                                | 4 5202          | 1·26             |
| Oolith podobný dle velikosti bobu, potažná váha, určená<br>s celou rudní hmotou krajní i střední . . . . . | 4·4079          | 1·99             |
| Jiný oolith velikosti bobu, potažná váha s celým kusem<br>rozbitým, tedy krajem i středem určená . . . . . | 4·4673          | 1·77             |
| Opět jiný oolith velikosti bobu, jehož střed na potažnou<br>váhu zkoušen . . . . .                         | 4·0891          | ·39              |

Z tohoto přehledu patrně, že se oolithy, byť i v nuzné základní hmotě zastlé byly, přece dle své rudnatosti málo mění a že se zdá, jakoby menší seménka byla chudší větších, a že střed větších oolithů jest opět o něco málo chudším, nebo méně hutným kraje.

Ať se dělo vytvoření oolithů jakýmkoliv způsobem v základní hmotě rudové nebo v břidlici samé, tolik jest jisto, že soustředně se vyvíjející vrstvy oolithové čím bohatšími na rudu jsou, čím později se tvořily nebo čím mladšími byly, děllye přírůstek oolithů z vnitř ke kraji, jak se zdá; z toho jde poměrně větší hutnota větších oolithů nad menšími, jakož i krajních vrstev jejich nad vnitřním jádrem.

Zdá se, že převládají v semenkách vůbec oolithy malé, kteréž jsou podobny llopsoidům trojosým, nad ony, kteréž se ellipsoidům jednoosým podobají, a tyto opět ad kulaté oolithy.

Ze semenky rudé složena ložiska bez výminky všude tam, kde mohutnost jejich již dvě třetiny métru dosahuje, ačkoliv i méně mohutné plásty dosti hojně této rudy sestávají. Lože mocnější  $\frac{2}{3}$  métrů se skládají toliko ze semenky rudé sice se zdá být v našem obvodu čím nuznější, čím ložisko mohutnější, ač to všeobecně pravidlem býti nemůže.


V nuzné rudě s základní hmotou břidličnatou neb tufovou a rudou prostouenou se objevují nezřídka, zvlášť ale je-li ložisko rudní mocné, pruhy černé až ernošedé základní hmoty, v kteréž buď rudá seménka neb sem tam i černá rostlá jsou. V některých místech zmohutní pruhy černošedé značně; též jest erných oolithů množství veliké v nich, rudých pak jen spoře, až šedočerná ruda ezme vrch nad onou rudě zbarvenou a promění se zcela v ni.

*Semenka barvy černošedé* zaujímá vedle semenky rudé v složivu ložisek největší část. Základní hmota jest buď šedočerná, jemně zrnitá, sem tam s lesknavým látečkem slídy prostoupená, neb černá, takřka celistvá, nedokonale břidličnatá. Dle pohledu soudě, mohlo by se za to mlt, že základní hmota složena z tuftů iabasových, břidličnatých, Sideritem úplně prostoupených. Bližšího nic o ní známo ení až posud. V základní hmotě vrostly jsou malé černé oolithy soustředně ískovitého slohu, velikosti máku a leného semene, vůbec ve všem rudým oolithům

se podobající, až na to, že na mnohých místech v černé rudě nebývají tak těsně vedle sebe vtroušeny, jak to v rudé semenke bývá. Ruda barvy černošedé neb prostě černá semenka jmenovaná, též se *chamoisitem* nazývá; prozatím ale beze všeho práva, an složení její doposud neprozkoumané jest, tudíž se o totožnosti neb podobnosti s chamoisitem soudit nedá. Toliko to zdá se být jisté a přechody potvrzené, že jest základní hmota složení břidlic tufových, kteréž úplně sideritem prostoupeny jsou.

Vedle černých oolithů se někdy objevují oolithy šedorudé, kterýmiž přechod do rudé semenky se sprostředkuje, ač se v černé rudě samé objevují dosti hojně pruhy ostře oddělené neb na pomezí s černou rudou poznenáhla splývající, kteréž z rudé základní hmoty a z rudých oolithů sestávají. Převládáním těchto pruhů semenky haematitové se nezřídka dosti náhlý přechod černé rudy do červené sprostředkuje.

Tak jako v semenke barvy rudé se objevují pásy nebo proplásty břidličnaté, tak i v černé se objevují v mohutnosti rudy samé, náhle plásty černavých neb šedých břidlic tufových a co zvláštnost též šedozelenavý tuf slohu mandlovcovitého, tedy pravý mandlovec, což v jiné rudě vyjma černé, posud pozorováno nebylo. Proplásty mandlovce jsou v Jakubinkách v Chynavě dobře odkryty v rudé černé, obr. 2.



Ložisko visuté  
v Jakubinkách u Chynavy.

**Vysvětlení:**

*b, b* tufová břidlice šedozelenavá neb diabasová břidlice v ležatém a visutém.  
*m, m, m* mandlovec šedozelenavý slohu mandlovcovitého.  
*r, r, r* plásty ložiska, černé, semenité rudy.

neb dvou tenounkých krajních vrstviček v limonit proměněných, kteréž dutinu vnitřní objímají; posléze i tento zbytek tenké skořepiny zmizí zcela ze základní hmoty na pohled neporušené.

Černá ruda jest mnohem pevnější rudy červené neb vlastní semenky, nerozpadává se tedy na vzduchu a vychází tudíž na den jako v Jakubinkách, v Chynavě a na močidle v Libečově; nejmohutnější ložiska složena z rudy černé jako v této osadě, kde 20 metrů mocnosti zaujímá ložisko, kteréž i tím památné jest, že ve vzdálenosti více sto kroků dle vlaku svého úplně v plásty rudé semenky, ovšem nuzné, proměněno jest.<sup>16)</sup>

Jestli že černá ruda dlouho na vzduchu leží, jak to u nejkrásnější části výchozí bývá, tedy se černé oolithy buď částečně neb úplně v žlutý zemitý limonit proměňují. Některé oolithy pak jsou úplně zmizely ponechávající po sobě toliko dutinu. Že by i část základní hmoty jako vyžíraná a v limonit proměněna byla, pozoruje se též, ale toliko zřídka.

Památný jest počínající rozklad a zmizení oolithů. Rozklad semenek počíná ode středu, kterýž se v maličkou tečku žlutou proměňuje. V seménkách dále v rozkladu pokročilých jest střed dutý a kolem něho vnitřní zbývající jedna neb dvě přetenké mísky oolithu v limonit proměněny a ostře od neporušených černých zevnějších vrstviček odděleny jsou. Čím dále rozklad vylouhování oolithů od středu ke kraji kuliček pokračuje, tím tenčí stávají se černé zevnější vrstvičky, až posléze sestává celý oolith z jedné

*Přechody* převládající rudy pozorují se mnohé do jiných odrůd, ač podřízených, přece veledůležitých.

1. Již napřed u rudé semenky naznačeno, že malá seménka čili oolithy uveličují se sice též, ale toliko zřídka. Tímto uveličováním se oolithů jest naznačen přechod do odrůdy, kteráž se jmenuje rudou Karabinskou (karabinkou). Jestli že se seménka zvětšují, což se velmi náhle děje, dosahující velikosti viky, hrachu, bobu, lískového ořechu neb vlašského ořechu, vejce, ba i ještě více, any zároveň tak těsně k sobě přiléhají, že základní hmotu všecku vytlačují: tedy jest proměna v tuto velmi bohatou rudu dokonána. Karabinská ruda skládá pláсты a ložiska toliko slabá, kteréž nedosahují nikdy mocnosti  $\frac{3}{4}$  métru, za to ale vzácnou svou bohatostí se vyrovnají, ba předčí mnohé mocné ložisko rudy nuzné. Rudní pláсты ložiska, je-li toto propláсты břidlic tufových děleno, nebo celé ložisko nedělené, skládají se z oolithů velikosti dříve naznačené, však hojněji z oolithů větších než menších; největší z oolithů dosahují velikosti velikých až prevelikých bochnů, kteréž potom celý plást skládají. Oolithy jsou vesměs splostělé s povrchem vlnovitě prohýbaným a splývají nezřídka do sebe. Sloh jejich jest veskrze soustředně mískovitý a sice přetence mískovitý; při udeření ve směru mísek rozpadávají se oolithy rázem v plátky rudní, tak jako by soustředně břidličnatým slohem vyznačeny byly. Ač přetenkých mísek soustředních nebývá vždy patrně vidět, přece se tenké plátky pozorným štípáním v ještě tenší a přetenké dělit mohou, kteréž by ještě další dělení připustily, kdyby toho možnost byla. Na okrouhlém a vlnovitě zohýbaném povrchu jest barva oolithů rudá, barva rozštěpených plátek tmavěšedorudá, na lomu příčném, dle kterého se snadno dělí, však jest barva železná, složivo celistvé, lesk slabounce trpytivý a kovový. Vryp pak světle rudý. Někdy na příčném lomu objevuje se soustředně mískovité složení velmi zdařile.

Co ale oolithy tyto zvlášť vele památnými činí, jest to, že ve velkých ba i v menších oolithech bývají opět zarostlé menší oolithy, ne sice vedle sebe ale porůznu, však velmi hojně a nepravidelně vtroušené. Zarostlé oolithy dosahují velikosti počínaje od máku až do oolithů značné velikosti pěstě i malé hlavy, což se dle toho řídí, v čem právě zahrnuty jsou. Oolithy vhrnuté do menších oolithů jsou menší oněch, kterýmiž obaleny jsou, což samo sebou se rozumí. Velké vrostlé oolithy opět vrostlých menších obsahují. Památný tento sloh, kterýž by se opětovaně oolitickým nazývat mohl, jest pro rudu tuto pamětihodným a významným. Tímto slohem se vysvětluje, proč všecka základní hmota úplně ze složiva ložiska vytlačena jest, nebo pouhými oolithy by zatlačena býti nemohla, byť by se tyto dosti těsně stýkaly aneb i částečně v sebe vnikaly; však zahrnutím oolithů do jiných, jejichž přírůstek dle soustředních vrstev se rychleji děl než u oněch zahrnutu byvších, se to snadno vysvětluje.

Jedna okolnost jest to, kteráž příčinou toho jest, že sloh soustředně mískovitý tak jasně vystupuje a kteráž zároveň vrhá světlo na možné povstání oolithů. Mezi soustředními mískami oolithu a též na povrchu, jakož i v mískách oolithu zahrnutých jsou uloženy částečně tenounké až přetenké plástvičky calcitu barvy světlorudé. Oolithy štípají se tudíž snadněji dle těchto vložených plátek vápence, kterýž se barvou světlorudou a slabě trpytivou na slabě kovovělesklých, šedorudých neb rudavěželezných vrstvách po každém rozštěpení mísek objevují. Že se .

dělo usazování plátek vápence zároveň s usazováním se jednotlivých mísek po celý čas trvání jeho, patrné jest, tolikéž i to, že krajní mísky oolithů objímající jsou mladší obejmutých mísek vnitřních. Že pak i v příčném směru se oolithy rovně lámou, bývají i tyto plochy plátkami onoho vápence pokryty.

Převeliké oolithy, když se rozbijou v kusy menší objevují se v kusech rovnobhranných, z kterýchž by se soudit dalo na prvý pohled, že se ložisko skládá též z rudy celistvé v plástu uložené; však tomu není tak; ruda karabinská je bez výminky oolitická, byť by i oolithy byly přerostlé. Sleduje-li se ale sloh takových jednotlivých kusů, z kterých by se mylně o povaze rudních plástů soudit dalo blíže, sezná se, že se štípají ve vrstvičky buď rovné neb sem tam mírně vlnovité ohýbané a že nezdávka se v rudě této celé oolithy menší nebo částky větších zarostlé objevují.

Jestli že se prehlíží veliká síla oolithů, nemožno se vyhnout domněnce, že se zdají převládat oolithy podoby elipsoidů jednosých (povstálých otočením velmi sploštělé elipsy kolem osy kratší) ovšem s povrchem nepravidelným, ohýbaným.

Co do bohatství se tato ruda může postavit po bok nejbohatší z Chrbiny, nebo jest takoruka samočistý kysličník železitý (až na nepatrné plátky vápence, kteréž jsou pro rudu spíše užitečnou než závadnou příměsínou). Potažná váha její to potvrzuje. Tak byla hutnota dvou celistvých haematitů ve vrstvičkách se štípajících, na kterých světlorudý calcit v tenounkých malých plátkách narostl byl a kteréž pocházely z nějakého ohromného oolithu, 4·6422 a 4·4871 určena s 2·61 a 2·06 grammy rudy (prosté všeho vápence).

Aby se stvrdilo, v jakém poměru stojí potažná váha jednotlivých vrstviček, vzaty k pokusu z oolithu velikosti sploštělého vejce, vrstvy nejkrásnější v mohutnosti asi 3 mm., potom z prostřední části mezi středem a krajem a konečně vyřazeno střední jádro vrstviček též asi 2½ mm. v průměru měřící.

|                                                |      |                  |        |
|------------------------------------------------|------|------------------|--------|
| Hutnota krajních vrstev určená množstvím . . . | 2·28 | grammy obnášela: | 4·5612 |
| „ prostřední mísky mezi jádrem a krajem . . .  | 3·24 | „ „              | 4·5319 |
| „ jádra v podobě sploštělé kuličky . . .       | 2·61 | „ „              | 4·3667 |

Opět z toho vysvítá, jako dříve již při vlastní semence pokusy objeveno bylo, že krajní vrstvy oolithů hutnější, tudíž bohatší vnitřních.

Jelikož pak jsou krajní vrstvy velikých oolithů odlehlejší od středu oolithů menších, vysvítá z toho, že kraj převelikých oolithů hutnější kraje oolithů menších, že tedy nebohatší ruda ona s ohromnými oolithy jest, jak tomu i skutečně tak bývá.

Hutnota krajních vrstev oolithu velikosti bobu značného, kterýž pochází z ložiska mezi Svárovskou šachtou IIhou a Iní, jakož i předešlé kousky z obzoru štol Vojtěšské pocházející, jest 4·1716 určená množstvím 45 grammů.

Tato nejbohatší ruda pásma visutého jest uložena v plástech nedosahujících značné mocnosti na Karabinském vrchu v ložisku druhém, mezi štolou Vojtěšskou a šachtou Iní. Též částečně v ložisku třetím jest uložena a ač značně bohatá, nedosahuje nicméně bohatství oné z ložiska druhého.

Některé pláсты doprovázeny bývají na krátko pravou semenkou, kteráž ale složena z oolithů velikosti leného semene až bobu, tedy z oolithů značné velikosti; nebo sestává některý plást zcela ze semenky v kratším neb delším prostranství dle vlaku, která se opět v Karabinsku mění. Zmohutní-li ale ložisko, jako na jednom

místě západně od šachty číslo I., kde zmohutněvší vrstva rudy, se náhle až do mocnosti 4 metrů nadme, tu zmizí úplně bohatá ruda a lože složeno toliko ze semenky.

Nejpamátelnější úkaz však jest v slabých plástech ložiska třetího šachty IVté Svárovské: tu v slabých pruhách černé břidlice s černými oolithy velikosti vikve až hrachu objevují se silnější pláсты semenky velkoolitické, kteréž sem tam velmi veliké oolithy bohaté rudy karabinské vrostlé mívají, není-li celý plást náhle v bohatou karabinku změněn. Tu v bohatých oolithech se objevují zahrnuty i částky semenky s oolithy většími, ba i v samých břidlicích tufových ve směru plástu rudního se objevují veliké oolithy bohaté. Tímto podána možnost k objasnění vývinu ložisek rudních tím způsobem, že v rudonosné břidlici oolithy a základní hmota jako vstříknuty jsou; a že rozhojněním se vrostlých rudních částek změní se břidlice v ložisko rudní. V některých větších oolithech semenky jest uvnitř velké zrno šedozeleňavé břidlice, kteréž toliko slabou vrstvou rudy, složenou z přetenkých misek, obejmuto jest. Obejmutá jalová jádra shodují se úplně s vrostlými zrny zelenavými v břidlicích rudých, kterými tyto jako kropenatými se stávají. V kropenatých břidlicích tedy rudá břidlice prostoupena haematitovou hmotou veskrz, do níž oolithy buď vtroušené neb obalením zelenavých pecek malých vrstvou rudovou utvořené jsou, — a z jalové břidlice tímto způsobem vyvinuto slabé ložisko rudy, s chudou základní hmotou, kteréž v dalším postupu vlaku svého zmohutněti i zbohatnouti může. V mnohých semenkách s velkými oolithy, kteréž by se snad semenkami tvořícími se nebo nedohotovými nazvat mohly, sestává valná část oolithů z jádra břidličnatého, zelenavého, obaleného soustředně se objímajícími tenoučkými vrstvičkami, skládající silnější skořápku rudovou.

Těž v bohaté rudě nalezeny jádra velikosti ořechu i menší, sestávající z celistvého špinavě zelenavého neb hnědavého tufu diabasového, obklopené korou bohaté rudy, tak že z toho oolith velikosti velkého splasklého vlašského ořechu povstal. Hutnota pak jádra zelenavého určená s 86 grammy byla 2·9972.<sup>17)</sup>

Také v břidlicích bílých a zelenavých bývají různě zarostlé kulice sploštěné, sestávající z celistvého chudého haematitu, kteréž nabývajíce velikosti lískového ořechu břidlici zcela vytlačují, když vedle sebe srůstají; jest toto opět počátek tvořícího se plástu rudního v břidlicích, kteréž kuličkami hrbolovitě se stávají.

Sleduje-li se proměna semenky v rudu karabinskou, shledá se, že jakmile v semence se objevující oolithy větší a mnohem větší lněného semene, tyto jsou vždy předchůdci velikých bohatých oolithů, tedy odrůdy karabinské.

2. Opět na jiných místech a to zvláště tam, kde ložisko druhé zeslábne značně, nebo kde ložisko třetí složeno jest z rudy něco bohatší semenky vlastní, vytrácejí se poznenáhla seménka z rudy, až úplně zmizí. Následek toho jest, že se promění semenitá ruda v celistvou rudu, složenou toliko ze základní hmoty. Zmizí-li tato celistvá ruda barvy rudé až hnědorudé, tedy jest příčina toho vrostlá zelenavá hmota sideroxenu, neb zelenavé jalové částky vtroušené v celém plástu rudním v malých zrnkách. Na mnohých místech takové rudy uloženy jsou; však jestli že základní hmota zbřidličnatá ještě mimo to, tož lože rudy pranuzné možno toliko za břidlici pestrá haematitem proniknutou považovat.



Jestli že ale základní hmota sama o sobě uložená plásky vytváří, snad ještě více zhoustne, tož se z ní vyvine dobrá, dosti bohatá ruda celistvá, jak v ložisku třetím západně od šachty Ivé Svárovské uložena jest. Jestli že ale do rudy celistvé přistupují velké oolity bohaté rudy neb menší oolity semenky, tož nebývá to na škodu jakosti rudy.

3. Jsou jistá místa v ložisku třetím, kdež celistvá ruda haematitu jest veskrz proniknuta sideritem; na pohled taková ruda nezdá se být dosti bohatou, však váha její svědčí o hojnosti kovu v ní obsaženého. Takové, sideritem prostoupené rudy však doprovázeny bývají plásky sestávajícími z nečistého sideritu velmi drobnozrnného, barvy šedohnědavé. Slabé plásky sideritové jsou vlastně břidlicemi úplně sideritem proniklými, v nichž část břidličnaté jalové hmoty rudou touto vytlačena jest. Jeden plást sideritové rudy zkoušen obsahoval 50.38 %  $FeO$   $CO_2$ .

Vůbec není to úkazem vzácným v břidlicích tufových, že některé z nich bývají prorostlé slabými pásky rudy buď jednotlivě neb mnohokrát se opakujícími, zároveň dle vrstevnatosti.

Přibýváním čísla jakož i mocnosti pásků proměňují se břidlice v ložiska sideritu, zvláště vedlé ložisek rudy krevelové nebo v proplástkách břidlic mezi plásky rudními.

*Proměna* rud na výchozím není zvláštní; krevele proniknuté sideritem nebo zrny zarostlého sideritu jsou na výchozu toliko částečně v hnědou rudu proměněny, která jako vtroušena jest do rudy červené.

Nuzné semenky barvy rudé nejobyčejněji na výchozím proměněny jsou v limonit, ovšem též nuzný. Oolity, kteréž v rudě jsou nejbohatším zdrojem rudním, proměněny jsou v žlutý polozrnný okr, základní hmota pak buď černavá neb žlutavá jest dle toho, mnoho-li rudy obsahuje; na vzduchu se tyto proměněné žluté semenky snadno drobí.

Jinak se rudy, zvláště jsou-li bohaté na výchozím neproměňují, leda že snad v některé trhlince jsou potaženy slabým povlakem zrnitého limonitu a že nejsou tak pevné jako v hloubce, kde se dobývají.

**Přehled.** Ložiska rudy uložena v břidlicích tufových a tyto opět v ohromném loži nebo pásnu mandlovců neb tufů diabasových, s kterými pohnatými přechody úzce spojeny jsou. Lože mandlovců, kteréž v obvodu našem jedině a výhradně v pásmě  $d_1$  rudonosné jsou, nezaujímají v tomto nejnižším pásmu žádného určitého místa ve směru kolmém. Nejmnocněji vyvinuté pásmo, v kterémž všechny báňské práce zaraženy jsou, leží buď na křemencích (pískovcích) nebo na pouhých azoických břidlicích. Nad ním následuje opět lože mandlovce v břidlicích černých, kteréž co do složení tufů i rudy od pásma ležatých mandlovců se nerozeznává. Následují sice ještě vysutější mandlovce v pásmu  $d_2$ , tyto ale posud co bezrudé se seznaly. Z toho vidno, že mandlovce ve směru kolmém následují nad sebou v horninách přerostlých, tedy v žádném určitém obzoru.

V mandlovcích uložené břidlice rudonosné opět nezaujímají určité pásmo, ale spoň tak jest v loži ležatého mandlovce, an visutý méně proskoumán byl. Nejstáleji ještě jeví se břidlice, spodek ohromného lože mandlovců skládající, an tato po celém vlaku mandlovců, ač v rozličné a místy takřka převelmi nepatrné mohutnosti, předece všude objevena byla. Pásma visutých břidlic nejsou v jediném obzoru

a neznámo ani mnoho-li jich je, jelikož nejsou tak daleko sledovány. Mohutnost břidličnatých pásem jakož i odlehlost jich od sebe jest od mocnosti celého pásma mandlovců zcela neodvislá; totiž každé mění se zvlášť, aniž by se jistý poměr této proměny ustanoviti mohl.

Jako pásma břidlic tak i ložiska v nich obsažených rud nenaznačují určitě jediný a jistý obzor. Nejstáleji se toto jeví opět u ložiska ležatého nebo prvního, ačkoliv i zde s určitostí nelze říci, že ložiska daleko od sebe odlehlá, jsou tatáž, dokud to dolovou prací dokázáno není; však nejsou-li ložiska na rozličných místech co ložiska prvá pojmenovaná totožná, tož alespoň leží v obzorech velmi sblížených. Ložiska visutého pásma neb pásem břidlic snad též nejsou na všech místech totožná; nebo na mnohých místech složeny z plástů mnohých, od sebe proplástky dělených, v jisté části rudonosných břidlic jest některý plást v mocném ložisku vyvinut, ostatní buď s ním spojené neb zcela vytracené jsou; na jiném místě opět jiný plást zmohtněvší tvoří ložisko, an předešlý třeba úplně se vytratil; opět na jiném místě zmohtněl plást nově vyskytnuvší se, kteréhož na obou předešlých místech ani nebylo: patrně z toho, že ložiska na rozličných místech objevená, ač třeba v podobném obzoru uložená, nemožno za totožná mít, dokud důkaz toho nepodán prací báňskou, an na mnohých místech shledáno, že ložiska vytrácejí se zcela a opět na jiných místech jiná vznikají, buď v přiblíženě téže, neb jiné kolmé vzdálenosti, než bylo prvotní vytrativší se ložisko. Ložiska jsou tedy toliko velmi táhlé vrstvy, uložené sice v břidlicích ale ne vždy v tomtéž obzoru.

Mohutnost ložisek rudních není v žádném poměru s mohutností břidlic, v kterých uložena jsou. Tak jest ložisko první, ač mimo ně ještě dvě slabounká ložiska z táhlých čoček složená se objevují, u šachty Ivé Svárovské uloženo v mocnosti až 2 decimetrů v břidlicích asi 20 metrů mocných; v blízkém sousedství u šachty IIIItí jest ložisko totéž, aneb alespoň podobné 7–8 decimetrů mocné, uloženo v břidlicích, ani zcela 8 metrů mocných, u šachty Jezovčinské IIhé, však totéž ložisko 1 metr mocné toliko v břidlicích asi 3 metry mocných leží, v Chrbinské štole ložisko Ivé asi 2 metry mocné vloženo do břidlic 4 metry mocných, v nichž i jeho mohutnost již zahrnuta jest. —

Též od mohutnosti celého pásma mandlovcového mocnost ložisek jest neodvislá. Neboť ve visutém pásmu mandlovců, uložených v černé břidlici v Chrbíně jest celé pásmo asi 10 metrů mocné, rudy v něm obsaženo ale v ložisku asi 3 metry mocném. V ležatém hlavním pásmu mandlovců jest pak u Svárovské štolý mohutnost jeho mnohem vyšší 120 metrů a mocnost všech tří ložisek dohromady neobnáší ani 1 metr. V Chrbinské štole jest mohutnost celého pásma v jednom místě asi 30 metrů a mocnost v něm obsaženého ložiska prvního (neberouc ohled na ložisko druhé a třetí, jichž mocnost dohromady asi  $\frac{2}{3}$  metru) jest více 2 metrů. U Libčova neobnáší mohutnost mandlovců zajisté ani 80 m. a visuté ložisko jest v těchto místech asi 20 m. mocné, kdežto ležaté zcela chybí aneb toliko v krátkých slabých shlukách jen místy se objevuje. S mohutností pásma mandlovců tedy nepřibývá mohutnosti ložisek, an právě opačné příklady toho známy jsou: přibývá-li mohutnosti ložisku jednomu, nevysvítá z toho ještě, že i druhému jí přibývat může. Neboť jak jednotlivá ložiska mezi sebou, tak i v porovnání s celým pásmem mandlovců vyvinují se samy o sobě v neurčitém poměru.

Že tato neurčitost, zvláště co se týče obzorů ložisek rudních, možná jest, tím snadněji pochopitelné, pováží-li se, na jak rozmanitý způsob se z jalové břidlice může plást rudní vyvinout nebo naopak zjalovět.

V jalové břidlici poukazují vrostlé částky sideroxenu neb snad delessitu vždy na možnost, že se může rudní ložisko v břidlicích objevit; však v rudě samé-li Sideroxen vrostlý jest v drobttech, což to znamením znuzující se neb již znuzené rudy; v bohatých rudách drobtty zarostlého nerostu tohoto úplně se pohřešují.

Skameněliny toliko na spodní hranici pásma mandlovců a ve vrchní hranici pásma pískovcového se objevují: počet druhů skamenělých je velice nepatrný, an celkem posud toliko čtyry druhy objeveny jsou.

### **Nerosty pro pásma $d_1$ rudonosných mandlovců významné.**

Toto pásmo jest jak náleží svými vlastními nerosty zvláštního rázu vyznačeno, kteréž mimo ně nikde se v tom způsobu neobjevují, tak že z pouhého pohledu některého z významnějších nerostů nejen možno poznat, že vůbec tomu pásmu přináležejí, ale mnohdy též kterému členu pásma.

#### **Nerosty v ložiskách rudních vtroušené.**

V první řadě jsou ovšem rudy samé, kteréž jsou:

**Haematitem**, buď celistvým a železovci více méně podobným, též pravým lesklým železovcem veskrz křemenem prostoupeným a potom oolithickým, buď hrubě nebo jemně semenkovitým. Že seménka jsou nejbohatší částí oolithických rud a že základní hmota v složení svém měnívá a do nuzné rudy proměnlivá jest, již nahoře šfřeji vypsáno.

**Siderit**, kterýž sám o sobě rudní plásky tvoří aneb jemně nebo v zrnkách v haematitu vrostlý jest.

**Chamoisit** tak zvaný, skládá černé malé oolithy v rudách šedých.

**Limonit** toliko na výchozím vtroušen co zrnka po sideritu, nebo v semenkách po černých oolithech místa zaujímá.

Kromě těchto, rudu skládajících nerostů, ještě následující jsou zarostlé v rudě:

**Haematit** co lesklá železná ruda jest buď co slída železná barvy višňové v skulinkách bohatého plástu ložiska prvního narostlá nebo nakupená, buď v přejemném rozptýlení zároveň činí, že šedivílové tufové břidlice jsou železnatými. V ložisku třetím, západně od šachty Svárovské Ivé, objevují se táhlé skuliny výrazným tyčinkovitým a polozemitým křemenem slabě pokryté; kde taková místa se nalézají, jsou do rudy šedorudé nepravidelné proužky až na prst široké barvy železné, lesku velmi silného, vrostlé, kteréž sestávající z železovce, sloh hrubozrnný až šupinatý objevují, an se ze samých šupin železovce nedokonale vyhraněného skládají. Toliko na příhodnějších místech, kde jen málo šupin průměru až malé vikve vrostlo jest, pozoruje se různé šestiboká podoba  $OR. \propto R.$  s velmi lesklou plochou ukončující. Vryp šupin vesměs světle rudý jako jiného haematitu.

V tomtéž ložisku objevují se též drůzy pokryté krystaly klenčovitými, velikosti přeznačného hrachu, kteréž jsou složeny z drobnozrnného haematitu barvy rudé,

v němž supiny železovce dosti značné velikosti vtroušeny jsou. Krystaly klenčové jsou pseudomorphosy po sideritu, ložisko v jisté části své tedy celé ze sideritu proměněné, nebo siderit v hlubším obzoru je ještě neporušen skládá.

**O Calcitu**, kterýž tenounké plátky barvy světlorudé mezi vrstvičkami velkých oolithů rudy karabinské skládá, již nahoře pojednáno a ještě později řeč bude.

**Sideroxen** toliko v nuzných rudách v zrnech barvy trávové a pistacové zarostlý jest; jsou-li bělozelené kousky vedlé něho vtroušené též tím čím kousky zelené, aneb toliko břidlicí, zeleným nerostem silně prostoupenou, není povědomo.

Křemen a baryt též v zrnkách a křafoučkých žilkách zarostlé bývají do haematitu ložiska spodního, nejsou ale vtroušenými nerosty, ač se jimi býti zdají, nýbrž jsou slohu žilového. Toliko:

**křemen** který proniká úplně železovcovou rudu, skládá se v směsici s ní zároveň ložisko rudní (spodní plást ložiska 1ého), náleží mezi tyto nerosty.


Co o úkazu velepamátném dlužno ještě se zde zmínit, totiž o skrytěkrystalinické odrůdě křemenu, kteráž se *flinc* nebo křesavému kamenu podobá. V hruboolithické rudě karabinské vyskytují se některé oolithy stlačené, mírně oblé na povrchu, velikosti značného lískového ořechu. Rozbijou-li se kuličky tyto objeví se v nich zvláštní sloh.

Nejkrajnější vrstva skládá se z vrstvičky asi 1 mm. i méně mocné, sestávající z haematitu rudého, soustředně miskovitě složeného; ostatek, zaobalený rudní vrstvičkou, jest složen z velkého množství slabých vrstviček barvy šedavé, bělošedé, bílé, šedorudé a šedé, různě se střídajících a tudíž patrně znalých. V několika málo kuličkách nalezených byl bod, kolem kterého vrstvičky soustředně uloženy jsou, velmi výstřední, tak že jedna a tatáž vrstvička rozličnou hrubost má dle toho, v které části kuličky se objevuje. Lom celistvý jest nerovný a silně natrhaný; střípky jsou velice ostrohranné a tvrdosti křemenu. Podaří-li se rozštípnout vrstvičky dle miskovitě složení, tedy se na některých objevuje slabý nádech haematitu. Fling zdá se být částečně též sideritem proniknutý, nebo má hutnost 2.9688 (určena s 1.10 grammy); ve vodě vyvíjí množství malých bublinek vzduchu ze sebe. Fling by byl tedy zvláštní druh skrytévýhraněného křemenu slohu oolithického.

Však co vlastně nej památnějším jest na celém nerostu, jest to, že povrch kuličky, odkryje-li se vrstvička haematitu, jest přejemně tečkován obr. 3; zvětší-li se tečky, sestávají z podob táhlým krůpějím se rovnajících v řadě sestavených; i když jest toto význačné tečkování setřeno, objevuje se předce jiné mnohem nepatrněji vyznačené, sestávající z teček zárovných v jiném směru. Pan Barrande seznal v tečkách zde vyobrazených zbytky komůrek bryozoů, což pro tak hluboký obzor geognostický v  $d_1$ , zajisté velepamátným úkazem jest.

Co zvláštnost v ohledu hutním spracování rud velice prospěšnou možno uvést, že v ložiskách není objeven žádný pyrit vtroušený.

Obr. 3.



Jemně tečkováný povrch zvětšený dvakrát vedle sebe na kuličkách křemenu z ložiska rudy karabinské.

## Nerosty v žilách a narostlé se objevující.

### *Nerosty v menších žilkách.*

**Haematit** se objevuje co slabounký nádech barvy višňové, lesku mdlého jako aksamit, velmi hojně na všech plochách lomem povstalých v některé rudě ložiska prvního plástu spodního bohatého. Kdekoliv nádech se v slabounkou vrstvičku barvy višňové promění, pozoruje se, že sestává na povrchu z pramaličkových lesklých plošek, kteréž majíce tvar klenčový, jsou *pseudomorphosami haematitu po sideritu*.

Některé celistvé kusy haematitu barvy železné v ložisku prvním objevují se co pseudomorphosy po krystalech sideritu, jež někdy ještě co značné klenče délky hran až 1 centimetr vynikají, proměněny jsouce ovšem v celistvý haematit.

Všecky tyto odrůdy haematitu toliko z Chrbiny a Jezovčina pocházejí.

V Karahinské rudě se objevuje mimo mezi vrstvičkami oolitů též *Calcit* barvy světlorudé v malých puklinkách, jakož i v žilkách, kteréž co drůzy trhlínky potahují. Plátky světlorudé tenounké nebývají vyhraněny, ač se na nich sloh krystallinický patrně objevuje, jakož i štípatelnost vápence. Barva pochází od přejemně v nich rozptýleného haematitu, což i potažnou váhou 2·7139 určenou s 48 grammy, kteráž něco málo vyšší jest bílého calcitu, se jeví. Drůzy vápence, sestávající z krystalů —  $\frac{1}{2}$  R těsně srostlých, ke kterým od plátku s nevyvinutými krystaly nepřetržené přechody se sledují, bývají buď velmi slabě do narudla zbarveny nebo jsou průzračny, číře slabounce nahnědlé.

### *Nerosty v žilách zarostlé.*

V žilách zarostlé nerosty tvoří dle způsobu svého vzniku zvláštní řadu významnou poměrným stářím členů nerostů, z kterých se skládá.

Žíly, kteréž jsou v obvodu celého pásma velmi hojny, an rozsedliny nebo vržení ložiska posouvající skládají, jsou velice rozmanité, tak jako vůbec žíly rudní. Žíly jsou povstale trhlíny skalní, duté neb vyplněné, dle kterýchž převelmi často (takřka pravidlem se říci může, že vždy) trhlé části skal se pošinuly; pošinutí, měřené vodorovnou odlehlostí k sobě přináležejících odtrhých částí jest buď velmi nepatrné aneb velmi značné, dosahující míry i větší 200 metrů. Mezi nepatrnými a značnými vrženími jsou všechny ostatní obsaženy. Délka vržení nezáleží od mohutnosti žíly neb vržení samého; často slabé žíly vrhají tak daleko nebo i dále než žíly silné. Mocnost žil jest toliko odvislá od pevnosti skály trhlé a od způsobu vržení. Žíly, v skalách kyprých, povolných, jsou tenké a úplně vyplněné, žíly v skalách pevných též tenké, bývají však často duté; v skalách pevných, však povolných, jsou nejsilnější. Kdekoliv tedy žíly přecházejí z jednoho pásma hornin do jiného, mění se povaha jejich. Tak jsou žíly sledovány z azoických břidlic pásma B skrze křemence a pískovce, mandlovce a břidlice černé pásma  $d_1$ . V pásmě B jsou žíly vyplněny slabou žilkou roztráštěnou a částečně v jílu proměněné břidlice drobové neb hlinité, v pískovcích jsou žíly ač nevelmi mocné, přece velmi dobře naznačeny; v pásmu mandlovců pak žíly zmohutní nezdědky značně, byť by byly v ostatních tvrdších horninách sebe slaběji naznačeny bývaly a opět ztenčují se velmi v černých visutých břidlicích. Kdekoliv každá stěna nebo bok vržení sestávají z rozlič-

ných hornin, jsou též rozličně vyznačeny; tu opět bývají nejmocnější ony žíly, kterýchž jeden bok z mandlovců se skládá.

Nejpamátelnější jest zajisté proměna mandlovců v žilách:

Vrzení v mandlovcích jsou žilky mocnosti prstu až celého dosahu rukou, složeny z měkce rozdrčených polohlinitých bílých mandlovců, byť by stěny z jakkoliv barvených tufů se skládaly, nebo valná část rozdrčených mandlovců změkne zjilovatě a zbělí v rozsedlinách. Některé žíly, zvláště slabší, úplně vyplněny jsou bílou jilovatou horninou valchovému jílu zcela se rovnající. V mocnějších žilách tvoří valchový jíl buď okraj žíly, tedy obrubu její, nebo jest vnitř nepravidelně v značnějších částkách vtroušen. Též bývají stěny žil proměněny v bělavý mandlovec, zvláště ale kolem menších odžilek, kteréž od každé větší žíly i od samých odžilek opět vybíhají. Kolem značných vrzení jsou všechny stěny menšími odžilkami veskrz natrhány. Povolné tufy a břidlice tufové jsou veskrz vyplněny rozdrčeným, obyčejně bělavým tufem a valchovým jílem, s kterým se tvrdší úlomky břidlic, tufů, rudy pískovců dle místa, v kterémž žíla tažena jest, objevují. V tvrdších tufech, jakož i v tvrdší rudě, kterou rozsedliny rozštěpují, nabývá žíla rázu obmezenějšího a ostřejšího, an tvrdší stěny rudy pevné neb tufů méně se porušují, tudíž ostřeji odtrženy jsou než tufy povolné a zkyprující se. Tolikéž odžilky protínající pevnější tufy, zvláště ony, kteréž dolomitem neb vápencem stvrdlé jsou, jakož i rudu tvrdou kolem hlavního vrzení, jsou ostře vyznačeny a nezdědky ještě poloduty.

V žilách prostupujících mandlovce a křemence jsou vtroušené tvrdší břidlice protrhané v převládajících bílých jemných tufech obr. 4: V těchto protrhaných břidlicích nebo v puklinách v tvrdé rudě, neb tufech tvrdých, neb křemencích odžilkami prostoupených jest hlavní zřídlo, v kterémž drůzy krystalů narostlých skryty jsou; v bílých tufech pak žil zarostlé vyskytují se jiné nerosty buď různě, buď žíly v tufu tvořící, buď v závalkách vytvořeného v žilách dolomitu. Obyčejně jsou žíly toliko jalové, v břidlicích pak, jak azoických tak i černých visutých jsou zcela jalové, tak že rudonosnost žil toliko na pásmo mandlovců a křemenců obmezena jest a tu opět jen na některých místech příhodnějších. Že se žíly toliko ze samotné rudy neb jiných nerostů skládají, jest mnohem vzácnější případu, kde žíly jalové jsou. Slabé žíly a odžilky bývají bohatší mocných, ač i tu mezi velkým množstvím žil jalových jsou některé pamětihodné, zvláště jedna několik kroků východně od Svárovské šachty druhé, kteráž k severojihu směřuje.<sup>18)</sup>

Všecky žíly jsou vyznačeny jistými nerosty, kteréž dle způsobu povstání svého řadu tvoří, až na menší žíly, o kterých pro nedostatečné vyvinutí nerostů to nemožno soudit, a na jednu, kteráž se zdá odchylovat od ostatních.

Tato jedna žíla zvláštní proráží tufy pásma rudonosného v Libečově, kdež

Obr. 4.



Žíla (vrzení) rudná prostupující vrstvy tufů slabě čárkovaných, jakož i odžilky její; průřez kolmý.

Černé čáry a tečky v žíle jsou pyrit; tečky čárkované jsou závalky okolní horniny pevnější, zahrnuté v bílé, jalové, polohlinité hornině žílu vyplňující.

kutní štolou předělána byla; možná, že se i s ostatními žilami srovnat dá, kterýmž se vůbec podobá. Nerosty, z kterýchž se skládá, jsou následující:

**Ankerit**; kdekoli jej vidět, potahuje tento nerost bezprostředně stěny drobnozrnitého šedozelenavého neb dolomitického hnědavého neb žlutohnědého kypřého tufu diabasového ve vrstvičkách 1 až 5 millimetrů mocných. Povrch vrstviček krystálky —  $\frac{1}{2}$  R., nanejvýše 2 mm. dlouhými, pokryt; barva jejich bělavá průsvitavá, lom krystalinický, plochy štěpné slabě perlově lesklé. Blížíší udaje o ankeritu ještě následovat budou.

**Baryt** tvoří hlavní část žíly až 3 decimetry mocné, an buď na ankerit nebo na tufové stěny přirostlý jest. Z žíly možno vysekat velké těžké kusy co by člověk sotva unesl, kteréž jsou barvy bělavé, lesklé, průsvitavé a velmi hrubě krystalinické; vyhraněných štěpných rovných ploch nezřídka pozorovat v rozsáhlosti 2—3 čtverečných centimetrů.

Potažná váha odrůdy v bělavých průsvitavých štěpných kusech, určena s 6.69 grammy, jest 4.4391, jiné odrůdy bílé trochu méně průsvitavé předešlé, též v štěpných kouskách 4.4359, určeny množstvím 7.58 grammy. V kyselině chlorovodíkové vyvařen, při čemž se nepatrně bublinek vyvíjí, rozpouští se z něho nepatrně množství  $CaO\ CO_2$ ,  $MgO\ CO_2$ , a což zvlášť památné jest, též pramalé částky  $BaO\ CO_2$ , nebo roztok zakalil se za čas, siranem vápenatým přidaným, značně. Baryt tudíž mimo dolomitem též přenepatrným množstvím uhličitánu bárnatého, tedy witheritem prostoupen jest. Potažná váha vylouhovaného barytu prvního jest 4.4595 (určena 3.39 grammy), druhého pak, z kteréhož kyselinou solnou 1.83% látky, nepočítaje v to kyselinu uhličitou, vylouhováno bylo, jest 4.4444 (určena s 7.55 grammy).

V jiné odrůdě velmi hrubokrystalinické, taktéž bělavé, průhledné, v menších kouskách, určeny v množství 2.05 grammů některé uhličitany (Jičínský), a sice obsahoval baryt v roztoku kyseliny solné

$$\left. \begin{array}{l} BaO\ CO_2 \\ SrO\ CO_2 \\ CaO\ CO_2 \\ Fe_2\ O_3 \end{array} \right\} = \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ .38\% \\ .45\% \end{array} \%$$

V dutých prostorách, kteréž po různu v žíle barytové se objevují, jest baryt vyhraněn v krystalech malých až dosti značných hranolovitých, z nichž největší jsou rozměrů až 8, 4 a 6 millimetrů. Ač se porůznu povrch barytu krystaly poset objevuje, jsou přece drůzy krystalů zároveň srostlých hojnější předešlých. Zároveň srostlé krystaly lesknou se v jistých směrech toliko na stejných plochách na jednou. Tu jediná velká štěpná plocha z hrubozrného barytu  $\infty \tilde{P}\infty$  se dá sledovat nepřetrženě do menších, zároveň srostlých krystalů, tak že soudit lze, že i velké štěpné plochy hrubokrystalinického barytu žíly pocházejí ze součtu štěpných ploch zároveň srostlých menších jednotníků složený jsou.

Spojky pozorovány jsou následující, vezme-li se za základ postavení krystalů dle Naumanna a jeho známky, při čemž štipatelnost naznačena plochami  $\infty \tilde{P}\alpha$  a  $\tilde{P}\infty$ :

$$\tilde{P}\infty. \infty \tilde{P}\infty. \tilde{P}\infty. P,$$

$\tilde{P}\infty. \infty \tilde{P}\infty. \infty \tilde{I}2. \tilde{P}\infty. \tilde{I}2. P$ . Hrany hranole  $\tilde{P}\infty$ , jehlanců  $\tilde{P}2$  a  $P$  zároveň jsou hlavnímu průřezu delší průsečnice.

$\bar{P}\infty. \infty \bar{P}2. \infty \bar{P}\infty. \bar{P}\infty. P. 3\bar{P}3. 2\bar{P}2.$  Hrany  $P\infty; \infty \bar{P}\infty, P; 2\bar{P}2, 3\bar{P}3$  zároveň k hlavnímu průřezu kratší průsečnice; hrany  $\infty \bar{P}2, 2\bar{P}2$  vodorovné.

Nejspojitéjší jest pak tato kombinace:

$\bar{P}\infty. \infty \bar{P}2. P. 2\bar{P}2. 3\bar{P}3. \bar{P}\infty. oP. \infty \bar{P}\infty. \bar{P}2., \infty \bar{P}3.$

Hrany  $\infty \bar{P}2$  a  $2\bar{P}2$ , potom  $\infty \bar{P}3$  a  $3\bar{P}3$  jsou vodorovné. Tato spojka jest tím památnější, že se na ní vyskytuje  $\infty \bar{P}3$  vedlé obyčejného hranolu přímého  $\infty \bar{P}2$  osamotněle, což se na tisících prohlídnutých krystalů, o kterých později pojednáno bude, nikde neobjevilo, (an toliko  $\infty \bar{P}4$  osamotněle se objevující jest;  $\infty \bar{P}3$  pak bez předešlého ostřejšího hranolu samo o sobě nikdy se neobjevuje).

Všecky plochy jsou velmi lesklé a rovné, nejsou-li potaženy právě slabounkým nádechem žlutohnědého limonitu. Toliko plocha  $P\infty$  bývá slabounce rýhovaná zároveň s hranami mezi  $\bar{P}\infty$  a  $\infty \bar{P}\infty$  povstalými, jen někdy sesiluje se rýhování trochu více vedlé těchto hran.

**Cinabarit** jest co vzácnost v pramaličkých zrnčkách barvy karmoasinové vstříknut v barytu čirém, šedavém.

**Pyrit** jest krásně vyhraněn a na drůzách barytových krystalů narostlý v krystalech velmi lesklých, ostrohranných, rovnoplochých, délky hrany krychlové  $\infty O\infty$  1 až 10 i více millimetrův; větší krystaly nejsou tak dokonale rovnoploché jako malé.

Nebo složeny jsou krychle délky hrany až 1 cm. ze samých malých krychlových špalíček srostlých, kterýmiž jako nedostavené se objevují. Také v tvarech  $\infty O\infty.O$  vyskytují se až 1 cm. velké krychle se značně vyvinutými plochami osmistěnu. Plochy jsou dosti rovné a jen leckdes jako špalíčky krychlovými vykládané.

Nezřídka potaženy jsou pyrity slabým nádechem žlutohnědého okru.

**Calcit** vytváří buď sám o sobě slabé žfly v hnědavém dolomitickém tufu, nebo pokrývá ankerit, neb v drůzách krystalových nebo i skupinách krystalů na barytu jakož i pyritu narostlý se objevuje.

Vyhraněn jest calcit v bělavých neb slabě nažloutlých průhledných klenčích —  $\frac{1}{2} R$ , velikosti čočky i z větších slabounce zaokrouhlených, neb z menších krystálků složených; vápenec jest na lomu zrnitý s leskem velmi slabě perlovým na štěpných plochách.

Zběžná a neúplná analyza calcitu při 100° C. sušeného jest (Diviš):

|                    |          |                                |
|--------------------|----------|--------------------------------|
| Nerozpustný zbytek | 2.50     | Calcit tedy obsahuje sblíženě: |
| $CaO$              | 39.65    | $CaO \ CO_2 = 70.81 \%$        |
| $MgO$              | 10.10    | $MgO \ CO_2 = 21.21 \%$        |
| $KO, NaO$          | 3.52     |                                |
| $Fe_2O_3$          | 2.06     |                                |
| $FeO$              |          |                                |
| $Al_2O_3$          | 1.02     |                                |
| $CO_2$             | 42.07    |                                |
| $HO$               | neurčena |                                |
|                    | 100.83   |                                |

Vápenec jest tudíž dolomitickým, jak se z pouhého pohledu soudit dá dle slabého perlového lesku ploch štěpných.



Těž leckdes bývá slabým hnědavým nádechem limonitu pokryt, který tudíž vesměs nerosty potahuje.

Sestaví-li se dle toho řada nerostů žílu Libečovskou skládající, obdrží se následující přehled nerostů, jak dle stářívého v žíle vyvinuty jsou počínaje nejstarším a konče nejmladším :

1. ankerit,
2. baryt, zároveň s ním též cinabarit,
3. pyrit,
4. calcit,
5. limonit, toliko co tenounký povlak.

Všecky ostatní žíly a odžilký, kteréž ložiska a celé souvrství pošínují a protrhují, zdají se býti co do útvaru nerostového velmi podobné. Následující pak nerosty buď v mocných žilách neb slabounkých se objevují:

**Ankerit** zdá se být nejstarším všech a objevuje se asi v následujících odrůdách.

Malé žilký neb pukliny v tvrdé rudě nebo v bílých, šedorudých a jiných tvrdších mandlovcích, neb i křemence roztrhané žilkami pokryty bývají slabou vrstvičkou toliko asi 1 až 3 millimetry mocnou, kteráž se skládá z bělostných krystalů v drůzy spojených nebo též různě narostlých a toliko se dotýkajících tvaru *R*, délky hran 1 až 2½ millimetrů. Krystálky lesklé jsou buď rovné hladké, aneb velmi slabounce sedlovitě ohnuté; na plochách toliko při zvětšení jich pozoruje se, že hrboulky narostlými srůst z menších klenčů nedokonale naznačen jest.

Krystálky bílé, lesklé slabě perlově, průsvitavé, až 3 mm. dlouhých hran, narostlé na bílém tufu diabasovém z Chrbinské štoly, na kterých krystaly barytu narostlé bývají, měly hutnoty 3·0081 určené 1·40 grammy.

K porovnání určená hutnota ankeritu z Hory jedové u Komárova s krystaly nepatrně většími předešlých, barvy slabě nahnědlé, na kterých též krystaly barytu narostlé bývají, obnáší 3·0568 množstvím 1·48 gr. nalezena.

Jelikož ale, jak ankerit z Chrbiny, tak i onen z Jedové hory zůstavily po sobě baryt nerozpustný v kyselinách, a sice: z Chrbiny a z Jedové hory nerozpustný zbytek barytu v ankeritu obnášel :

2·17% 2·24%

tedy ohnáší potažná váha nerostu „čistého“ opravena, vezme-li se hutnota barytu 4·45 za základ opravy :

2·9773 3·0247

Čistý ankerit, kterýž by byl úplně rozpustný v kyselinách, obsahoval by  $FeO\ CO_2$

24·01% 29·27%

jak s každým z obou pokus učiněn.

Malé krystaly lesklé průhledné, narostlé na rudě spodního ložiska (1.) v šachtě Svárovské III., na kterých nebyl baryt narostlý, smíšeny byly s krystaly bělostnými lesklými z Chrbinské štoly, na kterých chalkopyrit a baryt narostlý bývá; poměr množství krystalů prvých k posledním byl ¾; potažná váha určena 30 grammy a nalezena 3·0160.

Drůzy krystalů na vzduchu nabíhají do hnědava zprvu toliko na povrchu svém, později též uvnitř až do jisté nepatrné hloubky.

V některých žilách pokrývá ankerit značnější část stěn, ba krystálky narůstají na sebe a tvoří plátky 1 až 2 mm. mocné, kteréž jako síť se protkávají ponechávající dutin mezi sebou, v nichž malé krystaly barytu narostlé bývají. Skuliny toliko

v prostředku žil se objevují, na stěnách splývají krystaly do krystalinické hmoty. Též tento ankerit žlutne na vzduchu a ve vlhku, někdy již v žilách samých.

Tenčí žíly až do mocnosti 2 i 3 centimetrů bývají leckdys zcela vyplněny ankeritem bílým a dosti hrubozrným, štípatelným v rovných lesklých klenčích maličkých. Zvlášť v Chrbinské štole jsou slabší žíly v rudě neb tufech úplně vyplněny ankeritem.

Ankerit z žíly ze štolý Chrbinské měl potažné váhy 2·9713 neb 2·9614; zarostlá byla žíla bílého nerostu v rudých tufových břidlicích visutých nad ložiskem prvním. Zkoušen na množství obsaženého v něm uhličitanu železnatého, obsahoval  $FeO\ CO_2 = 20·01\%$ .

Jiný ankerit z žíly v rudých tufech zrnitých Chrbinské štolý v mocnosti 2 centimetrů zarostlý, měl potažnou váhu určenou 3·66 grammy 3·1024.

Žíla rozbitá dělila se v bílé štěpné kousky tvarů klenčových s plochami lesklými; ačkoliv plochy se neleskly jako zrcadlo, přece možno bylo je měřit odrazným goniometrem Wollastonovým, an předměty v plochách slabého obrazu poskytovaly. Úklon měřen opětovaně 8krát, 17krát a 21krát po sobě, což se vyrovná číslu  $36 + 153 + 231 = 420$  naznačujícímu, že tímto opětovaným měřením docíleno tolik, jako by úklon byl býval měřen 420krát po sobě, vždy ale jednoduše.

Úklon ploch klenče štípáním povstaleho určen měřením  $105^{\circ} 59' 17''$  s možnou chybou  $\pm 1' 05''$ .

Lučební rozbor štěpných kousků vybraných každý z jiné částky žíly jest:

a (Vilém Kautský) b (Jos. Burger) c (Otomar Čížimský).

| Vzato látky k analysi                |       | 1·00 gr. | 1·40 gr. |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|
| Nerost sušený při 100° C. vydal vody |       | ·41      |          |
| Nerozpustný zbytek                   | ·67   | ·89      |          |
| $Al_2O_3$                            | 3·13  | ·62      | 1·46     |
| $Fe_2O_3$                            | ·25   | ·26      | ·76      |
| $FeO$                                | 18·78 | 19·00    | 19·25    |
| $CaO$                                | 23·06 | 23·05    | 21·47    |
| $MgO$                                | 9·64  | 9·16     |          |
| $CO_2$                               | 42·85 | 43·85    | 43·00    |
| $HO$                                 | 1·05  | 1·25     |          |
| $SO_3$                               | ·46   | sledy    | ·28      |
| $PO_5$                               | 0     | sledy    |          |
|                                      | 99·89 | 98·08    |          |

Jinak se skládá ankerit též z:

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| $CaO\ CO_2$ | 41·14 % | 41·13 % | 38·01 % |
| $MgO\ CO_2$ | 20·24 " | 19·24 " |         |
| $FeO\ CO_2$ | 30·26 " | 30·61 " | 31·01 % |
|             | 91·64 % | 90·98 % |         |

Pamětihodné zajisté jest to, že obsahuje ankerit tento méně uhličitanu vápenatého než jiné ankerity, a že kyseliny nalezeno rozbořem vesměs více než zásady pojmuti mohou.

Pro poznání ankeritu uvádí Schrötter to, že nerost slabě žřhaný s praskotem v prášek se rozpadává (Baumgartner, Zeitschrift für Physik. Bd. VIII., p. 1—7.

a touto vlastností od jiných nerostů snadno rozeznává. Luboldt potvrdil toto pro ankerit silurský z Lobensteinu, kde též žíly skládá v sideritu uloženém mezi drobnými břidlicemi a diabasem (Poggendorf Annalen Bd. 102. 1857 p. 455). Však náš nerost z žil ač s praskotem při počínajícím žhání slabém v menší kousky se rozštěpuje, v prášek se nerozpadává.

Ankerit tento vůbec popsáný jest s barytem, jehož krystaly na něm velmi obvykle narostlé bývají v jakési vzájemnosti; však se též velice drobnokrystalinický nerost, ač toliko zřídka, objevuje, kterýž jsa mladší barytu, jak ankeritové klenče, tak i barytové krystaly v přetenké vrstvičce, na povrchu nepatrnými krystálky drůznaté, potahuje. Že pak i tento ankerit bělavý a průhledný na vzduchu po delší době přihnědne, odráží se slabounké pokožky jeho od čirých až bělavých barytů jimi pokrytých barvou svou ostřeji, než když zcela neporušeny jsou.

Na ankeritu množství nerostů narostlých objevuje se; mezi všemi nejvýznamnější baryt, mimo něj pramalounké krystálky chalkopyritu a pyritu, též calcitové krystaly na něm vrostlé bývají.

**Calcit** se vyskytuje v žilách krátkých tenkých, až na několik prstů mocných, v tufech diabasových obvykle zrnitých; žíly štípají se v kusy převelmi hrubozrné čiré neb průhledné bělavé.

V některých žilách jest bělavý průsvitavý až poloprůzračný bělavý calcit narostlý na tenounké vrstvičce ankeritu v krystalech značnějších, těsně srostlých, tvaru —  $\frac{1}{2}R. \infty R.$ <sup>19)</sup> Krystaly jsou lesklé a kosočtverečné plochy klenče dle nakloněné průsečnice přehluoce zbrázděny. Na krystalech pak vápencových narostlý baryt čirý v menších krystalech lesklých.

V některých rozsedlinkách Chrbinské štoly jsou holé stěny, jakož i krystaly barytu na nich prostě narostlého pokryty asi 1 mm. mocnou korou bělavého vápence na povrchu drůznatého, ze samých malých krystálků —  $\frac{1}{2}R$  povrchu šedého, až přisedlého, sestávajících.

**Dolomit** objevuje se obecně v žilách buď slabších, kteréž zcela vyplňuje, neb v žilových rozmělněných tufech, velké závalky tvoře, leckdes vtroušen jest. Barva celistvého dolomitu v žilách zarostlého jest hnědavá až hnědavě rudá, zajisté od krevele v něm jemně vtroušeného. V dolomitu jest pyrit v žilách aneb v krystalech zarostlý hojný.

Krystalisovaný dolomit jest méně hojný celistvého; on se objevuje v žilách bezprostředně na křemenu narostlý v krystálkách  $+ R$  lesklých, čirých, až slabě přihnědlých, velikosti až 1 mm., kteréž dle směru klenčových os vedlejších mezi sebou srostly jsouce, všelijak na způsob sítě mezi sebou se stýkající drůznaté plátky vytvářejí. Obvykle bývá dolomit v drůznatých plátkách křemenem doprovázen.

**Haematit.** Kdekoli jest ruda spodního plástu ložiska prvního v Jezovčíně a Chrbíně dutá v některých místech, bývá pokryta křemenem nebo směsí hrubokrystalinického křemenu a barytu, kteréž spočívají na vrstvě někdy až 1 cm. mocného železovce drobnozrnitého, silně lesklého, barvy železné. Ve vrstvě železovce však jsou hojná táhlá zrnka křemene průsvitavého bělavého, kteréž doprovázeny bývají slabounkým povlakem železné slídy drobnounce zrnité, barvy višňové.

V některých dutinách se objevují krátké kapalínové tvary haematitu zároveň a hustě vedlé sebe v průměru brku, a délky až 1 centimetru i více. Sloh kapalín

jest zvláštní. Duše sestává buď z haematitu, jemně dirkovaného, barvy černošedé, kolem kterého slabounké vrstvičky haematitu barvy tmavorudé, jedna kolem druhé obalené jsouce, celou duši podobnou roubíku potahují. Zvětší-li se složivo roubíku lupou, poznává se, že složen z nepravidelně nahromaděných přejemňounkých lístečků slidy železné, která též i hustší vrstvy obalu skládá. Některé kapaliny sestávají z velmi dutinatého, kyprého jako houba, dirkovatého černošedého haematitu; v jiných jsou pouhé nepravidelné pozůstatky jeho, opět v jiných jest duše dutá. V dutých kapalinách jest buď pod vrstvičkami haematitu, koru celého tvaru tvořícími vrstvička zemitého kaolínu usazena, aneb jest kapalin zcela, aneb toliko částečně bílým až slabě namodralým kaolínem vyplněn. V některých opět vyplněna dutina malíčkými krystálky dolomitu, kteréž na způsob velmi řídké houby srostlé jsou. Kapaliny buď samy o sobě vyčnívají aneb velkými krystaly křemenu pokryty jsou.

Vůbec možno za pravidlo mít, že všechny zvláštní odrůdy haematitu jsou úzce s křemenem spojeny.

**Křemen** jest nerostem hojným, ale toliko v žilách ložiska prvního v Jezovčíně a Chrbíně.

Malé žilky v rudě pokryty bývají různě rozestavenými až velmi sblíženě se dotýkajícími menšími krystaly dlouhými v průměru ptačího brku až slabounkého prstu. Krystaly průsvitavé až průhledné, barvy bělavé jsou tvarů  $\infty R. - R. + R$ . Na křemenech narostlý bývá baryt.

Větší dutiny v rudě podobající se kulím dutým, neb kratoučkým širokým žilám, pokryty krystaly v drůzy spojenými s převládajícími plochami jehlanců. Průměr kryslalů rovná se prstu, barva slabounce bělavá až mléčná, též průhledná až na hranách průsvitavé krystaly známy jsou. Některé duté kule drůzami křemene povlečené zajisté více se geodám než žilám podobají. Potažná váha polomléčného křemene 25888 určena 30 grammy. Jen velice zřídka jest barva křemene slabě violová (amethyst). Krystaly křemene narostlé buď na rudě samé neb na tenkém drůznatém podkladku dolomitu.

Mimo krystalisovaný křemen nalezen též křemen na rudě narostlý, barvy slabě bělavé, průhledný, drobnozrný, kterýž vrstvu na půl prstu mocnou a na povrchu jako hluboce ve všech směrech nasekanou tvoří. Prohlubeniny rovinoploché, nasekání tak velice podobné, pocházejí od barytů až  $1\frac{1}{2}$  mm. širokých; dle dutin soudě zdá se, že tvary krystalů barytových byly tyto:  $\infty \bar{P}\infty. \bar{P}\infty.$

**Limonit.** Krystaly křemene v žilách, jakož někdy i baryty potaženy bývají hnědavým nádechem až hnědočernou vrstvičkou silně lesklého limonitu.

**Kaolin** pokrývá krystaly křemene jak v žilách, tak i v geodách ve vrstvičce slabé, kypré, zemité, barvy bělostné. Pod drobnohledem sestává zemitý kaolin z šupinek průhledných, šestibokých, tedy jest krystalisován.

**Pyrit** jest nerostem velmi hojným a zajisté že hojnějším všech ostatních. Zarostlý jest v žilách, buď v rudohnědavém dolomitu, nebo v měkkém bílém neb šedém zkyprělém tufu, kterýž vyplňuje žíly mocnější. V žilách jest pyrit vrostlý

v jednotlivých osamotnělých krystalech vesměs tvaru  $\frac{\infty O2}{2}$ , nebo v srostlicích nepravidelných sestávajících z několika málo těchto krystalů. Krystaly jsou od drobnosti máku až do vejce, plochy jsou lesklé více méně slabě nepravidelně čárko-

vané, buď rovné, nebo na nich, neb polo v nich, narostlé i vrostlé menší krystaly těchže tvarů, jen že ploch mnohem rovnějších, a tím hladších, čím menšími tyto jsou. Potažná váha krystalů v celistvém dolomitu zarostlých, mezi sebou srostlých a částečně žlutě nabělých jest 5·2568 určena množstvím 65 grammu.

Jen v některých místech vzácných jsou zarostlé krystaly malé s plochami rovnými, silně lesklými zrcadlicími a ostrými hranami; tvary takové mají podobu

$$\frac{\infty O2}{2} \cdot O.$$

Kdekoli pyrit v žilách větší závalky neb žíly sám o sobě skládá, kteréž až na 1½ decimetrů zmohutňují, jsou tyto buď kypré nebo více méně pevné.

Kypré žíly a závalky snadno se drolicí složeny jsou ze samých malých a větších

k sobě těsně přiléhajících krystalů  $\frac{\infty O2}{2}$ , na kterýchž buď všechny plochy vyvinuty, aneb některé toliko, an ostatní složnými plochami, v kterých se krystaly jednotlivé mezi sebou dotýkaly, nahrazeny jsou. Potažná váha takových krystalů jednotlivých, rozbitých, v jejichž středu maličké dírky prázné byly, určena na 5·0053 1·30 grammy.

I žíly velmi drobnozrné, kteréž se v písek kyzový drobnoučký až předrobný i jemný rozpadávají, složeny jsou z přemalých vyvinutých krystalů, na kterých se pod drobnohledem tvar jich shledává.

Žíly a závalky pevnější jsou lomu hrubozrného a jen leckdes na lomu vyskytne se některá složná neb krystalová plocha  $\frac{\infty O2}{2}$  na důkaz toho, že i ony z těsně srostlých krystalů složeny jsou.

Kdekoli se pyritevé žíly i odžilký v rudě objevují, nepřiléhají na rudu vlastní, nýbrž toliko v žilách rudavého dolomitu celistvého zarostlé jsou. — Jestliže tento pyrit žilový někde jiným nerostem pokryt jest, bývá to buď ankerit nebo baryt: pyrit se tudíž jeví co starší ostatních nerostů.

Nejpamátelnější žíla jest ona již jmenovaná východně od Svárovské šachty II, v kteréž na pyritu v drůzách v něm obsažených a též v něm, ačkoliv méně hojně, nerosty.

Kromě tohoto pyritu jest ještě jiný, kterýž v tenkých drůzách lesklých, sestávajících z maličkých, nezřetelně srostlých krystálků, potahujících drůzy ankeritu, jest narostlé a vrostlé jsou mnohé vzácně mladší tohoto.

**Chalkopyrit** se vyskytuje v pramaličkých jednotlivých neb srostlých krystálkách menších 1 millimetru, narostlých na bílých korách ankeritových krystalů potahujících rudu ložiska prvního; nebo zarostlých spoře ve větších krystalech barytu narostlého na ankeritu, čirého, průhledného až poloprůhledného. Tvary jednotlivých krystalů jsou osmistěny  $+\frac{P}{2} \cdot -\frac{P}{2}$  s ostrými hranami; plochy lesklé, barvy mosazné, bývají částečně trochu prohlubeny. Naleziště toliko jediné, štola Chrbinská, kdež chalkopyrit velevzácný jest.

V žíle východně od Svárovské šachty II. jest uložen pyrit v závalkách nebo v žilách, jejichž dutiny pokryty jsou množstvím nerostů vzácných. V dutinách bývá pyrit buď nedokonale v malých krystalech  $\frac{\infty O2}{2}$  zpotvořených vyhraněn, hojněji

ale jako vyžrán a vyhlodán; též ve směsi s zrnitým pyritem se hojně nerosty tyto objevují: chalkopyrit, asbolan, cinabarit, baryt, redruthit, galenit.

Chalkopyrit jest buď v malých zrníčkách do pyritu nebo sám o sobě vzrostlý do horniny dolomitové neb tufové v kouskách co hrách velkých, rozvětvlujících se do malých žilek; doprovázen bývá černým zrnitým asbolanem. Barva kyzu měděného jest ona mosaze, jen málokdy jinak než do slabě ruda naběhlá. Též na rozežraném pyritu, černým zrnitým asbolanem pokrytém, jest narostlý v krystalech nezřetelných, černomodrých a na povrchu silně zbrázděném a nepravidelném, v barvách duhových slabě naběhlý. Na krystalech se toliko  $+\frac{P}{2}$  rozeznává, ostatních tvarů nemožno pojmut. Mimo v pyritu též v cinabaritu v drobnounkých žilečkách a zrnkách úplně smíšen bývá.

**Asbolan** na rozežraném pyritu narostlý; též v malých krátkých žilkách jest všude zemitý, černohnědý, barvicí nerost, asbolanu podobný; co tenká kora usazen. Asbolan jest velmi rozšířen v dutinách žil pyritu, ač ne v množství značném. Kdekoli malické krystálky barytu narostlé jsou na pyritu, jsou buď asbolanem zcela počerněny<sup>20)</sup> na povrchu, aneb též asbolan zemitý v malických zrníčkách v barytu zarostlý vyskytuje se, kalc ho částečně.

**Redruthit** vedlé chalkopyritu méně hojně v pyritu sám o sobě se objevuje zarostlý v malých zrnkách až velikosti malického hrachu, obyčejně ale mnohem menších. Též druzi dutého pyritu pokryty se objevují kousky redruthitu na povrchu rozežranými a asbolanem pokrytými. V žilkách calcitu jsou zrnčka tohoto nerostu vzácnější všech ostatních. Barva černošedá lesklá, lom slohu celistvého jest nerovný, nerost jemný, an se snadno nožem krájet dá; zrnčka jsou čistá, nebo v nich vtroušen chalkopyrit sem a tam v zrnčkách přenepatrných, pod lupou barvou svou dobře rozeznatelných od ostatního černého nerostu.<sup>21)</sup>

**Cinabarit** jest mimo pyritu těchto vzácných nerostů poměrně nejhojnějším, an tvoří celé žilky až na prst (ovšem toliko vzácně) mocné. Tolikéž i zarostlý v zrnkách jakož i narostlý v malických skupeninách asbolanem promíšených jest na barytu, však baryt též na rumělce samé narostlý bývá. Kdekoli uložení žilek se porovnat dá s ostatními nerosty, tož objevuje se, že jest cinabarit starší chalkopyritu, redruthitu, asbolanu, barytu; na jiných opět místech seznává se, že rumělka chalkopyritem, asbolanem, redruthitem modře naběhlým, lesklým barytem porostlá, jest tudíž s nimi stárí současného; opět na jiných druzích jest narostlý s asbolanem na barytu, tedy mladší toho. Že všeho toho se dá toliko soudit, že rumělka jest s ostatními nerosty vzácnými utvoření současného. Rumělka slohu zrnitého jest barvy košenilové, toliko částečně tmavošarlachové. Že skutečně jest cinabarit současný s ostatními nerosty, jmenovitě ale s barytem, vysvítá z toho, že v malických krystalech čirých, očištěných na povrchu od zemitého asbolanu, jest množství velmi velké předrobounkých drobnohledných zrn rumělky barvy šarlachové vtroušeno; toliko pod drobnohledem rozeznávají se nepravidelně vtroušená zrnčka červená, v barytu též zrníčky černého asbolanu místy zakaleného.

I v ostatních barytech krystalisovaných se vyskytuje nezřídka Cinabarit v zrnčkách převleml droboučkých vtroušený; méně často jsou zrnčka sem tam toliko ojedinele vtroušena, obyčejně v celých skupeninách sestávajících jako chomáčky

ze zrníček předrobounkých a nepravidelně přiblížených, kteréž jako obláčky sem tam vtroušeny bývají do čirých barytů, čímž se stává, že červené chomáčky v barytu bývají již pouhým okem patrný, což by jinak nebylo možné, pro drobotu jednotlivých zrníček, kdyby se obvykle toliko různě rozptýleny objevovaly. Jakkoliv se chomáčky a jednotlivá zrníčka červená různě zarostlé objevují v směrech přerozmanitých; tož předce v krystalu samém nezřídka v pravidelných směrech, obvykle dle ploch  $\bar{P}\infty$  se nakupeny nacházejí. Kdekoliv v čirých barytech více teček rumělky vtroušeno, mění se jejich barva tím v růžovou. Nejen dle jediného směru ploch se uvnitř Barytů zrníčka nahromaděna objevují, nýbrž velmi často mnohokrát po sobě následuje toto nahromadění uvnitř krystalu, byť by i všechny směry ploch nebyly úplně neb nestejně hustě jím pokryty.

Jsou-li ale zároveň plochy uvnitř krystalů v takovém způsobu červeně zbarveny od usazeného cinabaritu, že tím opět krystalovou podobu sestavují, tedy se vytvářejí památné krystaly barytu obalené, nebo velký krystal zahrnuje v sobě krystal menší ostře naznačený, soustředně.

Někdy i krystaly ankeritu slabě na povrchu zbarveny jsou rumélkou v předrobounkých zrníčkách narostlou.

**Galenit** velmi vzácně vrostlý v zrnkách v pyritu naznačené žíly. Též nalezen v malých očkách v žilkách calcitu zarostlých, kteréž protínaly dolomitem prostoupený tuf diabasový ve vržení dlouhém mezi šachtou III. v Jezevčíně a Chrbinskou štolou.

**Baryt** jest jeden z nejkrásnější vyvinutých nerostů, kterými se pásma tato vyznamenává. Krystaly dosahují velikosti počínaje od pramalých, takřka drobnohlodných, až do rozměrů dlouhého lískového ořechu ve všech možných způsobech vyhraněné; větší krytaly též se ohjevují, však nedosahují plochy jejich nikdy souměrného vyvinutí. Nejobyčejnější jsou krystaly zvlášť menší a dokonale vyvinuté, čiré, průhledných je méně, poloprůsvitavých bělavých ještě méně; baryty barev nažloutlých, narudlých a slabě namodralých jsou méně obecné všech ostatních.

Baryty posud nalezené jsou asi následující z těchto míst:

Z Chrbinské štoly, zvlášť z východní její části, kteráž tak převelmi rozsedlinami vržena jest, jsou na rudě hojně narostlé baryty buď, což obecné jest, na ankeritových korách vyhraněných, aneb též prostě na rudě samé; méně hojně jsou baryty na tvrdších tufech a břidlicích narostlé. Že však ruda, alespoň v některých místech, veskrz rozsedlinkami prostoupena jest, jsou tyto ne-li zcela, tedy alespoň z části převládajícím bělavým barytem vyplněny.

Nejobecnější tvary barytu zde nalezeného jsou poznačeny známkami Naumannovými v postavě dle Naumanna, kde tedy štěpné plochy zároveň jsou krystalovým tvarům  $\bar{P}\infty$  a  $\infty\bar{P}\infty$ . — Jsou to:

$\infty\bar{P}\infty$ .  $\bar{P}\infty$ ; též  $\infty\bar{P}\infty$ .  $\bar{P}\infty$ .  $OP$ ;

krystaly jsou tence deskovité, rozměrů 8, 4,  $\frac{1}{2}$  millimetru; všechny plochy dosti rovné a lesklé, poloprůhledné. Výborně jest v nich naznačen způsob obalených krystalů, any tenké sněhobílé pásy v krystalech, kteréž zároveň jsou buď plochám  $\bar{P}\infty$  neb  $\infty\bar{P}\infty$ .  $OP$  vystupují barvou svou značně na plochách  $\infty\bar{P}\infty$  krystalů. Narostlé jsou plochami  $\infty\bar{P}\infty$  na roztržštěné křemenné drobě drobnozrnné, spojené ankeritem na koře drůznatého ankeritu v rozsedlině východně od Chrbinské štoly.

Vedle těchto právě jmenovaných tvarů objevují se ještě

$$\infty \tilde{P} \infty. \bar{P} \infty. OP. P;$$

též tence plátkovitě vyvinuté; největší z krystalů mají rozměry 15, 10, 1 millimetry. Malé krystaly jsou ploch rovných a lesklých, zvlášť plocha  $\infty \tilde{P} \infty$  jest taková; na větších krystalech však bývá nerovná a zvlášť na některých místech drsná poněkud.

Krystaly jsou vlastně čiré až poloprůhledné, nic méně však jest barva povrchu jejich slabě narudlá, což od tenkého nádechu haematitu pochází, kterýž rozpuštěn v kyselinách, bezbarvý krystal pozůstává. Jednotlivé slabé a nesouvislé pásy haematitem barvené, uložené uvnitř krystalů jsou vzácnějším úkazem než ten jest, že plochy  $\bar{P} \infty. OP$  do jisté nepatrné hloubky slabě nahnědlorudě zbarveny jsouce, poblíže hran tupých mezi plochami  $P \infty$  a hran kombinacních mezi  $\bar{P} \infty$  a  $OP$  větší nahromadění barviva poskytují. Narostlé jsou na celistvém haematitu s žilečkami sideritu prostoupeného, neb na hnědavých neb zelenavých tufech diabasových v nepatrné vzdálenosti od ložiska, plochami buď  $\infty \tilde{P} \infty$ , neb  $P$ , neb  $\infty \tilde{P} 2$ , neb  $\bar{P} \infty$  (Chrbina).

$$\text{Krystaly tvaru } \infty \tilde{P} \infty. \bar{P} \infty. \tilde{P} \infty. \infty \tilde{P} 2;$$

tenounce tabulkovité, největších rozměrů 5, 3,  $\frac{1}{2}$  millimetrů jsou tím zřetelnější čím menšími jsou, tak že krystálky kratší 1 mm. jsou mnohem zřetelněji vyhraněné větších; ovšem se to pod drobnohledem toliko poznává. Čím více rozměru krystálkům přibývá, tím zpotvořenějšími jsou plochy jejich; zvlášť plochy  $\infty \tilde{P} \infty$  jsou drsné, nerovné a hluboce zbrázděné. Barva narudlá pocházející od tenkého povlaku haematitu tratí se v kyselinách, an krystal zcela neb částečně v průhledný se vyjasní, jsa úplně prost haematitu, nebo toliko obláčky krevcele zarostlého zkalen, jak pod drobnohledem se shledává. Volně jsou krystálky přirostlé na rudu v Jezovčíně, kdekoliv trhlá jest.

Následující tvary toliko v Chrbinské štole nalezeny a sice:

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty; \text{ a } \bar{P} \infty. \infty \tilde{P} 2; \text{ druhý tvar velmi vzácnější prvního dvojčlenného.}$$

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. \infty \tilde{P} \infty; \text{ neb } \infty \tilde{P} 2. \infty \tilde{P} \infty. \bar{P} \infty;$$

vzácnější předešlých trojčlenných spojek jsou:

$$\bar{P} \infty. \infty \tilde{P} \infty. \infty \tilde{P} 2;$$

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. \tilde{P} \infty;$$

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. OP. \text{ Někdy převládá } \infty \tilde{P} \infty \text{ nad } \bar{P} \infty.$$

Čtyřčlenné spojky jsou:

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. \tilde{P} \infty. P;$$

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. \infty \tilde{P} \infty. P; \text{ zde též někdy } \infty \tilde{P} \infty \text{ nad } \bar{P} \infty \text{ převládá; převládá-li}$$

$\bar{P} \infty$  nad  $\infty \tilde{P} 2$ , jsou takové krystaly o něco vzácnější oněch, na kterých tato plocha na úkor oné vyvinuta jest; jiné tvary jsou:

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. \infty \tilde{P} \infty. OP;$$

$$\infty \tilde{P} 2. \bar{P} \infty. \tilde{P} \infty. OP;$$

$$\infty \tilde{P} 2. \infty \tilde{P} \infty. \bar{P} \infty. \frac{3}{4} \bar{P} \infty; \text{ a jiných podobných více.}$$



Pětičlenné spojky:

$$\infty \check{P}2. \infty \check{P}\infty. \bar{P}\infty. \check{P}\infty. 0P;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. \check{P}\infty. P;$$

$$\infty \check{P}2. \infty \check{P}\infty. P\infty. 0P. \check{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. 0P. P. \check{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. \check{P}\infty. \frac{3}{2}P\infty, \text{ a jiné.}$$

Šestičlenné některé spojky jsou tyto:

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \infty \check{P}\infty. 0P. \check{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \infty \check{P}\infty. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty. \infty P\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. 0P. \check{P}\infty. \infty \bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. \check{P}\infty. \infty \check{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty. 0P. \infty P; \text{ velmi vzácný tvar,}$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty. 0P. 2P; \text{ tolikéž velevzácné,}$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. \check{P}\infty, P. \check{P}2;$$

$$\infty \check{P}2. \check{P}\infty. \check{P}\infty. P. \infty \bar{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty;$$

$$\bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. \infty \check{P}2. P. \check{P}\infty. \check{P}2;$$

$$\bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}2. 0P. \infty \check{P}2; \text{ a jiné.}$$

Některé ze sedmičlenných spojek jsou tyto:

$$\infty \check{P}2. P\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}\infty. 0P. \infty P\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}2. \check{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty, \check{P}2. 0P. \infty P\infty;$$

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. \check{P}2. 2\check{P}2. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. 0P;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}\infty. 0P. \frac{1}{3}\bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. \check{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. \check{P}2; \text{ a jiné.}$$

Z osmičlenných spojek některé:

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \check{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}\infty. \check{P}2. 0P. \infty \bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \check{P}2. P. \check{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty; \text{ a více jiných.}$$

Z devítičlenných následují tuto některé:

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \check{P}2. \check{P}\infty. 0P. \frac{1}{3}\bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. 2\check{P}2. \check{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. \check{P}2. \infty \bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \infty \check{P}\infty. 0P. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. \check{P}\infty. \check{P}2. 2\check{P}2;$$

$$P\infty. \infty \check{P}\infty. \infty \check{P}2. P. \check{P}\infty. \check{P}2. \infty \bar{P}\infty. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. \infty P; \text{ a t. d.}$$

Tato poslední spojka vzácnější ostatních.

Desítičlenné spojky pak následují některé zde:

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}\infty. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \check{P}2. 0P. \infty \bar{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}2. P\infty. P. \check{P}\infty. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \check{P}2. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty; \text{ a jiné.}$$

Jedenáctičlenné některé:

$$\infty \check{P}2. P\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}\infty. 2\check{P}2. \check{P}2. 0P. \frac{3}{2}\bar{P}\infty, 2\bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty;$$

$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \check{P}2. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty. 0P;$   
 $\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \frac{1}{3}P\infty. 2\bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \bar{P}\infty. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. \check{P}2;$  jakož i jiné.  
 Z dvanáctičlenných spojek tyto:  
 $\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty. 2\check{P}2. \check{P}2. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. 0P. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty. \check{P}3;$   
 $\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty. P. \check{P}\infty. \check{P}2. \frac{1}{3}P\infty. 2P. 3P. \infty \bar{P}\infty. 0P. \frac{1}{3}\bar{P}\infty;$  mimo jiné.

Též třináctičlenné i čtrnáctičlenné spojky vzácně se vyskytují. Všecky z těchto krystalů jsou buď průhledné neb průsvitavé, jsou-li malé, a hnědavé, jsou-li velké; krystaly, jejichžto velikost klesne pod rozsah lískového ořechu, jsou vesměs čiré; slabounce narudlé krystaly jsou velmi vzácné. Výška krystalu a šířka jejich se neumenšuje pod 3 a 1 $\frac{1}{2}$  milimétru, tak že tvary rozměru ještě menších jsou vzácnější; drobnoucké krystálky neobjevují se. Obvyčejně jsou krystaly narostlé na korách ankeritu krystalisovaného, pokrývajícího tvrdou rudu, málokdy na tufové rudé břidlici plochami  $\infty \bar{P}\infty$  vzácně, méně hojně s plochou  $\infty \check{P}2$ , obvyčejně jednou z ploch  $\bar{P}\infty$ , neb  $P$ , neb  $\check{P}\infty$ , neb i  $0P$ ; tak že častěji se objevují všechny čtyry plochy od  $\infty \check{P}2$  než od  $\bar{P}\infty$ .

Lesk všech krystalových ploch rovných, hladkých jest vesměs přesilný, zvlášť u některých menších; tak že úplně zrcadlcí, obrazy v nich odražené převýborně se k měření úklonu ploch v Wollastonově goniometru hodí. Nevyrovnají se krystalům malým zajisté co do lesku ostatní krystaly z jiných nálezišť, mimo náš obvod rudní. Jen zřídka jest plocha  $\bar{P}\infty$  slabounce a někdy toliko přetržité čárkovaná zároveň s hranami tvořenými mezi  $\bar{P}\infty$  a  $\infty \check{P}\infty$ ; ani větší krystaly, kteréž se vždy spíše nepravidelněji vyvinují menších, nebývají na této ploše nápadně rýhovány, jest-li vůbec se čárkování objevuje na ní; nejobecněji jest tato plocha tehdaž čárkovaná, když převládá nad  $\infty \check{P}2$ , což ovšem jen vzácnějším úkazem jest.

Krystaly malé, barvy čiré, některé přeslabě do namodrálá se klonící, spojek méně složitých, měly hutnoty 4·2922 určené s 1·13 grammy krystalů; jiné, opět jednoduché krystaly průhledné, větší, odloučeny v střed a povrch; povrch jich měl hutnoty 4·5602 (určené s 54 grammy). Čirý baryt, asi 1 $\frac{1}{2}$  cm. dlouhý a 1 cm. široký, narostlý na ankeritu krystalisovaném, jehož množství  $FeOCO_2$ , jakož i hutnota na místě vyšším udána jest, byl v solné kyselině vyvařen a potažná váha určená obnášela 4·4405 (s 2·13 grammy látky).

Baryt čirý, ve větších krystalech na ankeritu narostlý, měl hutnoty 4·5294, určené s 4·23 grammy.

Složení pak jeho jest následující (Frant. Farský):

K analýsi vzato látky 4·54 grammy.

|                                     |   |           |        |
|-------------------------------------|---|-----------|--------|
| V kyselinách rozpustná část barytu: | { | $SiO_2$   | .34    |
|                                     |   | $SO_3$    | .07    |
|                                     |   | $Fe_2O_3$ | .10    |
|                                     |   | $CaO$     | .04    |
|                                     |   | $CO_2$    | 0      |
| Nerozpustná část v kyselinách:      | { | $BaOSO_3$ | 99.50  |
|                                     |   | $SrOSO_3$ | ?      |
|                                     |   |           | 100.05 |
|                                     |   |           | 12*    |

Toliko zřídka bývají některé krystaly slabým nádechem rudého haematitu potaženy, kterýž v kyselině sírové přesnadno rozpustný, čirý krystal po rozpuštění svém ponechává. Složité spojky takového barytu čirého, původně ale s nádechem narudlým, v kyselině rozpuštěným, daly hutnoty 4.4965, kteráž určena množstvím 77 grammů.

Z těchto všech vypočítaných ploch sestavené krystaly jsou vesměs souměrné čili symetrické, totiž podobají se co možná nejvíce vzoru, jakým krystaly ty vyvinuté býti měly, kdyby všechny plochy jednoho tvaru v stejné míře se od os a středu uloženy objevovaly; žádná plocha jistého tvaru není jiné ploše tvaru jiného značně na úkor, protože jsou také krystaly plnoploché, an obě dvě neb všechny čtyry neb všech osm ploch těles přímotvárných stejně na všech dvou neb čtyřech stranách vyvinuty jsou, ovšem není-li krystal v tom směru právě narostlý, v kterém by se plochy objevovat měly, kdyby byly všechny plochy kolem os volny.

Obečné tvary jsou:  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}\infty$ , kteráž poslední často však chybí;  $\tilde{P}\infty$  jest sice dosti hojná, ale vždy velmi nepatrně vyvinuta. Ostatní jsou více neb méně vzácné. Však vzácnější plochy jsou jehlance  $2\tilde{P}2$ ,  $3\tilde{P}3$ ;  $2\tilde{P}2$  s hranolem  $\infty \tilde{P}2$  a s jehlancem  $\tilde{P}2$  vodorovné hrany tvořící, s jehlancem  $P$  a ukončující plochou  $\infty \tilde{P}\infty$  tvoří hrany zároveň k hlavnímu průmětu, v němž kratší průsečnice obsažena jest.  $\tilde{P}2$  s  $P$  tvoří vodorovné hrany, s  $\tilde{P}\infty$  pak hrany zároveň k průmětu hlavnímu dle delší průsečnice. Vzácnější všech ploch jest  $2P$ ,  $3P$ , a  $\infty P$ . Jehlanec  $2P$  otupuje zároveň hrany mezi  $\tilde{P}\infty$  a  $\infty \tilde{P}2$ ;  $3P$  pak hrany mezi  $\frac{3}{2}\tilde{P}\infty$  a  $\infty \tilde{P}2$ ; obě plochy toliko jen co uzoučké pásy lesklé se objevují. Též  $\infty P$  jest převzácné;  $\infty \tilde{P}4$  a přeúzké  $\infty \tilde{P}3$  toliko nejzkušenější oko na některých krystalech co pásy nad vše pomýšlení úzké pozoruje a rozeznává.

Na některých místech v Chrbinské štole se objevují krystaly zcela jiného rázu předešlých a sice spojek následujících:

Spojky čtyřčlenné:

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ .

Pětičlenné:

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ;

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $P$ .

Šestičlenné:

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $0P$ .

Sedmičlenné:

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $P$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}\infty$

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $P$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $0P$ .

Osmičlenné:

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $P$ ,  $\frac{3}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $0P$ ,  $\infty \tilde{P}\infty$ ;

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $P$ ,  $\frac{3}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\infty P$ ;

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $P$ ,  $\frac{3}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $2\tilde{P}\infty$ .

Devítičlenné:

$\infty \tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}2$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{1}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $\tilde{P}\infty$ ,  $\frac{3}{2}\tilde{P}\infty$ ,  $2\tilde{P}\infty$ ,  $0P$ ,  $P$ .

Desítičlenné:

$$\infty \bar{P}\infty. \infty \bar{P}2. \bar{P}\infty. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. \bar{P}\infty. \frac{2}{3}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. P. OP. \infty \bar{P}4.$$

Jedenáctičlenné spojky podobají se předešlým, toliko přistupuje ještě  $\infty \bar{P}\infty$ ; k dvanáctičlenným pak mimo to ještě  $\infty P$ .

Ráz krystalů narostlých na ankeritu neb prostě na tvrdé rudě jest hrubě tabulkovitý: největší krystaly jsou vysoké až 15 mm., dlouhé až 12 mm. a široké až 3 mm.; nejmenší krystaly však neklesají pod rozměry 3, 2,  $\frac{3}{4}$  mm. Velké krystaly jsou čiré neb bělavé a průhledné, malé buď čiré neb slabounce narudlé neb toliko na povrchu rudavým nádechem, snadno v kyselinách rozpustným, povlečené. Narostlé bývají obyčejně jednou z ploch  $OP$ , neb  $\bar{P}\infty$ , neb  $\frac{1}{3}\bar{P}\infty$ , neb  $P$ , neb  $\bar{P}\infty$ , méně často s  $\infty \bar{P}\infty$ . Lesk ploch jest velmi značný; plochy tím lesklejší a hladší, čím krystaly menšími jsou; i málo lesklé narudlé krystaly silně se lesknou po odstranění rudého nádechu kyselinami. Obrazy v plochách zrcadlí se výborně a jasně velmi. Buď jsou všechny plochy lesklé, aneb buď  $\frac{1}{3}\bar{P}\infty$ , nebo  $\bar{P}\infty$ , nebo  $\bar{P}\infty$  jsou silně vodorovně zbrázděné nebo i mdlé a drsné, buď všechny najednou, nebo jedna nebo dvě z nich.

Pomšžené krystaly čiré tvarů hranolovitých s těmito malými slabě růžovými měly hutnoty 4·4049 určené s 1·62 grammy. Malé krystaly barvy slabě růžové vyvařené v solné kyselině, až se téměř v čiré proměnily, měly hutnoty 4·4425 určené s 2·93 grammy.

Všecky plochy bývají též jako v předešlých pravidelně a souměrně vyvinuty, a toliko  $OP$  jest někdy velmi úzké; vždy však jsou úzké plochy  $\infty P$ ,  $\infty \bar{P}\infty$  a  $\infty \bar{P}4$ . Památné jest to, že ostatní jehlance vedlejších řad scházejí. Do krystalů hranolovitých, prvé vypsanych, neobjevují se žádné přechody, a též se pospolu krystaly těchto dvou rozličných tvarů ještě nikde nenalezly.

Na krystalech z Chrbinské štoly se objevují někdy vtisky od klenčů ankeritu, což od toho pochází, že se v druze vyvinul krystal větší, než ho dutina pojmout s to byla, tak že se plochy krystalu dotýkaly protějších stěn dutiny drůzové, pokryté krystaly ankeritu, do kterých při ustavičném růstu krystalu tento s krystalovými neb složnými plochami vtiskl.<sup>22)</sup>

V barytu Chrbinské štoly toliko porůznu zrníčka chalkopyritu neb jemně rozptýlený haematit vrostlý jest, však žádný cinabarit posud nenalezen.

Ve vržení v ústí štoly dědičné v Jezovčíně nalezeny narostlé krystaly podob těchto, z nich některé zde uvedeny:

Spojky čtyřtvárné:

$$\infty \bar{P}2. P\infty. \frac{2}{3}P\infty. 2\bar{P}\infty.$$

Šestičlenné:

$$P\infty. \infty \bar{P}2. \infty \bar{P}\infty. \frac{2}{3}P\infty. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. OP.$$

Spojky osmičlenné:

$$\infty \bar{P}2. P\infty. P. \bar{P}2. OP. \frac{1}{3}P\infty. \infty \bar{P}4. \infty P\infty.$$

Devítitvárné spojky:

$$\infty \bar{P}2. P\infty. P. \frac{2}{3}P\infty. 2\bar{P}\infty. \infty \bar{P}4. \infty P. \infty \bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty;$$

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}\infty. \frac{1}{3}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. \infty P. \infty \bar{P}4. \infty \bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty. OP.$$

Jedenáctičlenné:

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. P. \check{P}2. \check{P}\infty. 2\check{P}2. 3\check{P}3. 0P. \frac{1}{3}P\infty. \infty \check{P}4. \infty \check{P}\infty.$$

Šestnáctitvárné:

$$\infty \check{P}2. \bar{P}\infty. \frac{2}{3}\bar{P}\infty. 2\bar{P}\infty. 0P. \frac{1}{3}P\infty. P. \check{P}2. 2\check{P}2. 3\check{P}3. \check{P}\infty. \infty P. \infty \bar{P}\infty. \\ \infty \check{P}3. \infty \check{P}4. \infty \check{P}\infty;$$

tato spojka, kdyby byla úplně vyvinuta, obsahovala by 74 ploch krystalových.

Všecky tyto krystaly čiré až průhledné, velikosti lískového ořechu až malého táhlého hrachu (menších krystalů není) jsou ploch vesměs rovných, hladkých a velice lesklých a dobře zrcadlících se. Narostlé jsou na ankeritu potahujícím v druzách drobu křemennou neb mandlovec rudý. Na některých krystalech jsou otisky krystalů ankeritu, jen některé plochy jsou dle rovných směrů trochu prohlubeny.

Na šedorudém zrnitém mandlovcu narostlé byly opět na druzách ankerity dlouhé sloupkovité krystaly, z nichž tento pětičlenný:

$$\infty \check{P}2. \infty \check{P}\infty. \bar{P}\infty. \check{P}\infty. \infty P,$$

nejpamátelnější; nebo plochy hranolu  $\infty P$  toliko na jednom konci kratší průsečnice vyvinuty jsou, scházejíce úplně na druhém; jest to tedy úkaz tak vzácné poloplochosti (hemimorphie) u barytu. Sloupek barytu tlustý jako slabé brko a dlouhý co prst šířky obnáší, jest barvy vinné; plochy  $\bar{P}\infty$  jsou drsné a velmi hluboce a přetržité rýhované zároveň s hlavním průřezem kratší průsečnice,  $\infty \check{P}2$  jsou nerovné a též slabě tečkované hlubokými krátkými rýhami neb částečně též trochu drsné;  $\check{P}\infty$  a  $\infty \check{P}\infty$  jsou rovny a lesklé velmi.

V žíle východně od šachty druhé Svárovské, v kteréž tak značné množství nerostů se vyskytuje, jsou narostlé rozličné tvary barytu.

V rozežraných žilkách a druzách v pyritu zrnitém, v kterých též ostatní nerosty objeveny, jsou narostlé a veskrz asbolanem zemitým, někdy i cinabaritem částečně pokryté maličké krystálky těchto tvarů:

Čtverečných:

$$\infty \check{P}\infty. \bar{P}\infty. P. \check{P}\infty;$$

$$\infty \check{P}\infty. \bar{P}\infty. P. \infty \check{P}2;$$

a paterečných, přistupuje-li ještě k těmto  $\check{P}\infty$ .

Krystálky jednodušší těchto jsou velice vzácné.<sup>25)</sup>

Výška deskovitých krystalů jest nanejvýše 1 mm.; krystaly velmi lesklé se značně vyvinutým přímotvarem  $P$  jsou černé, dokud narostlé jsou, což od černého podkladku zemitého pochází, jinak ale jsou úplně čiré a velmi velice lesklé; ploch rovných a hladkých. Pod drobnohledem vrostlých zrn cinabaritu vtroušených, a chumáčkovitě skupených zrnec asbolanu množství převeliké se v každém krystalu objevuje.

Jiné tvary jsou:

$$\bar{P}\infty. \infty \check{P}\infty, \propto \check{P}2. P,$$

hranolovité čiré neb přencpatrně do fialova se klonící, velikosti asi hrachu, narostlé na velkých krystalech calcitu již napřed popsaneho nebo na ankeritové tenké kofe pokrývající bělavý tuf diabasový. Plochy jsou rovné a lesklé velmi;  $\bar{P}\infty$  jsou

hrounce rýhovaný směrem hlavního průmětu kratší průsečnice; na plochách  $\bar{P}_{\infty}$  bývá někdy toliko nedokonale slabounké čárkování nedokonalé ve směru n kombinálních ploch  $\infty \bar{P}_{\infty}$  a  $\bar{P}_{\infty}$  naznačeno.

Spojky trojčetné:

$\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $0P$ .

Paterečné:

$\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_2$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $0P$ .

Šesterečné:

$\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_2$ .  $\frac{1}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ .

Osmivápné spojky:

$\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_2$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $0P$ .  $P$ .  $\infty P$ .  $\infty \bar{P}_4$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .

Nejsložitější devaterečné spojky:

$\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_2$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $P$ .  $\frac{1}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $2\bar{P}_{\infty}$ .  $P$ .

větší z krystalů hrubě deskovitých neb tabulkovitých jsou 3 cm. vysoké, nejmenší pak asi  $\frac{1}{2}$  cm.; pod tyto rozměry neklesají. Krystaly čiré neb přeslabě udlé neb bělavé průhledné jsou rovné, hladké a velmi lesklé; někdy jest  $\bar{P}_{\infty}$  iště na krystalech větších rýhované, více méně značně dle plochy kombinální s  $\infty \bar{P}_{\infty}$  utvořené. Narostlé jsou krystaly na koře ankeritu, kteráž pokrývá hnědorudý drobnozrný dolomit neb žílu zrnitého pyritu.

Bělavé poloprůsvitavé pásy jsou ve větších krystalech vloženy zároveň dle  $\infty \bar{P}_{\infty}$  neb  $\infty \bar{P}_2$ . V krystalech vtroušena zrníčka cinabaritu buď v cholkách, neb různě, neb dle ploch  $\bar{P}_{\infty}$ .

Opět jiné tvary jsou tyto:

Sedmerečné spojky:

$\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_2$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $P$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $2\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty P$ .

Devítičlenné:

$P_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_2$ .  $P$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $0P$ .  $\infty P$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ ;

$\infty \bar{P}_2$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $P$ .  $\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $0P$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $2P_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .

Spojky čtrnácterečné:

$\infty \bar{P}_2$ .  $P_{\infty}$ .  $P$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $2P_{\infty}$ .  $0P$ .  $\frac{1}{2}\bar{P}_{\infty}$ .  $\infty P$ .  $\infty \bar{P}_4$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $\infty \bar{P}_{\infty}$ .  $2\bar{P}_2$ .  
3.  $4\bar{P}_4$ .

Krystálky krátce hranolovité, velikosti máku velkého a malého hrachu jsou ostly na tenké koře ankeritu sem a tam slabým pruhem cinabaritu růžově rvené, kteráž pokrývá žilové kamení sestávající z dolomitu barvy pletové a velmi bnoznrného pyritu. Krystálky čiré přeslabě do modra se klonící neb průhledné, i ploch rovných, hladkých, převlehlí silně lesklých: některé krystálky od vtroušého cinabaritu krásně růžově jsou zbarveny. Nížádná plocha není ani drsná rýhovaná.

V jedné žíle ankeritu v Jezovčíně, v kteréž jsou krystaly klenčové jako ba s velkými dutinami nakupené na ankeritu zrnitém, jsou narostlé do velkých lin krystaly:

Sedmerečného tvaru:

$$\bar{P}_{\infty} \propto \bar{P}2. \propto \bar{P}4. \propto \bar{P}_{\infty}. P. 0P. \bar{P}_{\infty}.$$

Nebo osmerečného:

$$\bar{P}_{\infty} \propto \bar{P}2. \propto \bar{P}_{\infty}. P. 0P. \bar{P}_{\infty} \bar{P}2. \frac{1}{2}P.$$

Složitě spojky třeba dvanácti a třináctičlenné:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. 0P. \bar{P}_{\infty}. P. \bar{P}2. \bar{P}3. \frac{1}{3}P. \frac{2}{3}\bar{P}2. 2P. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. \frac{2}{3}\bar{P}_{\infty};$$

$$\bar{P}_{\infty} \propto \bar{P}_{\infty} \propto \bar{P}2. \propto \bar{P}4. \propto P. 0P. P. 2P. \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. \frac{1}{3}P. \frac{2}{3}\bar{P}2;$$

jsou vzácné úkazy.

Krystaly velikosti viky až bobu malého jsou průhledné, slabě žlutavé, ploch rovných a lesklých. Plochy  $\bar{P}_{\infty}$  bývají slabě, zcela neb přetržitě přeslabě rýhované dle průmětu s hlavní plochou, v kteréž kratší průsečnice obsažena jest. Též bývá plocha místy drsná a jako slabě nahlodaná.

Což však krystaly velepamátnými činí, jest několik vzácných ploch, jako  $2P$ , kteráž otupující hrany  $\bar{P}_{\infty} \propto \bar{P}2$  s plochou  $P$  vodorovné hrany vytváří; tolikéž i  $\frac{1}{3}P$ , kteráž hrany mezi  $\bar{P}_{\infty}$  a  $\bar{P}_{\infty}$  otupuje;  $\frac{1}{3}P$  zase s  $\frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}$  hrany zároveň s hlavním průmětem dle kratší průsečnice vytváří by s  $P$  též vodorovné hrany tvořila, kdyby se někde stýkala s ní. Tyto plochy jehlance  $\frac{1}{3}P$  bývají často slabě vypouklé.  $\frac{2}{3}\bar{P}2$  pak dává s  $\frac{1}{3}P$  a  $\bar{P}2$ , mezi kterými smětnána jest, zároveň hrany, kteréž jsou zároveň opět k hranám mezi  $\bar{P}2$  a  $\infty \bar{P}2$ , tedy vodorovné. Též  $\frac{2}{3}\bar{P}2$  jest nerovná, nýbrž trochu vypouklá plocha vzácná.

V slabé žíle v tufu zrnitém bělošedavém neb šedavě přizelenalém jsou narostlé na slabé koře ankeritu malé krystaly tvarů velmi složitých, z kterých zde uvedeny:

Desaterečné spojky:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. \bar{P}_{\infty}. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. 0P. P. \bar{P}2. \frac{2}{3}\bar{P}_{\infty} 2P. 3P.$$

Dvanáctičlenné spojky:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. \bar{P}_{\infty}. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. 0P. \frac{2}{3}\bar{P}_{\infty}. P. \frac{1}{3}P. \frac{1}{4}. 2P. 3P. \propto P. \propto \bar{P}4.$$

Spojky čtrnácterečné:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. \bar{P}_{\infty}. 0P. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. \frac{2}{3}\bar{P}_{\infty}. P. \bar{P}2. \bar{P}3. \propto P. \propto \bar{P}_{\infty}. \propto \bar{P}_{\infty}. 2P. 3P.$$

Tvary složené ze spojek šestnácterečných:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. \bar{P}_{\infty}. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. 0P. \frac{2}{3}\bar{P}_{\infty}. 2\bar{P}_{\infty}. P. \bar{P}2. 3\bar{P}3. \frac{1}{4}P. 2P. 3P. 4P. \propto P_{\infty}. \propto P4.$$

Dvamecitmatvárné spojky:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}_{\infty}. \bar{P}_{\infty}. \frac{1}{3}\bar{P}_{\infty}. \frac{2}{3}\bar{P}_{\infty}. 0P. 2\bar{P}_{\infty}. \propto \bar{P}_{\infty}. \propto \bar{P}_{\infty}. \propto \bar{P}4. \bar{P}. \bar{P}2. \propto P. 2P. 3P. 4P. \frac{1}{4}P. \bar{P}3. \bar{P}4. 3\bar{P}3.$$

Tyto krystaly čirě až bělavé průhledné, hranolovité, velikosti nepatrné, vysoké 2—3 millimetry a poměrně méně široké a dlouhé, s plochami rovnými, hladkými a přesilně lesklými (až na některé dvě neb tři) jsou zvláštním úkazem, kterýž o bohatosti tvarů barytových vydává svědectví skvělé. Nebo spojky zde uvedené čtrnácti-, šestnácti- až dvamecitmatvárné by byly sestaveny z 70ti, neb 88ti, neb dokonce 110 ploch, kdyby volně vyvinuty byly. Posud nejsou baryty naše co do množství ploch od žádného jiného barytu z naleziště jakéhokoliv dostíženy, tím

méně od jiných nerostů vyhraněných v soustavě přímotvárné. Ovšem jsou mnohé plochy velice malé a nepatrné a toliko nejvyzvičenější oko jest s to je pojmout, což lesk silný připouští, byť by plochy sebe menšími byly.

Plochy  $\frac{1}{2}P$  otupují hrany mezi  $\frac{1}{2}\bar{P}\infty$  a  $\bar{P}\infty$  utvořené;  $3P$  a  $4P$  pak hrany mezi  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$  a  $2\bar{P}\infty$  s  $\infty\bar{P}2$ , an též mezi sebou, jakož i s  $2P$  a  $P$  zárovných a vodorovných hranách se stýhají.

Úzké plochy  $2P$ ,  $3P$ ,  $4P$  jsou nerovné a silně vodorovně rýhované, tudíž málo lesklé neb docela bez lesku. Vzácnější všech ploch jsou  $4P$ ; potom  $\bar{P}4$ , kteréž toliko co přeúzké plošky mezi  $\bar{P}3$  a  $\bar{P}\infty$  umístěné teprve při velmi příhodném osvětlení se co přetenké pásky lesknou. Též  $3\bar{P}3$  a  $\frac{1}{4}P$ , ač někdy dobře se rozeznávají, nejsou tak hojné jak ostatní více vyvinuté plochy. Do krystálků jest zřídka vtroušen cinabarit v přemalých zrníčkách, ještě vzácnější jest vrostlý chalkopyrit, kterýž ale v malých zrníčkách častěji na ankeritu bezprostředně narostlý se objevuje.

Všecky tyto baryty zde vypsané mají zvláštní ráz a jsou vůbec na ankeritu narostlé. —

Tyto zde následující svým zvláštním a nápadným rázem od předešlých podstatně se liší, ač některé ovšem méně hojné tvary jim nicméně podobny jsou.

Na rudě ložiska prvního aneb na dlouhých tenkých krystalech křemene narostlé baryty tence tabulkovité bílé, tenké tabulky však průsvitavé jsou. Tvar tabulek 1—4 millimetry širokých a až 3 centimetry vysokých jest:  $\infty\bar{P}\infty$ .  $\bar{P}\infty$ ; však málokdy bývají plochy  $\bar{P}\infty$  patrný, jelikož krystaly všelijak přeráženy bývají.

Plochy jsou veskrz nerovné, an složeny jsou z krystálků malých, až velmi malých, zároveň vedlé sebe srostlých, tak že v jistých směrech toliko jedny plochy, ale všecky najednou lesknouce se se třpytí. Plocha  $\infty\bar{P}\infty$  jest pokryta velkým množstvím malých krystálků napolo neb ještě méně vypuklých. Osy krystálků jsou zároveň s osami tabulek, tvary jejich pak:  $\infty\bar{P}2$ .  $\infty\bar{P}\infty$ .  $\bar{P}\infty$ .  $\bar{P}\infty$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$ .  $P$ . Všecky plošky lesknou se až na  $\bar{P}\infty$ ,  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$  a  $P$ , kteréž mdlého lesku jsou. — Plocha  $\bar{P}\infty$  velkých tabulek, jestli viditelná jest obyčejně lesku mdlého, an složena z vynikajících a v jedné ploše uložených zároveň srostlých částek krystálů  $\bar{P}\infty$ .  $OP$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$ , z nichž toliko  $OP$  leskne; celá plocha se tedy mdle třpytí. Rozměry narostlých krystálků jsou pouhým okem snadno rozeznatelný, od této velikosti, až do přenepatrných krystálků tak zdrobnělých ve svých rozměrech, že toliko silným zvětšením se spatřují, jsou všecky ostatní drobnosti zastoupeny.

Někdy jsou krystalové plátky prorostly krystaly křemene.

Na těchto tabulkovitých krystalech, kteréž jsou staršími, narostlé bývají krátce až dlouze hranolovité krystaly, kteréž ale též porůznu na křemencových drúzách neb na rudě prostě narostlé jsou.

Tvary těchto mladších barytů následující jsou:

Tvary čtverečné:

$\infty\bar{P}2$ .  $\bar{P}\infty$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$ .  $\bar{P}\infty$ .

Paterečné:

$\infty\bar{P}2$ .  $\bar{P}\infty$ .  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$ .  $2\bar{P}\infty$ .  $\infty\bar{P}4$ .



Šesterečné:

$$\bar{P}_\infty. \infty \tilde{P}_2. P. 2\tilde{P}_2. \frac{1}{3}\bar{P}_\infty. \infty \bar{P}_\infty.$$

Spojky osmičlenné:

$$\infty \tilde{P}_2. \bar{P}_\infty. \frac{2}{3}\bar{P}_\infty. \tilde{P}_\infty. P. 2\tilde{P}_2. \infty \tilde{P}_\infty. \infty \tilde{P}_4;$$

přistupuje-li ještě  $\infty \tilde{P}_3$ , povstávají spojky desaterečné, nebo jinak složené;

$$\infty \tilde{P}_\infty. \infty \tilde{P}_2. \bar{P}_\infty. \tilde{P}_\infty. \frac{1}{3}\bar{P}_\infty. 0P. \infty \tilde{P}_4. \tilde{P}_2. P.$$

Spojky jedenácti- a desítitvarné:

$$\infty \tilde{P}_2. \bar{P}_\infty. \frac{2}{3}\bar{P}_\infty. 2\bar{P}_\infty. \infty \tilde{P}_\infty. \infty \tilde{P}_4. \infty \tilde{P}_3. \infty \bar{P}_\infty. \infty P. P. 2\tilde{P}_2,$$

$$\bar{P}_\infty. \infty \tilde{P}_2. \frac{2}{3}\bar{P}_\infty. \infty \tilde{P}_4. \infty \tilde{P}_\infty. 0P. P. 2\tilde{P}_2. 3\tilde{P}_3. \tilde{P}_\infty,$$

$$\bar{P}_\infty. \infty \tilde{P}_2. \infty \tilde{P}_4. \infty \tilde{P}_\infty. \frac{2}{3}\bar{P}_\infty. P. 2\tilde{P}_2. \tilde{P}_\infty. 0P. 5\tilde{P}_5.$$

Patnácteročlenné spojky:

$$\infty \tilde{P}_2. \bar{P}_\infty. \infty \tilde{P}_\infty. \frac{2}{3}\bar{P}_\infty. 2\bar{P}_\infty. \tilde{P}_\infty. \tilde{P}_2. P. \frac{2}{3}\tilde{P}_3. 2\tilde{P}_2. 3\tilde{P}_3. 4\tilde{P}_4. 5\tilde{P}_5. 0\tilde{P}. \infty \tilde{P}_4.$$

Plochy bývají rovné a dosti hladké, někdy i značně lesklé; však některé se zvláštním leskem vyznačují a to jsou tyto

$$\text{plochy tvarů: } \infty \tilde{P}_2, \infty \tilde{P}_\infty, \infty \tilde{P}_4, \infty \tilde{P}_3, \tilde{P}_\infty.$$

$\tilde{P}_2$  bývají vždy lesklé, obvykle dosti značně a silně se lesknouce;

plochy  $\frac{2}{3}\bar{P}_\infty, 2\bar{P}_\infty, \infty \bar{P}_\infty, P, \bar{P}_\infty$  bývají vždy jemně drsné a tudíž mdlé a nelesklé; toliko  $\tilde{P}_\infty$  bývá někdy ale jen zřídka lesklá nebo pololesklá a polomdlá;

ostatní plochy  $2\tilde{P}_2, 3\tilde{P}_3, 4\tilde{P}_4, 5\tilde{P}_5$ , jsou na některých krystalech lesklé, málolesklé až i mdlé; někdy vedle jedné z této ploch lesklých leží druhá neb třetí buď pololesklá, buď úplně nelesklá a tudíž mdlá.

Krystaly nejsou souměrně vyvinuty vždycky, jak to o předešlých všech takřka pravidlem jest; zde však jest souměrné vyvinutí ploch kolem osy výminkou. Nejstáleji jeví se plochy  $\bar{P}_\infty, \frac{2}{3}\bar{P}_\infty$  vyvinuty; méně stále jest  $\infty \tilde{P}_2, \infty \tilde{P}_4, \infty \tilde{P}_3, \infty \tilde{P}_\infty$ , jež na jedné straně krystalu buď méně vyvinuty se objevují nebo zcela chybí. Velmi nepravidelně vyvinuty jsou však všechny jehlance, z kterých toliko základní přímotvar  $P$  poměrně nejpravidelněji se jeví. Nebo na některém rohu jsou vyvinuty některé jehlance na jiném ne; ba na jedné půlce téhož rohu se vyskytují nezřídka jiné tvary neb méně tvarů než na druhém, nechybí-li náhodou některý z nich nebo všechny. Takovým způsobem se objevují některé jehlance toliko v několika málo plochách, místo se všemi osmi plochami. Velmi složité spojky, jako ona uvedená z patnácti členů sestávající, kteráž by měla 80 rozličných ploch obsahovat, neobsahují všechny plochy v rovném vyvinutí ba vyhraněno jich obvykle méně, an jich částka chybí; obzvlášť ploch jehlanců pohřešuje se často.

Některé z jehlanců jsou vzácné a toliko v jediné ploše vyvinuty, jako třeba na jedné půlce rohu se objevuje  $P, 2\tilde{P}_2, 3\tilde{P}_3, 4\tilde{P}_4$  a  $5\tilde{P}_5$ , na druhé půlce však  $P, \tilde{P}_2, \frac{2}{3}\tilde{P}_3, 2\tilde{P}_2, 3\tilde{P}_3, 4\tilde{P}_4$ ; na ostatních rozích jest toliko  $P, 2\tilde{P}_2, 3\tilde{P}_3$  neb jen  $P, 2\tilde{P}_2$  nebo toliko  $P$  osamotněle vyvinuto. Z množství velikého jednotlivých krystalů prohlédnutých důkladně jest toliko z jehlance  $\frac{2}{3}\tilde{P}_3$  jediná plocha na jediném krystalu vyvinuta; z plochy  $5\tilde{P}_5$  toliko dvě plochy na dvou krystalech na každém po jednom objeveny jsou. Z toho lze soudit, jak vzácné některé tvary vůbec jsou.

Na rozích nenásledují však jehlance v pořádku jak v řadě dle vývinu svého z os následovat by měly, an mnohdy některý člen chybí. Tak na jednom rohu v jedné půlce obsaženy:  $P$ ,  $2\tilde{P}2$ ,  $3\tilde{P}3$ , v druhé půlce však  $P$ ,  $2\tilde{P}2$ ,  $5\tilde{P}5$  po přeskóčení dvou členů, na ostatních rozích ani tyto všechny plochy objeveny nebyly. Tím, jakož i nestejně velkými plochami jediného tvaru bývají krystaly mnohdy nepravidelné.

Některé větší krystaly, ačkoliv i menší, tento úkaz, třeba trochu vzácněji na sobě nesou, jsouce nepravidelně vyvinutými plochami ohraničené, poskytují pohled jakoby ze samých částek nebo nevyvinutých malých krystalů se skládaly, kteréž v zároveň srůstu skupené na místě některých ploch krystalů velkých se objevují. Některé plochy složeny jako ze samých malých krystalů v srůstu zároveň, kteréž nedokonalé se kryjíce mezi sebou mezery ponechávají, jimiž na plochách krystalu jako schůdkovitě sem a tam jako křížem křížem lámané prohlubeniny se objevují.

Místo některých ploch vyčnívají menší kousky krystalů srostlých, tak že celý krystal jako ze samých špalíčků krystalových na způsob jako zřícenina neb nedostavěná zeď nedostavěn se objevuje.

Obyčejně jsou krystaly srostlé dle osy kolmé, protož bývají častěji plochy konečné jako  $\bar{P}_\infty$  a též  $\infty \bar{P}_\infty$  prohloubené neb nevyvinuté než jiné.

Také se tím jaksi vysvětluje, proč právě bývají plochy  $\bar{P}_\infty$ ,  $\frac{3}{2}\bar{P}_\infty$ , ač rovné, předce na pohled jako jemně drsné a mdlé; nebo pod drobnohledem skládají se plochy jako struhadlo ze samých maličkých zároveň v řadách srostlých, částečně do sebe splývajících maličkých rovnoběžníků, kteréž třpytíce se všechny najednou v jistých směrech, od vyčnívajících předrobných krystálků zároveň srostlých pocházejí. Nejmenší rovnoběžníky třpytivé na plochách mdlých a nelesklých jsou asi 0.026 millimetrů široké a asi tak daleko co šířka jejich obnáší, od sebe rozešaveny.

Krystaly jsou narostlé na krystalech křemene, kterýž je někdy proniká, prorůstajíc je co starší nerost. Kaolin je buď částečně pokrývá aneb též i v maličkých chomáčkách, ač velmi zřídka, v nich vrostlý bývá. Kaolin se tvořil asi zároveň s barytem, též i před ním i po něm. Některé krystaly toliko jako by na špičkách křemene spočívaly, přirostlé jsou, protož tak zhusta ulamují se.

Kromě všech těchto nepravidelností objevují se ještě krystaly hluboko rozežrané a tak jako nahlované nějakou tekutinou, v kteréž by se částečně byly rozpouštěly, se zdají.

Též hlubší díry do krystalů vyžrané bývají, což od toho pochází, že kolem krystalů křemene, kteréž do barytu vrostlé jsou, baryt vyžrán, tak že toliko na špičkách sloupků křemene volně spočívá, tak jako kdyby nasazen byl.

Barva průhledných až poloprůhledných krystalů jest bledě pletová neb bledounce rudá, což od nepatrných částek kysličníku železitého a kaolinu pochází.

Potažná váha určena množstvím 5.21 grammy jest 4.4502. Složení lučebné dle rozboru podniknutého s 1.45 grammy látky při 100°C sušené (Jos. Špinka) jest:

|                             |   |                   |        |
|-----------------------------|---|-------------------|--------|
| Část v kyselinách rozpustná | { | rozpustná $SiO_2$ | 354    |
|                             |   | $Fe_2O_3$         | 213    |
|                             |   | $CaO$             | 025    |
|                             |   | $CaOSO_3$         | 061    |
|                             |   | $CO_2$            | 0      |
| Část nerozpustná            | { | $BaOSO_3$         | 99.097 |
|                             |   | $SrOSO_3$         | 0      |
|                             |   |                   | 99.750 |

K rozboru vybrány nejčistší krystaly toliko velmi slabounce narudlé. V tomto barytu nevyskytuje se rumělka.

Přehlednou-li se všechny tvary barytu úhrnečně, jeví se mezi nimi značný rozdíl v tom způsobu, že krystaly narostlé na ankeritu jsou čistší oněch narostlých na křemenu nebo prvé jsou velmi obyčejně čiré, druhé ale toliko průhledné až poloprůhledné a slabě zbarvené. Krystaly způsobu prvního též velmi lesklé až přelesklé bývají a vyvinuty jsou souměrně a pravidelně plnopoše; kdežto ostatní jsou sice toliko na některých plochách svých lesklé, na jiných mdlé s nepravidelně a nestejně vyvinutými plochami, jak co do velikosti tak co do počtu; mimo to i jinak nepravidelně sestavené jsou z menších krystalů.

V jednotlivých krystalech, a to opět zvláště v oněch na Ankeritu narostlých, vyskytují se krystaly obalené nebo povlečené. Jeden způsob, jak krystaly zahrnuté jinými většími vyznačeny bývají, již nahoře uveden, kde rumělka v obaleném krystalu obyčejně tvaru  $P_\infty \propto \tilde{P}_\infty$ , na plochách  $P_\infty$  vtroušena jest. Jinak bývají zaobalené krystaly obyčejně bělavě zbarveny na povrchu; nejobecnější tvar zaobaleného krystalu jest  $\tilde{P}_\infty \propto \tilde{P}_\infty$ , ať si konečný tvar obalujícího krystalu jakýkoliv jest.

Však se ale též zvláštní krystaly zaobaleny vyskytují; tak třeba v krystalu na křemenných hranolech narostlém velikosti brka a délky co prst šířky obnáší, jehož podoba se tvaru  $\propto \tilde{P}_2$ .  $\tilde{P}_\infty$ .  $\frac{2}{3}\tilde{P}_\infty$ .  $P$ , rovná, jest zarostlý uprostřed něho menší krystal podoby  $\propto \tilde{P}_2$ .  $\tilde{P}_\infty$ , tedy s plochami nikterak zcela k zevnějšku tvaru zárovnými. Zaobalený krystal vyznačen tenkou vrstvou haematitu světle rudého, kterým sice dost hustě pokryt ale předce ne tak značně, aby nebylo možno seznat, že jak vnitřní krystal tak i zevnější obalující vrstva jsou čiré.

Baryty obou způsobů bývají dvojčatně srostlé.

Dvojčatný zrůst děje se dle dvou zákonů: buď dle plochy  $OP$ , nebo dle plochy  $\propto \tilde{P}_\infty$ . V prvému způsobu jest hrana ostřejší od  $\propto \tilde{P}_2$ , — převládá-li tento hranol — lomina, obyčejně slabě, též několikrát po sobě, aneb jestli že  $\tilde{P}_\infty$  neb  $\frac{2}{3}\tilde{P}_\infty$  převládající vodorovnou hranu vytvářejí, jsou plochy v prohnutém úhlu k sobě nakloněny. Zvláštnost při tomto prvému způsobu dvojčatného zrůstu jest ta, že objeven posud na krystalech, na kterých zároveň jedna neb obě plochy  $\frac{2}{3}\tilde{P}_\infty$ ,  $2\tilde{P}_\infty$  se vyskytují. Čím rozsáhlejší místo plochy zaujímají, tím hlubší může být úhel vydutý dvojčatným srůstem povstalý; protož také krystaly na křemenech narostlé, mající zvlášť hojně plochy tyto, dvojčatnost jaksi podmiňující zastoupené, obzvlášť dvojčatně i opětovaně srostlé bývají.

Dle plochy  $\infty P_{\infty}$  se též dosti hojně srůst podvojný jeví, kterýmž plochy  $\check{P}_{\infty}$  na ostré straně své se vydutým úhlem opakují.

Na některých krystalech oba způsoby objeveny najednou, tak že ve dvou směrech os krystal prohlubené úhly má.

Co zvláštnost dlužno tu uvést, že kdekoliv se krystaly barytu na rudě narostlé vyskytují buď bezprostředně neb na ankeritu; ruda toliko ona, ložiska ležatého a sice celistvá odrůda jeho jest. Ani v semenité rudě ani v ložiskách vyšších na rudě Baryt neobjeven s jistotou, ovšem ale v žilách větších mimo ložisko rudní nalezen.

V barytu pak následující nerosty zarostlé bývají: křemen, haematit, kaolin, chalkopyrit, cinabarit, křemen jest starší barytu, ostatní s ním současné.

**Haematit** potahuje co nádech rudý povrch barytů neb i tenké vrstvičky, zároveň jistým plochám, uvnitř krystalu vytváří, není-li vůbec v chomáčkách a obláčkách krystal kalících zarostlý. Povlak krajní kyselinou lečjakou, v kteréž se snadno rozpouští, se snímá.

**Wad** pokrývá v maličkých, černých, zrnitě složených zrněčkách tečkám podobných buď některou rudu, na které však se dobře nerozeznává; nebo baryt, kterýž na krystalech křemene narostlý bývá, vyhlodaný a vyžraný, však nehojně.

**Psilomelan** pokrývá v malých korách až 1 millimetr mocných krystaly barytu z Chrbinské štolý vzácně.

**Gyps** jest v maličkých jehličkách narostlý v žilách neb na rudě úkazem vzácným, jakož i

**Melanterit** v rozpadávajícím se některém hrubozrnném pyritu. Zvlášť paměti-hodným úkazem jsou ještě tyto nerosty:

**Cuprit**, kterýž v žíle po několikráte jmenované vzácně, na žilkách bílého dolomitu, nebo ve vyžraných dutinkách žilek velmi vzácně, nebo též na pyritu co prášek neb povlak přejemný barvy cihlové usazen jest. Cuprit původu novějšího, jest rozkladem snad chalkopyritu povstálý, an zaujímá dutinky polorozloženým kyzem měděným, s černalým ještě částečně vyplněné. Vedle některých zrněk chalkopyritu, vtroušených do dolomitu a kolem nich bývá tento slabě zbarven do cihlova, což od počínajícího rozkladu pochází.

Chalkopyrit pak na povrchu svém naběhlý jest tmavomodrou, trochu duhově se měnící přejemnou vrstvičkou, což by se pro podobnost barvy

**Covellinu** připočísti mohlo, kterýž povlak přetenký skládá.

**Malachyt** pokrývá tenké pukliny v dolomitu hnědavém neb v pyritu žilovém povstalé co tenký zemitý povlak barvy jablkové, buď sám o sobě, nebo barví tenounké kory bílého calcitu zároveň s ním též takové skuliny potahujícím.

**Azurit** vedle malachitu velice vzácný v maličkých skvrnkách.<sup>24)</sup>

Z vyjmenovaných nerostů jest jen malé číslo jich hojnější a dle svého uložení v žilách určitěji známé. Jsou pak tyto nerosty hojné: dolomit, pyrit, ankerit, křemen, baryt, calcit. Mnohé z nich se několikráte po sobě vyhranovaly, jako pyrit, ankerit, baryt, calcit, tak že se v posloupnosti své v žilách jednou buď narostlé, jindy opět pokryté objevují. Vůbec nemá paragenesis nerostů takové důležitosti, jak se jí mnohdy přikládá a dá se toliko všeobecně z hruba provést, což pro poznání stáří úplně dostačuje.

Tyto pak by byly nerosty seřazené dle stáří svého, jak se objevují ve spolku s ankeritem a barytem v žilách mladších haematitu ložisko skládajících.

1. Dolomit.
2. Pyrit.
3. Ankerit.

Mladší ankeritu jest jistý pyrit, ale neznámo posud v jakém poměru, an toliko ankerit jím potažen nalezen byl, na kterém nebylo barytu.

4. Calcit.
5. Baryt.

S barytem stejného stáří jsou chalkopyrit, cinabarit, asbolan, kteréž v něm i na něm narostlé se objevují, též redruthit. Asboban pak mladší chalkopyritu se býti zdá. Snad též galenit sem náleží, což pro vzácnost jeho nerozhodnuto. Též haematit v povlacích jest s barytem stejnodobý.

Následující nerosty nejsou mezi sebou co do stáří srovnané, pokrývají však baryt; jsou to:

6. ankerit, calcit.

Do této řady snad cuprit, malachit a azurit přináležejí, jest-li že není ještě mladších calcitů.

7. Psilomelan.
8. Gyps, melanterit.

Jaký by byl asi poměr mezi křemenem a ankeritem posud zjištěno býti nemohlo, an nikde ještě oba nerosty vedlé sebe objeveny nebyly, však jisto jest, že křemen starší barytu a mladší dolomitu, kterýž by jaksi snad místo ankeritu zastupoval.

Řada skupenin, v kterýchž křemen se objevuje, pak jest asi tato, počínaje s haematitem ložiska tvořícím:

1. Dolomit.

2. Křemen

3. Baryt starší

4. Kaolin.

Kaolin se tvořil na křemenu zároveň s barytem starším, ba ještě i s mladším barytem, alespoň částečně.

5. Baryt mladší.

S ním stejného stáří jest haematit zemitý.

6. Limonit.

7. Wad.

V ležatém plástu spodního ložiska se velezřídka objevují a sice na pomezí mezi rudou a ležatým křemencem nebo částečně i místo rudy samé, velké splošklé kule bochníků podobné, kteréž složeny jsou z

křemene přepevného, barvy šedovoskové neb hnědavé, též červené. Křemen jest odrůda tak zvaná železitá (Eisenkiesel), zcela hnědou neb červenou rudou železnou prostoupena a jí zbarvená. Sloh těchto kratoučkových loží jest tence vrstevnatý, an se pásy rozličně zbarvené ve směru vrstev střídají. Na lomu jest hrubozrnný; zrnatost pochází od samých krystalů křemene vedlé sebe srostlých a jeden druhým v složní plochy stlačených; též se drobnozrnné odrůdy objevují někdy

s hrubozrnnými se střídají. Na původním místě toliko v Chrbinské štole nalezen jest tento křemen, v Chyňavě snad též zarostlý bude, an tam leckdes kusy jeho zvlášť na polích v Kamenné se nalézají.

V chyňavských kusech objevují se v ložích křemene barevného, žlty bílého křemene až na prst široké, v kterýchž někdy střední žilový pruh

**Psilomelan**-em celistvým úplně vyplněn bývá.

Zvláštní žilové skupeniny tyto sestavují se v následující řady dle stáří nerostů:

1. Křemen (Eisenkiesel) zbarvený prostoupen žilami složenými z
2. křemene bílého, v němž usazen
3. Psilomelan, mladší křemene.

### Nerosty pásma mandlovcového.

V zrnitých tufech, jakož i ve velmi drobnozrnných jest zarostlý *labradorit*, kterýž podmínuje sloh porfyrický. O labradoritu již řečeno, že v krystalech dosti značných, však více méně porušených se vyskytuje, buď se štípatelností vyznačenou s plochami slabounce dvojčatně rýhovanými, nebo lomu nerovného, polozemitého, když proměna živce značněji pokročila. Labrador, jenž snadno porušení bře, zmizí na výchozím tufu diabasových buď úplně buď zanechává v prázdných dutinách po sobě něco zemitého, kaolinu stvrdlému, podobného zbytku.

**Augit**, v některých tufech zarostlá malá zrnka barvy černé podobají se augitu, ač se zdá na některých štípatelnost příliš význačnou a toliko v jednom směru vyvinutou být, což u augitu nebývá, ale u hypersthenu.

**Calcit** prostupuje velmi často tufy v žilečkách maličkých, jakož i labrador přemalými žilečkami bílého vápence prostoupen bývá.

**Křemen** též v žilkách ale mnohem méně hojně v tufech se objevuje, též v celých větších zrnech, zvlášť na blízku labradorů, jako v Libečově v štole.

**Apatit** jest velepamátným nerostem pro pásmo tufů drobnozrnných. labradorové krystaly zarostlé v šedozeleném, velmi drobnozrnném tufu v Libečově v ležatém celého pásma, prorostlé bývají zřídka vtroušenými krátkými jehličkami krystalisovaného apatitu barvy olejové až slabě přizelenalé. Barvou svou jakož i leskem silným se snadno od slabě lesklého labradoritu rozeznávají, ještě snadněji však od zběleného porušením nelesklého a mdle polozemitého labradoritu. Největší jehličky apatitu rovnají se sloupkům mnohem tenčím vranšho brka a ony asi co prst šířky dlouhé jsou nejvyvinutější z nich. Sloupky táhlé jsou ploch dosti rovných a lesklých a jsou vyhraněné v tvarech:

$\infty P. P. \infty P2;$

hrany bývají dosti ostré. Krystaly vlastně jsou číré a toliko předrobnými táhlými krystálky nějakého zeleného nerostu, pod drobnohledem teprve patrného, jak ve všech směrech sloupky apatitu prostupujepatrného, zbarveny. Jen zřídka se již lupou seznávají větší zarostlé sloupky zeleného nerostu.

**Sideroxen** jest zarostlý v zrnkách a zrnčkách, jakož i šupinách v tufech vrstevnatých zrnitých i v břidlicích tufových, zvlášť na blízku ložisek rudních.

Zrnka barvy travové, tmavotravové až světlezelené nepřevyšují však obyčejně velikost velké viky.

V mandlovcích vtroušená pravidelně kulatá zrnka nebo mandle velikosti viky až hrachu, jakož i větší mandle a *geódy* až velikosti pěstě i malé hlavy, kterými mandlovce tak význačně sloh mandlovcový přijímají, že dle něho i pojmenovány jsou, zasluhují zvláštního povšimnutí. — Mandle malé nebo geódy větší skládají se vesměs z Calcitu.

**Calcit** vyskytuje se v tvarech dokonale kulatých velikosti viky až hrachu, zarostlý v tufech drobnozrnných šedozelenavých. Obyčejně sestává každá kulička bělavého poloprůhledného vápence z jediného krystalu, an se dle ploch nepřetržitě rovných štípe. Některé kuličky sestávají uvnitř z bělavého vápence, kterýž slabounkou vrstvou černavě neb šedočerně zbarveného vápence jako skořápkou obalen jest. Některé jsou složeny zcela z černého nelesklého vápence, snad anthrakonitu, lesku mdlého zemitého, lomu nerovného, složení celistvého.

V tufech rudých a šedorudých nebývají kuličky tak pravidelně kulovité a sice tím nepravidelnější jsou, čím hustěji v základní hmotě vtroušeny se objevují, tak že nezřídka několik kuliček dotýkajících se, splývá do jedné nepravidelné táhlé neb jako všelijak rozpoltěné podoby. Vápenec jest tolikéž bělavý. V těchto rudých tufech veskrz slohu mandlovcovitého jsou obyčejně mezi ložiskem ležatým a ložisky visutými zarostlé větší kuličky vápence čili pravé mandle a geody, asi uprostřed pásma, nebo něco blíže k ložisku ležatému než k visutým.

Geody jsou velikosti malého lískového ořechu až jablka a podob obyčejně nepravidelně kulovitých, vejčitých, obých neb hruškovitých; povrch jejich se podobá rudému tufu diabasovému, drobně mandlovcovitého slohu s zarostlými kousky sideroxenu zeleného i bez něho.

Geody složeny jsou buď z jediného nerostu, vápence totiž, nebo z vrstev několika nerostů soustředně jako kory se objímajících, mají tedy velmi vyznačený sloh geodový. Stáří objímajících se vrstev počítá se od kraje do středu. Nejstarším nerostem jest:

**Dolomit** barvy slabě přihnědlé štípatelnosti sice dosti zřetelné, hrubé, však méně zřetelné než jaká u calcitu; obyčejně však jest hnědavý dolomit lomu nerovného a slohu celistvého, nemůže tedy štěpných ploch objevovat ve svém složení ve vrstvách hrubozrnných. Vrstvy bývají  $\frac{1}{4}$  až  $\frac{3}{4}$  centimetru mocné, což se dle toho řídí, jak velká jest geoda sama. Jedna věc jest zvláštní při tomto dolomitu, že všechny větší i menší mandle kolem geod větších, v nichž tento dolomit ve vrstvě uložen jest, až do jisté vzdálenosti do rudého tufu zarostlé, sestávají vesměs z tohoto dolomitu bělavě přihnědlého, lomu rovného až nerovného a slohu celistvého. Ve větší odlehlosti pak od takových geod opět se objevují toliko mandle složené ze štěpného calcitu bílého.

Dolomit též skládá sám o sobě geody, zvlášť menší úplně, ač méně hojně než vápenec.

**Calcit**; na vrstvě dolomitu toho uložena bývá vrstva calcitu bílého průsvitného, až málo průsvitného, velmi hrubozrnného, tedy ve velkých plochách rovných se štípacího. Calcit buď vrstvu skládá na dolomitu, nebo nad vrstvou dolomitu

celé ostatní jádro geody z něho složeno jest; nejčastěji však celé geody až velikosti malé pěstě složeny bývají výhradně z tohoto hrubozrnného calcitu.

Hutnota calcitu, z geody jak ořech velké určena množstvím 1·81 grammy jest 2·7380; jiný vápenec z geody velikosti pěstě, na některých plochách štěpných pokrytý malými plátečky pyritu pak měl potažné váhy, jsa čistý (bez pyritu) 2·7476 určené 1·82 grammy.

Calcity tyto, jakož následující analysované, pocházejí z Jezovčína z výšky asi 15 metrů nad ložiskem ležatým.

Rozbor lučební calcitu z mandlí velikosti lískového ořechu (Jos. Lacina) jest:

Při 100°C sušený vápenec obsahoval 65% vody, zbytek složen:

|           |        |
|-----------|--------|
| $SiO_2$   | 1·09   |
| $CO_2$    | 41·44  |
| $Fe_2O_3$ | ·53    |
| $Al_2O_3$ | 1·05   |
| $CaO$     | 54·45  |
| $MgO$     | ·58    |
| $KO, NaO$ | sledy  |
| $HO$      | ·89    |
| $SO_3$    | ·45    |
| $PO_3$    | ·0     |
|           | 100·48 |

Jestli že v geodách velkých calcit vyhraněn bývá (Svárov šachta I.), tož tvoří velké krystaly —  $\frac{1}{2}$  R., měřící směrem os vedlejších až 5 centimetrů, jež však pokryty jsou tenkou korou hnědého zemitého limonitu, na kteréž opět calcit, ale jinak vyhraněný nebo křemen se objevuje.

Nad calcitem bílým následuje tenká vrstva 1—2 millim. mocná, složená z hnědého

**Sideritu** zrnitého, štipatelného v zrnkách lesklých; někdy, ale vzácněji vyplňuje siderit dosti zrnitý, barvy hnědé, celé jádro geody. Jen málokdy bývá tenká kora sideritu proměněna v zemité hnědý limonit, kterýž vápenec pokrývá, jako předešlý, o němž zmínka se dělá. Na sideritu spočívá:

**Křemen** poloprůhledný až průhledný, kterýž vyplňuje buď úplně jádro geod, v kterýchž tudíž toliko ve velmi stlačených krystalech se objevuje, aneb trochu volněji vyvinut je, zvláště jest-li mezi krystaly jeho, až co prst tlustými, calcit zarostlý jest. V drúzách uvnitř dutých se v těchto geodách posud neobjevil. Složní plochy jeho předrobnými dendrity

**Psilomelanu** zřídka a toliko v některých geodách pokryty bývají.

Na sideritu nebo v prostorách mezi krystaly křemene narostlý jest opět:

**Calcit**, obvykle celé jádro geody vyplňující. Vápenec tento jest předešlému zcela podobný, ačkoliv mladší onoho. V dutých geodách velkých pak narostlý na křemenu, neb v limonit proměněném sideritu, vyhraněn jest v drúzách krystalů větších —  $\frac{1}{2}$  R. až 1 cm. v průměru majících, nebo v malých krystálkách asi  $1\frac{1}{2}$  až 2 mm. širokých šedavých neb slabě hnědavých, kteréž nakupeny na sobě, dle lesku svého zdají se být trochu dolomitickými.

**Pyrit** jest co vzácnost v krystalech  $\infty O \infty$ , 1 mm. dlouhých hran, na krystálkách právě připomenutého vápence narostlý.



Přehlednou-li se všechny geody, tedy se v složení jich ve vrstvách jeví, že vývin vrstev v jistém pořádku se děl a že vápenec opětovaně po sobě následoval.

Některé geody složeny toliko z dolomitu nebo vápence, při kterémžto posledním ovšem se seznat nedá, není-li dělen právě sideritovou vrstvou, jestli jest starším nebo mladším calcitem. Ze sideritu neb křemene samotného geody složené nalezeny nebyly ještě. V těchto geodách objeveny následující způsoby složení z vrstev počínaje nejstarším a konče nejmladším.

- |              |        |              |
|--------------|--------|--------------|
| 1. Dolomit   | } nebo | 1. Dolomit   |
| 2. Calcit I. |        | 2. Calcit I. |
|              |        | 3. Siderit   |

nebo 1. Dolomit  
2. Calcit I.  
3. Siderit

4. křemen, na kterémž dendrity ještě mladšího psilomelánu narostly jsou:

nebo jiné: 1. Dolomit  
2. Calcit I.  
3. Siderit  
4. Calcit II. } zde v řadě chybí mezi sideritem a calcitem křemen.

Jiné opět: 1. Dolomit  
2. Calcit I.  
3. Siderit  
4. křemen, na němž psilomelan mladší.  
5. Calcit II.

Úplně vyvinutá řada následuje tuto, v kteréž psilomelan a pyrit do řady nenáleží, an jimi vrstvy vytvořeny nejsou:

1. Dolomit.
2. Calcit I.
3. Siderit (nebo proměna jeho v zemité limonit).
4. křemen, mladší jeho jest psilomelan.
5. Calcit II., mladší vápence jest pyrit.

Zvláštní geody se vyskytují v Jezovčíně v bělavých tufech zrnitých, nebo v šedorudých polobřidličnatých tufech, jež nebývají slohu mandlovcovitého. V tufech se objevují zarostlé menší i větší geody složené z dolomitu, obyčejně uprostřed dutého. V bělošedých tufech jest povrch kulovitých neb podlouhlých geod až velikosti velké pěstě dosti ostře od horniny omezen, kdežto ony, v rudé hornině zarostlé, buď též ostře oddělené aneb velmi pevně srostlé jsou s nejvrchnější korou z horniny sestávající.

Geody složeny na svém okraji z pevné vrstvy dolomitu, barvy světle pleťové, na kteréž do vnitř maličké krystálky, velikosti nanejvýše 1 mm. na sebe tak skupeny jsou — obyčejně ve směrech zárovných, v tenké nerovné plátky — že jimi celý střed geody tak vyplněn bývá, že se poněkud houbě mořské podobá. Mezi krystálky skupenými a celistvě krystalisovanou vrstvou krajní nebývá ostrých mezí. Buď jsou geody vyplněny zcela krystalinickým dolomitem, nebo houbovitě skupenými krystálky, nebo jest vnitřek dutý.

Dolomitové krystálky mají hutnotu 2·9388 (určenou s 1·16 grammy); dolomit malíčkými dutinami a s většími rovnými štěpnými plochami byl hutný 2·8281 (určeno s 68 gr.).

Barva slabě pleťová, podobající se v čerstvých odrůdách barvě bledě růžové, chází snad od většího množství uhličitanu manganatého, kterýž vedle uhličitanu železnatého do složení dolomitu přistupuje; nebo v krystalových skupeninách, které v dešti na vzduchu ležely, se bledě růžová barva v nahnědlou proměňuje, což počínajícího okysličování kysličníků v kysličníky manganitý a železitý původ by beře.

Ankeritu jest tento dolomit velmi blízký a svou vysokou poměrnou váhou kající se s nejmenší hutnotou, kterou ankerit mívá. Na krajní vrstvě dolomitu zena jest vrstva:

**křemene**, kterýž obyčejně, je-li geoda dutá, v málo velkých krystalech vyviněn bývá. Barva jeho bledě bělavá, krystaly pak průsvitavé, až poloprůsvitnými jsou.

Na křemenu opět uložena kora dolomitu, aneb krystaly jeho pokryty buď plně nebo částečně druznatě spojenými i též ojedinělými krystálky dolomitu, kterýž starší jest křemene, přece po celý čas vyvíjení krystalů křemenných se neustále uzoval, ba i po utvoření křemene ještě nějaký čas se vyhraňoval. Protož také jen zvláštní úkaz se pozoruje, že vrstvy křemene nebývají na všech místech stejně mocné, ba že ani nepřetržité nejsou, an místy znenáhla ukončují se ve tvrdé dolomitu samého, křemen přerůstajícího.

**Baryt.** Na křemenu neb na ankeritových skupeninách narostlý jest baryt malých krystalech. Někdy však, a to často, se pozorují větší krystaly barytu; dutiny jsou mezi dolomitěm, kterýž přerůstal, an do sebe zahrnul plátkovité skupeniny dolomitu. Dolomit kyselinou vyleptaný pozůstává po sobě dutiny v barytu, kterýmiž leptaný baryt jako vyžrán jest a v kterých jsou otisky dolomitových nádob. Krystaly bývají malé, nanejvýše 1 cm. vysoké; menší krystaly jsou důkladně vyvinuty větších, zvlášť byly-li toliko na křemenu vrostlé.

Některé v geodách objevené spojky jsou:

Spojky šestitvárné:

$$\infty \bar{P}\infty. \bar{P}\infty. \infty \bar{P}4. \infty \bar{P}2. \frac{2}{3}P\infty. \infty P\infty.$$

Osmerečné:

$$\bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty. \infty \bar{P}4. \frac{2}{3}P\infty. \infty \bar{P}\infty. \infty P. \bar{P}\infty. 0P.$$

Desaterečné:

$$\infty \bar{P}2. \bar{P}\infty. \infty \bar{P}\infty. \frac{2}{3}P\infty. \bar{P}\infty. P. \bar{P}2. 2P. 3P. \infty \bar{P}4.$$

Spojky třináctičlenné:

$$\bar{P}\infty. \infty \bar{P}2. \frac{2}{3}P\infty. 0P. \infty \bar{P}\infty. \bar{P}\infty. \infty \bar{P}4. \infty \bar{P}\infty. 2P. 3P. \infty P. P. \bar{P}2.$$

Spojky osmnáctirečné:

$$\bar{P}\infty. \infty \bar{P}2. \frac{2}{3}P\infty. \infty \bar{P}\infty. 0P. \bar{P}\infty. P. \bar{P}2. \infty \bar{P}4. \infty P. \infty \bar{P}\infty. \frac{2}{3}P\infty. 2P. \infty. 3P. 4P. \bar{P}3. \bar{P}4.$$

Krystaly jsou vesměs ploch rovných, hladkých a silně lesklých; malé krystaly zvlášť přesilně lesknou se, až na plochy 2P, 3P a 4P, kteréž jen málo

lesklé a vodorovně rýhované bývají. Z ostatních ploch toliko  $\frac{3}{2}\bar{P}\infty$ , ač velmi lesklá bývá, přeslabě přetržitě čárkována vodorovně.

Krystaly jsou vesměs souměrně vyvinuty kolem os svých; z ploch, z nichž nebývá žádná větší na úkor druhé, nechybí žádná, tak že třeba v spojení osmnáctičlenné všech 94 ploch vyvinuto, aniž by některá chyběla, až na ty plochy ovšem, s kterými krystal narostlý jest.

Tím pamětihodnějším jest to, že nalezen ve velkém množství vyhraněných Barytů krystal devítitvárný spojený z těchto členů:

$$\infty \bar{P}\infty. \bar{P}\infty. \infty \bar{P}4. \frac{3}{2}\bar{P}\infty. \bar{P}\infty. \bar{P}2. \infty P. \infty \bar{P}\infty. 5\bar{P}5;$$

kteréž všechny plochy souměrně vyvinuty měly, až na tvar  $5\bar{P}5$ , z kteréhož toliko jediná velká plocha se objevovala osamotněle. Úkaz ten jest ale mimo to tím památnějším, an v těchto barytech ani jediná známka jehlanců z řady  $m\bar{P}m$ ,  $m > 1$  objevena nebyla.

Mimo to i to zvláštní jest, že plochy  $\infty \bar{P}4$ , obyčejně podřízené jiným co do velikosti, na některých krystalech nad plochy  $\infty \bar{P}2$  vynikají.

Krystaly veskrz čiré jsou; v některých hojně zarostlé jednotlivé krystálky přemalé od cinabaritu nebo chomáčky krystalů ve směrech neurčitých. Též na dolomitu bývají zrněčka rumělky vtroušena. V některých barytech zrnka chalkopyritu zarostlá jsou toliko po různu.

Všecky geody nalezené tohoto druhu jsou složené buď z dolomitu samotného nebo z dolomitu a barytu v této řadě dle stáří svého:

1. Dolomit (Ankerit).

2. Baryt.

V geodách, v kterých všechny nerosty zastoupeny jsou, objevují se v této řadě:

1. Ankerit.

2. křemen.

3. Baryt, s kterým jsou cinabarit a chalkopyrit soudobého povstání.—

V zrnitých, pevných, šedorudých tufech diabasových, jak se s velikou pravděpodobností zdá, v pásmu mandlovcovém mezi ložiskem ležatým a ložisky visutými, jsou ve Svárově na jednom místě uloženy žíly rudní. Místo toto jest v severozápadní stráni, roh karabinského vrchu tvořící mezi průsekem, od Vojtěšské stoly do údolí Kačického potoka vedoucím a mezi palouky severně od Rejnovského mlýna se rozprostírajícími. Od Rejnovského mlýna jest to místo asi 400 metrů k severu vzdáleno nad nejnižší štolou do Karabinského vrchu hnanou.

Žíly, uložené do tvrdého hrubokrystalinického tufu, kterýž, ač hnědošedý a šedorudý, ve své hmotě nicméně hojně v něm zarostlými zrny vápence a psilomelanu do tmavohněda zbarven jest, jsou krátké, směrem asi od východu k západu se rozprostírající a ne velmi příkře k jihu se klonící.

Od mocnosti největší, která asi  $1\frac{1}{2}$  decimetru obnáší, se hojně až na pouhou rozsedlinu stlačují; žil snad jest jedna neb dvě s mnohými odžilkami. Nejmocnější části žil složeny částečně z jalové rozmělněné horniny, v kteréž uloženy jednotlivé závalky neb žíly psilomelanu.

**Psilomelan** v závalkách v žilách vtroušený velikosti předrobné až takové, kteráž se malé hlavě rovná, jest ledvinovitý neb hroznovitý, povrchu hnědého,

uvnitř však lomu rovného barvy černomodré až černé, slohu celistvého, lesku mdlého, zvlášť je-li polozemitý, až slabě třpytivého. Vryp nožem udělaný leskne se značněji.

V žilách co plocha uložený nerost jest též povrchu hroznovitého, jestli okolní hornina povolná, jinak ale jest v žilách jednotlivých mocnějších až 7—8 centimetrů mocných, neb slabých, rozvětvlujících se, vrostlý.

Psilomelan ve vodě vyvíjí značné množství přemalých bublinek ze sebe, ač na pohled zcela souvislým a nepronikatelým se být zdá.

Hutnota jeho určena jednou s kousky vybranými 1.98 grammů těžkými byla určena s 3.6891 s nerostem prostým všech bublin.

Po druhé vzaty též vybrané kousky 3.73 grammy těžké, jejichž hutnota byla tak jak byly 3.7191; prosáknut-li ale psilomelan po vyjítí všech bublin úplně vodou, obnášela potažná váha jeho 3.8024; tedy v něm dle objemu obsaženo dírek nepatrných vzduchem proniknutých 2.19 %.

Pouze z nízkého čísla, hutnotu vyznačujícího, seznává se, že Psilomelan méně čistý odrůd z jiných nalezišť, jejichž potažná váha mezi čísly 4.1 až 4.2 obsažena jest.

Složení psilomelanu z vybraných čistých kousků při 100°C sušených ustanovené jest toto:

*a* (Jan Vonka), *b* Jos. Novák, *c* (dr. Gust. Müller).

nerozpustný zbytek sestávající z převládajícího

|                             |            |        |        |        |
|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|
| množství                    | $SiO_2$    | 2.71   | 3.59   | 6.02   |
|                             | $Mn_2O_3$  | 53.23  | 49.48  | 45.045 |
|                             | $Fe_2O_3$  | 18.41  | 22.57  | 3.320  |
|                             | $CuO$      | .63    |        |        |
| $CoO + NiO$                 |            | .45    | sledy  |        |
|                             | $BaO$      | 8.57   | 5.82   |        |
|                             | $CaO$      | 4.19   | 4.77   |        |
|                             | $MgO$      | 1.55   | 1.23   |        |
|                             | $KO (NaO)$ | .47    | 6.50   |        |
|                             | $HO$       | 6.10   | 5.48   | 1.025  |
| $CO_2$ , <i>O</i> a schodek |            | 3.69   | .56    | 7.317  |
|                             |            | 100.00 | 100.00 |        |

Má se za to sice, že psilomelan obsahuje kysličník manganičitý, zde ale udán toliko kysličník manganato-manganitý, jelikož v tomto způsobu vážen byl.

Nápadné jest množství železa obsaženého v psilomelanu, ač nejisto, zda li v něm co kysličník železnatý nebo železitý obsaženo jest; spíše se zdá, že v sloučenství co  $FeO$  by obsaženo býti mohlo, nebo v rozboru *c*, kdež málo železa nalezeno jest více *O* než v předešlých; neshoda ta snad pochází od toho, že započítáno železo do analyzy co  $Fe_2O_3$ .

Být by i železo co  $FeO$  v nerostu obsaženo bylo, přece roztok v kyselině solné obsahuje železo co  $Fe_2O_3$  rozpustné, an se účinkem kyseliny solné na sloučeninu manganu chlor vyvíjí, kterýž okysličení kysličníku železnatého v železitý zprostředkuje.

Též množství vápna jest velké v psilomelanu, kterýž vůbec má měnivé sloučenství.

Malé částky  $\text{CuO}$  a  $\text{CaO}$  ( $\text{NiO}$ ) určeny v množství 59.59 grammů nerostu.

Některý psilomelan zdá se být úplně proniknut buď vápencem čistým nebo dolomitickým, neboť v jedné odrůdě nalezeno, když byla při  $100^{\circ}\text{C}$  vysušena:

d (Jos. Pich).

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| nerozpustného zbytku    | 14.48  |
| $\text{Mn}_2\text{O}_3$ | 39.88  |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 2.13   |
| $\text{BaO}$            | 10.64  |
| $\text{CaO}$            | 10.97  |
| $\text{MgO}$            | 2.48   |
| $\text{KO}$             | 6.30   |
| $\text{CO}_2$           | 3.63   |
| $\text{HO}$             | 6.18   |
| ztráta (O)              | 3.31   |
|                         | 100.00 |

Jestli že všechna kyselina uhličitá sloučena jest toliko s vápnem, tedy by ho dle tohoto rozboru bylo v nerostu 8.25 % přejemně vtroušeno (patrně zarostlý nebyl calcit v kouskách k analýsi vybraných) a mimo to by ještě asi 6 %  $\text{CaO}$  zbylo, kteréž v psilomelanu jinak sloučeno jest, než s kyselinou uhličitou co vápenec jemně rozptýlený.

V psilomelanu, v některých pramalých skulinkách pozorují se jehličky krátké, neb sloh hrubě a krátce vláknitý; jehličky jakož i vláčenka krátká jsou:

**Pyrolusit** měkký, černý; krystaly shodují se s krystálky pyrolusitu vůbec a zvláště s oněmi, kteréž z jiných nalezišť též v takové drobnosti se vyskytují. Ač pyrolusit nikde mimo skulinky velmi vzácné patrný není, jest nicméně možno, že se v psilomelanu jemně rozptýlen nachází a jednou z příčin, ovšem méně patrných jest, proč sloučenství nerostu tak proměnlivé bývá.

**Calcit** jest hojněji předešlého zarostlý v psilomelanu v maličkých čirých zrnčkách a zrnkách dokonale štípatelných a lesklých. Ač i zrnka calcitu toliko zřídka se objevují zarostlé, zdá se, že vápenec jest druhou a to hlavní příčinou měnivého sloučenství psilomelanu, nebo analýsy vedou k tomu, jako by velmi jemně v nerostu rozptýlen byl.

**Haematit** zarostlý buď v pramalých proužkách nebo ve větších kusech barvy rudé, slohu ledvinovitého na povrchu; nápadně podoben jest červené rudě některé z ležatého neb visutého ložiska rudního, v kterémž též ledvinovitě odloučené kusy rudy se objevují.

Mimo ty nerosty vrostlý do psilomelanu též v křafoučkových žilkách dolomit nahnědlý.

**Dolomit** jest vlastně starší psilomelanu a vyskytuje se na okrajích žil psilomelanových co starší vrstva vyvinut, ovšem ne tak hojně jako černá ruda sama; nicméně však se též v ní samé zarostlý objevuje. Dolomit hrubokrystalinický hnědne na vzduchu nápadně.

Ledvinovité neb hroznovité kusy psilomelanu v žilové jalové hornině zarostlé

bývají pokryty na povrchu vrstvičkou slabou (nanejvýše 1 millimetr mocnou), šedě-hnědávého tufu vápeného, jako náryp na povrchu bradavičkovatého. Trhlíny tufu diabasového bývají pokryty tenkou kožkou psilomelanu a tufu vápenatého hojně, buď obojími společně nebo každým zvlášť.

Jak se zdá, nerozprostírají se žíly psilomelanu do hloubky; an se dle pohledu do větší hlubiny vytrácet a súzovat zdají.

Řada nerostů žíly skládající se sestavena dle stáří jest asi tato, nepočítaje v to jalovou horninu, kteráž po tufu diabasovém stěny žil tvořícím nejstarší jest:

1. Dolomit.
2. Psilomelan, v něm pyrolusit převzácný stejnodobého původu.
3.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Haematit} \\ \text{Calcit} \end{array} \right\}$  zarostlé, aniž udat lze, který z nich starší.
4. Calcit, co tuf neb z vody usazené kory.

### Rudonosné pásmo d<sub>1</sub> v okolí Pražském.

Po dlouhé přestávce jeví se rudonosné pásmo zmizevší u Červeného Újezda pod útvarem křídovým opět východně od Ruzyně, kdež se objevují zase ležaté křemence v uložení velmi porušeném mnohými rozsedinami, jako severozápadně od Liboce, na počátku šárecké rokle vlčí.

Směrem k východu se křemence, kteréž nejsou mohutně vyvinuty, vytrácejí nebo v Šárce, severovýchodně od Jenerálky na silnici k černému Beránku, kde skály dobře skryty jsou, jich více není.

Tím mocnější jsou v Šárce vyvinuty mandlovce a břidlice, jež oboje ve dvou mocných pásmech se objevují. Pásmo mandlovců rudonosných nižší, kteréž bezprostředně na azoické břidlice pásma *B* přilehá, nezasluhuje jména mandlovců než toliko ve své visuté části, an část střední se z tufových břidlic a tufů diabasových, ležatá pak ze zvláštních drobových břidlic skládá. O ležatých břidlicích prvního pásma tufů rudonosných nemožno tvrdit, ani že jsou drobovými aniž tufovými; pevné břidlice barev špinavošedých, špinavohnědých, zelenavých jsou zrna velmi jemného a břidličnatosti velice dokonalé. Mezi břidličnatými vrstvami se vyskytují vrstvy napolo tufovým diabasovým břidlicím podobné, an v rudé základní hmotě šedozelenavé rozdrolené ostrohranné kousky špinavě šedozelenavých jemných břidlic hojně vtroušeny jsou; neb jsou v základní hmotě pestré červenozelenavé úlomky šedorudé a zelenavé vrostlé, tak jak se to v některých břidlicích okolí Svárova též, ale mnohem vzácněji objevuje. Těmito břidlicemi slohu brecciových tufů diabasových jest poznenáhly přechod mezi ostatními břidlicemi jednobarevnými do pravých tufů diabasových, jakož i do těchto drobových břidlic uskutečněn.


V střední a visuté části tohoto pásma jsou zastoupeny všechny jen možné odrůdy tufů mandlovcových, polovrstevnatých a hrubovrstevnatých. Břidlice tufové dosti pevně střídají se s tufy beze všeho pořádku; na některých místech tvoří tufy zrnité visuté tohoto pásma, na jiných opět břidlice barvy hnědavé a to ve vodorovných i kolmých odlehlostech mnohdy dosti nepatrných. Břidlice jsou hnědavé, šedorudé; tufy vrstevnaté pak drobno- až hrubozrnné dokonale a nedokonale břidlič-

naté, pestré i jednobarevné. Tufy zrnité pak jsou drobné až hrubozrné bělavé, šedozelenavé, rudé, slohu zrnitého neb mandlovcovitého, zřídka též i porfyrického od zarostlých labradorů. Buď jsou mezi břidlicemi zrnité tufy uloženy ve vrstvách ostře oddělených bez přechodu, neb se břidlice do zrnitých tufů rozličných slohů mění, jak ve směru přímém, tedy z jedné vrstvy do druhé, tak i směrem vlaku vrstev samých. Ležaté břidlice polodrobové i polotufové tohoto pásma svou pevností vyznamenány, skládají levý sráz úvalu Šáreckého východně a západně od dvoru Jenerálky, visuté pak tufy pravý sklon. Mnohými rozsedinami je celé pásmo vržené hojně, a složen též pravý sráz úvalu kolem sv. Matěje z ležatých břidlic a tufů.

V tvrdých břidlicích uloženy jsou porfýry rozličné na způsob ložisek mezi vrstvami. Buď toliko základní hmota barvy pletové neb šedavěružové skládá celý porfýr, nebo v ní spoře malé krystaly křemenné vtroušeny jsou; nebo jest vyloučenými malými krystaly živce nějakého, velmi zřetelně porfyrického slohu. Živce nezřídka bez lesku a úplně bílé a měkké jsou, an se v kaolinovou hmotu snadno rýpat dají. Na silnici od Jenerálky k černému Beránku jest nevysoko nad hranicí s břidlicí pásma *B*, blízko malého můstku zděného, vloženo lože porfýru asi 4 metry mocného v břidlicích ležatých pásma rudonosného. Jakkoliv dle uložení by se za to mít mohlo, že porfýr tento, chudý na vrostlý křemen, jest ložiskem, zdá se tomu přece okraj, jeho skládající se z breccii porfýrových a břidlicových odporovat, a spíše k tomu to poukazuje, že porfýr snad uložen v žíle na způsob ložiska. Nebo pravá ložiska nikoliv na okrajích svých z breccii nesestávají. U sv. Matěje též několik takových porfýrových hornin uloženo jest, v srázích příkrých; pro nedokonalé odkrytí ale ničeho více známo není o uložení.

Obr. 5.

Údolí Šárecké.



Průřez od severu k jihu západně od Jenerálky skrz prvou zmolku na severním svahu úbočí.

*t* a *t* je pásma tufů diabasových ležatých; *b* jsou černé jemné drobové břidlice; *m*: mandlovec zelenavý a rudý, v kterých nesouvislé ložiska rudy *r*, *r* uloženy jsou, po ležatých rudě štola hnána jest.

až 5° 6', úklon 18°—25° k jihu. Mocnost celého pásma ležatých tufů rudonosných okolo Jenerálky jest asi 3¼ sta metrů.

Visuté spodních tufů složeno jest z černých, jemných, dokonale břidlicnatých a tence vrstevnatých břidlic drobových, kteréž se podobají oněm již ve Svárovské části popsáným. Vlak břidlic měřen v údolí Šáreckém kolem silnice z Dehnic

Ve visuté části toho pásma jsou v první zmolce pravé straně, jihozápadně od Jenerálky, tufy rozličné, mandlovcovité, porfyrické a zrnité uloženy, v kterých asi ve dvou rozličných vlnách slabé lože (asi 1¼ decimetru) celistvé nebohaté rudy nepravidelně uloženy jsou; an ruda celé souvislé ložisko neskládá, nýbrž toliko velké čočky nebo i pouhé závalky (obr. 5.). Ložiska se nacházejí blízko na hranici pásma tufového s visutou černou břidlicí

V ležatých břidlicích tufových určen severně od Jenerálky u Dufkovky vlak směrem 5° 7', úklon 45° k jihu; jižně odtud na hranici visuté jest směr 4° 9°

z Jenerálce směrem  $3^h 8^0$  až  $4^h 10^0$ , úklon k jihu  $5^0$  až  $29^0$ . Mohutnost břidlic nejvyšších v údolí místa nižší obnáší asi  $3\frac{1}{2}$  sta metrů.

Na černých břidlicích spočívá opět mohutné pásmo tufů diabasových, kteréž v celé mohutnosti své na silnici z Jenerálky do Dehnic vedoucí, počínaje v oklikách vystupující silnice, až k statku na Beránku odkryty jsou podél celé silnice. Ležatý tl tufů jest složen z pevných velmi hrubovrstevnatých, drobnozrnných, špinavě zelenavých, hnědozelených neb tmavošedozelených hornin tufových velmi mírně k jihu nakloněných. Visutá část počínajíc nad polovičkou mohutnosti celého pásma jest na východním svém velice zkypřená, barvy šedorudé, sem tam s břidlicemi hrubozrnnými i drobnozrnnými, jak rudými tak i bělavými se střídající, sklon jest mírný k jihu, značněji předešlého. Podobnost těchto tufů šedorudých, slohu ne-  
lokonale mandlovcovitého k oněm z rudonosných pásem Svárovsko-Chrbinským jest nápadná.

Také ve visuté části poměrně nehluboko pod visutým ukončením mandlovců jest ložisko rudy vloženo. Jakkoliv i na silnici silnějším barvivem místo, v kterémž se ložisko vleče, naznačeno jest, i ač na temně vrchu jižně od Zlatnice a severně od Pernikářky asi v polovici cesty sem a tam slabá krátká ložiska nebohaté rudy spoře uložena jsou: přece nikde není ložisko rudní trochu rozsáhleji vyvinuto jako na Červeném vrchu u Vokovic, ba zde též po krátkém dolování všude práce v ložisku opuštěna.

Místo, kde hlavně ložisko otevřeno bylo v rudých břidličnatých, bílých a šedorudých mandlovcích, jest na Červeném vrchu asi ve středu cesty do půl kruhu zahnuté, kteráž z Veleslavína na Červený vrch vycházejíc, zde se ukončuje. Místo to jest též asi uprostřed směru mezi západní částí Vokovic a Pernikářkou (v Dehnicích).

Ložisko sestávající z předlouhých táhlých menších plástů asi jako ohromné bočky uložených, nabývalo mohutnosti až více čtyř decimetrů, bylo ale též až 1 metr mocné otevřeno, nalezeno ale též velmi často méně mohutné této míry. Ruda byla celistvá, v skulinkách na východním nepatrně nažloutlá od limonitu neb na-  
bělená od kaolinu; velmi bohatá nebyla. Směr vlaku jejího určený z map bání opuštěných jest  $5^h 12^0$ , úklon  $33^0 50'$  k jihu. Číslo tato jsou tím důležitější, a zasluhují toho, zachována býti, an nikde jinde se pro zkypřelost vrstev v tomto pásmu, ni vlak ni úklon s dosti malou pravděpodobností určit nedá.

Tak jako u Svárova je zde ložisko rudní vržené trhlínami. V jedné takové trhlíně nalezeny zarostlé v zkypřelém tufu diabasovém zcela vybledlém krystaly, až co malý ořech veliké, na nichž obecný tvar pyritu (dvanáctisten = kyzotvar) vyvinut byl. Barva dosti lesklého povrchu krystalů černošedá, kde právě odkryta byla; jinak ale povrch tenounkou vrstvičkou zeleného malachitu potažen. Na prvý pohled se seznalo, že krystaly nejsou pyrit, ač tvar jeho znázorňují. Nožem řezány daly se dobře krájet, řez leskl se tak jako redruthit, tak že není pochyby, že to krystaly redruthitu v tvarech po pyritu jsou, zajisté velmi památný úkaz proměny pyritu v redruthit. Hmota nerostu není úplně celistvá, an uvnitř vtroušeny malé částičky limonitu, teprve pod lupou dobře rozeznatelné, což jest i příčinou, proč potažná váha určena s jedním krystalem, asi co ořechové jádro velkém (5 až 6 gramů), byla tak nízká  $4\cdot 10$ , an redruthitu vlastně něco více než číslo 5 přiná-



leží. K úplnému zjištění totožnosti nerostu s redruthitem analysován kvalitativně a seznán co takový, ač vedle mědi i dosti značná částka železa, pocházející z jemně vtroušených částek limonitu se objevovala.

Mohutnost celého visutého pásma tufového rudonosného jest asi 400 metrů.

I toto pásmo druhé pokryto černými, jemnými břidlicemi tenko vrstevnatými, téhož rázu jako ony v ležatém jsou; tak že vlastně celé ohromné lože tufové do břidlic samých vloženo jest.

Visuté černé břidlice drobové veletence vrstevnaté, opět pásmo rudonosných mandlovců pokrývající, ukončují celý útvar pruhu  $d_1$  v mohutnosti asi 100 metrů, an ve visutém svém, střídají se tenkými vrstvami křemence, kterým do visutého mohutnosti přibývá, až posléze zcela v souvrství křemencové pásma  $d_2$  splývají, ukončují se tím způsobem, že střídajícím se opět s křemenci vrstvám břidličnatým až do vytracení se úplného, mocnosti ubývá.

Celé pásmo  $d_1$ , jakož i ohromné lože mandlovců podstatnou část v něm skládající se dá od tohoto místa mezi Třešovicemi a Jenerálkou, kdež poměrně nejlépe odkryta jest, tab. III. obr. 5., dále k východu, až k Vltavě jak údolím Šárky tak i částečně na návrší sledovat, kdež ale na přemnohých místech pokryto jest buď pískovci křídového útvaru nebo mocnými vrstvami hlín.

Že v této části mnohdy značně vrženo, nebo jinak ve svém uložení porušeno jest, již zmíněno a toliko jediný doklad dostačí o nepravidelném uložení pojem si sdělat, že břidlice mezi oběma pásmy mandlovců uložené u Zlatnice v Šárce směr  $7^h 8^o$  a úklon  $51^o$  k jihozápadu mají. —

Na druhém břehu (pravém) Vltavy táhnou se toliko mandlovce a pokrývající je černé břidlice Trojí a Ovencem na temenu a úpatí k Vltavě se klonícím až ke Kobylisům a Libni.

Z celého pásma  $d_1$  zde uloženy toliko mandlovce pásma ležatého a břidlice visuté.

Na jednom místě v malých Holešovicích, u Popelářky a jinde, jsou tufy dosti dobře odkryty, ač nemožno je až k ležatému svému, kteráž bezpochyby bezprostředně na buližníku spočívá, sledovat. Tufy jsou tytéž jako na všech jiných místech, tedy od rudých břidlic počínaje až do hrubozrnných tufů. Památka však jest jedna vrstva tufu tvrdšího, kteráž zarostlými, dosti ostrohrannými kusy porfýru, barvy pleťové, jak onoho, který v Šárce se objevuje na původním místě, vlastně v breccii se proměnivší, nad ostatní v holých neb poloholých stráních vyčnívá.

Mohutnost pásma, jehož ležaté není zcela odkryto, zajisté jest vyšší 160 metrů.

V mandlovcích jest ruda velice po řídku v slabounkých ložích nebo toliko závalkách, slohu celistvého, vtroušena; některá místa rudou toliko jako zbarvena se objevují. Určitého místa slabé, krátké vrstvičky rudy celistvé nezaujímají nikde.

Pokrývající břidlice černé jsou ostatním z jiných míst dosti podobny, a ač o něco málo méně jemnými jsou ostatních, nepozbývají tím nic méně velmi dokonalé břidličnatosti a tenkovrstevnatosti. Jedině tím se od ostatních nápadně liší, že se lámou v dlouhé tenké roubíky, že tedy mimo lom dle vrstevnatosti ještě příčným lomem vyznačeny jsou. Vlák jejich jest u Popelářky a v Troji severně od cihelny, na silnici ke Kobylisům ležící (severně od Zámečku),  $5^h 3^o$  a  $5^h 5^o$ , úklon  $64^o$  a  $55^o$  k jihu. Mocnost celého pásma, počítaje ji od visutých křemenců pásma

, jak pod Zámečkem směrem  $5^{\circ}$  a  $5^{\circ} 10'$  a úklonem  $63^{\circ}$  a  $54^{\circ}$  k jihu vyvinutý, jest něco méně  $4\frac{1}{2}$  sta metrů.

V Troji toliko jediné pásmo mandlovců a sice ono, kteréž ležaté vytvořuje, oženo jest; visuté pásmo, jenžto ve Vokovicích přece v tak značné mocnosti vinuto se spíše zcela vytratí, nepřechází tedy až do Troje.

Za Trojí k východu jest pásmo  $d_1$  s velikou věrojatností na jih vrženo a se asi okolo tří set metrů ve směru vodorovném; nebo tak se dá soudit z holé šály u Tirolky a Bulovky, naproti dělostřeleckému terči na pláni Holešovické, kteráž proti skále složené tolikéž z křemenců pásma  $Dd_2$ , ona v malých Holešovicích, na níž Zámeček stojí a k jihu pošinuta je značně. Tab. IV. obr. 6. jest řezem skrze Troji.

Důležitosti, kteráž by s rudonosností mandlovců souvisela, nemají vrstvy sama  $d_1$  v okolí Pražském uložené nížádného. —

Též nerostů jest v těchto místech velice málo známých, což buď s přirozenou udobou pásem, nebo s nepatrným odkrytím a chyblivým rozděláním práci báňskou uvísl. Rudé zrnité, železité křemeny (Eisenkiesel) se nalézají dosti hojně vedle alých kousků rud celistvého haematitu sem a tam na polích jakož i v roklích; nonit jest mnohem vzácnější haematitu a toliko řídce v Troji nalezen, podobá se tomu z Hrbku a Dobrotivé velmi; calcit jest v mandličkách a slabých žilkách v mandlovcích hojný, též žilky křemene se objevují jakož i labrador krystalovaný a porrický sloh tufu podmínující, ovšem též zrušený jako onen z Libečova, jemuž se dle míru podobá, tolikéž slabounké žilky koalinu a dendrity psilomelanu jsou asi ecky známé nerosty tohoto pásma. Ani sideroxen, kterýž přece ve Svárově častý není, se zde nenalézá v hojnosti mírné, nýbrž jen spoře v zrníčkách malých, což i dolomit v přemalých druzích.<sup>25)</sup>

**Přehled všech nerostů vyskytnuvších se až posud v pásmu mandlovců rudonosných dle způsobu seřazené, jakým se objevují.**

| Číslo |                       | zarostlý<br>v rudě | narostlý<br>na rudě | v žilkách, jak<br>rudu tak i<br>pásmo man-<br>dlovců prorá-<br>žejících | v geodách<br>pásma man-<br>dlovců | zarostlé do<br>tufů diaba-<br>sových |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Haematit . . . . .    | †                  |                     | †                                                                       |                                   |                                      |
| 2     | Siderit . . . . .     | †                  | †                   |                                                                         | †                                 | †                                    |
| 3     | Limonit . . . . .     | †                  | †                   |                                                                         | †                                 | †                                    |
| 4     | Chamoisit ? . . . . . | †                  |                     |                                                                         |                                   |                                      |
| 5     | Psilomelan . . . . .  |                    | †                   | †                                                                       | †                                 |                                      |
| 6     | Pyrolusit . . . . .   |                    |                     | †                                                                       |                                   |                                      |
| 7     | Wad . . . . .         |                    | †                   |                                                                         |                                   |                                      |
| 8     | Asbolan . . . . .     |                    |                     | †                                                                       |                                   |                                      |
| 9     | Cuprit . . . . .      |                    |                     | †                                                                       |                                   |                                      |
| 0     | Dolomit . . . . .     |                    | †                   | †                                                                       | †                                 | †                                    |
| 1     | Calcit . . . . .      |                    | †                   | †                                                                       | †                                 | †                                    |
| 2     | Ankerit . . . . .     |                    | †                   | †                                                                       |                                   |                                      |

| Číslo |                       | zarostlý<br>v rudě | narostlý na<br>rudě | v žilách, jak<br>rudu tak i<br>pásmo man-<br>dlovců prorá-<br>žejících | v geodách<br>pásma<br>mandlovců | zarostlé do<br>tuftů diaba-<br>sových |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 13    | Malachit . . . . .    |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |
| 14    | Azurit . . . . .      |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |
| 15    | Baryt . . . . .       |                    | +                   | +                                                                      | +                               |                                       |
| 16    | Solenit . . . . .     |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |
| 17    | Labradorit . . . . .  |                    |                     |                                                                        |                                 | +                                     |
| 18    | Augit ? . . . . .     |                    |                     |                                                                        |                                 | +                                     |
| 19    | Kaolin . . . . .      |                    | +                   | +                                                                      |                                 |                                       |
| 20    | Křemen . . . . .      | +                  | +                   | +                                                                      | +                               | +                                     |
| 21    | Sideroxen . . . . .   | +                  | +                   |                                                                        |                                 | +                                     |
| 22    | Apatit . . . . .      |                    |                     |                                                                        |                                 | +                                     |
| 23    | Melanterit . . . . .  |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |
| 24    | Pyrit . . . . .       |                    | +                   | +                                                                      | +                               |                                       |
| 25    | Chalkopyrit . . . . . |                    | +                   | +                                                                      | +                               |                                       |
| 26    | Redruthit . . . . .   |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |
| 27    | Cinabaryt . . . . .   |                    | +                   | +                                                                      | +                               |                                       |
| 28    | Covelin ? . . . . .   |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |
| 29    | Galenit . . . . .     |                    |                     | +                                                                      |                                 |                                       |

## B. Růdy pásma d.

**Otevření ložiska.** Ložisko Nučické vychází na přemnohých místech na den, jakož i na mnohých místech dolovou prací otevřeno jest.

K otevření a sledování ložiska následující přípravní otvory dolové učiněny, počítaje od západu k východu:

Od východního konce stavení Vražských, 815 metrů úplně na sever, pod jižním svahem západního výběžku vrchu „Hřebenem“ zvaného, jest po vlaku rudy výskumní štola zaražena. Též možno místo štolové také tímto způsobem určit: pod jižní patou vrchů, severně od Vráže se táhnoucích, vleče se úzký pruh potůčkem zavlažovaných palouků, vedlé úpatí od západu k východu; ještě než se palouky k cihelně Vrážské přibližují, vybíhá z nich úzký dlouhý pruh travnatý na sever, na jehož konci štola zaražena jest. Od cihelny jest štola na severozápad umístěna.

Na jižním svahu vrchu Blejskavy východně od Chrutenic, kde les s polmi se stýká, an od Chrutenic počínaje se směrem silnice z Loděnic do Hořelic vedoucí severozápadní vzdálenosti 400—200 kroků dosti zároveň běží, jsou tři stoly zaraženy. Dvě stoly jsou ze silnice vidět a nalézají se vesměs na jižní mezi lesa, který se zde „v Hlubokém“ nazývá. Nejvýchodnější štola číslo II. jest od místa, kde cesta z Chrutenic do Nučic vedoucí silnici přeráží na severozápad na kraji lesa. Nejzápadnější štola číslo III. jest od této stoly něco málo více než 600 metrů směrem k Chrutenicům, opět na kraji lesa zaražena; štola I. jest uprostřed mezi nimi něco výše v lese samém na cestě lesní, která z Chrutenické cesty vybočuje.

Jižně od silnice z Loděnic do Hořelic asi ve dvou třetinách celé délky jest štola do jihozápadního svahu vrchu Krahulova vehnána. Ústí stoly jest velmi blízko na západ od toho místa, kde se cesta z Chrutenic do Nučic dělí v jinou cestu, kteráž se opět rozštěpuje na dvě, jednu pro Mezouň a druhou pro Loděnice.

Od tohoto místa asi v půlce, než se cesta z Chrutenic do Nučic s onou z Hořelic do Mezouně křížuje, jest od cesty pod Krahulov opět štola zaražena.

Na ukončení železnice z Hořelic v Nučicích jest štola Nučická asi k severu prohnána. Mimo to ložisko otevřeno mnohými lomy denními, o kterých se prospěšněji až při vypsání výchozího zmíniti dlužno.

### Rozprostírání se rudy, jakož i mocnost její.

**Délka ložiska** dle vlaku svého jak posud pracemi zjištěno, obnáší asi něco více než 15 kilometrů neb 1½ myriamétru, kteráž délka se dvěma našim mílům vyrovná. Ani západní, tím méně východní konec ložiska znám posud.

### Rozprostírání a mocnost ložiska.

Ložisko rozprostírá se od východních hranic Berounských, obcí Vražskou, Loděnickou, Chrutenickou, Nučickou, Jinočanskou, Třebonickou, Řeporyjskou, až do pozemků Stodůlských. Kdyby se směr ložiska od Berounského východního pomezí, až do Stodůleckých pozemků, kde asi oba nejkrásnější cípy ložiska, západní i východní známé jsou, naznačil přímou čarou, tvořil by směr její se směrem poledníka úhel  $4^{\circ} 4'$ , což by též i hlavní vlak ložiska celého byl. Porovná-li se směr tento s poledníkem magnetickým, tu by ovšem se v směr  $5^{\circ} 1'$  až  $5^{\circ} 2'$  proměnil. Úklon ložiska po celé délce vlaku svého jest jižní (vlastně jiho-jihovýchodní).

Střední část celého ložiska uložena jest v Nučicích a sice z hruba zároveň s železnicí; nejmocněji vyvinuto jest ložisko v doubi na vršku „Vinici“ a v lomech v „Chrastici“ východně, pak v „Háječku“ západně od Vinice.

Sleduje-li se mocnost a rozprostírání se ložiska od Vinice, půlnočně od Nučic položené, k západu, obdrží se asi následující přehled vlaků a úklonů, kde tyto vůbec s jistotou známy jsou:

Ve Vinici jest vlak ložiska  $5^{\circ}$  a úklon  $10^{\circ}$  až  $20^{\circ}$  (vždy jižní), mocnost ložiska neznáma sice, ale zajisté ne menší 15 metrů, v kalužině západně od Vinice, po vybrané rudě, půlnočně vedlé železnice povstalé, jest úklon toliko  $8^{\circ}$ , mocnost značná, ale určitě neznámá; vedlé lesíku v Háječku východně od místa, kde se dráha železnice dělí do Nučic a do Tachlovic, je směr  $3^{\circ}$ , úklon  $50^{\circ}$ , mohutnost asi 10 metrů. — V Krahulovském lomu jest vlak směrem  $3^{\circ} 3'$  a úklon  $62^{\circ}$ , mocnost asi 6 metrů; západně od lomu v lesíku v menším lomu  $3^{\circ} 10'$  a úhel  $52^{\circ}$ , mocnost asi 4 metry; ještě západněji v lese  $4^{\circ} 5'$ , s úhlem  $55^{\circ}$ , mocnost 2 metry; v Krahulovské štole pak otevřeno ložisko směrem  $3^{\circ} 14'$  a v úklonu  $51^{\circ} \frac{1}{2}$ , v mocnosti  $2 \frac{1}{4}$  metru. V Hluboké u Chrutenic je hlavní směr vlaku  $4^{\circ} 11'$  a úklon  $49^{\circ} \frac{1}{2}$ , v mocnosti 3 metrů, východně od Chrutenic ale  $4^{\circ} 2'$ , úklon  $48^{\circ}$ , v mocnosti  $\frac{1}{3}$  metru. — Ve Vražské štole směr asi  $4^{\circ} 8'$ , úklon  $46^{\circ}$ , v mohutnosti asi 1 metru. Západněji od Vražské štolý není ložisko dle vlaku svého proděláno, ač ještě dále se rozprostírá.

Východně od Vinice jsou čtyry velké lomy v Chrastici; v lomu 1 a 2 (počítaje od západu k východu) jest hlavní směr ložiska  $4^{\circ} 12'$ , úklon  $22^{\circ}$  až  $25^{\circ}$ , v mohutnosti asi 15—17 metrů, pohled na lom č. II. jest na Tab. V.; v lomu 3. a 4. pak je směr  $5^{\circ} 11'$ , úklon  $42^{\circ}$  a  $56^{\circ}$ , mocnost pak v každém lomu 14—10 a 7 metrů. V Jinočanském lomu na „Škrobech“ jest hlavní směr  $5^{\circ} 0'$ , úklon  $68^{\circ}$ , v mocnosti 7—8 metrů. Dále na východ není ložisko nikde otevřeno, ač se ještě daleko rozprostírá.

Směr ložiska se za nedlouho, vždy trochu mění, takřka za každou menší rozsedinou se trochu zjináčí; za vržením malým se ne značně mění, za velikým vržením ale velmi značně se jak směr tak i úklon zjináčí. Aby se podal jen jakýsi příklad, tak v lomu jinočanském v západní části jest směr  $4^{\circ} 8'$ , úklon  $73^{\circ}$ , ve východní části  $5^{\circ} 5'$ , úklon  $63^{\circ}$ , ač jen malými nepatrnými vrženými ložisko posunuto jest.

Ložisko ve svém celém vlaku nescíslnými malými i značnějšími, jakož i předlouhými rozsedinami ze svého vlaku přetrženo a jinam vrženo jest. Menší roz-

sedliny takořka každým krokem ložisko rozštěpují, větší z nich jsou dosti hojné, však je též několik přeznačných vržení daleko posmykujících roztržené části ložiska, o kterých nutno se zmínit. Vržení v pohledu dle vlaku ložiska vyobrazeno na Tab. II. obr. 4.

**Výchozí ložiska** na velmi mnohých místech se seznává, kteréž zde vypsány budtež.

Ve východní části lesa v obci Berounské ležícího, který k Vraži se táhne, objevují se poprvé utržené a skryté částky ložiska Nučického v mocnosti nepatrné na nejvýše  $\frac{1}{2}$  metru dosahující, na jižním svahu lesa, asi 500 kroků od silnice z Vraže do Berouna na půlnoc, směrem asi zárovným se silnicí. Západněji od těchto míst je všechna skála pokryta mocným náplavem, který zabraňuje všeliké důkladnější propátrání krajiny. Jisto jest však, že na břehách Litavky u Berouna ložiska Nučického více není. V obci Vražské vleče se výchozí ložiska, přehojně vrženými přetrhaného a nanejvýše asi 1 metr mocného, po jižním svahu stráně pastvišťaty pokryté, kteráž se opět něco přes 500 metrů půlnočně od silnice asi zároveň s ní táhne a v pozemcích nazvaných „v slupicích k Berounu“ leží. Odtud se vleče ložisko na výšině polí v „ouvalech“ severně proti Vraži, aniž by na den vycházelo, až se zase na úpatí jižních strání pod vrchem, na kterém osada „na Lesích“ zvaná jest, a západně od Vražské štoly v několika odtržených částích mocnosti až 1 metru směru asi  $3^h 10^o$  a úklonu jižního  $54^o$  objeví. Východně od Vražské štoly se po prudkých lijácích výchozí též v lese na jižním svahu západního výběžku Hřebenu severně od Kněží hory objevuje směrem  $3^h 12^o$  a úklonem  $52^o$ , v mocnosti asi 4 metrů, počítají-li se i jalové vrstvy do mocnosti ložiska. Odtud se dá sledovat po jižní patě hřebenu, po vysočině západně od Chrustenic neb od severních hranic Loděnické obce, až do polností loděnických na jihovýchodním svahu Hřebenu rozložených až ke Kačickému neb Loděnickému potoku jižně od samých Chrustenic, kde podle pruhů hnědě barvených, v polích se místy utržené části ložiska seznávají.

V této části obce Vražské a sice východně od Vražské štoly, sestává ložisko vedle hlavního ložiska asi 1 metr zde mocného, asi z dvou ještě slabších ložisek v mocnosti 1 decimetru i méně, které se zároveň s ložiskem vlečou buď bezpřetržené nebo v jednotlivé bochníky se oddělící, jež od ložiska břidlicí černou odděleny jsou. V lese východně od Vražské štoly jsou dvě ložiska, každé asi 1 metr mocné, oddělená pruhem černé břidlice od sebe. Kdyby se mocnost rudních ložisek neb bochníků měřila přes jalové vrstvy všechny, které je od sebe dělí, vzrostla by od 2 až k 4 metrům; proto výchozí také vždy mocnějšími se býti zdají než ložisko rudní, an rozpadávající se rudou proplásty břidličnaté se zakrývají.

Za Kačickým potokem, v obci Chrustenické na východ, není výchozí známé, až v Hluboké, kde pracemi směr ložiska odkryt, aniž by toto na den vycházelo. Délka ložiska v Chrustenicích prozkoumaného obnáší více než 600 metrů a ložisko vleče se po jižním svahu Blejskavi asi zároveň s krajem lesa, až snad k východním hranicím Chrustenickým, kde se s Hořelickými hranicemi stýkají. V této východní části lesa, pod Blejskavou, jest ložisko úplně neznámo a objevuje se odtud náhle jižně, na jižním svahu vrchu Krahulova, již do obce Nučické přináležející.


Dá se soudit s pravděpodobností takřka zjištěnou, že v těchto místech jest ohromné vržení, snad úvalem na západní straně Krahulova naznačeným, o jehož délce, směru a úklonu, při úplné neznalosti jedné částky odtrženého ložiska samého, ničeho více ani udat nelze, než toliko to, že směr vržení předlouhého bude asi sblíženě severojižní a úklon rozsedliny západní. Že vržení samo předlouhé bude, soudit z toho, an mírné kopce, v „Illubokém“ Nučickém nazvané, na jižní straně silnice se táhnoucí z vrstev se skládají, které jinak nad ložiskem asi více než 700

kroků vodorovně ve visutém uložené býti mají; tvoří prodloužení směru vrchu Krahulova, (od kterého toliko úvalem snad rozsedlinu naznačujícího odděleny jsou), kterýž se skládá z vrstev, jež toliko pod ložiskem vyvinuty bývají.

Výchozí ložiska jest na jižním svahu Krahulova, čím dále na východ, tím výše v lesíku, až na vysočině samé, nad strání višněmi posetou se objevuje v lomu, odkudž směrem k Hořeliciům se vleče na polích, na „stráži“ zvaných, až do vzdálenosti neznámé. — Ložisko se neobjevuje, spíše až zase v obci Hořelické na jižním cípu hájku „v Háječku“ na jižním svahu stráně, východně od dělicí se dráhy Nučicko-Tachlovické, kamž zajisté zase jen velkým vržením pošinuté jest.

Vlak ložiska přechází opět za krátko do obce Nučické, kdež s železnici asi zároveň, odchylujíc se od ní jen něco, směrem k severu se sledovat dá; západně od hájku na Vinici, kdež rudní lom otevřen, Tab. VI, jest silnice z Nučic do Dušník na pouhé rudní skále stavena. Z „Vinice“ jde vlak přes Chrastici čtyřmi otevřenými lomy až k mezím Jinočanským, kde ruda dvakrátě mocně vržena jest (rozsedlinami, z níž jedna 250 metrů a druhá ve vodorovném směru ještě o něco delší bude), až k cestě z Nučic do Jinočan vedoucí do polích na „Škrobech“ zvaných; obr. 6. Odtud se dá sledovat cestou až k silnici od Jinočan k Dobříčci, pod kterou, asi v 140 metrech na jih, od spojení cesty z Nučic počítaje, přechází, aniž by dále na východ pod hlubokým náplavem sledována byla.

Další směr ložiska bude asi severně od Mirešického dvora s úklonem příkrým do



Obr. 6.

pozemků Třebonických, kdež v cestě od kostelíčka na „Krtň“ k Jinočanu, západně od Krtně asi v místech, kde se cesta k Ořechu dělí, by vycházet mohlo; odtud pod luhy Řeporyjské, jižně kolem Krtně, až do pozemků obce Stodůlek. Nejvýchodnější místo, kde by ložisko se ještě objevit mohlo, jest na polní cestě, asi 300 kroků východně od Krteňského kostelíčka na jih směřující, v místě, které později ještě při diadochitu Stodůleckém zevrubněji udáno bude. Odtud na východ jest vlak rudního ložiska úplně neznámý.

Ložisko tvoří tedy jakousi velice dlouhou vrstvu, více dvou mil, uprostřed nejmnocněji vyvinutou, kteráž by se přehromnou čočkou ve svém středu asi 16 metrů mocnou, odtud na oba cípy vždy méně a méně mohutnou, čím dále od středu, porovnat dala. Celá vrstva není v souvislosti uložena v skalních vrstvách, nýbrž vrženými přetrhána na velmi velké množství kusů od sebe pošunutých.

### Ležaté a visuté ložiska Nučického.

Jak z všeobecného přehledu vysvítá, leží ložisko v drobových břidlicích, v nichž podrízeně pískovce velice jemné, zrnitým křemencům podobné, uloženy jsou. Jak ležaté, tak i visuté v nejbližší vzdálenosti od ložiska dobře odkryty jsou podél výchozího; severozápadně od Vráže, pak severně a severozápadně od Vrážské cihelny, na pravém břehu Kačického potoka u Chrustenic. V Hluboké, západně od Chrustenic, toliko ležaté částečně odkryto; v Krahulově zase, jakož i v Nučicích jen visuté nedokonale skryto jest; východně od Krteňského kostelíčka v brázdách v cestě toliko po prudkých lijavcích se vysuté objevuje. Na stránkách s jižním svahem mezi Vráží a Berounem sice též visuté částečně odkryto, nemožno ale ničeho z toho zde soudit, jelikož ostatní část, kde by se vlastní ložisko uložené nalezat mělo, jest pod rozsáhlými náplavy pokryta. An toliko v ležatém se hojněji pískovce křemencové objevují a tyto méně se ruší než břidlice měkké ve visutém rudy; a protože též vrstvy k jihu se kloní: tedy to takorba pravidlem jest, že se ložisko objevuje toliko na jižních svazích vrchů, jejichž temeno z ležatých vrstev se skládá.

**Ležaté vrstvy** bezprostředně pod ložiskem, až do jisté vzdálenosti od tohoto, skládají se z břidlic drobových černých neb černohnědých, tence břidličnatých, slídnatých vrstev, s kterými se střídají vrstvy tvrdého jemnozrnného pískovce, jemuž se vůbec křemenec říká, beze všeho určitého pořádku. Jak břidlice drobové, tak i křemence nedají se od sebe ostře oddělit v přírodě, nebo břidlice zpískovitější-li aneb **zkřemení-li**, přecházejí do křemenců, křemence zase zbřidličnatějším do břidlic. Břidlice drobové černé neb velmi tmavé, barvou od šedavých neb šedohnědých křemenců ostře odděleny jsou; přechodní horniny se barvou přibližují tím více oné hornině, do které se mění, tak že poskytují barev šedavých a šedohnědých. Břidlice do křemenců, nebo naopak se mění, jak ve směru kolmém, tak i ve směru vodorovném.

Jakkoliv břidlice a křemence beze všeho pořádku se střídající celé ležaté ložiska skládají, tož přece se pozoruje, že v západní části vrstvy křemencové zmohtněvší převládají nad břidlicemi, kdežto ve východním dílu uveličevší se množství břidličnatých vrstev, zahrnujících jen slabší křemencové vrstvy, jaksí převládá. Protož také v západní části ležaté, skládající se z tvrdších křemenců, vy-



tvoří vysoké vrchy, jako u Vraže, u Chrutenic (Hřeben, Blejskava, Krahulov, u Hořelic je již nižší), kdežto ležaté ve východní části z měkkých převládajících břidlic složené, jen v nížce pahrbkovité rovině se rozprostírá a jen menší vyvýšeniny u Nučic, Jinočana a Třebonic skládá (Vinice, Škroly, Krteň). Nicméně jest ležaté ve východní části, byť by i v celku méně tvrdé, než v západním dílu, přece mnohem pevnější vlastního vysutého, tak že se krajina, byť i rovinatá, přece trochu k jihu, kdež visuté měkké vrstvy uloženy jsou, mírně se uklání.

U Vraže jsou ležaté křemence zajisté nejvyvinutější, a břidlice, jakož i přechody břidlic do křemenců, nejpodřízenější. Severozápadně od Vraže leží ložisko rudní bezprostředně na křemencích ne sice hrubovrstevnatých, ale nicméně dosti značně vyvinutých. Ve východní části obce Vrážské leží ložisko toliko na křemenných drobových břidlicích a tvrdších břidlicích s křemenci se střídajících, any vlastní tvrdé křemence trochu do ležatého ustupují.

V Chrutenicích se střídá břidlice s křemenci v ležatém, a zdá se mít břidlice převahu nad vrstvami křemencovými, jejichž mohutnost nikdy míry  $\frac{1}{2}$  metru nedosahuje (Tab. IV., obraz 6.); v dalším ležatém ale opět křemencové vrstvy nad břidličnatými převládají velice velmi, ba úplně je vytlačují neb stlačují až na nepatrnou část.

V Chrutenicích, kdež ležaté, bezprostředně ložiska se dotýkající trochu otěvřeno jest, skládá se toto z šedivé vrstvy přetvrdého šedého křemence  $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$  metru i více mocné, kteráž práškovitým pyritem prostoupena, a kratičkými žilkami bílého vápence prošlehána, dle vlaku na vzdálenost asi 600 metrů známá jest: byť by třeba nebyla jedinou souvislou vrstvou, tedy by to mohlo být několik vedle sebe se rozprostírajících krátkých vrstev, vyřezujících se a opět povstávajících. V tomto pískovci křemencovém jsou zachovalé černošedé pruhy, vidličnatě se rozvětvojící chalupy snad nějakého chondritu. Göppert sice uvádí mnoho chondritů, z nichž ale žádnému se tento nepodobá; jaksí jen co do tvaru zevnějšího podobna k Chondrites antiquus Sternb. (Göpp. Uebergangsgebirge (T. I. f. 1.). Tyto rostliny nemožno ani roztrždit, an mimo velmi hrubý tvar praničeho na nich se neobjevuje určitého.

Pod křemencovým pískovcem tímto následují drobové břidlice v mocnosti asi 3—4 metrů, v nichž se asi dva- až třikrát opakují vrstvy rudní, nebo místo vrstev čocky bochníkům nanejvýš 2 decimetry mocným podobné (Tab. IV., obraz 6.). Pod tím následují břidlice se slabými křemencovými vrstvami se střídající; čím dále do ležatého, tím více převládá křemenec, kterýž posléze všecku břidlici vytlačuje. Jestli to všude tak, nemožno tvrdit, nebo toliko v štole č. I. bylo ležaté přeráženo. V Krahulově opět se v ležatých břidlicích křemencové vrstvy objevují, kteréž ale nedaleko od ložiska dosti hojnými jsou, potom velice převládají.

V Nučicích jest bezprostřední ležaté ložiska černá drobová břidlice bez křemence, v které teprve ve vlastním ležatém se střídají vrstvy křemence s prvku něco hojněji, k posledu opět méně hojně, aniž by v celku mocnost 1 až  $1\frac{1}{2}$  decimetrů o mnoho převyšovaly. Ač v dalším ležatém, kteréž až na 170 metrů vodorovné délky proraženo bylo, se objevují též pásma bohatší na křemence pevné, tož přece v celku břidlice a břidličnaté křemence převládají. Též vrstvy podobné tuřím diabasovým (mandlovcovým) v ležatém objeveny byly. (Tab. II., obraz 3.)

V Jinočanech pod ložiskem toliko břidlice, ovšem trochu písčinaté, odkryté až na vzdálenost toliko asi 3 metrů; hlubší ležaté i zde neznámé.

Pahorek Krteň u Chabů sice z křemencových vrstev se skládá, tyto ale jsou od ložiska značně v ležatém. Východně od Krtně opět v místě, kde by asi ložisko býti mohlo, se střídají křemencové vrstvy s břidlicemi mnohonásobně.

V celém ležatém se v jistých vrstvách v neurčité vzdálenosti od rudy objevují skameněliny, ale toliko jen na některých místech přístupny jsou. Místa, kde se skameněliny vyskytují, jsou:

U Vráže: na jižním úpatí vrchu, na kterém samota „na lesích“ jest, vedle pěšiny odtamtud do Vráže, asi 40 metrů vodorovně od výchozího rudy, které tam je odkryté. Skameněliny jsou v černé drobové slídnaté písčité břidlici, kteráž ale na výchozím svém šedohnědá jest, asi následující, mimo velmi mnoho jiných: *Conularia grandissima* Barr., *Conularia insignis* Barr., *Orthis* sp. snad *Orth. redux* Barr. se podobající, *Orthoceras bisignatum* Barr., *Discina squamifera* Barr.

V Chrutenicích jsou skameněliny v lesku, na jižně se klonícím svahu západního konce Blejskavy, uprostřed mezi štolou č. III. a Chrutenickým mlýnem, v křemenci žlutohnědavém, kterýž snad je dle pohledu asi 100 metrů od ložiska, v těch místech posud neznámého, vodorovně vzdálen. Skameněliny potaženy bývají žlutým nádechem silným od zemitého limonitu pocházejícím; jsou to asi následující: *Orthis* sp., podobající se asi *O. redux* Barr., *Leptaena aquila* Barr., an. *Atrypa deformata* Barr., *Orthis* sp. ind. (podobná na pohled k *O. moesta* Barr.), *Euomphalus* sp., *Pleurotomaria* sp., *Orthoceras bisignatum* Barr., *Trinuncleus ornatus* Barr., *Illaeus Panderi* Barr., *Dalmanites socialis* Barr. var. *proeva*, *Acidaspis Buchi* Barr., *Cypridima* sp., *Cystidea bohémica* Barr., *Echinoencrinus Helmhackeri* Barr., maličký *Enerinit* neznámý, *Lingula* sp., *Discina* sp., mimo to též chaluhy sprosté v těchto vrstvách, přechatrně zachovalé, a dalece podobné buď k *Bythotrephis flexuosa* Hall, neb k *Chondrites antiquus* Sternb.

V ležatých křemencích Krahulovských, kteréž s těmito asi v stejném vlaku co do obzoru pod rudou souhlasit by mohly, nalezena *Orthis* indet. (podobná dalece k *Orth. moesta* Barr.) a menší *Orthis* sp. toliko vzácně.

V Jinočanech jsou, počínaje asi od 1 decimetru bezprostředně pod rudou v šedočerných, slídnatých a písčnatých břidlicích v celé posud známé vodorovné mohutnosti 3 metrů, v jistých vrstvách skameněliny vtroušeny; tak nalezeny: *Conularia grandissima* Barr., *Leptaena aquila* Barr., *Orthis* sp. indet. (podobná jak k *O. macrostoma* tak k *O. redux*), *Pleurotomaria* sp. (*viator*? Barr.), *Trinuncleus ornatus* Barr., velká *Orthis* sp. indet., *Serpulites bohemicus* Barr., *Euomphalus* sp. nov. velký, posud v těchto vrstvách nenalezený, *Cytherina gregaria* Barr., *Beyrichia bohémica* Barr., *Cystidea bohémica* Barr. Skameněliny nebývají v hrubších těchto břidlicích ostře zachovalé.<sup>26)</sup>

**Visuté** nad rudou, skládá se do výšky dosti značné, výhradně z černých, jemných, slabě slídrovitých, velmi tence břidličnatých a tence vrstevnatých drobových břidlic. Jen na málokterých místech a sice obyčejně blíže ložiska, bývají břidlice trochu slídnatější. Na vzduchu, vlastně na slunci rozpadávají se čerstvé vrstvy drolením velice rychle; to, a vůbec snadnější zrušitelnost jejich podmíněna jemností břidlic, příčinou, proč v nižších místech málokdy na den vystupují.

Svou snadnější povolností ustupují tlaku shýbající se směrem, kterým posílnuty jsou; čímž se podivuhodný úkaz vysvětluje, jak vrstvy k jihu se klonící,

na výchozím svém na svahu vrchů, někdy, ač rozdraceny přece ohnuty bývají, kloníce se k severu, jak to v ústí štoly číslo II. i I. v Chrutenicích otevřeno jest Tab. IV. obr. 6.

Co vzácnost jest v břidlicích visutých křemenec šedý, v málo slabých vrstvách asi 1½ decimetru i méně mocných uložen; alespoň tak toliko na jednom místě objeveno a sice v Chrutenické štole číslo II. Tab. IV. obr. 5, kde ve vodorovné vzdálenosti asi 22 metrů nad ložiskem asi sedm vrstev křemencových se s břidlicemi střídá — Možná, že též v Krahulově se tento úkaz opakuje, však není právě zjištěn, proto že na tom místě ložisko posud nevyhledáno jest.

Jiný, ne méně památný úkaz by byl ten, že se ve Vráži severozápadně od vsi v jižním úpatí stráně, v které ruda se na výchozu nalezá, objevují asi ve vzdálenosti vodorovné 4 až 6 metrů ve vrstvách velmi porůznu malé koule smáčkuté, ve dvou různých obzorech. Koule, složené z šedého, celistvého vápence velikosti pěstě, obalují skameněliny nedobře zachovalé, z nichž toliko *Orthoceras* sp. ind. *Pleurotomaria* sp. ind. a *Acidaspis* sp. ind. poznány jsou. Možná, že to kolonie, ač teprve skameněliny lépe zachovalé by o tom s jistotou rozhodovaly. Jelikož nesnadno popsat tak obmezené místo, stojíž zde číslo katastrální, 1351, pastviny na stráni, v jejímž východním rohu se místo nalezá.

Též asi ve vodorovné vzdálenosti 130 kroků (k jihu) od Vrážské štoly, tedy do visutého, nalezl se v břidlicích shluk podobného vápence směrem 4½ 8° a úklonem 46° k jihu v břidlicích uložen. Ve vápenci toliko *Orthoceras* sp. ind. a *Trinuncleus ornatus* Barr. se nalezl. V Chrutenické štole II. jest ve vodorovné vzdálenosti 55 metrů uložena 2 decimetry mocná krátká čočka šedožlutá, zemitá, snad ze zkyprělého vápence sestávající Tab. IV. obr. 5.

Jestli že jest obzor těchto vtroušených shluků vápencových v jediné souvislosti, nedá se nijak soudit; kdyby tomu snad tak bylo, vzdalovala by se vrstva, shluky vápencové držíci, čím dále na východ tím více od ložiska až do jistých mezí. —

Skameněliny se vyskytují ve visutých břidlicích a sice: Ve Vrážské štole toliko velenezřetelné otisky *Chondrita*.

V štole číslo III. v Chrutenicích ve visuté vodorovné vzdálenosti až do 20 metrů se skameněliny nalezaly; v nejvyšších vrstvách bylo vedlé sprostých malých brachiopodů a gasteropodů též něco tribolitů, kteréž v nižších vrstvách chyběly; jsou to: *Cheirurus claviger* Barr., *Trinuncleus ornatus* Barr., *Dalmanites socialis* Barr. var. *proeva*, *Ilacenus Panderi* Barr., *Aeglina rediviva* Barr., *Orthis radiatula* Barr., *Hyolithes* sp., *Nucula bohemica* Barr., *Discina* sp., *Serpulites bohemicus* Barr., *Cyclus?* *bohemicus* Barr., *Graptolites tectus* Barr., malý polyp, vejce pocházející snad od Trilobitů.

Ve visutém štoly Chrutenické číslo II. nalezeny asi v stejných vzdálenostech ve visutém: *Nucula bohemica* Barr., *Orthis radiatula* Barr., *Trinuncleus ornatus* Barr., *Dalmanites socialis* Barr. var. *proeva*, *Cyclus?* *bohemicus* Barr., *Lingula lingua* Barr., *Rhynchonella primula* Barr., *Serpulites bohemicus* Barr., *Plumulites bohemicus* Barr., *Graptolites tectus* Barr., *Conularia modesta* Barr., *Orthoceras bisignatum* Barr., *Cystidea bohemica* Barr., *Pleurotomaria* sp.

V Krahulovské štole nalezeno ve visutém, nejisto z kterého místa, ale zajisté nedaleko od ložiska: *Nucula bohemica* Barr., *Pleurotomaria viator?* Barr., *Orthis*

radiatula? Barr., Orthoceras sp. Trinuncleus ornatus Barr., Dalmanites socialis Barr., var proeva, Cystidea bohémica Barr., jakož i otisky Chondrites sp.

V Nučicích nalezeno ve visutém při sledování vržení, neznámo tedy v jaké vzdálenosti od ložiska, toliko Nucula bohémica Barr., a Trinuncleus ornatus Barr. Na Vinici ve visutém toliko větší nějaká špatně zachovalá Pleurotomarie nalezena. Z těžní stoly snad před lety též by se byly otisky vydobyly, kdyby se bylo k tomu přihlíželo. Nyní to v provlhlé břidlici nemožno.

Mimo toho co vypočítáno zde, posud nikde jinde skamenělin nalezeno není.

### Ložisko Nučické.

**Složivo ložiska.** Ložisko složeno z rud černomodrých nazelenalých, semenitých, kteréž co do povahy mineralogické, jak v mohutnosti ložiska samého, tak i ve směru uložení svého značným proměnám podléhají.

**Mineralogické popsání rudy.** Rudy obecně modrými rudami nazvané, jsou vesměs slohu semenitého neb oolithického a jmenují se vůbec *chamoisitem*, k jehož některým odrůdám jinozemským nad míru podobny jsou. Seménka rudová jsou zarostlá v základní hmotě: jak seménka tak i základní hmota velice se mění.

*Základní hmota* chamoisitová sestává v některých rudách ze světle hnědavě našedlého *sideritu* předokonale štípatelného, nebo štěpné plošky vyznačující se hladkostí a leskem přese všechno, že nepatrně malými jsou, předce ve světle slunečním se třpytí. Sideritové základní hmoty se v rudě nezdá dle pohledu býti více, než zrníček oolitických v ní vrostlých, nebo ona vyplňuje toliko mezery těsně přiléhajících zrníček okulacených.

V jiných opět rudách, které co do množství většinu rud skládají, sestává základní hmota z *chamoisitu* vlastního, barvy hluboce černošedé neb jen tmavošedé, lomu nerovného, celistvého, složiva a lesku žádného, tedy zemitého. Vryp nebo prášek chamoisitu jest šedý. V této základní hmotě bývají sice též oolithy jeden vedle druhého těsně k sobě přiléhající, však jsou též přehojné ony rudy, v jejichžto základní hmotě oolithy ač hojně, předce netěsně vedle sebe vrostlé bývají; však též místy oolithy jen toliko sem tam vrostlé bývají, tak že základní hmota v takových částech rudy velice převládá, ba i celé pruhy, ovšem ne ostře oddělené, v ostatní rudě sama o sobě skládá.

Toliko při nejsilnějším osvětlení slunečním a nejopatrnějším prohlížení základní hmoty, proleskne přenepatrný bodek leskem odraženého světla, na důkaz že i v této základní hmotě jsou přenepatrné krystálky sideritu vrostlé.

Mimo tyto dvě základní hmoty se objevuje třetí složena z obou, tedy ze *chamoisitu* *prostoupeného sideritem*, v níž buď siderit neb chamoisit převládá. V chamoisitové základní hmotě, převládá-li tato, jsou přeslabounké žilečky sideritu krystalinického, ve všech směrech jako protkané, zarostlé vedle krystalečků přemalých, které vesměs černý chamoisit prostupují. Někdy základní hmota chamoisitová, toliko přemalými krystalečky sideritu úplně proniknutá, jest tvrdá a slabě lesklá. Šířka žilek dle pouhého pohledu se na  $\frac{1}{10}$  —  $\frac{1}{100}$  mm. ba i na ještě méně cenit může. Jestli že převládá siderit tu ovšem šířka žilek u nejširších, zatlačujících někdy

dosti značné černošedou základní hmotu, až na 2 až 4 mm. vzroste. Již v dosti slabém slunečním světle jest vidět třpytící se přemaličké plošky rozštěpených žilek, neb zarostlých krystalečků sideritových.

Rudy s těmito třemi rozličnými základními hmotami nejsou ostře od sebe odděleny, nýbrž ze základní hmoty čistě sideritické, šedavěhnědlé lesklé, jest v jediné bezpřetržené řadě přechod základní hmotou Sideritu, prostouplou chamoisitem; potom hmotou chamoisitu, prostouplou sideritem; až do základní hmoty černošedě mdlé nelesklé vlastně chamoisitové zprostředkovan.

Tvrdot základní hmoty sideritické jest větší tvrdosti calcitu, nebo calcit jí rýpán jest, obnáší tedy 3·5—4·5 jako u sideritu; kdežto černý chamoisit základní hmoty, rýpající sůl kamennou sám calcitem rýpán jest, 2·5 obnáší. Pro základní hmoty chamoisito-sideritické tvrdost mezi oběma čísly leží.

*Zarostlá seménka* nebo *oolithy* nejsou nikdy kulatá, nýbrž toliko elipsoidická a sice jsou buď ellipsoidy jednoosými, buď s delší neb kratší hlavní osou, anebo ellipsoidy s třemi osami.

Velikost ellipsoidů jest asi následující: při ellipsoidech jednoosých jsou rozměry největší  $\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$  mm., a nejmenší  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{3}$  mm.; ellipsoidy trojosé mají následujících rozměrů: dle nejdelší osy  $\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$  mm., dle druhé osy  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{3}$  mm., dle nejkratší osy  $\frac{1}{4}$ —1 mm. Oolithy velice zřídka přerůstají nejdelší udané míry, jakož i pod nejmenší míry neklesávají svými rozměry.

Sloh oolithů jest soustředně miskovitý, an z neskonale velikého množství přetenkých, objímajících se misek složeny jsou. Barva jest silně černošedá neb černo-modravá a černo-zelenavá. Barvy šedo-zelenavé, světlošedo-zelenavé, šedohnědavé, vůbec barvy světlejší, naznačují již přechod do oolithů rušících se.

Černošedé oolithy zarostlé v sideritických základních hmotách, bývají též předrobounkými krystalečky sideritu slabě prostoupeny, což se za největší pozornosti na slunečním světle sem a tam kmitnoucím se slabě lesklým bodem poznává.

*Rudy* samé, složené ze základní hmoty a z oolithů, možno asi následující odrůdy popsat:

1. Ruda složená z černošedých oolithů prostoupených sideritem, kteréž vrostlé jsou do šedohnědavého krystalinického sideritu jest vlastně tím co se *Berthiérinem* nazývá, kterýž jest chamoisitová odrůda, valně ocelkem prostoupená. Ruda úplně neporušená pocházející z Nučic z lomu druhého z hloubky asi okolo 35 metrů, největší posud dostižené, a 4 metrů z ložiska dle mohutnosti od počvy počítaje, má hutnotu 3·5463 nalezenou z 3·09 grammů. Oolithy mají hutnoty 2·6704 nalezené z 47 grammů.

Vezme-li se za základ potažná váha sideritu čistého, jak ten jím skutečně jest, který základní hmotu této rudy skládá, dá se vypočítat, že tato ruda sestává asi ze základní hmoty sideritické . . . . . 71 dílů dle váhy  
a z oolithů v ní zarostlých . . . . . 29

100 dílů dle váhy

Z hruba tedy možno určit základní hmotu sideritickou na  $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{4}$  celého Berthiérinu, ostatek  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$  pro oolithy zbyde.

2. Ruda, skleněnkou zvaná, velice tvrdá, nárazem silným v tenčí střípky

ostrohranné, které znějí, se rozpadávajíce, jest barvy tmavošedozelenavé neb černošedé. Základní hmota černošedá, tvrdá, složena z chamoisitu úplně sideritem prostoupeného, proto se také na slunci slabě třpytí; oolithy černošedé neb černo-zelenavé bývají v rudě pevně zarostlé. Tato ruda jest tedy též Berthiérinem.

Taková jedna skleněnka, tmavočernošedá, s ploskými oolithy přepevně zarostlými; tak že se na prvý pohled zdá jako by oolithy byly ze základní hmoty vyloučeny a s ní ještě na krajích polosplývající; z hloubky ložiska, z nučického lomu druhého, z prostředka ložiska, 9 metrů od počvy ku krovu počítaje, měla hutnoty 3·7158 z množství zkoušeného 4·72 grammů.

| Rozbor rudy z 2·78 grammů při 100°C sušených; Kratochvil |       |   | a                                   |
|----------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------|
| v kyselině octové rozpustné . . . . .                    | 12·28 | } | FeO 6·85                            |
|                                                          |       |   | CaO 36                              |
|                                                          |       |   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3·08 |
|                                                          |       |   | CO <sub>2</sub> 1·99                |
| v kyselině solné rozpustné . . . . .                     | 78·95 | } | FeO 52·42                           |
|                                                          |       |   | CaO 55                              |
|                                                          |       |   | MgO 87                              |
|                                                          |       |   | KO, NaO 03                          |
|                                                          |       |   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 6·01 |
|                                                          |       |   | SiO <sub>2</sub> 76                 |
| nerozpustný zbytek . . . . .                             | 8·58  | } | PO <sub>5</sub> 2·54                |
|                                                          |       |   | HO 15·77                            |
|                                                          |       |   | SiO <sub>2</sub> 8·58               |
| sestavující převládající z vyloučené . . . . .           |       |   | 99·81                               |

Voda určena v proudu kyseliny uhličitě; mimo kysličník železnatý možná že též něco málo kysličníku železitého snad obsaženo v ní, je-li kyselina fosforečná na Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> a ne na Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vázána, což nerozhodnuto. Malé množství kyseliny uhličitě nesnadno se určuje, protože jí snad něco více obsaženo jest v sloučení. Nebo FeO rozpustné v kyselině octové žádá k nasycení v ocelek uhličitán železnatý více kyseliny uhličitě. Vůbec jsou rozbor chamoisitu nesnadné.

Berthiérin tento by byl dle rozboru a nejméně 10·95% sideritu a 64% calcitu prostoupen, jestli všecken uhličitán železnatý se v kyselině octové rozpustil; jinak by bylo sideritu, Berthiérin prostupujícího, ještě více.

Jiný chamoisit, v odrůdě Berthiérinem zvané, barvy tmavočernošedé, na lomu celistvý až jemnězrný, v němž po různu zrněčka sideritu se třpytila, pocházející z lomu č. I. v Nučicích, analysován v lučebně prof. Mrázka v Příbrami (Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der Bergakademien Příbram, Leoben und Schemnitz. XVIII. Bd. 1869, str. 388).

| Analysu dělal Kar. Mirtl |                                    | b            |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|
|                          | <i>FeO</i>                         | 51·20        |
|                          | <i>MnO</i>                         | sledy        |
|                          | <i>CaO</i>                         | 1·93         |
|                          | <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 4·82         |
|                          | <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 16·57        |
|                          | <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 6·50         |
|                          | <i>PO<sub>5</sub></i>              | 1·28         |
|                          | <i>SO<sub>3</sub></i>              | sledy patrné |
|                          | <i>HO</i>                          | 16·70        |
|                          |                                    | <hr/> 99·00  |

V této úhrnečné analýsi chybí ještě maličké množství  $CO_2$ , kteréž nesnadno se určit dá, an siderit v rudě v maličkém množství též obsažen jest.

3. Ruda barvy tmavočernošedé, sestávající z černošedé základní hmoty celistvé, neleské, lomu nerovného, v níž sytě černošedé sploštěné oolithy zarostlé jsou, nalezena v hloubce druhého roznosu nučického něco výše nad polovičkou mocnosti rudy. Tato ruda za vzor *chamoisitu* se postavit může.

Potažná váha základní hmoty jest 3·4840, nalezena z množství 4·04 grammů.

Rozbor při 100°C sušené základní hmoty jest; Vlastislav Milbauer;

|                                            |      |                                    |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------|
| vody hygroskopické při 100°C vysušené jest |      | c                                  |
|                                            |      | ·07                                |
|                                            |      | <hr/> <i>SiO<sub>2</sub></i>       |
|                                            |      | ·08                                |
|                                            |      | <i>CaO</i>                         |
|                                            |      | ·74                                |
|                                            |      | <i>FeO</i>                         |
|                                            |      | sledy                              |
|                                            |      | <i>MnO</i>                         |
|                                            |      | sledy                              |
|                                            |      | <i>MgO</i>                         |
|                                            |      | sledy                              |
|                                            |      | <i>KO<sub>1</sub>NaO</i>           |
|                                            |      | ·25                                |
|                                            |      | <i>FeO</i>                         |
|                                            |      | 49·56                              |
|                                            |      | <i>MnO</i>                         |
|                                            |      | nepatrné                           |
|                                            |      | sledy                              |
|                                            |      | <i>CaO</i>                         |
|                                            |      | 1·56                               |
|                                            |      | <i>MgO</i>                         |
|                                            |      | ·53                                |
|                                            |      | <i>KO<sub>1</sub>NaO</i>           |
|                                            |      | 2·04                               |
|                                            |      | <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> |
|                                            |      | 21·87                              |
|                                            |      | <i>SiO<sub>2</sub></i>             |
|                                            |      | 4·53                               |
|                                            |      | <i>PO<sub>5</sub></i>              |
|                                            |      | ·42                                |
| nerozpustný zbytek                         | 5·42 | ztráta <i>HO(CO)<sub>2</sub></i>   |
| sestavující převládajíc z vyloučené        |      | <i>SiO<sub>2</sub></i>             |
|                                            |      | 5·12                               |
|                                            |      | <hr/> 100·000                      |

Základní hmota *chamoisitu* toliko přenepatrně, aneb vůbec ani není sideritem proniknuta, než toliko 1·32% calcitu v ní obsaženo.

Potažná váha v *chamoisitu* zarostlých oolithů určena s množstvím 1·54 grammů jest 3·0761.

Rozbor oolithů při 100°C sušených jest; Frant. Farský;

|                                                |       | d                                        |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|                                                |       | <i>SiO<sub>2</sub></i> 1.86              |
|                                                |       | <i>FeO</i> sledy                         |
|                                                |       | <i>CaO</i> 1.16                          |
| v kyselině octové rozpustné . . . . .          | 5.39  | <i>MgO</i> sledy                         |
|                                                |       | <i>KO, NaO</i> 1.06                      |
|                                                |       | ztráta <i>CO<sub>2</sub>(HO)</i> 1.31    |
|                                                |       | <i>FeO</i> 41.58                         |
|                                                |       | <i>MgO</i> 2.12                          |
|                                                |       | <i>KO NaO</i> 2.74                       |
| v kyselině chlorovodíkové rozpustné . . . . .  | 68.23 | <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> 16.90 |
|                                                |       | <i>SiO<sub>2</sub></i> 2.83              |
|                                                |       | <i>PO<sub>5</sub></i> 1.06               |
| nerozpustný zbytek . . . . .                   | 26.38 | <i>SO<sub>3</sub></i> 1.00               |
| sestavující převládající z vyloučené . . . . . |       | <i>SiO<sub>2</sub></i> 26.38             |
|                                                |       | 100.00                                   |

Oolithy tedy toliko 2.07% calcitu prostoupeny jsou.

Šedočerné, trochu namodralé oolithy, velmi veliké, zarostlé v celistvé mdlé základní hmotě tmavošedé, z štoly č. II. v Chrustenicích; pocházející z hloubky pod zemským povrchem asi 35 metrů, kdež ruda úplně nezrušena jest, analysovány dr. Em. Bořickým (Sitzungsberichte der k. Academie der Wissenschaften Bd. LIX., I. Abthl. 1869, p. 12 a Živa Sborník vědecký Musea král. Českého II.; spisů muzejních č. 95, 1869, str. 10):

|                                    | e        |
|------------------------------------|----------|
| <i>FeO</i>                         | 40.90    |
| <i>CaO</i>                         | .92      |
| <i>MgO</i>                         | 2.76     |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 17.48    |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 23.92    |
| <i>CO<sub>2</sub></i>              | 2.5      |
| <i>PO<sub>5</sub></i>              | neurčena |
| <i>HO</i>                          | 10.50    |
|                                    | 98.98    |

Jestliže jest uhličitá kyselina vázána na *CaO* a na *FeO*, byly by oolithy prostoupeny calcitem 1.72% a sideritem 4.48%.

Tyto rudy pod číslicemi 1, 2, 3 uvedené jsou úplně neporušeny, an z nejhlubší, nyní dostupné části ložiska pocházejí.

Každé, sebe nepatrněji počínající porušení rudy jeví se nejprve v oolitech zarostlých, jejichž tmavá barva v světlejší nazelenalou se mění; ruda sama, totiž základní hmota, mnohem urputněji vzdoruje proměnám. Proto také všechny chamoisity pocházející ze střední hloubky Nučických lomů jeví barvu černozeleňavou neb černonamodralou proto, že oolithy zelenavé ji přijímají.

Přechod počíná se jevit proměnou barvy oolithů v černošedozeleňavou později šedozeleňavou.

4. Ruda s základní hmotou černošedou, lesku prázdného, tedy zemitého lomu,



s oolithy barvy šedozelené, pocházející asi z hloubky 12 až 14 metrů, 2 metry pod krovem, byla zkoušena na potažnou váhu svou.

Základní hmota, vážící 5·33 grammů dala hutnaty 3·4467. Šedozelené oolithy, jichž váha 3·06 grammů obnášela, vyvíjely ve vodě ze sebe velmi mnoho bublinek vzduchových, na doklad toho, že již nejsou tak husté jak jiné oolithy; potažná váha oolithů prostých všech bublinek byla 3·1039.

Sloh oolithů jest ještě soustředně miskovitý, množství tenkých misek nesčíslně veliké a šířka jich neměřitelná. Toliko v světlejších oolithech, vejplky rozštípených se objevují soustředně se objímající obdélné kruhy, silně šedozeleně zbarvené, několikrát po sobě, větší kruh menší objímaje. Pod drobnohledem není barva kruhů určité obmezena a každý pruh sbarvený jest na svých obvodech, vnitřním a zevnějším poznenáhlou, až do úplného vyblednutí bledší silně zbarveného středu. Jednotlivé soustředně se objímající misky, oolith skládající, lépe než v nezrušených oolitech odstávají, ale nedají se pro svou nepatrnou šířku měřit.

Vzdálenost barevných obdélných kruhů v rozštípených oolitech, měřena podle nejsilněji zbarvených čar ve středních částech obvodů, jest asi 38 mm.

Oolithy tyto při 100°C sušené analysovány; rozbor jejich jest: Fan Vonka;

|                                                |       | f |                                          |
|------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------|
| v kyselině octové rozpustné . . . . .          | 8·04  | } | <i>SiO<sub>2</sub></i> 1·24              |
|                                                |       |   | <i>CaO</i> 1·10                          |
|                                                |       |   | <i>FeO</i> 4·83                          |
|                                                |       |   | <i>MgO</i> sledy                         |
|                                                |       |   | <i>KO, NaO</i> 87                        |
| v chlorovodíku rozpustné . . . . .             | 70·00 | } | <i>FeO</i> 33·05                         |
|                                                |       |   | <i>CaO</i> 87                            |
|                                                |       |   | <i>MgO</i> 1·21                          |
|                                                |       |   | <i>KO, NaO</i> 1·43                      |
|                                                |       |   | <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> 22·08 |
| nerozpustný zbytek . . . . .                   | 21·96 | } | <i>SiO<sub>2</sub></i> 4·70              |
|                                                |       |   | <i>PO<sub>5</sub></i> 1·14               |
|                                                |       |   | <i>SO<sub>3</sub></i> sledy              |
|                                                |       |   | <i>HO</i> 1·12                           |
|                                                |       |   | ztráta <i>CO<sub>2</sub></i> 4·40        |
| sestavující z převládající vyloučené . . . . . |       |   | <i>SiO<sub>2</sub></i> 21·96             |
|                                                |       |   | 100·00                                   |

Oolithy jsou proniknuty 7·78% sideritu a 1·96% calcitu.

Že skutečně Siderit mnohé, nebo všechny světleji neb černošedě zbarvené oolithy proniká; toho zřejmý důkaz na mnohých kusech se objevuje, kde mimo tyto oolithy i okolní chamoisit do jisté hloubky tak silně sideritem proniknut jest, že v těch místech oba slabě třpytivé a od vrostlých krystálků nahnědlé zbarveny bývají. —

Barva proměňujících se oolithů tím více vyjasňuje se, čím proměna jich pokročilejší jest, tak že světlózelené mnohem zkyprtlejší tmavozelených bývají; také sloh soustředně miskovitý velmi význačně vystupuje, an světlózelenavé neb dalším

rozkladem sšedlé oolithy se v přejemné šupinky, kteréž se dříve objímaly, loupají, neb rozpadávají. Konečný výsledek rozkladu jest bílý zemitý kaolin, zarostlý v základní hmotě, buď velmi málo na pohled porušené, aneb porušením sešedlé. Kaolin nemá slohu soustředně vrstevnatého, skládá se ale z přejemnounkých, toliko při nejsilnějším zvětšení patrných plátčků šestibokých, jako vůbec všechny ostatní kaoliny. Ve vodě se rozpadávají zemité, bílé, v kaolin proměněné oolithy v blátíčko.

Potažná váha nejzrušenějších a v pravý kaolin proměněných oolithů z 29 grammů určena jest 2·5338.

Někdy se proměna oolithů v kaolín děje dosti rychle; za několik měsíců se v některých chamoisitech promění na vzduchu oolith v kaolin, kterýž deštěm vymyt, toliko na povrchu dutinatý, na pohled nezrušený chamoisit ponechává.

Zdá se, jakoby oolithy z chamoisitů podléhaly snadněji proměně v světlobarevné oolithy, než ony z Berthièrinu, což snad od chránícího je sideritu, kterým prostoupeny jsou, pochází.

Porovná-li se složení základní hmoty se složením oolithů, tož vysvítá z čísla 3, že se oboje od sebe značně liší. Základní hmota obsahuje 13—15%  $HO$ , kdežto oolithy nezrušené bezvodým křemenem jsou; nerozpustného zbytku, sestávajícího z převládající části z vyloučené  $SiO_2$ , obsahuje chamoisit toliko  $\frac{1}{20}$ , oolithy ale  $\frac{1}{4}$ ; též na  $FeO$  a  $Al_2O_3$  jest základní hmota v rozpustné části bohatší oolithů. Mimo to jsou oolithy lehčí základní hmoty.

Přechod nezrušených oolithů černošedých, oolithy šedozeleňými až v kaolin jest z analys č. 3 a č. 4., porovnají-li se mezi sebou, patrný. V oolithech, počavších se proměňovat, do kterých  $HO$  přistupuje, přibývá  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$ , a ubývá  $FeO$ , jakož i nerozpustný zbytek, což první krok k tvořícímu se kaolinu jest. —

**Vypsání složiva ložiska.** Ložisko sestávající v hloubce toliko z rud černých, (nebo modrých, jak se obyčejně nazývají) složeno z vrstev rudních, které se skládají každá z nějaké těch odrůd rudových, jež nahoře vypsány byly. Jednotlivé vrstvy rudní, až na 2 métry i více zmožněvší skládají se z rozličných rudních odrůd, tak že se mohou stýkat vrstvy mezi sebou, kteréž rozličné odrůdy buď Berthièrinu (skleněnky), neb chamoisitu (modré rudy) skládají. Obyčejná mohutnost rudních vrstev jest ve střední nejmnocnější části ložiska, v Nučicích, mnohem menší než 2 métry, kterouž mohutnost toliko některé vrstvy dosahují. Mohutnost jednotlivých vrstev možno páčit na  $\frac{1}{3}$  až  $1\frac{1}{2}$  métru. Vrstvy slabší jsou v Nučicích méně hojné vrstev mocnějších.

Jelikož se vrstvy z rozličných odrůd rudních skládají, jest složivo ložiska ve směru přímém, tedy od starší vrstvy k mladší, nebo což totéž jest, od ležatého k visutému jiné. Takový jest postup rudy v ložisku ve vrstvách od ležatého k visutému v lomu druhém Nučickém:

**A.** Bezprostředně na zoule, tedy na černých, drobových, trochu málo písčnatých břidlicích jest uložena ruda chamoisitová, černošedá, bez oolithů, hrubobřidličnatá, pevná; hutnost 3·301 (z 2·84 grammů).

**B.** Ve vzdálenosti  $1\frac{1}{4}$  métru k visutému dle mocnosti rudy jest chamoisit též něco málo hrubobřidličnatý s oolithy složenými z calcitu, hutnost 3·084 (nalezena z 2·66 grammů).

C. V 2 metrech jest Berthièrin přepevný s černými oolithy, potažná váha 3·378 (z 3·81 gr.).

D. V 4 metrech; Berthièrin pevný, černé oolithy zahrnutý toliko sideritem  $h = 3·547$  (z 3·10 gr.).

E. V 6 metrech; Berthièrin celistvý s málo oolithy přepevně srostlými a takřka na pohled splývající v základní hmotě velmi ocelkové  $h = 3·444$  (z 3·43 gr.). Jiný podobný Berthièrin dal hutnost  $= 3·480$  (z 2·69 gr.).

F. V 8 metrech; Berthièrin celistvý podobný předešlému. Hutnost  $= 3·353$  (z 3·89 gr.). Jiný, z jiné vrstvy asi v téže výšce byl více chamoisitu podobný a valně semenkovitý, potažná váha 3·262 (z 2·83 gr.).

G. Z 10 m.; chamoisit tmavočernozelenavý, semenkovitý, hutnost 3·227 (z 4·39 grammů).

H. Z 12 m.; semenitý chamoisit černošedý, hutnosti 3·287 (z 3·51 gr.).

I. Z 14 m.; chamoisit semenkový s více základní hmoty než předešlý  $h = 3·405$  (z 4·70 gr.).

Mimo Nučice, kde ložisko v menší mohutnosti vyvinuto se objevuje, jsou vrstvy rudní, ložisko skládající v celku ne v takové mocnosti zastoupeny, nebo jak mocnost, tak i množství jejich není tak velké jako v Nučicích. Vrstvy z Berthièrinu složené jsou jen v těch místech zastoupeny, kde ložisko mocnosti nejméně 5 metrů dosahuje. V Jinočanech tedy, v nejbližší vzdálenosti od Nučic jsou Berthièriny ještě dosti hojné, tolikéž i ve východní části vrchu Krahulova.

V Chrustenicích, kde ložisko přece ještě mocnost více 2 metrů zaujímá, nejsou více ty tvrdé skleněčky, jako v Nučicích, ačkoliv i tam chamoisit ještě značně tvrdý a sideritem přejemně prostouplý jest.

V Chrustenicích v západní části, nebo ve Vráži, kdež se mocnost rudy až na metr ba i méně stlačí, vystupují oolithy, kteréž něco málo větší jsou, než jak napřed udáno, v rudě náramně v popředí, a na základní hmotě samé se na prvý pohled poznává, že ač těžká, je přece znečištěna horninou, kteráž rudou není.

Tak slabá ložiska sestávají toliko z jediné vrstvy rudní. —

Do složiva ložiska přistupují vedlé těchto vypsanych rud ještě **skameněliny**, které ač žádné ceny nepřidávají bohatosti ložiska samého, jsou nicméně pro vědecké poznání pásma samého, v kterém se rudy objevují, ve spojení s otisky z ležatého a visutého, tím důležitější, an posud takorba praničeho o skamenělinách v rudě Nučické známo nebylo. Skameněliny jsou v rudě vелеvzácnými úkazy, a toliko velikému rozdělení, jakož i zkoušení mohutnosti ložisek spojeným s šťastnou ráhodou jest to přisoudit, že valný počet skamenělin a některých, pro útvar silurský zcela nových nalezeno jest bylo.

Ložisko v Chrustenicích a sice mezi štolami číslo I. a II. obsahuje následující skameněliny v ležaté části své, toliko na jediném obmezeném místě: *Orthoceras bisignatum* Barr., *Cystidea bohémica* Barr., *Cystidea Sedgewicki* Barr., *Echinospaerites* nov. sp. (podobný trochu k převzácnému *E. infaustus* Barr.) *Echinocrinus Helmhackeri* Barr., *Capulus* nov. spec., *Capulus* nov. sp. *Natica* sp., *Eomphalus* nov. sp., *Pleurotomaria* sp. velká, *Pleurotomaria* sp. malá, *Murchisonia* sp., *Discina* sp., *Orthis* sp., *Rhombifera bohémica* Barr., *Iliaenus Panderi* Barr., *Cheirurus claviger* Barr., *Asaphus nobilis* Barr., *Trinuncleus ornatus* Barr., *Plum-*

*lites bohemicus* Barr. a stopa jiného ještě neurčitého trilobita z řady oněch s *pleures à bourelet*, též i *Conularia* sp. (malá, od *Conul. grandissima* rozdílná), *Conularia fecunda* Barr., *Cornulites bohemicus* Barr.,? *Hyolithes* sp.

V Chrustenicích vedlé zvířat jmenovaných též velice nezřetelné stopy od *Chondrites* objeveny.

V Krahulovské štole toliko *Orthoceras bisignatum* Barr. nalezen.

V lomu Krahulovském vedlé *Orthoceras* ještě *Conularia grandissima* Barr., v části ložiska, s ležatým bezprostředně se stýkající, nalezeny jsou.

V Nučicích nalezeno jak se zdá 2 až 3 métry od visutého rudy k ležatému: *Nucula bohemia* Barr., *Orthoceras bisignatum* Burr., *Orthis macrostoma* Barr., *Pleurotomaria viator* Barr., *Graptolites* sp. (podobný k *Grapt. colonnus* Barr., od kterého se ale liší), *Asaphus nobilis* Barr., *Pleurotomaria* sp.

V Jinočanech nalezeny: *Orthoceras bisignatum* Barr., *Conularia grandissima* Barr., *Serpulites bohemicus* Barr., stopy od *Trinuncleus ornatus* Barr.

**Sloh ložiska.** Jak s ubývající mocností k oběma cípům ložiska, ubývá i mocnosti vrstev, jakož i množství vrstev samých, tak že slabá ložiska ve Vraži a v Chrustenicích se toliko ze samojediné rudné vrstvy skládají; tak i v tom směru ovšem v mnohem menší míře, než ubývá na mocnosti, ubývá též něco na jakosti rudy samé.

Mnohé zvláštnosti v slohu ložiska mohou se toliko ve středu jeho, tedy toliko v Nučicích (též v Jinočanech částečně) sledovat, o kterých v slabších částech ložiska ničeho, alespoň ne v té míře se pozoruje. Jedna taková zvláštnost jsou *stříhy* ložiska, v Nučicích převýborně vyznačené. Stříhy (*failles*, *Schlechten*) u ložisek rudních nebývají hojné; zde ale jsou vyznačeny ve dvou směrech. Jeden směr stříhů jest:  $11^{\circ}3'$ ,  $9^{\circ}7'$ ,  $10^{\circ}0'$ , s úklonem  $75^{\circ}$ ,  $85^{\circ}$ ,  $83^{\circ}$  na západ, ale málokdy též na východ; druhý směr stříhů jest:  $5^{\circ}7'$ ,  $5^{\circ}0'$ , a úklon  $60^{\circ}$ ,  $65^{\circ}$  na sever. Střední čísla prvního směru stříhů jsou tedy:  $10^{\circ}2'$  a úklon  $81^{\circ}$  na západ; druhého, stříhů  $5^{\circ}4'$  a úklon  $63^{\circ}$  k severu. Oboje stříhy protínají se tedy úhlem, jehož vodorovná míra  $73^{\circ}$  jest, tvoříc velké kvádrovité balvany mezi sebou, tímto úhlem obmezené. Stříhy jsou buď jen hladké, nebo slaboučkou žilkou limonitu, kaolinu neb sideritu vyplněné; sideritem vyplněné stříhy jsou trochu více rozevřeny ostatních, ještě více rozevřené ale mívají složivo rudních žilek. Později ještě vytknuto bude, jak důležité stříhy ty pro proměnu ložiska na výchozím jsou. — V tomto vypsáném vrchním ložisku vyskytují se na některých místech, ovšem ve střední části, jako v Nučicích, vele-vzácně, na cípech ložiska o něco hojněji, malá, krátká neb i delší ložiska, černé břidlice drobové uložené u prostřed vrstev rudních mezi nimi. Nabývá-li ložisko v rudě uložené břidlice dalšího prostranství dle vlaku svého, dělí ložisko rudní ve dvě, neb v několik částí neb plástů, jako to na některých výchozích ve Vraži vidět je. V těchto břidlicích mezi ložiskem uložených, kteréž tudíž k složení ložiska přináležejí, jsou hojně vtroušeny větší čocky neb celé bochníky rudy, ba i delší vrstvy rudové. Mimo to přechází tato břidlice někdy v jakýsi polovičitý chamoisit, an sideritem proniknuta jest a hojnost vrostlých oolithů mimo to obsahuje.

V některých místech, zvlášť v ležatém ložiska rudního, i v Nučicích samých jsou ležaté vrstvy ložiska někdy břidličnaté a chudé na oolithy, tak že se u některých dá sledovat na jistých místech přechod nepřetržený do ležatých břidlic

drobových, sideritem prostoupených, a tudíž těžších ostatních břidlic, a kteréž tím více se rudě přibližují. an i vtroušené oolithy zarostlé obsahují. O některé chudé břidličnaté rudě v ležatém bývá nesnadno rozhodnout, zdali náleží do ložiska neb do ležatých břidlic; tak jest přechod obojích do sebe na některých místech pozneo náhlý. Však břidličnatá chudá, byť i oolithická ruda rozpadá se za krátký čas, jak-břidlice sama, v drobty vyschnutím na slunci a oolithy v ní jsou buď řídkěji zahrnuté, aneb o mnoho větší než ve vlastní rudě. — V celém stropu, bezprostředně rudy se dotýkajícím, jakož i v počvě bezprostředně pod rudou, vyskytují se až do jisté vzdálenosti od ložiska, buď maličké, neb co hrách, bob, neb stlačený ořech, neb co velmi rozmačknuté splcatělé jablko, velké kule nepravidelné neb placaté, které majíce barvu tmavočernošedou, svou tíží rudě se podobají. Malé kousky bývají dosti tvrdé, větší kousky placaté však rozpadávají se snadno v menší hranaté, an již natrhané se jeví samy v sobě. Lom jest celistvý, lesk slabý, a potažná váha (kousků z Jinočan z ležatého 2·96 grammů těžkých) jest 2·7895.

O některých splcatělých takových shlukách z visutého břidlic v Chrustěnicích možno za to mít, že jsou to velmi zpotvořelé skameněliny nějaké Cystidei.

Někdy takových, jak oolithy malých, a vlastním oolithům tím podobnějších shluků, an i soustředně miskovitý sloh přijímají, se nalezá jako naseto v jistých krátkých pruhách zároveň s vrstevnatostí. — Jisto jest též, že některá slabší ložiska chudé rudy, doprovázející na krátko vlastní tvrdou rudu, jako u Vrače, skládají se z břidlice slabě sideritem proniknuté, a úplně těmito shluky oolitickými, kteréž však o něco větší vlastních oolithů bývají, prostoupené. Slabě sideritem proniknuté břidlice se na slunci za krátko drolí, což u rudy nebývá nikdy; značněji sideritem proniknuté břidlice oolithické více rudě se podobají, an se teprve po delší době rozpadávat počínají.

Když se pozorně sleduje celý vývin rudy, když se dále uváží, že i v dobré rudě se sem tam objevují takové černošedé velké shluky zarostlé: nedá se upřít, že i z nejčistší rudy se dá poznenáhle přechod až do břidlic, oolithy, zahrnujících, bezpřetrženě stopovat. Poučný tento úkaz jest ale toliko na místech vidět, které od středu ložiska daleko vzdáleny jsou. Těmito oolithy, jakož i přechody do břidlic (zvláště v ležatém), souvisí ložisko úzce s okolní břidličnatou horninou.

Jest ještě jediná otázka, jakým způsobem asi ložisko ve svém vodorovném rozprostírání neboli vlaku se ukončuje? Konce tyto sice nejsou známy, ale zná se ložisko dle vlaku svého již dosti daleko, a tu se zdá, smí-li se z výchozího, tedy z ložiska nedobře otevřeného soudit, že ku konci vlaku ložisko se chýlí se vyřezuje úplně, a že v souvislé vrstvě se v neveliké vzdálenosti opět znova rudní vrstva objevuje, což se opakuje mnohokrát, při čemž každá následující vrstva rudní slabší a kratší předešlé jest, až konečně zbytky vrstev toliko táhlými ččkami, neb sploštěnými kulemi, v jediné vrstvě uloženými a daleko od sebe odlehklými jsou.

Při hloubení studny v Ovenci u Prahy, v letohrádku p. Lany objeven vlak malých sploštělých shluků (konkrecí) nebo kul velikosti slabé pěstě. Kule sestávají z chamoisitu velmi spoře oolithy prostoupeného; jedna taková kule byla prasklá, (Septarie), v rozsedlině narostlý baryt úplně se podobal onomu, jak v rozsedlinách v okolí nučickém se vyskytuje. Kdyby se dalo nějakým způsobem dokázat, že vrstva, v které vlak kul objeven, souvisí s vrstvou nučické rudy, — což tím ne-

snadnější jest, an vrstvy  $d_4$  v Ovenci náleží do nižšího, vržením od vyššího pásma odtrženého pruhu vrstev  $d_4$ , — byly by kule ovenecké nejvýchodnějším koncem ložiska nučického. Však možno též, že se chamoisitové vrstvy neb kule i v jiných buď vyšších neb nižších vrstvách, než ona je, v které se nučická ruda usadila, objevují, a nemožno tedy z tohoto jediného příkladu ničeho soudit, než toliko to, že mineralogická podobnost rudy s nučickou nápadně značná jest.

**Proměna ložiska** děje se v dvojím smyslu: Buď se mění ruda chamoisitová samotná v ležaté břidlice, nebo rušivou mocí vody ruda ve větší hloubce sešedne a změkne valně, an i oolithy zarostlé úplně zbělají a v kaolin se promění. Mezi touto poslední proměnou v šedou rudu s kaolinovými zrněčky (nebo oolithy nemožno jich více jmenovat) a černou rudou chamoisitovou neb Berthiérinovou jest neskonale mnoho přechodů naznačených barvami tmavočernomodravými, tmavočernozelenavými, kteréž zbarvení rudy toliko od počínajícího blednutí, nejspíše se rušících oolithů, do barev tmavozelených a světle šedozelených, pochází. V jisté mírné hloubce toliko takové rudy celé ložisko skládají. Toliko v největší posud dostížené hloubce jsou právě nezrušené chamoisity a Berthiériny, kteréž mimo černošedou a tmavočernošedou barvu se tím od ostatních rozeznávají, že oolithy v nich zahrnuté neobsahují prázdné vody chemicky vázané. — O jiném přechodu ložiska do břidlic sideritem slabě prosáknutých a oolithy prostoupených v předešlém článku, o slohu ložiska, řeč byla.

Aneb celé ložisko jest proměněno na výchozu do *limonitu*.

Proměna černé rudy v rudu žlutou dá se z hloubky do výše postupně stopovat. Všecky vrstvy rudní, z nichž ložisko složeno jest, protaženy jsou ve dvou směrech naznačenými již stříhami, kterými vrstvy děleny jsou v kvádrovité špalky. Po stříhách jeví se nejprve počínající proměna rudy tím, že vniklou ve stříhy vodou, špalky kolem stříhů slabou korou hnědé rudy obaleny jsou, kteráž tedy zároveň mimo stříhy vlastní, kvádrové špalky rudy značněji od sebe dělí. Prvá tato kora hnědé rudy bývá hnědá a na lomu celistvá. Čím blíže k výchozímu, tím mocnější bývá kora limonitu až do jisté míry; potom se objevují špalíky ohrnuté dvěma i více za sebou následujícími pruhy limonitu hnědé, mezi kterými kraj s žlutou neb žlutohnědou pevnou rudou sice, ale méně pevnou, než ona hnědých pruhů jest, se nachází. Vnitřky špalíků jsou na rohách značně okulaceny a podobají se spíše malým žokům; též nesestávají více z rudy neproměněné, nýbrž z našedlé, polozemité, zkypřelé rudy se světlezelenými neb bílými oolithy; ve středu malých žoků toliko uzavřeno jádro rudy pevnější méně zkypřelé. Žlutá neb žlutohnědá ruda okraje jest toliko pseudomorphosou základní hmoty chamoisitové, an v ní zelenavé neb bílé oolithy jistě zahrnuty jsou.

V jisté hloubce podobá se celé ložisko přehrubé síti s okulaceny oky, jejíž pletivo sestává z limonitu, oka ale šedočernavomodrým chamoisitem zkypřelým vyplněna jsou. Stříhy vynikají co žilky tmavěji zbarvené, jelikož po nich se nejprve hnědá ruda usazovala.

Čím proměna pokročilejší, tím menší jsou jádra modré rudy limonitem žlutohnědým zahrnutá, tak že se v jisté výšce toliko sem tam kule chamoisitu vyskytnou, an menší jádra již úplně proměněna byla. Na vlastním výchozím se toliko jen žlutohnědá semenitá ruda objevuje. Seménka bývají mnohdy též v hnědou rudu promě-

něny, ale nejbojněji se objevují toliko na bílo, neb bíle zbarvené, v žlutohnědé základní hmotě.

Hloubka, až do které proměna černé rudy v žlutou zasahuje, obnáší 6 až 12 metrů. — Ložisko chamoisitu tedy nemůže na den co takové vycházet, a toliko hnědé rudy semenkovité na výchozím poukazují na chamoisit, v hloubce z nich se teprve přeměnicí (vlastně naopak). Že pak hnědé rudy na výchozím se často drobí a spojitosti pozbývají, nemožno i z nejlépe přírodou odhaleného výchozu určitě mocnost a povahu ložiska zevrubně poznat.

Proménou černé rudy v žlutou, dají se mnohé pamětihodné zvláštnosti pozorovat. Jestliže se každý, stříhy a vrstevnatými plochami obmezený špalek jedno- stejné proměnil v žlutohnědou rudu oolithickou, vyjma nejkrajnější obal tvrdším pruhem hnědého limonitu, tedy se v celé hmotě jeho nalezá stejná žlutohnědá ruda, toliko snad několika slabě barvenými kruhy nahnědlými a soustředně se objevujícími kreslena; střed kruhů splývá se středem bývalého špalku.

Jestli že ale kora špalků, z pevného hnědého limonitu čistého, beze všech oolithů, sestává, aneb jestli že několik takových pruhů hnědé bohaté rudy v hnědo- žluté rudě oolithické, do které ostatní část proměněna jest, se soustředně objímá, tedy se nenalezá střed bývalého balvanu rudního proměněn též v hnědou rudu, nýbrž on jest polodutý a vyplněný šedomodravou zemitou barvicí hmotou, co posledním pozůstatkem chamoisitu, z něhož všechna látka v limonit se proměnila již vysáknuta jest byla. Pruhy na rudu čistou bohatší soustředily do sebe tolik kysličníku želez- itého  $Fe_2O_3$ , že celý špalek v sloučenství kysličníku železnatého  $FeO$  obsahoval, tak že ze zbytku víc ničeho nezbylo, kdežto ještě prostora prázdná zbývala. Na přechodech to též patrné vidět; kde kolem jádra chamoisitového více hnědé než žlutohnědé semenkové rudy usazeno, tam jest jádro zemité a kypré; kdežto jádra, kolem kterých tolik žlutohnědá ruda usazena jest, dosti pevná a na pohled mnohem méně proměněna jsou prvéjších. Z toho následuje, že proměněná hmota balvanů, v kterých jest uvnitř dutina, jest na železo tím bohatší, čím dutina větší, an se v korách železo nahromadilo; kdežto ostatní, bez střední dutiny proměněné balvany obsahují totéž množství železa, jako původní chamoisit obsahoval.

V některých částech hnědé rudy ložiska, v kterých původní špalíky chamoisitu, proměnilšího se již, samy o sobě malé byly, nebo kde v kouli proměňující se v limonit se opět menší jádra utvořila, kolem kterých se kory limonitu usazovaly, nalezají se ve středu hnědé rudy, co bývalých špalků modré rudy, kulovité kory hnědé rudy obecné „škatulkami“ (Adlerstein) zvané, v jejichž středu se buď šedo- modrý, zemitý, jako pískovitý, barvicí zbytek, nebo prázdná dutina nalézá. Čím moc- nější kora hnědé pevné rudy, neb kde mnoho slabých kor jako škatulky v sobě zavřených jest, čím více jich po sobě následuje, tím větší bývá dutina.

Nedá se zamlčet, že zbytek zemitý, uprostřed škatulek zahrnutý, se podobá úplné rozpadlé a vodou prosáklé drobové břidlici.

Na krajích ložiska, jako u Vráže, se objevují na výchozím též podobné kule, kteréž ale nebývají duté; nýbrž silná miska nečisté hnědé rudy obkličuje jádro rudy, která se více černošedé břidlici drobové, než rudě podobá, a v níž se slída ještě dobře pouhým okem rozeznává. Z rudy chudší, sestávající toliko z břidlice

rudou prostoupenou, byla ruda z jádra proměnlivšího se vysáknuta a v miskou, jádro objímající nahromaděna.

Že chamoisity, sideritem prostouplé, tedy odrůdy Berthièrinu, hnědou rudu pevnější a něco bohatší poskytují po svém zrušení, zjištěno zkušeností.

V hnědé rudě na výchozím jest vrstevnatost rudy ještě dobře rozeznatelná, též stříhy, ač namnoze setřelé, se přece co směry žilkami limonitu zbarvené rozeznávají, ač se dle nich hnědá ruda více neláme, jako ruda černá.

Mimo tento způsob proměny chamoisitu v limonit kolem jistých středů, kdež základní hmota v limonit se proměnila, oolithy ale z největší části jen zbělely a jen málokdy též zhnědly, se objevuje ještě jiný druh proměny, při kteréž jak základní hmota, tak i oolithy stejně v šedavožlutou okrovitou rudu, však nebarvící, se proměnily. V celém uložení rudy jednorodém nejví se mimo toto nižádné jiné zbarvení, a zdá se, že se děla proměna ve všech částech rudy stejnou dobou, tak že žádná část nebyla spíše proměněna v limonit, než jiná. Oolithy splývají takřka úplně s základní hmotou rudy, od které se barvou ničím neliší, tak že toliko při zvětšení se rozeznávají. Vsaň se tato okrovitá ruda vyznamenává před jinou a to tím, že v ní krátké žilky hnědé rudy slabě vláknité se objevují, v jejichžto dutinách plno drůz krystalů klenčových, limonitu po sideritu, narostlých jest, o čemž ještě později se pojedná.

Okr žlutý, jak se posud toliko v Jinočanech na obmezeném místě nalézá, má hutnost, je-li prost bublin, 3·0431 (z 1·05 grammů určena).

Sušen při 110° C. a vyžíhán zrudne úplně, ztratě všecku vodu,  
 již pouští  $HO = 10·259$ .  
 Kdyby se zbytek vzal za čistý  $Fe_2O_3$ , bylo by toho tedy  $= 89·741$ .  
 100·00

Poměr kyslíku (O) vody, ke kyslíku kysličníku železitého jest:  $\frac{1}{2·952} = \frac{1}{3}$ ,  
 sloučenství by bylo tedy  $Fe_2O_3, HO$  s tím, že zbytek vyžíháný skutečně čisté  $Fe_2O_3$  beze všeho jiného přimísení jest, což nezkoušeno.

Tato okrovitá ruda z Jinočan byla v mnohostoleté minulosti dobývána, a ač staří i pevnější hnědou rudu znali, neboť na ní vedle okru měkkého přišli, nedotkli se jí. Chamoisitu pak úplně neznali.

Nebude snad od místa zde v krátkosti se zmínit, že před staletími toliko snadno tavící se rudy okrovité z Jinočan a ze Zbuzan taveny býti mohly. Po celé vysočině polní u Tachlovic nalézají se strusky těžké, jakéž jen od rud přímo v kujné železo ztavených pocházeti mohou. Jelikož na celé výšině nikde není místa, kde by se mohly měchy silou vodní hnát, an tam vůbec ani vody není, ovšem způsob, jakým se železo asi vyrábělo, ani znám není, zajisté ale se v nístějších štukových neb v tak nazvaných selských pecích tavelo, v kterých se toliko kypré a snadno tavitelné okrové rudy rozpouštějí. To též možný důkaz, proč toliko kyprých rud vyhledáváno, mimo to že pro pevné rudy nástroje snad méně dokonale byly.

Jest ještě jedna proměna chamoisitu, která ale jen pod jistými výminkami se pozoruje a nikdy takové rozsáhlosti nenabývá jako proměna v limonit. Kolem rozsedlin větších, nebo-li kolem vržených, jest ruda vrženými až do jisté vzdále-



nosti úplně rozdrvena a rozžmolena a na výchozím v zemité haematit proměněna. Že pak vrženými toliko poměrně menší část rudy rozžmolena a roztrhána, jest proměna v červenou rudu nebo krevel, oné v hnědou, mnohem podřízenější. Krevel jest zemité beze vši vrstevnatosti, což se rozdrčením rudy vysvětluje, an tato mnohdy v úzkém pruhu daleko s vržením se vleče a bílými oolithy zemitými prostoupena jest. Však pozoruje se, že proměna rudy černé v červenou kolem vržení větších mnohem hlouběji vnikla, než proměna v hnědou rudu, což se opět vysvětluje velikou rozdrčeností rudy, čímž více přístupu vodě a vzduchu zjednáno, než by jinak možno bylo.

**Úvaha.** Ložisko Nučické uloženo v břidlicích a křemencích pásma *D*, které značnou část spodního silurského útvaru vytváří. Do kterého asi z pěti pásma, v které se celá étage *D* dělí, by ložisko se vřadit dalo, bylo dlouho nerozhodnuto. Dle znaků petrografických, jakož i z uložení vysvítá s jistotou, že ani v pásmu nejnižším *d*<sub>1</sub>, ani v nejvyšším *d*<sub>5</sub> ložisko uloženo není. Nebo *d*<sub>1</sub> se svými mandlovcí a ostatními poměry ložisek rudných, jakož i uložení svým se liší naprosto od onoho pásma, které rudu doprovází; též pásmo *d*<sub>5</sub> svými břidlicemi i pískovci jakož i uložení svým pod vrchním útvarem silurským se vylučuje z oněch možných pásma, v kterých by ruda, když by se toliko z petrografických známek soudilo, uložena býti mohla. Zbývají toliko střední pásma *d*<sub>2</sub>, *d*<sub>3</sub> a *d*<sub>4</sub>, v kterých by ložisko uloženo býti mohlo. Že pak křemence pásmo *d*<sub>2</sub> vyznačující ve visutém úplně chybí, může pásmo *d*<sub>2</sub> toliko v ležatém rudy se nacházet. Zbývají tudíž ještě pásma *d*<sub>3</sub>, *d*<sub>4</sub>, v nichž v jednom zajisté ložisko umístěno jest. Visuté rudního ložiska podobá se velice břidlicím z pásma *d*<sub>3</sub>, též skameněliny jsou si podobny; ale skameněliny z pásma *d*<sub>3</sub> objevují se též v nejjemnějších vrstvách pásma *d*<sub>4</sub>, od kterých se břidlice na pohled nižádným způsobem rozeznat nedají, opět z největší části.

Toliko z petrografických známek se obzor rudy určit nedá, jelikož jednotlivá pásma na znacích zakládajících se v uložení a na skamenělinách založena jsou. Zbývá tedy k zevrubnému určení obzoru porovnání skamenělin všech, ve visutém i v ležatém, jakož i uložení.

*Zde vyznačeny všechny posud nalezené skameněliny seřazené dle tří rozličných obzorů:*

|   |                                           | ležaté vrstvy | rudní ložisko | visuté vrstvy |
|---|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | <i>Crustacea.</i>                         |               |               |               |
|   | Trilobites:                               |               |               |               |
| 1 | Trinuncleus ornatus Barr. . . . .         | †             | †             | †             |
| 2 | Dalmanites socialis var. proeva Barr. . . | †             |               | †             |
| 3 | Illaenus Panderi Barr. . . . .            | †             | †             | †             |
| 4 | Asaphus nobilis Barr. . . . .             |               | †             |               |
| 5 | Cheirurus claviger Barr.. . . .           |               | †             | †             |
| 6 | Aeglina rediviva Barr. . . . .            |               |               | †             |
| 7 | Acidaspis Buchi Barr. . . . .             | †             |               |               |
| 8 | Trilob. spec. indet. . . . .              |               | †             |               |
|   | Vejce, snad trilobitů . . . . .           |               |               | †             |

|    |                                            | ležaté vrstvy | rudí ložisko | visuté vrstvy |
|----|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|    | Ostatní korýši:                            |               |              |               |
| 9  | Cytherina socialis Barr. . . . .           | †             |              |               |
|    | Cytherina sp. . . . .                      | †             |              |               |
| 10 | Beyrichia bohémica Barr. . . . .           | †             |              |               |
| 11 | Plumulites bohemicus Barr. . . . .         |               | †            | †             |
|    | <i>Cephalopodeæ.</i>                       |               |              |               |
| 12 | Orthoceras bisignatum Barr. . . . .        | †             | †            | †             |
|    | <i>Pteropodeæ.</i>                         |               |              |               |
| 13 | Cornulites bohemicus Barr. . . . .         |               | †            |               |
| 14 | Conularia grandissima Barr. . . . .        | †             | †            |               |
| 15 | Con. insignis Barr. . . . .                | †             |              |               |
| 16 | Con. modesta . . . . .                     |               |              | †             |
| 17 | Con. fecunda . . . . .                     |               | †            |               |
| 18 | Con. sp. . . . .                           |               | †            |               |
| 19 | Hyalolithes sp. . . . .                    |               |              | †             |
| 20 | ? Hyalolithes . . . . .                    |               | †            |               |
|    | <i>Gasteropodeæ.</i>                       |               |              |               |
| 21 | Euomphalus sp. . . . .                     | †             |              |               |
| 22 | Euomph. sp. . . . .                        | †             |              |               |
| 23 | Euomph. sp. . . . .                        |               | †            |               |
| 24 | Capulus sp. . . . .                        |               | †            |               |
| 25 | Pleurotomaria viator Barr. . . . .         |               | †            | †             |
| 26 | Pleurotomaria sp. . . . .                  | †             |              | †             |
| 27 | Murchisonia sp. . . . .                    |               | †            |               |
| 28 | Natica sp. . . . .                         |               | †            |               |
|    | <i>Brachyopodeæ.</i>                       |               |              |               |
| 29 | Atrypa deformata Barr. . . . .             | †             |              |               |
| 30 | Rhynchonella primula Barr. . . . .         |               |              | †             |
| 31 | Discina squamifera Barr. . . . .           | †             |              |               |
| 32 | Discina sp. . . . .                        | †             |              |               |
| 33 | Discina sp. . . . .                        |               | †            |               |
| 34 | Lingula lingua Barr. . . . .               |               |              | †             |
| 35 | Lingula sp. . . . .                        | †             |              |               |
| 36 | Cyclus? bohemicus Barr. . . . .            |               |              | †             |
| 37 | Leptaena aquila Barr. . . . .              | †             |              | †             |
| 38 | Orthis radiatula Barr. . . . .             |               |              | †             |
| 39 | Orthis macrostoma Barr. . . . .            |               | †            |               |
| 40 | Orthis sp. (macrost. neb. redux) . . . . . | †             |              |               |
| 41 | Orthis sp. . . . .                         | †             |              |               |
| 42 | Orthis sp. . . . .                         |               | †            |               |
|    | <i>Acephaleæ.</i>                          |               |              |               |
| 43 | Nucula bohémica Barr. . . . .              |               | †            | †             |
|    | <i>Graptoliteæ.</i>                        |               |              |               |
| 44 | Graptolites tectus Barr. . . . .           |               |              | †             |
| 45 | Graptolites sp. . . . .                    |               | †            |               |

|                             |                                          | ležaté vrstvy | rudní ložisko | visuté vrstvy |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Encrinites.</i>          |                                          |               |               |               |
| 46                          | Cystidea bohémica Barr. . . . .          | †             | †             | †             |
| 47                          | Cystidea Sedgewicki Barr. . . . .        | †             | †             |               |
| 48                          | Echinoencrinus Helmhackeri Barr. . . . . | †             | †             |               |
| 49                          | Echinosphaerites sp. . . . .             |               | †             |               |
| 50                          | (Encrinites) sp. . . . .                 | †             |               |               |
| 51                          | Rhombifera bohémica Barr. . . . .        |               | †             |               |
| <i>Polypes.</i>             |                                          |               |               |               |
| 52                          | Spec. ind. . . . .                       |               |               | †             |
| Mimo to z <i>Annelidů</i> : |                                          |               |               |               |
| 53                          | Serpulites bohemicus Barr., . . . .      |               | †             | †             |
| a z rostlin: <i>Algæ</i> :  |                                          |               |               |               |
| 54                          | Chondrites sp. indet. . . . .            | †             | †             | †             |

Z vypočítaných zde skamenělin vysvítá, že pocházejí z pásma  $d_4$ .

Sleduje-li se uložení vrstev, tedy vysvítá z něho, že se ruda objevuje ve vrstvách drobových břidlic, střídajících se s křemenci, čímž též pásmo  $d_4$  vyznačeno jest; nebo všeobecná petrografická známka  $d_4$  jest „schistes micacés alternants avec quartzites“.

Povází-li se ale, že hlavně v ležatém rudě se střídají křemence s břidlicemi, kterým mnohdy převládají, a že ve visutém se objevují toliko měkké vrstvy břidličnaté, v kterých a to v nejvyšších částech, nehluboko pod břidlicemi  $d_5$  ležících, se též ještě křemenité, drobové břidlice vyvinují, kteréž ale nikdy rozsáhlosti i tvrdosti křemencových nenabývají, tož by se dalo uložení ložiska asi takto vyjádřiti: *Ložisko Nučické asi uloženo u prostřed pásma  $d_4$  ve vrstvách oněch, které jsou pohraničními s ležatou částí převládajíc křemencovou a visutou částí břidličnatou tohoto pásma.* Vzdálenost ložiska dle mohutnosti od ležatého neb visutého pásma  $d_4$  udat je nesnadno, jelikož hranice nejsou všude zevrubně odkryty a mimno to se úklon vrstev přehojnými vrženými posouványi přecasto mění.

V Chrustenicích, ač není ani hranice vrchní s  $d_5$ , ani spodní s  $d_3$ , určité vyhledána, možno za to míti, že vzdálenost ložiska od spodní hranice pásma  $d_4$  asi okolo 550 metrů až k ložisku a od ložiska k ukončení pásma asi okolo 600 metrů počínaje v mohutnosti vrstev obnáší. Celá mohutnost pásma  $d_4$  by tedy u Chrustenic byla něco více jednoho kilometru (asi 1150 m.).

U Nučic jest obmezení pásma do ležatého i visutého ještě méně známo než v Chrustenicích, úklon vrstev též není zevrub měřen, tak že toliko jen asi zblížená čísla pro vzdálenost ložiska od obou hranic pásma udat se mohou. Odlehlost ložiska od spodní i vrchní hranice pásma  $d_4$  jest asi 400—500 metrů a okolo 500 m.; tak že mocnost celého pásma asi něco méně než 1 kilometr by obnášela (900—1000 m.).

### Nerosty pro ložisko Nučické významné.

Jakkoliv na prvý pohled se zdá, že ruda Nučická toliko velice málo druhů nerostů by provázena býti měla, jest po bedlivějším hledání, k čemuž ovšem rozsáhle otevřené ložisko a práce v něm zaražené přispívají, počet nerostů na valnou řadu uveličen.

#### Nerosty v ložisku vtroušené.

V první řadě dlužno jmenovat základní hmotu, skládající takřka všecku rudu, kteráž do soustavy nerostopisné co

**chamoisit** uvedena jest. Bližší popsání chamoisitu napřed podáno. Zajisté že *oolithy* v chamoisitové základní hmotě zarostlé též zvláštní druh nerostů tvoří.

**Siderit** prostupující rudu a měnící ji v Berthiérin jest tolikéž důležitým složivem.

**Limonit** jest co pevná semenitá ruda i co okr pro výchozí ložiska významný.

**Haematit** zase při vrženích značnějších, hojný. V rudě se jen zřídka proměna chamoisitu v limonit a haematit pozoruje. V rudě vtroušeny objevují se následující nerosty:

**Kaolin**, z kterého sestávají do běla proměněné *oolithy*; o tomto kaolinu též zjištěno, že jest krystalovaný v šestibokých-plátkách ač přeútlých, předce pod drobnohledem patrných.

**Calcit** tvoří kuličky na způsob *oolithů*, jen že mnohem větší, v některých vrstvách hrubobřidličnaté rudy, blízko ležatého.

**Aragonit** se objevuje v *oolithech* některých, které tudíž jsou pseudomorphosami, v Krahulově; o těchto *oolithech* řeč bude ještě později při aragonitu.

**Selenit** v malých krystalkách, asi 3 mm. vysokých a 2 mm. širokých a dlouhých, nalezen v šedomodravém zemitém obsahu kulí limonitových (Adlerstein) zarostlý. Krystalky jsou čiré, ač povrch jejich šedý, znečištěný se jeví.

Tvar jejich jest  $-\frac{P}{2} \cdot \infty P \cdot \infty \tilde{P} \infty$ ; plochy  $\infty \tilde{P} \infty$  rovny a lesklé, méně lesklé jsou plochy  $-\frac{P}{2}$ ,  $\infty P$  pak rýhované v směru kolmém.

**Pyrit** zarostlý v zrnkách malých, na lomu jemnozrných, obyčejně ve vrstvě rudní, která se bezprostředně ležatého dotýká; alespoň tak to známo ve Vráži, Chrustenicích, na Krahulově i též v Nučicích. Ačkoliv se též sem tam i v jiné rudě, jmenovitě oné, která měkčí a na slunci za čas se drolící zarostlý vyskytuje, jest předce toliko v nejležeatější vrstvě nejhojnější. Vyskytne-li se ale kyz též v rudě jinak tvrdé, tvoří porůznu malé tenounké žilky lomu celistvého, nebo zaujímá v jistých nevelikých místech, kteréž nebývají nikdy větší vlašského ořechu, zcela místo chamoisitové základní hmoty. Do skvrn celistvého pyritu bývají zarostlé neporušené černé *oolithy*, jako do základní hmoty rudy samé. Jen zřídka jest viděti, že by i *oolithy* v kyzu zarostlé byly též v kyz proměněny. Vzácnější všeho ale jest, viděti *oolithy* v pyrit proměněné, v různých skupeninkách maličkých, zarostlé v neproměněné základní hmotě. Kdekoliv se to pozorovati dá, jeví se v *oolithech* v pyrit proměněných též soustředně miskovitý sloh, který ale toliko z několika málo, pouhým okem dobře viditelných misek sestává.<sup>27)</sup>

**Galenit.** Některé rudní vrstvy ležaté lámou se při rozbití v kousky s hladkými, drobně vlnovitě prohýbanými plochami. Na těchto hladkých plochách pozorují se malé skvrny barvy šedomodré a lesku kovového, kteréž z přeténké vrstvičky galenitu sestávají. V Chrustenicích v štole II. a v Nučicích několikrát galenit takový nalezen.

**Arsenopyrit.** V Nučickém lomu prvním, asi čtyry métry od visutého k ležatému počítaje, jest v chamoisitu s základní hmotou tmavošedou a oolíthy světle šedozelenými v jistých, velmi obmezených pruzích slabých, zárovných asi s vrstevnatostí, arsenopyrit v maličkých krystalkách zarostlý.

Krystaly jsou nízce hranolovité a největší z nich  $1\frac{1}{2}$  millim. vysoké,  $2\frac{1}{2}$  mm. široké a  $1\frac{3}{4}$  mm. dlouhé; ostatní jsou mnohem menší; též jehličky asi 3 mm. vysoké, však velmi nepatrně široké a dlouhé se též, ač mnohem řidčeji, vtroušeny objevují, mimo hranolu  $\infty P$  se nižádná plocha na jehličkách nerozeznává.

Tvar krystalů jest  $\infty P \cdot \frac{1}{4} \bar{P} \infty$ ; však na prvý pohled podobaly by se krystaly spíše této spojce:  $\infty P \cdot OP$ , která při arsenopyritu ještě nikde objevena nebyla. Všecky plochy jsou stříbrolesklé; plochy  $\infty P$  nerovné, lesklé sice, ale netřpytí se předce co zrcadlo, tak že se uhl odrazným goniometrem ani sblíženě měřiti nedá. Plochy  $\frac{1}{4} \bar{P} \infty$  se podobají svou plochostí spíše ukončující ploše  $OP$ . Však při bedlivějším pozorování plochy se objevuje, že na některých krystalech skutečně část plochy  $\frac{1}{4} \bar{P} \infty$  vyvinuta jest, kdežto ostatní část se skládá ze samých úzkých částek plochy  $\frac{1}{4} \bar{P} \infty$ , které vedlé sebe asi ve směru vodorovném srostlé jsou; že pak takový způsob srůstu malých plošek vodorovného hranolu v plochu asi vodorovnou bez hran býti nemůže, jsou tyto hrany skutečně, ale toliko ve způsobu silného rýhování vodorovného zárovného s kratší průsečnicí vyvinuty.

Nalezen též jedinký malý krystal dvojčatně srostlý. Na arsenopyritu objeveny posud dva zákony podvojného srůstu a sice dle hranolu přímého  $\infty P$  a dle vodorovného hranolu  $\bar{P} \infty$ . Žádný z těchto zákonů nehodí se pro tuto srostlici arsenopyritu, než toliko zákon nový, posud pro tento nerost neobjevený: dle kterého srostlice se objevuje srostlá plochami  $\infty \bar{P} \infty$ . Hranol  $\infty P$  tedy má v srostlici vypouklé a prohlubené uhly.

Potažná váha určena s množstvím 2·13 grammů jest: 5·8560. Rozbor arsenopyritu jest:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| (Vilém Kaucký)      |        |
| nerozpustný zbytek: | 1·74   |
| <i>S</i>            | 21·46  |
| <i>As</i>           | 42·25  |
| <i>Fe</i>           | 33·82  |
| <i>Ni</i>           | sledy  |
|                     | 99·27, |

což se dosti dobře shoduje s ostatními analysemi tohoto nerostu. By se vypátraly sledy niklu, vzato ku zkoušce větší množství nerostu, asi 2 až 3 grammy.

Arsenopyrit též se co otisk skořápkový od *Orthis macrostoma* Barr. jednou nalezl; podruhé též byl *Orthoceras bisignatum* Barr. jím skamenělen.

Když právě se vypisují nerosty v rudu vtroušené, nutno pro úplnost se zmíniti ještě o

**křemenu a sideritu**, které vlastně náleží do článku, v kterém o žilách se jedná. V krahulovském chamoisitu a sice v té části, která pod strání s višněmi uložena jest, vyplňuje křemen bílý, poloprůsvitavý, velmi hrubě vyhraněný, prázdné vzduchové komory od orthocerů v rudě zahrnutých. Jelikož vzdušní komory uvnitř nejprve asi 1 mm. i ještě méně slabou vrstvou sideritu červenavěhnědého potaženy jsou, který kolem křemene co mladšího nerostu bezprostředně k vnitřní skořápce orthocerů přilehá, a an křemen jakož i siderit onomu, který v Nučicích žíly vyplňuje velice se podobá, dá se souditi, že jest to křemen a siderit útvaru žilového. Skutečně jest též vyplnění dutých komor orthocerů obdobou vyplnění žilového.

### Nerosty v žilách (a narostlé) se objevující.

#### Nerosty v menších žilkách.

V šedavě žlutém limonitu okrovém, v kterém i oolity v limonit proměněny se objevují, jsou v Nučicích žilky

**sideritu**, kterými na mnohých místech jako tkanivem protkán jest, až i centimétr mocné, vrostlé. Na přemnohých místech tvoří siderit dutiny, v kterých polovypouklé okulacené krystálky ocelku, složené ze samých malých krystálků, narostlé bývají. Na některých krystalech nedokonale vyvinutých přirostlé jsou někdy malé, až  $2\frac{1}{2}$  millimétru široké a dosti pravidelně vyvinuté klenče —  $\frac{1}{2}$  R, barvy světløšedivohnědé. Místo krystalů bývají v druzách též narostlé skupeniny polokulovité asi velikosti hrachu, splývající na svých krajích do sebe a složené ze samých zakrnělých klenčů ocelku, jejichž hrany povrch drsným činí. Někdy povrch, kapalinovým okulaceným skupeninám na pohled dosti podobný, bývá pokryt slabou vrstvičkou bílého kaolinu. Barva sideritu jest tmavošedopřihnědlá, lesk mastnému podobný a štípe se vesměs malými lesklými plochami silně vyboulenými. Potažná váha určena 1.79 grammy jest: 3.7436.

V Jinočanech, kde podobný okr se uložen nachází, jsou též takové jednotlivé žilky, které se ale toliko různě objevují, any mezi sebou se neproplétají. Složeny jsou vesměs z tmavohnědého

**limonitu** krystalisovaného ve skulinách hojných v žilkách, v krásných hladkých neb slabě rýhovaných klenčích tvaru —  $\frac{1}{4}$  R, až velikosti čtyř i pěti millimétrů. Patrně, že to jsou pseudomorphosy limonitu po sideritu.

Žilky, nebo kde v druzách krystaly jsou, tedy slabé kory krystalové bezprostředně na žluté rudě narostlé, skládají se z vrstvy asi jednoho i něco více millimétrů mocné, velmi jemně vláknité, barvy vláken kaštanové, mezi nimiž někdy žluté skvrnky neb žlutá vláčenka se vyskytují; na lomu příčném jsou mezi vlákny okem přemalé dutinky patrné.

Potažná váha, s 1.17 grammy určena, jest pro kory limonitové, v nichž vzduch všude v dutinkách ještě obsažen 2.9481; pro kory prosté vzduchu 3.3308. Pseudomorphosy krystalové tedy dle objemu obsahují 11.42% dutin.

Krystaly proměněné vybrané a při 120° C sušené vydaly vody zřháním 11.303% proměnice se v rudý kysličník železitý.

S podmínkou, že pseudomorphosy jsou čistý vodnatý kysličník železitý, bylo by sloučenství jejich tedy:

$$\begin{array}{r} HO = 11.303 \\ Fe_2O_3 = 88.697 \\ \hline 100.000 \end{array}$$

Poměr kyslíku, vody a kysličníku železitého jest:

$$\frac{1}{2.648} \text{ neb sblíženě } \frac{3}{8} = \frac{1}{2.666}, \text{ což by žádalo vzorek sloučenství následující:}$$

$$8 Fe_2O_3 + 9 HO.$$

**Stilpnosiderit** vytváří asi 1 mm. silné povlaky buď sám o sobě nebo společně s zemitým limonitem, v kterém vrostlé vrstvičky stilpnosideritu se objevují na puklinách v rudě hnědé, v krahulovské štole. Obzor v ložisku rudním, v kterém se tato ruda vyskytuje, jest obmezený na onu hnědou rudu, která teprve z černé rudy se vyvíjí; jest tedy na hranici obou rud, hnědé a černé; tudíž blízko výchozího. Hnědá ruda proměněná, se stilpnosideritem barvy černohnědé, lesku značného jest toliko v základní hmotě své hnědá, oolity rudy ještě úplně se neproměnily, any ještě zelenošedě zbarveny jsou.

Tenké kory stilpnosideritu, od zemitého limonitu úplně odloučené, obsahují v sobě maličké viditelné dirky, které buď duté, buď částečně zemitým limonitem pokryty neb vyplněny jsou. K určení potažné váhy vzaty kousky, prosté všeho zemitého limonitu, 4.08 grammů vážící, jejichž hutnota tak jak byly, určena jest 3.3742; po vyjití všech bublin, vyvíjejících se z každého kousku, byla hutnota rovna 3.4530. Stilpnosideritové kory tedy dle objemu sestávají z vlastního nerostu 97.72% a z 2.28% dutin vzduchem naplněných.

Tento nerost, jehož ke zkoušce 3.75 grammů vzato, vysušený při teplotě, která 100° C něco málo převyšovala, byl vyžhán a ztráta vody obnášela:

$$\begin{array}{r} HO = 12.071 \\ Fe_2O_3 = 87.929, \\ \hline 100.000 \end{array}$$

na kysličník železitý tedy připadá

to vše s podmínkou, že nerost čistý jest, jak dle pohledu velice pravdě se podobá.

Poměr kyslíku, vody a kysličníku železitého jest  $\frac{1}{2.4579}$  neb sblíženě  $\frac{1}{2.5}$ , což souhlasí se sloučenstvím dle vzorce 5  $Fe_2O_3$ , 6  $HO$ . Dle tohoto vzorce by mělo být v stilpnosideritu tomto vlastně obsaženo:

$$\begin{array}{r} HO = 11.89 \\ Fe_2O_3 = 88.11 \\ \hline 100.00 \end{array}$$

Aby se též zjistilo, jaké sloučenství zemité, čistě žlutohnědý nerost má, jemuž se jméno limonit přiložit může, který stilpnosiderit doprovází a v němž vlastně nejvíce kor černohnědých zarostlých jest, vzato ke zkoušce 2.93 grammů tohoto okru vysušeného při něco více než 100° C.

Okr vyžhán, sestával by, jestli že čistý jest, jak se na pohled zdá, z určené vody

a ze zbytku

$$HO = 12.244$$

$$Fe_2O_3 = 87.756$$

$$100.000$$

Poměr kyslíku  $HO$  k  $Fe_2O_3$  jest  $\frac{1}{2.419}$  neb sblíženě též  $\doteq \frac{1}{2.5}$ .

Zemitému okru by tedy totéž sloučenství 5  $Fe_2O_3$  6  $HO$  přináleželo.

Nedá se ovšem z toho soudit, že zemitý okr a tmavohnědý jsou jediným druhem, ačkoliv stejné sloučenství jin oběma přináleží: však možné jest to, že by byl okr toliko jinou, totiž zemitou, velmi jemně rozptýlenou odrůdou celistvého nerostu, což se tím pravděpodobnějším býti zdá, an prášek jemně rozetřeného stilpnosideritu též sytě žlutý jest.

**Aragonit.** V podobných puklinách v rudě hnědé, jako stilpnosiderit, objevuje se na blízku tohoto s zemitou hnědožlutou rudou aragonit v krystalkách. Posud aragonit nalezen v krahulovské štole vedlé stilpnosideritu, a v chrustenické štole číslo II., na slabých povláčkách zemité rudy, potahující stříhy a spáry vrstev černé rudy.

Kraťouché přejemné jehličky aragonitové se objevují v druzách, hustě vedlé sebe narostlé, též v chomáčky skupené. Krystalky jsou bílé, pod drobnohledem ale úplně čiré; jen sem a tam se pod drobnohledem v nich spatřuje černošedá zrnečka, kalící čirost krystalů, pocházející od zarostlých drobečků rudy.

Délka krystalků obnáší až 2 mm.; šířka jednoho z větších měřena pod drobnohledem mikrometrem šroubovým byla .920 mm.

Tvar krystalků jest:  $\infty P$  .  $\infty \bar{P}\infty$  .  $\bar{P}\infty$ ; je-li ukončující hranol  $\bar{P}\infty$  ulomen, objevuje se nedokonalá štípatelnost dle ploch tohoto vodorovného hranolu. Též dvoj i trojčatný srůst dle plochy  $\infty P$  jest hojně vidět pod drobnohledem, tolikéž se i několik krystalků spojuje v jediný, kterýž stéblovitě z nich složen jest.

Sem a tam se objevují vtroušeny v některých krystalkách též bublinky, snad tekutiny, zahrnuté co zbytek louhu matičného, krystalem obklopeného. Jedna taková bublinka neb měchýřek, na způsob ledviny zahnutý byl .113 mm. dlouhý a něco málo méně široký; v bublince tekutiny byla jako očko plovoucí menší bublinečka vzduchu, úplně kulatá a .037 mm. v průměru měřící.

Potažná váha krystalku zkoušena s .48 grammy vybraných jehliček z Krahulova byla 2.8034.

Vedlé krystalků bývají někdy některé oolithy, jinak světle šedo zelené, v základní hmotě hnědolu proměněny v špinavě bílý aragonit soustředně vláknitý, Pseudomorphosa aragonitu po oolithech toliko v Krahulovské štole pozorována. Oolithy aragonitu potaženy bývají toliko slabou vrstvičkou snadno se drolicí, barvy světle šedo zelenavé.

**Selenit.** V spárách vrstev rudy jak hnědé tak i černé, jakož i v stříhách, kteréž oboje na výchozím a nehluboko pod ním polozemitou, hlinitou, hnědou rudou potaženy jsou, kteráž v důlu je-li promokvaná trochu mazavá, jako jíl bývá, bývají vtroušeny velká zrnka splosklých krystalů selenitu. Na zrnkách, jichž velikost až k rozměrům značného bobu vzrůstá, není o plochách krystalových ani památky, nebo ony toliko plochami složnými ohraničeny bývají. Vnitřek selenitových zpotvo-



řených krystalů jest čirý neb slabounce nažloutlý; povrch jest potažen silnou polozemitou korou jilovaté hnědé rudy; plochy štěpné  $\infty \tilde{P} \infty$  bývají velké a rovné.

Selenit čirý, čistě vybraný z Chrustenic, kde zvláště hojně se objevuje, měl hutnoty 2.3140 s .87 grammy určené.

**Markasit.** V podlouhlé dutině zarostlé v černé rudě sestávající z limonitu celistvého, uvnitř slabou korou pyritu potaženého, který na povrchu úplně v pyrrhoiderit proměněn jest, nalezeno asi několik krystalů narostlých nezřetelně vývinutých a markasitu nejpodobnějších. Krystaly domnělého markasitu, asi 3 mm. dlouhá hrotnatá dvojčata na povrchu slabou kožkou hnědou potažená, byly silně rýhovány; z ploch se toliko  $\tilde{P} \infty . \infty P . O P$  rozeznat daly.

Zdá se, že dutina náležela druhdy k prázdným komorám nějakého orthocera. Nalezen v lomu Jinočanském.

### Nerosty v žilách zarostlé.

Nejmocnější část ložiska v Nučicích jest protrhána hojnými žilkami a žilami vyplněnými rozličnými nerosty; směr žil, kteréž někdy ložisko též posouvají, jest asi zárovný k směru stříhů; však se zdají být žíly, jejichž směr asi severojižní jest o něco hojnějšími žil západo-východních. Mocnost žil rudu prostupujících počíná pouhou puklinou na stěnách toliko slabým nádechem nerostu žilového potažených, až více jednoho metru. Mocnější žíly obyčejně ložisko pošínují; v tomto případě žíla nebo vržení skládá se ze samých ostrohranných malých i velikých drobtů rudy, roztržením a vržením ložiska povstalých. Drobtý, skládající celou žílu neb vržení, spojeny bývají nejčastěji sideritem neb směsí sideritu s kaolinem, též křemen spojuje úlomky nezřídka; však siderit co spojivo drobtů a úlomků je hojnější křemene. Jelikož drobtý v žile zarostlé barvou svou tmavou od sideritu je slepujícího dobře se různějí, poskytují žíly Nučické poučné příklady breccie žilové.

Žíly se rozštěpují v odžilký, nebo se roztrísťují v ramena, nebo odžilký od jedné vyběhající k jiným sbíhají se, jako vůbec u žil pravidlem jest. Že žíly i do ležatých i visutých vrstev, měkkých rudy vlastní, pokračují, jde samo sebou na um; toliko každá, byť by sebe mocnější žíla sůžila se v břidlicích náramně, někdy na pouhé dělení prázdné neb žilečkou limonitu naznačené. Žíly jsou vyplněné sprostými nerosty, z nichž se skládají a kteréž dle jistého pořádku na sobě narostlé jsou; pořádek ten stářím nerostů se též nazývá, ačkoliv se přísně ohraničit nedá stáří jednotlivých nerostů, z nichž žíly složeny jsou. Starší nerost se ještě ustavičně dále tvořil, jak to dle slohu žil soudit se může, an se mladší nerost dávno již mezi tím usazovat počal. Řada nerostů, dle svého stáří skupeninu tvořící, není tedy přísně ohraničena. Možno zde prozatím pro všeobecný přehled udat, jak asi po sobě nerosty žilovou skupeninu tvořící následují; na pozdějším místě teprve se pravé stáří každého nerostu vytkne. Řada nerostů *asi* dle stáří sestavená, které se v žíly skupené objevují, jest:

1. Kaolin.
2. Siderit.
3. Křemen.
4. Siderit.

Jsou toliko tři druhy sprostých nerostů, které žíly skládají.

Mimo sprosté nerosty objevují se nerosty vzácné, v žilách buď hojněji neb převzácně jen vtroušené. Hojněji se v žilách toliko pyrit objevuje, všechny ostatní nerosty, které následují, jsou vzácné nebo převzácně a sice jsou to: anthracit, baryt, chalkopyrit, galenit, limonit, selenit, sphalerit.

Jakmile žíla z rudy přijde do břidlice, nejen že se sází, jak již podotknuto, ale i veškeré sprosté nerosty, nemluvě ani o vzácných, úplně vymizí.

V Nučicích soustava žil nejlépe vyvinuta jest; na jiných místech, v méně mocném ložisku, jest sloh žil jakož i mocnost jejich méně vyvinuta. Toliko v Chrustenicích se ještě calcit objevuje v žíle co sprostý nerost, kterýž ale nedá se vřadit do řady nerostů dle stáří sestavené, an tyto calcitové žíly beze všech sprostředkujících členů se objevují toliko osamotnělé.

**Kaolin** jest v Nučicích a v Jinočanech, v Chrustenicích a vůbec všude v ložisku, velmi sprostý nerost. Každá sebe menší puklinka nebo i žilka jest buď tenkým bílým nádechem nebo i žilkou kaolinovou až 2 mm. mocnou vyplněna. Kde mocnější žíly z jiných nerostů se skládají, které nejsou bezprostředně přirostlé na rudě, tu opět kaolin tvoří slaboučkou vrstvičku, někdy toliko pouhý silný nádech na rudě, na kterém teprve ostatní nerosty narostlé jsou. Však též na ostatních sprostých nerostech se vrstvičky kaolinu usazeny objevují, na doklad toho, že kaolin, ač utvoření jeho do počátku žil samých zasahuje, se předce ustavičně dále se tvoříc bez přestání usazoval na mladších nerostech, které se později teprve v žilách usazovat počaly. Později příklady uvedeny budou. Kaolinové nádechy nebo vrstvičky jsou buď zemité, bílé a na omak velmi jemné jako masné. Vrstvičky silnější přesnadno se co prášek seškrabati mohou. Některé vrstvičky mění barvu svou v slabě namodralou, slabě blankytnou neb slabě šedavou a dají se v plátky, přesnadno v zemité kaolin se rozpadající oddělovati. Též plátky barvy velmi bledě čířkové a barvy sytější čířkové se odlupovati mohou, kteréžto poslední ještě velmi jemné a jako masné se toliko tlakem prstů v zem rozdrolit mohou. Od zemitých bílých nádechů a vrstviček až do čířkové zelených povlaků slabých, na hranách tenkých průsvitavých, jest nepřetržený přechod.<sup>28)</sup>

Pod drobnohledem skládá se prášek bílého kaolinu z průhledných šestibokých plátčků, z nichž nejmenší asi 0.027 mm., největší asi 0.145 mm. dlouhé jsou, při šířce o málo menší. Zemité bílé kaolin, na druzích křemenných z Chrustenic narostlý, sestával pod drobnohledem z plátek též šestibokých, z nichž ony prostřední velikosti 0.058 mm. dlouhé byly. Prášek ze zeleného povlaku kaolinu tolikéž sestává z krystalečků šestibokých průhledných, z nichž některé 0.079 mm. až 0.074 mm. dlouhé jsou.

Jak bílý zemité, tak i zelenavý kaolin v plátkách se odlupující skládají se ze stejných krystálků, toliko se zdá, že v plátkách bílých neb slabě nazelenalých zároveň seřazení krystálků dle ploch svých jest příčinou toho, proč se kaolinové vrstvičky v plátky loupají, kdežto v zemitých vrstvách kaolinové krystalky nahromaděny býti se zdají. Některý pevnější kaolin jest očividně sideritem prostoupený.

Potažná váha světle čířkově zeleného kaolinu, který velké krystaly křemenu co vrstva pokrýval, nalezena s 28 grammy: 2.6655.

Kaolin a) seškrabaný ze zemité sněhobílé vrstvy asi 2 mm., na chamoisitu narostlé, má hutnoty 2·4781 (k určení jí vzato 1·39 grammů).

Kaolin b), přizelenalé plátky oloupané ze slabé vrstvičky na chamoisitu narostlé. Obě odrůdy z Nučic.

| Rozbory:                                 | a) Jan Ješina                        | b) Josef Novák |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Hygroskopická voda při 100° C prchající: | HO 3·31                              | 3·59           |
|                                          | SiO <sub>2</sub> 44·43               | 45·03          |
|                                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 40·48 | 34·91          |
|                                          | FeO 1·11                             | 5·00           |
|                                          | CaO 1·37                             | ·85            |
|                                          | HO 12·54                             | 14·08          |
|                                          | 99·93                                | 99·87          |

Nejen mineralogicky, přechodem, jakož i stejnou krystalisací dokázána totožnost bílého a zeleného kaolinu, ale též lučební sloučenství dle obou jest podobné.

**Siderit** se objevuje hned bezprostředně na rudě, nebo na podložce kaolinu narostlý, v stálých krystalinických vrstvičkách nebo i ve vrstvách až na prst hrubých s povrchem vykrytalizovaným, složeným z druz krystalových. Malé krystálky slabounkých vrstviček bývají nepatrné; však krystaly silnějších kor sideritových bývají tím většími, čím mocnější vrstva sideritu sama o sobě jest, tak že jednotlivé krystaly i 1 mm. dlouhé vedlejší osy mají. Velké krystaly jsou vyvinuty co + R s povrchem velmi drsným neb i druznatým, an se ze samých zároveň srostlých menších krystalků klenčových skládají. Nebo jsou pólové hrany okulaceny a zároveň silně rýhovány, an střed ploch méně značně čárkován jest. Málo kdy jeví se na povrchu velkých krystalů jich pravá barva, často bývají potaženy hnědým povlakem limonitu; však štěpné plochy krystalů, jakož i velmi hrubo-kystalinické plochy, celé vrstvy sideritu skládající jsou barvy žlutavě nahnědlé nebo přišedlé. Lesk štěpných ploch rovných silný a jasný jest a ač neukazují plochy odrazem světla obrazů jako v zrcadle zřetelných, předce zrcadlí se dosti zřetelně v nich předměty, tak že se úklon ploch štěpných měřit dá.

Úklon ploch štěpných měřen Wollastonovým odrazným goniometrem po sobě 1 až 14krát opětovaně (repetirt), což se vyrovná tomu, jako by úhel 105krát jednotlivě měřen byl býval: pro úklon nalezen úhel 106° 59'·9 s možnou chybou průměrní ±' 4. — K porovnání měřen úklon štěpných ploch slabého, ale zřetelného obrazu odrazem poskytujícího sideritu rovněž žlutavě přihnědlého z Příbrami z Annenských bání pocházejícího. Siderit měřen opětovaně 1 až 10krát po sobě, což se vyrovná 55 jednotlivým určením úhle, který 107° 13'·8 měřil; průměrná možná chyba ±' 7 obnáší.

Potažná váha velmi hrubozrného sideritu, z vrstvičky mocné slabého prstu určena s 1·49 grammy: 3·8264.

Kromě těchto vrstev složených z hrubozrného sideritu jsou některé žíly složené ze zrnitého šedožlutavého sideritu úplně. Na prvý pohled se tento drobnozrnitý siderit příliš dolomitu přihnědlému podobá. Vrstvy drobnozrnitého sideritu toliko křemenem provázeny bývají a stýkají se bezprostředně s rudou, s níž pevně srostly jsou, tedy beze všeho kaolinu, který by co starší sideritu, prvou pod-

ložku tvořiti měl. Žíly jsou pevné a sem tam zaleskne se v nich malá ploška štěpná od ocelku pocházející.

Potažná váha zrnitého až drobnozrnného celku jest 3·3143, 3·1684 nalezena s 2·65 a 1·78 grammy.

Siderit zrnitý potažné váhy 3·3449 nalezené s 1·74 grammy analysován částečně:

Karel Preis

Nerozpustný bílý zbytek, kaolinu nad míru podobný 22·01

*FeO* 44·79

*CaO* 1·14

*MgO* 2·94

*MnO* sledy

neurčený ostatek  $CO_2$  29·12

100·00

Jestli že se počítají kysličníky co uhličitany, při čemž ovšem malá chyba se udělá, an nejisto jest, zdali všechny kysličníky skutečně co uhličitany v ocelku obsaženy jsou, obdrží se pro složení sideritu sblíženě:

Kaolinu nerozpustného v kyselině solné: 22·01...22·01

$$\begin{array}{l} \text{ze sideritu rozpustného} \left\{ \begin{array}{l} \text{FeO } CO_2 = 72·07 \\ \text{CaO } CO_2 = 2·03 \\ \text{MgO } CO_2 = 6·17 \\ \text{MnO } CO_2 = \text{sledy} \end{array} \right. \quad 80·27 \\ \hline 102·28 \end{array}$$

Analysou potvrzeno, že kaolin prostupuje siderit v množství značném, že tedy kaolin tvoře se zároveň se sideritem s tímto se usazoval; tudíž dokázáno, že kaolin ač nejprvejší nerost, který se v žilách usazovat počal, se ještě ustavičně tvořil, když usazování se sideritu do žil se dělo.

Jsou též některé tvrdé vrstvičky bílé, které by se jaksi stvrdlému kaolinu podobaly; tyto ale sestávají z kaolinu prostoupeného a spojeného sideritem.

**Haematit.** Jestliže siderit, potahující v slabých povlacích rudu, delší čas na vzduchu a dešti ležet zůstává, mění se úplně v špinavě rudý haematit. Na povrchu haematitu ještě vyčnívají zbytky bývalých siderovitých klenčů pramalých. Ve východní štole Krahulovské byly narostlé baryty na sideritu; na haldě mnoholeté se baryty toliko na haematitu ze sideritu přeměněného narostlé objevují. Proměna sideritu do haematitu se za krátký čas několika měsíců počíná jevit slabým narudlým povrchem tenounkých vrstviček sideritových a jest za málo roků již velmi značně znalá.

Mimo kaolin, jehož usazování po dlouhý čas trvalo, vyskytuje se na sideritu celá řada nerostů vzácnějších narostlých. Jsou to tyto:

**Baryt** narostlý jest na sideritu v tabulkách malých, plochých, asi 1 mm. širokých až i ve větších výšky 10 mm. Tabulky čiré, neb bělavé a průsvitavé jsou vyhraněny obyčejně v těchto tvarech:

$$\infty \bar{P} \infty . \bar{P} \infty . \infty \bar{P} \infty ,$$

$$\infty \bar{P} \infty . \bar{P} \infty . 0P ,$$

$$\infty \bar{P} \infty . \bar{P} \infty . 0P . \infty \bar{P} \infty .$$

Vzácný jest tvar tento:  $\infty \bar{P}\infty . \bar{P}\infty . \infty \bar{P}\infty . OP . \infty \bar{P}2$ .

K zjištění této spojky měřen úklon plochy  $\bar{P}\infty$  k  $OP$ ; obě plochy sice velmi lesklé jsou, neposkytují ale odrazem nicméně obrazu nanejvýš přesného. Úklon nalezen z dvou měření  $129^{\circ} 7'$  (na krystalech z Chrbiny úklon tento jest  $129^{\circ} 3\frac{1}{2}'$  až  $129^{\circ} 14'$ ), čímž pravost známek těchto ploch dokázána.

Všecky plochy jsou hladké lesklé, ve ploše  $\infty \bar{P}\infty$  objevují se nezřídka bělavé proužky zároveň s plochou  $\bar{P}\infty$ , což od přerůstajících obklopujících se krystalů vrstevnatých (Schalenbildung) pochází.

Štípatelnost dle obou směrů vyznačena převýborně; potažná váha čirých krystalů s 78 grammy určena jest 43656. Krystaly se objevují nejčastěji ojedinněné a to v Nučicích narostlé obyčejně plochou buď  $OP$ , neb  $\bar{P}\infty$ , neb  $\bar{P}\infty$  na sideritu drobně vyhraněném; málokdy též na pyritových druzách jemně vyhraněných. V krahulovské východní štole ale srůstají krystaly bělavé průsvitavé tvaru  $\infty \bar{P}\infty . \infty \bar{P}\infty . \infty \bar{P}\infty$ , přirostlé s plochou  $\infty \bar{P}\infty$  neb  $\infty \bar{P}\infty$  v skupeniny, od jednoho středu vycházející, siderit potahující a nápodobící některé tvary lišejníků neb na okně zmrzlých par vodních. — Těmto krystalovým skupeninám zcela podobné baryty skupené, jen že slabě přizloutlé, nalezeny v trhlíně kule chamoisitové, narostlé na tenounkém povlaku sideritovém, pocházející ze studny letohrádku p. Lany v Ovenci u Prahy, jak již nahoře zmíněno bylo.

**Galenit** jest narostlý v ojedinelých krystalkách na druzách sideritu nebo pyritu velikosti  $\frac{1}{4}$  mm. až  $2\frac{1}{2}$  mm. Nejmenší krystalky tvarů  $O$  neb  $O . \infty O \infty$  bývají lesklé a hladké; na větších krystalkách se někdy pozoruje, že jsou buď černosředé a mdlé, nelesklé na povrchu; aneb že lesklé plochy osmistěnu  $O$  bývají jako schůdkovitě prohlubeny. Největší krystaly velikostí vikve nebývají obyčejně lesklého hladkého povrchu, nýbrž jsou šedé s povrchem drsným; někdy též ohlodané a polookulacené zemitým nádechem černomodravým pokryté. Krystaly, na nichž by převládaly plochy  $\infty O \infty$ , jsou velice vzácné. Plochy štípatelné jsou náramně lesklé, šedomodravé.

Potažná váha narostlých krystalků s 21 grammy ustanovená jest 73789.

V žíle sphaleritu, o kterém níže řeč bude, jest galenit vrostlý ve velkých zrnech v zrnitém sphaleritu; ale též jednotlivé krystaly s plochami rovnými nelesklými neb slabě lesklými se objevují. Tvar krystalů jest  $O . \infty O \infty . \infty O$ , plochy jsou nestejně vyvinuty. Některé galenity srostlé jsou s dvojčatnými krystaly sphaleritu: největší krystaly až 4 mm. dlouhé osy mají. V některé ploše osmistěnu  $O$  jest několik málo schůdků prohloubeno tak řka až do samého středu krystalu, kdežto vedlejší plochy ač nelesklé, přece hladké jsou.

**Sphalerit** se objevil v žíle mocné asi 2 decimétrů směřující asi od západu k východu sestávající z breccie spojené sideritem, v množství trochu značnějším. — Buď jest vrostlý v maličkých krystalkách v kaolinových vrstvičkách v žíle se objevujících nebo narostlý v krystalkách větších na sideritu nebo pyritu, nebo jest vrostlý do sideritu jemně zrnitého v žilkách až na prst širokých, kteréž sestávají ze samých větších krystalů vedle sebe vrostlých, se vzájemně tlačících, tudíž jen složitými plochami obmezených. Jen málokde, kde prostor volnější byl, vyvinuly se ne-

zřetelné krystaly, s kterými a do kterých zarostlé se objevují, vzácně galenit, buď v zrnech nebo krystalech, též celistvá zrnka pyritu a velmi vzácně též chalkopyritu.

Nejmenší krystalky v kaolinu vrostlé bývají někdy nejúhlednějšími. Velikost jejich jest asi tato: široké a dlouhé jsou 1—2 mm., vysoké  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  mm. Barva žlutohnědá, průhledná až průsvitavá, plochy lesklé a hladké. Tvar krystalový jest vždy dvojče *O* dle plochy osmistěnné srostlé; plochy málokdy bývají u pravidelných krystalů zároveň s hrany slabě rýhovány. Mnohem hojnější jest tvar dvojčatný ten, kde osmistěny dle jedné z klenčových os stlačeny jsou; potom se dvojčata objevují v tvarech plochých, jichž plochy hojněji zároveň s hranami slabě rýhovány bývají.

Z narostlých krystalů, jichž barva mnohdy něco tmavší bývá, toliko jediný krystalek asi  $1\frac{1}{4}$  mm. vysoký byl utvořený z tvarů  $+\frac{O}{2} - \frac{O}{2}$ . Jeden čtyrstěn převládal velmi a byl hladký, druhý, otupující rohy jeho, byl vydutý.

I narostlé krystaly jsou vesměs složeny z dvojčat osmistěnu dle klenčové osy skráceného srostlých dle plochy *O*. Větší krystaly však silně rýhovány jsou zároveň s hranami osmistěnu; plochy některé uveličují se na úkor jiných přenáramně, tak že zpotvořený krystal dvojčatný, podobný táhlému hranolu, žádným způsobem poznati nemožno. Barva narostlých krystalů bývá žlutohnědá, průsvitavá až poloprůhledná, štípatelnost předokonalá, plochy štěpné, přelesklé.

V žíle, kde mnoho krystalů vedle sebe stlačených a skupených jest, se toliko na volných místech až 4 i 6 i 8 mm. dlouhé krystaly dvojčatné, přesilně rýhované a k nepoznání zpotvořené, převládáním některých ploch nad jinými, objevují. Na nejdokonaleji vyznačených krystalech se poznává, že jsou podobným způsobem ze stlačených osmistěnnů srostlé, jak nahoře již připomenuto bylo; některé vzácně jsou vykryštalisovány co  $\frac{O}{2} \cdot \infty O \infty$ , srostlé dle hrany, tak že obě plochy čtyrstěnu v jedinou srostou (Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1869, Bd. XXI., Sadebeck Krystallform der Blende T. XVII. fig. 21).

Přemnohé krystaly mimo to, že opětovaně dvojčatně srostlé bývají, jsou též dle jednoho směru roztaheny tak, že se sloupkům podobají; některé plochy jsou úplně potlačeny jinými, velmi rozsáhlé vyvinutými. Barva těchto největších krystalů, kteréž až 8 mm. délky mívají, jest hnědá, menší krystaly jsou barvy olivové. Krystaly ohraničené toliko složnými plochami, bývají též buď hnědé průsvitavé neb olivové průhledné. Pamětihodno jest to, že mimo osmistěn, čtyrstěn a krychle ani nejmenší památky o dvanáctistěnu se neobjevuje.

Potažná váha sphaleritu barvy tmavší jest 4·1537 s 2·98 grammy určená. Pod známkou c) jest tento spalerit analyzován.

Jiné blejno zinkové, sestávající z krystalů olivové barvy a z krystalů hnědých, mělo hutnosti 4·0975 určené s 5·27 grammy. Z tohoto blejna vybrány olivové krystaly zvlášť a tmavohnědé též zvlášť; první analysovány pod známkou a, druhé pod známkou b.

a) Hynek Stuchlý; b) Frant. Farský; c) Jos. Pichl

|                            |       |  |                |       |
|----------------------------|-------|--|----------------|-------|
| Vzato k analýzi            |       |  | 2.69           |       |
| Nerozpustný zbytek $SiO_2$ | 1.45  |  | 1.18           |       |
| rozpustná $SiO_2$          | .68   |  | .20            |       |
| $Zn$                       | 63.94 |  | 65.50          | 55.51 |
| $Cd$                       | .26   |  | nepatrné sledy | .91   |
| $Fe$                       | 1.20  |  | .27            | 9.35  |
| $Cu$                       | sledy |  |                | 1.01  |
| $S$                        | 31.66 |  | 32.77          | 32.59 |
| $CaO$                      | .29   |  |                |       |
|                            | 99.48 |  | 99.54          | 99.37 |

Přepočtou-li se rozborů na sírničky, an se kovy nalezené za základ vezmou bylo by sloučenství následující:

|                                 |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
|                                 | a)    | b)    | c)    |
| nerozpustný zbytek $SiO_2, CaO$ | 2.42  | 1.38  |       |
| $ZnS$                           | 95.35 | 97.74 | 82.59 |
| $CdS$                           | .33   | sledy | 1.17  |
| $FeS$                           | 1.88  | .42   | 14.69 |
| $CuS$                           | sledy |       | 1.52  |
|                                 | 99.98 | 99.54 | 99.97 |

Ač tmavohnědá blejna zajiště zbarvena sírníkem železnatým, kterým znečištěna jsou; vysvítá z rozboru a) i b), že  $FeS$  není výhradní příčinou barvy any obě odrůdy jak olivová tak hnědá obsahují nepatrně málo a asi rovně části železa.

Sphalerit posud toliko v Nučicích v hloubce a sice v jediné žíle v lomu druhém nalezen byl.

**Chalkopyrit** jest na velkých krystalech sideritu narostlý v pramalých as  $\frac{1}{4}$  mm. vysokých krystalech  $P$ , povrchu drsného, barvy žlutošedavé, uvnitř ale silně žlutě kovově lesklé. V Nučicích co vzácnost převeliká znám. Se sphaleritem vyskytly se po řídce též zrnka chalkopyritu.


**Selenit** ač zajiště nejmladším všech nerostů žilových, objevuje se narostl toliko na sideritu v chumáčkách bílých. Jednotlivé jehličky sádrovce, chumáček skládající, jsou nanejvýše 3 mm. dlouhé, a zvětšené objevují se co dvojčata tvaru  $\propto \bar{P} \propto . \propto P$ . —  $\frac{P}{2}$  srostlé dle plochy  $\propto \bar{P} \propto$ . Jednotlivé trochu větší krystalky jsou mnohem vzácnější.

Na puklinách rudy, potažených slabounkým nádechem žlutohnědě zbarvenéh sideritu se objevují hvězdičky černé, nepokryté, v řadě sestavené a jež náramu podobou svou na otisky *Annularia longifolia* Brongn. v kamenouhelném útvaru s objevující, připomínají. Na tenkých povlacích pyritu, potahujícího siderit se spatřují podobné obdoby rostlin, přepodobné k *Annularia sphenophylloides* Zenke (= *Ann. brevifolia* Brongn.), taktéž z útvaru kamenouhelného; otisk rostlinné hvězdičky (vřetenu) podobný, jest z pyritu a okolní hornina sestává ze sideritu kaolinem prostoupeného. Podoba rostlinná pochází ale toliko od krystalů selenitu zmizelého, od jediného bodu paprskovitě vycházejících a čím dále od středu tím

více se rozšiřujících, tak že skutečně podobu táhlých klínků měly, jako listy rostlin vyznačených Tab. VII., obr. 4.

Otisky pocházejí od klínovitých dvojčat selenitu  $\frac{1}{1} \dots \frac{10}{1}$  Obr. 7.

na jednom konci v špičku se sbíhajících, na druhém rozsbíhajícím se konci rozštěpených a u prostřed čarou spoj dvojčatný naznačující, vybrázděných. Tato dvojčatná čára dodává otiskům tím značnější podobnosti s listky jmenovaných rostlin zkamenělých, an směr hlavního nervu v listku každém označuje obr. 7. Tvary krystalů okulacených, které skládaly sádrové krystalky mohou býti buď  $-\frac{P}{2} \dots -\frac{3\bar{P}\infty}{2} \dots \infty P \cdot OP$ , neb tentýž



Dvojčatně srostlé jehlice selenitu, listkům dosti podobné, vyběhající z jediného bodu.

tvar ale bez  $OP$ ; neb i  $-\frac{P}{2} \dots \frac{\bar{P}\infty}{2} \dots OP$  dle plochy

$\frac{P\infty}{2}$  srostlé. Rozštěpení konce listků nebývá vždycky

patrné, namnoze se ale nicméně spatřuje, že úhel vydutý, v který se konce rozštěpují; an obnáší asi  $55^\circ$ , což by od srostlice  $OP \dots -\frac{\bar{P}\infty}{2}$  neb od  $OP \dots -\frac{\bar{P}\infty}{2} \dots -\frac{3\bar{P}\infty}{2}$

dle plochy  $-\frac{\bar{P}\infty}{2}$  spojené, pocházet mohlo.

Tyto, otiskům podobné nákresy, pozůstalé po sádre, toliko v Nučicích nalezeny byly.

Nepoměrně hojnější nerost všech posud vypsanych jest

**Pyrit**, tak že by se právem mezy sprosté vřadit mohl. Místo, do kterého by se pyrit v řadě nerostů žily skládajících vřadit mohl, jest nejisté; neboť se objevuje buď pod sideritem, neb v sideritu neb na něm, též velmi vzácně na křemenu; pyrit tedy asi se sideritem zároveň utvořen jest.

Na sideritu pyrit narostlý buď v malých lesklých rovnoplochých krystalech  $\infty O\infty$  neb  $\infty O\infty \cdot O$ , neb velkých krystalech nerovných ploch, an se tyto ze samých menších, více méně vyčnívajících plošek krychlových, zároveň srostlých, skládají. Hrana největších posud známých, ovšem nerovnoplochých krychlových krystalů, na kterých plochy osmistěnu  $O$  ač podřízené, obyčejně nikde nescházejí, měří  $1\frac{1}{2}$  cm.

Mimo tyto dvě plochy nenalezeny na pyritu nižádné plochy jiné, toliko asi na dvou krystalech, což při převelkém množství prohlédnutých krystalů, kteréž se na mnoho tisíc cenit může, jest tedy úkazem přenáramně vzácným, objeveny vedlé  $\infty O\infty$  a  $O$  slabé plošky  $-\frac{\infty O 2}{2}$ , jen na některých hranách krychle vyvinuté.

Mimo krystaly na sideritu, zvláště v Nučicích dosti hojně narostlé, se v menších rozsedinách, vyplněných rozmělněným a na polo změkklým chamoisitem skupeniny malých, krásně vyvinutých krystalů, všelijak srostlých objevují. Takové krystalky v skupeniny srostlé, na kterých též přemalé krystaly galenitu vzácně vrostlé byly, aneb i jednotlivé krystalky vybraného čistého pyritu velikosti krychlí  $\frac{1}{4}$ —1 mm. z Nučic měly hutnoty 50783 s 63 grammy určené.

V Chrutenické štolce č. II. jsou velmi krásné skupeniny, srostlé z vyvinutých



malých krychlí, vrostlé v rozsedině rozmělněného chamoisitu; potažná váha s 1.29 grammy určená, krystalků 2—4 mm. vysokých jest 5.0494.

Mimo srostlé neb narostlé krystaly vytvářejí pyrity mnohé jiné, buď na sideritu neb na pouhé rudě narostlé skupeniny, tak kulovaté, na jejichž povrchu vyčnívající krychlové plochy zřetelně až málo zřetelně vystupují; mimo to tvoří rovné neb vlnité kory lesklé aneb hnědým limonitem potažené. Též do žil sideritových zarostlý bývá co celistvý pyrit.

Potažná váha celistvého pyritu, barvy šedospěšové z Nučic, určena s 1.51 grammy jest 4.8194, tedy nízká, což k tomu poukazuje, že hmota jeho není úplně hustá, ana snad uvnitř menší skulinky chová.

Lesk pyritu jest buď značný neb slabý; pyrity na povrchu barvy žluté, po zvlhnutí potrácejí všeho lesku. Do hněda naběhlé plochy krystalové též se vyskytují, nejsou ale příliš hojné.

**Křemen** jest v žilách Nučických nerostem velmi obecným, an buď sám o sobě skládá žíly, nebo se sideritem společně, dosahuje mocnosti až i 7 cm. Barva křemene, který buď na rudu samotnou narostlý neb kaolinovou nebo i sideritovou vrstvou odloučen jest, bývá obyčejně bělavá, málokdy mléčná. Křemen v žilách jest průsvitavý až poloprůhledný a zahrnuje v sobě nezřídka černé malé ostrohranné úlomky rudové. Lesk na plochách štípaním odkrytých jest mastný.

Ale též malé, jakož i větší až  $1\frac{1}{4}$  cm. dlouhé čiré neb průhledné krystaly  $\infty P. + R. - R$ , přirostlé na sideritu neb kaolinu, lesku značného a ploch rovných a pravidelně vyvinutých, nebývají nikoliv vzácné.

Toliko v prázdných druzích mocnějších žil křemenných se někdy vyskytují krystaly čiré až toliko průhledné neb bělavé a průsvitavé, až délky 2 cm., jejichž plochy, ač tvarům  $\infty P. + R. - R$  přináležející, vedle pravidelně vyvinutých sloupků šestibokých, též nezřídka jedny na úkor jiných tak se roztahují, že povstávající krystaly jsou nepravidelných, skrčených neb roztáhnutých tvarů tabulkovitých.

Na mnohých krystalech, jak čirých tak i bělavých bývá siderit v malých krystalkách narostlý. Křemen barvy mléčné, na jehož vyvinutých plochách siderit narostlý jest, má hutnoty určené s 1.72 grammy: 2.6235.

V některých mocnějších žilách bývají vzácně zarostlé do kaolinu, sideritem trochu prostoupeného, velké krystaly křemene. Jeden z největších nalezených měl průměru asi 7 cm.; byl barvy bělavé, průsvitavý a v místě středním, tedy podél osy měl dutinu pravidelně tříhrannou. Strany trojbokého hranolu dutého, až 7 mm. dlouhé, byly zároveň vždy ob jednu z ploch šestibokého hranolu  $\infty P$ . Vůkol byl krystal ploch nelesklých, obklopen vrstvičkou kaolinu šupinatého, barvy slabě přizelenalé.

Jiný krystal v průměru až  $3\frac{1}{2}$  cm. měřící a asi 9 cm. délky mající, značně bělavý, poloprůhledný, v němž malé ostrohranné kousky chamoisitu, obalené šupinatým nazelenalým kaolinem různě zarostly byly, byl na svém nelesklém povrchu potažen slabými vrstvičkami bělavého kaolinu prostoupeného sideritem. Uvnitř objevoval krystal krátké, ploské dutinky zároveň s některou z ploch hranolu  $\infty P$  neb jehlance  $P (= + R. - R)$ . Však památné v něm to bylo, že měl sloh vrstevnatý, any krystaly křemene jako jádro obehmuty byly vrstvou krajní. Jeden

takový, uvnitř vrstvou mladší přerostlý krystal byl potažen slaboučkou vrstevkou bělavého kaolinu; dělen byl tedy úplně od vrstvy křemene obkličující jej. — Z toho, jakož i z obalů kaolinu na ostatních krystalech, se dá soudit, že se kaolin, ač tvoření jeho nejprve vzniklo v žilách, se usazoval ještě toho času, kdy křemen se tvořil, ba kdy křemen již úplně vytvořen byl.

Křemen složený ze samých vrstev objímajících se, kteréž ale dle barvy nijak rozeznat lze nebylo, štípal se dle ploch  $\infty P$ , ač nesnadno přece patrně.

Od tohoto krystalu určena potažná váha a sice byla hutnota jeho ze středu, tedy z místa kolem osy krystalografické určena s 61 grammy . . . . . 26127; hutnota krystalu z vnitřku v půlce příčného lomu mezi krystalografickou osou a povrchem krystalovým s 96 grammy . . . . . 26381; kraj křemene, tedy bezprostředně pod plochou  $\infty P$  úplně prostou všeho kaolinu s 80 grammy . . . . . 26443.

Hutnoty jednoho a téhož krystalu přibývá tedy ode středu k povrchu, tedy tím více čím vzdálenější od osy krystalografické. Zajisté, že s nejmenší hutnotou jádra krystalu souvisí úkaz, proč tyto krystaly velké mívají v ose dutý trojboký hranol jako duši.

O křemenu vzdušní komory orthocerů vyplňujícím z Krahulova, který vlastně semu přináleží, již nahoře jednáno. O křemenu, potahujícím duté orthocerové otisky v Chrutenicích, ještě zmínka se stane.

**Anthracit** jest s křemenem stáří stejného, nebo on vyplňuje v jedné žíle obmezené a směřující asi od severu k jihu, kteráž sestává z převládajícího bělavého až mlékově bílého křemene, mezery mezi úzce rozstoupenými od sebe krystaly, do nichž i v menších částkách vrostlým jest. V celistvé žíle křemenné, kde tedy krystaly vyvinuty nejsou, bývá v menších částkách nepravidelných zarostlý.

Anthracit jest barvy černé, uhelné, lesku silně smolného, až jakoby polokovového, lomu lasturového, tvrdosti nepatrné asi 2, křehkosti značné a vrypu černého. Potažná váha určená s 13 a 26 grammy jest: 17320 a 18113. Ve vodě se i větší kousky nesnadno ponořují, prášek plave na povrchu vody a přenesnadno se potápí.

Žhán v kelýmku platinovém po dlouhý čas se nemění, v žáru delší čas trvajícím shoří ač nesnadno, posléze beze zápachu a bez plamene, zanechávaje po sobě bělavého popele 10.53 % (z 10 grammu látky). Spálitelné látky v něm obsaženo tudíž 89.47 % (v nerostu při 100° C sušeném rozumí se).

V proudu kyseliny uhličité až do slabé ředivosti žhán, ztrácí nerost při 100° C vysušený 3.02 % vody.

Anthracit jest v Nučicích v lomu druhém, v žíle nerostem vzácným, any zrostlé částky jeho neveliké jsou.

V Chrutenické štole č. II. jsou zřídka duté vzduchové komory od *Orthoceras bisignatum* Barr., vyplněny druzami krystalů křemene čirého, jen zřídka bělavého. Délka krystalů dosahuje až 7 mm., šířka pak až 4 mm. V krystalech vtroušeny hojně tenké tabulky čtverečné též trojboké ba i nepravidelné ve všech směrech, často ale též zároveň s plochami  $\infty P$ . Tabulky jsou barvy černé jak smola a podobají se úplně skvrnám asfaltu, jak zarostlý v křemenu z mnohých míst znám

jest. Však někdy se i mezi krystalky šupinka na povrchu narostlá objeví a tu se černý nerost úplně podobá anthracitu z Nučic.

Pod drobnohledem některé tabulky, které přetenké jsou, průsvitají barvou hnědou. Jelikož o anthracitu povědomo až posud není, že by byl průsvitavým ve vrstvičkách přetenkých, a spíše by se o asfaltu soudit dalo, že by průsvitným býti mohl, nedá se zarostlý černý nerost ani jinak mineralogicky ohledat, ať nějaká zkouška s ním učiněna nebyla leda ta, že rozbité pramalé střípky křemene dlouhý čas žíhané pozbývají černých skvrn v nich zarostlých.

Prozatím se černé skvrny ještě nejvíce anthracitu podobají, ač to prvou zkušeností jest, že anthracit též do krystalů křemene vrostlým býti může.

**Siderit** se opět objevuje na krystalech křemene narostlý co nejmladší nerost v malých krystalech tvaru —  $\frac{1}{2}$  R, velikosti mnohem menší vikve. Krystaly často rýhovány jakož i ohýbány bývají. Barva jejich světle šedohnědá; buď ojedinele neb v druzích křemen potahují. Hutnota určena s 1.26 grammy jest 3.7914.

**Limonit.** Mimo siderit se též krystaly limonitu barvy hnědé na křemenu objevují; jelikož tvar krystalů souhlasí s oným, jaký na sideritu se vyskytuje, jsou limonitové krystaly toliko pseudomorphosou po sideritu.

**Melanterit** se jeví co nejmladší nerost, z rozkladu pyritu teprve se tvořící. Kdekoli melanterit co silná kora neb v silných krátkých vláknech, barvy světle-zelené průhledné se objevuje, tam hornina, na které narostlý jest, obyčejně popukána a zcela roztrhána bývá, tak že se při slabém nárazu drolí; veskrze pak jest prostoupena žlutým neb žlutohnědým povlakem, který do všech i těch nejmenších trhlinek vniká. Pyrit, na kterém obyčejně melanterit narostlý bývá, jest povrchu velice drobivého, zkpřeného, barvy šedé až špinavěšedé a toliko jádro pod tímto zemitým povrchem sestává z kyzu kyprého barvy nečisté spěžové. Celá hornina toliko kyzem rušícím se okysličováním zkpřena a puklinami roztrhána jest. Toliko na místech suchých se melanterit a to vzácně objevuje v žilách s porušeným kyzem, ve vlhkých neb mokravých částkách žil by se ovšem opět rozložil.

**Calcit** náleží mezi žilové nerosty sprostší a nalezen v žilách rudu prostupujících v štole č. I. v Chrutenicích narostlý na kaolinové slabé vrstvě, kteráž ho tudíž od rudy dělí. Calcit tedy mladší kaolinu; že ale tyto žíly osamotnělé se vyskytují beze všeho spojení s žilami sideritovými i křemennými, nedá se místo, které vápenci v řadě těchto nerostů žilových přináležejí, určit. Žíly vápencové jsou 1—3 centimetry mocné a složené z čirých krystalů, velkých klenčů —  $\frac{1}{4}$  R, až  $1\frac{1}{2}$  cm. širokých. Klenče silně mezi sebou srostlé a nepravidelně vyvinuté jsou; plochy buď nerovné, hrany okulacené, ba některé krystaly zcela hrbolovité bývají. Všecky plochy jsou vesměs pokryty krystalovými rohy silně vyčnívajícími a v dosti zárovném směru srostlými.

Hutnota vybraných kousků štípaním povstalých určena 1.72 grammy jest 2.7624. —

Přehlédnou-li se všechny nerosty do složení žil vstupující ještě jednou, pozná se, že přesně nenásleduje dle stáří jeden po druhém, nýbrž že se počal mladší nerost tvořit spíše, než starší se usazovat přestal, ba že po dlouhý čas se dělo usazování obou nerostů jak staršího tak mladšího současně. Tím způsobem se

vysvětluje, proč se kaolin, ač nejstarším nerostem v žilách jest, totiž nerostem, kterýž nejprve se usazovat počal, objevuje pomíchán se sideritem starším ba i s mladším sideritu křemenem. Důkazem patrným o současném usazování se sideritu a křemene s kaolinem jest siderit, kaolinem proniknutý a vyhraněný křemen vrstevnatý, obalující vrstvičky kaolinu. Ba ještě po utvoření se křemene usazoval se kaolin, an by jinak křemenné krystaly obkličovat nemohl.

Podobně též pyrit se tvořil asi zároveň se sideritem, an vedlé toho žádného určitého místa nezaujímá.

Nejstáleji se objevují ještě nerosty vzácnější se sideritem spolčené, nebo jsou obyčejně mladší sideritu, ač též do něho někdy, ovšem zřídka zarostlé se objevují, což by o rovném stáří obou svědčilo.

Snad by se dala posloupnost nerostů v žilách nučických asi takto vyznačiti:

|        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaolin | siderit | pyrit | Pyrit jest současný se sideritem, buď starší buď mladší onoho. Současné neb mladší sideritu jsou: sphalerit, galenit, chalkopyrit.<br>Mladší sideritu: baryt.<br>Neurčitého stáří ale zajisté mladší sideritu: selenit, melantherit. |
|        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | křemen  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | siderit |       | Současný s křemenem jest anthracit.                                                                                                                                                                                                  |

### Nerosty okolních vrstev.

**Pyrit** zaujímá prvé místo, neboť se objevuje v zrnkách a zrnečkách na mnohých místech ve visuté, černé, nezrušené břidlici, po různu sice, v celku ale nicméně dosti hojně vtroušen. Jedna z příčin, proč se nezrušené břidlice na vzduchu za nedlouhý čas drolit počínají, jest kyz, který též svým zvětřáním podnětu zadržává vytvoření se

**Selenitu.** Také se skutečně ve všech břidlicích pyritem druhdy jemně prostoupených tvoří buď nehluboko pod výchozím nebo na haldách vlastních, sádrovec, kterýž v malých čirých krystalech buď ojedinelých neb spojených, zvláště hojně na plochách, břidličnatostí naznačených, se narostlý objevuje, obyčejně s plochou  $\infty \bar{P} \infty$ .

Krystalky selenitu bývají obyčejně  $\infty \bar{P} \infty$  .  $\infty P$  . —  $\frac{P}{2}$  buď jednotlivé neb srostlice dle plochy  $\infty \bar{P} \infty$ .

Že mimo tvořící se selenit z rozkladu pyritu též limonit se vylučuje,

jest na bíledni; protož také břidlice, drolící se zkypřením, obsahující sádrovcové krystalky, potaženy jsou vesměs sem tam žlutohnědým limonitem v tenkých vrstvách, jsouce jím jako potřísněny.

**Epsomit** jest též nerost utvořený z rozkladu kyzu. Objevuje se co bílý výkvět na ležatém, jakož i na rudě, druhdy provlhlých, buď co vrstvička jako bradavičkovatá neb i v dlouhých, tenounkých vlákenkách jak vlas tenkých, bílých. Na mnohých místech nalezen epsomit, tak v Chrustenických štolách, též v Nučicích. Výkvěty epsomitu se objevují toliko za suchých roků v letě, ana trochu vyschnuvší hornina sůl v roztoku pohlcenou usazuje na povrchu svém. Jakmile ale vlhčí počasí nastane, tedy z jara a v zimě, ztrácí se opět všecka sůl do zvlhlé horniny.

Byť by tedy i epsomit co výkvět se neobjeoval, předce ve vodě hygroskopické, horninu prostupující jest hořká sůl rozpuštěna.

**Limonit** tvoří celé malé žilky ve břidlicích visutých, kde tyto, pozbyvše rozkladem barvy své černé, v šedé proměněny jsou, jako ve visutém v Nučicích. Šedé břidlice vycházející na den jako úplně vylouhované, prošlehány jsou krátkými, až 1 cm. mocnými žilkami hnědého, nečistého limonitu, kteréž ve všech směrech se roztrhávají v odžilky a těmito mezi sebou spojují.

Též v některých ležatých břidlicích drobových, měkkých i pískovitých bývají podobné žilky.

Původ žilek limonitu zajisté dlužno hledat v rozkladu kyzu, přejemně břidlice prostupujícího, nebo kdekoliv břidlice černé, bezkyzové na den vvházejí, nebo kde o něco hlouběji uloženy, byť by i kyzové, tedy kryty jsou, neobsahují žil limonitových.

**Diadochit** jest pro okolní horniny jak visuté tak ležaté nerostem nad míru pamětihodným; nebo nejen že se nalezá na některých místech hojně, jest i po celém vlaku ložiska Nučického, na velmi mnohých místech objeven v poměrech dosti sobě podobných.

Diadochit se toliko ve vrstvách břidličnatých, ležatých jak visutých, tedy směrem vrstevnatosti zarostlý objevuje, až do jisté hloubky nepatrné, počínaje ode dne samého. Největší hloubka kolmá, až v které posud nalezen jest, obnáší asi 6 až 8 metrů a sice toliko do těch míst sestupuje, do kterých břidlice jak visuté tak i ležaté zkypřeny a proměněny se objevují, jakož i do té samé hloubky ruda v hnědou proměněna jest. V hlubších vrstvách méně změněných, ba dokonce snad ve vrstvách neporušených se neobjevuje a jest vůbec nemožno, by se v nich vyskytl, an co nerost z rozkladu hornin se vyvinuvší v méně rozložených neb neporušených horninách se ani vyskytovati nemůže.

Podoba diadochitu rovná se shlukům (konkrecím); nebo není ničím jiným než shlukem v povolnějších vrstvách vyloučeným. Nejmenší tvary nerostu velikosti asi hrachu velkého jsou dosti kulaté, větší, až velikosti ořechu dosahující, bývají povrchu okulaceného, ledvinovitého neb nejasně hroznovitého. Na velkých shlucích, kteréž rozsáhlostí svou velké pěsti se rovnají, jest silně hroznovitě neb vlnovitě prohýbaný, an sestává ze samých menších kuliček shluklých k sobě. Kuličky jednotlivé, nebo v hrozny shluklé bývají potaženy šedavým, zemitým povrchem, někdy, ač vzácně, trochu nažloutlým neb nazelenalým. Velké shluky skládají se vesměs z menších shluků potažených šedou zemitou korou; jsou tedy i uvnitř protaženy žilečkami, jakož i celými kousky šedými, zemitými, kterými hroznovitý povrch, k sobě na-

kupeně srostlých shluků, naznačen jest. Rozbijou-li se některé větší kusy, rozpadávají se v menší kousky s povrchem stlačeně hroznovitým, což se i po dlouhém ležení na vzduchu někdy samo děje, když deštěm zemité kory hroznovitých shluků, spojených mezy sebou, se vypírají.

Na vzduchu, totiž vlastně na dešti a slunci se diadochit tím méně rozpadává neb drolí ve větší krychlovité kousky, čím čistším jest. Jelikož diadochit toliko nerostem, jemu podobným, delvauxitem totiž, někdy úplně proniknut, neboli znečištěn bývá, a tento se přesnadno za krátký čas na slunci a vzduchu drolí: následuje z toho, že diadochitové hroznovité kusy tím pevnějšími na vzduchu zůstanou, čím více kyseliny sírové a čím méně kysličníku vápenatého obsahují; nebo delvauxitu čistému kyselina sírová v složení chybí, diadochitu čistému opět kysličník vápenatý.

Lom diadochitu jest nerovný, lesku nemá žádného, sloh jest celistvý, tvrdý až zemitý; barva rozličná; od běložluta až do tmavě cihlové barvy jsou všechny odstíny zastoupeny.

Hygroskopickou vodu obsahují všechny diadochity bez výjimky, někdy v značném množství ač proměnlivém.

Z každého naleziště jest diadochit jiný dle barvy i dle složení svého. Všecka posud známá místa, v kterých diadochit až posud nalezen byl, jsou následující a sice od západu k východu:

Ve Vraži se našly na stráni, na které východí rudy tak hojné jest, od západu k východu směřující, severozápadně od vesnice samé a něco západněji od místa, kteréž dříve naznačeno bylo, proto že se tam kule vápence ve vistutém rudě objevují. Jak diadochit zde uložen, nedá se určit, jelikož nenalezeny kousky jeho srostlé v skále, nýbrž různě na stráni vtroušené. Nepravidelné koule s hroznovitým povrchem slabě lesklým, velikosti značného vlašského ořechu až malé pěstě, byly barvy žlutohnědé až cihlové, lomu nerovného, nelesklého, celistvého.

Potažná váha nerostu žlutohnědého, velikosti velmi malého vejce slepičího, určena s 3·87 grammy jest pro nerost, bubliny vzduchu zahrnující 2·2056, pro nerost prostý všech vzdušných bublinek, tedy úplně vodou prosáklý 2·2205; diadochit tedy dle objemu obsahuje dutin 62% vzduchem naplněných.

Jiná odrůda, velikosti malé pěstě, barvy cihlové, měla hutnoty, určené s 2·36 grammy, i s bublinami 1·9415; prosta všech bublin ale 2·1756, obsahovala tedy dle objemu 10·39% dutin vzduchem vyplněných.

Žlutohnědý diadochit z rozličných částí vzat k analýsi a sice část a) Jos. Motyčka, b) Frant. Louženský.

|                                                          | a)                                       | b)    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Vody hygroskopické vysušené pod chloridem vápenatým bylo | 3·31                                     | 3·12  |
| nerozpustného zbytku                                     | ·81                                      | 1·65  |
| v roztoku rozpuštěné                                     | <i>SiO<sub>2</sub></i> ·43               | ·03   |
| <i>HO</i> prchající při 100° C                           | 7·75                                     | 7·58  |
| ostatní pevněji vázaná                                   | <i>HO</i> 20·04                          | 18·19 |
|                                                          | <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> 44·76 | 48·63 |
|                                                          | <i>CaO</i> 1·21                          | ·72   |
|                                                          | <i>MgO</i> ·29                           | 1·25  |
|                                                          | <i>KO, NaO</i> ·47                       | ·72   |
|                                                          | <i>PO<sub>5</sub></i> 22·50              | 18·09 |
|                                                          | <i>SO<sub>3</sub></i> 3·51               | 2·48  |
|                                                          | 99·82                                    | 99·34 |

Jelikož byl nalezen na zemském povrchu, kdež po dlouhou dobu zajisté vodou a vzduchem proniknut byl, možno soudit, proč sloučenství jeho od diadochitu tak rozdílné; mimo to se zdá být též delvauxitem prostoupený, obsahuje ale málo *CaO*. Rozbor slouží k tomu, by se seznalo, jakým způsobem se diadochit zrušuje na proměnlivém povrchu zemském.

V Chrutenicích nalezen diadochit v štole výskumní, asi 170 kroků západně od štolý číslo I., pod východím zaražené, ve visutých břidlicích. Asi několik málo centimetrů ve visutém rudě, uloženy ve směru vrstev, táhlé, hroznovité shluky nerostu; částečně se shluky splývají v jedinou vrstvu asi 3—6 cm. mocnou, jejíž povrch velmi nerovný, hroznovitý a jako nerovně velmi bradavičkováný jest. Povrch pokryt slabou vrstvou šedavé zemité hmoty, kteráž též do vnitř nerostu vniká v žilkách, rozštěpujících se v ještě tenčí. Lom jest nerovný, povrchu celistvého, lesku zrnitého, tedy žádného. Tvrdost těchto odrůd Chrutenických větší tvrdosti všech ostatních, zdá se být vyšší než 2·5 dle Mohsovy řady. Též křehkosti nemá tento diadochit žádné a jest pevnější všech ostatních, jakož i mnohem hustší jest. Kladívkem se mnohem nesnadněji láme všech ostatních odrůd.

Barva jest světle žlutohnědá až hnědavá, to však toliko uvnitř shluků nebo vrstev, ku kraji bledne neustále, kraj pak sám jest barvy světle šedožlutavé a barvi částečně též jako křída.

Hutnota střední části diadochitu asi 5 cm. mocné určená s množstvím 2·66 grammů, jest i s bublinami vzdušnými 2·2246, bez bublin, tedy úplně vodou pro-sáknutého nerostu 2·3439; obsahuje tedy nerost 5·09% dutin vzduchem naplněných dle objemu počítáno. Určena-li potažná váha nerostu co prášek rozetřeného obnášela hutnota po vyvážení všech bublin ve vodě 2·506 a jiného prášku 2·4902.

Některé vzácné kusy diadochitu jsou velepamátne tím, že povrch jejich potažen na místech hlubších slabou vrstvou (asi 2—4 mm.) hnědé až kaštanového delvauxitu, kterýž i v žilkách rozvětvlujících se do vnitř vniká. Kdežto diadochit jest velmi pevný, lesku zemitého, jsou delvauxitové žilky, kde trochu mocnější jsou, veskrz popukané, any se snadno drolí, a lesku smolného.

Neuplné analýsy tohoto diadochitu, jehož potažná váha určena, jsou: c) jest krajní vrstva barvy bledé; pod chloridem vápenatým ztrácí 92% hygroskopické vody; analýsa vztahuje se na nerost vysušený pod *CaCl*;

d) jest střední část, jejíž hutnota určena, analyza vztahuje se na nerost pod chloridem vápenatým vysušený;

e) též střední část, analyza ale vztahuje se na nerost při 100° C vysušený.

|                                          | c) Kar. Preis  | d) K. Preis    | e) Jos. Pich |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| nerozpustný zbytek                       | ·50            | ·45            | neurčen      |
| HO při 100° C                            |                |                | 0            |
| i ostatní všecka voda při žáru prchající | 29·38          | { neurčena     | 26·36        |
| $Fe_2O_3$                                | 37·15          | 37·02          | 39·27        |
| CaO                                      | neurčeno       | neurčeno       | neurčeno     |
| MgO                                      | sledy nepatrné | sledy nepatrné | sledy        |
| KO, NaO                                  | neurčeno       | neurčeno       | ·29          |
| $PO_5$                                   | 16·49          | 15·68          | 17·18        |
| $SO_3$                                   | 14·52          | 14·20          | 16·91        |
| Cl                                       | sledy nepatrné | sledy nepatrné | .            |
|                                          | 98·04          |                | 100·01       |

Ačkoliv analyzy e), d) jsou dělány s látkou prostou hygroskopické vody, e) však s látkou při 100°C vysušenou, shodují se nicméně rozborů značně, nebo poměr nalezených podvojných sloučenin se mezi sebou vzájemně rovná dosti sblíženě.

Jiný kus, vzat z většho shluku jednotlivého, tedy nikoliv z vrstvy, analysován a sice jsou f) a g) rozličné části nejkrajnějšího povrchu bledého h), pak hnědavý střed shluku.

f) Vilém Kaucký g) A. Veselý h) Hynek Stuchlý

Hygroskopická voda chloridem vápe-

|                        |           |        |       |
|------------------------|-----------|--------|-------|
| natým pohlcena         | ·52       | 3·21   | ·43   |
| nerozpustný zbytek     | 1·82      | 3·04   |       |
| v roztoku obsažená     | $SiO_2$   | ·35    | ·17   |
| při 100° C prchající   | HO        | 7·38   | 2·91  |
| ostatní žárem vypuzená | HO        | 22·03  | 21·99 |
|                        | $Fe_2O_3$ | 32·78  | 36·15 |
|                        | CaO       | 1·12   | 2·53  |
|                        | MgO       | ·65    | 1·54  |
|                        | KO, NaO   | 1·32   | 1·50  |
|                        | $PO_5$    | 21·13  | 16·97 |
|                        | $SO_3$    | 18·78  | 17·42 |
|                        | 100·33    | 101·50 | 99·89 |

V Krahulovské západní štole nalezen v komíně prvé, při prorážce jeho na den, nehluboko pod výchozím v břidlicích ve visutém, diadochit. Diadochit tolikéž několik centimetrů, až něco více 1 decimetru uložen ve směru vrstev.

Kusy okulacené s povrchem hroznovitým, obalené šedou, z břidlice povstalou zemí, kteráž až do jádra hmoty vniká v žilkách, jsou barvy světle voskově žluté až slabě šedavě nažloutlé. Krajní část poznenáhla bledne až do běložlutava.

Nerost jest lomu nerovného, zemitého, lomu nelesklého a velmi měkký, an při dotknutí barví a snadněji křídý píše. Přese všecko, že tato odrůda nejměkčí všech, předce nerozpadává se na vzduchu v drobty.



Hutnota určena s 1.09 grammy barvícího zemitého nerostu a nalezena i s bublinami 2.2098, v nerostu úplně vodou prosáknutém ale 2.4221; obsahuje tedy 8.75% dutin vzduchem naplněných, počítáno dle objemu.

K analýsi vzata odrůda i) bledě šedavěžlutavá, jejíž potažná váha určena s 2.00 grammy, byla, když se nerost byl vodou úplně prosákl, 2.4231; však byl-li nerost vysušen pod chloridem vápenatým, tedy prost vši hygroskopické vody, zvýšila se potažná váha na 2.7707 (určena s množstvím .93 grammů). K analýsi vzato 1.06 grammů.

Jiný kus bledě voskově žlutý, 12 cm. dlouhý a 6 cm. široký a vysoký, analysován ve dvou částech, k) střední a l) krajní část vybledlá.

i) k) Jan Vonka l) Ferd. Jičínský

Hygroskopická voda pod chloridem

| vápenatým pohlcená      | 1.03                                     | 3.56  | 14.87  |
|-------------------------|------------------------------------------|-------|--------|
| nerozpustný zbytek      | .62                                      | .38   | .02    |
| v roztoku obsažena      | <i>SiO<sub>2</sub></i> .24               | .62   | .83    |
| při 100° C prchající    | <i>HO</i> 7.91                           | 7.94  | 1.65   |
| ostatní, žárem vypuzená | <i>HO</i> 19.92                          | 20.55 | 23.21  |
|                         | <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> 35.35 | 34.63 | 40.48  |
|                         | <i>CaO</i> .65                           | 1.92  | .68    |
|                         | <i>MgO</i> .02                           | .23   | sledy  |
|                         | <i>KO, NaO</i> neurčeny                  | 1.39  | 4.01   |
|                         | <i>PO<sub>5</sub></i> 15.63              | 27.20 | 22.17  |
|                         | <i>SO<sub>3</sub></i> 17.57              | 5.00  | 7.03   |
|                         | <i>Cl</i> nepatrné sledy                 | sledy | .03    |
|                         | 97.91                                    | 99.86 | 100.11 |

Mnohem více než 100 kroků od tohoto komína, po výchozím rudy ve směru k východu jest zkušební štolka takřka pod samým výchozím. Ve visutých bídlicích asi v odlehlosti 1 decimétru od visutého ložiska rudy, jsou ve vrstvě jedné, zároveň s ní vtroušené shluky diadochitu, barvy bledě oranžové až sítě oranžové, povrchu hroznovitého; pokryté jsou též zemitou šedou korou, podobnou bídlici zrušené, v níž nerost zarostlý jest. V některých shlukách místo žilek zemitých jsou žilky hnědé delvauxitové. Nerost při dotknutí píše a barví snadněji křídý.

Hutnota diadochitu, k jejímužto vynajití vzata kulička co ořech velká, z níž střed i okraj vybrány a na hutnost zkoušeny, kteráž určena s 2.84 grammy, jest pro nerost prostý 2.4227, pro nerost úplně vodou prosáknutý ale 2.7634; obsahuje tedy dle objemu 14.48% dutin vzduchem vyplněných.

K analýsi vzatý nerost tak, jak se nalezá, tedy i s hygroskopickou vodou m) měl hodnoty 2.4227 prost všech bublinek; jiný sestávající z malých zrnek menších ořechů lískových jest n); o) jest střed, p) jest kraj z kusu 6 cm. dlouhého a 5 cm. širokého a vysokého, kraj jen o nepatrně méně barvený oranžového středu.

m) K. Preis n) Polívka o) Fr. Farský p) Jos. Lacina

Voda hygroskopická pohlcena chlo-

ridem vápenatým

nerozpustný zbytek

v roztoku obsažená

při 100° C prchající

ostatní, žárem vypuzená

|           |          | ?     | ·07   | 2·72  |
|-----------|----------|-------|-------|-------|
|           | neurčeno | 11·72 | 1·06  | .     |
| $SiO_2$   |          | .     | 4·41  | ·17   |
| $H_2O$    | 8·99     | 6·04  | 9·57  | 2·91  |
| $H_2O$    | 19·23    | 18·69 | 18·57 | 21·99 |
| $Fe_2O_3$ | 53·64    | 37·75 | 31·49 | 36·15 |
| $CaO$     | neurč.   | 1·46  | 1·81  | .     |
| $MgO$     | neurč.   | ·44   | sledy | .     |
| $KO, NaO$ | neurč.   | ·24   | 2·13  | ·15   |
| $PO_3$    | .        | 14·10 | 20·66 | 19·86 |
| $SO_3$    | 9·49     | 9·26  | 11·27 | 18·66 |
| $Cl$      | sledy    | .     | sledy | .     |
|           |          | 99·72 | 99·97 | 99·72 |

Obě tato místa v Krahulově podávají podivuhodný příklad, jak ve vzdálenosti krátké barva se mění.

V Nučicích se též diadochit nalezá, ale toliko v ležatém, tedy pod rudou. Kdekoli ložisko rudní jest beze všeho vržení uloženo, tam neobjevuje se nižádný diadochit; ale kdekoli bývá ložisko vrženo rozsedlinou, a s ložiskem též vrstvy v ležatém rozpoltěny a od sebe posouvny, tu se objevuje nerost tento v měkkých zrušených břidlicích ležatých 1 až 4 decimetry hluboko pod rudou, vrostlý do břidlic, zároveň s jich vrstevnatostí v hroznovitých a nepravidelně kulovitých kusech, až do jisté vzdálenosti od vržení samého; až pokud totiž břidlice velmi proměněny jsou. V Nučicích několik takových míst, kde se diadochit nalezá a sice v západním kraji a ve prostředku 2hého lomu, ve východní části 3tího a uprostřed 4tého lomu. Ve visutém není o diadochitu ani té nejmenší památky. <sup>29)</sup>

Pamětihodno jest, že se zvláště u blízku, kde diadochit vrostlý bývá, někdy ale též osamotněle jako v Jinočanech, bezprostředně pod rudou oběhuje křemenitá břidlice zbarvená čížkově zeleno. V Nučicích se na jednom místě v této břidlici sám diadochit zarostlý vyskytuje. Čížkově zelená břidlice (z Jinočan, v níž byla malá *Orthis* sp. zarostlá), méně se v kyselině solné v břidlici šedou, an se nerost zeleně barvící snadno rozpouští. V roztoku dokázána  $PO_3$  a  $SO_3$ , obě v množství značném. Zajisté se tedy dle této zbarvené břidlice dá soudit na možnou přítomnost diadochitu.

Barva nučického diadochitu jest cihlová, více méně do žlutohněda neb hnědava se klonící, tvrdost jest menší než odrůdy z Chrustenic pocházející, tedy asi  $2\frac{1}{4}$ , lom nerovný, nelesklý, celistvý; za dlouhý čas rozpadá se na vzduchu ve velké drobtý. Kraj bývá též něco málo světlejší středu.

Hutnost středu z kusu velikosti vlašského ořechu, barvy tmavocihlové, určena s 1·60 grammy, jest 2·2922; kraj pak dal hutnoty s 1·68 grammy i s bublinami, 2·2639, prost bublin však 2·2935, obsahuje tedy 1·29% dutin, vzduchem naplněných, počítaje dle objemu.

Střed jiného diadochitu, barvy žlutohnědé, velikosti pěstě měl hutnotu 2·0795 s bublinami a 2·3519, byv celý prosáknutý vodou, (k určení vzaté množství 2·76 gr.),

obsahuje tudíž dutin dle objemu 11·50%; kraj z tohoto samého kusu vážící 25 grammů měl, prost všech bublin, 2·3745 hutnoty.

K analyzy vzat diadochit č. q) barvy cihlové a č. r) barvy tmavě cihlové, kterýžto ve vodě vyvařen, až všechny bubliny vyšly, měl hutnoty 2·369; jiný kousek nevyvařený pak 2·429, též prostý všeho vzduchu. Jak č. q) tak i č. r) ležely po delší dobu na vzduchu.

Z kusu 10 cm. dlouhého a 7 cm. širokého a 2½ cm. vysokého barvy cihlové jest s) střed cihlový, t) kraj světle cihlový.

Všecky kusy pocházejí ze západní části druhého roznosu v Nučicích.

q) Kar. Preis r) K. Preis s) Sojka t) Fr. Čimbura

Voda hygroskopická, chloridem

| vápenatým pohlcená:    |           | při 100° C sušený |          | 1·92  | neurčena |
|------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|----------|
| nerozpustný zbytek     |           | neurčen           | ·17      | 1·15  | 2·55     |
| v roztoku rozpustěná   | $SiO_2$   | neurčena          | neurčena | ·62   | ·20      |
| při 100° C prchající   | $HO$      | sušen při 100° C  |          | 1·56  | 4·21     |
| ostatní žárem vypuzená | $HO$      | neurčena          | neurčena | 23·50 | 14·68    |
|                        | $Fe_2O_3$ | "                 | 36·39    | 37·28 | 34·25    |
|                        | $Al_2O_3$ | "                 | sledy    | .     | .        |
|                        | $CaO$     | "                 | 1·55     | 1·16  | 1·78     |
|                        | $MgO$     | "                 | sledy    | sledy | 1·73     |
|                        | $KO, NaO$ | "                 | neurčeny | ·12   | 2·06     |
|                        | $PO_5$    | 17·4              | 17·72    | 21·08 | 22·33    |
|                        | $SO_3$    | 15·5              | 15·08    | 13·41 | 16·06    |
|                        |           |                   |          | 99·88 | 99·85    |

V Jinočanech jest diadochit též v ležatém ložiska, a sice asi toliko 1 dm. od toho vzdálen, uložen zároveň s vrstvami, též na jistou vzdálenost od vržení. Jako v Nučicích i zde bývá ruda na hojných místech uložena na písčnaté břidlici barvy čířkově zelené, s kterouž buď se diadochit objevuje, neb kteráž i bez něho svou bohatostí na  $PO_5$  a  $SO_3$  na možnost, že by se v ní nalezat mohl, poukazuje.

Barva jest cihlová až světle cihlová, ostatní vše takové jako v Nučicích. Hutnota určena s 3·13 grammy i s bublinami jest 1·8863, však úplně vodou prosáknut má potažné váhy 2·3709; tudíž obsahuje dle objemu 20·50% dutin vzduchem naplněných.

Částečné složení tohoto nerostu jest u) Wett

|           |       |
|-----------|-------|
| $Fe_2O_3$ | 39·25 |
| $PO_5$    | 17·35 |
| $SO_3$    | 10·57 |

$HO$ ,  $CaO$  a ostatní

neurčeno.

Částečný rozbor vztahuje se na látku prostou hygroskopické vody.

Od cesty, od kostelíčka na Krtňi u Chabů k Stodůlkám, asi v jedné třetině celé vzdálenosti, se odlučuje krátká polní cesta na jih, která brzy končí, toliko vodním brázdou až k lukám krteňským naznačena jest. Počítaje 160 kroků od vzniku cesty směrem k jihu, objevuje se mezi břidlicemi na východním jich samých diadochit brzy, ledvinovitý, kulovitý, hroznovitý, v kusech na povrchu lesklých, šedožlutavých, uvnitř ale barvy voskové až žlutohnědé. V těchto místech též ložisko rudní asi uloženo býti může. Jestli se diadochit nalezá v ležatém neb ve visutém od něho, nemožno

z výchozu nezřetelně uloženého soudit nikterak, aniž to lze poznat, jestli že kule zároveň s vrstvami vrostlé jsou, však možno dle obdoby s větší věrojatností toto poslední za pravdu mít.

Břidlice drobové, šedé, kteréž vedlé diadochitu se vyskytují, bývají pokryty slabými vrstvičkami nějakého zásaditého síranu železitého, barvy špinavě citronové, kterýž obyčejně výchozí kyzů naznačuje.

Odrůda hnědocihlové barvy s pramalými, ale pouhým okem patrnými dutinkami měla hutnoty, s 3·35 grammy určené i s bublinami, 2·1794, prosta bublin, 2·3825, obsahovala tudíž dle objemu 8·63% dutin; složení pak odrůdy ze Stodůlek jest v) a ch):

|                                                    | v) Jos. Spinka                           | ch) Bečka |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Voda hygroskopická, pod chloridem vápenatým určená | 2·5                                      | ?         |
| nerozpustný zbytek                                 | 14·54                                    | 8·40      |
| v roztoku obsažená                                 | <i>SiO<sub>2</sub></i> .64               | .91       |
| při 100° C prchající                               | <i>HO</i> 6·05                           | 8·30      |
| ostatním žářem vypuzená                            | <i>HO</i> 14·65                          | 14·21     |
|                                                    | <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> 31·83 | 33·44     |
|                                                    | <i>CaO</i> .88                           | 2·85      |
|                                                    | <i>MgO</i> .03                           | 1·42      |
|                                                    | <i>KO NaO</i> .95                        | 1·27      |
|                                                    | <i>PO<sub>5</sub></i> 24·83              | 23·90     |
|                                                    | <i>SO<sub>3</sub></i> 6·00               | 4·73      |
|                                                    | 100·40                                   | 99·43     |

Z toho patrné, jak v jediném kuse, z kterého rozličné kousky k rozboru vzaty byly, se část nerozpustná rozličně rozptýlena nalezá.

**Delvauxit** jest vedlé diadochitu, kterému jinak dosti podoben jest, druhým, pro okolní vrstvy vedlé ložiska významným nerostem, neobjevuje se ale dalece tak hojně jako prvý.

Význačné jest pro delvauxit to, že se nikdy neobjevuje zarostlý do vrstev jako diadochit, nýbrž toliko v žilách. Kde ale nicméně ve vrstvách se vyskytuje, tu toliko žilky v diadochitu tvoří, jak již o diadochitu Chrutenickém a Krahulovském zmíněno bylo.

Delvauxit se sice též tak objevuje ve shlucích nepravidelně kulovitých jako diadochit, ale předce se od tohoto jaksi liší tím, že shluky jeho se více přibližují podobě kule, že, ač povrch jeho rovněž silně hroznovitý, ledvinovitý od samých srostlých a do sebe splývající kuliček jest, nebývá předce potažen šedou, zemitou slabou korou rozložené břidlice, nýbrž tenounkou vrstvičkou nažloutlou neb žlutozelenavou, ovšem na svém jednom kraji, též rozloženou břidlicí znečištěným. Rovněž i vnitřek jeho nebývá složen z menších shlukových kuliček, oddělených mezi sebou tenkou, šedou zemitou vrstvou, do kterých se diadochit rozpadává někdy opět; nýbrž střed jeho jest obyčejně jednotejná hmota, jen převzácně žilkami, od povrchu do středu se táhnoucími, protkána.

Čistý delvauxit pak na vzduchu rozpadává se přesnadno, an se drolí, počínaje od povrchu svého v kousky krychlovité. Znečištěný-li diadochitem, též je mnohem trvanlivější.

V Chrutenické štole č. II. a sice při prorážce komína I. na den, nalezeny

shluky delvauxitu v žíle, vyplněné změkklou jilovatou břidlicí rozetřenou, velikosti ořechu až pěstě. Nerost jest dvojbarevný na lomu svém: kraj potažený žltozele-  
navou vrstvičkou jest barvy kaštanové, lomu lasturového, lesku smolného; střed  
pak lomu nerovného jest celistvý, zemitý, mdlý bez lesku, a barvy hnědé; krajní  
vrstva kaštanové barvy asi 5 mm. mocná, přechází znenáhla, ale předce v dosti  
krátké přechodní vrstvě do mdlého hnědého středu. Kraj barvy kaštanové již dle  
pohledu jest delvauxitem, střed hnědý zdá se být směsí diadochitu s delvauxitem,  
jak to též rozbořem na jevo vychází.

Kraj, lesku smolného, barvy kaštanové d) puká ve vodě se slabým šramotem,  
aniž by se v kousky rozpadal; potažná váha určena s množstvím 1.58 grammů  
jest i s bublinami 2.2541, bez bublin, tedy úplně prosáknutého vodou 2.2676;  
obsahuje tedy toliko 50% dutin dle objemu. Střed barvy hnědé jest s diadochitem  
valně pomíšený delvauxit, jak rozbor e) naznačuje.

Jiný delvauxit opět z kraje shluku f) měl co prášek potažnou váhu 1.9404  
určenou s množstvím 1.45 grammů.

d) dr. Gust. Müller e) dr. G. Müller f) Jan Breuer

Hygroskopická voda, pohlčená v chloridu

|                                      |                 |       |        |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| vápenatém                            | 9.11            | 5.06  |        |
| nerozpustný zbytek                   | 2.96            | 1.38  | 2.87   |
| v roztoku obsažená rozpustná $SiO_2$ | .               | .     | .24    |
| při 100° C prchající                 | HO 9.71         | 2.56  | 6.55   |
| ostatní, žářem vypuzená              | HO 15.08        | 18.97 | 17.94  |
|                                      | $Fe_2O_3$       |       | 49.87  |
|                                      | CaO             |       | 4.56   |
|                                      | MgO             |       | 1.71   |
|                                      | KO, NaO         |       | 2.25   |
|                                      | PO <sub>5</sub> |       | 13.26  |
|                                      | SO <sub>3</sub> | .93   | 5.24   |
|                                      |                 |       | 100.14 |

Značné množství kyseliny sírové, obsažené v jádru, čísla e) svědčí o tom, že  
velmi mnoho diadochitu v něm obsaženo jest a sice úplně s delvauxitem smíšeno.

Delvauxity, s jádrem diadochitovým na vzduchu nerozpadávají se tak snadno  
v drobty, leda že se kraj trochu oprýskává.

U Stodůlek nalezen též tento nerost a sice něco málo níže od toho místa,  
kteréž co naleziště pro diadochit uvedeno bylo. Vyskytuje se též na výchozím  
ve vodní jedné brázdě; s určitostí ovšem nemožno tvrdit, že v rosedlině jilovatou  
rozmělněnou břidlicí vyplněné, však zdá se být věrojatné, že tomu tak. Del-  
vauxitové nepravidelné kule jsou lomu lasturového, lesku smolného, barvy kaštanové,  
uvnitř trochu bledší a podobají se jinak všem ostatním delvauxitům až k nerozeznání.

**Přehled všech nerostů, kteréž posud nalezeny byly ve společnosti rudy v celém známém prostranství ložiska**

|    |                          | zarostlé v rudě | v žilách rudy pro-<br>rážejících neb<br>v žilkách narostlé |   | v okolní hornině<br>vrostlé neb v ži-<br>lách zarostlé |
|----|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
|    |                          |                 |                                                            |   |                                                        |
| 1  | Siderit . . . . .        | †               |                                                            | † |                                                        |
| 2  | Chamoisit . . . . .      | †               |                                                            |   |                                                        |
| 3  | Limonit . . . . .        | †               |                                                            | † | †                                                      |
| 4  | Haematit . . . . .       | †               |                                                            | † |                                                        |
| 5  | Stilpnosiderit . . . . . |                 |                                                            | † |                                                        |
| 6  | Křemen . . . . .         | †               |                                                            | † |                                                        |
| 7  | Calcit . . . . .         | †               |                                                            | † | †                                                      |
| 8  | Aragonit . . . . .       | †               |                                                            | † |                                                        |
| 9  | Selenit . . . . .        | †               |                                                            | † | †                                                      |
| 10 | Baryt . . . . .          |                 |                                                            | † |                                                        |
| 11 | Epsomit . . . . .        |                 |                                                            | † | †                                                      |
| 12 | Melanterit . . . . .     |                 |                                                            | † |                                                        |
| 13 | Diadochit . . . . .      |                 |                                                            |   | †                                                      |
| 14 | Delvauxit . . . . .      |                 |                                                            |   | †                                                      |
| 15 | Kaolin . . . . .         | †               |                                                            | † |                                                        |
| 16 | Pyrit , . . . . .        | †               |                                                            | † | †                                                      |
| 17 | Markasit . . . . .       |                 |                                                            | † |                                                        |
| 18 | Chalkopyrit . . . . .    |                 |                                                            | † |                                                        |
| 19 | Arsenopyrit . . . . .    | †               |                                                            |   |                                                        |
| 20 | Sphalerit . . . . .      |                 |                                                            | † |                                                        |
| 21 | Galenit . . . . .        | †               |                                                            | † |                                                        |
| 22 | Anthracit . . . . .      |                 |                                                            | † |                                                        |

## C. Rudy ve středu pásma e.

**Otevření ložiska.** Ložisko rudní odkryto prací denní na místě, kde co pevná skála, druhdy z méně pevných okolních hornin, ložisko obklopujících, na den vyčnívalo; mimo to otevřeno je štolou „Dobříčskou“.

Střed ložiska, kteréž se objevuje na pozemcích osady Dobříčské, kde na den co mocná pevná skála vycházelo, jest od nejzápadnějšího cípu chalup Dobříčských, v směru úplně jižním asi 1300 m. vzdálen. Mimo to i takto poloha jeho určení se dá: Střed ložiska jest asi ve dvou třetinách délky cesty z Dobříče do Tachlovského nebo prostředního mlýna vedoucí, a sice od rozcestí, z něhož se tato cesta dělí s jinou, která do Chejnice směřuje, ve směru západojižním asi 170 až 180 metrů odlehlý.

Z toho místa, ležícího na obecní pastvině, číslem 181. naznačené, ale ovšem již velice rozorané, tak že se co do rozsáhlosti více neshoduje s velikostí na katastrální, jakož i na největší generalštabní mapě ( $1'' = 400^{\circ}$ ) udané, jest dle vlaku ložiska štola zaražena a v směru východním asi k 100 metrům dohnána.

### Rozprostírání se rudního ložiska, jakož i mocnost jeho.

*Délka ložiska*, jak pracemi posud zjištěna jest, obnáší asi 380—400 metrů, aniž by tím ukončení vlaku ložiska zjištěno bylo.

**Rozprostírání a mocnost ložiska.** Ložisko nerozprostírá se svým západním cípem ani k Dobříčsko-Tachlovickým hranicím, nebo nepřechází přes potok Radotínský, jihovýchodně od stodoly Tachlovické (u pivováru zvané), kdež by, byť by i sebe slabší bylo, se vypátrat dalo, nebo všechny výchozy vrstev jak ležatého tak i visutého ložiska, zvláště za prudkých lijáků dobře odkryta bývají. Teprve v polích západně od Dobříčské štoly samé ložisko šachtou objeveno asi v mocnosti  $\frac{1}{4}$  až  $\frac{1}{2}$  metru a vlaku západo-východního.

Střed ložiska uložen v pastvišti již jmenovaném, kdež mocnost rudy 5 až 6 metrů dosahuje. Odtud je ložisko štolou hnanou lépe prozkoumáno a vleče se směrem k severovýchodu a úklonem asi  $37^{\circ}$  až  $44^{\circ}$  k jihu, jsouc mnohokrátě po sobě rozsedinami vrženo; směry jednotlivých, vrženými odtržených částí ložiska, jsou obsaženy mezi  $4^{\text{h}}$  až  $6^{\text{h}}$   $12^{\circ}$ . Mocnosti ložiska od středu na východ neustále rychle ubývá, tak že již v odlehlosti odtud asi 50—60 metrů mohutnost toliko 1 metr obnáší a pod koncem pastviny, až pokud ložisko asi známo, ještě pod  $\frac{2}{3}$  m.,  $\frac{1}{3}$  m. a ještě níže klesá. Dále za cestu, z Dobříče k Tachlovickému mlýnu, ložisko vyhledáno není a zdá se, že i východní cíp nedaleko za cestou se snad buď zcela

vytratí vyříznutím se, neb na přenepatrnou vrstvu svraští. Známa tedy toliko asi střední část ložiska prací dolovou asi v délce 100 metrů dle vlaku.

*Výchozí* ložiska leží v pastvišti již naznačeném a v polích, u Svatojanského kříže nazvaných, kde holá ruda až na den vystupovala; další výchozí k východu jest v pastvišti samém naznačeno nízkým, malým táhlým valem, sestávajícím z pevnějších diabasů ležatých. Západní výchozí, které by v potoku Radotínském na mezech Dobříčsko-Tachlovických býti mělo, není známo proto, že ložisko ani tak daleko nezasahuje. Vákol výchozí se objevují jednotlivé balvany velké z ložiska tvrdého pocházející; v celém okolí, až do jisté, dosti značné vzdálenosti, od směru ložiska, se v polích hojně vyskytují menší kusy rudy, pocházející původně odtud.

### Ležaté a visuté ložiska Dobříčského.

O ložisku vědělo se do nedávna toliko to, že buď v diabasech pásma  $Ee_1$ , nebo na blízku jich uložena jest; nebo ani visuté ani ležaté nikde v styku s ložiskem odkryto nebylo: nebylo tedy zjištěno, v čem vlastně ložisko uloženo jest. K rozřešení této záhady musily se výzkumné podzemní překopy zarazit, kterými zjištěna určité poloha ložiska ve vrstvách pásma  $Ee_1$ .

Bezprostředně pod ložiskem sestává *ležaté* z jemných, špinavě bělavých neb šedožlutých nepevných, málo zřetelně vrstevnatých tufů diabasových, nebo diabasů úplně proměněných. Pod touto bezprostředně ležatou vrstvou, jejíž mocnost sotva  $\frac{1}{2}$  metru, i když nejvyvinutější jest, dosahuje, následují jemné, špinavě šedožluté hrubovrstevnaté diabasy zrušené a zkypřené, jejichž úklon k jihu hrubě naznačený asi 37 až 40° obnáší. Čím dále do ležatého, tím pevnějšími stávají se diabasy, méně barvu ustavičně do šedohněda, do hnědavošeda, šedo zelenava, až v 10 metrech vodorovné vzdálenosti od ložiska jest patrný poznenáhle přechod těchto porušením zkypřelých diabasů, v špinavě tmavozelený, málo proměněný diabas nevrstevnatý, patrný. Diabasu tmavozelenému přibývá pevnosti čím dále od ložiska v tím větší míře, tak že se na konci výzkumného překopy asi v 14 metrech vodorovné vzdálenosti úplně jiným, tvrdým a na pohled málo zrušeným diabasům pásma  $Ee_1$  vyrovná a též jako tyto, žilami a menšími odžilkami bílého vápence prosluhán jest:

Diabas tvoří celé ležaté, an se bez ustání až k visutému pískovců (křemenců) a břidličnatých křemenců pásma  $Dd_3$  objevuje. Na vzduchu však za delší dobu drolí se diabas ležatý.

Diabas ležatého analysován, ne sice z ležatého od ložiska, nýbrž o mnoho hlouběji a sice z míst ze stráně nízké, proti tachlovické stodole „u pivováru“. K rozboru vzat diabas z jádra balvanů velkých, které před nedlouhým časem lámány byly, jen nepatrně proměněných, an toliko slabými nádechy černomodrého psilomelanu na rozbitých plochách potaženy byly. V složivu zrnitém patrně se rozeznávaly dva nerosty již pouhým okem, a sice krystalky bílé a potom lesklé černé štípatelné krystalky.

Potažná váha diabasu určena s 6 grammy jest 2.7946.



Rozbor pak od Jahna: k analýsi vzato látky 72 grammů.

|            |             |
|------------|-------------|
| $SiO_2$    | = 45.74     |
| $Al_2O_3$  | = 11.65     |
| $Fe_2O_3$  | 16.50       |
| $MnO$      | 30          |
| $CaO$      | 8.35        |
| $MgO$      | 5.27        |
| $KO$       | 2.93        |
| $NaO$      | 5.54        |
| $HO, CO_2$ | 3.42        |
|            | <hr/> 99.70 |

Ve **visutém** ložiska objevuje se asi  $\frac{1}{2}$  až více jednoho decimétru mocná vrstva kypřého, šedožlutého tufu, někdy žlutou zemitou rudou zastoupeného, nad kterým následují až do mocnosti asi jednoho metru měkkí, bílé neb šedé vrstvy jilovaté, střídající se s tvrdšími břidličnatými, neb slabě křemenitými. Tyto měkké vrstvy, vybledlé do běla, jsou porušené a v jíl změkklé vrstvy v dalším visutém se objevují. Čím výše do visutého, tím patrněji střídají se tenké a tenounké vrstvy tvrdší, barvy světlé s velmi měkkými vrstvami šedými, bezpočtukrát s úklonem  $44^\circ$  na jih. Však úklon i vlak vrstviček není nepřetržitý; vrstvičky tvrdší jsou tak přetrhány a ve svém spojení zrušeny, a měkké vrstvičky zase v jíl částečně rozetřeny a mezi trhlínky tvrdších vrstev protlačeny, že by se nižším způsobem z pevnějších vrstviček deska asi 1 čtverečný decimétr obnášející, vyhledati nedala.

Tyto vrstvy prodělány byly od ložiska na 14 metrů do visutého ve směru vodorovném, aniž by tím předělány byly bývaly (obr. 8.).

Obr. 8.



Průřez skrz ložisko Dobříčské směrem od severu k jihu na mapě Tab. I. směr NN.

*r* ložisko křemenné, dutinaté (nuzná ruda). *jt* jemné tufy diabasové, zkypržené, přecházející v tuf *t* hrubovrstevnatý a tento v nevrstevnatý, méně porušený diabas *d*. *z* žlutavý tuf diabasový, *t* šedavý tuf pevnější předešlého; *g* graptolitové břidlice barvy šedé.

V šedých břidlicích se objevují pravidelné kuličky velikosti vikve až hrachu, barvy šedožlutavé, zemité, nepevné, kteréž po rozštípení břidlic, zvláště oněch nevysoko nad rudou uložených, na půlku zarostlé zůstávají, nevypadnou-li zcela; zanechávají v druhé části rozštípené břidlice kulatý dolíček. Jen málokdy se rozštěpují zároveň s břidlicí vejpůlky. Kuličky se podobají diadochitu zemitému nápadně, rozpouštějí se snadno v kyselinách a obsahují značné množství  $SO_3$ , též  $PO_3$  a  $HO$ .

Od ložiska počínaje vyskytují se v jisté výšce po celé prozkoumané mohutnosti vrstev jisté vrstvičky, v kterých se objevují skameněliny. Skameněliny, sestávající z otisků graptolithů, neobjevují se v tak ohromném množství, jako obyčejně v ostatních černých břidlicích z jiných nalezišť, nýbrž toliko po různu.

V šedých břidlicích visutých, které tudíž graptolitovými břidlicemi pásma *Ee*, jsou, nalezeny posud: *Graptolites priodon* Bronn, *Grapt. spiralis* Geinitz,

*Gladiolites Geinitzianus* Barr.; tento poslední s krásně zachovalou kresbou (Barrande, *Graptolites de Bohême* 1850. Pl. 4, fig. 17—33.).

Ač mohutnost vrstev graptolitových, visuté rudy tvořících, není prodělána, dá se nicméně v místě, kde pásma vrstev přes Radotínský potok na Dobříčsko-Tachlovských hranicích přechází, východojižně od Tachlovické stodoly „pivovárem“ nazvané, asi v mocnosti 30—36 metrů stopovati. Nad břidlicemi graptolitového pásma opět diabas a diabasový tuf ve velké rozsáhlosti uložen jest.

### Ložisko Dobříčské.

Ložisko ve své střední nejmocnější části složeno z těžké, tvrdé hnědé rudy, limonitu, barvy hnědé, protkávaného buď maličkými zrnčky vyhraněného křemene v žilečky spojeného nebo propletaného žilkami křemene ve všech směrech; v dutinkách velmi hojných jest křemen v maličkých krystalkách vyhraněn. Tak složena asi nejbohatší část ložiska, kteráž podobna až k nepoznání k oné, křemenem prostoupené rudě, která v Zbuzanském ložisku na jednom místě se objevuje ve množství značném.

Potažná váha hnědé rudy Dobříčské, prosté všeho křemene přimíšeného, určena s množstvím 2·07 grammů na 4·0008. Podobný té rudě hnědý limonit ze Zbuzan má hutnotu 3·9381. Žiháním ztrácí limonit 5·96 % na váze, což z největší části od vody pocházeti bude, která se vypuzuje žárem.

V kyselině sírové vyvinuje se kyselina uhličitá a v roztoku se nalézá vedle kysličníku železitého část kysličníku železnatého, na důkaz toho, že v limonitu přejemně siderit rozptýlen jest.

Vedle hnědé rudy v ložisku objevuje se černohnědá až šedočerná ruda tolikéž jako hnědá, do které znenáhla přechází, křemenem a žilkami křemene prostoupena.

Potažná váha černé rudy jest 3·3949 nalezena z množství 3·55 grammů.

V sírové kyselině vyvinuje značně kyselinu uhličitou a v roztoku vedle  $Fe_2O_3$  též  $FeO$ . Nerozpustného v kyselině sírové zbytku obsahuje 6·82%, a  $FeO$   $CO_2$  23·75 %.

Černá ruda, která jest směs haematitu s limonitem, jest značným množstvím sideritu proniknuta. <sup>80)</sup>

V některých částech ložiska uveliči se množství tenkých žilek křemene na úkor rudy tak velice, že v křemenu dutinatém, s povrchem druznatým, kousky rudy toliko jen vtroušeny jsou v základní hmotu křemenovou.

Ba někdy se celé, až na 1 metr zesláblé ložisko promění toliko v křemennou, jako rozežranou a zcela dutinatou hmotu, složenou z pletiva síťovitě se protkávajících žilek křemenných, v dutinách svých malými krystaly křemennými posetých; v nichž sem tam jako osamotněle kousek limonitu hnědého vtroušen, nebo jehož některé skuliny buď polorozpadlým, zemitým limonitem — žlutým okrem — vyplněny, nebo toliko povlečeny jsou. Tu ovšem ložisko rudní spíše by se ložiskem křemenným nazývati mohlo. Však v některých částech křemenného skulinatého ložiska se v bílém křemenu žilek rozeznává jakési šedé zbarvení, pocházející od sideritu, křemen pronikajícího.

V některých částech ložiska, mezi žilkami velice podřízeně vtroušeny částky tvrdé, polozemité, zkypřelé rudy, barvy černorudé neb zemité rudé, kteráž čistým

haematitem jest; z černošedé, tvrdé rudy dají se přechody, rudou černorudou až do rudé zemité pozorovati.

Z vlastního ložiska rudního dají se toliko části, které méně žilkami křemennými propleteny jsou, co ruda dobývat.

Podřízeně se vedlé křemenem prostouplého ložiska objevuje, ale toliko jen částečně v tufu ložisko bezprostředně pokrývajícím, ruda hnědá, zemitá — žlutý okr — která pokrývá jej v slabé mocnosti několika prstů neb ruky s tímto se místy vleče. Buď jest visutý tuf zcela žlutou rudou prostoupen a sežloutlý, neb ruda žlutá se objevuje sama zemité v tenké vrstvě vyloučena; toliko na jediném místě bylo v žluté rudě, až 3 decimetry mocné, přimíšeno na krátký vlak, až v mocnosti  $1\frac{1}{2}$  decimetrů zemitého psilomelanu s žlutou, zemitou rudou promíšeného.

Též tufy diabasové bezprostředně ložiska se dotýkající zkypří a sežloutnou tak, že by se místy za nuznou žlutou rudu považovat mohly; toliko jen vzácně se vyloučena nalézá v tomto ležatém tufu světlohnědá ruda. Na jednom místě kratounké rozsáhlosti, v ležatém, úplně zkypřelém tufu vyloučen haematit co kyprá zemitá ruda barvy světlorudé v kostkách malých, prostoupených malíčkými zrnky žlutavého, šedavě zelenavého tufu úplně proměněného. <sup>31)</sup>

Z ložiska Doříčského známo toliko výchozí; jaká ruda v ložisku asi v hloubce se vyskytuje, neznámo posud; možno ale soudit z toho, že limonity hnědé, jakož černošedé směsi limonitu s haematitem, kteréž ocelkem prostoupeny jsou, pocházejí snad z proměny ještě nedokonané ze sideritu, v hloubce ložisko skládajícího.

**Úvaha.** Ložisko Dobříčské uložené asi v jedné třetině mocnosti pásma  $Ee_1$ , počítaje od ležatého k visutému, mezi diabasy a graptolitovými břidlicemi šedými, které na tomto místě v pásmu  $e_1$  se poprvé objevují. V mohutnosti celého pásma, již možno asi na 620 — 640 metrů cenit, jest od ložiska okolo 250 metrů k spodku a asi 480 metrův až na vrch pásma  $e_1$ . Zhruba možno říci, že se ložisko objevuje v střední části pásma  $Ee_1$ .

### Nerosty pro ložisko Dobříčské významné

jsou některé památné. Nerostů vůbec dosti známo, pováží-li se jak málo ložisko vůbec otevřeno a prozkoumáno jest.

#### Nerosty v ložisku vtroušené.

Jsou to vlastně nerosty, z nichž se ložisko skládá, tedy **limonit tvrdý, hnědý**, který toliko velmi zřídka v zemité okr žlutý se mění. Potom zemité limonit nad ložiskem.

**Haematit** zemité i pevnější, v celku velmi podřízený, jak již podotknuto.

**Siderit**, pronikající rudu vůbec. V některých dutinách hnědé rudy, které nejsou jako obyčejně krystalky křemenu pokryty, objevují se hnědé klenče —  $\frac{1}{2}$  R, v limonit proměněného sideritu.

**Psilomelan** zemité, toliko podřízeně v ložisku ve visutém nalezen, jak již podotknuto.

**Křemen**, v žilkách prostupuje úplně ložisko, kteréž někdy výhradně z něho se skládá, nad rudu vlastní nesmírně převládá. Některé druzy krystalkové bývají hnědavé, an slabým nádechem limonitu potaženy jsou.<sup>31)</sup>

**Pyrit**, vtroušen zřídka bývá v hnědé rudě v malinkých hloučkách neb žilkách.

### Nerosty v žilách se objevující.

Jest to v první řadě zase **křemen** rudu prostupující.

V skulinách křemene bývá narostlý, někdy v jednotlivých krystalech neb druzách malých, **siderit** v ohybaných klenčích —  $\frac{1}{2} R$ , někdy šedožlutavých nezrušených, často ale hnědých, v limonit proměněných.

**Stilpnosiderit** tvoří někdy v puklinách slabé kory barvy smolně přihnědlé, lesku značného.

Též **psilomelan** potahuje trhlinky co slabý nádech tmavomodrý; tolikéž i limonit tvoří slabé nádechy barvy hnědé, zvlášť na krystalových druzách křemenu, nebo povláčky hnědé na povrchu, jež bývají ale černé na ostatní rudě.

**Pyrrhosiderit** co vzácnost nalezen v druzách křemene v malých, nanejvýše 2 mm. dlouhých, tenkých, silně rýhovaných hranolech, na nichž toliko tvary některého kolmého hranolu  $\in Pm$  a  $\in \bar{P} \infty$  se poznati mohly.

**Pyrit** v druzách v malých krychlich  $\in O \infty$  lesklých, ale toliko vzácně též se objevuje.

**Selenit** v malých plátkách štípatelných, narostlých v druzách.

### Nerosty okolních vrstev.

Zmíněno již, že v diabasů ležatém **calcit** bílý, průhledný až průsvitavý tvoří žíly až na prst široké. Tolikéž, že tufové, bezprostředně ložiska se dotýkající ležaté vrstvy, které prostoupeny bývají **limonitem** i **haematitem**, ještě hojněji ony z visutého v žlutou zemitou rudu se mění.

**Diadochit**, kuličky v šedé zkypřelé graptolitové břidlici tvořící, již nahoře popsán.

V žluté rudě ve visutém ložisku, jakož i v tufu visutém, zemitém, žlutou rudou úplně prostouplém, nalezeny vzácné malé shluky diadochitu velikosti až lískového ořechu s povrchem hroznovitě okulaceným, dosti pevné, lesku mdlého, lomu zemitého a barvy nečistě citronové.

Potažná váha určena s drobtý vybranými 6·21 grammů vážícími na vzduchu suchými.

Hutnota diadochitu v prvním okamžiku 2·3526 obnáší: po vyjití všech z něho vyvíjejících se hublin vzduchových, což teprve za den neb i později se děje, jest hutnota 2·4146.

Diadochit na vzduchu sušený tedy sestává dle objemu z 3·75% prázdných, vzduchem naplněných dutinek.

Rozbor od Jahna; diadochit x) sušen pod chloridem vápenatým až všecku hygroskopickou vodu potratil.

|                          | x)    |
|--------------------------|-------|
| Nerozpustný zbytek       | 11·16 |
| při 100°C unikající $HO$ | 2·28  |
| ostatní $HO$             | 14·30 |
| $Fe_2O_3$                | 34·54 |
| $PO_5$                   | 19·53 |
| $SO_3$                   | 17·90 |
|                          | 99·71 |

Kuličky měkké, až velikosti hrachu, barvy šedožluté, lomu zemitého, zarostlé v šedé břidlici graptolitové obsahují značné množství  $SO_3$  a též  $PO_5$ , jsou tedy též diadochitem.

V bělošedavé břidlici zkypřelé jsou co vzácnost ve visutém ložiska vrstle velmi stlačené kule, ččkám až na prst hrubým podobné, dle vrstevnatosti břidlic. Barva jich jest žlutavě šedozelená neb hnědozelenavá, lesk na lomu rovném neb nedokonale lasturovém jest slabý. V kyselině jsou snadno rozpustné a roztok obsahuje značné množství  $PO_5$  a  $SO_3$  jsou tedy též diadochitem.

**Delvauxit.** Ložisko jest vrženo na jednom místě o mnoho metrů rozsedinou, vyplněnou částečně žlutou zemitou rudou a šedavou jilovatou horninou měkkou. Mocnost žíly rozsedinové až 1 metr i více obnáší. V této žíle se objevuje zarostlý zemitý okr, též ale v jemné šedé jilovaté hornině, ale mnohem vzácněji delvauxit. Delvauxit tvoří v žíle spoře roztroušené závalečky velikosti hrachu, nejčastěji ale velikosti ořechu, vejce až pěsti; ba i závalky velikosti hlavy se objevily, ale toliko velmi pořádku.

Tvary závalků jsou shluky kulovité, vejčité, bambulovité, smáčknuté, ledvinovité s povrchem hrubě hroznovitým a potaženým slaboučkou korou sytě žlutou, zemitou a barvící při nejslabším dotknutí.

Rozbit, roztrhává se delvauxit snadno lomem nedokonale lasturovým, až nerovným. Nedokonale lasturový lom objevuje se v delvauxitech barvy tmavomodrové neb tmavokaštanové, jimž též lesk smolný vlastním jest. Lom nerovný slabě lesklý, celistvý obyčejně přináležejí odrůdám světle kaštanové neb jen hnědě zbarveným.

Delvauxit, jakmile nalezen zarostlý, jest dosti trvanlivý: za krátký čas ale, jmenovitě na slunci za překrátký čas několika hodin, počíná povrch odpryskávati vždy hloub a hlouběji a delvauxit drolí se z prvku v samé čtvercové drobty, které opět v menší drobečky se rozpadávají. Zvláště rychle děje se rozpadávání delvauxitu na vzduchu, když nerost žaru slunečnímu i dešti podléhá. Trochu déle vytrvají v své podobě odrůdy světleji zbarvené, ač i tyto témuž osudu jako ony tmavě zbarvené konečně podrobeny jsou. Rozpadávání souvisí se ztrátou hygroskopické vody, kteréž čerstvý delvauxit až více než jednu čtvrtinu vlastní váhy obsahuje a kterou na vzduchu znenáhla ztrácí.

Potažná váha prášku delvauxitového barvy tmavomodrové, prostého všeho vzduchu, nalezena s 1·45 grammy, 1·9404; jiný kus, též co prášek bezvzdušný vážen, měl v množství 3·80 grammů hutnotu 1·9240; však prost hygroskopické vody, tedy vysušen pod chloridem vápenatým, měl hutnoty 2·7057.

Kromě těchto okulacených celistvých delvauxitů objevují se kulovité kusy s povrchem hrubě hroznovitým, které sestávají z žlutého zemitého, rudě železné podobného nerostu, obklopené buď jedinou slabou vrstvičkou delvauxitu barvy

tmavolevínové, nebo v kteréž několik vrstviček delvauxitových se soustředně objímá. Při pohledu na tyto takřka nedohotovené závalky se mimoděk namane myšlénka, jakoby to snad přírodou ještě nedohotovené delvauxitové závalky byly.

V některém delvauxitu, třeba jako v onom zde pod g) analysovaném, jako malá pěst velkém, jest pod korou, asi na prst hrubou, lesku smolného, barvy tmavolevínové, lomu nedokonale lasturového, dutina vyplněna zemitým, sytě žlutohnědávým, kyprým práškem, barvivým na prvý omak, který jsa rozpukán, není přece od kory delvauxitové odloučen ostře, nýbrž přechází znenáhla v ni úplně. Kora tmavolevínová pod znakem g) látky 1·26 grammů (Jos. Zahradník), jádro žlutohnědavé zemité pod h) Jos. Burger analysována jest.

Menší kule delvauxitu i) měla hutnoty 1·9240, však vysušené kousky pod chloridem vápenatým daly 2·7057 (s množstvím 3·86 grammů) částečný rozbor od dr. Gust. Müllera. Z nerostu v kyselině solné rozpuštěného vyloučilo se velmi mnoho kyseliny křemičité.

|                         | g)     | h)     | i)   |
|-------------------------|--------|--------|------|
| Voda hygroskopická      | 13·97  | 6·09   |      |
| nerozpustný zbytek      |        | 1·59   |      |
| rozpustná $SiO_2$       | 3·96   | ·29    | 7·26 |
| při 100° unikající $HO$ | 8·70   | 4·06   |      |
| ostatní $HO$            | 19·96  | 21·64  |      |
| $Fe_2O_3$               | 40·51  | 44·97  |      |
| $CaO$                   | 6·38   | 8·82   |      |
| $MgO$                   | ·11    | 1·46   |      |
| $KO, NaO$               | ·31    | ·56    |      |
| $PO_5$                  | 20·03  | 16·89  |      |
| $SO_3$                  | ·48    | ·58    | ·24  |
|                         | 100·44 | 100·86 |      |

Z tohoto rozboru patrné, jak v jediném kuse se mění s rozličnou barvou a skupenstvím pevným neb zemitým i složení. Že pevný delvauxit více hygroskopické vody obsahuje než vnitřek zemitý, snadno tím se vysvětluje, že zemitý snadněji vysychá celistvého.

Delvauxit velikosti rozplácnutého většího jablka, barvy hnědé, lomu nerovného, lesku mdlého, pevnější předešlého analysován: k) Jos. Novák

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Voda hygroskopická chloridem vápenatým pohlcená | 12·2   |
| nerozpustný zbytek                              | 0      |
| rozpustná $SiO_2$                               | 2·60   |
| při 100° C unikající $HO$                       | 4·24   |
| ostatní $HO$                                    | 20·48  |
| $Fe_2O_3$                                       | 31·96  |
| $CaO$                                           | 4·21   |
| $MgO$                                           | ·28    |
| $KO, NaO$                                       | 1·33   |
| $PO_5$                                          | 28·89  |
| $SO_3$                                          | 6·55   |
|                                                 | 100·54 |

Z tohoto rozboru vysvítá, že analysovaný delvauxit jest vlastně směsí delvauxitu s diadochitem, jelikož obsahuje více kyseliny sírové, než delvauxitu vůbec do složení příuáleží a méně vápna než delvauxit vyžaduje.

Jestli že všechny ostatní světleji zbarvené, tedy hnědé delvauxity, lesku mdlého obsahují též přimíšený diadochit, jak z této analýzy s jistotou vysvítá, tedy by se tím snadno vysvětloval úkaz, proč světleji zbarvené delvauxity volněji se na suchém vzduchu drobí než tmavokaštanové s leskem smolným, an vůbec diadochit na vzduchu, byť i suchém, dosti dlouho se nerozpadává.

Povrch zemitý a přesnadno při dotknutí barvící, barvy sytě žlutohnědavé, pokrývající delvauxit v tenké vrstvě asi  $\frac{3}{4}$  mm. mocné, sestávající z přetenkých, as  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  milimétru slabých, jiných, na sebe přiléhajících vrstviček, analysován pod značkou 1):

K analýzi vzato 61 grammů; v kyselině solné snadno rozpustný zanechal po sobě toliko bílé chumáčky, vyloučivši se kyseliny křemenčité, ana částka jí rozpustná zůstala:

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Voda hygroskopická pohlcená chloridem vápenatým | 5·14   |
| Vyloučená z roztoku $SiO_2$                     | 2·64   |
| rozpustná $SiO_2$                               | ·34    |
| ztráta $HO$ při 100° C                          | 2·96   |
| ostatní $HO$                                    | 14·27  |
| $Fe_2O_3$                                       | 74·06  |
| $CaO$                                           | 1·16   |
| $MgO$                                           | ·17    |
| $PO_5$                                          | 4·39   |
| $SO_3$                                          | ·11    |
|                                                 | 100·10 |

Žlutý, zemitý povrch delvauxitu jest tedy pouhý limonit, znečištěný toliko prostupujícím ho v nepatrném množství delvauxitem.

Aby se zjistilo, jaký vliv asi okolné hornině při tvoření se delvauxitu přičísti sluší, hledáno množství kyseliny fosforečné, obsažené v hornině rozsedliny vržení tvořící a v břidlici graptolitové bezprostředně na rudě ležící. A sice obsahoval:

Žlutý zrušený tuf diabasový z ležatého rudy, z jednoho boku ve vržení vzatý, v kterémž též v odtrhnutých kouskách vrostlý jest: Zkoušeno 2·42 grammy a nalezeno v tufu  $PO_5 = 25\%$ .

Žlutá zemitá ruda v rozsedlině, v níž hlavně delvauxit zarostlý, zkoušena s množstvím 3·52 grammů a obsahovala  $PO_5 = 46\%$ .

Bělošedavá břidlice vrstevnatá z visutého ložiska; vzato k zkoušce 3·46 grammů a obdrženo  $PO_5 = 07\%$ .

Šedavý tuf nevrstevnatý, pod zemí dosti povolný, tvořící též bezprostřední visuté nad rudou a sestávající snad z proměněných měkkých vrstev graptolitových; zkoušeno 3·85 grammů a nalezeno  $PO_5 = 02\%$ .

Z toho patrno, že hlavní zdroj kyseliny fosforečné jest v hornině samé, vržení vyplňující; nápadná jest též poměrně dost velká bohatost ( $\frac{1}{4}\%$ ) tufu diabasového na kyselinu fosforečnou.

V Dobříčské štole jest vržení jediným místem, kde tak poučným způsobem naleziště delvauxitu otevřeno jest, a kde objevení se nerostu toho toliko výhradně v žíle se stopovat dá.

**Přehled všech nerostů v Dobříči nalezených.**

|    |                          | vrostlé<br>v rudě | narostlé<br>na rudě | v okolní hornině<br>vrostlé neb v žilách<br>ji protínajících |
|----|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Siderit . . . . .        | †                 | †                   |                                                              |
| 2  | Limonit . . . . .        | †                 | †                   |                                                              |
| 3  | Haematit . . . . .       | †                 |                     | †                                                            |
| 4  | Psilomelan . . . . .     | †                 | †                   |                                                              |
| 5  | Pyrrhosiderit . . . . .  |                   | †                   |                                                              |
| 6  | Stilpnosiderit . . . . . |                   | †                   |                                                              |
| 7  | Křemen , . . . . .       | †                 | †                   |                                                              |
| 8  | Calcit . . . . .         |                   |                     | †                                                            |
| 9  | Selenit . . . . .        |                   | †                   |                                                              |
| 10 | Diadochit . . . . .      |                   |                     | †                                                            |
| 11 | Delvauxit . . . . .      |                   |                     | †                                                            |
| 12 | Pyrit . . . . .          | †                 | †                   |                                                              |



## D. Rudy visuté části pásma $Ee_1$ .

**Otevření ložiska.** O ložisku Zbuzanském se vědomost nabyla toliko báňskou prací, ano nikde na den nevychází. Otevřeno je ložisko štolou „Zbuzanskou“.

Jihovýchodně od vsi Tachlovic jest Tachlovický mlýn, nazvaný „prostředním mlýnem“; od mlýna asi dvě stě kroků na východ jest zaražena štola na pozemcích obce Dobříčské v zrnitých vápencích pásma  $Ee_2$ , přeplněných v ústí štoly samými malými Rhynchonellami, články Enkrinitů jakož i Orthocery. Jelikož směr vrstev silurských, východně proti mlýnu Tachlovickému, jest sblíženě asi od západu k východu, štola sama ale v směru východo-východo-severním, tedy šikmo na směr vrstev hnána jest až na délku asi 530 metrů, než na rudu nerazila: tedy předěláno boky chodníku štolového celé visuté ložiska, počínaje od zrnitých vápenců pásma  $e_2$ .

Štolou ložisko otevřeno směrem dle rozprostírání jeho jak k východu tak k západu.

### Rozprostírání se rudy jakož i mocnost její.

*Délka ložiska* dle vlaku svého až k šesti stům metrům zjištěna, aniž by tím obou konců rudního ložiska, jak východního tak i západního, na kterých se úplně asi vyřezuje, bylo dostiženo bývalo.

### Rozprostírání se a mocnost ložiska.


Ložisko rozprostírá se asi od západních hranic Dobříčských, které se u mlýna prostředního v Tachlovicích s Tachlovickými hranicemi stýkají, směrem asi východním něco málo k severu se klonícím, až přes hranice Zbuzanské. Největší část ložiska dle vlaku svého tedy v obci Dobříčské, a toliko jen východní kraj jeho v obci Zbuzanské uložen jest.

Jakoliv největší část ložiska v obci Dobříčské a jen východní cíp jeho v Zbuzanské uložen jest, nazývá se nicméně ložisko „Zbuzanským“ a štola „Zbuzanskou“, aby se ložisko toto rozeznalo od ložiska dříve popsaného „Dobříčského“.

*Střed* ložiska uložen v obci Dobříčské a sice mezi cestou z Dobříče do Chejnic vedoucí a mezi hranicemi Dobříčsko-Zbuzanskými na polích „v pískách“ zvaných v délce asi 350 metrů. Zde směr ložiska jest  $5^h$  a úklon jeho velmi příkrý k jihu. Úklon ložiska v této střední části od  $60^\circ$  až k  $90^\circ$  k jihu, však převládá příkrý

úklon na mnohých místech velice, ba na některých místech i velmi příkrý sklon na sever pozorován (obr. 9.).

Obr. 9.



Průřez směrem *OO* na mapě Tab. I. skrz šachtu č. I. od severu k jihu, kdež ložisko nejprůkrěji zapadá v rozdrcených tufech diabasových jak v ležatém tak ve visutém.

Mocnost ložiska v těchto středních místech od 4 až k  $5\frac{1}{2}$  metrům se měnila, umenšujíc se neustále jak na východ, (přes hranice Zbuzanské) tak i na západ (přes cestu z Dobříče do Chejnice). Rozprostírání ložiska není v jediném směru dle vlaku; nýbrž v celé délce ložiska, takřka krok za krokem, objevena malá vržení, kterými ložisko o něco málo ze svého směru posunuto jest. Vrženými se vysvětlí měnící se úklon ložiska jakož i to, že na některých místech ložisko překlopeno na sever se kloní.

Čím dále od západních hranic Zbuzanských ložisko k východu sledováno bylo, tím více ubývalo mu mocnosti, kteráž v tomto východním *cípu ložiska* konečně až na 1 metr, ještě dále k východu na  $\frac{1}{3}$  metru i méně v mocnosti zesláblo, až dále dle vlaku svého sledováno nebylo. Zdá se, že v dalším rozprostírání svém při ubývající mocnosti ložisko úplně se vytratí.

Tento východní *cíp* táhne se od hranic západních Zbuzanských, zprvu směrem  $5^h$  později asi  $5^h 10^o$ , až k cestě z Mírešic do Chejnice pod Zbuzanskými pozemky „u studánky“ zvanými. Sklon k jihu tentýž jako v střední části ložiska; ložisko přesto posunuto vrženými, z nichž největší asi o 20 metrů ve vodorovném směru ložisko odtrhuje.

Čím dále od střední části ložiska na západ, tím nápadněji opět mocnosti ubývá, tak že západně od cesty z Dobříče do Chejnic mocnost v rychlém postupu klesá z čtyř metrů na  $2\frac{1}{2}$  metru a ještě níže, až konečně se umenší na  $\frac{1}{2}$  neb  $\frac{1}{4}$  metru. Dále na západ by zajisté ubývalo mocnosti ještě více, ložisko ale není dále sledováno; zajisté není v těchto místech ložisko daleko svého úplného vytracení, nebo na stráni od Tachlovické stodoly, „pivovárem“ zvané, podél levého břehu Radotínského potoka až k Zbuzanské štole se táhnoucí, by mělo výchozí ložiska sblíženě v těch místech se objevit, kde potok vtéká do rybníka u prostředního mlýna: na těchto místech hledáno ložisko, písmeno *l* na průřezu Tab. II., obr. 2., aniž by se bylo objevilo. To na důkaz toho, že i k západu ložisko se úplně vytrácí. Vlak *západního cípu* ložiska přechází ze směru  $5^h$  čím dále k západu směrem  $5^h 10^o$  až v směr  $6^h 12^o$ . Úklonu ložiska na polední stranu ubývá od východu k západu od  $60^o$  až asi do  $35^o$  ba místy ještě o něco málo méně. Též některá větší vržení odtrhují ložisko na mnoho metrů v směru vodorovném. V nejzápadnější známé části tohoto západního cípu ložiska objevily se ve visutém ložiska Zbuzanského asi 2 až 3 ložiska slabá, ve vzdálenostech asi 6 až 10 metrů se střídající, jejichž mocnost ale toliko  $\frac{1}{10}$  až  $\frac{1}{4}$  metru dosahovala.

*Výchozí* ložiska nikde není na dni patrné. Ložisko by sice mělo u rybníka nad prostředním mlýnem Tachlovickým asi 130 až 140 metrů severně od ústí štol v stráni vycházet, neobjeveno tam ale kutáním; tolikéž i v nejmocnější střední části ložiska neupomíná nic na výchozí ložiska, než toliko propadliny a kotliny

v polích Dobříčských na „pískách“, které směrem od západu k východu až asi k západním mezím pozemků Zbuzanských s Dobříčskými se sesadily.

### Ležaté a visuté ložiska Zbuzanského.

Ložisko, jak již zprvku připomenuto, leží v tufech diabasových, které jak v ležatém tak i ve visutém převládají a toliko velmi slabými vrstvami vápence sideritického prostoupeny jsou. Jak ležaté tak i visuté na levém břehu rybníka u Tachlovického mlýna dobře odkryty jsou.

**Ležaté ložiska** jsou vrstevnaté; velmi drobnozrnné až toliko drobnozrnné tufy diabasové, které na výchozím svém barvou hnědavě žlutou od ostatních jinak zbarvených vrstev na prvý pohled se liší. Do ležatého svého ukončují se tufy diabasové na slabém souvrství šedočernavého vrstevnatého vápence s hojnými, a pro pásma e, význačnými skamenělinami, jak již dříve podotknuto, jehož nejvisutější vrstvy jsou též na polo tufovitě a vápenné.

Zrno tufů diabasových jest v rozličných vrstvách rozličné a střídají se vrstvy s tufy zrnitými beze všeho pořádku s tufy jemnozrnnými.

Vlastní povaha tufů diabasových poznává se toliko ve vrstvách podzemních nezkrpělých a neporušených. Barva tufů, hlouběji pod zemským povrchem uložených jest špinavě zelenavošedá; vrstevnatost jejich nad míru dobře vyznačená, any se jednotlivé vrstvy dle rozličných odstínů barevných dobře různí a jmenovitě zrno jejich jest nápadné.

Kdežto odrůdy jemnozrnité jsou vesměs stejnobarevné, odchylují se od nich odrůdy zrnité vesměs kropenaté, any částčky nelesklého, zemitě mdlého zelenavošedého tufu jsou obstoupeny žilkami bílého, čistého calcitu lesknoucího se na plochách štípatelných. Na pohled podobá se kropenatost i barva tohoto zrnitého tufu co do barvy, i rozdělení kropenatosti, zbarvení ropuchy (*Bufo cinereus* Schneider, neb *Rana bufo* Linné zvané) proto se také „žabákem“ nazývá.

Vrstevnatost žabáku převyšuje jemnou vrstevnatost drobnozrnných tufů stejnobarevných o mnoho.

Na výchozím se rozdílové tyto tratí v míře značné, nebo ani vrstevnatost hrubá se od vrstevnatosti jemné nerozeznává; též dvojbarevnost žabáku mizí před jednobarevností jemnějších tufů úplně proměnou v žlutohnědavou barvu, čímž zároveň se i zrnitý sloh nerozeznává zřetelně v zkypřených vrstvách.

Ve vrstvách tufů diabasových co převládající hornině objevují se vložené vrstvy vápencové v množství velepodřízeném.

Mocnost skutečných vrstev vápenných nedosahuje sice ani míry pod  $\frac{1}{2}$  decimetru, aniž převyšuje  $1\frac{1}{2}$  decimetru značně. Ne všechny ve vrstvách uložené vápence jsou nepřetržené vrstevnaté; valná část jich se dá porovnat ku kratounkým vrstvám, nebo k převelice táhlým ččkám, kteréžto jak dle úklonu, tak i dle vlaku svého často se úplně vyklinují, by buď zmizíce, naprosto se vytratily z vrstev tufových, aneb opět nasadíce, dále se vlékly. Zmizí-li někde táhlá vrstva vápencová, nastupuje zase na jiných místech do vrstev tufových jiná táhlá ččka vápencová.

Barva vrstev vápenných na výchozím je žlutá na povrchu až do jisté hloubky a sestává žlutý okraj z nečistého limonitu na důkaz toho, že vápenec jest značně

sideritický. Některé vrstvy, zvláště ale ony blíže vlastního ložiska jsou bohatší na uhličitán železnatý, jelikož na výchozím, na svém povrchu zřejměji v limonit, co proměnu sideritického vápence, proměněny jsou, než jiné.

Barva vápence jest šedá neb světle šedá a vnitřek vrstev slohu celistvého neb jemně zrnitého.

Co se týče **visutého**, tož se toto neliší valně od ležatého, leda tím, že v celku převládají jemněji vrstevnaté, a tudíž jemnozrné a velmi jemnozrné tufy diabasové. V tufech opět se objevují co podřízené vrstvy, velmi táhlé čocky vápence té samé mocnosti jako ony v ležatém, a vůbec ničím od nich se nerozeznávající. Barva tufů opět na výchozím žlutohnědá, barva vápenců žlutavá, uvnitř ale šedá.

Pod zemí jsou tufy diabasové šedé neb šedozelenavé, žabáky v nich vele-vzácné. Zvláště velice jemnozrné jsou tufy bezprostředně ve visutém ložiska, a neobjevují se v nich vrstvy vápencové, až do jisté vzdálenosti do visutého, nižádné. Některé vrstvičky těchto visutých tufů bývají někdy tak převelmi jemňounké, že se jílu úplně podobají, zvláště když barva jejich se v bělavou nebo rudou mění, jak se to zřídka též stává.

Na vzduchu samy sobě ponechány, rozpadávají se na slunci za kraťoučký čas, zvláště navlhly-li dříve deštěm v hlínu, vodu nepropouštějící.

Byly-li vrstvičky hlinovatých tufů diabasových rozsedinami neb vrženými dosti nepatrnými posunuty, a zvlhly-li vodou dolovou, která do rozsedin tržením a vržením povstalých, snadného přístupu má, tu nabubříce a nabotnajíce potratily vrstevnatosti své a vnikly do všech sebe menších, vržením povstalých rozsedin. Proto také ložisko rudní, kde velice vrženými, byť by toliko nepatrnými, ve svém uložení původním jako rozcucháno bylo, mívá ve visutém svém přeroličně změněné, světlé, bělavé jíly nevrstevnaté jako v plástvích na visutém ložiska přilepené, do kterých se jemnozrné tufy nabotnáním a zvlhnutím shnětly.

Jemnozrné tufy toliko bezprostředně nad nevrženými částmi ložiska dobře vrstevnatě uloženy jsou.

V některých částech vrstev jemnozrných tufů bývají vtroušeny zrnéčka i větší zrnka sideritu, proměňující některé vrstvičky, ovšem ne mocné, v tuf úplně zrnéčky sideritickými prostoupený, který, když by sideritová zrnka převládala nad základní hmotou šedozelenavého tufu, by se sideritovou nečistou rudou nazvat mohl.

Napřed, při rozprostírání ložiska připomenuto, že u jeho západního konce bylo několik vrstviček rudních objeveno; tyto rudní vrstvičky sestávaly z největší části z takových vrstviček tufových, zrnéčky sideritovými bohatě prostoupených.

V dolu samém se takové bohaté vrstevky toliko tíží svou poznávají, jelikož světlá barva vtroušených zrnéček sideritu se od světle šedozelenavé barvy ostatní vrstevní hmoty, jakož i ostatních vrstev tufových nesnadno rozeznává; na vzduchu ale, zvláště po několikrát sobě dešti, nahnědne-li siderit trochu, rozeznává se snadno vedlé vtroušených tufových částek barvy světle šedozelenavé.

Že i vypálením v ohni se takové vrstvičky co rudní poznají, snadno se pochopí. — Důležitosti však co ruda vrstvičky sideritického tufu nemají pro svou spornost, jakož i svou nepatrnou mocnost.

V dalším visutém zase se vyskytují ve vrstvách tufových podřízené vrstvy vápence sideritického, šedého, mocnosti též jako vrstvy a čocky táhlé v ležatém.

Mocnost celého visutého souvrství, sestávajícího z tufů převládajících s podřízenými čočkami a vrstvami vápence sideritického, až k vrstvám hrubozrnného šedavého vápence pásma  $Ee_2$ , od kterého ostře se dělí, obnáší asi 90 metrů (ve vodorovném směru ovšem více, asi 130 až 140 metrů).

Ležaté ložisko, odkryto toliko na dni u Tachlovického rybníka, v důlu málo proděláno bylo; za to ale celé visuté, mimo to, že na dni též odkryto jest, předěláno též štolou Zbuzanskou v směru šikmém a na jiném místě ve východní části ložiska též proděláno bylo.

Ve vrstvách a čočkách vápence šedého, uloženého v tufech diabasových visutých, nalezeny mnohé skameněliny krásně zachovalé v štole Zbuzanské. Nejhojnější z nich jest *Atrypa reticularis* Linné, v skořápkách od mladých i od dorostlých zvířat, *Leptaena funiculata* M' Coy krásně zachovalá, *Leptaena euglypha* Dalm., *Spirifer trapezoidalis* Dalm., *Rhynchonella* sp., *Atrypa* sp., *Phacops* sp., *Bronteus* sp., *Proetus* sp., *Dictyonema* sp., *Calamopora gotlandica* Lin., *Omphyma grandis* Barr., jiné korále a rozličné jiné skameněliny. Některé vrstvičky vápenců velmi tufovitých, barvy šedozelenavé, sestávají takřka ze samých skořápek, vápencem vyplněných a od *Atrypa reticularis* pocházejících.

Vápence zrnité z pásma  $Ee_1$ , uložené na tufech diabasových, které se vedle štoly Zbuzanské na pozemcích Dobříčských, potom jižně vedle vsi Tachlovic u železnice samé na pozemcích Tachlovických vesměs co přísada k tavení rud železných lámou, obsahují též hojné skameněliny, zvlášť ale na místě prvním, mezi nimi nejhojnější jsou: *Atrypa linguata* Buch., *Atrypa marginalis* Dalm., *Atrypa hircina* Barr., *Spirifer togatus* Barr., *Pentamerus caducus* Barr., *Pentamerus simplex* Barr., *Pentamerus Knighti* Sov., *Orthis pecten* Davids., *Gomphoceras* sp., *Cyrtoceras* sp., *Orthoceras* sp., *Phacops fecundus* var. *communis* Barr., *Calymene Baylei* Barr., *Cheirurus Quenstedti* Barr., články od encrinitů a jiné.

### Ložisko Zbuzanské.

#### Složivo ložiska.

Vlastní ložisko rudní skládá se z největší části své, zvlášť ve svém středu, kde nejmocněji vyvinuté jest, ze *sideritického vápence*.

Veliká část, a možno snad s velikou pravděpodobností říci, že největší část ložiska vápencového sestává z vlastní *sákladní hmoty* vápencové s převelikým množstvím *skamenělin*, zvlášť brachiopodů, přeplněné.

#### Mineralogické popsání rudy.

*Sideritický vápenec* základní hmoty, kterého ve valné části ložiska méně jest než skamenělin jím zaobalených, jest celistvý, barvy špinavě šedohnědé, jen sem a tam od bílých proužků rozbitých skořápek skamenělin, z čistého vápence sestávajících, bělavý.

Potažná váha základní hmoty obdržená s množstvím 4·16 grammů jest 3·1135.

Již z toho vychází na jevo, že vápenec je značně sideritický, nebo vezme-li

se za to, že by vápenec tento toliko z čistého calcitu  $\text{CaO CO}_2$ , a z čistého sideritu  $\text{Fe CO}_2$  se skládal, a že potažná váha calcitu = 2·7 a váha sideritu = 3·8; tedy se vypočítati dá, že by se skládat měl z 62 % calcitu

a 38 % sideritu, nebo že by poměr calcitu k sideritu v něm byl sblíženě  $= \frac{3}{4}$ , ovšem s podmínkou, že by se vápenec toliko z uhličitanu vápenatého a uhličitanu železnatého skládal.

Lučební rozbor ovšem vše jasněji vysvětluje:

K rozboru vzato množství a): látky 2·94 grammů, rozbor dělal Josef Zahradník.

množství b): látky 48 grammů, rozbor od Ferd. Jičínského.

Základní hmota byla dobře vybrána a prosta všeho čistého vápence, pocházejícího ze skořápek skamenělých.

Vlhkosti, vody, která při 100° C prchá, obsahoval na vzduchu sušený sideritický vápenec a: 95 % b: 54 %.

| Rozbor vztahuje se na látku při 100° C. sušenou | a)       | b)    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| V kyselině solné (HCl) nerozpustný zbytek       | 5·77     | 6·76  |
| $\text{CO}_2$                                   | 30·70    | 29·52 |
| $\text{FeO}$                                    | 26·40    | 30·06 |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$                         | 3·30     | 3·67  |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$                         | 5·55     | 1·31  |
| $\text{CaO}$                                    | 22·83    | 21·85 |
| $\text{MgO}$                                    | 1·26     | 1·26  |
| $\text{KO}, \text{NaO}$                         | 1·78     | 1·78  |
| $\text{HO}$                                     | 1·42     | ·65   |
| $\text{SO}_3$                                   | sledy    | ·11   |
| $\text{PO}_3$                                   | 0        | sledy |
| ústrojně látky:                                 | neurčeno | 2·47  |
|                                                 | 99·01    | 99·44 |

Vypočte-li se poměr uhličitanů ve vápenci obsažených z kyseliny uhličité rozbořem určené, obdrží se následující poměr:

| Základní hmota vápencová sestává v               | a)                                                                                                                                               | b) z:                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nerozpustné látky a neuhličitanů 17·82 . . . . . | 17·82                                                                                                                                            | 16·75 . . 16·75                                                       |
| Uhličitanů 81·19 a sice                          | $\left\{ \begin{array}{l} \text{FeO CO}_2 \text{ } 37·94 \\ \text{CaO CO}_2 \text{ } 40·62 \\ \text{MgO CO}_2 \text{ } 2·63 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} 41·64 \\ 82·69 \\ 2·63 \end{array} \right.$ |
|                                                  | 99·01                                                                                                                                            | 99·44                                                                 |

Ve vápenci bylo by asi stejně mnoho uhličitanu železnatého jako uhličitanu vápenatého.

V této základní hmotě je převeliké množství *skamenělin* nahromaděno a soudí-li se na poměr skamenělinami zajmuté hmoty k hmotě šedého celistvého vápence, v kterém otisky zarostlé jsou; tož zajisté převyšuje množství skamenělin základní hmotu vápencovou o mnoho.

Skameněliny obsažené ve vápenci jsou následující:

Více všech ostatních jest *Atrypa reticularis* Linn. v mladých i dorostlých skořepinách; velmi hojně jsou *Atrypa ypsilon* Barr. a články encrinitů. Mimo tyto nejobyčejnější objevují se *Spirifer togatus* Barr. a *Spirifer trapezoidalis* Dalm. Vzácné jsou orthocery jakož i polypy.

Toliko porouchané skořápky jsou uvnitř vyplněné vniklou do nich hmotou šedohnědého vápence. Zcela uzavřené zbytky zvířat, sestávají z velmi hrubozrnného ve velké plochy se štípajícího vápence bílého, který se od skořápky, sestávající z drobnozrnného vápence liší. Vápenec čistý, buď samojedině vyplňuje dutinu skořápek, nebo se vedle něho též objevují hrubozrnné štípatelné kousky sideritu barvy nahnědlé; některé brachyopody pak bývají uvnitř kolem vápencové skořápky vyplněny vrstvou sideritu velmi hrubozrnného a střed sestává z vápence bílého. Siderit tu tedy starším vyplněním bývalé duté skořápky, an se toliko na vnitřní stěně usazen objevuje. Mimo to v některých mušlích sestává střed z válců, nebo se tato uhelná látka v tenkých žilkách ve vápenci objevuje.

Články crinoidové na pohled různí se od ostatních skamenělin tím, že sestávají z vápence mnohem hrubozrnnějšího; nebo štěpné plochy při rozbití článku povstaly jsou mnohem větší plochy štěpných vápence ostatních skamenělin; některé toliko z jediného jednotlivce vápence sestávají, an směr štěpných ploch toliko ve třech směrech, klenčí přínaležejících se beze všeho přerušení objevuje. Dutá roura článku vyplněna celistvým šedohnědým vápencem.

Potažná váha hrubozrnného bílého vápence skládajícího skameněliny, určena množstvím 3·68 grammů a nalezena 2·7130. Vápenec pocházel z větší části z *Atrypa reticularis* a z menší z *Atrypa ypsilon*. Z potažné váhy možno soudit, že vápenec dosti čistý jest.

Vybrané kousky vápence, v nichž ony z *Atrypa reticularis* převládaly značně nad oněmi z *At. ypsilon*, byly analysovány; každá analýza s jinými kousky podniknuta:

Rozbor a) (Frant Farský) sdělán s 907 látky, vlhkost při 100°C prchající = 28 %.

Rozbor b) (Jan Vonka) látky 779, vlhkost při 100°C je 24 %.

Rozbor c) (Sojka).

Analýzy se na látku při 100°C sušenou vyrozumívají:

|                                | a     | b     | c     |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Nerozpustného zbytku           | 1·56  | ·65   | ·86   |
| CO <sub>2</sub>                | 39·08 | 39·44 | 40·69 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 4·03  | 3·04  | 1·14  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ·04   | ·85   | ·35   |
| FeO                            | 3·50  | 3·04  | 2·13  |
| MnO                            |       |       | sledy |
| CaO                            | 49·72 | 50·52 | 51·78 |
| MgO                            | ·64   | ·64   | ·43   |
| KO, NaO                        | sledy | sledy | 1·50  |
| HO                             | 1·07  | 1·01  | ·30   |
| SO <sub>3</sub>                | ·31   | ·35   | ·09   |
| PO <sub>3</sub>                | sledy | sledy | sledy |
| ústrojná látka                 | 0     | 0     | ·63   |
|                                | 99·45 | 99·54 | 99·80 |

Vápenec tyto sestávají tedy, přepočtou-li se na uhličitany analýsy z:

|                       | a)                                                                                                       | b)                                                                   | c)                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Látek mimo uhličitany | 7·01 . . . . . 7·01                                                                                      | 5·90                                                                 | 4·87                                                                     |
| Uhličitany            | 92·44                                                                                                    | 93·64                                                                | 94·93                                                                    |
|                       | $\left\{ \begin{array}{l} FeO\ CO_2 = 2·19 \\ CaO\ CO_2 = 88·91 \\ MgO\ CO_2 = 1·34 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} 2·09 \\ 90·21 \\ 1·34 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} 1·60 \\ 92·43 \\ \cdot 90 \end{array} \right.$ |
|                       | 99·45                                                                                                    | 99·45                                                                | 99·80                                                                    |

Jiný vápenec ze skamenělín brachiopodů (*Atrypa*), který byl pomíšen vtroušeným sideritem: d) (Jos. Zafouk).

Analýsa vztahující se na látku při 100° C sušenou jest:

|                      | d)    |
|----------------------|-------|
| Zbytku nerozpustného | 4·25  |
| $CO_2$               | 30·06 |
| $Al_2O_3$            | 14·25 |
| $Fe_2O_3$            | ·56   |
| $FeO$                | 23·58 |
| $CaO$                | 18·35 |
| $MgO$                | 1·12  |
| $KO, NaO$            | 2·71  |
| $H_2O$               | ·20   |
| ústrojné látky       | 2·05  |
| ostatek neurčen      |       |
|                      | 97·13 |

Vypočtou-li se tedy opět uhličitany z rozboru, sestával by vápenec d) z:

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Látek mimo uhličitany | 24·02 . . . . . 24·02                                                                                     |
| uhličitany            | 73·11                                                                                                     |
|                       | $\left\{ \begin{array}{l} FeO\ CO_2 = 37·99 \\ CaO\ CO_2 = 32·77 \\ MgO\ CO_2 = 2·35 \end{array} \right.$ |
|                       | 97·13                                                                                                     |

V tomto právě vypsaném sideritickém vápenci s přehojnými skamenělinami, který z největší části ložisko rudní skládá, se objevují ještě jiné rudy co velmi podřízené složivo v ložisku; a sice vápenec krevelem neb haematitem prostoupený, ocelek nebo siderit a hnědel nebo limonit.

### Popsání složiva ložiska.

1. Na některých místech v ložisku přechází část vrstvy vápence ložisko skládajícího se z *vápenec* nebo *siderit haematitem* úplně prostoupený.

Přechod jest buď dosti náhlý, a haematitem na rudo zbarvený vápenec sideritický, nebo sám siderit odstupuje sice dosti náhle, ne ale velmi přikře od ostatního vápence. Skameněliny nevymizely a bílé oblé proužky naznačují v rudém vápenci zbytky skořápek rozbitých, nejsou-li v něm vedle nich, též bílá vápencová jádra vtroušená. Převládá-li základní hmota sideritu neb sideritického vápence haematitem na rudo úplně zbarvená, podobá se ruda taková, sama v sobě bohatá, na první pohled mnohým rudým křemenům drobnozrnným neb celistvým (jaspisům).



Není-li přechod do této rudy náhlý, tedy se vyskytují ve vápenci malé skvrnky zarostlé, které sestávají ze sideritu rudého, úplně haematitem prostouplého; též vápenec bílý přistupuje do rudy a směs šedého vápence, s rudým celistvým sideritem, protkaná bílými hloučky neb žilečkami vápence jest zvláštní pestrá rudou a tím pestřejší, jestliže též skameněliny v ní v hojnější míře se vyskytují.

Jak již podotknuto, jest tato ruda, haematitem a sideritem zbarvena, toliko v malých závalcích a částkách v ložisku vápence uložena.

2. Nezřídka se změnilo ložisko vápence sideritického náhlým postupem úplně do tvrdého šedohnědého *sideritu* zcela, aneb jen v jistých, s vrstevnatostí dosti zárovných směrech. Obvykle se v sideritu všechny skameněliny vytrácejí úplně. Siderit jest značně pevný, hrubo až dosti jemnozrný, velmi čistý a dutinatý, neboť netvoří jedině pevné ložisko. Tak náhle jak ložisko někdy buď zcela se v siderit proměnilo, nebo pruhy sideritovými prostoupeno bylo, tak rychlým postupem zase mizí někdy všechen siderit opět z něho.

3. Přechod do *limonitu*, křemenem prostouplého toliko na jednom místě se objevuje. V ložisku vápence, nebo v siderit proměněného vápence, vyskytne se náhle plást tohoto limonitu, který ve všech směrech tak rychlým postupem mohutní, že vytlačí úplně ložisko, v němž se objevil, a skládá sám o sobě celou mocnost jeho.

Limonit jest celistvý, barvy tmavohnědé, velmi tvrdý a sideritem, jakož i křemenem úplně proniknut. Potažná váha hnědého limonitu, nalezena z 3·55 grammů, jest 3·9381. Ani siderit, ani křemen, limonit pronikající pouhým okem se nerozeznávají a toliko lučebně zjištěno, čím proniknuta hmota limonitová. Limonit jest veskrz malíčkými nepravidelnými skulinkami jako natrhán; skulinky jsou tenkou vrstvou krystalků křemenných, v druzy nahromaděných, povlečeny. Také bílý křemen vyplňuje kratičké, a jako žilky rozvětřující se skulinky, úplně. V některém limonitu ovšem jsou větší skuliny mocnější korou krystalů křemenných potaženy; někdy skuliny převládají jakož i křemen v nich povlak tvořící nad limonit značně.

Do některých, velmi křemenitých limonitů bývá též haematit co černá, lesklá, železná ruda přejemně vtroušen, ač též i křemel barvy tmavorudé míst do sloziva přistupuje.

Na první pohled není možno limonit křemenitý hnědý, jakož i haematitem černohnědě zbarvený od onoho z Dobříče nižádným způsobem rozeznat. I tíž potažnou se velice přibližují, nebo mají takorba tutěž hutnotu; kdežto Zbuzanský limonit má hutnoty 3·9381, má Dobříčský, jemu podobný, 4·0008.

Co ruda, jest křemennými povlaky silně potažený limonit ovšem nutný, ale onen, v němž křemen podřízen jest, co do množství jest ovšem lepší.

K oběma cípům jak k východnímu tak i k západnímu ubývá mohutnosti ložiska a také sideritický vápenec mění se v *tufový sideritický vápenec* barvy šedavozelené; tak to alespoň k západní straně je vyvinuté; k východní straně zdá se, že snad ložisko se mění v pouhou vápencovou slabou vrstvu, ne mnoho sideritickou, jak to též ostatní vápencové vrstvy, v tufech diabasových v tomto pásmu, uložených, jsou.

Že ložisko Zbuzanské jest toliko ložiskem sideritického vápence, teprvé nedávno seznáno, když se ložisko pod štolou zkoušeti počalo.

### Proměna ložiska.

Proto že ložisko se skládá z vápence, velmi ocelkem prostoupeného, nemožno, by bez proměny až na den, tedy k výchozímu svému vystupovalo. Ložisko se mění čím výše k výchozímu, takovým způsobem, jako by z pouhého ocelku se skládalo; konečný zbytek, úplně proměněného ložiska, rušivým účinkem vody a vzduchu, jest hnědá železná ruda, limonit. Proměna v limonit tím úplnější v oněch částech ložiska, čím mělčeji tyto pod povrchem zemským uloženy.

1. Prvý počátek proměny ložiska jeví se tím, že ložisko pevného, hustého, sideritického vápence jaksi nepatrně zkypří. Nejprvé nejčistší vápenec, skládající skořápky skamenělin, se počne proměňovat: skořápky zbělí co křída a zkypří se trochu; po té se zkypří a zbělí nemnoho vápenec skamenělin, počínaje od povrchu do vnitř, až konečně i jádro vápencové, nejdelší čas neporušené, se též zkypří, zbělají. V ložisku, v němž proměna pokročila, vytrácejí se skořápky lastur a vápencové částky článků Crinoidových, po kterých zbyde toliko oblá dutina naznačující místo, kde rozdrčená skořápka zarostlá byla; neb zkypřelé jádro bílé, co písek přejemný, se drobící, sestávalo-li původně z bílého vápence. Jádra, která náhodou z vápence sideritického sestávala, podržují podobu svou delší čas ukazující otisk vnitřní strany skořápky, kteráž u brachyopodů tak nápadně od zevnějšku se liší; kdežto vápenec hmoty základní, jenž též trochu méně hustý jest, než předešle byl, zevnější otisk skořápky ukazuje.

Úplně rozložená jádra vápencových skamenělin neb články Crinoidové, v přejemný písek šedavý se drolící, sestávají dle všeobecného rozboru lučebního, ke kterému vzaty drolící se pozůstalé zbytky jader od *Atrypa reticularis* a od článků Crinoidů:

Písek přejemný šedavý sušen při 100°C obsahoval:

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| V kyselině chlorovodíkové nerozpustného zbytku                                        | 14.79  |
| <i>CaO</i>                                                                            | 28.59  |
| <i>FeO</i>                                                                            | 19.33  |
| <i>MgO</i>                                                                            | 1.69   |
| ostatek neurčen a sestává hlavně z <i>CO</i> <sub>2</sub> , a něco <i>HO</i> a jiných | 35.60  |
|                                                                                       | 100.00 |

Zásady jsou až na nepatrnou část co uhličitany v sloučenství obsaženy a přepočítají-li se na uhličitany, pomíjejíc malou chybu, povstalou tím, že něco málo zásad též v roztoku je, které nebyly na uhličitou kyselinu vázány, obdrží se pro složení přejemného písku též:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nerozpustný zbytek         | 14.79   |
| <i>FeO CO</i> <sub>2</sub> | 31.78   |
| <i>CaO CO</i> <sub>2</sub> | 51.43   |
| <i>MgO CO</i> <sub>2</sub> | 3.56    |
|                            | 101.56, |

což dosti dobře pro tak všeobecnou analýsi souhlasí.

Přeseček se skládá pod drobnohledem ze samých malých klenčů základních, + *R*.

Vápenec základní hmoty zkypřel a ztratil část uhličitanu vápenatého, stal se tedy bohatším na uhličitan železnatý.

Dalším postupem proměny se konečné všechna jádra po skamenělinách úplně vytratí, zanechávajíce po sobě ve vápenci sideritickém, sprvku základní hmotu tvořící, a proměnou v siderit přeměněném, toliko oplesky svých povrchu. Z článků Crinoidových zbyde toliko bývalá dutá roura stát co roubík sideritový, kolem kterého malé kroužky po bývalém spoji článků vystupují.

Toliko ona jádra, která se pod skořápkou ze sideritu skládala, ve středu ale z calcitu složena byla, zůstávají neporušena a jsou uvnitř jen dutá po vymizelém vápenci. Aby též vnitřní ramena brachyopodů tímto postupem rozkladu se objevila, nenáleží sice mezi nemožnosti, jest ale nicméně převzácné, jelikož ramena tak jako skořápky v nejčistší vápenec skamenělá bývají — a nejčistší calcit nejprvnější jest, který rušením se vytrácí.

Výsledek této proměny jest ten, že sideritický vápenec s hojnými skamenělinami se promění v siderit dřkovatý, lehky dle váhy, jelikož místo skamenělin obsahuje toliko dutiny.

Siderit šedohnědý, kyprý a s dutými otisky skamenělin zrušených, ve všech dutinách posetý malými krystalky pyritu, obsahoval vlhkosti při 100° C prchající 25%.

Analýsa vztahuje se na nerost při 100° C sušený:

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Nerozpustné zbylo v <i>HCl</i>          | 5.36  |
| Rozpustná <i>SiO<sub>2</sub></i>        | .12   |
| <i>CO<sub>2</sub></i>                   | 30.24 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>      | 5.63  |
| <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>      | 1.64  |
| <i>FeO</i>                              | 43.85 |
| <i>CaO</i>                              | 2.11  |
| <i>MgO</i>                              | 1.62  |
| <i>KO, NaO</i>                          | sledy |
| <i>HO</i>                               | .24   |
| <i>SO<sub>3</sub></i>                   | .57   |
| <i>PO<sub>3</sub></i>                   | .02   |
| ústrojně látky                          | 2.00  |
| Pyrit <i>FeS<sub>2</sub></i>   <i>S</i> | 2.49  |
| <i>Fe</i>                               | 2.17  |
|                                         | 98.15 |

Vyšetři-li se, mnoho-li uhličitanů v sideritu obsaženo jest, obdrží se následující:

|                                  |       |                           |       |
|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| V sideritu obsaženo neuhličitanů | 20.33 | . . . . .                 | 20.33 |
| Uhličitanů                       | 77.82 | <i>FeO CO<sub>2</sub></i> | 70.65 |
|                                  |       | <i>CaO CO<sub>2</sub></i> | 3.77  |
|                                  |       | <i>MgO CO<sub>2</sub></i> | 3.40  |
|                                  | 98.15 |                           | 98.15 |

Z toho jasně vysvítá, jakým způsobem se základní hmota vápence sideritického proměnila: z vápence vylouhován všecken uhličitán vápenatý až na nepatrnou část; zkypřený zbytek bez skamenělin vápenných, též vylouhovaných, sestává toliko z neporušeného uhličitánu železnatého, něco uhličitánu vápenatého a hořečnatého. Tím se v sideritu proměnou pozůstalém, ocelku, až mnohem více než 70%, tedy asi  $\frac{3}{4}$  uhličitánu železnatého nahromadilo. V přiloženém rozboru ovšem jest ocelku proto méně, že vzat k analýsi ocelek asi 5% pyritu obsahující, čímž množství ocelku o něco nižší jest ve 100 částích; ostatní ruda bez pyritu vykazuje asi o to větší část ocelku, oč pyritu schází.

2. Dutinatý a zkypřelý, nicméně ale dosti pevný siderit šedý jest v oněch částích ložiska, které se v jakési střední hloubce mezi vlastním výchozím a neporušenou hloubinou nacházejí, pokryt ve všech dutinách a skulinách zemitou, černohnědou rudou; čím výše k výchozímu, tím více zemité rudy přibývá, jejížto barva s přibývajícím množstvím v hnědou se mění. V jistých místech ložiska sestává velká část rudy z této hnědé zemité, v kteréž toliko malé tvrdší zbytky proměnou nahledaného sideritu zhnědlého neb zčernalého zaobaleny jsou.

Ve vlastním výchozím se objevuje toliko ruda hnědá nebo limonit barvy žlutohnědé, lesku mdlého, uvnitř zemitý a mnohem méně pevný než siderit. Dutiny po skamenělinách jsou v limonit proměněny; a to poslední proměna vápence sideritického v zemitý limonit, rudu vlastně „Zbuzanskou“, jak vůbec známá jest pod tímto jménem.

Podřízeně v ložisku se vyskytující vápence haematitem zbarvené, jakož i siderity husté, i hnědá ruda, křemenem prostouplá, též se proměnily na výchozím, nejméně ovšem se mohl proměnit pevný limonit křemennými žilkami prostouplý.

Vápence, které haematitem, neb sideritem, haematitem na rudo barveným, prostouplé jsou a jichž poměrně velmi málo, se úplně po vymizení všeho vápence ve velmi dutinatou zemitou rudu žlutou proměnily.

Siderity husté poněkud proměnou (podobným způsobem jako siderity od skamenělin dutinaté) zhnědly sprvku na povrchu svých velkých skulin a dutin, konečně úplně v pevnou, hnědou, velmi bohatou celistvou rudu přešly. Celistvý limonit ze sideritu proměnou povstalý se objevuje toliko jen na vlastním výchozím ložiska; nebo v té hloubce, v které siderit od skamenělin dutinatý již úplně v žlutohnědý limonit proměněn jest, jsou mocnější částky hustého sideritu, v kterých vůbec proměna poznenáhla se dělá, toliko na okrajích v celistvý limonit tvrdší proměněny, uvnitř ale chovají ještě dosti tvrdé jádro rušícího se sideritu.

Proměna sideritu v limonit se tím způsobem zprostředkuje, že za kyselinu uhličitou, která ze složiva vystupuje, voda v sloučení přistupuje, an se kyslíčník železnatý zároveň okysličuje v kyslíčník železitý. Proměna se znázorňuje takto:



Siderit + kyslík + voda = limonit + kyselina uhličitá.

Z tohoto vzorce vysvětluje se mnohý úkaz.

Počítají-li se rovnomocniny sideritu a proměnou z něho povstalého limonitu, rovná se 232 částí (dle váhy) sideritu 187 částím limonitu z něho povstalým. Jelikož ale proměněnému sideritu na objemu neubývá tak, jako na váze, musí být proměnou pozůstalý limonit kypřejší sideritu, čemuž skutečně tak.

Proměnou sideritu v limonit se uvolňuje kyselina uhličitá a kyslík vzduchu se ubírá.

V dolových pracích Zbuzanských se pozoruje, že v místech, v kterých proud větrů ochábl, světlo nehoří a že se vzduch, vyvíjející se kyselinou uhličitou, kazí. Úkaz ten pozoruje se nejen v stařinách, ale i v ložisku celistvém, posud nedotknutém. Že vyvíjení kyseliny uhličitě zajisté nepochází toliko ze dřeva, v stařinách vlhkých tlejícího, nýbrž jiného původu jest, to možno dle obdoby tím dokázat, že v jiných rudních báních i za slabšího přístupu větrů se ze stařin, podobně vlhkých a tolikéž dřívím naplněných, kyselina uhličitá v patrném množství nevyvíjí, a z ložisek nedotknutých a nově otevřených, byť by i vlhkých, ale nikdy nevychází.

Z toho možno soudit s velikou pravděpodobností, že proměna sideritu v limonit se ve Zbuzanském ložisku děje posud a snad rychlejším ještě postupem, než se to od výchozího dolů dělo, an dolovou práci ložisko více otevřeno a proděláno jest.

**Úvaha.** Ložisko Zbuzanské, v tufech diabasových pásma  $Ee_1$  uložené, jest snad nějaká z oněch vrstev v tufech hojných vápenců, kteráž náramně zmohutněla a zmohutnějše ocelkem prostoupena byla. Jelikož ložisko Zbuzanské od spodní hranice hrubokrystalinických vápenců z pásma  $Ee_2$ , asi okolo 90 metrů dle mohutnosti vrstev v ležatém uloženo jest, od ložiska až k spodní hranici pásma  $Ee_1$ , v kterém ložisko samo leží, asi 550 metrů se dle mocnosti měřit může, tak že mocnost celého pásma  $Ee_1$  na hranicích Tachlovsko-dobříčských na 620 až 640 metrů se páčiti může, tedy z toho jde, že *ložisko, uložené ve visutém pásma  $Ee_1$ , velice přibližně ležatému vápenného pásma  $Ee_2$ , se takřka objevuje na hranici mezi pásmy  $e_1$  a  $e_2$ .*

### Nerosty, pro ložisko Zbuzanské významné.

Zbuzanské ložisko jest chudé na zvláštní nerosty, tolikéž i vrstvy, v kterých ložisko uloženo.

#### Nerosty v ložisku vtroušené.

**Siderit.** O hustém sideritu se zmínka dělá napřed; skuliny tohoto ocelku, který co ruda v ložisku podřízeně vystupuje, bývají nezřídka pokryty buď nepatrnými malíčkými krystalky sideritu nebo většími, sedlovitě ohýbanými a silně rýhovanými krystaly sideritu, tvarů —  $\frac{1}{2} R$ . Velikost krystalů sotva převyšuje velikost čočky. Otisky po zmizelých vápencových jádrech brachyopodů skamenělých též — ale toliko zřídka — narostlými malými, jednotlivými krystalky, barvy světlé, tvaru —  $\frac{1}{2} R$ , však všelijak zohýbaného pokryty bývají.

Na některých limonitech objevují se tmavohnědé krystaly lesklé v druzách buď jednotlivě neb v skupeninách narostlé, které mimo tvar —  $\frac{1}{2} R$ , sideritu vlastní, nemají ani štípatelnosti klenčové ani hmoty ocelkové, jsou to pseudomorphy limonitu po sideritu.

O *calcitu* a *sideritu*, skládajících jádro skamenělin, ve vápenci zarostlých, netřeba se blíže zmiňovati, jakož i o žilkách *válaitu* v nich se nalézajících, nebo již svrchu o nich zmínka učiněna.

**Limonit** jest vlastní ruda, výchozí ložiska skládající. Z hustého sideritu po-

vstal hnědý pevný limonit; z ostatního dutinatého sideritu se vytvořil méně pevný, žlutohnědý limonit. Pevný, celistvý a žilkami křemene prostoupený a v malých skupinkách krystaly křemene porostlý limonit jest třetí odrůdou v složení rudního ložiska.

Mimo tyto hnědele jest v ložisku na nesčetných místech vyloučen zemitý limonit, *okr*, barvy sytě žluto přihnědlé. Na výchozím pevného limonitu objevují se v měkčí hmotě rudního ložiska veliké záválky uvnitř duté. Okraj neb mocná skořápka těchto nepravidelných kulí, jejichž vnitřní dutina bývá někdy větší hlavy, skládá se z vrstviček hnědého, pevného limonitu, s krátkými vrstvičkami žlutého, zemitého hnědelu se střídající. Okraj kulí jest žlutý od okru a povrch kostrbatý od nepravidelně prohýbaných pevnějších vrstviček hnědého limonitu. Vnitřek dutiny jest potáhnut vrstvou, i více než silný prst mocnou, s vlnitým neb hroznovitě z kuliček a kapalinových tvarů nakupeným, černým, hladkým a lesklým povrchem. Tato vrstva složena z tmavokaštanového vláknitého přechistého limonitu (brauner Glaskopf).

Ve větších některých dutinách rudního ložiska se objevují na kypřejším hnědelu kulovaté tvary limonitu, velikosti bohatého hrachu, narostlé. Barva jejich žlutohnědá, a složeny jsou ze samých, asi půl millimétru tenkých, ba ještě slabších vrstviček, soustředně se objímajících.

Taktéž bývají mnohdy skuliny a trhlinky v limonitu pokryty *wadem*; buď jednotlivými přejemnými šupinkami neb slabounkými povlaky, přejemně šupinatými, barvy hnědošedé a lesku polokovového.

O *haematitu* též nahoře psáno, že co jemně vtroušený železovec, křemenem prostoupen a žilkami křemennými protkán, společně vedlé hnědé křemenné rudy se co ruda černošedá neb černorudá objevuje, v které se někdy též nějaké hloučky tmavorudého zemitého haematitu objevují.

Zemitý neb okrovitý haematit barví mnohý vápenec na rudo buď sám o sobě, nebo zároveň se sideritem, který okrem úplně prostoupen a na rudo zbarven jest. Siderit celistvý, haematitem prostouplý podobá se velice rudému jaspisu, kterýž v žilkách též vedlé něho se objevuje.

**Pyrit**, ač bývá často v sideritu, z vápence povstalého, v maličkých zrnkách zarostlý, jest přece v malých, osamotnělých neb v skupeniny srostlých, nezřetelných krystalkách, tvaru  $\infty O \infty$  na otiskách dutých mnohem obecnější, než v zarostlých částkách.

### Nerosty v žilách se objevující.

**Křemen** stojí na prvním místě, nebo jest v hnědé rudě v žilkách pramalých i větších velmi hojný; v některém limonitu sestavují žilky jako tkanivo nebo síť, v kteréžto limonit roztroušen jest. Dutiny vyplněny pramalými krystalky, průzračnými neb průhlednými, tvaru  $\infty P. + R. - R.$  I větší krystaly, as šířky husího brka objevují se v slabých žilkách v rudě hnědé neb od haematitu tmavorudé neb černošedé.

Nejmenší krystalky, mnohem menší makových zrnek, které pokrývají maličké skulinky v limonitu pevném, bývají potaženy tenounkou vrstvičkou

**Pyrrhosideritu** barvy světle hnědé, a ze samých chomáčků, složených z přejemných, asi toliko  $\frac{1}{4}$  až  $\frac{1}{10}$  millimétru dlouhých jehliček krystalových, sestávající.

Toliko silnou lupou a opatrným prohledáním skulinek křemenných se objevují slabounké povlaky hnědé.

Tmavošedá křemenitá ruda haematitová bývá též prostoupena žilami krátkými a co slabý prst mocnými, které sestávají z celistvého, skrytě vyhraněného křemene barvy tmavošedé neb červené, tedy z *jaspisu*. V žilkách jest buď červeného neb tmavošedého jaspisu více; obě barvy do sebe přecházejí dosti náhle, však jsou i všelijaké pruhy a kousky buď červeného jaspisu v šedém nebo i opačně ostře od sebe odděleny.

Vedle žilek jaspisů, v rudě křemenné aneb jaspisové žíly prostupující, objevují se o něco slabší a též o mnoho kratší předešlých, žilky *chalcedonu* barvy hnědavé neb slabě dýmové.

**Pyrit.** V ložisku rudním se objevují též žilky zrnité až i hrubší prstu, které sestávají ze samých krystalků pyritových, srostlých. V druzách objevují se tvary  $\infty O \infty$  velmi lesklé a tak těsně srostlé, že od ploch krychlových toliko jedna bývá zřetelněji vyvinuta.

V druzách lesklých bývají též krystaly tvaru  $\infty O \infty . \infty O . O$  až 6 mm. vysoké, narostlé. Plochy  $\infty O \infty$  nerovné, složené ze samých čtverců menších krychlí, nepatrně vyčnívajících.

Malé krystaly druz,  $1\frac{1}{2}$  až  $2\frac{1}{2}$  mm. vysoké, velmi lesklé, bývají složitých tvarů a sice co:  $\infty O \infty . \infty O . \frac{\infty O 2}{2} . O$  nebo  $\infty O \infty . \frac{\infty O 2}{2} . \infty O . \frac{3 O \frac{1}{2}}{2} . O$  vyvinuty.

Pyritové žilky se v limonitu ani neobjevují nebo toliko převzácně; jen v sideritech proměněných z vápence se vyskytují. Hustý siderit bývá též prost všeho kyzu.

**Calcit,** štípací se v kusy velikosti malé pěsti, skládá žílu mocnější stehna, kterou ruda prostoupena jest na jednom místě. U prostřed žíly jsou druzy převelkých krystalů calcitových tvaru  $-\frac{1}{2} R$ , až velikosti pěsti.

Povrch klenčů úplně ukryt asi 2 millimetry mocnou korou hnědavou, dobře sice štípatelnou, ale nicméně ne tak předokonale dělitelnou jako vápenec samý. Kora hnědého vápence, na pohled dolomitického a limonitem prostupujícím jí zbarveného, sestává ze samých zároveň srostlých, malých krystalů  $-\frac{1}{2} R$ , tak že povrch její od hran klenčových jakož i rohů, mezi sebou zároveň, jest drsný velice.

Vápenec průhledný má hutnotu 2·7266, nalezenou z 1·97 grammů kousků štěpných.

Pokrývající kora, tak jak jest, má potažnou váhu = 2·6360, prosta všech bublinek vzduchových 2·7324, není tedy úplně hustou a sestává dle objemu tudíž z 96·45% vlastního vápence a 3·55% dutinek vzduchem vyplněných. Možná, že klenče, z kterých kora srůstem jich složena jest, nejsou úplně jeden v druhém srostlé. Potažná váha určena s množstvím 1·56 grammů.

V žíle vápence čistého se objevují malé, až dosti velké krystaly pyritu převzácně, něco hojněji ale v krystalech vápencových v druzách vyhraněných po různu sem tom vtroušeny. Pyrity dosahují až velikosti malého vlašského ořechu, tvary jejich jsou velmi zpotvořené a stlačené  $\infty O \infty . O$ , povrch nepravidelně zároveň rýhován a na hnědo zbarven.

### Nerosty okolních vrstev.

**Calcit** zase první místo v tufech, zvláště hrubozrnných žabacích zaujímá, které jím úplně protkány jsou a v nichž též žfly, do značnější dálky se rozprostírající, tvoří.

**Pyrit** prostupuje v maličkých, až přenepatrných krystalkách jemnozrnné tufy visuté v jistých vrstvách náramně hojně.

V některých místech jsou ve visutých tufech zarostlé shluky (konkrece) pyritu velikosti hrachu až bobu, nezděná dosti pravidelně kulaté. Povrch shluků velmi lesklý, jest hranatý, an ze samých vyčnívajících čtverečných plošek až 1 mm. délky měřících to ploch od  $\infty O \infty$  se skládá. Uvnitř jeví sloh dostředně paprskovitý.

**Selenit** se objevuje zarostlý v jednotlivých krystalech v hlíně jílovaté, povstálé z rozdrcených a zvlhlých přejemných tufů ve visutém ložisku. Velikostí svou rovnají se největší krystaly slabému malíku.

Tvary krystalů jsou nezřetelné;  $\infty \check{P} \infty . \infty P . - \frac{P}{2}$ , některé až k nepoznání okulacené na hranách. Nejrovněji jeví se plocha  $\infty \check{P} \infty$ ; však hranol  $\infty P$  takřka až k nerozeznání hluboce zbrázdněn jest ve směru kolmém, tolikéž i plochy  $-\frac{P}{2}$  zároveň s hranami spojivými mezi  $-\frac{P}{2}$  a  $\infty \check{P} \infty$  přeznačně vybrázdněny jsou. Sádovec jest čirý, předokonale štípatelný, jen sem a tam maličkými zrnečky šedého jílu zakalen. Potažná váha určena s množstvím 2.49 grammů jest 2.3085.

### Přehled nerostů v ložisku Zbuzanském nalezených.

|                           | V rudě<br>zarostlé | na rudě<br>narostlé | v okolní hor-<br>nině zarostlé |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 Siderit . . . . .       | †                  | †                   | †                              |
| 2 Limonit . . . . .       | †                  |                     |                                |
| 3 Haematit . . . . .      | †                  |                     |                                |
| 4 Pyrrhosiderit . . . . . |                    | †                   |                                |
| 5 Wad . . . . .           | †                  |                     |                                |
| 6 Calcit . . . . .        | †                  | †                   | †                              |
| 7 Křemen . . . . .        | †                  | †                   |                                |
| 8 Chalcedon . . . . .     | †                  |                     |                                |
| 9 Selenit . . . . .       |                    |                     | †                              |
| 10 Pyrit . . . . .        | †                  | †                   | †                              |
| 11 Válcit . . . . .       | †                  |                     |                                |



Ložiska rudy železné na jiných místech pásma  $Ee_1$  nejsou ani tak mocně, ani tak rozsáhle vyvinuta, aby možné upotřebení jich k účelům hutním bylo příčinou zkoušení jich dle vlaku. Jsou pak asi následující slabá ložiska známá:

### V Tachlovicích.

Z jihozápadní části vsi Tachlovic, blízko panských stájí, hnána štola tufovými břidlicemi, střídajícími se s vrstvami vápence, kteréž do vysuté části pásma  $e_1$  náležejí, až do lomu otevřeného, v němž se dobývá vápenec hrubozrnitý z pásma  $e_2$  pro vysoké pece.

Štolou předěláno asi 3 centimetry slabounké ložisko zemitého haematitu, kterýž uložen v jilovatých tufech žlutavých a rudých. Jilovaté vrstvy v ležatém jsou rudou červenou probarveny, ony ve visutém pak slabounké vrstvičky limonitu jen sem a tam uložené objevují.

Celé visuté, až k mocným vrstvám vápence se skládá z rudých více méně jemných břidlic; od rudy až na zoul vápenců jest 20 metrů počítaje dle mohutnosti vrstev. Ležaté složeno z hnědožlutých tufových břidlic, v kterých se krátké neb dlouhé vrstvy sideritického vápence, nanejvýš až 2 decimetry mocné, střídají.

Ruda tedy podobně jako Zbuzanská uložena ve vrstvách pásma  $e_1$  nehluboko pod vápenci pásma  $e_2$ ; tedy na hranici pásem  $e_1$  s  $e_2$ . Jest-li že pásy rudy Tachlovické, k jihu se klonící, jsou opětované pokračování ložiska Zbuzanského, v jehož pokračování směrem k západu uloženy jsou, aneb jestli některá jiná nahodilá vrstva v rudu proměněna jest, o tom ovšem ničeho ani tušit se nedá; jen to toliko jest jisté, že obzor obou jest sblíženě tentýž.

### U sv. Ivana.

V lesích Svatojanských, asi uprostřed mezi zámečkem u sv. Ivana a Berounem, jest na vysočině vrchu, kterýž jméno „na herinkách“ má, dub na cestě, vůkol kteréhož bývají roční schůzky za příčinou jistých zvyků pocházejících z časů církevních upomínek. Nedaleko dubu, asi trochu na sever, táhne se na dosti rovné pláni na temenu vrchu, dlouhý, nevysoký pahrbček, táhlému valu podobný. Val ten složeno z hrubozrných tufů diabasových pásma  $e_1$ , v kterýchž uloženy jednotlivé vrstvy vápence celistvého, šedého. Jedna taková vrstva vápence, kteráž sestává ze samých velikých, táhlých vrstev, čůčkám dlouhým podobných, kteréž mocnosti až 2 decimetry nabývají, mění se v rudu tím, že do vápenného složiva jejího značné množství haematitu přistupuje.

Ruda skládá se z dosti značných, nicméně ale přece malých šupin neb šupinatých zrníček velmi lesklého haematitu barvy železné, mezi kterými, v množství menším, k porovnání s oným, kteréž železovec samotný zaujímá, vtroušených šedožlutých zrněk tufového vápence, limonitem zbarveného. Ruda, kdež bohatší jest, skládá se z části železovcové, velice převládající nad ostatní vápenatou; toliko v některých místech, kde zrna velice zdobní, mění se barva železná přechodem do rudé. Znečištění rudy vápencem, limonitem barveným jest pro rudu železnou spíše vlastností dobrou než znečištěním.

V jaké vzdálenosti ruda, k jihu se klonící, od spodního nebo vrchního ukončení pásma  $e_1$  se objevuje, jest neznámo.

### V Slivenci.

Rokle, od hřbitova Sliveneckého ve vzdálenostech 70 až 200 metrů k západu, jižní svah vrchu prorývající, složeny jsou ve své části severní, kdež vznik berou, z břidlic graptolitových, k jihu přikře se klonících s uloženými vrstvami černošedého vápence se střídajících. Některé vrstvy vápence se skládají ze sideritu vápenného neb vápence sideritem přeznačně proniknutého; výchozí takových vrstev, až několik decimetrů dohromady mocných, složeno z limonitu žlutohnědého až hnědého, polozemitého až pevného. Jiné rudy v silurských vrstvách  $e_1$  v těch místech není a vyskytuje-li se tam též haematit, tož tento pochází z nejnižších vrstev pískovce útvaru křídového, vršinu roklí pokrývajícího. Ruda žlutá jest dosti čistá. — V rozdrčených graptolitových břidlicích, vedle vržení bývá siderit zarostlý.

### Přehled všech nerostů, objevených v rudonosných pásmech útvaru silurského v krajině mezi Prahou a Berounem.

|    |                          | pásmo $d_1$ | pásmo $d_4$ | pásmo $e_1$<br>střed | pásmo $e_1$ visuté<br>na hranici s $e_2$ |
|----|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1  | Haematit . . . . .       | †           | †           | †                    | †                                        |
| 2  | Siderit . . . . .        | †           | †           | †                    | †                                        |
| 3  | Limonit . . . . .        | †           | †           | †                    | †                                        |
| 4  | Chamoisit . . . . .      | ?           | †           |                      |                                          |
| 5  | Pyrrhosiderit . . . . .  |             |             | †                    | †                                        |
| 6  | Stilpnosiderit . . . . . |             | †           | †                    |                                          |
| 7  | Psilomelan . . . . .     | †           |             | †                    |                                          |
| 8  | Pyrolusit . . . . .      | †           |             |                      | †                                        |
| 9  | Asbolan . . . . .        | †           |             |                      |                                          |
| 10 | Wad . . . . .            | †           |             |                      | †                                        |
| 11 | Cuprit . . . . .         | †           |             |                      |                                          |
| 12 | Calcit . . . . .         | †           | †           | †                    | †                                        |
| 13 | Aragonit . . . . .       |             | †           |                      |                                          |
| 14 | Dolomit . . . . .        | †           |             |                      |                                          |
| 15 | Ankerit . . . . .        | †           |             |                      |                                          |
| 16 | Malachit . . . . .       | †           |             |                      |                                          |
| 17 | Azurit . . . . .         | †           |             |                      |                                          |
| 18 | Melanterit . . . . .     | †           | †           |                      |                                          |
| 19 | Epsomit . . . . .        |             | †           |                      |                                          |
| 20 | Selenit . . . . .        | †           | †           | †                    | †                                        |
| 21 | Baryt . . . . .          | †           | †           |                      |                                          |
| 22 | Delvauxit . . . . .      |             | †           | †                    |                                          |
| 23 | Diadochit . . . . .      | †           | †           | †                    |                                          |
| 24 | Apatit . . . . .         | †           |             |                      |                                          |
| 25 | Kaolin . . . . .         | †           | †           |                      |                                          |
| 26 | Sideroxen . . . . .      | †           |             |                      |                                          |
| 27 | Labradorit . . . . .     | †           |             |                      |                                          |

|    |                       | pásmo $d_1$ | pásmo $d_4$ | pásmo $e_1$<br>střed | pásmo $e_1$ visuté<br>na hranici s $e_2$ |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|
| 28 | Angit . . . . .       | †           |             |                      |                                          |
| 29 | Křemen . . . . .      | †           | †           | †                    | †                                        |
| 30 | Chalcedon . . . . .   |             |             |                      | †                                        |
| 31 | Pyrit . . . . .       | †           | †           | †                    | †                                        |
| 32 | Markasit . . . . .    |             | †           |                      |                                          |
| 33 | Redruthit . . . . .   | †           |             |                      |                                          |
| 34 | Covellin ? . . . . .  | †           |             |                      |                                          |
| 35 | Chalkopyrit . . . . . | †           | †           |                      |                                          |
| 36 | Arsenopyrit . . . . . |             | †           |                      |                                          |
| 37 | Galenit . . . . .     | †           | †           |                      |                                          |
| 38 | Sphalerit . . . . .   |             | †           |                      |                                          |
| 39 | Cinabarit . . . . .   | †           |             |                      |                                          |
| 40 | Válaít . . . . .      |             |             |                      | †                                        |
| 41 | Anthracit . . . . .   |             | †           |                      |                                          |

## II. Rudy v útvaru kamenouhelném

u Malých Přílep a Hýskova.

### Ú v o d.

Malické pánvičky kamenouhelné v okolí Berounském teprve v polovičce předešlého století otevřeny a uhlí v nich rychle dobýváno bylo; rud železných, v nich tolikéž uložených v úhrnečném množství zajisté větším uhlí samého, nevšmáno si.

Zde toliko pánviček na levém břehu Litavky si všmáno bude, z nichž Malo-Přílepská, 3½ kilometry od Loděnic k severozápadu vzdálená, nejdůležitější jest.

Od předešlého století počíná se, ač již mnohem dříve známo bylo, rozvíjeti dolování na uhlí v tamější krajině, kdež k jihu mírně se klonící svah bezprostředně jižně od Malých Přílep, jakož i mírný úval západně od Přílep k Železné se klonící, jehož západní část již do obce Železenské připadá, šachticemi a mírami obsazeny byly.

Dle tehdejšího zákonodárství ve věcech báňských nebylo uhlí regálem a podání horních lánů bylo obvedené tehdejšími malými měrami na příjemce, jenž byli zároveň majiteli polí, pod kterými se sloj uhelná rozprostírala. Tímto již hned z prvopočátku podmíněn nepravdivý a nesprávný způsob dolování velikým množstvím příjemců, kteříž zároveň sedláky byli. V celém malém propůjčeném prostoru stíhalo hloubení šachtičky jedné, druhou, po celý čas živějšího dolování, jichž nyní okolo tří set napočítat se dá, kterými ložisko uhelné, selskou prací pustošeno, na přemnohých místech se vzňalo, tak že jisté části jeho opuštěny býti musily po dlouhou dobu, až do udušení se dolových požárů, kteréž až po dnešní den, ač velice obmezené, utulány nejsou úplně.

Po celý čas živějšího dolování, tedy od druhé polovice minulého století až i několika desetiletí tohoto století, dováženo uhlí do Prahy na trh od vlastních majitelů jeho, kdež pro svou dobrou jakost vždy se snadno odbylo. Po prvé čtvrtce uplynulé v tomto století ochabovala však práce na uhlí neustále, a čím dále tím více ochabujíc, obmezovala se pouze na zbytky pokaženého uhlí, drancováním ložiska pozůstalé; až i po tyto dni ještě přenepatrně se poslední přístupné zbyty vyhledávají, tak že nynější roční výroba uhlí, kteréž se toliko paběrkuje, asi jen několik málo tisíc centů obnáší (něco okolo 4—2000 i ještě méně). Mnoho-li asi v celku uhlí vytěženo bylo, to při tehdejších nevšmání si státní správy podobných statistických věcí nemožno udat; nebylo by ale též možno bývalo spole-

hlivých udajů si od majitelů zaopatřit po dobrém. Dle cenění prostranství, ložiskem zaujatého, dá se sblíženě množství uhlí, u Přílep Malých kdysi uloženu byvšího, na 10 až 12 milionů centů rakouské váhy cenit, z čehož ovšem velmi značná část zpustošením pokažena a nevydobyta byla.

Dolování na uhlí, jinak pramenem rozkvétajícího se průmyslu a zmáhajícího blahobytu, zde mimo politování hodnou zkázu pokladu nevyzdviženého, neposkytuje ani nejmenší známky pozůstalé, po bývalém možném blahobytu majitelů, kterými stržené peníze v městě na cestě prohýřeny byly; tak že mimo odstrašující pohled na černé, přechetné haldy, jimiž polnosti pokaženy jsou — pohled na svah Přílepský dá se přirovnat sblíženě asi pohledu na pole s převelikým množstvím černých hromad, krticím podobných, tak jako by od krtků zcela prohrabáno bylo bývalo — a jež důtklivým odstrašujícím příkladem o neprospěšnosti rozdrobeného báňského majetku jsou, ničeho více nezbyvá.

V polovici tohoto století přešla část opuštěných kamenouhelných měr u Malých Přílep blíže Loděnic na Pražskou železářskou společnost, již ještě několik málo velkých nových měr propůjčeno bylo. Od roku 1863 až do 1866 dobýván tam byl sphærosiderit, jakož i u Hýskova, kdež též asi v první čtvrti tohoto století proslojek uhlí se odkryl, však pro slabost nikdy k dolování nedospěl.

|                                                  |                    |                |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Vytěženo v Malých Přílepech od roku 1863 až 1865 | . . .              | 90.000 centů.  |
| „ v Hýskově                                      | 1864 až 1865 . . . | 10.000 „       |
| dohromady                                        | . . .              | 100.000 centů. |

### Literatura.

Přímo se týká Malých Přílep:

Kratičká připomínka na str. 102 obsažená v knížečce: *J. Krejčí; Přírodopisný průvodce po okolí Pražském 1854*; pak tolikéž kratičké pojednání obsaženo na str. 523 v:

„*M. Lipold; Das Steinkohlengebiet im nordwestlichen Theile des prager Kreises in Böhmen*“, obsažené v *Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt XII. Band 1861 und 1862*.

Přímo netýká se Přílep, nýbrž blízkých pánviček podobných svou povahou k této:

„*Const. Ettingshausen; Die Steinkohlenflora von Stradonic in Böhmen*“, obsaženo v *Abhandlungen der geologischen Reichsanstalt I. Band, 3. Abtheilung, Nr. 4. 1852*;<sup>33)</sup> potom v:

„*Rich. Andree; Die Versteinerungen der Steinkohlenformation von Stradonic in Böhmen*“, obsaženo na str. 160—176 v *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie und Palaeontologie von Leonhard und Geinitz 1864*.<sup>34)</sup>

Z tohoto článku uveřejněn též výtah pod jmenem:

„*J. Krejčí; Otisky v kamenouhelném útvaru u Stradonic blíže Berouna*“, obsaženým na str. 273—276 v *Živě, časopisu přírodovědeckém, ročníku XIIitém 1864*.

Dále jest nejlepší posud seznam rostlin z malých kamenouhelných pánviček uveřejněn pod jmenem:

*K. Feistmantel; Verzeichniss einiger neuen Fundorte von Steinkohlenpflanzen in Böhmen; obsažen v Lotos 19. Jahrgang 1869.<sup>35)</sup>*

Ve všech těchto, přímo Malých Přílep netýkajících se pojednání, uvedeny rostliny hlavně z pánviček na pravém břehu Litavky, tedy ze Stradonic, Lísku atd.; toliko v posledním, nejmladším, několik málo rostlin též od Malých Přílep uvedeno.

### **Otevření ložiska kamenouhelného a ložisek rudních.**

Jak již připomenuto, jest na svahu, pod samými Malými Přílepy k jihu se klonícím, potom v mírném úvalu k západu se snižujícím, vedlé cesty z Přílep k Železné vedoucí, převeliké množství šachtíček 10—40 metrů hlubokých, z nichž největší část na pozemcích Malo-Přílepských, menší pak na Železenských zaražena jest a jež takřka veskrz až na tři neb čtyry; úplně zavaleny a nepřístupny jsou. Šachticemi toliko visutého sloje uhelné proděláno bylo.

Od potoka jižně pod svahem Malo-Přílepským z opuštěných bánských otvorů, z kterých se voda prýští, vznikajícího, hnány od samého pomezí Přílepsko-Lhotického (Chrutenického) štoly krátké na sever; též jedna štola od potoka na jih do vrchu Březové, kteráž již do pozemků obce Lhotky (Chrutenic) padá, hnána.

Štolami otevřeno ležaté útvaru kamenouhelného; zvlášt štolou k jihu směřující proděláno v délce asi 170 metrů celé ležaté kamenouhelného útvaru až téměř na samý podložený útvar silurský.

V Hýskově hnána štola delší 130 metrů do ležatého útvaru, od potoka Hýskovského sblíženě na sever, a sice asi v půlce vzdálenosti mezi Železnou a Hýskovem, pod samou půlnoční patou Plešivce. Na proslojce uhlí Hýskovského před čtvrt stoletím asi štolka a šachtice pro pokus zaraženy byly, jsou ale dávno již zhroucením zavaleny.

### **Zeměznalecký přehled.**

Do poddutých svahů nebo do úvalů, vytvořených horninami silurskými, uloženy vrstvy útvaru kamenouhelného u Malých Přílep a Hýskova a na mnohých jiných místech na levém i pravém břehu Litavky, kteréž co poslední pozůstatky někdy daleko široko rozprostírajícího se útvaru kamenouhelného, směrem vrstev, jakož i složivem jich, tolikéž i podobou zkamenělin, o bývalém svém spojení mezi sebou svědčí.

U Malých Přílep zaujímá největší část kamenouhelného útvaru malé místo mezi oběma vrchy Chrástí, z nichž východní se též v teplé stráni Chrástí zove, nazvanými, v poddutém úvalu mezi nimi. Útvar kamenouhelný, spočívající na vrstvách silurských, křemencům pásma  $d_2$  přepodobným, kteréž z hruba od západu k východu směřující, k jihu se kloní, vytvořuje pánev, jejížto půlnoční část na svahu, od samých jižních chalup Přílepských k jihu se mírně klonícím, spočívá, any vrstvy její tolikéž mírně k jihu se kloní a jejížto jižní část, poměrně méně rozlehlá částí severní, s úklonem vrstev na sever na patě Březové (svahu k severu se klonícím) spočívá, tak že střed pánve, kde vrstvy asi sblíženě vodorovně

leží, něco málo severně od potůčka, nejnižší místo v útvaru zaujímajícího se odchyluje.

Od jižních chalup Přílepských k jihovýchodu, okolo teplé stráně v Chrasti přes potůček Přílepský směrem k jihu, do samého lesa v Březové, táhne se útvar kamenouhelný, kam od potoka, počítaje na 200 kroků i více, k jihu se sledovat dá, (ovšem toliko prací dolovou, any nikde vrstvy jeho odkryty nejsou v Březové) odkud opět v oblouku k západoseveru se chýlí, až asi k rozcestí vedlé luk proti západní stráni v Chrasti, kde se cesty z Přílep do Lhotky a z Chrustenic, podél potoka Přílepského na pravém břehu jeho do Hýskova vedoucí, křížují. Odtud se táhne toliko uzoučký jeden pruh útvaru slabě vyvinutého pod lukami dále k západu, an na černých silurských břidlicích, snad do pásma  $d_3$  příslušejících, spočívá; ostatní hranice ale od zmíněného rozcestí k východu se vlečou, až asi k nejdelší zmoře, pod Přílepy v lukách končící a k severozápadu vystupující, podél které asi vystupuje útvar až na temeno Chrastí západní. Odkud podél cesty k Železně vždy na polední straně vyvýšeniny Chrastu až do luk Železenských jižní hranice menšího výběžku pánve tvoří, jejíž severní hranice od Přílepských jižních chalup po půlnoční straně cesty až k Železenskému parnímu mlýnu sledovat se dají, kdež najednou tak jako předešlé, jsouce hlubokými vrstvami hlin pokryty, neznámými se stávají.

Jihozápadně od Přílep nemá útvar více podobu pánve, an toliko na svahu jednom spočívaje, mírně se k jihu kloní. Celá strán Chrastí, sestávající ze silurských křemenců, vystupuje mezi útvarem kamenouhelným na den, jsouc toliko na jižní patě své kouskem kamenouhelných vrstev pokryta, kteréž pod lukami k západu v přeúzkém pruhu směřují, podávající zřejmého dokladu o tom, jak uložení vrstev mladších kamenouhelných závislé jest od povahy výšin, vytvořených staršími silurskými vrstvami.

Jestliže necky táhlé, k západu se klonící, podél cesty Přílepsko-Železenské, jejichž omezení se několik kroků západně za parním mlýnem Železenským náhle pod rovinou ztrácí, dále k západu směřují, jsouce takto snad s vrstvami, ježto mezi Železnou a Hýskovem v údolí na půlnočním svahu jeho opět vystupují, v bezprostředním a toliko pokrytém spojení; nedá se než toliko s pravděpodobností soudit dle povahy údolí, v tomto směru pokračování vlaku vrstev kamenouhelných se rozprostírajících. V pokryté části by vrstvy kamenouhelné, jsou-li skutečně vyvinuty, měly směr západojižní. Že se od parního mlýna vrstvy kamenouhelné na západ vlekou, je sice dokázáno, ale toliko jen až do jisté dálky k Železně.

Zde budiž jakožto zajímavá místnost ještě podotknuta lesnatá strana mezi Železnou a Hýskovem, kdežto na svahu malého prohbí, již k Berounce směřujícím, na severní patě Plešivce, asi v pokračování úzkého pásu útvaru kamenouhelného, v místě „na vápenici“ zvaném jest poměrně dosti mocná vrstva uložena, která záleží z valounů a balvanů, pocházejících z vrstev pásma vrchního útvaru silurského a mezi sebou vyplněných zanešeným rudým jílem neb žlutohnědým, kterýž celému uložení neokulacených balvanů vápenných povahu breccie udílí. Některé balvany jsou značné velikosti, že se z nich velké množství vápna

vydobýti dá, jež se na místě pálí. Do jakého útvaru tato breccie asi vřaděna býti má, není posud určité ujištěno.

V dalším západním pokračování vápenice vystupují vrstvy kamenouhelné opět na den, a jsou pod jmenem Hýskovských známé. Pod jejich výchozím jižním jest uložen tuf diabasový, z opětovaně se vyskytujícího pásma  $d_1$  silurského; co pod tufem diabasovým, dále pod kamenouhelným útvarem k severu leží, ovšem neznámo, anot kamenouhelnými skalami ukryto.

Kromě tohoto vlaku, snad spojeného útvaru kamenouhelného Přílepsy-Hýskovského, jsou leckdes uloženy malé kousky vrstev kamenouhelných na vrstvách silurských, z nichž snad ani všechny známy nejsou a o nichž posud ani nezjištěno, jestliže ve spojení s ostatními pánvičkami, nebo mimo spojení s nimi, uloženy jsou: jako maličký kousek kamenouhelné části u Lhotky ve směru k vrchu Veselé.

Petrografická povaha hornin, vrstvy kamenouhelného útvaru skládající, jest v celku až na mimoobvyčejné, trochu odchylné vyvinutí sblíženě podobná, tak že ráz jich všeobecně tentýž jest.

Co o Malých Přílepech řečeno bude, platí též o ostatních místech; tedy hlavně o Hýskovu na levém břehu Litavky, kde podobné horniny vyvinuty jsou.

Celé souvrství, kamenouhelný útvar skládající, děleno jest sloji uhelnou, nebo jestliže tato vyvinuta není, proslojkem uhelným, na pásmo ležaté, nižší, a na pásmo visuté neb vrchní, kteréž nápadně od sebe se liší:

Nebo kdežto pásmo ležaté složeno jest, počínaje od nejspodnějších vrstev svých, z breccií a pískovců, kteréž čím výše uloženy jsou, tím více do jemných pískovců lupkovatých a konečně v samé lupky přecházejí, na kterých kamenouhelná sloj spočívá; jest visutá hornina celá jednotejně složena toliko co pískovec.

Mohutnost celého útvaru kamenouhelného možno asi na 60 metrů páčit v místech mezi oběma Chrásti, tedy jižně od Malých Přílep; však se rozprostírá pod Březovou ještě část ležatého, kteráž snad není až k Přílepům samým vyvinuta, a kterouž by zajisté, připočítá-li se, celý útvar na 80 metrů nejméně v mocnosti odhadnout se mohl. Však jsou též místa, kde mohutnost jeho, toliko až na několik málo metrů porušena, skryta jest.

**Ležaté.** Ležaté, bezprostředně na útvar silurský nahlíející, sestává ze slepenců na polo též brecciím podobných, velice hrubozrnných. V nejležatějších slepencích jsou zahrnuty spojivem drobnozrnnými, pískovitým a sice arkosnatým, v kterém vedle křemenných pískových a orthoklasových zrn, polo v kaolin se zrušující zrna orthoklasu, droboučké černé drobové břidlice a pak droboučká písčivá zrna křemence pozorují následující velké úlomky hrubosti ořechu až pěsti: oblázky jsou toliko málo obroušeny na svých hranách a jsou to černé drobové břidlice, velmi jemně břidličnaté a slídnaté, podobné oněm, jaké vrstvy v silurském pásmu  $d_1$  neb  $d_2$ , též  $d_4$  skládají; potom lupky kamenouhelné, jakož i valounky málo okulacené, složené z pískovců jemnozrnných, snad kamenouhelných, posléze se též oblázky křemence, z pásma silurského  $d_2$  neb  $d_4$  pocházejícího, ale méně hojně ostatních, objevují. V nejnižší části jsou tyto slepence v celku šedé až šedavěhnědé, převelmi hrubo- a velkozrnné. Štolou dlouhou 170 m., směrem k jihu hnanou, směr KK Tab. VII., obraz 1, byly takoráž až na samý silurský útvar proráženy, nebo předkem štol přestáno v místech, kde od slepenců na spodek útvaru velmi



kratičká prostora ještě asi bude; mocnost jejich asi 5—6 metrů obnáší. Tab. VII., obraz 1. pod písmenem *r* v levo.

Poznenáhla proměňují se velkozrnné slepence v trochu nepatrně jemnější, v nichž pískovcová hrubozrná hmota převládá a v níž zarostlé jsou vedlé menších, již udaných valounků, částečně dosti ostrohranných, polookulacené velké oblázky křemenců; též se v této, asi 1—2 metry mocné vrstvě Tab. VII., obraz 1. písmeno *r*, počínají rudé skvrny objevovat, kterými se celá vrstva proměňuje poznenáhla v:

Rudý slepenec slohu polo brecciovitého, any zvlášť břidličnaté valounky v něm málo na hranách otupeny bývají. V spojuv rudě zbarveném, jemnozrnném, sestávajícím z velmi drobnozrnného pískovce, lupku se podobajícím, jsou dosti těsně vedlé sebe umístěny úlomky břidlic černých, drobových, oným z *d*, přepodobných na pohled, vedlé břidlic šedozelenavých, drobnozrnných a křemenců, velikosti hrachu až velkých zrn, větších pěsti. Zvlášť velké oblázky křemence, kteréž ale nikterak převládat se nezdají, pro svou pevnost vypadávají celé z drolicího se kamení některých méně pevně spojených vrstev a jsou obaleny na celém povrchu dosti mocným povlakem rudě barvicím, a haematitu rudohnědému se podobajícím. Křemencové oblázky od povrchu počínaje do jisté nepatrné hloubky do vnitř jsou v ubývající barvitosti též rudě zbarveny, prostoupeny jsouce na svém povrchu až do jisté hloubky krevelem barvicím; Tab. VII., obraz 1, písmeno *r. p.* Do visutého zdobňuje se zrna rudých vrstev, jichž mocnost na 10 až 12 metrů asi odhadnout možno, an velikosti zarostlých oblásků černých, břidličnatých ubývá a vrstvy se v pískovcové světlejší proměňují, až do vrstev jemnějších, 4—5 metrů mocných přecházejí. Tyto vrstvy sestávají z lupků bělošedavých, neb bělomodravých, šedých a černavých, dosti pevných, dosti význačně, však ne dokonale břidličnatých. Na průřezu Tab. VII. obr. 1. jsou tyto lupky písmenem *l* naznačeny a jsou tím památné, že poprvé se v nich přeslabé proslojky uhlí vyskytují. Něco málo hlouběji pod poloviční mohutností jich uloženy jsou dvě přeslabé proslojky uhlí, každá z nich asi 3 až 4 milimetry mocná. Jakkoliv důležitost proslojky uhelné není prázdná, přece jest v tomto hlubokém obzoru v lupkách, vedlé pásků uhlí usazených, nejstarší známka vyhynulé květeny Malo-Přílepské obsažena.

Posud toliko asi 4 neb 5 druhů rostlin, ne zcela určitých nalezeno bylo. Rostliny lupků ležatých, v Březové dlouhou štolou objevených, jsou tyto:

1. *Hymenophyllites furcatus* Brongn. sp.

Naše kapradí se podobá mladým nevyrostlým odrůdám *Hymenophyllites furcatus* Brong. sp. var. *γ*, které co *Splenopteritis flexuosa* Gutbier, Zwickauer Steinkohlenform. Tab. 5, fig. 3, neb Geinitz, Steinkohlenform. Sachsens, T. 24, fig. 11, 12 vyobrazeny jsou. Vějíře jsou dosti dobře znalé.

2. *Alethopteris longifolia* Presl ?

Vedlé předešlého kapradí objevují se částky vějířů, jednoduše speřené, kteréž upomínají dle všeobecné podoby své jak na *Alethopteris* (*Pecopteris*) *Davreuxii* Brong. sp., tak na *Alethopteris aquilina* Brongn. (*Pecopt.* Grandini Brgt.), též ale na *Alethopt.* (*Pec.*) *lonchitica* Sternb. sp., jakož i na *Alethopt. longifolia* Presl. Nerozhodnuto ovšem, ku které z oněch rostlin by nedokonale zachovalý zbytek náležeti mohl; však pro jeho podobu s *Aleth. longifolia* Pr. (*Asplenites longifolius* Ettingshaus. Flor. Radnic, T. 16, fig. 3.), ač nervy ve vějířkách ani dost málo po-

znat se nedají, ponechán prozatím u tohoto druhu, an se tento i v pásnu nad slojí uhelnou vyskytuje.

### 3. *Cyatheites argutus* Brong. sp.?

Také tento zbytek jest velice nezřetelně zachovalý a podobá se buď zoubkovanému předešlému kapradí s krátkými vějířky, nebo tomuto uvedenému, máje největší podobu ještě s vyobrazením tohoto druhu v Schlotheimově Flora der Vorwelt, Tab. IX, obr. 16; mnohem méně s obrazem 1—3 na Tab. 29. v Geinitzově Steinkohlenfl. Sachsens. Nervy též zachovány nejsou.

### 4. *Sphenophyllum* sp. ind.

Z tohoto přeslicovitého rodu zachovalé toliko maličké výtrusy, o kterých se soudit dá s jakousi pravděpodobností, že od klasů výtrusných nějakého *Sphenophyllum* pocházejí. Že výtrusy skutečně z klasů pocházejí, námi na mnohých místech v pánvi Oslavansko-Rosické na Moravě zjištěno bylo; též Geinitz Steinkohlenflora Tab. 20, fig. 7, 7 A písmeno b, udává podobné výtrusy na klasu *Sphenophyllum emarginatum* Brong. Což hlavně podporuje důmněnku, že zde zbytky tohoto rodu se nalézají, jsouce částky větších větven beze všech lístků, však s pošvaní u kolének zachovalými, jak podobné s jistotou co k rodu *Sphenophyllum* přináležející známé jsou.

Jestli že zbytky tyto též k *Sphenophyllum emarginatum* Brongn. náleží, kteréž již ze Stradonic známy jsou, to zcela nerozhodnuto posud.

5. Mimo tyto otisky nalezeny sledy velmi nedokonale zachovalé, kteréž by připomínaly jak na jemné kořínky od *Hydatia columnaris* Artis, Antediluvian Phytology Tab. V, obr. 1. a 2. neb *Myriophyllites gracilis* Artis. Tab. XII, nebo Linley, Hutton Foss. Flore Pl. 110, kteréž co kořeny od *Asterophyllites foliosus* Lind. Hutt. známy jsou; tak i na jemné výběžky od *Pinnularia capillacea* Lindley, Hutton Foss. Flore of Great Britain Pl. 111 neb Geinitz, Steinkohlenflora Sachsens Tab. 18, fig. 4, jež se buď rodu *Calamites* neb *Asterophyllites* co kořeny přisvojují. Jestli že snad nenáležejí tyto tenké výběžky kořenů též k *Sphenophyllum* samému, poukazovaly by na nějaký jiný rod přeslic kamenouhelných.

Mimo tyto jiných rostlin neobjeveno.

Na těchto lupkách spočívá mocnější pásma pískovců, pískových lupků a lupků, v nichž vesměs sphaerosiderity uloženy jsou. Toto pásmo, 30 až přes 40 metrů mocné, jež štolou v délce, převyšující o něco 100 metrů (vodorovně), odkryto bylo, rozprostírá se od Přílepského potoka jen několik málo kroků po svahu nahoru k severu, kdež v zmlkách malých obnažené výchozí jeho obsaženo jest. Pro dobývání rudy jest toto pásmo ležaté, nejmohutnější všech ostatních vyvinuté, nejdůležitějším, ano jediným místem v kterém výhradně sphaerosiderity objeveny.

Pásmo ležaté skládá se z rozmanitých odrůd hornin, neostře od sebe oddělených a mezi sebou přechody spojených.

Nejhrubší vrstvy ležaté jsou leckdes co pískovce zrna hrubého vyvinuty. Pískovce buď sestávají z bílých oblásků křemene, až co ořech, ba i co malá pěst velkých, spojených tmelem drobozrnným, jemně pískovitým, veskrz sideritem slabě prostoupeným, neb haematitem na rudo zbarveným, v kterém menší úlomky černých silurských břidlic, vedlé písku, křemene a jiných ještě úlomků hornin, podřízeně

vtroušených, nejhojnějšími jsou. Velkozrnné tyto pískovce toliko podřízeně co nevelmi mocné pásy se v následujících ještě horninách, ležatě skládajících, objevují.

Jiný pískovec jest hrubozrný, složený ze zrn co hrách velkých, křemených nebo břidličnatých (drobové břidlice černošedé z pásma silurského *B* neb černé z pásma *d*<sub>1</sub> neb *d*<sub>2</sub> neb *d*<sub>3</sub>, což vůbec nerozhodnuto) neb bělavých, (porfýrům převelmi zrušeným azoického pásma silurského podobných) kteréž buď zemité a tedy zkaolinovatělé jsou, aneb v kterých se v bělavém průsvitavém křemenu ještě polo-zrušené živce, snad orthoklasy pozorují. Základní hmota, převládající nad zrna, jest slabě hnědá, jemně pískovcová a bývá též sideritem prostoupena; v základní hmotě objevují se menší zrnka křemene neb zelených břidlic barvy trávové, podobných oněm, které z pásma silurského *d*<sub>1</sub> známy jsou, pak zrnečka bílého, zemitého kaolinu, lístky slídy muscovitu a drobečky břidlic tufových z pásma *d*<sub>1</sub>. Také tyto pískovce, jejichž barva hnědavá bývá, toliko různé vrstvy skládají, aniž by velice převládaly.

Zdrobní-li zrno pískovců předešlých, velice tedy se proměňují v pískovce drobné až jemno zrné, v kterých nebývá spojivo vzácné. Barva šedozelenavá, šedomodravá, šedobělavá, šedá až šedorudavá spojiva dává pískovcům ráz.

Jestli že v pískovci zrnka křemenná v základní hmotě lupkovité velice jemně rozptýleny jsou, bývá tím přechod do písčnatých lupků zprostředkovan, které posléze do pravých pevných lupků se proměňují.

Ač lupky, písčnaté lupky a drobnozrnné pískovce převládající část ležatého skládají, any bez pořádku mezi sebou se střídajíce do sebe se mění; tož přece nejvrchnější vrstvy celého ležatého pásma sestávají z pevných, dosti dobře břidličnatých lupků šedomodrých, uhelné sloji podložených, na vzduchu poměrně velice stálých, kteréž jsouce obdobou Stradonických lupků šedomodrých, v nichž se překrásně zachovalé otisky rostlin kamenouhelných hojně objevují, jimiž právě Stradonice velmi známé se staly — od nich úplně k nerozeznání jsou na pohled, ale toliko otisků velice po řídku obsahují.

Ve všech horninách spodního oddělení Přílepské pánve, jejichž vrstvy nejsou dobře vyznačeny, až na dobře vrstevnaté nejvyšší lupky jeho obsaženy vrostlé shluky (konkrece) sphaerosideritu drobnosti, počínající malým ořechem až do velmi značné velikosti.

Sphaerosiderity jen málo kdy jsou kulaté, obyčejně představují elipsoidy, bočníkům podobné, jež delší svojí rozsáhlostí zároveň s vrstvami uloženy jsouce v celém prostranství mocnosti pásma na některých místech o něco hojněji než na jiných se vyskytují, ač se to často měnívá v krátkých odlehlostech. Nejobyčejnější velikost sphaerosideritových shluků jest ona, počínající velikostí hlavy až do hrubosti bočníků, některé však jsou tak značné, že by je ani několik lidí neuneslo.

Bezprostředně na výchozím jsou sphaerosiderity proměněny zcela do limonitu, dále od výchozího jest jádro sideritové v nich, ještě hlouběji však toliko korou limonitu potaženy jsou a sestávají v jisté hloubce zcela ze sideritu celistvého. Sphaerosiderit jest poměrně k okolním vrstvám, v kterých uložen jest, horninou přetvrdou; nebo lupky, pískovce a přechody jejich mezi sebou, zvlášť jsou-li provlhlé, tlačí náramně silně; i limonitové kule, v které sphaerosiderit na výchozím proměněn bývá, jsou mnohem pevnější horniny, v níž zarostlé se objevují, protože ve

zmlkách co boule nebo hrboule vystupují polovypouklé nad lupkami neb pískovci, vodou vymletými.

Ve sphaerosideritových kulích nalezeny následující skameněliny:

1. *Calamites cannaeformis* Schloth.

V shlukách sphaerosideritu v Hýskově, též v Malých Přílepech nalezeny smáčklé kmeny, nebo i úplně válcovité částky jeho, až 10 centimetrů v průměru měřící.

V Hýskových kulích mimo to nalezeny též kořeny, pojmenované co *Pinnularia capillacea* Lindl. Hutt., kteréž možná že též k tomuto calamitu náležejí. Vřetena mladší nebo větvičky zde nalezeny nebyly, pod kterými některý *Asterophyllites* obsažen jest.

2. *Cordaites principalis* Germ. sp.

Tímto jmenem vyrozumívají se toliko dlouhé, široké, zároveň čárkované listy, kteréž jak v Přílepských, tak i v Hýskovských sphaerosideritech nalezeny byly.

Též se objevily v Hýskovských kulích kořeny, ne nepodobné oněm výběžkům, jež co výběžky od válcovitých, bradavičkových otisků *Stigmaria ficoides* Brong., známy jsou.

Že pak *Stigmaria* jest co kořen buď od *Lepidodendrů* (*Sagenarii*) neb od *Sigillarii* poznán, proto jest možno, že co třetí známá rostlina snad nějaká *Sagenaria* neb *Sigillaria* neb obě najednou se též v kulích nalézají, ač posud se nevyskytly.

## Sloj uhelná

spočívá na šedomodravých pevných lupkách, ačkoliv se tyto v některých málo místech též v lupky jiné, písčnaté, až i v pískovce velmi jemné proměňují; však nejprv uvedené lupky jsou převládajícím ležatým.

Sloj uhelná kloní se na svahu Přílepském k jihu, mírně pod úhlem asi 10—15°; v úvale, podél cesty k Železné se klonícím, tvoří pánvičku malou, takoruka samo pro sebe, a kloní se v celku mírně k západu, an po obou stranách necek na sever dosti značně, místy až s 40°, a na jih mírněji se kloní. Podél cesty této až k parnímu mlýnu u Železné jest sloj uhelná na způsob k západu nakloněných necek uložena. V části větší, kdež výchozí sloje pod samou jižní částí vesnice Přílepské se v úzkém pruhu na den vyklinuje, jest rozložení sloje více ploché; v ploše sloje však na okrajích výchozího jest úklon zesláblé sloje o něco málo značnější než v ostatní části její.

Mohutnost sloje uhelné mění se od 2 až do 10 metrů; průměrní číslo jest 4 až 6 metrů; ve východní části, tedy u Přílep, jest sloj mocnější a sestává asi z tří plástů, slabými proplásty lupkovými a arkosnatými dělených; v západní části u mlýna parního toliko jediný plást mocnější 2 $\frac{2}{3}$  metrů, kde nejlépe vyvinut jest, sloj skládá. Plásty v mohutnější části ložiska uhelného jsou na některých místech, počítaje od dola k vrchu, asi takto mocné; první ležatý  $\frac{2}{3}$  až více 1 metru, druhý střední 2 až 3 metry, třetí vysutý okolo 2 metrů. Mohutnost však se mění a někdy scházejí jeden neb dva z plástů sloje uhelné.

Sloj jest veskrz hojnými rozsedlinami vržená, v kterých se na dlouho ze sloje rozdrolené uhlí vlékává, proto že jak ležaté tak i visuté se ostře netrhají rozsedlinou.

Sledování vržení jest uměním, v něž toliko zkušený báníci zasvěcení bývají;

protož také dolováním, bezpříkladně zanedbalým, zde velikou překážkou rozsedliny byly a jsou zároveň částečně příčinou, proč sloj dolováním zničena a zpusťována byla.

Jakost uhlí jest dobrá ještě posud, ač se toliko paběrkuje; uhlí se neláme ve velkých kusech a drolí se vůbec často. Zdali ale dříve též uhlí toliko v menších kusech dobýváno, nezjištěno jest; nebo nynější drobná povaha uhlí není vlastní sloji, nýbrž je následkem pozůstalým z předešlých dob, any zbylé nepravidelné částky sloje, ve všech směrech bez pořádku a způsobu rozdělané, úplně stlačený a rozdrčeny jsou.

Uhlí zvlášť snadno se paří v dole, což při takovém dolování, jaké zde obvyklé bylo, neblahé následky pro důl samý mívá.

Traskavých (bánských plynů) a těžkých větrů v slojích nebylo.

V jakých směrech asi stříhy v uhlí se sbíhaly, byly-li vůbec nějaké, nemožno nyní určit, an po nich více ani nejmenšího sledu zachováno není.

Sloj byť i sebe mocnější k výchozímu svému, ke kterému vystupuje tím sklonitěji, čím bližší jest, pozbývá v rychlém postupu k výchozu mohutnosti své, kteráž z 10 metrů třeba do vodorovné dálky nepatrné, poměrně 50—60 metrů i méně ještě, až na 2 i 1½ metru i ještě méně se sужuje.

**Visuté.** Bezprostředně nad krovem sloje (též ale v proplástech jalových částečně) uložen jest černý neb černošedý uhelný lupěk v mohutnosti až 2 decimetrů. V tomto bezprostředním visutém uhelném lupku, kterýž prostoupen bývá slabými proslojky uhelnými, zahrnuto veliké množství — zvlášť v proslojkách uhelných — malých, zuhelnatělých částí dřev rozdrčených a dřevěnému uhlí podobných (říká se tomu vlaknitý anthracit obyčejně). Tato zuhelnatělá dřevovina poznána buď co Araucarites, neb co dřevo ze Sagenaria neb též od Calamites, na velmi mnohých místech, kde se ještě vyskytuje: zde však zdá se, soudě dle hojnosti zbytků vedlé obsažených, přináležet buď k zbytkům kmenů od Sagenaria nebo Cordaites nebo obojím společně. Jiných zřetelných otisků v uhelnatém lupku není.

Nad tímto lupkem jest uložen šedomodrý lupěk, přepodobný onomu ze Stradonic, jen že mnohem pevnější (modrá skála), v kterém zřídka skameněliny zahrnuty; zvlášť v západní části útvaru jest visuté takto lupkovité. Však hojněji šedomodrých lupků jsou ve visutém uloženy běložluté arkosy (kde se sloji přibližují, „košílí“ zvané), v kterých nevysoko nad uhlím skameněliny dosti hojně bývají.

Nad slojí jsou tyto arkosy buď samojediné, nebo se v nich objevují tenké, ostře obmezené pásy černého až černošedého lupku, kterým spojení s černým uhelnatým lupkem, nad slojí spočívajícím, zprostředkováno jest.

V těchto tenkých, jemných lupkách, v arkose co úzké pásy (2 mm.) uložených, jest hojnost přenáravná otisků, kteréž ale pro hojnost samu tak ve všech směrech se přeléhají a stlačují, že velice špatně zachovalé jsou. Však i v arkose samé jsou ve směru vrstevnatosti krátké, přetenké, nanejvýše ¼ millimétru měřící, černošedé proužky, kterými smačklé otisky na příčném lomu naznačeny bývají. Dle těchto pásků se arkosa štípáním nedokonale dělí — a otisky se tím odkrývají — a jsou opět nezřetelně zachovalé, čehož příčina nyní v hrubosti zrna arkosy spočívá. Přetenké pásy jsou o něco hojnější pásků tenkých lupků černých. Čím výše do visutého, tím méně pásků na příčném lomu; někdy žádných se více

neobjevuje a arkosa chudá na otisky. Ještě visutěji jest arkosa prosta všech otisků.

Všech posud ve visuté arkose objevených druhů rostlin jest dosti mnoho.

V lupkách a arkosách **ve visutém sluje** nalezeno posud nejvíce otisků rostlinných, ač nejsou tak dobře zachovalé, že by se o všech určité dalo říci, čím vlastně jsou.

Tyto rostliny v předešlém pojednání od pana Karla Feistmantela uvedeny již jsou. Zde toliko ještě čtyry druhy vřaděny budou, kteréž v právě jmenovaném pojednání z Malých Přílepů uvedeny nejsou.

#### 1. *Equisetites infundibuliformis* Bronn.

Tímto jmenem zahrnuty jsou kmeny přeslice. Ačkoliv se zdá být velmi možné, že *Equisetites* a *Calamites* jsou tentýž rod, ale z rozličných částí kmenu, jak to o triasových přeslicích obrovských dokázáno bylo; není přece v kamenouhelném útvaru zjištěno, jestli vůbec, aneb ku kterému *Calamitu* *Equisetites* náleží. Ač se pokusy již o spojení obou učinily, není přece úplně totožnost těchto druhů nad vši pochybnost doznána a proto zde ještě rozdíl podržen bude.

Jediný nalezený kus kmenu podobá se velmi Tab. 10., obr. 4, v Gein. Steinkhlfl. Sachsens nebo Ettings. Fl. Radnic T. I., fig. 4. Po několika člancích následuje článek s okrouhlými bradavkami.

Domněle klasy tohoto druhu pod jmenem *Equis. infundibuliformis* Bronn, Brongniart, Sternberg, Gutbier a pod jmenem *Huttonia* Germar, částečně i Sternberg, popsané, jakož i domnělé pošvy pod jmenem *Bokschia flabellata* Göppert uvedené, zde posud nalezeny nebyly.

#### 2. *Sphenopteris coralloides* Gutb.

Jakkoliv od tohoto kapradí, v Stradonicích tak hojného, v Malých Přílepech toliko malý stlačený kousek vějíře se nalezl, postačil nicméně k určení toho druhu dobře vyznačeného.

#### 3. *Dictyopteris Brongnarti* Gutb.

Těž tohoto druhu nalezeny dosti hojné lístky, však žádný z nich nebyl na způsob srpů ohnutý, ani na zakončení svém do špičky.

Na mnohých místech pozorovány přechody obou druhů *Dict. Brongnarti* a *Dict. neuropteroides* Gutb. do sebe, tak v kamenouhelném útvaru u Oslavan (Zbejšov) na Moravě a též u Stradonic, kdež i připomenuto, že oba druhy velmi blízké si jsou (*Andrée Versteinerungen der Steinkohlfl. v. Stradonic; Neues Jahrbuch f. Min. etc. 1864*), možná, že by se v jediný též stáhnout mohly.

#### 4. *Cardiocarpus emarginatus* Göpp. et Berger.

Plody prostřední velikosti, asi dvě třetiny tak velké jak ony ze Stradonic uvedené, (*Cardiocarpon orbiculare*, Ettingshausen Steinkohlenflora v. Stradonic 1852 p. 16, T. 6., fig. 4.) nalezeny s patrným a dobře vyznačeným jádrem

Bezprostředně ve visutém ložiska jest arkosa vrstevnatá, velmi nedokonale slohem břídlíkatým opatřena; barva jest světle šedožlutavá, běložlutavá, bělošedá až špinavě bělavá; na lomu rovném nerozeznává se pouhým okem složivo, an toto, co velmi drobnozrnné, do sebe splývati se zdá. Však pod slabým zvětšením seznává se, že arkosa složena z převládajících zrníček bělavého, mdle lesklého, celistvého, polorozloženého orthoklasů, vedlé něhož přišedlá zrnka průsvitavého písku kře-

menného zarostly jsou. Do visutého se stává složivo drobnozrnným a jest patrněji vyznačené, též částečně pevnosti ubývá, an složen jest arkosový pískovec toliko z dobře rozeznatelných zrnček křemenných, průhledných, spojených volně zemitým bělostným kaolinem, v němž někdy žlutavé skvrny bývají. Arkosa to tedy toliko nevlastní, ana více orthoklasu žádného neobsahuje. Kaolinová arkosa spojena nepatrnými, poznenáhlými přechody s pravou, pevnou arkosou orthoklasovou. Kaolinové pískovce, kteréž celé visuté kamenouhelného útvaru ukončují, jsou ve své vrchní části dosti zrnité, drolivé, a toliko zřídka lístečky muskovitu v nich zarostlé se objevují.

Mohutnost arkos asi 15 až 40 metrů obnáší. T. VII, obr. 1, *up*.

To co o Malých Přílepech platí, též asi se pro Hýskov hodí, nebo ležaté pásmo skládá se z lupků a pískových lupků, v nichž tolikéž sphaerosiderity uloženy jsou; visuté pak složeno z arkos, jak se zdá, něco mocněji a hrubozrnněji vyvinutých než u Malých Přílep. Též ve visutém proslojku uhelného jsou lupky, ale šedé a písečné; tolikéž i v arkosách se objevují pravé pískovce bělošedavé zrnité s převládajícími zrnky křemene a se spoře vtroušenými lístečky muskovitu.

Pod drnem jsou některé vrstvy arkosy zvlášť bohaté na kaolin.

### Nerosty kamenouhelné pánve Přílepské.

Mimo *uhlí*, v sloji uložené, neschází též stálý průvodčí slojí uhelných, totiž: **pyrit**, kterýž ale v Malých Přílepech není tak hojným jako v jiných slojích ve visutém i ležatém.

Též **křemen** potahuje pukliny v ležatých pískovcích a slepencích v slabounkých vrstvičkách, složených ze skupenin, na způsob na oknech zmrzlých vodních par, sestávajících ze zpotvořených krystalů.

Hlavní zdroj všech nerostů známých jest obsažen v kulích sphaerosideritu, v pásmu ležatém uložených.

**Siderit** v odrůdě celistvé hlinou znečištěné co **sphaerosiderit**, tvoří shluky velikosti již napřed udané v ležatých lupkách.

Barva shluků pevných, lomu celistvého jest uvnitř šedá, špinavě šedá až šedohnědá. Toliko k povrchu se mění v hnědavou poznenáhla; povrch sám sestává někdy v nejkrajnější části své z hlinitého sphaerosideritu, kterýž se škrabat dá v prášek šedý.

Aby se zjistilo, v jakém poměru se asi potažná hutnota ve sphaerosideritových shlukách mění, vzata z Hýskova bochníku podobná kule malá, rovnající se velikostí malé dětské hlavě a určena hutnota z rozličných částí.

Ze středu nebo z jádra shluku byla hutnota nerostu velmi drobnozrnného, šedého, určena množstvím 4.16 grammů a obnášela . . . . . 3.6493; jiná část vzata uprostřed mezi jádrem a mezi krajem shluku, a množstvím 2.77 grammů určena hutnota na . . . . . 3.5919; posléze vzato z kraje shluku nehluboko pod povrchem, snadno se v prášek škrabat dajícím, něco čistého vsí krajní vrstvy, trochu hlinité, prostého sphaerosideritu, jehož potažná váha určena 2.90 grammy se rovnala 3.3507.

Od kraje ke středu tedy v shlukách hutnosti přibývá; čím tedy střed vzdálenější kraje, tím také hutnota vyšší; jelikož pak vyšší hutnotou větší množství těžšího uhličitanu železnatého podmíněno, jest tedy střed bohatší na vlastní rudu; a an střed ve velkých shlukách odlehlejší jest kraje než v shlukách malých, dá se z toho soudit, že shluky velké bohatší jsou o něco shluků menších.

Pamětihodno jest pro sphaerosiderit to, že ve množství asi půl hektogrammu nalezena nepatrná částka antimonu.<sup>36)</sup>

Jakkoliv jak u malých Přílep tak i u Hýskova shluky velice hojné jsou, zdá se, že septarie jsou ještě hojnější shluků (konkrecí) vlastních. Sploštělé kule jsou uvnitř zcela popukané a dutými žilkami ve všech směrech prostoupené; někdy jádro kulí tak převelmi roztrháno jest trhlinami v samé ostrohranné třštky sphaerosideritové, že tyto, nejsou-li slepeny jinými nerosty, opět po rozbití kulí septariových ven se v množství vysypou.

Septarie jsou vlastně pravým zřídlem, z kterých všechny nerosty známy jsou, nebo v trhlinách dutých hojně narostlé se vyskytují, tak že septarie duté beze všech nerostů jsou vzácnější všech ostatních.

**Limonit.** Na výchozím svém jsou shluky sphaerosideritové proměněny zcela v žlutý neb žlutohnědý polozemitý až pevný limonit, kterýž v objímajících se soustředně vrstvách celé koule skládá. Každá vrstva, do které se koule též loupají, bývá složena z jiné odrůdy limonitu; aneb jsou-li vrstvy stejného složení, tedy alespoň zemitým, žlutým limonitem barvicím odděleny bývají. Některé koule jsou uvnitř duté a skládá se vnitřní vrstva, dutinu obklopující, z černohnědého vláknitého limonitu přecistého, kterýž na povrchu dutiny vnitřní černý, lesklý, slabě hrboulovatý neb nepatrně kapalovitě skupený jest. Též některé vrstvy v kulích se střídající, ač vzácněji, sestávají tolikéž z vláknitého limonitu.

Od výchozího do vnitř skal nejsou shluky zcela proměněny v limonit, nýbrž sestávají z malého jádra neproměněného, neb málo porušeného sphaerosideritu, obklopeného hojným sledem vrstev limonitových se objímajících. Čím hlouběji, tím větší jádro a tím méně kor limonitových, až posléze toliko jedinou korou limonitu obalené shluky v pouhé sphaerosideritové kule se mění.

Jak již podotknuto jsou trhliny v septariích zřídlem všech nerostů, kteréž zvlášť u Hýskova v nich v hojné míře se objevují.

**Siderit** jest nerostem nejhojnějším, nebo potahuje až na nepatrné výminky všechny trhliny ve vrstvičce  $\frac{1}{2}$  millimétru mocnosti nepřevyšující, kterou i užší trhlínky mnohdy opět spojovány bývají. Vrstvička jest složena veskrz z pramalých krystalků sideritu barvy šedavě žluté, tvarů —  $\frac{1}{2}$  R, čočkovitě okulacených a jednou z vedlejších os narostlých. Však toliko zřídka jest barva jejich tato zde uvedená, nezrušenému sideritu přináležející; obyčejně jsou nahnědlé až hnědé, což od počínající proměny jich v limonit pochází.

Zcela podobnou tenkou korou, na povrchu druznatou, sideritovou neb částečně v hnědý limonit proměněnou jsou i septarie sphaerosideritu u Kralup v kamenouhelném útvaru zarostlé, ve svých trhlinách potaženy.

Někdy, ač velevzácně jsou tenounké žilky sideritu, trhlínky zcela vyplňující, černé, což původ svůj v zbarvení živčnatou látkou má; jsou to tedy siderity černé, obdobné černým vápencům nebo anthraconitům.



Na sideritu nebo na částečně proměně jeho v limonit jsou všechny ostatní nerosty narostlé, málokdy na holé trhlině ve sphaerosideritu samém.

**Baryt** jest dosti hojným nerostem v septariích. Obvykle však se objevuje v trhlinách co velmi hrubokrystalinický průhledný, neb bělavý až čirý, jakž již po dlouhý čas znám byl z Hýskova (Zippe Verhandlungen der vaterländ. Gesellschaft des böhm. Museums 1842 str. 110.).

Zarostlé kusy barytu, kterými trhliny volně spojeny bývají, an jimi úplně vyplněny nejsou, sestávají z větších, v skulinách smáčknutých krystalů se složnými plochami; plochy štípatelné jsou velké, hladké a lesklé, zároveň i velmi zřetelné. Některé barytové kusy zarostlé jsou tak velké, že se z nich malé tvary podoby  $\bar{P}\infty$   $\infty \bar{P}\infty$ , složené z ploch štípaním povstálých, vyštípati dají.

Potažná váha štěpných průhledných kusů z Hýskova, určená množstvím 1.06 grammů, jest 4.4202.

Však v převelikém množství prohledaných rozbitých septarií podařilo se obmezené množství krystalů, nedokonale vyvinutých, na nichž toliko plochy  $\infty \bar{P}2$ , též vedle těchto  $\infty \bar{P}\infty$  vyvinuty byly, buď hladce neb drsně nebo jako vyhlodané složených. vynajíti.

Však též celých krystalů, obmezených ukončujícími plochami, nalezeno několik. Větší krystaly, ač hladké, lesklé a dosti rovných ploch nedají se přece měřit odrazným úhloměrem Wollastonovým, toliko nejmenší krystalky velikosti 5, 3 až 2 millimétrů dají se měřit, však jsou vzácné velice.

Krystaly barytu jsou sloupkovité, prodloužené dle kolmé osy v postavě dle Naumanna, (tato kolmá osa jest dle délky prostřední). Vybrané, čiré až průhledné krystaly měly hutnoty 4.4626, určené 1.68 grammy.

Některé z poznanych krystalů jsou následující:

$\infty \bar{P}2$  .  $\bar{P}\infty$  .  $OP$ ; nebo

$\infty \bar{P}2$  .  $\bar{P}\infty$  .  $\infty \bar{P}\infty$ ;

$\infty \bar{P}2$  .  $\bar{P}\infty$  .  $\infty \bar{P}\infty$  .  $\bar{P}\infty$ .

Největší z nich šířky a délky prstu, však obvykle mnohem menší; narostlé jsou všelijak; všechny plochy jsou rovné, však toliko  $\bar{P}\infty$  a  $\bar{P}\infty$  se velmi lesknou, někdy též  $\infty \bar{P}2$  a  $\infty \bar{P}\infty$  se lesknou silně, bývají ale též mnohdy drsné. Památne jest to, že v těchto krystalech se objevují na kraji buď jednostranně zároveň s plochami  $\infty \bar{P}2$ , aneb nepravidelně obmezené, sněhobíle zbarvené části barytu, v kterých předokonalý lom dle štěpných ploch se nedokonalým stává. Bělostné zbarvení čirých až průhledných barytových krystalů, kterým se neprůhlednými stávají, pochází od zarostlých krystalečků bílého kaolinu, kterým někdy plochy některé zahrnuty a potaženy bývají. Krystalečky kaolinu podoby šestibokých plátků jsou v barytu ve všech směrech, tedy beze všeho pořádku vtroušené, jak to na poloprůhledných tenkých, málo kaolinem do běla zbarvených štěpných plochách pod drobnohledem se spatřuje.

Bílé baryty ploch rovných sice, ale drsných, mdlých, nelesklých, kteréž velké množství plátků kaolinových zahrnutých obsahují, měly hutnoty 4.0775, určené .77 grammy.

Jestli že se vezme potažná váha kaolinu Hýskovského s 2·70 za základ, dá se vypočítat pro baryt, jehož hutnota udána jest, složení, sestávající z 78·09 barytu zahrnujícího v sobě

$$\frac{21\cdot91 \text{ kaolinu}}{100\cdot00}$$

Proč některé plochy krystalů ač rovné, jsou přece mdlé, nelesklé a jako drsné, vysvětluje se tím, že krystalečky kaolinu, kterýž je pokrýval, zanechaly v nich maličké drobnohledné otisky, jejichž souhrn drsnost podmiňuje. Některé plochy krystalů jsou částečně lesklé, částečně mdlé, což od částečně toliko narostlých krystalečků kaolinu pochází.

Na plochách mdlých, neb slabě třpytivých, nebo i pololesklých se již pod lupou drsnost co od otisků plátečků kaolinových poznává.

Jiné malé krystalečky šířky brka husího až vraního i ještě užší a výšky krátké převyšující šířku jen několikrát, objevovaly na sobě tyto tvary:

$$\begin{aligned} &\infty \tilde{P}2 \cdot P \cdot \bar{P}\infty \cdot \tilde{P}\infty; \\ &\infty \tilde{I}2 \cdot P \cdot \bar{P}\infty \cdot \tilde{P}\infty \cdot \tilde{P}2 \cdot \infty \tilde{P}\infty; \\ &\infty \tilde{P}2 \cdot \bar{P}\infty \cdot \infty \tilde{P}\infty \cdot \infty \bar{P}\infty \cdot P \cdot \tilde{P}\infty \cdot 0P; \\ &\infty \tilde{P}2 \cdot P \cdot \bar{P}\infty \cdot \tilde{P}\infty \cdot 0P \cdot \tilde{I}2; \\ &\infty \tilde{P}2 \cdot P \cdot \tilde{P}\infty \cdot \bar{P}\infty \cdot \tilde{P}2 \cdot \tilde{P}3 \cdot \frac{1}{2} \tilde{P}\infty \cdot 0P \cdot \infty \tilde{P}\infty. \end{aligned}$$

Krystalky jsou čiré neb přeslabě nažloutlé, plochy  $\infty \tilde{P}2$  a  $\infty \bar{P}$  buď lesklé velmi neb částečně třpytivé, neb polomdlé; ostatní plochy všechny přelesklé, rovné jsou a dají se měřit odrazným úhloměrem.

Co však krystalky některé z těchto tvarů velmi památnými činí, jest značné vyvinutí základního osmistěnu  $P$ , tak že jím hranole čtverečné jako jehlancem ukončeny jsou: takové ukončení u barytu v té míře posud známo nebylo.

Plochy jsou buď stejně kolem středu vyvinuty; hojněji však jsou nestejně velké, scházejí též částečně, aneb jsou toliko přeúzké.

Plochy  $\tilde{P}2$  a  $\tilde{P}3$  dávají mezi  $P$  a  $\tilde{P}\infty$  zároveň hrany ležící v hlavním průmětu, v němž delší průsečnice obsažena jest. — Plochy  $\frac{1}{2} \bar{P}\infty$  a  $\tilde{P}2$  dávají hrany, kteréž v průmětu hlavním leží, v němž kratší průsečnice obsažena jest.

**Kaolin** se v trhlinách objevuje velmi hojně a vyplňuje je buď úplně, usazen jsa na sideritu drobno krystalinickém, nebo potahuje siderit, částečně též baryt, do kterého až do jisté hloubky vniká, jsa příčinou jeho bílé barvy.

Kaolin Hýskovský jest bělostný prášek, jemný, na silném světle slabě se třpytící; jestli že velice rozptýlen na tmavé ploše, seznává se prášek složený ze samých předrobných, bílých, lesklých šupinek, jejichž velikost při světle příznivém někdy pouhým okem, snadněji však pod lupou pojmut možno. Pod drobnohledem poprvé p. prof. dr. Šafaříkem co krystaly seznány, kterýž též prvý o tom zprávu dal (Sitzungsberichte der böhm. gelehrten Gesellschaft; Sitzung der Classe für Mathm. u. Naturwissenschaften am 16. Febr. 1870, str. 7. <sup>27</sup>).

Krystaly jsou největší posud známé, šestiboké, ojedinelé neb srostlé tabulky přetenké, vyobrazeny tab. VII. obr. 5.; pod drobnohledem jsou průhledné. Šířka jednotlivých šestibokých tabulek měřena, obnáší na některých krystalkách ·034, ·074, ·097, až ·189 mm.; délky pak některých krystalů určeny: ·074, ·156, ·191,

·213, ·286 millimetrů; nejdelší tabulky tedy  $\frac{1}{4}$  millimetru obnášejí, tedy se již pouhým okem jeden rozměr jich pojímá.

Potažná váha kaolinu z Hýskova, určena ·66 grammy, jest: 2 7047.

V Přílepských septariích též se kaolin práškovitý, bělostný, zarostlý objevuje.

Složení jeho jest následující:

Kaolin, při 100°C sušený, nevydal ze sebe žádné hygroskopické vody a obsahoval:

| Hynek Stuchlý |       |
|---------------|-------|
| $SiO_2$       | 45·81 |
| $Al_2O_3$     | 35·17 |
| $Fe_2O_3$     | 2·99  |
| $CaO$         | ·55   |
| $HO$          | 15·42 |
|               | 99·94 |

Ač co do povstání svého jest kaolin mladší barytu, přece se spíše usazovat počal v trhlinách septarií, nežli tvoření se barytu ukončeno bylo, an v jistých krajních částech krystalů barytových těmito zahrnut jest, barvě je do běla.

**Chalkopyrit** narostlý jest na krystalcích sideritu nebo vrostlý do barytových krystalů. Maličké zpotvořelé krystalky chalkopyritu, až  $\frac{1}{2}$  millimetru dlouhé,

jsou složeny z tvarů  $+\frac{P}{2}$  a  $-\frac{P}{2}$  co osmistěny; jen málokdy převládá

$+\frac{P}{2}$  nad druhým čtyřstěnem o něco. Též se vyskytují jiné plochy, kteréž pro drobotu svou a pro nepravidelnost celých tvarů se pojmout nedají.

Krystalky narostlé jsou lesku modrozelenavého, do červena se měnícího, zarostlé krystalky v barytu jsou barvy mosazné, jen slabě do zelena neb červena zcela neb částečně nahnědlé. V lomu jsou vesměs barvy mosazné.

Dle stáří svého jest kyz měděný současný s barytem.

**Galenit, Sphalerit.** O těchto převzácných nerostech se nedá ničeho více říci, než že jsou v maličkých krystalcích narostlé na sideritů; nalezeny byly převzácně.

Kromě těchto nerostů pokrývají někdy slabé nádechy hnědožlutého limonitu baryt, kaolin, jakož vůbec trhliny, čímž čiré baryty na povrchu slabě nahnědlé, kaolin pak slabě nažloutlý se jeví. Však jsou tyto povlaky přetenké vždy vzácnější, než aby se na ně zvláštní ohled bral.

Sestaví-li se tyto nerosty, v septariích Hýskovských obecné, v řadu, jak dle stáří po sobě následují, obdrží se následující přehled, počínaje s nejstarším a nepočítaje v to nejstarší sphaerosiderit sám.

1. Siderit
2.  $\left. \begin{array}{l} \text{Baryt} \\ \text{Kaolin} \end{array} \right\}$  současný s barytem jest chalkopyrit.
3.  $\left. \begin{array}{l} \text{Baryt} \\ \text{Kaolin} \end{array} \right\}$

Galenit a sphalerit jsou nejistého stáří, snad též s barytem současné.

Ještě zbývají nějaké nerosty ze septarií Hýskovských a Přílepských, kteréžto vyskytující se ojedinelé, do řady předešlé vřaděny býti nemohou.

Na tenkých povlacích sideritu, pokrývajících v droboulinkých druzách trhliny

v septariích Hýskovských a Přílepských, narostlé jsou tenounké malé bradavičky, drobné, buď ojedinelé aneb v celý povlak tenký spojené. Barva bradavek jest šedavá, mléčná, až špinavě žlutá. Šedavé bývají okrajem mléčným obroubeny. Jinak jsou průsvitavé. Na povrchu bývají bradavky nerovné a někde na nich jak polovokrystalisované, však nezřetelné plochy se objevují. Jakousi podobu jeví tenounké bradavky s bradavkami mléčného cukru vyhraněného. Tvrdost jich jest značná. Fluorit je nerýpe; toliko orthoklášem bývají rýpány. Ostatní vše o nich neznámé jest, nebo ani hutnota ani lučebné sloučenství se nedá určit, an množství daleko nedostačuje. Malý kousíček nerostu záhadného, na kterém něco sideritu přirostlého bylo, an se odděliti nedal, rozpuštěno v sehnané kyselině solné. V roztoku nalezena kyselina fosforečná  $PO_3$ ; jestliže neobsahuje siderit sám značnější množství kyseliny fosforečné, o čemž napřed již pochybovat možno, tedy by byl nerost nějakým fosfátem. Jakým asi by sblíženě býti mohl, nedá se určit, nebo jest řada nerostů jako amphotit, attacolith, barrandit, kirrolith a jiné, kteréž jsouce fosfátany, mají tvrdost vyšší tvrdosti fluoritu, značná.

Prozatím se o nerostu nic bližšího nad toto udat nemůže.

**Aragonit.** Vedle toho neznámého nerostu na sideritu, nebo na něm samým, narostlé jsou čiré malé krystalky aragonitu, složené ze sloupků, zároveň dle hlavní osy srostlých; buď ojedinelé vzácné, nebo v druznatých chomáčkách spojené, což hojnější jest. Délka největších krystalků až 2 millimetry, šířka až  $\frac{1}{3}$  millimétru obnáší.

Na hranolech rozeznávají se plochy  $\infty P$  a  $\infty \tilde{P}$ , kteréž tvary  $\tilde{P}$  a též  $P$  ukončeny bývají.

Jednoduché krystalky jsou vzácné proti krystalům, srůstem z menších ve směru hlavní osy povstalým.

Tyto nerosty, o jejichž poměrném stáří k předešlým ničeho více známo není, než to, že se zdají být snad mladší barytu, an na některých místech na kaolinu, siderit přeslabě pokrývajícím, bradavičky narostlé jsou; mohou se dle stáří, pomíjeje opět nejstarší sphaerosiderit, takto sestavit:

1. Siderit.
2. Kaolin.
3. Neznámý nerost Hýskovský (snad nějaký tvrdý fosfát zemité).
4. Aragonit. —

Nesmí se pohlížeti, o nerostu zvláštním, ač tolikéž neznámým, který se ve sphaerosideritech u malých Přílep nalezá. V trhlinách septarií se objevují narostlé až 2 i 3 millimetry mocné kory nerostu lehkého, lesku mastného, barvy šedožlutavé až špinavě běložlutavé, průsvitavého, snadno pukajícího a odlupujícího se v drobtách, jejichž lom lasturový jest. Nerost beztvárný, tvrdosti nepatrné 1·5 až 2, velice křehký, má prášek světležlutavý.

Složení nerostu neznámého Přílepského jest Borickým (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paleont. von Leonhard und Geinitz 1864 str. 701) zkoušeno a sice: nerost v trubce otevřené vydává ze sebe dosti vody kyselé, kteráž, tuhne, v mastné skvrny se mění, an nerost, zčernající zářem, se v tenké plátky zuhelnatělé na povrchu svém loupá. V zavřené rource vedle par vodních vyvíjí se zahříváním bílý, hustý kouř, jež spáleninou cítiti jest. V perliče soli fosforečnanu

sodnatého před dmuchavkou spaluje se, a šumě rozpouští se až na vyloučenou kyselinu křemičitou. Ve vodě a líhu se částka nepatrná z nerostu rozpouští a sice obsažen ve vodnatém roztoku siran hořečnatý vedle nepatrných částek siranu vápenatého a siranu sodnatého a něco ústrojně látky. V kyselinách se úplně a snadno rozpouští, vyvíjeje něco málo bublin a vylučuje za krátký čas chomáčky kyseliny křemičité. V žiravém louhu draselnatém sbělí.

|                                   |                                    |       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| Rozbor nerostu Přílepského jest : | <i>HIO</i>                         | 18·13 |
| látku ústrojná spalitelná         |                                    | 27·19 |
|                                   | <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 13·87 |
|                                   | <i>PO<sub>3</sub></i>              | 8·74  |
|                                   | <i>SO<sub>3</sub></i>              | 6·98  |
|                                   | <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 3·72  |
|                                   | <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 9·27  |
|                                   | <i>MgO</i>                         | 8·96  |
|                                   | <i>CuO</i>                         | 1·10  |
|                                   | <i>NaO</i>                         | 1·12  |
|                                   | <i>S</i>                           | ·55   |
|                                   |                                    | 99·63 |

Jakého složení asi ústrojná sloučenina, v nerostu obsažená jest, nebo jak asi neústrojně sloučeniny složiva spojeny jsou, o tom ovšem ničeho posud známo není a pro vzácnost nerostu samého snad tak brzy nebude.

Konečně dlužno se zmíniti, že z báňských vod Přílepských se usazuje limonit (není-li to nějaký siran železitý, ve vodě nerozpustný) a selenit.

#### Souhrn všech v kamenouhelném útvaru Malo - Přílepsko - Hýskovském objevených nerostů.

|    |                                 | Ve vrstvách útvaru<br>kamenouhelného | V septarích<br>sphaerosiderita |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Siderit . . . . .               | †                                    | †                              |
| 2  | Hacmatit . . . . .              | †                                    |                                |
| 3  | Limonit . . . . .               | †                                    | †                              |
| 4  | Křemen . . . . .                | †                                    |                                |
| 5  | Aragonit . . . . .              |                                      | †                              |
| 6  | Baryt . . . . .                 |                                      | †                              |
| 7  | Selenit . . . . .               | †                                    |                                |
| 8  | Kaolin . . . . .                | †                                    | †                              |
| 9  | Nerost Hýskovský . . . . .      |                                      | †                              |
| 10 | Pyrit . . . . .                 | †                                    |                                |
| 11 | Chalkopyrit . . . . .           |                                      | †                              |
| 12 | Galenit . . . . .               |                                      | †                              |
| 13 | Sphalerit . . . . .             |                                      | †                              |
| 14 | Nerost Malo-Přílepský . . . . . |                                      | †                              |
| 15 | Uhlí kamenné . . . . .          | †                                    |                                |

### III. Rudy útvaru křídového.

Křídový útvar v naší krajině zastoupen hlavně pásmem jeho nejnižším, pís-kovcovitým, kteréž toliko na nejvyšších místech mladšími vrstvami opuky pokryty jsou. Opuky, jež žádné důležitosti nemají, an v nich žádných rud se nevyskytuje, táhnou se v úzkém pruhu, pokrývající pís-kovce křídové od Červeného Újezdu okolo Hájku k Chejní, Sobínu a Zlejčínu, kdež po přestávce v údolí opět na výšině Bílé hory a u Tresovic, potom též na Vidovlích u Jinonic se objevují. Mohutnost jejich není veliká. V pís-kovcích, pod těmito opukami uloženými a mnohem větší pruh země pokrývajícími než tyto, není rud železných uložených.

Rudy železné se vyskytují toliko v onom pásmu pís-kovců, kteréž v nesou-vislých malých prostranstvích celé rozhraní asi mezi spodním a vrchním útvarem silurským pokrývají. Hranice pís-kovců vůbec nedá se pro nedokonalé odkrytí jich ani sblíženě určit a jest valná část ohraničení křídového útvaru od silurského na mapě Tab. I. toliko dle oka a možnosti sdělána, tedy hrubá a nejistá.

Na vrchách jihovýchodně od Loděnic a západně od Vysokého Újezda se roz-prostírají slabé vrstvy pís-kovců buď osamotnělé, buď spojitě mezi sebou a dají se odtud kolem Vysokého Újezda okolo Mezouně až k jižní části vesnice Tachlovické sledovat, jak se zdá, že v bezpřetržitém spojení. V této části jsou nejnižší vrstvy křídového útvaru zastoupeny pís-kovci zrnitými, drobnó- a hrubozrnnými a potom vrstvami slínovitého pís-kovce jemnozrnného. Pís-kovce obyčejně kypré bývají, jsouce spojeny volně spojivem vápennatým a slínovitým; toliko jižně od Tachlovic jsou velice tvrdé v jistých vrstvách, an je tmel křemenný slučuje. Barva jich je světlá, šedá až žluto- neb hnědošedá. Též se mezi Tachlovicemi a Mezouní mocné vrstvy bělošedé hlíny hrncířské objevují, o kterých posud nezdá se být uložení zjištěno, jestli totiž pod pís-kovci leží.

V této části toliko limonity se nalézají ve vrstvách pís-kovců a slínových pís-kovců.

Tachlovickým úvalem přetržené vrstvy křídového pís-kovce se objevují opět na vysočině západně od Zbuzan a dají se odtud sledovat až k Ořechu, ba i za Ořechem (východně) se ještě v osamotnělých ostrovech vyskytují na vysočině vá-penné mezi Řeporyjemi a Holínem, mezi Řeporyjemi a Slivencem (na Draších), u Slivence, u Klukovic a na přemnohých jiných místech.

Zde sestávají vrstvy pís-kovců z oblásků křemene co ořech velikých, spojených menšími zruky křemene; též drobnozrnnější pís-kovce, kdekoliv se střídají s hrubo-

zrnnými, jak se zdá převládajícími, nebývají pevněji spojeny těchto, any se snadno v písek drolí. Pod pískovci na přemnohých místech pískovcovité slíny a slabé vrstvy slínů šedých, šedorudých a bělorudých uloženy bývají.

Mohutnost pískovců, sblíženě vodorovně uložených, na dvou místech proražena a sice na cestách západně od Zbuzan z Mirešic do Chejnice a Chotče vedoucích a zjištěna 34 až 40 métry.

Kromě spojiva pískovcovitého jsou některé vrstvy, nebo toliko vodorovné pásy pískovců spojeny haematitem barvy tmavorudé; převládá-li tmel rudový nad zrny pískovými, tu by na prvý pohled celý pískovec rudě samé se dosti podobal. Železité pískovce bývají někdy dosti pevné.

V ležatých vrstvách slínů pískovcových, jakož i v drobnozrnných pískovcích samých, nalézají se obyčejně dosti zároveň s vrstevnatostí pruhy slabé, úplně prostouplé limonitem nebo haematitem. Jestliže převládají písková zrnka nad rudou, přechází pískovec rudou tmavě do hněda, neb ruda v zbarvený rudnatý pískovec, v kterém na některých místech zrnka písku tak zatlačena jsou, že toliko pouhá ruda, trochu hlinitá, převládá. Na některých jiných místech, zvlášť hojně v měkkých slínech, vyskytují se celé krátké, slabé pruhy rovné neb nerovné, složené toliko z čistě rudy, na okraji svém jen něco znečištěné.

Všecky rudy, které se na povrchu zemském objevují co velmi čisté, pocházejí z těchto nejnižě uložených slínů; povrch jejich jest ovětráním znečišťující, nuze kory slínovate neb pískovcovité prost.

Mezi čistými rudami a pískovci, rudou spojenými, bývají hojně přechody.

Tím, že se rudy toliko v slabých pruzích neb pásech i závalkách, nebo též zároveň s vrstevnatostí, co menší nepravidelné kusy neb závalky vtroušeny objevují mezi pískovci a slíny pískovitými; vysvitá z toho, že ač někde dosti hojně vtroušeny jsou, přece se nesouvisle v málo valném množství objevují a tudíž ve větším množství by se ani dobývat nedaly. Rudy, jejichž velikost až hlavě se rovná, jsou sice částečně velice čisté, a na pohled bohaté se býti zdají, zvlášť jestliže se v polích nebo ve vodních zmolkách roztroušené a opláknuté nalézají.

Nyní se rud nedobývá právě pro velikou roztroušenost jich ve vrstvách křídových; zajisté ale dříve křídové čisté rudy vyhledávány byly častěji, buď z potoků nebo z polí samých, nebo též i na ně kopáno, o čemž svědčí zbytky nalezených prastarých pecí a strusek okolo Klukovic, v kterých toliko křídové čisté rudy taveny býti mohly, an se samojediné v okolí nalézají.

Skamenělin v pískovcích křídových posud nenalezeno, toliko v některých, haematitem spojených, velmi rudnatých vrstvách v údolí Dalejském pod Holínem nalezeny nezřetelné zhytky otisků stonků a táhlych listů rostlin křídových.

Co se týče obzoru neb pásma, v kterém se rudy objevují, též náleží tato do nejspodnějšího přesnovodního pásma, kterým v Čechách křídový útvar vznik bere a kteréž dle pojmenování, zavedeného profesorem Krejčím, proslavivším se prozkoumáním křídý české, se pásmem peruckým nazývá. Perucké pásmo pak náleží do stupně cenomanského. Pískovce Korycanské, tolikéž cenomanské, uloženy na pískovcích a slínech peruckých, jsou bezrudé, jakož i vyšší opuky pásma bělohorského (turonské?).

Rudy, kteréž co závalky ve vrstvách pískovců hojně vtroušeny se vyskytují, jsou :

1. **Siderit**, co sphaerosiderit. Táhle shluky velikosti přeznačné pěstě nalezeny toliko na jediném místě na vysočině vápenné pravého břehu Dalejského potůčka, jihovýchodně od Řeporyjského mlýna nebo jižně od Ohrady.

Na vrstvách vápenců silurských pásma *F* jsou uloženy nezřetelně slabé zbytky vrstev šedých slínů a pískovců slínovatých, v kterých uloženo veliké množství limonitů, až co pěst velikých, ba ještě větších, mezi kterými vzácně se leckdes sphaerosiderit celistvý, šedohnědý, na pohled velmi čistý, objevuje. Kora sphaerosideritu sestává buď z limonitu; nebo až do jisté hloubky ze samých vrstev hnědých složen jest. Velká část limonitů ostatních seznává se co proměna sphaerosideritových shluků.

2. **Limonit** jest poměrně rudou nejvíce rozšířenou, nebo se nalézá jak jižně od Loděnic tak u Vysokého Újezda, Mezouně, jihozápadně od Tachlovic jakož i u Řeporyje na udaném místě. Na dvou místech pracemi seznáno, že skutečně v nejnižších slínovatých šedých pískovcích, kteréž bezprostředně na vápenné vrstvy vrchního silurského útvaru přiléhají, co závalky uloženy jsou: a sice jižně v Tachlovicích v lomu vápenném a západně od Zbuzan na cestě mezi Chejnicí a Zbuzany asi v pokračování vlaku Zbuzanského ložiska.

Limonity, kteréž na polích nebo ve zmolcích vodních roztroušené se objevují jsou hnědé, lomu nerovného, celistvého slohu aneb ze samých tenkých vrstviček nerovných složené. Kusy složené z vrstviček zdají se ne-li výhradně, tedy alespoň z valné části pocházet z rozpadlých dutých kulí hnědele, jejichž kory soustředně miskovitým slohem vyznačeny byly.

Neporušené limonity prací v nejnižších pískovcích slínovatých, šedých, objeveny, bývají buď zcela z celistvého hnědého limonitu složené, zvlášť jsou-li malými závalkami; větší vtroušené kusy však složeny bývají z mocnějších vrstev hnědých, nerovně se objímajících a do sebe splývajících. Uvnitř jsou buď hnědé vrstvy duté a tu nejvnitřnější část jich mění se v slabou vrstvu tmavokaštanového vláknitého limonitu, jehož povrch do dutiny vnitřní obrácený, jest smolně lesklý, černý, někdy slabě, vlnovitě prohýbaný. Nebo jest vnitřek vyplněn žlutohnědým zemitým okrem, jenž nezřídka mezi vrstvicemi hnědými též uložen bývá; aneb zahrnuty vrstevy limonitu jádra slínu, kteréž teprve za drahý čas se deštěm vyplakují; tyto rudy poslední jsou nuznější předešlých.

Někdy mnoho závalků menších v jeden velký nepravidelný srůstá.

Též slabé vrstvičky žlutohnědé celistvé rudy čisté se vyskytují, kteráž při bráním zrnček pískových přechodem s pískovci slínovatými neb pískovci spojena jest.

3. **Haematit**. Na cestě z Měšic do Chejnice, v místech mezi Zbuzany a Dobříčím „na průhoně“ zvaném, do obce Zbuzanské náležejícím, jsou šedé, nejnížší slíny křídové částečně rudé a vystupují na den v slabém souvrství beze všeho pokrytí pískovci. V šedých a rudých slínech a slínech pískovcovitých, v nichž též rudnatý pískovec podřízeně se střídá, jsou uloženy krátké neb táhlejší závalky haematitu. Závalky haematitu uložené vedle sebe a nad sebou v slínech rudě zbarvených v pásech vrstevnatých stíhají jeden druhý v značném množství.

Obyčejně jest ležaté pod každým pásem závalků složené ze světle rudých, nedokonale až dokonale břidličnatých slínů. Závalky málokdy převyšují velikost hlavy, obyčejně jsou mnohem menší.



Památný jest sloh krevele pevného, nebarvicího, an ooliticky vyvinut jest. V převládající základní hmotě červené až tmavocihlové, celistvé, lomu nerovného, jsou vtroušeny hojně kuličky nekonale neb nepravidelné kulovité, velikosti droboučké vky až značného hráchu. Oolithy jsou barvy velmi tmavorudé, na ohlazeném povrchu lesklé, černorudé, an základní hmota červená, mdlá, nelesklá neb nepatrně lesklá jest.

Ač základní hmota červená není příliš měkká a dosti pevná, jsou oolithy mnohem pevnější a skládají se vesměs z celistvého černorudého haematitu, an vryp jejich též červený jest, jako onen základní hmoty. Kuličky jsou nepravidelně vtroušeny nedotýkají se mezi sebou, an mezer základní hmotou vyplněných mezi nimi jest, do kterých by se ještě dvojnásob tolik oolithů vešlo.

Splacatění kuliček se v žádném směru pravidelně nejví. V základní hmotě, ač se z ní vyrážet mohou tlučení, jsou přece dosti pevně zarostlé. Ani celá ruda ani zarostlé oolithy neodchylují magnetickou jehlu ani dost málo.

Kdekoliv haematit přechody pomenáhlými nebo dosti ostrými od rudého pís-kovce dělen jest, ubývá mu oolithů, tak že takové rudy toliko červené až rudé a toliko celistvé a mdle lesklé bývají.

Mimo naznačené místo mezi Zbuzany a Dobříčí vyskytují se červené oolithické rudy všude na cestách, kde slíny křídové vycházejí, tak na cestách z Ořecha do Dobříče a ze Zbuzan do Dobříče. Hojně vtroušeny jsou též kolem Ohrady, Nové vsi až blízko k Butovicům po všech cestách a polích.

Do limonitu jsou přechody haematitů oolithických velice vzácný, ač se též částečně, ale toliko velmi obmezeně objevují.

Jiných rud v křídovém útvaru není, aniž útvar ten něčím jiným ještě mimo to památný jest v naší krajině.

## IV. O některých zvláštních nerostech.

### A. Nerosty silurské.

#### 1. Chamoisit.

Nejstarší zpráva o tomto nerostu obsažena v Journal des mines No. 205 Janvier 1814 v 35. svazku na str. 19. Báňský inženýr Gueymard ve svém popisu tehdejšího departementu Simplonu popisuje tuto rudu, nalézající se v obci Chamoison (tehdež francouzské) ve vrchu téhož jména v okrese Saint-Maurice-ském pod jménem „mine de fer oxydé en grains agglutinés“.

Ve vrchu složeném z šedavého vápence jest uložena ruda ve dvou místech v nižším a vyšším (ložiskách?) na krátko se prostírajících a velmi zřetelně vrstevnatých. Visutý vápenec, dotýkající se částečně bezprostředně rudy, obsahuje množství skamenělých skořepin mušlí jakož i ammonity. Z toho vysvítá jasně, že jest ruda chamoisitová uložena v některém z útvarů druhohorních, tedy od křídového počínaje až k triasovému nebo ve všech se objevují buď Ammonity neb jim podobné, jiné Cephalopody (Ceratity).

Udávaje rozbor rudy, mluví však Gueymard o žíle rudní snad toliko omylem; rozbor pak jest následující:

|                             |       |      |               |                          |
|-----------------------------|-------|------|---------------|--------------------------|
| červeného kysličníku železa | 62·50 | tedy | $Fe_2O_3$     | kysličník železitý,      |
| kysličník hlíny             | 8·    | „    | $Al_2O_3$     | „ hlinitý,               |
| křemene                     | 14·50 | „    | $SiO_2$       | kyselinu křemičitou,     |
| vápna                       | 3·75  | „    | $CaO$         | kysličníku vápenatého    |
| těkavých látek              | 13·   | „    | $HO$ a $CO_2$ | vody a kyseliny uhličitó |

101·75

Na tedejší čas jest rozbor dosti přesný, a že převyšuje součet látek rudu skládajících číslo 100, vysvětluje se tím, an by místo  $Fe_2O_3$  se  $FeO$  psáti a přepočítati mělo, čímž by méně než 100 v součtu vyšlo.

Jelikož železo i ocel vytavené z rudy výborné jakosti býti mají, následuje z toho, že v snadno tavitelné rudě pramálo neb žádné množství kyseliny fosforečné neb sírové obsaženo jest. —

Chamoisit z vrchu Chamoison jest ještě po tyto dni co vzor černé rudy do popředí postaven, an též jeho analyza co vzorec sloučenství do všech stručných nerostopisů přešla.


Prvá přesná analýsa chamoisitu z naleziště, od kterého jméno své obdržela pochází z roku 1820 od Berthiéra a jest uveřejněna v *Annales des Mines* V. 1820 str. 393.

Ruda k analýsy vzata nebyla sama v sobě čistý chamoisit, an mimo vlastní rudy v ní 14·4%  $CaO$   $CO_2$  uhličitanu vápenatého a 1½%  $MnO$   $CO_2$  uhličitanu manganatého obsaženo bylo.


Chamoisit šedozelenavý, oolithický, tvrdosti asi 3, potažné váhy 3—3·4, vyrušující z klidu jehlu magnetickou; prostý všech uhličitanů zmíněných jest složen dle Berthiéra z:

|           |        |                  |              |                |   |
|-----------|--------|------------------|--------------|----------------|---|
| $SiO_2$   | 14·30  | množství kyslíku | O . . . 7·42 | poměr kyslíku: | 2 |
| $Al_2O_3$ | 7·80   | „                | 3·64         | „              | 1 |
| $FeO$     | 60·50  | „                | 13·70        | „              | 4 |
| $HO$      | 17·40  | „                | 15·50        | „              | 4 |
|           | 100·00 |                  |              |                |   |


Z poměru kyslíku sesteven lučební vzorec:




což jinak psáno se rovná:



Těž se ale píše vzorec takto:



nebo trochu čistěji co




|                                                 |           |       |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| Dle prvního vzorce měla by černá ruda obsahovat | $SiO_2$ : | 13·6  |
|                                                 | $Al_2O_3$ | 7·5   |
|                                                 | $FeO$     | 63·1  |
|                                                 | $HO$      | 15·8  |
|                                                 |           | 100·0 |

Však přehlednou-li se všechny tyto vzorce, jest v prvních poměr kyslíků:

$SiO_2$  :  $Al_2O_3$  :  $FeO$  :  $HO$ , jako 2 : 1 : 4 : 4 v posledním však jest

jako 6 : 3 : 11 : 12, což bližší k pravdě: ale ani

ten poslední poměr není dosti určitý, an z číslic množství kyslíku naznačujících vlastně by měl ještě sblíženější poměr 6 : 3 : 11 : 13 vysvitat, z kteréhož se dá odvoditi vzorec pro chamoisit, jak z Berthiérovy analýsy se sloučenství nejbliže druží co:



Jak asi jednotlivé částky chemické složiva vzorec chamoisitu z chamoisonu blíže seřaděny jsou, o tom ničeho se domýšlet nedá. <sup>39)</sup>

V novějším čase se o geologickém uložení chamoisitu ve Wallisu nových vědomostí nabylo (B. Studer Index der Petrographie und Stratigraphie der Schweiz und ihrer Umgebung 1872).

Chamoisit tvoří totiž 10 až 15 metrů mohutné ložisko ve vápenci a vápencové břidlici v severním postranním údolí Chamoison v dolním Wallisu blízko vrchní hr-

nice lesů asi 1910 metrů nad mořem. Ještě před několika roky byla ruda v Ardon-u tavena.

Dle skamenělin v rudě nalezených, jako Ammonites, Belemnites, Rhynchonella lacunosa náleží ruda do jurského útvaru, oddělení Malmu, étage Oxfordien (Fournet annales de l'agriculture de Lyon 1849).

Ruda železná, podobná chamoisitu se objevuje tolikéž v pozadí za Sixt-em na jižním sklonku Dents Blanches, kteráž tolikéž do útvaru jurského a sice do spodního Malmu, Callovienu, náleží.

Tyto chamoisitové rudy se nikterak nesmí vřadit k rudám oolithickým hnědým a rudým (limonit a haematit), na kteréž jurský útvar tak bohatý jest, aniž s nimi změnit, an se tyto v zcela rozdílných étagích v Liasu a Doggeru uloženy objevují (v pásmech Murchisonovém a Parkinsonovém).

Mimo chamoisit (calcitem prostoupeného) z údolí Chamoisonu u Saint Maurice, blíže Ardonu ve Wallisu ve Švýcarsku, udávjí se ještě Mettenberg v Bernském Oberlandu (Švýcarsko) a Bernwald ve Vogezech, kdež podobný chamoisit se nalézá, aniž by něco bližšího o složení aneb uložení o něm povědomo bylo.

Jiné odrůdy chamoisitu jsou z Bretońska ve Francii známé a sice podán popis od Puillon Boblaye-a v článku: Essai sur la configuration et sur la constitution géologique de la Bretagne“ obsaženém v Mémoires du Muséum d'histoire naturelle Tome XV, 1827, str. 49.

Ruda, nazvaná Fer silicaté, podobná chamoisitu (popsaná na str. 93 až 98) uložena jest v starých břidlicích zelenavých, lesknavých, v kterých tak zvané diabasy uloženy jsou a jež břidlice drobové z útvaru přechodního (silurský a devonský) pokrývají. Však seznáno, že břidlice náležejí do nejstaršího pásma přechodního útvaru. Hlavní ložisko rudy odkryto jest v lese Lorges u Quintin-u, odkud se hutě v Pas u Quintinu (arrondissement Saint-Brieuc, département Côtes du Nord) zásobují — v mohutnosti 15 metrů, aniž by toho času bylo ležaté dostiženo bývalo. Ve visutých břidlicích nad ložiskem zarostlé opět leckdes závalky a pásy rudy, nad kterýmiž opět následuje ruda, zcela podobná oné hlavního ložiska, ve vrstvě 1 metr mocné, pokryta jsouc zelenavými břidlicemi.

Chamoisit jest modročernavý, prášek jeho šedý, sloh jeho trochu břidličnatý a zároveň oolithický, an sestává ze soustředně složených kuliček spojených základní hmotou, téhož složení, jen že trochu uhelnatou látkou prostoupené. Kuličky jsou směrem vrstevnatosti sploštělé, málokdy rozsáhlejší dvou čárek (asi 3 až 3 1/2 milimétru). Ruda jest magnetická, před dmuchavkou se oolithy vyblednuvší zprvku, zářem nesnadno v černou strusku taví.

Analýsa pocházející od Berthiéra jest :

| $\alpha)$              |             |
|------------------------|-------------|
| $Fe_2O_3$              | 48·8        |
| $FeO$                  | 23·4        |
| $SiO_2$                | 13·0        |
| $Al_2O_3$              | 12·0        |
| $Cr_2O_3$              | ·3          |
| uhlí a $HO$ (vyžíhané) | 2·5         |
|                        | <hr/> 100·0 |

Od lesa Lorges se táhnou rudonosné vrstvy až k Plurien přes obce d'Iffiniac (se serpentinem a diabasem společné), Saint-Alban a Plérneuf; kteréž mimo vtroušeného chamoisitu obsahují též plástky ve vrstvách uložené. Též u Plérin Trémuson a jinde (západně od Saint-Brieuc) se rudy spolčené s ohromnými spoustami dioritu nevrstevnatého objevují.

Též břidlice se objevují, v kterých vtroušeno plno oolithů velikosti žitného zrna, sestávajících z téže rudy jako ona v lese Lorges jest. Jak v Bretagni tak i ve Vogesách jsou rudy podobně uložené a spolčené s ohýbaně břidličnatými břidlicemi, doprovázené horninami amphibolitickými.

Od toho času se vědomosti o tomto chamoisitu, uloženém ve vrstvách břidličnatých útvarů přechodných, o něco rozšířely a známo jest ložisko u Pas Moncontour blíže Saint-Quentin (département du Morbihan) v mohutnosti 2 metrů, složené z rudy takřka totožné s chamoisitem, an ze samých oolithů spolu spojených, barvy modravé, sestává. Ruda, kteráž se dobývá, jest též magnetická a složení následujícího:

(A. Dufrénoy, *Traité de Mineralogie* 2ème edit. 1856, Tome deuxième, strana 600.) <sup>40)</sup>

| $\beta)$  |        |
|-----------|--------|
| $Fe_2O_3$ | 49·10  |
| $FeO$     | 23·60  |
| $Al_2O_3$ | 14·10  |
| $SiO_2$   | 10·85  |
| Ztráta    | 2·35   |
|           | 100·00 |

Dle Des Cloiseaux; (*Manuel de Mineralogie*, I. part 1862 str. 470), odkud též do Dana; (*A System of Mineralogie*, fifth edition 1869 na str. 796 udané popisy přešly) jest chamoisit z toho zde udaného naleziště v Bretagni málo břidličnatý se slohem zároveň oolithickým, černě zelenavý, modravý neb šedavý, prášek jeho šedozelenavý neb černý, zbarvený od málo částek uhelných v rudě rozptýlených. Tvrdost asi 4, hutnota určena Delesse-m 3·99. Magnetický jest velmi tvrdý.

Dvě odrůdy, pocházející z Quentin-u Saint-Brieuc, analysovány a sice jest složení následující:

| $\gamma)$      |       | $\delta)$     |        |
|----------------|-------|---------------|--------|
| Dle Berthiéra, |       | dle Delesse-a |        |
| $Fe_2O_3$      | 48·8  |               | 65·45  |
| $Cr_2O_3$      | ·3    |               | ·50    |
| $FeO$          | 23·4  |               | 13·25  |
| $Al_2O_3$      | 13·3  |               | 7·50   |
| $CaO$          | .     |               | ·45    |
| $SiO_2$        | 11·0  |               | 6·50   |
| $HO$           | .     |               | 4·85   |
| uhlík          | .     |               | 1·30   |
| hlína          | 3·2   |               | ·20    |
|                | 100·0 |               | 100·00 |

Mimo tato vytknutá naleziště, udává Des Clauseaux ještě ono u kapličky Saint-Oudon u Segré, (département de Maine et Loire), kdež malo oolithická odrůda se objevuje, jejíž prášek hnědorudý jest.

Jest-li že se všechny čtyry udané analýsy přehlednou, sezná se, že ač prvé tři trochu se shodují, čtvrtá z nich se odchyluje velmi.

Přehlednou-li se součástky v menším množství v složení obsažené, obdržely by se pro tyto čtyry analýsy následující poměry kyslíku v součástkách sloučenin obsažených.

|                    | $\alpha)$ | $\beta)$ | $\gamma)$ | $\delta)$ |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kyslík z $Fe_2O_3$ | 14.64     | 14.73    | 14.64     | 19.64     |
| $FeO$              | 5.20      | 5.24     | 5.20      | 2.94      |
| $Al_2O_3$          | 6.08      | 6.59     | 6.22      | 3.51      |
| $SiO_2$            | 6.93      | 7.52     | 5.80      | 3.46      |
| $HO$               | 0         | 0        | 0         | 4.31      |

Poměry kyslíků jsou tedy v:

|           | $\alpha)$         | $\beta)$ | $\gamma)$ | $\delta)$   |
|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| $Fe_2O_3$ | 2.9 neb z hruba 3 | 2.9 3    | 2.9 3     | 6.55 neb 13 |
| $FeO$     | 1 = 1             | 1 = 1    | 1 = 1     | 1 „ 2       |
| $Al_2O_3$ | 1.2 1             | 1.3 1    | 1.2 1     | 1.2 „ 2     |
| $SiO_2$   | 1.2 1             | 1.4 1    | 1.1 1     | 1.1 „ 2     |
| $HO$      | 0 0               | 0 0      | 0 0       | 1.4 „ 3     |

Dle poměrů kyslíků dal by se pro prvé tři bretoňské chamoisity  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sestavit vzorec z hruba:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 (3 Fe_2O_3 \ Al_2O_3) \\ 3 (2 FeO \ SiO_2) \end{array} \right\};$$

poslední  $\delta$  pak by měl složitý vzorec:

$$\frac{12 Fe_2O_3 \ 2 Al_2O_3}{3 (2 FeO \ SiO_2)} + 9 HO;$$

aniž snad ze vzorců se soudit dá, že ruda skutečně tím způsobem složena jest.

Není sice známo, jest-li všechny chamoisity analysované byly stejně čisté neb nezrušené; však to z rozboru přece vysvítá, že chamoisit dle rozličných odrůd svých se v jediném ložisku mění co do sloučenství svého.

V mnohých nerostopisech, jmenovitě v Huot-ově Mineralogii 1841, str. 290 jest chamoisit uložený v ložiskách v břidlicích útvaru přechodního v Bretagni, nazván *Bavalit*-em <sup>41)</sup>.

Nejobšrnější práce uveřejněná o chamoisitu jest od Berthiéra v Annales des Chimie et de Physique Tome XXXV, 1827 pod názvem „Sur la composition de Minerais de fer en grains“.

V útvaru jurském (oolithickém) se objevují vrstevnaté oolithické rudy černé s břidlicemi hlinitými a vrstvami vápenců jako u Villebois (departement de l'Ain), v pohoří Jurském, v Couches u Creuzotu (dép. de Saône et Loire), v Hayanges (dép. de la Moselle), v départementu d'Aveiron a na mnohých jiných místech, z nichž některá později vytknuta ještě budou.

Oolithy chamoisitové jsou buď vtroušeny do vápenaté základní hmoty, obyčejně

něco hlinité, tedy slínovaté, aniž by se mezi sebou dotýkaly; nebo tak k sobě přiblíženy jsou, že se dotýkají, any mezery mezi nimi rudou hlinitou vyplněny jsou. Ložiska rudní vytvářejí ve vrstvách vápenných vrstvy nezřídka velmi mohutné a vždy velmi daleko rozprostřelé; však množství železa nebo čisté rudy v nich obsažené mění se v rozličných částech ložiska, kteráž i mnohými jinými zvláštnostmi se vyznamenávají.

Oolithy chamoisitu bývají magnetické veskrz; a množství jich vtroušených do vápenců v departementech de Champagne, Bourgogne a de la Lorraine obnáší dle váhy .1 až 10%.

Co do sloučenství se magnetické oolithy chamoisitu mění. Zrnka z Châtillonu (dép. Côte d'Or) jsou malá a zřídka vtroušená; zrnka magnetická z Nancy u Saint Dizieru jsou velice malá a sploštělá, v rudě, v které zarostlé jsou, je jich 10% dle váhy.


|                                          |           |       |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| Sloučenství jest následující:            | Châtillon | Narcy |
| $Fe_2O_3$                                | 67.3      | 70.0  |
| $FeO$                                    | 15.3      | 15.7  |
| $Al_2O_3$                                | 7.0       | 5.0   |
| V chomáčkách z roztoku vyloučena $SiO_2$ | 2.0       | 4.6   |
| $HO$                                     | 6.4       | 1.6   |
| Hlína a křemenný písek                   | 2.0       | 2.4   |
|                                          | 100.00    | 99.3  |


|                                |           |     |       |       |    |     |    |
|--------------------------------|-----------|-----|-------|-------|----|-----|----|
|                                | Châtillon |     |       | Narcy |    |     |    |
| Poměr kyslíku jest v $Fe_2O_3$ | 20.19     | ... | 20    | ...   | 20 | ... | 39 |
| $FeO$                          | 3.4       | ... | 3     | ...   | 3  | ... | 6  |
| $Al_2O_3$                      | 3.23      | ... | 3     | ...   | 3  | ... | 6  |
| $SiO_2$                        | 1.07      | ... | 1     | ...   | 2  | ... | 2  |
| $HO$                           | 5.6       | ... | 5 1/2 | ...   | 11 | ... | 11 |

Na znečištění hlínou a křemennem nevzato ohledu.

Sloučenství chamoisitových oolithů z obou nalezišť jest velmi rozličné a dalo by se pro zrna z Châtillonu vyjádřit vzorcem:



Pro zrna z Nancy pak:



Neznámo, jest-li kysličník železitý jest v sloučenství v oolitech obsažen nebo toliko přimíšen; že sloučenství dle těchto vzorců není pravdě podobné, se na prvý pohled zdá vysvítat.

Tato zrna oolitická i po vyžhání ještě vyrušují jehlu magnetickou z klidu.

Však oolithy chamoisitu z bání u Stigny, Jrouer a Glandu blíže d'Ancyle-Franc (depart. de l'Yonne), potom ony z bání u Pierre-Viller blíže Moyeuve (dép. de la Moselle) neobsahují kysličníku železnatého, za to ale .4 až .52 kysličníku manganitého; žháním postrádají vlastnosti vyrušovat magnetickou jehlu z klidu.

Oolithy, velikosti malého broku, z Glandu pocházející, jsou ještě jinak památné. Jest-li že se v sehnané kyselině solné oolithy ponechají celé jak jsou, aniž by se rozetřely, vyblednou za krátko, aniž se rozpadnou; ve vybledlé zemité vylouhované látce oolithu, kteráž nerozpustná pozůstává, veliké množství vtroušených přemalých zrníček, toliko zvětšením patrných, barvy kovově černé a lesku velmi značného, se objevuje. Zrníčka, jichž množství dle váhy více  $\frac{1}{100}$  celého oolithu obnáší, v němž zarostlá jsou, mají podobu osmistěnu na špičkách otupeného krychlí tedy:  $O \cdot \infty O \cdot \infty$ . Složena jsou z kysličníků železa s něco málo přimíšených kysličníků manganu a titanu. Krystalky jsou tedy buď titanovým železovcem, ilmenitem, s nejmenším množstvím titanu nebo z titanového magnetitu složené, což krystalové formě neodporuje. Zajisté že magnetičnost těchto oolithů pochází od zrn černých.

Ve všech oolitech však nebývají stejně roztroušeny, v některých pak se ani nepoznávají lučebním rozborem. Struska chamoisitů roztavených, mnoho černých zrn obsahujících, potahuje se někdy na povrchu slabým nádechem barvy měďové.

Též ostatní části ložisek uložených ve vápencích jurských bývají nezřídka magnetickými.

Nejpamátnější ložisko jest u Hayange, (dép. de Moselle), báněmi otevřené v mocnosti 3 až 4 metrů sblíženě vodorovně v jurských vápencích uložené. V ložisku rozeznávají se troje rozličné odrůdy rudní, kteréž nepravidelné, velké části v ložisku skládají a ponenáhlymi přechody mezi sebou spojeny jsou. Všecky troje odrůdy jsou oolitické a zrnité a sice jsou to hnědá, modrá a šedá ze všech nejhojnější.

Odrůda hnědá vlastně ani chamoisitem není, jelikož se z vodnatého kysličníku železitého, nebo převládajíc z limonitu skládá.

Modrá ruda se mění v tmavošedoolivovou, šedozeleňavou, olivovou a černavou. Prášek její jest tmavošedozeleňavý. Snadno se štípe, ba též drobitvá jest. Tvrdost 2·5 obnáší. Před dmuchavkou jest neschůdně tavitelná v černou strusku velmi magnetickou; ruda sama jest silně magnetická.

Na pohled se zdá být modrá ruda složena toliko z jediného nerostu, není tomu ale tak, an se rozborem troje rozličné nerosty, rudu skládající rozeznávají; v kyselinách vyvíjí ruda kyselinu uhličitou, což již o směsi nějaké svědčí. Sloučenství modré rudy jest:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <i>FeO</i>                         | 61 0  |
| <i>CaO</i>                         | 6·2   |
| <i>CO<sub>2</sub></i>              | 20·3  |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 3·8   |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 6·0   |
| <i>HO</i>                          | 2·5   |
| <i>MgO, MnO</i>                    | sledy |
|                                    | 99·8  |

Ruda, složena z tří nerostů, z chamoisitu, sideritu a calcitu. Beudant (Traité de Mineralogie 1832, str. 128) dal chamoisitu smíšeném v modré rudě s uhličitany železnatým a vápenatým jméno *berthièrinu*. Sloučenství berthièrinu se odchyluje



od onoho, které chamoisitu z Chamoisonu přináleží, od kteréhož se vůbec každý posud zkoušený chamoisit odchyluje.


Přepočte-li se rozbor uvedený obdrží se pro složivo modré rudy :

|                                    |                       |      |                                          |   |   |      |   |   |   |         |
|------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---------|
| <i>CaO</i>                         | <i>CO<sub>2</sub></i> | 11·0 | .                                        | . | . | 11·0 | . | . | . | calcit  |
| <i>FeO</i>                         | <i>CO<sub>2</sub></i> | 40·3 | .                                        | . | . | 40·3 | . | . | . | siderit |
| <i>FeO</i>                         |                       | 36·0 | } . . 48·5 . . . chamoisit (berthièrine) |   |   |      |   |   |   |         |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> |                       | 3·8  |                                          |   |   |      |   |   |   |         |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             |                       | 6·0  |                                          |   |   |      |   |   |   |         |
| <i>HO</i>                          |                       | 2·5  |                                          |   |   |      |   |   |   |         |
|                                    |                       | 99·8 |                                          |   |   |      |   |   |   |         |
|                                    |                       | 99·8 |                                          |   |   |      |   |   |   |         |


Chamoisit v modré rudě samojediný magnetický by měl tedy složení :

|                                    |      |         |       |               |         |       |    |
|------------------------------------|------|---------|-------|---------------|---------|-------|----|
| <i>FeO</i>                         | 74·7 | kyslíku | 17·00 | poměr kyslíků | 5 : 4·7 | . . . | 14 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 7·8  | "       | 3·65  | "             | 1 = 1   | . . . | 3  |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 12·4 | "       | 6·45  | "             | 2 = 2   | . . . | 6  |
| <i>HO</i>                          | 5·1  | "       | 4·50  | "             | 1 : 1·3 | . . . | 4  |

Vzorec dle prvního poměru kyslíků by byl :



neb



dle druhého poměru.

Těž se jméno berthièrin na celou modrou rudu prostoupenou značným množstvím sideritu a calcitu přenáší.

Třetí odrůda z Hayange, nebo šedá, jest patrnou směsí obou předešlých. Okem rozeznávají se částečky žlutohnědého limonitu ostře oddělené od základní hmoty chamoisité šedomodravé, v níž zarostlé jsou. Rozborem se seznává, že sestává z limonitu, sideritu, chamoisitu, ale žádného calcitu.

Podoba rudy z Hayange s naší Nučickou jest velmi značná; modrá ruda složení berthièrinu jest nezrušená původní, z kteréž zvětráním hnědá nebo limonit poněmáhlymi přechody šedou odrůdou povstává.

V hnědé rudě jest všecken kysličník železnatý ve vodnatý železitý proměněný; v šedé pak jen část jeho jak ze sideritu, kterýž nejprve se okysličuje tak snad i ze chamoisitu, an calcit všecken vylouhán jest.

Některé chamoisity zdají se obsahovati jak hlínu tak i vodnatý kysličník hlinitý, kterými znečištěny jsou, a jimž se k tavení křemene přidávati musí. Takové jsou některé chamoisity Champagni a v Bourgogne. Jeden z takových chamoisitů, mnoho vody obsahujících z Mont Girardu u Saint Diziers, který se v peci Bienvillu taví, jest složen z :

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>      | 69·0  |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>      | 7·0   |
| <i>SiO<sub>2</sub></i> a písek křemenný | 7·2   |
| <i>HO</i>                               | 16·0. |

Jelikož neobsahuje žádného kysličníku železnatého, není snad ani chamoisitem. Mimo Francii a Švýcarsko jest chamoisit znám posud toliko v Čechách

a může se směle tvrdit, že mnohem lépe než všude jinde, nebo o něm více vědomostí nyní nabyto než o všech ostatních dohromady. Je-li uložení ložisek chamoisitových co do obzorů, jež v útvarech, v kterých se vyskytují, zauímají, nejisté, jest obzor, v českém spodním silurském útvaru zcela jistě známý.

Tolikéž český chamoisit jest ložiskem mohutným a dlouhým, kteréž od Vráže, přes Chrustenice do Nučic a Jinočan se táhne, uloženo jsouc uprostřed pásma  $Dd_1$ , druhou zvířenou silurskou vyznamenaným. Též ještě v nižších pásmech v  $Dd_1$ , rudy černé se uvádějí, kteréž mimo jméno chamoisit jim dané, kteréž jim však neprávem náleží, posud neznámy jsou.

České chamoisity též se rozvrhují na pravé chamoisity a na berthièriny, více neb méně sideritem a též calcitem, ale v míře mnohem podřízenější, prostoupené. Též hnědé rudy, jako u Hayanges ve Francii, se vyskytují co proměny chamoisitů.

Barva chamoisitu jest černošedá až černomodravá, prášek šedý. Barvy světlejší, zelenavé, světlošedé, nejsou nezrušenému chamoisitu vlastní.

Tvrdost jest okolo 3, dle Mohsové stupnice tvrdosti, nebo buď rýpají calcit, nebo jím jsou rýpány.

Slon rud jest vesměs oolitický, malé oolithy někdy dosti hojné a ve směru vrstevnatosti často sploštělé, ač nepravidelně tak bývá. Potažná váha rud oolitických jest: 3·084 — 3·716.

Vesměs jsou chamoisity magnetické, an vyrušují jehlu magnetickou z klidu. O působnosti rudy na magnetickou jehlu podávají důkazu dolové mapy, v kterých od úchytky magnetické podmíněné vlastnosti rudy, malé neshody se pozorují v souhrnu mnohých tahů, měreno-li kompasem hornickým. Též malé kousky rudy k jehle přiložené vyrušují ji z klidu; tu rozličné odrůdy chamoisitu rozličnou sílu magnetickou jeví.

Chamoisit oolithický, nebo základní hmota chamoisitu nebo vybrané z něho oolithy (vše neporušené) odchylují jehlu z klidu o 3, 4, 5 až 6' na každou stranu, přiblíží-li se jí v malých kouskách.

Berthièrin, nebo skleněnka však až na 15' až 17' odchyluje jehlu na každou stranu ze směru magnetické čáry.

V žáru před dmuchavkou se oolithy neporušené, černošedé dosti snadno taví v černou, strusce podobnou kuličku neprůhlednou. Základní hmota chamoisitová se trochu méně snadno v podobnou kuličku slívá. Berthièrin však ještě méně snadno slívá se černou, lesklou, struskovitou kuličku neprůhlednou.

Tavené neb toliko vypálené chamoisity mnohem účinněji vyrušují magnetickou jehlu z klidu. Chamoisity neb oolithy vyžíhané v malých kouscích uchylují jehlu o 4 až 8', vyžíhané Berthièriny (skleněnky) ale rozechvějí jehlu až na 30' i ještě něco málo více na obě strany od magnetické čáry. Berthièriny, nebo sideritem prostoupené chamoisity jsou magneticky účinnější všech ostatních odrůd.

Co do bohatství rudy na železo jsou skleněnky nebo siderity a též něco calcitem prostoupené pevné chamoisity neb berthièriny, bohatší rud neprostoupených sideritem.

Oolithy jsou tak pevně spojeny se základní hmotou a mimo to též sideritem proniknuty, že se z rudy vyloupati nedají; proto všechny analýsy berthièrinu úhrnečnými jsou (jako analýsa písmeno a na straně 203 a písmeno b na straně 204).

V některých odrůdách skleněnek jsou šedočerné oolithy toliko do čisté sideritické základní hmoty šedožluté vrostlé.


V černošedých chamoisitech oolithických, málo neb takřka žádným sideritem prostoupených, jest složení oolithů, jež se ze základní hmoty vyloupat dají, jiné, než ono základní hmoty.

Černošedé nezrušené oolithy analysované pod písmenem **d** strana 205 obsahují kyslíku v sloučenství částky v kyselině octové nerozpustné:

|                                    |       |          |       |       |     |     |   |
|------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-----|-----|---|
| <i>FeO</i>                         | 41·58 | kyslíku: | 9·24  | poměr | 1·5 | neb | 4 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 16·90 |          | 6·76  |       | 1·  |     | 3 |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 29·21 |          | 15·58 |       | 2·5 |     | 8 |

Poměr kyslíků jest sblíženě tento, an vynechány malé částky *PO<sub>3</sub>*, *SO<sub>3</sub>*, které snad na *Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>* sloučené, množství jeho umenšují, čímž poměr kyslíku, tak jak vypsán, tím sblíženějším se stává.

Dle poměru toho by se dalo složení oolithů **d**, sblíženě takto vzorcem vyjádřiti:



Oolithy v chamoisitu jsou křemenem bezvodým; počínajícím zrušováním vyblednou a szelenají, an též něco vody přibírají, jak z analyzy na straně 206 písmeno **f** na jevo jde.

Porovnáním rozboru oolithu s rozboru základní hmoty též se zdá vysvítati, že v nich mnohem více *PO<sub>3</sub>* a *SO<sub>3</sub>* než ve vlastní základní hmotě obsaženo jest.

Hutnota oolithů mění se od 2·670 do 3·104.


Konečná proměna oolithů jest kaolin.

Černošedá, velmi jemnozrná až celistvá základní hmota neporušená, tak jak na stránce 204 písmeno **c** rozbor její uveden jest, skládá se ve své nerozpustné části v kyselině octové pozůstalé, přehlédnou-li se látky v menších částkách v ní obsažené z:

|                                    |       |                  |       |       |     |     |   |
|------------------------------------|-------|------------------|-------|-------|-----|-----|---|
| <i>FeO</i>                         | 46·59 | kyslíku obsaženo | 10·35 | poměr | 2   | neb | 4 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 21·87 |                  | 8·75  |       | 1·5 |     | 3 |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 9·65  |                  | 5·15  |       | 1   |     | 2 |
| <i>HO</i>                          | 12·66 |                  | 11·25 |       | 2   |     | 4 |

Poměr tento by se stal mnohem přiblíženější ještě, kdyby se něco *Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>*, kterýž snad na *PO<sub>3</sub>* vázaný jest, odtáhlo.

Z poměru toho se dá sestavit tento vzorec pro sloučenství chamoisitu **c**):



Základní hmota chamoisitová jest tedy vodnatý křemen hlinitoželeznatý, jako chamoisity původní. Zdá se, že v ní méně *PO<sub>3</sub>* a *SO<sub>3</sub>* do sloučenství přistupuje, než do oolithů vlastních.

Hutnota základní hmoty neporušené mění se od 3·447 do 3·484. Konečná proměna chamoisitu jest limonit.

V černých, drobových břidlicích, jak ve visutém tak i v ležatém ložiska, zarostlé malé oolithy černé, jimž se některé větší soustředně miskovité oolithy černo-

šedé do drobnoolitické rudy vtroušené podobají, sestávají opět z vodnatého křemenu, něco sideritem a calcitem prostoupeného, jak z rozboru na stránce 205, písmeno e) na jevo jde.

Některé české chamoisity opět něco kysličníku železitého  $Fe_2O_3$ , co součástku v složení obsahují, jako skleněnka na straně 204 pod písmenou b) uvedená, což u odrůdy, bavalitem zvané, hojným úkazem bývá.

Že naše chamoisity co do složení svého mezi sebou, jakož i s oněmi z Francie a Švýcarska nesouhlasí, není nic divného, an chamoisit seznán co ruda složení velmi měnivého, což od přístupujících do ní nepodstatných částí pochází. Vždyť francouzské chamoisity mezi sebou a se švýcarskými též nesouhlasí nikterak.

Mimo tyto zde uvedené analýsy českých chamoisitů nejsou žádné jiné uveřejněny; toliko v Bořického pojednání o nerostech silurských, pásma železných rud v Sitzungsber. der wien. Acad. 1869, str. 1273 a v Živě 1869 na str. 10 uvedeny tři analýsy chamoisitu z Chrustenic provedených ve Vojtěšské huti na Kladně (ne na Vojtěšské šachtě, jak omylem udáno, an v Kladně žádné šachty toho jména nestává), kteréž ale nespolehlivé jsou.

Co konečný úsudek možno o složení chamoisitu následující uvést:

Základní hmota chamoisitová jest vodnatý křeman hlinitoželeznatý; oolithy v základní hmotě vtroušené jsou bezvodým křemanem hlinitoželeznatým; rozumí se samo sebou, že v způsobu nezrušeném, tedy z takové hloubky ložiska, až do které se rušivá moc vody a vzduchu nejeví.

Poněvadž chamoisit co ruda se skládá ze základní hmoty, v níž neurčité množství oolithů vtroušeno jest a poněvadž každá z částek složiva jiné sloučenství má, následuje z toho, že analýsy rudy samé, tedy jak základní hmoty tak i oolithů, budou pokaždé jiné a že jimi se nikdy pravé sloučenství chamoisitu nevysvětlí, byť ruda i neporušená byla. Že pak do chamoisitů i siderit a calcit v jemném rozptýlení přistupují, měníce je v odrůdu berthièrinem zvanou, tedy tím sloučenství se ještě neurčitější stává.

Chamoisity se dosti snadno proměňují, jak již nahoře řečeno bylo, a analýsy takových polozrušených a proměněných rud budou tedy velice od sebe odchýlovat.

Vše to se shoduje se zkušeností; kolik analýs našeho chamoisitu takovým způsobem uděláno bylo, tolikráte se nalezlo vždy jiné sloučenství.

I analýsy francouzských a švýcarských chamoisitů se různí mezi sebou, jakož i s analýsami našimi z té příčiny, že nezkoušena základní hmota a oolithy jejich, každá zvlášť o sobě a potom též snad z té příčiny velice pravdě podobné, že nevzaty rudy z hloubky ložiska ještě nezrušeného, kteréž tehdy snad ještě ani dostiženo nebylo, když analýsy dělány byly.

Že skutečně nevzaty k analýsám alespoň částečně čisté nevětralé chamoisity, vysvítá z toho, že Berthière sám popisuje jeden chamoisit jím analysovaný, nyní co vzorný ve všech knihách uváděný, co šedozelenavý; známo ale, že barvy zelenavé naznačují v chamoisitu již valně pokročilý rozklad, kterým se i sloučenství mění; Berthièrův nerost byl tedy již valně rozložený a takový se zajisté co vzor sloučenství postavit nemůže.

Z obou těchto příčin dá se soudit, že analýsy, kteréž co vzorné sloučení cha-

moisitu do všech nerostopisů přešly se nevztahují na čistý nerost, a že tedy své vzornosti by pozbýt měly. Naše analýsy vztahují se na nerost nezrušený a sice ne na rudu samu, než na oolithy zvlášť a základní hmotu tolikéž zvlášť, jimž každému jiné sloučenství náleží.

## 2. Sideroxen.

V předešlých člancích byla velmi často řeč o zeleném nerostu, který buď některé tufy diabasové v přejemném rozptýlení barví, aneb v nich v přeslabých žlečkách, neb menších i větších šupinkách a malých kouscích vyloučen se nalézá. V některých seménkách, však též i v Karabinských rudách visutých ložisek se v malých kouscích, aneb v tenkých, krátkých povláčkách šupinatých, zarostlý objevuje. Ze všech těchto přehojných nalezišť tohoto nikterak vzácného nerostu nemožno však tolik látky čisté sebrat, by se z ní sloučení nerostu určit dalo.

Sideroxen, kterýž na straně 153 v seznamu nerostů, do ložisek rudních aneb do diabasových hornin vtroušených uveden jest, nalezen ve Svárově ve IV. šachtě, v samé blízkosti ložiska nejvisutějšího nebo třetího v značnějších kouscích. Ve vrstvě asi 2 cm. mocné, sestávající ze špinavě šedého, trochu tufem znečištěného, dolomitického vápence, kteráž bezprostředně k třetímu ložisku přirostlá jest, vtroušeno značné množství zrněk sideroxenu. Zrnka však málokdy dosahují velikosti hrachu, obvykle jsou mnohem menší.

Tato zrnka mají barvu travově zelenou, až světle travovou, jsou křehká, lomu nedokonale lasturového, natrhaného střípkami. Tenké střípky jsou průsvitavé na hranách. Lesk jest slabý, sloh jednotejný, tedy beztvárný. Nedá se upřít, že některá světlejší zrnka upomínají na delessit.

Zrnka byla vybrána a zkoušena na hutnotu. Ve vodě vyvíjela nepatrné množství malých bublinek vzdušných. Potažná váha nerostu, tak jak jest, tedy než ještě bublinky se vyvinuly, určena s 2.09 grammy, jest 2.6039; když se ale bublinky za kratičký čas byly z něho zcela vyvinuly, nalezena hutnota 2.6104. Nerost tedy na pohled úplně spojitý obsahuje přece dle objemu 25% skulinek drobnohledných, do kterých se voda vsakuje.

Jiné kousky nerostu, které se vodě dříve omočeny nebyly, vysušeny pod chloridem vápenatým; za 5 dní ztratily 1.96% vody nebo vlhkosti v nich obsažené.

Tyto pod chloridem vápenatým vysušené kousky byly zkoušeny na potažnou váhu a vzato ku zkoušce 2.00 grammů. Nerost tak jak byl, tedy i s bublinkami v něm obsaženými, měl hutnoty 2.5650; po vyjití všech bublinek z něho byla potažná váha 2.7407. Bublinky se vyvíjejí kvapně z nerostu a za několik hodin je nerost vodou úplně prosáknut, an se více žádných bublinek nevyvíjí. Látka, pod chloridem vápenatým vysušená, sestává tedy dle objemu z nerostu a z 6.41% dutinek drobnohledných, vzduchem a vodou vyplněných.

Bylo by záhodno zvědět, zdali jsou tyto dutiny, zaujímající dle objemu v nerostu 6.41%, vyplněny vodou nebo ne. Kdyby v těchto dutinách 6.41% dle objemu byla voda, musilo by jí dle váhy být 2.50%; jelikož ale nerost chloridem vápenatým toliko 1.96% vody pozbývá, tedy jsou buď dutinky neúplně vodou vy-

plněny, aneb shustěnou v nich vodní parou: však prvé zdá se být proto pravděpodobnější, an by se jinak, kdyby toliko shustěná vodní pára v nich obsažena byla, ve vodě z nerostu vzduchové bublinky vyvíjet nemohly.

Zelený nerost byl na prášek rozetřen a pod chloridem vápenatým vysušen; takto připravený prášek v množství 2·05 grammů měl hutnoty 2·7373.

Hutnota se tedy v nerostu jen tehdy nemění, byl-li pod chloridem vápenatým vysušen, než zkoušen byl na potažnou váhu. Jak potom se potažná váha určuje, zdali s kousky nebo práškem, jest jednotejné.

Tvrdost nerostu jest 2·5 nebo calcitem nerost rýpán jest, kamennou sůl pak zase rýpe. Lithionit z Zinnwaldu rýpe nerost a jest jím tolikéž rýpán.

Prášek nerostu velmi světle zelený, pod chloridem vápenatým vysušený, sušen při 100° C ztratil vody za 3 hodiny 1·14 % a  
za 6 hodin 1·16 %, kteráž není chemicky vázána.

Při 300—400° C žihán v platinovém tyglíku, aniž by dno tyglíku bylo dost málo řeřavé bývalo, pozbyl původní, pod *CaCl* vysušený nerost 2·71% vody a změnil při tom barvu svou v špinavě hnědopříšedlou.

V kyselině solné se nerost nerozkládá.

Ku zkoušce vzato 1·46 grammů při 100° C sušeného nerostu.

Nerost při 100° C sušený obsahoval 1·16 hygroskopické vody.

|                                    |        |               |       |      |       |                |    |
|------------------------------------|--------|---------------|-------|------|-------|----------------|----|
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 56·67  | v tom kyslíku | 29·44 | neb  | 29·44 | sblížený poměr | 14 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 17·85  | "             | "     | 8·33 | "     | "              | 3  |
| <i>CaO</i>                         | 1·72   | "             | "     | ·48  | }     | "              | 2  |
| <i>MgO</i>                         | 2·65   | "             | "     | 1·06 |       |                |    |
| <i>FeO</i>                         | 14·74  | "             | "     | 3·27 |       |                |    |
| <i>CuO</i>                         | ·10    | "             | "     | ·02  |       |                |    |
| <i>HO</i>                          | 6·90   | "             | "     | 6·13 | "     | "              | 3  |
| <hr/>                              |        |               |       |      |       |                |    |
|                                    | 100·63 |               |       |      |       |                |    |


K zjištění tohoto sloučenství byl ještě jeden rozbor s jinými kousky udělán, při čemž nerost nejprvé v kyselině solné vylouhován se něco málo calcitem znečištěn býti seznal.

Rozbor tento od p. assist. Frant. Farského.

Nerost při 100° C sušený obsahoval 4·84 hygroskopické vody.

|                                    |                 |                                     |       |   |       |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|---|-------|-------------------|
| <i>CaO</i>                         | 2·14            | } calcit v kyselině solné rozpustný |       |   |       |                   |
| <i>MgO</i>                         | sledy           |                                     |       |   |       |                   |
| <i>CO<sub>2</sub></i>              | 2·04 vypočítáno |                                     |       |   |       |                   |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 53·05           | obsahuje kyslíku                    | 28·31 | . | 28·31 | sblížený poměr 14 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 16·69           | "                                   | 7·81  | . | 7·81  | " 3               |
| <i>CaO</i>                         | .               | "                                   | .     |   | .     |                   |
| <i>MgO</i>                         | 3·83            | "                                   | 1·53  | } | 4·59  | " 2               |
| <i>FeO</i>                         | 13·77           | "                                   | 3·06  |   |       |                   |
| <i>CuO</i>                         | sledy           | "                                   | .     |   | .     |                   |
| <i>HO</i>                          | 8·58            | "                                   | 7·58  | . | 7·58  | " 3               |
| <hr/>                              |                 |                                     |       |   |       |                   |
|                                    | 100·10          |                                     |       |   |       |                   |

Jest-li že se vezme poměr kyslíku:  $SiO_2$  :  $Al_2O_3$  :  $FeO$  ( $MgO$ ) :  $HO$  tak, jak určen jest, 14 : 3 : 2 : 3, kterážto čísla arci ne zcela přesná, než trochu nucená jsou, za základ dal by se pro sideroxen sestaviti vzorec



který ovšem toliko sblíženě sloučenství naznačuje.

Pamětihodný jest nový nerost, kterémuž z té příčiny, že v tufech na blízku rudních ložisek neb v nich samých se objevuje, jméno **sideroxen** dáno. Nerost jest tím, že v něm něco málo kysličníku měďnatého obsaženo jest, památný; však tento ale není příčinou zelené barvy, kteráž od kysličníku železnatého pochází. <sup>42)</sup>

Nový tento nerost, ač podobný v některých odrůdách delessitu, se nicméně od něho tím liší, že v kyselinách se nerozkládá, kdežto delessit se snadno rozkládá, vylučujíc kyselinu křemičitou. Mimo to obsahuje delessit mnohem méně kyseliny křemičité a více vody a mnohem více magnésie než tento nový nerost. Potážná váha delessitu, 2·9 jest tolikéž ač málo, přece vyšší než ona našeho nerostu.

Jiný nerost, ku kterému by sideroxen porovnán býti mohl, jest tak zvaný diabantochromin, zelený, barvící nerost v diabasech Frankenwaldu, jemuž dosti na pohled by se podobal. Však diabantochromin se jako delessit objevuje vyloučen v dutinách, skulinách a rozsedinách, což o našem nerostu zarostlém neplatí a má hutnoty 2·81—2·93. V kyselinách se rozpouští a má asi následující sloučenství:

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| $SiO_2$   | . . . | 29·4—31·7 |
| $Al_2O_3$ | . . . | 9·1—12·2  |
| $FeO$     | . . . | 21·3—26·9 |
| $MgO$     | . . . | 17·9—22·9 |
| $HO$      | . . . | 10·2—15·8 |

(Neues Jahrbuch für Miner., Geol. u. Palaeont. von Leonhard u. Geinitz 1870; p. 1 atd. Dr. K. L. Th. Liebe, Die Diabase des Voigtlandes und des Frankenwaldes, erster Abschnitt, die färbenden Mineralien).

Porovná-li se diabantochromin s delessitem, seznává se, že oba nerosty jsou totožné, a že náš nerost dalece rozdílný od nich.

### 3. Delvauxit.

Tento nerost byl nejprvé od Dumonta (Bulletin de l'academie royal de sciences de Bruxelles 1838 Tome V. p. 296) dle Delvauxa pojmenován, který již před tím byl nerost (Bull. de l'acad. de Brux. 1838 t. V. p. 147) třikrát analysoval. Nerost nalezen na haldách opuštěných bání na olovo v Berneau u Visé v Belgii.

Tři první analyzy nerostu pocházející od Delvauxa jsou tyto:  $\alpha$ ,  $\beta$  jiná odrůda rudohnědá,  $\gamma$  hnědočerná odrůda:


|             | $\alpha$ | $\beta$ | $\gamma$ |
|-------------|----------|---------|----------|
| $SiO_2$     | 50       | 3·60    | 4·40     |
| $HO$        | 36·40    | 42·20   | 40·40    |
| $Fe_2O_3$   | 35·79    | 29·00   | 31·60    |
| $CaO\ CO_2$ | 10·00    | 11·00   | 9·20     |
| $PO_5$      | 16·29    | 13·60   | 14·13    |
|             | 98·98    | 99·40   | 99·90    |

Jelikož Delvaux při rozpouštění nerostu v kyselině solné pozoroval slabé vyvíjení se kyseliny uhličité, měl za to, že pochází z rozkladu calcitu, celý nerost postupujícího a určil dle toho všecko vápno jako uhličitán vápenatý, aniž by byl dříve kyseliny uhličité dle množství svého určil.

Rozklady byly tedy v ten způsob vysvětleny, jako by v nerostu calcit co znečištěnina jej veskrz pronikující obsažen byl; vápno tedy na uhličitán vápenatý přepočítáno a toto jakož i nalezená kyselina křemičitá co nedůležitá přísady v nerostu odtaženy (Dumont L'institut a Phyl. Magaz. Ser. III. vol. XIV. str. 474). Za příčinou takového vysvětlení rozboru delvauxitu určeno pro složení následující theoretické sloučenství:

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| $HO$      | 49·76  | 48·81  | 41·13 |
| $Fe_2O_3$ | 34·20  | 36·62  | 40·44 |
| $PO_5$    | 16·04  | 16·57  | 18·20 |
|           | 100·00 | 100·00 | 99·77 |

dle kterého by delvauxit složen byl dle vzorce:



Za příčinou takového vysvětlení rozboru vtáhl Church (Chemical New edit. by Crookes, London, X. 145.) delvauxit ku krauritu nebo dufrénitu, přese vše, že sloučenství obou nerostů jest rozdílné; též Dana (ve svém System of Mineralogy fifth editon 1869) následuje tohoto příkladu, kladouc delvauxit do druhu dufrénitu, přese vše že tento nerost z:

|           |       |
|-----------|-------|
| $HO$      | 10·5  |
| $Fe_2O_3$ | 62·0  |
| $PO_5$    | 27·5  |
|           | 100·0 |

sestává.

Nejlepší posud stávající práci o delvauxitu podal Karel Hauer (Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt, V. Jahrgang 1854, str. 67, Über die Zusammensetzung einiger Mineralien mit besonderer Rücksicht auf den Wassergehalt).

V tomto pojednání se složení delvauxitu z Bernau u Visé v Belgii znovu probírá a se složením nerostu, toho času v ložisku limonitovém v Dollingraben u Freisteinu (Lubno, Leoben) v Štyrsku nalezeném, srovnává.

Aby se zjistilo, zdali kysličník vápenatý v nerostu z Berneau jest kyselinou uhličitou vázaný, tedy co calcit nerost znečišťující v něm rozprostraněn, určena kyselina uhličitá vážením a nalezena v množství menším než 1%. Jelikož ale bezprostřední určování malých částek kyseliny uhličité není zcela přesné, určena tato ze zbytků, když nerost byl vyžhán a voda pohlcením v chloridu vápenatém určena byla. Výsledek tohoto určení byl, že množství kyseliny uhličité v nerostu



toliko několik desetin procentů obnáší, kteréž k vázání kysličníku vápenatého v nerostu obsaženého nedostačuje; že tedy kysličník vápenatý v nerostu samém z největší části chemicky vázán jest.


Hauer vzal dvě částky nerostu na *vzduchu vyschlého* a určil v nich vodu; jednou žháním, tedy nepřímou, a podruhé vážením jí, tedy přímo.

Složeny tedy delvauxity z Berneau z Dollinggrabenu (Lubno):

|                                                 |           | Určení vody |                          |          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|
|                                                 |           | nepřímou    | bezprostředně<br>vážením | nepřímou | bezprostředně<br>vážením |
| při 100° C prchající<br>teprve v žáru prchající | $SiO_2$   | 2·08        | 7·83                     | 1·24     | 7·89                     |
|                                                 | $CaO$     | 7·08        |                          | 7·39     |                          |
|                                                 | $HO$      | 12·20       | 25·20                    | 12·80    | 26·76                    |
|                                                 | $HO$      | 13·84       |                          | 13·91    |                          |
|                                                 | $Fe_2O_3$ | 46·40       | 46·25                    | 46·34    | 46·46                    |
|                                                 | $PO_5$    | 18·67       | 18·47                    | 17·68    | 17·64                    |
|                                                 | $CO_2$    | sledy       | sledy                    | sledy    | sledy                    |
|                                                 |           | 100·27      |                          | 99·36    |                          |

Odtáhnou-li se z rozborů, tak jak to Dumont učinil,  $CaO$  a  $SiO_2$ , obnáší množství vody v nerostech od 20 až 12%, méně než Delvaux ve svých rozbořech nalezl. Toho příčina leží v tom, že nerost dlouhým uschováním vysychá, an velmi hygroskopický jest. Bezpochyby analysován Delvaux-em nerost velmi vlhký, vodnatý.

Dle složení tohoto, Hauerem nalezeného, by pro nerost se hodil vzorec:



By se seznalo, jak velice nerost hygroskopickým jest, dány malé kousky jeho pod zvon skleněný, vedlé nádoby vodou naplněnou, kdež ustavičně vody do sebe pohlcovaly:

| Nerosty z  | Berneau a | z Lubna | pohltily vody: |
|------------|-----------|---------|----------------|
| ve 3 dnech | 8·73%     | 10·06%  |                |
| v 4tém dni | ·71       | ·36     |                |
| v 5tém „   | ·17       | ·12     |                |
| v 8mém „   | ·35       | ·23     |                |
| v 12tém „  | ·01       | ·01     |                |
|            | 9·97%     | 10·78%  |                |

Byly-li nerosty dříve na prášek roztlučeny, pohlcovaly o něco více vody.

Jelikož nerost tak velice hygroskopický jest, bylo lepší nerost na vzduchu vysušený spíše pod chloridem vápenatým sušiti.

Nerosty, pod chloridem vápenatým sušené, ztrácely na váze


|            | z Berneau | z Lubna |
|------------|-----------|---------|
| za 3 dni   | 8·14%     | 9·28%   |
| v 6tém dni | ·88       | ·27     |
| v 8 „      | .         | ·41     |
| v 12 „     | .         | .       |
|            | 9·02%     | 9·92%   |

V množství vody, v nerostu obsažené, jsou znační rozdíly dle toho, byl-li nerost toliko ve vzduchu vyschlý aneb pod chloridem vápenatým vysušen, an množství vody v nerostu od vlhkosti vzduchu závisí a s touto se proměňuje.


Jest-li že se analýsy přepočítají na nerost pod chloridem vápenatým sušený a odtáhne-li se kyselina křemičitá, obdrží se následující sloučenství:

|                                                       | Berneau | Lubno |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| Veškerá voda nerostu pod chloridem vápenatým sušeného | 19·08   | 19·04 |
| $Fe_2O_3$                                             | 52·03   | 52·54 |
| $CaO$                                                 | 7·94    | 8·37  |
| $PO_5$                                                | 20·93   | 20·04 |
|                                                       | 99·98   | 99·99 |

Dle toho složení by se dalo sloučenství nerostu, pod chloridem vápenatým sušeného, sblíženě tímto vzorcem vyjádřiti:



však i tento vzorec:



snázorněje dosti sblíženě sloučenství nerostu.

Jest toliko ještě otázka, zdali voda, kterou nerost při 100° C pouští, jest chemicky vázána aneb toliko hygroskopickou vodou, což posud zcela neurčito jest. Nerost pod chloridem vápenatým nebo při 100° C sušený nepozbývá ničeho na své podobě aniž barvy své trátí.

Vzorec určený Hauerem pro sloučenství nerostu pod chloridem vápenatým sušený, jest až po ten čas pravý, jelikož podle něho i delvauxity u nás v Čechách nalezené, sloučeny jsou.

Vlastnosti delvauxitu, jak jich Hauer podal, všeobecně i pro náš nerost se hodí který v rozmanitém způsobu výchozy silurských železných rud doprovází.

Nerost jest pevný, ledvinovitý, křehký, lomu lasturového, lesku smolného, barvy žlutohnědé až hnědočerné, prášku světle hnědé, na tenkých hranách někdy průsvitavý. Delší čas na vzduchu uschován rozpadává se nerost sám ze sebe v drobty; v žáru před dmuchavkou rozpráská se a vypálí se v malém žáru na rudo a taví snadno v šedou magnetickou kuličku. Ve vodě se všechny odrůdy nerozpadávají, tolikéž i naše nikoliv, též pod vodou praskají jen některé odrůdy se šramotem, aniž by se kousky rozpadávaly. V rozředěné kyselině solné se rozpouští nerost snadno, v sehnané kyselině se v chladu náramně snadno v hnědý roztok rozpouští.

Naše nerosty při rozpouštění v kyselinách nešumí, jelikož nejsou calcitem prostoupeny jako nerost z Berneau, kterýž drží malé částky tohoto nerostu co znečištění. Všecky odrůdy vylučují v kyselinách více nebo méně chomáček kyseliny křemičité při rozpouštění, an i malá částka kyseliny křemičité v roztok přechází; naše české odrůdy vylučují jí 1·38—3·90%.

Naše české odrůdy obsahují vesměs malé podíly kyseliny sírové, na kterouž dlužno při určování vody zřetel obracet, an v teplotě žáru, při kteréž z nerostu

se voda vypuzuje, i něco kyseliny sírové uniká, za kterouž příčinou nepřímé určování vody by vysoké množství její vykazovalo. Pročež také ve všech analysovaných delvauxitech se určování vody takto dělo:

Do porculánového tyglíku dán nerost a pokryt vrstvou dříve vyžíhaného kysličníku olovnatého (klejtu) a potom teprvé žhán; všechna kyselina sírová z nerostu žháním vypuzená zachycena v kysličníku olovnatém a toliko jediné voda uniká. Protož také vrstva klejtu, pokrývající do ruda vypálený nerost, sbělí od síranu olovnatého. Toliko v rozborech b) a c) strana 103 od Bořického pocházejících, není udáno, aniž dopříděno býti mohlo, jakým způsobem voda určena byla.

O potažné váze delvauxitu jest toliko jediný udaj od Haidingera (Handbuch der bestimmenden Mineralogie 1845) vztahující se na nerost z Berneau číslem 1·85 uveden.

Potažná váha našich odrůd tak jak jsou, tedy i se vzduchem, do nich vsáknutým určena s 2·074 až 2·254; kousky úplně vodou prosáklé aneb na prášek roztřelý nerost na hutnotu zkoušený, daly potažné váhy 1·924—2·354. Nerosť zkoušený obsahoval 50 až 21% vzdušných bublinek v sobě počítaje dle objemu. Je z toho vidět, jak velice měnívá jest potažná váha nerostu na vzduchu vyschlého, ať si byla určena hutnota s kousky, aneb s práškem nerostu. Rozličná hutnota závisí od rozličné vody hygroskopické, kterou nerost prosáknut jest, protož nikdy se potažné váhy nerostu na vzduchu vyschlého shodovat nebudou. Aby se hutnoty shodovaly, dlužno brát k jich určení nerosty stejného složení, tedy nerosty prosté vši hygroskopické vody, což se děje takovým způsobem, že se nerost zprvu pod chloridem vápenatým vyschnout nechá. Nerosty, kteréž dříve pod chloridem vápenatým vysušeny byly, nežli s nimi zkouška na hutnotu podniknuta byla, shodují se ve své potažné váze znamenitě od 2·696 do 2·707, při čemž rozdíl není, vzat-li nerost ku zkoušce v kouskách nebo co prášek.

Potažná váha ve vzduchu vyschlého delvauxitu záleží na množství hygroskopické vody v nerostu vsáknuté; vlhkosti nerostu ale neustále na vzduchu až po jisté meze ubývá, čímž nerost sám vždy ještě křehčím a drolivějším se stává. Jestli že delvauxit čerstvě v hornině nalezený se několik dní v teplém vzduchu ležet nechá, rozpadá se potom rychle v drobty, zvlášť byl-li sluncem vysušen.

Pokračujícím vysycháním delvauxitu ve vzduchu ubývá jeho vlhkosti, a potažná váha uveličuje se. K potvrzení toho, že až na malé výjimky potažná váha nerostu ve vzduchu vyschlého se tím více uveličuje, čím více mu vlhkosti ubývá dělány pokusy, kterými to stvrzeno:

|                                                                                                                   | hygroskopické<br>vody | potažná váha nerostu<br>ve<br>vzduchu vyschlého |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Delvauxit z Dobříčce obsahoval za 10 dní potom,<br>když byl ze štoly na den vynešen . . . . .                     | 24·80                 | 1·9240                                          |
| Jiný kus před měsícem čerstvý, z žíly, v níž zarostlý<br>byl na den vynešený [i] na straně 251] . . . . .         | 21·32                 | 1·9404                                          |
| Nerosť z Chrustenic, čerstvý z dolu vynešený, který<br>několik dní na vzduchu chráněn ležel . . . . .             | 16·74                 | 2·2676                                          |
| Nerosť z Nenačovic, kterýž po svém nalezení asi<br>3 roky ve sbírce, chráněn před sluncem, uschován byl . . . . . | 12·00                 | 2·3545                                          |

Drobty na vzduchu rozpadnuvšího se nerostu Nenačovického, kterýž po 3 roky na haldě změny povětrnosti zakoušel, tedy deštěm a sněhem prosáknut byl, sebrané za parného dne a brzy na to zkoušené . . . . .

12·62

2·2308

Přibývajícím stářím tedy nerost se stává sušším a tedy tak jak ve vzduchu vyschlý jest, poměrně těžším.

Dle těchto zkušeností jest delvauxit toliko, když zarostlým jest, pevný, pokud jest úplně vodou prosáknut. Jelikož ale okolní hornina (žilová, do které delvauxit v závalkách zarostlý jest) mimo vlhkem též epsomitem prostoupena jest, dělí s ní delvauxit tyto vlastnosti v měře svrchované. Ku zkoušce, zdali nerost epsomitem proniknut jest, se hodí toliko zcela čerstvě v hornině zarostlé nalezené kusy, kteréž žádným deštěm ještě nepromokly. Nerost jeden z Dobříčce zkoušený (i na str. 251) držíci vlhkosti 21·32%, hutnoty 1·9404 obsahoval 1·66%  $MgO SO_3$  (co bezvodý siran hořečnatý vypočítán) v studené vodě rozpustného; byl-li ve vodě vyvařen, rozpustily se z něho ještě 510% (siranu hořečnatého, bezvodé počítáno)  $MgO SO_3$ ; nerost tedy byl 676% (bezvodého)  $MgO SO_3$ , prosáknut, dokud ještě v žilové hornině zarostlý byl. Tomuto množství siranu hořečnatého odpovídá 451% kyseliny sírové; zdali tedy všechna kyselina sírová v nerostu obsažená není vázána na kysličník hořečnatý a vodu co epsomit, tedy alespoň valná část její jest v tomto sloučenství v nerostu obsažena.

V nerostu, kterýž po dlouhou dobu změnám povětrnosti podléhal, jsou malé částky  $SO_3$  v něm obsažené snad jiným způsobem než na magnesii vázané.

Delvauxit jest nerost hygroskopický, kterýž když byl na suchém vzduchu vyschl, opět něco vody z vlhkého vzduchu přibírá.

Aby se zjistilo, jakým způsobem delvauxit pod chloridem vápenatým své hygroskopické vody pozbývá, dány dvě proby, asi před měsícem ze štoly Dobříčské na den vyceněné (i na straně 251), tedy za ten čas na vzduchu trochu osušené, pod zvon skleněný nad chlorid vápenatý a sice jedna na otevřené hodinové sklíčko, druhá do otevřeného piknometru.

Proba na hodinovém sklíčku

Proba v piknometru

ztratila hygroskopické vody

|                   |        |
|-------------------|--------|
| za 22 hodin . . . | 16·9%  |
| „ 25 „ . . .      | 17·7 „ |
| „ 48 „ . . .      | 23·3 „ |
| „ 5 dní . . .     | 24·1 „ |
| „ 6 „ . . .       | 24·3 „ |
| „ 13 „ . . .      | 24·8 „ |
| „ 20 „ . . .      | 24·4 „ |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| za 22 hodin . . . | 1·07%   |
| „ 25 „ . . .      | 1·19 „  |
| „ 48 „ . . .      | 2·03 „  |
| „ 5 dní . . .     | 5·6 „   |
| „ 6 „ . . .       | 6·3 „   |
| „ 13 „ . . .      | 10·8 „  |
| „ 20 „ . . .      | 14·2 „  |
| „ 26 „ . . .      | 16·6 „  |
| „ 33 „ . . .      | 20·0 „  |
| „ 60 „ . . .      | 23·82 „ |

Kousky delvauxitu vši hygroskopické vody prosté nezměnily ani podoby své ani barvy, toliko malým tlakem se mnohem snadněji v menší drobty rozpadávaly, než to před vysušením bývalo.

Nerost vysušený jest velice hygroskopický a přitahuje rychle vodu ze vzduchu.

Proba na hodinovém sklíčku přitáhla vody na vzduchu ponechána

za 5 minut . . . . . 3%

Hodinové sklíčko jiným nabroušeným uzavřeno a sponkou připevněno, ponecháno tak uzavřené na vzduchu, a přitáhlo

za 7 dní . . . . . 7.9%

Otevřeno-li hodinové sklíčko a ponecháno na vzduchu, přitáhl ještě nerost

za 4 hodiny . . . . . 9.5% vody

„ 5 „ . . . . . 9.9 „ „

„ 24 „ . . . . . 10.8 „ „

„ 48 „ . . . . . 11.7 „ „

za 5 dní . . . . . 12.3 „ „

„ 6 „ . . . . . 12.3 „ „

„ 13 „ . . . . . 11.5 „ „

„ 20 „ . . . . . 11.4 „ „

Když byl tedy nerost asi 12% vody na vzduchu vsákl, proměňovala se jeho vlhkost právě dle vlhkosti vzduchu.

Delvauxit barvy smolné, z jednoho závalku, u Chrustenic nalezeného, jak pod písmenem d) na straně 242 analysován jest, zadržoval v sobě brzy po vynajití 16.74% hygroskopické vody, kteréž pod chloridem vápenatým zbaven byl. Když analýsa asi 1 až 2 měsíce později dělána byla, obsahovala toliko 9.11% vody vsáknuté.

Proba při 100°C tak dlouho vysušená až vody nevydávala ze sebe, vydala

8.82% chemicky vázané vody při 100°C unikající.

Nerost při 100°C vysušený přitahoval na vzduchu opět rychle vlhkost do sebe a množství vody v něm

za 4 minuty obnášelo 8.52%

„ 1/4 hodiny 7.57 „

„ 2 „ 6.54 „

„ 4 „ 5.28 „

„ 24 hodin 2.22 „

„ 48 „ 2.1 „

„ 3 dni 2.1%

Nerost tedy opět přitáhl vodu svou, kterouž při 100°C pustil, ze vzduchu zpět.

Delvauxity delší čas na vzduchu vyschlé (tedy za čas, když z dolů nalezeny a na den vyneseny byly), obsahují 5.14 až 13.97% hygroskopické vody, kterouž pod chloridem vápenatým potrácejí.

By se též přesvědčenost nabyta, jak rychle delvauxit svou chemicky vázanou vodu při 100°C potrácí, zahřívána proba z Nenačovic a) strana 102, když byla dříve pod chloridem vápenatým vysušena (12.62% vody hygroskopické obsahující) ve vodní lázni na 100°C a čas od času vážena.

Proba při 100°C sušená pozbyla vody

za 3 hodiny . . . . . 7.03%

„ 4 1/2 „ . . . . . 7.26 „

„ 7 „ . . . . . 7.41 „

„ 17 „ . . . . . 7.56 „

Více vody nerost nevydal. Poslední zbytky vody tedy při 100° C toliko pomalu z nerostu unikají.

Jiný delvauxit z Dobříče poměrně dosti mladý (to jest čerstvě nalezený), kterýž pod chloridem vápenatým 22·23% hygroskopické vody vydal, byl při 100° C sušen a potratil vody

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| za 2 hodiny                       | 7·55%   |
| „ 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „ | 8·24 „  |
| „ 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „ | 8·42 „  |
| „ 7 hodin                         | 8·91% ; |

dále na 100° C zahříván, nepozbyl více 8·91% vody.

Nerost ještě nad 100° C zahřát, pouštěl ještě vody a sice

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| za 3 hodiny při teplotě 120° C               | 15·42%  |
| „ 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> „ „ „ 137° C | 16·43 „ |
| „ 1 „ „ „ 150° C                             | 16·60 „ |
| „ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „ „ „ 220° C | 17·93 „ |
| „ 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „ „ „ 220° C | 18·19 „ |

Jestli že nerost, silně vysušený, kterýž sušením nikterak barvy své neproměňuje, na pouhém vzduchu ponechán jest, přitahuje vody náramnou rychlostí a ztráta jednou pozbyté vody jeho klesá tím neustále, nebo obnáší množství potracené jím vody

|                    |         |
|--------------------|---------|
| za 3 minuty toliko | 17·55 % |
| „ 8 minut          | 16·75 „ |
| „ 1/4 hodiny       | 16·61 „ |
| „ 1/2 „            | 15·09 „ |
| „ 3/4 „            | 11·42 „ |
| „ 3/4 „            | 11·07 „ |

Kdyby byl pokus dále prodloužen býval, byl by nerost opět své vlhkosti nabyl, kterou vůbec ve vzduchu zadržet může, tak jako ostatní na vzduchu vyschlé delvauxity.

Když naše delvauxity toliko nepatrně malé množství kyseliny sírové obsahují, kteráž z větší části hlavně magnesií a vodou co epsomit vázána jest, přibližují se dosti značně vzorci sloučenství Hauerem určenému; drží-li ale mnoho kyseliny sírové, klesá tím zároveň jejich množství vápna a seznává se, že jsou diadochitem pomíchány.

**Přehled.** Pro druh nerostu delvauxit možno krátce dle vědomostí nyní nabytých následující přiměřenější popis jeho sestavit.

Delvauxit se objevuje toliko obmezeně v žilách na blízku loží rud železných (hnědých) a sice toliko na výchozu jejich, kde nerost v závalkách s povrchem hroznovitým se vyskytuje. Barva jeho jest hnědá, ledvinová, kaštanová až hnědočerná, lom jest lasturový, lesk smolný. Křehký nerost rozpadává se časem v drobty za příčinou svého vysychání. Na vzduchu vysušen obsahuje ještě značné množství hygroskopické vody, kterouž po delší době úplně pod chloridem vápenatým potráčí a na vzduchu zase přitahuje, an látkou velmi hygroskopickou jest. Slabě žlhná až tím vody pozbyl, tvoří rudý prášek; v žáru před dmuchavkou taví se v šedočernou magnetickou kuličku. Potažná váha nerostu jest měnivá od 1·85 do 2·25 a jest tím těžším, čím méně hygroskopické vody obsahuje. Jestliže se potažná váha nerostu v kouskách nebo v prášku určuje, nemění ničeho na číslicích. Toliko proby

pod chloridem vápenatým úplně vysušené poskytují určitá čísla potažné váhy 2·696 — 2·707. V studené sehnané kyselině solné se nerost velmi snadno rozpouští v hnědý roztok vylučující něco chomáček kyseliny křemičité. V teplých třeba i v rozředěných kyselinách se náramně snadno rozpouští. Ve vodě prýskají některé odrůdy se slabým šramotem, aniž by se ale rozpadávaly.


Naleziště nerostu jsou: Berneau u Visé v Belgii jak se zdá na blízku žil limonitových doprovázejících žíly leštěnce olověného na výchozím. Též v žilách a rozsedlinách, které pronikají ložisko limonitu a phyllity, v nichž ložisko uloženo jest v Dolingraben u Freisteinu a Sv. Petra (Lubně — Leoben něm.) v Štyrsku, ve výchozím. V značné výšce svahu na levém břehu Vordernberského potoka nad hutí Donavickou a Sv. Petrem jest blízko temena alpského hřbetu uloženo ložisko limonitu, nyní opuštěné ve phyllitech, leckdes s vápencovými phyllity se střídajícími (snad do spodního silurského útvaru neb laurentánu náležející). Z celého uložení se zdá vysvítat, že ložisko vzalo svůj původ z kyzů zvětraných. Ve phyllitech trochu zkypřených, zvláště ale v rozsedlinách, sestávajících z rozdrčených úlomků břidlic zarostlé závalky delvauxitu jako u nás. Delvauxit se drolí tolikéž jako český a belgický vyschnutím. V některých shlukách s povrchem hroznovitým jest jádro barvy cihlové, lomu rovně lasturového, lesku mdlého, kraj ale kaštanový lomu lasturového a lesku smolného. Střed obsahuje, zkoušen kvalitativně, něco málo kyseliny sírové, protože s malými částkami diadochitu pomíšen jest, kterýž příčinou jest, proč střed pevnější jest drolivého a prýskajícího kraje když byl vyschnul. V jalových žilách, kteréž v sousedství výchozího pod drnem ložiska rudní českého silurského útvaru prorážejí. Tak v Nenačovicích v jalové žíle na blízku velmi chudobného ložiska limonitového, u Chrustenic na blízku ložiska chamoisitového, pod drnem v limonit proměněného, tolikéž zde i žilky v závalkách diadochitu tvoře. V Nenačovicích u Chrustenic ve vrstvách drobných břidlic pásma *Dd*<sub>4</sub> spodního siluru. U Dobříče v jalovém vržení na blízku limonitového ložiska ve vrstvách graphtolitových břidlic a diabasových tufů ve vrchním siluru *Ee*<sub>1</sub>. U Mezihoří (na blízku Benešova) na blízku žíly limonitové ve phyllitech lauretánských neznámo ještě zdali též v žíle zarostlý jest, an toliko pod drnem závalky povalující se nalezeny byly. <sup>42)</sup>

#### 4. Diadochit.

Tento původně u Saalfeldu nalezený, od Breithaupta pojmenovaný (*Journal für prakt. Chemie* 1837, X. 503), potom od Plattnera analysovaný nerost (*Rammelsberg Beiträge zur Mineralchemie in Poggendorfs Annalen* Bd. 62 p. 137 a *Erste Supplement zu Rammelsbergs Handwörterbuch des chemischen Theils der Mineralogie* p. 45, *Rammelsberg Mineralchemie* 1860 p. 360) má následující složení:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <i>HO</i>                          | 30·344            |
| <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 39·690            |
| <i>PO<sub>5</sub></i>              | 14·811            |
| <i>SO<sub>3</sub></i>              | 15·145 . . . 14·9 |
|                                    | -----             |
|                                    | 100·000           |

Analýsa, kteráž podmiňuje vzorec



přešla do všech nerostopisů.

Vařící voda odjímá dle Rammelsberga diadochitu 12·6 %, kyseliny sírové, tak že v zbytku vyvařeném jí toliko 2·3 % zůstává.

Nerost ledvinovitě, krápníkovitě, soustředního slohu, lomu lasturového, barvy hnědé až žluté, lesku skelného až mastného, kterýž průsvitavý, křehký a snadno roztržitelný jest, jest vlastností chemických jak to takové sloučenině přináleží.

Vydává totiž v žáru vodu a něco kyseliny sírové, barví světlo před dmuchavkou zeleně, nadýmá se a taví toliko na hranách v černou málo magnetickou strusku.

Náš nerost, kterýž v krajině českého silurského útvaru spodního tak hojně se objevuje a pod písmenami a až x analysován jest, shoduje se dosti sblíženě s analýsou právě uvedenou, nerostu durinského.

Byť by i většina analysovaných diadochitů co do sloučenství s nerostem právě uvedeným souhlasila, tož náš nerost ve svých zevnějších znacích odchyluje se dosti značně od tohoto vzorného nerostu.

V sehnané kyselině solné se nerost i v chladu snadno rozpouští, v kyselinách rozředěných se rozpouští v teple snadno v žlutý roztok vylučující něco málo chomáčků kyseliny křemičité, an zároveň malá částka kyseliny křemičité v roztok přechází.

Určování vody musí se dít tak jako při delvauxitu pozorně, an vedlé vody v žáru i kyselina sírová prchá. Aby se kyselina sírová vážala, tedy se proba, z kteréž se v žáru nepřímým způsobem voda určití má, musí vrstvou kyslíčnku olovnatého pokrýt, kterýžto všecku kyselinu sírovou váže. Proba vyžíhaná jest hnědorudá a značnou bílou vrstvou síranu olovnatého pokryta, v který se část klejtu proměnila.

Tvrdost nerostu jest měnivá, od 2·5 do 3; Saalfeldská odrůda ve svých tvrdších částkách objevuje tvrdost vyšší 3, an jí calcit rýpán jest. Naším českým odrůdám přináležejí všechny stupnice tvrdosti od 1 až přes 3. Závalky zemitého lomu mají nízkou tvrdost, an jako křída barví; pevné vrstvy nebo shluky z Chrusenic rýpají však i calcit.

Barvy diadochitu jsou běložlutavé, citronové, špinavě žlutověhnědé, oranžové, cihlové až špinavě cihlové.

Potažná váha Saalfeldského diadochitu udává se od 1·9 až do 2·035.

Náš nerost jest dutinatý a vyvíjí ve vodě převelmi malé bublinky vzdušní, kteréž teprve po dlouhé době se vyvíjet přestávají; určí-li se potažná váha nerostu, spíše než bublinky z něho vyšly, tedy obnáší 1·8863 až 2·4227; určí-li se hutnota ale potom teprve, když všechny vzdušní bublinky vyšly, což mnohdy několik dní trvá, aneb jest-li se místo toho nerost ve vodě vyvaří, tedy stoupne potažná váha na 2·2205 až 2·7634, což tím se vysvětluje, že nerost 6 až 20·5 % dutinek vzduchem vyplněných obsahuje. Příčina toho proč potažná váha nerostu vodou úplně prosáknutého tak měnivá jest, leží v tom, že nerost obsahuje 0·7 až 3·21 % hygroskopické vody, kteráž teprve pod chloridem vápenatým z něho vysušena býti může. Potažná váha diadochitu jest tím vyšší, čím méně hygroskopické vody obsahuje. Jest-li že se dříve nerost pod chloridem vápenatým vysuší, než se určení



hutnoty jeho předsevezme, tedy se tím potažná váha jeho zvýší na 2·7707. Potažné váhy nerostu, na vzduchu suchého, dají se snadno převést na nerost prostý vší hygroskopické vody, je-li množství vody vsáknuté v nich známo, potom se hutnoty přibližují značně oné právě udané.

Potažná váha našeho nerostu jest vyšší než ona nerostu z naleziště Saalfeldského, z čehož se soudit dá, že tato určena nerostem, kterýž hygroskopickou vodu pohlcenou držel.

Tak jako delvauxit, jest i diadochit, vzat-li z břidlic zrušených, v nichž zarostlý bývá, značně vodnatý; jak se zdá tak značně, ne-li ještě značněji, jako břidlice jej zahrnující a jest tolikéž i epsomit v malých částkách prostoupen.

Drobové břidlice porušené, v nichž oranžový diadochit m, n, o, p, strana 239 vtroušen byl, obsahovaly na počátku jara 8·91 a 9·54% hygroskopické vody, kteráž z nich při 100° C prchala. Dá se z toho soudit, že diadochit, pokud v zrušené drobové břidlici zarostlý byl, obsahoval přibližitelné onomu množství vody. Diadochit však na vzduchu vyschlý nezadržuje v sobě nikoliv tak vysoké množství vody jak to v delvauxitu objeveno, an nejvyšší množství vsáknuté vody 3% obnáší, nerost tedy vysychá rychleji, aniž by tím toho nejmenšího na pevnosti pozbýval.

Malé částky epsomitu v diadochitu obsažené dají se vodou vylouhovati; diadochity, kteréž změnou povětrností vylouhovány (od deště a sněhu) byly, neobsahují epsomitu.

Časem vysychají diadochity značně.

Tak obsahoval diadochit z Krahulova, odrůd i na straně 238 podobný, kterýž po dva měsíce na haldě se válel, (potažná váha 2·4221 když byl plný vodou vsáknutý) toliko 282% hygroskopické vody, ač celý týden pod zvonem vedlé chloridu vápenatého ležel.

Jak značně suchý diadochit hygroskopickým jest, vysvítá z toho, že tato pod chloridem vápenatým úplně vyschla proba opět za 12 minut ze vzduchu předešlé množství vody obnášející 282% do sebe vsákla.

Jiný, tolikéž takový kus, kterýž asi měsíc v dešti a slunci na haldě ležel a potom po několika měsících chráněn, uschován byl, ztratil hygroskopické vody pod chloridem vápenatým:

|          |     |
|----------|-----|
| za 1 den | ·4% |
| za 8 dní | ·6% |
| za 15 „  | ·6% |

Jiný kus, na který počasi z prvopočátku nemělo vlivu, an po 9 měsících uschován, tudíž na vzduchu vysušen byl a z něhož analyza i strana 238 vzata jest (potažná váha 2·4231 když byl vodou úplně prosáknut, 2·7707 když byl úplně prost vší hygroskopické vody) obsahoval 1·03% hygroskopické vody.

Aby se zjistilo jak rychle voda chemicky sloučena při 100° C z nerostu prchá zahřívány dvě proby ve vodní lázni při 100° C, při čemž ztratily vody:

|                        |                        |        |
|------------------------|------------------------|--------|
|                        | za 1 hodinu při 100° C | 2·61%  |
|                        | „ 1½ hodiny „ „        | 2·98 „ |
| za 3 hodiny při 100° C | 3·36%                  |        |
|                        | „ 3¾ „ „ „             | 3·18 „ |
| „ 4½ „ „ „             | 4·49 „                 |        |

|                       |        |                       |        |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| za 6 hodin při 100° C | 5·59%  | za 6 hodin při 100° C | 4·15%  |
| „ 8 „ „ „             | 7·08 „ | „ 8 „ „ „             | 4·33 „ |
|                       |        | „ 8½ „ „ „            | 6·11 „ |
| „ 10 „ „ „            | 7·77 „ |                       |        |
| „ 20 „ „ „            | 7·91 „ |                       |        |
|                       |        | po dlouhé době        | 7·88 „ |

· Více vody obě proby při 100° C nevydaly ze sebe.

Ještě více zahřáta ztratila proba vody:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| za 1 hodinu při 127° C | 19·73%  |
| „ 1 „ „ 137° C         | 21·74 „ |
| „ 1 „ „ 150° C         | 22·38 „ |
| „ 2¼ hodiny „ 220° C   | 22·54 „ |
| „ 4¼ „ „ 220° C        | 22·56 „ |

Diadochit, při této vyšší teplotě částky své vody chemicky sloučené pozbavený, mění barvu svou v špinavě citronovou a přitahuje na vzduchu opět vodu ale dalece ne v té míře a tak rychle, jako delvauxit vychladlý, při této teplotě vysušený. Na vzduchu přitáhl vychladlý nerost opět tolik vody, že obnášelo jeho množství vypuzené vody:

|             |         |
|-------------|---------|
| za 3 minuty | 22·49%  |
| „ 8 minut   | 22·17 „ |
| „ ¼ hodiny  | 22·07 „ |
| „ ½ „       | 21·99 „ |
| „ ¾ „       | 21·30 „ |
| „ 3¾ „      | 21·28 „ |

Vysušený diadochit jest tedy v porovnání s delvauxitem nerostem slabě hygroskopickým nepozbývajícím pevnosti vysušením.

Dle Rammelsberga (Beiträge zur Mineralchemie in Poggendorf Annalen Bd. 62. pag. 137 und Mineralchemie 1860 p. 360) z diadochitu Saalfeldského 12·6% kyseliny sírové vařící vodou se vylouhuje; náš nerost ve vařící vodě zůstal takřka nezměněný.

**Přehled.** Jelikož popis tohoto druhu toliko z nerostu Saalfeldského udělán jest, v Čechách ale rozmanité množství odrůd silurské rudy doprovází, tedy se tím rozhled na nerost značně rozšiřuje.

Diadochit se vyskytuje buď v ledvinovitých, krápníkovitých, miskovitě složených korách a křehkých nákytech lesku skelného nebo v shlukách (závalkách) hroznovitého povrchu, zemitého a mdlého lesku, lomu rovného. Barva jeho jest šedavěbílá, žlutavěbílá, voskově až citronově žlutá, oranžová, žlutohnědá až cihlová a hnědá. Tvrdost od 1 počínaje, až přes 3, jelikož měkké odrůdy jako křída píšou. Potažná váha jest velice měnivá, od 1·90 až do 2·76; nerost prostý hygroskopické vody pod chloridem vápenatým vysušený má potažnou váhu 2·771. Vařící vodou se toliko z některých odrůd značná částka kyseliny sírové vylouhovati dá. Na vzduchu sušené diadochity obsahují nanejvýše až 3% vody, kterouž, když z nich pod chloridem vápenatým vysušena byla, na vzduchu opět rychle pohlcují. V chladných sehnaných kyselinách, jakož i v teplých rozředěných se velmi snadno v žlutý neb

hnědavý roztok rozpouští vylučujíc někdy ze sebe něco kyseliny křemičité. V teple pouští vodu a kyselinu sírovou, an při tom barvu do ruda mění; ostatní znaky chemické jsou takové, jak ze složení vysvítá. Ve vodě nerost nepraská se šramotem, aniž se vyschnutím drolí.

Naleziště jsou: Arnsbach u Gräfenthalu a Schmiedefeldu a Garnsbachu u Saalfeldu v Durinském lese v kamenečné břidlici. V Jachimově v žíle sv. Dušní v starých chodnících co hnědorudý průsvitavý povlak na smaltitu, pyritu, chalkopyritu, pateraitu, selenitu, a erythrynu. Eisenbach u Štávnice v Uhrách v štolě Alžbětinské v korovitých skupeninách na křemenné hornině, v níž pyrit jemně vtroušen jest. V Křemenici v Uhrách na jílovaté hornině, ve Freibergu na zrušené rule.

Diadochity z Eisenbachu u Štávnice, Křemenice a Freibergu v Sasku (Phosphoreisensinter) jsou si velmi podobny. Potahují-li ve vrstvě slabší horniny žilové, tedy se takové povlaky podobají vyschlé žlutohnědé arabské gumě. Mocnější kory pak jsou tmavěji žlutohnědé a veskrz poprýskané. Kory se snadno drolí v kousky ostrohranné, lomu lasturového, lesku smolného, kteréž barvou žlutohnědou značně průsvitavé jsou. Daly by se takové kousky přirovnati ku kouskům kalafuny, kterým se nad míru podobají.

V závalcích, kteréž jsou ve vrstvách zároveň uloženy, buď v místech, kteréž se blíže označiti nedají, nebo ve vrstvách co hnízda až do jisté vzdálenosti od vržených zarostlé (ale nikdy v rozsedlinách samých) v nejbližším sousedstvu výchozího ložisek hnědé rudy aneb v chamoisitech hnědé rudy proměněných českého silurského útvaru.

V strání u malých Přílep, v černé drobové břidlici pásma  $Dd_1$ , na blízku velmi nuzných hnízd limonitových; u Vraže a Stodůlek v drobových břidlicích pásma  $Dd_4$ , na blízku ložiska chamoisitu v limonit proměněného. U Chrustenic a Nučic (vrch Krahulov) v nejbližším sousedstvu ložiska rudního v stropu v závalkách v zrušené drobové břidlici, v Nučicích a Jinočanech v počvě ložiska rudního, v jedné vrstvě v závalkách na blízku vržených, vše pod drnem v pásmu  $Dd_4$ . V Dobříči v malých závalkách a kuličkách v zrušených vrstvách šedé graptolitové břidlice bezprostředně v stropu křemenného ložiska limonitového pásma  $Ee_1$ . S delvauxitem pod drnem chudobné žíly limonitové u Mezihoře v Lauretánských phylitech (viz následující pojednání).

Ač Breithaupt toho mínění byl, že by diadochit a delvauxit v jediný druh nerostu vtaženy býti mohly, tož tomu přece jak chemické sloučenství, tak i ostatní právě uvedené vlastnosti obou nerostů nikterak nepřipouštějí.

Není to nijakou vzácností, že se objevují diadochity, kteréž obsahují kyslíčnfk vápenatý a málo kyseliny sírové, jakož i delvauxity, kteréž drží málo vápna a něco kyseliny sírové v sobě. Takové závalky jsou směsami obou nerostů v neurčitém poměru, v některých delvauxitech sestává obyčejně krajní vrstva, jsou-li diadochitem pomíseny ze smolně lesklého, křehkého, ledvinově, až kaštanově hnědého delvauxitu, střed pak z pevné nedrolící se směsi lomu rovného, celistvého barvy hnědé jak to u prob d, e, f, strana 242 objeveno bylo. Jakmile delvauxit s něco málo diadochitu pomíchán jest, stane se značně pevnějším. Takové směsi dějou se v neurčitých poměrech a hnedle každý diadochit obsahuje vápno a každý delvauxit něco kyselivy sírové, což o malých částkách jednoho nerostu, vyskytujících se v druhém, svědčí.

## 5. Váloit.

Tento nerost, kterýž jsem dříve nedokonale popsal (Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt, 1867; Helmhacker, Mineralspecies, welche in der Rosic-Oslavaner Steinkohlenformation vorkommen str. 210.) nalezen nejdříve, společně s dolomit, calcitem a ozokeritem (Hatchettinem) v trhlinách sphaerosideritových septárií, kteréž v stropu blízko první sloje, v pánvi uhelné, Rosicko-Oslavanské, v lupkách uložené, zvláště v severní části se objevují.

Tehdáž se s nerostem pro nedostatečné množství jeho žádné zkoušky předsevzíti nemohly, toliko tvrdost určena s 1·5. Mimo to není váloit, doprovázený ozokeritem nikterak čistý, any na něm pozůstatky nafty lpí, kteráž též voňavý zápach, jenž nerost, v prstech třen, vydává, způsobuje. Jsou totiž všechny rozsedliny a trhliny septarií ve sphaerosideritu od nafty vlhky, ba sphaerosiderit sám jest naftou úplně prosáknut.

Ve vrstvách vápencových českého vrchního silurského útvaru, zvláště v pásmech *Ee<sub>2</sub>*, *F* a někdy též *Gg<sub>1</sub>*, se objevují krátké, bílé vápencové žilky, v kterých maličké závalečky nebo jemné žilky černého nerostu se vyskytují, kterýž dle pohledu se náramně anthracitu podobá. Jak v bílém hrubovyhraněném calcitu, tolikéž i v černém nerostu se objevují velice malé, číré na obou koncích vyhraněné, pravidelné, velice lesklé krystalky křemene podob  $\infty P. - R. + R$ , kteréž třeba by hned patrnými nebyly, kyselinami se vyleptati dají.

Černý nerost masného lesku, ač na pohled anthracitu velmi podobný, se od tohoto přece svojí menší tvrdostí, váloitu přiblížené rozeznává a podobá se zcela našemu nerostu. Nerost jest tak měkký, že se tlakem mezi prsty v černý barvící prášek rozmoliti dá.

Váloit ze shluků sphaerosideritových, kamenouhelného útvaru mezi Zástavkou a Zbejšovem na Moravě, jakož onen z bílých žil calcitových českých silurských vápenců, se v zkoumadlech záporně chovají. V kyselinách sehnaných, jako chlorovodíkové, dusičné, v lučavce, v pryskyřicovém oleji, v sírouhlíku, étheru, líhu nezmění se ničeho na nerostu ani v teple ani za čas dvou týhodnů; v drasle žíravém a kyselině sírové se obě tato zkoumadla slabě do hněda zbarví, což se zdá být nepodstatným znakem, an se nerost nijak nemění.

Nejvýznamněji chová se nerost v teple. Na platinovém plechu zahříván, vydává nerost zprvku dým zápachu vonného, kterýž se liší velmi značně od onoho zápachu, jakým se kamenné uhlí poznává; ještě výše zahřát shoří s čadícím plamenem.

Jižně od Tachlovického lomu vápeného nalezeno v žilce, až na prst hrubé, tak mnoho tohoto černého nerostu, že se jím zkoušky podniknout mohly.

Nerost úplně čistě vybraný dal potažné váhy ze dvou prob 86 a 63 grammů těžkých 1·3909 a 1·4226.

Byť by nerost dle pohledu se byl zdál být velice čistým, tož přece vyvíjely obě proby v rozředěné kyselině chlorovodíkové kyselinu uhličitou, šumíce při tom, na důkaz, že nerost calcitem jemně prostoupen byl.

Calcit, prostupující nerost určen v množství 21·83%. Tento váloit tedy jest asi  $\frac{1}{2}$  calcitu úplně proniknut.

Jest-li určena potažná váha nerostu, prostého všeho calcitu, tedy nalezena tato z dvou částek 2·20 a 1·58 grammů těžkých co vlastní, válaity čistému příslušející hutnota 1·2693 a 1·2703.

Rozborem tohoto nerostu, podniknutým s probami, od calcitu úplně očištěnými, nalezeno prof. dr. Šafaříkem co střední čísla z dvou analys při 100° C sušeného válaity následující sloučení:

|          |              |
|----------|--------------|
| <i>C</i> | 85·64        |
| <i>H</i> | 5·20         |
| <i>O</i> | 7·96         |
| popel    | 1·20         |
|          | <hr/> 100·00 |

Přepočte-li se rozbor na nerost prostý všeho popele, obdrží se následující sloučenství:

|          |              |
|----------|--------------|
| <i>C</i> | 86·68        |
| <i>H</i> | 5·26         |
| <i>O</i> | 8·06         |
|          | <hr/> 100·00 |

Dle toho sloučení se liší válaity značně od asfaltu, ku kterému ho Naumann (Elemente der Mineralogie 1868 p. 553) řadí; nebo asphalt mající potažné váhy 1·1 — 1·2 se v étheru částečně rozpouští, kteréžto vlastnosti náš nerost nemá. Od succinitu, retinitu, copalinu, midletonitu, anthrakoxenu se nerost náš rozeznává barvou, tavitelností a menším množstvím vodíku v něm obsaženým. Anthracit pak má větší tvrdost 2—2·5 a vyšší potažnou váhu, obsahuje více uhlíku a méně vodíku než náš nerost. Mimo to neshoří tak jako náš nerost. Uhlí bogheadové drží ale mnohem více vodíku než válaity.

Nejvíce se náš nerost dle svého sloučenství podobá kamennému uhlí a sice následujícím odrůdám: oné z Newcastleu (Jarrow, chery coal)  $\alpha$ ; oné z Newcastleu (Garesfield, caking-coal)  $\beta$ , dle Richardsona; a odrůdám na uhlík bohatým z Rive de Gier,  $\gamma$  dle Regnaulta, jejichž složení jest následující:

|          | $\alpha$ )  | $\beta$ )   | $\gamma$ )  |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| <i>C</i> | 84·8        | 88·0        | 87·4—87·8   |
| <i>H</i> | 5·0         | 5·2         | 4·9 — 5·1   |
| <i>O</i> | 8·5         | 5·4         | 6·3 — 4·1   |
| popel    | 1·7         | 1·4         | 1·4 — 3·0   |
|          | <hr/> 100·0 | <hr/> 100·0 | <hr/> 100·0 |

Třeba by válaity ve složení se nejvíce podobal chery coalu z Jarrova u Newcastleu, nemůže se z té příčiny s kamenným uhlím spojit, proto že zahřát vydává voňavý zápach a se značným čadícím plamenem hoří, kdežto zápach kamenného uhlí jest škrtící a dusící.

Válaity by byl krásným dokladem toho, jak nerost kamennému uhlí podobný se v žilách vytvořiti mohl.

## Poznámky a vysvětlení

vztahující se k číslicím v pojednání obsaženým.

- 1) Výšky čerpány jsou z *Kořistkovy: Zprávy o pracích a výsledcích měření výšek v okolí Pražském*, kteráž co příloha v Živě 1856 obsažena jest. Některé výšky jiné vzaty z největší generalistábní mapy z roku 1868. Poznámka 1) se má nalézat na str. 90 ku konci odstavce před geognostickým přehledem.
- 2) Lip. Jahrb. XIII., 1863 u prostřed stránky 359 uvádí, že vedlé ústí Chyňavského potoka do Kačického, břidlice pásma *B*, jež Příbramskými břidlicemi nazývá, nejsou uloženy zároveň s vrstvami pásma  $d_1$ , z čehož by se soudit mohlo, že skutečně tomu tak. Však na přemnohých místech zárovnost obou pásem dobře odkryta jest a jednotlivý příklad, jichž ale velice mnoho poznáno jest, nemění ničeho na jednou již poznaném uložení, any všechny tyto nepravidelnosti pocházejí od rozsedin, kterými pásma zároveň uložená, vržena jsou v nezárovná. Právě na udaném místě by se dala zevrubně rozsedinu určit, kteráž vržení způsobuje, nebo všechna vržení otevřena a sledována jsou v báních blízkých. I jednotlivé vrstvy pásem  $d_1$ , bez odporu zároveň, bývají velmi často nezárovně k sobě uloženy, což se vrženími vysvětluje; ovšem jest poznání vržení někdy úlohou velmi nesnadnou i pro toho, kterýž v tom cvik má.
- 3) Lip. Jahrb. XIII. 1863 nahoře na str. 363 jmenuje tyto černé rudy „celistvé sphaerosiderity, v nichž částky, hnízda a pásy semenitého sphaerosideritu zahrnuty jsou.“ Ať jsou černé rudy čímkoliv, zajisté ale sphaerosiderity nejsou.
- 4) Lip. Jahrb. XIII., 1863 na str. 4 asi u prostřed udává, „že v nich uloženy závalky semenitého sphaerosideritu“, což též Boř. Acad. 1869, str. 28 dole, a Živa 1869, str. 20 nahoře po něm uvádí, čemuž ale tak není v skutečnosti.
- 5) Boř. Acad. 1869 a Živa 1869 seřazuje nerosty jím popsané dle tohoto pododdělení.
- 6) Bořický udává v Lotosu 1867 Märzheft, potom v Živě ročník XIII. 1866 str. 310, že nalezen v pásmu  $d_1\beta$  neb komárovských vrstvách, kterými snad tufy diabasové míněny jsou. Od tufů diabasových pásma  $d_1$  jest nerost náš ve visutém asi ve vodorovné vzdálenosti  $1\frac{1}{2}$  kilometrů, v zcela jiných horninách, než diabasech nalezen.  
Bořický v páté výroční zprávě o obecném reálném gymnasiu v Praze str. 5 praví, že delvauxit je v ležatém železných rud silurských u Nenačovic.  
V Nenačovicích se objevuje nerost v žíle a nikoliv v ležatém rud železných, kterých v Nenačovicích ani není.  
Tolikéž i zpráva o diadochitu, Bořickým na uvedeném místě udaná, co do objevování se ho, je chybná.
- 7) Lip. Jahrb. XIII., 1863 na str. 354 asi u prostřed udává, „že na mírné vyvýšenině asi 600 sáhů severně od Vinice u Nučic“ (kdež ruda chamoisitová vystupuje) „mezi Dušníky a Hořelice“ jsou otevřené lomy v křemenci vrstev brdských“, (čímž ona pásma  $d_1$  se vyznačují mají) „kteráž zde vodorovně uložena jsou.“ K tomu přidán obrázek znázorňující

průřiz obr. 4 a, b, z kterého vysvitat má nejistota, zdali křemence vodorovně uložené z pásma  $d_1$ , visutá neb ležatá pásma tvoří.

„Lomy, mezi Hořelicemi a Dušňky, v kterých křemencové vrstvy vodorovně uloženy jsou“, jest toliko lom východně vedlé samých Hořelic u silnice jižně proti hřbitovu miněn, nebo on jediný otevřen jest: křemencové vrstvy však v něm příkře k jihu jak naznačeno se kloní. Vůbec není v celém prostranství tohoto pásma *nikdež* místo odkryto, kde by vrstvy křemence příkře k jihu se neklonily. Nalezne-li se kdy takové místo, nebude zájisté rozsáhlé, a příčina vodorovného uložení ve vržení záleží.

Jsou sice též severně od Dušníků vodorovné vrstvy známy, tyto ale náležejí již křidovému pískovci a také se co do místa neshodují s popisem.

- 8) Lip. Jahrb. XIII., 1863 na str. 358 má tyto břidlice, mezi Loděnicemi a Chrutenicemi v stráni vedlé potoka uložené, za břidlice pásma  $d_1$ , neb jak je jinak Vinické jmenuje; skutečně jest podobnost k nerozeznání veliká.

Křemence s břidlicemi se střídající, vedlé samých Chrutenic, kteréž jsou  $d_1$ , pak má za křemence pásma  $d_2$  (Brdské), an prý mimo rozvětvené pruhy na vrstevních plochách též skameněliny pásma  $d_2$  obsahují; poslední se zakládá na omylu zajisté, nebo skameněliny námi nalezené a panem drem. Barrande-em určené, poukazují na pásmo  $d_1$ .

- 9) Lip. Jahrb. XIII., 1863, na str. 354 dole a 357 u prostřed jmenuje chamoisit náš sphaerosideritem černošedým, oolithicky zrnitým. Byť by i byly rudy nyní chamoisitem zvané třeba i čímkoliv jiným, nejsou zajisté sphaerosideritem, totiž uhličitánem železnatým  $FeO CO_2$ , znečištěným hlinou.

Na straně 444 udány rozborů dvou rud pod jmenem sphaerosiderit z Nučic číslo 7 a číslo 2 uvedené, z nichž č. 7 šedý, semenitý, celistvý, potažné váhy 3·254 s seménky kypřými, zelenavými.

Rozborů jsou:

|             | číslo 7. |                | číslo 2. |
|-------------|----------|----------------|----------|
| Nerozpustné | 7·4      | Ztráta žiháním | 9·9      |
| $CaO CO_2$  | 5·8      | $SiO_2$        | 25·6     |
| $MgO CO_2$  | 3·8      | $Al_2O_3$      | 8·6      |
| $FeO CO_2$  | 82·7     | $CaO$          | 3·1      |
|             | 99·7     | $MgO$          | 1·8      |
|             |          | $PO_5$         | sledy    |
|             |          | $Mn_2O_4$      | 5·0      |
|             |          | $Fe_2O_3$      | 43·9     |

Číslo 7 skutečně jest sphaerosideritem, však zajisté není z Nučic, nebo chamoisit z Nučic opětovaně analysovaný, nikdy se neobjevil co složený z převládajícího  $FeO CO_2$ . Analýza č. 7 jest úplně chybná a nehodí se na náš nerost. V analýsi žádná  $SiO_2$  a  $Al_2O_3$  a  $HO$  udána není, ač nahoře výslovně řečeno, že v rudě zelenavé kypře oolithy vrostlé byly, v kterých tyto neudané součástky obsaženy jsou, jak mnohonásobně dokázáno.

Číslo 2 se přibližuje spíše k složení chamoisitu, a nicméně, že v něm analysovaný žádný  $FeO$  nýbrž toliko  $Fe_2O_3$ , ač chybně udán jest, jsou přece co sphaerosiderity pojmenovány.

Tak si jméno sphaerosiderit a analýza v pojednání tomtěž odporují.

- 10) Lip. Jahrb. XIII. 1869 sice udává na str. 356, že ze štoly krahulovské pocházejícími skamenělinami, totiž z Dalmanites socialis Barr. a Trinuncleus ornatus Barr. poznal visuté co  $d_1$  (neb za Vinické vrstvy), kteréž též pro Chrutenické visuté ložiska na str. 357 dole přijímá, z čeho soudí na str. 359 dole, že ruda Jinočansko-Chrutenická jest starší pásma  $d_1$  (Vinických vrstev), čemu ovšem v přírodě tak není.

- 11) Lip. Jahrb. XIII., 1863 na str. 351 dole čte se, že sestává Zbuzanská ruda na jistých místech ze samých skamenělých lastur, v nichž otisky vrstev Chuchelských, tedy pásma  $e_1$  seznány byly, a že rudní uložení „má povahu žíly, že jest tedy spíše nepravidelným vyplněním rozsedliny, tudíž pozdějšího původu.“ Dále: „není v ní žádné vrstevnatosti a mohutnost jak dle vlaku tak dle sklonu jest velmi rozmanitě měnivá, tak že na některých místech až 3 sáhův dosahuje, an na jiných zcela stlačena jest.“

Též na str. 357 dole ještě jednou povaha žilová Zbuzanské rudy připomenuta jest. Jakkoliv v samé sadě již protivuřečí se povaze žilové tím, že se udává hojnost

skamenělin v tak zvané žíle obsažených, tož přece mnohými jinými důvody nevyvratně zjištěno jest, že Zbuzanská ruda neuložena v žíle, ale v *ložisku*.

Kdyby byla ruda v žíle uložena, kteráž tudíž jest povstání pozdějšího, jak přijdou do ní skameněliny, kteréž seznány co ony z pásma  $e_1$ , v němž mladší žíla uložena? Žíla jest mladší, ale obsahuje otisku, které svědčí o součastnosti s okolní horninou!

Ložisko jest dosti zřetelně vrstevnaté na přemnohých místech; dále jest ložisko patrné zároveň mezi vrstvy uloženo, jak též na nescíslných místech viděti jest.

Kdyby bylo ložisko žilou, muselo by nevyhnutelně sloh žilový míti; totiž musely by se v něm objevovat zarostlé úlomky okolní horniny a muselo by vysílati odžilky jako každá jiná žíla, což se všecko v něm nenalezá.

Že ložisko příkře se sklání, není důkazem toho, že jest žilou, nebo to toliko v některých místech se pozoruje; jinde jest sklon méně příkrý. Že se mohutnost jeho sžuje, není nic divného i pro samé ložisko ale zde právě sžování podmíněno jest hojnými rozsedlinami, kteréž ložiako Zbuzanské vrhají.

Jest nepochopitelné, jak se může povaha ložiska Zbuzanského co takového nepoznat.

- 12) Lip. Jahrb. XIII. 1863 str. 361 u prostřed. Slepence křemenné droby, ležaté křemencového pásma v Chrbinské štole skládající, by snad „Přibramskou drobou?“ byly, čímž se pásmo  $B$  vyrozumívá. Ony však bezprostředními přechody úzce s celým křemencovým pásmem spojeny jsou, náleží bez odporu do  $d_1$ .

- 13) Boř. Acad. 1869 str. 7. dole, Živa str. 6. dole udáno, že v tufech se nalezájí zrna (Körner) a pecky vápence. Nejsou to ani zrna ani pecky, nýbrž kuličky a sice geody nebo mandle, an větší z nich i sloh geod ukazují.

Totéž platí o zrnkách v německém popisu, na str. 10. uprostřed, v českém pojednání na str. 8. nahoře v labradorových tufech zarostlých, kteréž jsou kuličkami neb mandličkami.

- 14) Lip. Jahrb. XIII. 1863 na str. 361. u prostřed uvedeno, že mohutnost Komárovských vrstev, čímž tufy diabasové neboli mandlovce míněny jsou, obnáší asi 25 sáhů v Chrbinské štole jestli že žádných vrzení není; o několik rádků výše pak udáno, že tytéž vrstvy Komárovské, tedy opět mandlovce proraženy štolou Chrbinskou v délce 50 sáhův asi; což by však na mohutnost přepočítáno asi 39° dalo. Které číslo jest pravé? Prvé číslo, ač ještě velmi vysoké, přece skutečnosti jest bližší druhého.

Ostatně tomu tak není jak udáno, nebo štolou Chrbinskou proraženy mandlovce ani ne poloviční délkou vodorovnou, jaká zde udána jest.

- 15) Lip. tamtéž str. 361. dole: ložiako složeno z listnatého sideritu a celistvého haematitu, který obyčejně prvý nerost miskovitě objímá. V sideritu vyloučen pyrit. Ani neobjímá haematit siderit, který toliko v zrnkách v něm zarostlý jest, ani neobsahuje zrna sideritu vyloučený pyrit. Pyritu vůbec v červených rudách v zrnkách zarostlého není, což zvláštnost těchto rud jest.

Tentýž omyl týkající se sideritu, haematitem obalenu být majícího, opsán v Boř. Acad. 1850 str. 11. dole.

- 16) Krejčí, Bericht der geol. Aufnahmen bei Prag und Beraun. Jahrb. d. Reichsanst. XII. 1861–62, na str. 242. dole: udává, že chamoisitu podobná ruda jest přechody spojena se semenitou rudou, kteráž z ní zajisté okysličením povstává.

Boř. Ac. 1869 str. 11. u prostřed tvrdí již s větší určitostí, že jest chamoisitová ruda původní hmotou, z které všechny ostatní odrůdy rud železných se vytvořily. Uvádí se do kterých nerostů ruda okysličením se mění, že v siderit, haematit, magnetit a limonit.

Kdyby všeobecně tak bylo, tedy by chamoisit tak zvaný se musil nalezat v hloubce ložisek rudních, ostatní rudy pak blíže na výchozím. Však chamoisit ten, jakož i haematit, vystupují stejně až na den a není v hloubce ložisek, která přece již tak dalece dostižena jest, že by se v ní původní chamoisit jistě nalezati musel, kdyby z něho okysličením jiné rudy povstávaly. Však posud nenalezen chamoisitu podobný nerost veskrz v hloubce, aniž tak brzy nalezen bude.

Magnetit jest pro pásmo  $d_1$  ještě záhadným nerostem a dlužno, aby bylo z mnohých stran potvrzeno nezvratně, že rudu skládá, aby se nález jeho věrojatným stal. Posud dlužno pochybovati o rudách složených z magnetitu.



V Živě 1869 str. 9. u prostřed jest udáno s větší pravděpodobností, že se „zdá“ být chamoisit základní hmotou, v níž rozličné odrůdy železných rud vrstev d, původ svůj mají.

- 17) Lip. Jahrb. XIII. 1863 str. 360 u prostřed; ve Svárově jsou miskovité rudy, jejichž kora z haematitu a střed ze žlutého sideritu sestává.

Totéž opsáno v Boř. Acad. 1869 na str. 11. dole.

Siderit domnělý jest ale tuf diabasový. Pravý siderit zahrnutý miskami oolithů haematitových posud nikde nenalezen. Z potažné váhy samotné již jde, že to nemůže siderit být, byť sebe znečištěnější byl. V některých jádrech tufových zahrnutých poznán nezvratně tuf diabasový okolních vrstev, jakož zrnitý tak i břídlíčnatý.

Též v Lip. na str. 361. dole a 362. nahoře udáno, že i v ložisku nejvisutějším, kteréž jest uloženo do lože mandlovce spočívajícího v černých břidlicích ve visutém Chrbínské štoly, zahrnuto oolithy haematitu jádro sideritu prorostlého žilečkami pyritu.

Též tomu není tak.

- 18) Dle Boř. Acad. 1869 str. 14. dole, prý zároveň s vlakem ložisek se objevují rozsedliny několik sáhů dlouhé, kteréž zavrhuje lože jsou prý vrženými. Hojněji prý roztrhují příční rozsedliny lože rudní, až by je značně vrhaly aneb je ani prý nepošinují; tyto, slohem žilovým obdařeny jsou, jsou bohaty na nerosty na některých místech, což ale i u předešlých udáno.

Mezi rozsedlinami podélnými a příčnými rozprostírání ložisek není nijakého rozdílu, neboť se objevují nejen podélní a příční rozsedliny, nýbrž žíly ve všech možných směrech. Všecky rozsedliny jsou buď zároveň vrženými většími nebo nepatrnými, též jsou všechny žilami, byť by i jalovými byly.

Že do visutého a ležatého se prodlužují, samo sebou se vyrozumívá a není jinak možné u pravých žil.

V Živě 1869 na str. 11. nahoře uvedeno, že prý souběžné rozsedliny mnohdy několik sáhů široké bývají.

Tato převeliká mocnost žil zajisté pravdě nepodobná a nemožná vůbec jest.

- 19) Boř. Acad. 1869 na str. 27 uprostřed a v Živě 1869 na str. 19. též uprostřed uvedeny tvary calcitu co:  $R. \infty R$ .

Klenceč  $\perp R$  se nikdy ještě neobjevil, toliko  $\perp R$  nalezeno přehojně a posud výhradně na vápencích.

- 20) Boř. Acad. 1869 str. 16. dole uvádí z žíly, vedlé šachty č. II. ze Svárova neznámé malé droboučké, černavé krystaly lesku silně sklovitého, zarostlé vedlé pyritu.

Tyto krystaly jsou barytem čirým na podkladku asbolánu vrostlým, tudíž černavým.

- 21) Boř. Acad. 1860 str. 29. udáno, že redruthit co takový poznán.

Nám byl již dříve znám, an kvalitativně též námi zkoušen a poznán byl.

Kvantitativně analysovaný redruthit nebo chalkosin sestává, Boř. Acad str. 21, Živa str. 15. z:

|    |        |
|----|--------|
| Fe | 9.896  |
| Cu | 65.453 |
| S  | 24.651 |

jest tedy redruthitem, s 32.4% chalkopyritu znečištěným.

Však se nalézají též redruthity, kteréž takofka samočistým  $Cu, S$  jsou jen s nepatrnými částkami železa. Že jest chalkosin Svárovský vytvořený z chalkopyritu ztrátou železa a síry, tudíž že jest metasomatickou pseudomorphosou jeho, jak v Acad. na str. 21. a v Živě na str. 15. na obou místech uprostřed uvedeno jest, o tom pochybovatí dlužno, pokud se to dokázati nedá. Způsob, jakým se chalkosin zarostlý objevuje, an v něm předbírné krystalky chalkopyritu ostře zarostlé objeveny byly, nikterak tomu nesvědčí.

- 22) Vtisky ankeritu do barytu již Zippem, Verhandlungen der vaterländ. Gesellschaft des böhm. Museums 1839 str. 36. uprostřed, v barytech Komárovských pozorovány, an se o vysvětlení jich též pokoušel.

- 23) Boř. Acad. 1869, str. 21 a 25 nahoře a Živa 1869, str. 14. dole a 18 nahoře udává následující tvary tohoto barytu, z žíly u Svárovské šachty č. II., na kterých tyto plochy převládají:

1.  $\infty \check{P}_{\infty} . P_{\infty}$
2.  $\infty \check{P}_{\infty} . \bar{P}_{\infty} . P;$
3.  $\infty \check{P}_{\infty} . 0P . \infty \bar{P}_{\infty} . \check{P}_{\infty};$
4.  $\infty \check{P}_{\infty} . 0P . \infty \bar{P}_{\infty} . m\check{P}_{\infty}.$

Toliko číslo 1 a 2 se přibližují skutečným tvarům krystalů; tvary číslo 3 a 4 ani se neobjevují ani  $OP$  ani  $\infty P_{\infty}$  se neobjevuje, jsou tedy chybně pojmuty. —

Úplné popsání a vyčíslení tvarů barytových ze Svárova, Nučic a Hýskova, kteréž by se sem nehodilo, jest podáno v: Denkschriften der k. Academie der Wissenschaften. Math. naturh. Classe Bd. XXXII. 1872 pod jménem: Helmhacker, Über Baryte des eisensteinführenden böhmischen Unterailurs.

- 24) Boř. Acad. 1869 str. 20. uprostřed a 25. dole, jakož v Živě str. 14. nahoře uvádí vedle malachitu, azuritu, asbolanu též chrysokolu.

Však nezdá se být chrysokola s určitostí známa.

- 25) Krátký popis Šareckých a Trojských poměrů obsažen v: Krejčí Jahrb. d. geol. Reichsanst. Bericht etc. XII. 1861, 1862 strana 242; potom v Lip. Jahrb. XIII. 1863 str. 348. 351.

- 26) Lip. Jahrb. XIII. 1873 str. 355. uprostřed, uveden pro ležatá ložiska Nučického následující popis: Nejblíže následující ležaté vrstvy jsou: světle šedý tažný jíl s oolithickými žlutavými zrnky, — černošedá, nevrstavnatá, krátká písčinatá, drobová břidlice, v kteréž černá oolithická zrnka, bílé listky slídy a kyz vtroušeny jsou, — posléze šedé, žlutavé nebo bílé tufovitě tence vrstevnaté pískovce křemenné, s měkkou kaolinu podobnou hmotou mezi dutinkami křemennými a s bílými lupínky slídy na vrstvách. Pískovec tento posléze jmenovaný též v rozmělněných hlínách (jílech) v závalkách se objevuje, podob sploštělých kulí nebo elipsoidů, soustředně barvených, uvnitř bílými a hnědými železitymi pruhy, a obsahuje též nepravidelné kule kyzu nebo malé černé kulovité hloučky s zarostlými velejemnými krystalky kyzu nebo jehličkami kyzovými.

Tento popis se nikterak na ležaté rudy nehodí a jest tooliko nějaké veliké vrzení, kteréž zde popsáno jest. Nebo jíly toliko z rozmělněných břidlic ve vrzení obsaženy jsou a toliko vrzení obsahují závalky pískovců nebo křemenců, byť by se těmto sebe pravidelnější podoba připisovala. Též krátké horniny, totiž vrstvy, snadno rozpadající, jakož i kaoliny v pískovcích i zarostlý pyrit — vše to jsou znamení, kterými se vrzení být i z popisu, poznává zřetelně.

- 27) Lip. Jahrb. XIII. 1863 str. 354. dole udává, že v celistvé základní hmotě rudní se obyčejně pyrit zarostlý objevuje a sice buď v krychlích nebo ve velmi tenkých jehličkách.

Pyrit ale v rudní hmotě jest v skutku méně hojným, než by se z toho souditi dalo. Mimo to ale nikdy není zarostlý ani v krychlích ani v jehličkách, nýbrž toliko v zrncech složení celistvého na lomu.

Toliko jeden nerost se v krystalech, kteréž ale nejsou krychlemi a v jemňoučkých jehličkách, však ještě mnohem vzácněji pyritu zarostlý v rudě objevuje; jest to arsenopyrit a s tím přece se pyrit srovnati nedá.

- 28) Boř. Acad. 1869 str. 30 uprostřed udává, že jsou zemité nebo moučnaté bílé povlaky kaolinové, bělozelenavé však talkovité;

v Živě 1869. str. 21. nahoře uvádí pouze hmoty zelenobílé, mastku (neolithu) podobné.

Jak z pohledu pouhého, potom z bezpřetržitých přechodů, z bílého prášku krystalizovaného a z analys konečně vysvítá, není nerost být i barevný ani talku podobným ani neolithem.

- 29) Boř. Acad. 1869 str. 30. dole, uvádí dle našeho udání, že prý nerost tento toliko ve výchozím vrstev ležatých, v tence břidličnatých drolivých rudách železných zarostlý, z kterých prý na mnohých místech poznenáhle přechody do delvauxitu se sledovat dají.

Tak naše udání neznělo, nýbrž následovně: Nerost zarostlý do tence břidličnatých drolivých břidlic drobových, toliko ve výchozí části jich, z kterých (totiž z břidlic) se na mnohých místech poznenáhle přechody do rud železných (nuzného chamoisitu a limonitu) sledovati dají.

- 30) Lip. Jahrb. XIII. 1863 str. 352. uprostřed, nazývá tuto směs haematitu, železovce s křemenem

někdy sideritem prostoupenou „velmi pevným, celistvým, bílými žilami křemene prostoupeným magnetitem“, což se s přírodou neshoduje. Magnetitu, totiž  $Fe_2O_3$ , ani v Dobříči ani jinde u nás není.

Boř. Acad. 1869 str. 31. nahoře a Živa 1869, 21 uprostřed, udává přítomnost magnetitu z hořejšího pramene.

- 31) Kromě těchto uvedených rud v ložisku Dobříčském žádných jiných není ani dříve nebylo. Lip. Jahrb. XIII. 1863 str. 352. uprostřed uvádí co rudu z Dobříče ještě nějaký celistvý „Kieseisenstein“; potom směs červenavého křemene s žlutým krystalinickým ocelkem. O druhém nám povědomo, že se neobjevuje, o druhém pak nemožno ani říci, co by to bylo, nebo Kieseisenstein mineralogům aniž co nerost, aniž co něco jiného znám není, jen tolik, že ať to cokoliv jest, v Dobříči se to nevyskytuje.

Též Boř. Acad. 1869 str. 31. nahoře a Živa str. 21. uprostřed uvádí směšeninou červeného křemene s žlutým krystalinickým ocelkem z předešlého pramene doslovně.

- 32) Lip. Jahrb. 1863 XIII. uvádí na str. 352. u prostřed, že kieseisensteiny v jaspis a achát přecházejí.

Boř. Acad. 1869 na str. 31. nahoře vedlé jaspisu a achátu též amethyst co odrůdu křemene z Dobříče uvádí, v Živě 1869 však na str. 21. uprostřed toliko jaspis a achát.

Nejsnadněji by se omluviti dalo to, že některé rudy na prvý pohled nezkušeným co jaspis se podobají.

Však že achát se zde nalezá v přechodech s jaspisem a kieseisensteinem ve spojení, to se nikterak odůvodniti nedá. Nebo achát jest skupenina rozličných odrůd křemene objímajících se, což zde se neobjevuje ani nic jaspachatu podobného, leda by se ruda žilkami křemene protkaná snad achatem nazývala.

Amethyst též zde se nenalezl posud.

V páté výroční zprávě o obecném gymnasiu realném v Praze 1871 podává dr. Bořický Seznam nerostů okolí Pražského, do kteréhož přešly všechny údaje právě zde podotknuté a jež se tedy pro mnohé silurské nerosty s přírodou neshodují. Dlužno jich tedy opravit.

- 33) Ettingshausenem uvedeno ze Stradonic 18 rozličných druhů rostlin.  
34) Andréem uvedeno toliko ze Stradonic 30 druhů rozličných, z nichž zajisté jeden se stáhnouti dá do ostatních (možná i více), tak že toliko 29 druhů vybývá.  
35) Feistmantelem udáno k rostlinám Stradonickým ještě 19 druhů nových, z nichž se nejméně 1 druh opětuje pod jiným jménem a dá se tudíž stáhnouti, vybývá toliko 18 druhů. Všechny rostlin Stradonických tudíž nyní 47 bylo (jejichž číslo by se ale ještě o něco málo zmenšiti dalo.)

Mimo to udáno z ostatních nalezišť jako z Hýskova, Zlejštiny, Lísku a z Dibř 42 druhů, v nichž předešlých 19 pro Stradonic nové, obsaženo jest. Zbývá ještě 23 druhů pro tato naleziště, kteréž se v Stradonicích nevyskytují; však zajisté 6 druhů se dá co dvakrát jmenovaných, pod jinými jmény stáhnouti do ostatních již jmenovaných, tak že jich toliko 17 zbývá. Všechny druhů nalezených v těchto malých pánvičkách kamenouhelných jest 70; vezmeli se ohled na opětované jmenované, toliko 64 jich jest, číslo značně veliké kteréž v mnohém rozsáhlejší útvaru kamenouhelném obsaženo ani není.

V tomto čísle nejsou obsaženy uvedené druhy číslem 7 z Malých Přílep, jež se ale na 5 toliko stáhnout mohou, an jedno opětované jmenováno co jiná část rostliny již jinak pojmenovaná.

- 36) Že nález sloučeniny antimonu není v kamenouhelném útvaru osamotnělý, o tom důkaz podán Feistmantelem (Lotos 17. Jahrg. 1867, článek: Ueber Nebenprodukte böhmischer Hochöfen, str. 194), jímž nalezen v pískovci pánvičky kamenouhelné v Lísku nedaleko u Zlejštiny na pravém břehu Litavky antimonit stéblovitý, částečně i chomáčekovitě složený v malých částkách v něm zahrnutý.  
37) V poznamenaném spise jsou kaoliny, o kterých zmínka se děje tak, jakby snad ze silurského útvaru a sice ze Svárova pocházely — však původ jich jest v septariích sphaeroideritů Hýskovských, kamenouhelných.

Bořického, Pátá roční zpráva atd. uvádí též chybné naleziště tohoto kaolinu.

- 38) Že jsou skutečně naše Hýskovské krystaly kaolinu největší z posud známých, vysvítá z po-

rovnání s některými měřenými kaoliny cizími. V *The American Journal of Science and Arts*, by B. Silliman and Dana. Second series. Vol. 43, 1867 sestaveno pod článkem XXXIX. Contribution from the Sheffield Laboratory of Yale College — XIV. On Kaolinite, by Johnson and Blake, na str. 351—360 velmi mnoho kaolinů, z nichž některé krystaly dle rozměru uvedeny jsou a sice na str. 353 vyobrazena šestiboká tabulka kaolinu nalezeného v dutině uhlí v Summit Hill (Pennsylvania), délka její 130 mm., šířka 078 mm. obnáší. Úhle tabulek, kresleny v kameře lucidě z drobného zrna, změřeny na papíru úhlem 120°. Dle Clarke-a str. 354 jsou kaolinové plátky blíže Richmondu ve Virginii 026 mm. široké.

Dle Brushe-a jest kaolin, fluorit Cínvaldský doprovázející 013 mm. v průměru. Kaolin pak z Diensdorfu u Bodenmais (Boží mysle) v Bavorsku jest útlejší všech posud známých, an má rozměr 003 millimétrů. Na str. 405 téhož svazku Amer. Journ. uvedeny rozměry kaolinu doprovázejícího topas na Schneckensteinu v Sasku dle Knoppa (*Neues Jahrb. für Min., Geol. etc.* 1859 str. 544) co 021 mm. délky a 015 mm. šířky. Naše krystaly jsou tedy ještě dvakrát tak velkých rozměrů než tabulky z Summit Hillu, jež posud za největší platily.

- 39) Chamoisit z Chamoisonu a Saint Maurice ve Wallisu jak se od obchodníka v mineralech dra. A. Krantze (nyní od jeho následníků) rozesílá, není vlastně chamoisitem pravým, než toliko jeho odrůdou berthierinem zvanou, an sestává z malých, máku podobných, černošedých, soustředně vrstevnatých oolithů, zarostlých těsně vedle sebe do základní hmoty sideritu, na níž štípatelnost dobře vyznačena jest. Podobnost s našimi Nučickými berthieriny, jak na str. 202 číslo 1) a str. 208 pod písmenem D zmíněny jsou, jest až k nerozeznání značná. Však siderit jest u našich odrůd českých o něco světlejší odrůd švýcarských, tedy ještě úplně nezměněn, kdežto siderit vzorků Wallisských slabě nahnědlý jest od počínající proměny. Z té příčiny jsou naše české chamoisity co do neporušenosti nedostižitelné, an z hloubky dosti značné pocházejí; analýze našich vzorků tedy budou vztahovat se na čistší odrůdy, než jaké nám Chamoison poskytuje.
- 40) Od koho analýze tohoto chamoisitu zde uvedená pochází, není udáno v Dufrénoy-ově Mineralogii; bez pochyby že též od Berthiera pochází.
- 41) Des Cloiseaux ve svém Manuel de Minéralogie str. 470 nezná vysvětlení pro jméno Bavalit od Huot-a zavedené, nebo prý v celém Bretoňsku nestává žádné vesnice, ani žádné hutě, jejíž jméno by Bavalon bylo; toliko úval v lese de Lorges u Quintinu, kde se ruda dobývala, jest pod jménem malého údolí „bas vallon“ znám, od kterého by snad jméno rudy pocházet mohlo.

Však není-li jméno rudy utvořené z Bavalon, možno že od Baval pochází; jméno Baval ale Pouillon Boblaye v *Mémoires du Muséum d'hist. naturelle* XV., na str. 93 skutečně uvádí co naleziště starých břidelic a dioritů talqueux, jež na blízku ložisek rudních se objevují. Je-li tomu tak, došlo by jméno rudy jiného vysvětlení.

- 42) K. Feistmantel (*Lotos, naturwissenschaftliche Zeitschrift*, Prag 1867, 17. Jahrgang, str. 194, Ueber einige Nebenproducte aus böhmischen Hochöfen) poprvé upozorňuje na to, že jest v částkách a zrnkách obyčejně celistvého a částečně i zemitého zeleného nerostu, kterýž do šalesteinu v počtvě Libečovského rudního ložiska zarostlý, dle kvalitativního rozboru mnoho mědi obsaženo. Měď jsme toliko v nepatrných částkách v našem nerostu objevili. Feistmantel přirovnává tento zelený nerost k allophanu neb zemité chrysokole (zelení mědné).
- 43) O tomto posledním nalezišti u Mezihoří bude obšírněji pojednáno v následujícím pojednání „Zeměznalecký popis krajiny mezi Benešovem a Sázavou.“

## Opravy.

| Na strance 90, | řádka | 15tá | od hora | má stát     | Bubovským        | místo | Bubrovským     |
|----------------|-------|------|---------|-------------|------------------|-------|----------------|
| " "            | 92    | " 1  | " "     | " "         | debru            | "     | Debru          |
| " "            | 92    | " 6  | od dola | " "         | $d_1$            | "     | $A_1$          |
| " "            | 93    | " 3  | od hora | " "         | Tab. III.        | "     | Tab II.        |
| " "            | 94    | " 10 | " "     | " "         | ne               | "     | $uv$           |
| " "            | 94    | " 20 | " "     | " "         | drobové          | "     | drubové        |
| " "            | 94    | " 4  | od dola | " "         | Hypersthen       | "     | Hyperethen     |
| " "            | 95    | " 5  | od hora | " "         | geodami          | "     | zevdami        |
| " "            | 95    | " 7  | " "     | " "         | zkaolinovatělý   | "     | zkaulinovatělý |
| " "            | 95    | " 18 | od dola | " "         | východu          | "     | západu         |
| " "            | 95    | " 20 | " "     | " "         | východně         | "     | západně        |
| " "            | 96    | " 17 | od hora | " "         | $k$              | "     | $k$            |
| " "            | 96    | " 14 | od dola | " "         | oolitické        | "     | olitické       |
| " "            | 97    | " 16 | od hora | " "         | západní          | "     | východní       |
| " "            | 99    | " 19 | od dola | " "         | Rejnovského      | "     | Rojnovského    |
| " "            | 102   | " 10 | " "     | " "         | $KO$             | "     | $KN$           |
| " "            | 102   | " 1  | " "     | " "         | '54 a '45        | "     | 54 a 45        |
| " "            | 103   | " 2  | od hora | mají stát   | nad číslicemi    | b c   |                |
| " "            | 103   | " 15 | od dola | má stát     | nenačovském      | místo | kenačovském    |
| " "            | 110   | " 8  | od hora | " "         | $e_1$            | "     | $l_1$          |
| " "            | 111   | " 7  | " "     | má se slovo | snadno vynechat. |       |                |
| " "            | 116   | " 9  | od dola | má stát     | Sobotně          | místo | Sabotně.       |



## Vysvětlení tabule II.

### Obrazec 1.

Na průřezu asi 7 kilometrů dlouhém, který asi zároveň s Kačickým údolím veden jest, pozorují se od severu k jihu následující pásma silurská:

*Pásmo B*, do kterého náleží drobové břidlice *bř*, nejseverněji.

*Pásmo Dd<sub>1</sub>*; na břidlici uložené křemence a křemenné droby *dr*, *k*, pak diabasové tufy *d* a černé drobové břidlice *čbr*, skládají toto pásmo.

*Pásmo Dd<sub>2</sub>* sestává z křemenců *k*, tufů diabasových *d*, opět křemenců *k*, v kterých slabá lože diabasových tufů *d*, *d*, *d*, jakož i černých drobových břidlic uloženy a křemencem *k* pokryty jsou.

*Pásmo Dd<sub>3</sub>* uložené v Rejnovském vrchu u míst asi *kbř* naznačených, není určité seznáno. Za to ale *pásmo Dd<sub>4</sub>*, skládající se z křemenných drobových břidlic, černých a černohnědých drobových břidlic a křemenců *kbř*, *čbr*, *kbř*, *hbř*, *k*, jest od myslivny pod Rejnovským vrchem, až asi naproti Blejské v přerostanitém přerušení uloženo.

Toliko v pásmu *Dd<sub>1</sub>* jsou u *l* a *l* slabá, ale čistá bohatá ložiska rudy haematitu uložena.

Nyní následuje opět *pásmo Dd<sub>1</sub>* zastoupené černými drobovými břidlicemi a diabasovými tufy *čbr*, *d*, *čbr*, které vesměs v místech, kterými průřez sestaven jest, bezrudými jsou.

*Pásmo Dd<sub>2</sub>*, křemencové *k*, leží na nich a odkryto bílou příkrou skálou poloholou, nad kterou opět břidličnaté černé drobové vrstvy *pásma Dd<sub>3</sub>*, však opět určité nepoznaného, *čbr*, následují.

*Pásmo Dd<sub>4</sub>* jest vyznačeno svým křemencovým ležatým, v kterém též křemencové břidlice drobové barev šedých, černých a černohnědých uloženy jsou *k*, *k*, *k*, *k*, *čbr*, *k*, *kbř*, a svým, převládajícím drobovým, břidličnatým vysutým, sestávajícím z černých břidlic, *čbr*, hnědých, *hbř*, křemenných *kbř*, a opět hnědých *hbř*. Na hranici mezi převládajícím křemenným ležatým a břidličnatým visutým u *ch* v jižní patě Blejskavy jest ložisko chamoisitové rudy uloženo.

*Pásmo Dd<sub>5</sub>*; nejnížší vrstvy šedých břidlic *šbr* tohoto pásma obsahují malé shluky vápenaté se skamenělinami, kteréž se též v nejvyšších vrstvách pásma *Dd<sub>4</sub>* vyskytnou. Čím výše, tím více pískovcovatější břidlice šedozelenavé a střídají se s jemnozrnnými pískovci *P*, *P*, kteréž opět šedozelenými břidlicemi *šbr* končí.

Nad těmito břidlicemi následují tufy diabasové a diabasy *d*, *d* s pásmem černých graptolitových břidlic *gbř*, snad do nějaké kolonie, nebo do spodního pásma vrchního silurského útvaru náležejících.

### Obrazec 2.

jest průříz 4 kilometry dlouhý.

Od severu k jihu počínaje spočívají severně za Dušnickým kostelem na homoli nad černými břidlicemi drobovými *čbř pásma Dd<sub>1</sub>* vrstvy křídového útvaru *křp* co pískovce perucké, pásma cenomanského.

*Pásma Dd<sub>2</sub>* sestávající převládající z křemenců *k*, rozdělaných zaniklými lomy, leží na nich.

*Pásma Dd<sub>2</sub>* však není určité seznáno pro valně mohutnou ornici.

Za to ale *pásma Dd<sub>4</sub>* v ležatém svém křemencové a čím dále tím více s břidlicemi drobovými se střídající *čbř, k*, chová v sobě mohutné lože (až 20 metrů) chamoisitové, rudy železné, *ch*, kteráž pokryta černými drobovými břidlicemi *čbř* a potom hnědými břidlicemi *hbř*, na kterých *pásma Dd<sub>5</sub>* počínající šedozelenavými břidlicemi *šbř* pokrytými jemnozrnnými pískovci *p*, střídajícími se tolikéž břidlicemi.

Památná jest kolonie Tachlovická spočívající na těchto pískovcích a sestávající z černých graptolitových břidlic *gbř gbř gbř* a loží tufu diabasového *d, d, d, d*, kteráž opět pískovci *P* střídajícími se s břidlicemi šedými pokryta jest, kterýmiž i spodní útvar silurský vrchole svého dosáhl.

Následující diabasy *d*, jakož i šedé graptolitové *gbř*, mezi nimiž ruda Dobříčská uložena jest, pak opět následující tufy diabasové vrstevnaté *d*, jakož i pás vápenců šedých *v* i diabasových břidlic *d, d*, zastupujících graptolitové břidlice, jinde dost mohutné vyvinuté, skládají *pásma Ee<sub>1</sub>*, co nejspodnější vrchního silurského útvaru. V diabasových břidlicích u *l* jest lože Zbuzanské rudy uloženo.

*Pásma Ee<sub>2</sub>* skládá se z hrubozrnných vápenců *v* otevřených lomy Tachlovickým a Dobříčským.

### Obrazec 3.

představuje část menší než  $\frac{1}{2}$  kilometru z předešlého průřezu obrz. 3. k tomu účelu, by se uložení ložiska chamoisitového *ch* lépe znázornilo.

Od ložiska chamoisitového *ch* do ležatého pozorují se černé břidlice drobové *čbř, čbř, čbř, čbř, čbř, čbř, čbř* střídající se křemencovými vrstvami *k, k, k*, pak žlutými křemenci *ž* a vrstvami *d, d, d*, kteréž jmenem mandlovců pojmenovány jsou a z rozdrčených křemenců, pak též diabasových tufů se skládají. Ležaté pod rudou bylo výskumní štolou až do 200 metrů vodorovné vzdálenosti od počvy ložiska proskoumáno.

Visuté neb krov ložiska chamoisitu složen z černých drobových břidlic *čbř*, pokrytých hlinami *hl* a prodělanými těžní štolou.

Na obrz. 3. vidět rozdělení v ložisku roznosem jakož i průříz dolových úpadných chodníků jakož i směrých.

Stěna ložiska roznosem odkyta v *a a*.

### Obrazec 4.

znázorňuje podélný pohled na stěnu ložiska rudního, ve směru *a a* na obrazci 3. znázorněného. Ložisko jest tmavě čárkováno a vidět všechny vržení jeho, kterými pošunuto jest. Pod ložiskem spočívá počva jeho, složená z břidlic, střídajících se s křemenci; v krovu jeho jsou toliko černé břidlice. Tmavé čtyrstěny jsou ústí úpadně hnaných chodníků v ložisku.

## Vysvětlení tabule III.

### Obrazec 1.

Průříz v délce asi  $\frac{1}{2}$  kilometru představuje u *šb* šedé břidlice *pásma* silurského *B*, na kterých tufy diabasové *pásma* *Dd*<sub>1</sub>, *td* spočívají, v nichž uloženy jsou v těch místech, kterými průříz sdělán jest, tři lože rud železných, haematitových a sice nejspodnější ložisko na hranici mezi šedou břidlicí a tufem diabasovým u *td*, ostatní dvě ložiska u čísel 2 a 3 v pásmu diabasových tufů samých.

### Obrazec 2.

představuje průříz v délce asi  $1\frac{1}{4}$  kilometru.

Břidlice ležaté u *b* náleží do *pásma* *B*, na kterých leží

*pásma* *Dd*<sub>1</sub> sestávající z drob křemenných *kr*, pak z tufů diabasových *td*, v nichž asi troje ložiska uložena jsou, ač jen nejnižší prvé u *td*, známé jest, an ostatní, totiž 2hé a 3tí by se v místech 2? a 3? objevovati měly. Tufy pokrývá černá jemná břidlice drobová *čbř*, kteráž se s

křemenci *kr* *pásma* *Dd*<sub>2</sub>, pokrývajících jich, střídá až se úplně vytrácí.

### Obrazec 3.

tolikéž asi  $\frac{1}{2}$  kilometru délky zaujímající

představují u *b* opět břidlice *pásma* *B*,

na kterých křemence *kr* a tufy diabasové *pásma* *Dd*<sub>1</sub>, *td* spočívají, v nichž tři ložiska rud železných haematitových u čísel 1, 2, 3, uloženy jsou.

### Obrazec 4.

něco kratší  $\frac{1}{2}$  kilometru, jest dle map dolových úplně přesně vyveden.

*Pásma* *B* jest zastoupeno tmavou drobovou břidlicí *b*, *b* na obou stranách potoka Chyňavského, na kterých spočívají šedé zrnité břidlice *šb*.

*Pásma* *Dd*<sub>1</sub> složeno z křemenných pevných drob *kr*, pak z tufů diabasových, *td* v nichž troje ložiska rudní uložena jsou, z nichž toliko 1né a 3tí naznačeny jsou, an 2hé velmi blízko u třetího a sice pod tímto se objevuje. Tufové diabasy pokryty černou jemnou břidlicí drobovou *čbř*, v níž opět lože tufu diabasového *td*<sub>2</sub>, tolikéž rudu obsahujícího nloženo a opětně černou břidlicí *čbř* pokryto jest.

Na celém spočívá křemenec *kr* *pásma* *Dd*<sub>2</sub>.

Celé pásmo předěláno štolou Chrbínskou.



**Obrazec 5.**

představuje průřez v délce asi  $3\frac{1}{2}$  kilometru.

Jak na severu u Truhlářky tak i u Beránky jakož i na jihu u Třešovic jest útvar silurský pokryt spodními pískovci křídovými, pásem Peruckých a Korycanských (cenoman) *pi*.

*Pásmo* ležaté *b* náleží do souvrství *B* a uloženy na něm břidlice drobové a tufové *br* s žilami porfýru *p*, kteréž do svého krovu se v pravé tufy diabasové mění *td*<sub>1</sub> a do pásma *Dd*<sub>1</sub> náleží. Pokryty jsou tufy diabasové černými břidlicemi drobovými *čbr*, nad kterými opět mocný pás tufů diabasových *td*<sub>2</sub> spočívá, kterýž ale ve své počvě tmavými porfýry zastoupen jest. U *r?* by se v tomto pásmu měla ruda Vokovická objevovat. Pokryt jest pás diabasových tufů, na červeném vrchu u Vokovic na den vystupujících opět černými břidlicemi *čb*, kteréž střídajíce se s

křemenci *kr* pásma *Dd*<sub>2</sub>, úplně se vytrácejí do svého krovu.

**Obrazec 6.**

průřez v délce 2 kilometrů

sestává ve své severní části z bulžníků pásma *B*, *bu*,

na něž příkládá se pásma *Dd*<sub>1</sub> sestávající z tufů diabasových *td* a z břidlic černých drobových *čb*.

Pokrývající pás křemencový *br* náleží pásmu *Dd*<sub>2</sub>,

a následující drobové břidlice *čb* buď pásmu *Dd*<sub>2</sub>, aneb není-li toto zde vyvinuto, tedy pásmu *Dd*<sub>4</sub>, kteréž však v rovině mohutnými náplavy Vltavy pokryto jest.

## Vysvětlení tabule IV.

### Obrazec 1.

představuje průřez v délce asi  $\frac{1}{4}$  kilometru, na němž

jest *pásmo B* zastoupeno břidlicemi *b*,

a *pásmo Dd*, křemennými drobkami *kř*, jež však do krovu svého v jemné křemence a pískovce se mění, ba i trochu ztufovati — v jedné z těchto pískovcovitě tufových vrstev *l* jest náleziště skořápek od *Lingula lamellosa* Barr. — a pak tufy diabasovými *td*, *td*, v nichž dvě ložiska *r*, *r*, uložena jsou, z nichž zvlášť ono při jižní straně velice mohutné ale z nuzné rudy složeno jest.

### Obrazec 2.

V boku překopu se spatřují ležaté vrstvy křemencové *kr*, na nichž ruda mezi písmeny *s* a *v* spočívá, pak rozmanité tufy a břidlice tufové, v nichž rudní ložiska *r3* *r2* uložena jsou.

Rozmanité tufy a břidlice tufové jsou buď šedé břidličnaté u *s s* neb šedé u *šv š*, neb šedavorudé *šr* neb rudé břidličnaté *rb*, *rb*, bílé mandlovcovité u *b*, *bm*, zelenavěšedé a šedozelenavé *zš*, *šz*, *šz*, až jemné šedozelené *jšz*, neb zcela zelené *z*, neb tmavozelené *tr*.

Ložisko *rt* jest ruda velmi tufovitá; *v v* jsou vrčení slabá, toliko co úzké rozsedliny zastoupená.


### Obrazec 3.

Na křemencích *kř* při severní straně spočívají šedé *š*, pak rudé a zelenavé břidlice *zb*, v nichž asi dva slabé pláсты rud *r*, na blízkou kterých se otisky *Discina* sp. a *Obolus* sp. nalézají, uloženy jsou; břidlice střídají se s zelenavými u *bř*, pak s zelenými u *z*. Pak následují rudé zrnité *rz*, šedé břidličnaté *šb*, a rudobílé břidličnaté tufy *rb*, *t* a rudohnědé, v nichž slabé pláсты rudy *r r* uloženy jsou. V tufech mandlovcovitých *m* jest množství vápenných a dolomitových geod zarostlých. Tyto tufy mění se v šedozelenavé a šedorudé a šedé břidličnaté tufy *šz*, *šr*, *tš* a v šedý mandlovec *š*, v nichž u čísel 2 a 3 slabé lože haematitu uloženy jsou.

### Obrazec 4.


Na křemencích *kř* spočívají rudy *r 1r*, ve dvou plástech, pak v tufech dvoje ložiska rudní u 2 a *r3*, poslední opět ve dvou plástech. Tufy jsou bělošedé *b*, *b*, *tb* neb






1  
2  
3

Tab. III.





Tab. IV.







# Rudní lom u Nučie č. II.

Tab. V.

Sever



...th Bedřich Šandner v Praze. Vydáno 1881.




Pohled na lom rudní v Nučicích (vinice) Tab. VI.





Tab: VII.





# **Zeměznalecký popis**

**části**

## **krajiny mezi Benešovem a Sázavou.**

**S 2 tabulemi.**

**Sestavil**

**Rud. Helmhacker,**

**báňský inženýr a profesor mineralogie, geognostie a paleontologie na c. k. báňské akademii v Lubau.**





## Ú v o d.

Jako vůbec celé jižní Čechy, sestává i krajina kolem Benešova z převládajících hornin žulových, v kterých uloženy jsou v porůčí Sázavy, a jako vtroušeny ostrovy prahorních břidlic neb phyllitů. Jeden z těchto ostrovů břidličnatých, rozsáhlejší a prostrannější ostatních, rozprostírá se svojí délkou, dosahující bez mála 2 myriamétrů a šířkou nejrozsáhlejší asi  $\frac{3}{4}$  myriamétru, přes Sázavu, od východu k západu tekoucí, kterou na příč ve dvě částky dělen jest, v severní a jižní.

Severní půlka tohoto břidličnatého ostrova zasahuje mezi svým západním omezením u Čtyrkolenského mlýna a svým východním krajem u Komorného hrádku (též na Sázavě) až k Voděradům na sever. Toliko severovýchodní část ostrova břidličnatého, počínaje od Voděrad až přes Hrachové Střimelice, jest šedorudými permskými pískovci Česko-Brodské permské pánve pokryta, an ostatní ohraničení žulou vytvořeno jest. Jižní půlka břidličnaté prahorní krajiny, tolikéž v šířce mezi Čtyrkoleny a Komorným hrádkem až k Petroupínu zasahující, jest vesměs jen žulou obklopena.

Severní polovička břidličnatého ostrova, v jehož středu městys Ondřejov leží, vyznačena jest zvláštní rozmanitostí hornin; mimo to ale ještě tím, že v nich žíly zarostlé jsou, které porůznu rud olověných a měděných obsahují. Jakkoliv by, třeba toliko při povrchním zeměznaleckém propátrání tohoto Ondřejovského pásma břidličnatého, v rozličných ohledech zajímavý vědecký výsledek docíliti se mohl, tož přece by pro nepřístupnost starého rozdělení v rudních žilách nejpamátnější a nejdůležitější část celého pásma nepovšimnuta a neobjasněna zůstati musela.

Jinak jest ovšem v jižním souvrství břidlic, jejichž nejjihnější cíp u Soběhrad a Petroupína velice súžen jest. V této neméně pamětihodné částce objevují se hojně žíly rud železných, které tohoto roku nákladnými kutacími pracemi zkoušeny a otevřeny byly. Z příčiny, že vedle všeobecného zeměznaleckého popisu též veledůležité objevování se rud železných v obšírnější popis zahrnuto býti může; vybrána tato jižní část pásma břidličnatého, na které obce Vranov, Přestavky a Soběhrady, s připojenými svými dědinami, částečně se rozprostírají, k popisu zeměznaleckému proto, že až po jisté meze krajina dosti zevrubně proskoumána býti mohla.

Jelikož ale, jak ze severní polovice břidličnatého pásma u Ondřejova, tak i z jiných menších ostrovů břidličnatých okolí Benešova leckterés památné jednotlivé pozorování činěno bylo, které dle své neúplné zlomkovité povahy toliko co jednotlivé příspěvky teprve svým časem pro budoucí proskoumání celého okruhu upotřebeny býti mohou, a proto že mezi sebou beze všeho vztahu jsou: tedy umístěny budou toliko v dodatcích k tomuto článku.

Zmíněná krajina, jejíž zeměznalecké popsání podáno bude, jest již zeměznalecky ohledána, jakož i horniny roztříděny a ohraničeny poznačeny jsou na barevných mapách c. k. říšského geologického ústavu. Ale ohraničení žuly s prahorní břidlicí jak na mapách naznačeno jest, nesouhlasí úplně s ohraničením, jaké se v přírodě sledovat může, a protož odchyluje se mapa k článku přiložená tab. I. co se rozhraní obou hornin týče značně od mapy vydané od c. k. geologického říšského ústavu.

### Horopisný přehled.

Krajina břidličnatá má proti krajině žulové rozličný ráz. V břidličnatém pásmu vystupují poměrně hojněji jednotlivé vrchy s vyššími temeny a příkřejším svahem, než jednotvárné nevysoké a okulacené homole krajiny žulové. V žulovině převládají prostředně vysoké vlnovité pahrbky, kdežto příkřejší osamotnělé vrchy z prahorních břidlic složeny jsou.

Ona část našeho pásma břidličnatého, která se severně od Sázavy rozprostírá, vystupuje od řeky, ač povolně, přece neustále až za Ondřejov do výše, odkud k severu jednotlivé prostředně vysoké hřbety pahrbků, směrem jihoseverním se táhnou. Část jižně Sázavy jest zdálí již vysokým Chlumem neb Mráčským Chlumem, který 278° neb asi 525 m. nad obzorem mořským se vypíná, vyznačena hřbetem jeho, převyšujícím všechny ostatní temena žulových vrchů. Uprostřed břidličnatého pásma všem ostatním vrchům vrcholící Chlum, jehož krátký hřbet od jihu k severu směřuje, sklání se na všechny strany. K západu, bezprostředně pod temenem jest úbočí jeho nejklonitější; úklon svahu jeho mírní se ale neustále až k Mráčskému potoku v samé blízké vzdálenosti od Poříče. K severu sklání se úbočí Chlumu méně příkře; však mnohem méně sklonitá jest jeho jižní pata. K východu jest svah Chlumu toliko na krátkou vzdálenost, an po straně jeho východního úklonu se troje temena Čisteckých vrchů od jihu k severu rozprostírají. Mezi Čisteckými vrchy a Chlumem jest úzké, prostředně hluboké údolí, které jednak na sever k Přestavlkům a oprotiv tomu, též na jih k Mezihoří se sklání. Vesnice Mezihoří jest úplně mezi vrchy položena.

Mimo Chlum a Čistecké vrchy, vesměs nižší Chlumu samého, rozprostírají se ještě některé menší okulacené pahorky veměs směrem od jihu k severu. Tak jest vrch Vepří u Přestavlk a Doubravický vrch asi v severním pokračování Čisteckých vrchů; nízký Hradec u Mezihoří a vyšší Třemoch u Soběhrad jsou asi v jižním pokračování jich. Osaměle stojí toliko mírně vysoký Hořcín u Phova. Kromě těchto znamenitějších vrchů není důležitějších a značnějších vyvýšenin v pásmu břidlic; toliko v žulovině se vypíná několik vyšších vrchů do mírné výšky, kterým Meduněj všem vévodí, ač sám výše Chlumu nedostihuje.

Údolím Sázavským směřujícím od východu k západu, tedy na příč vlaku vrstev pásma břidličnatého, naznačeno nejnižší místo celé krajiny, u kterého všechny pahorky méně hojně mírně, obyčejně příkře se ukončují, tak že údolím Sázavským sloh vrstev skalních dobře odkryt jest.

Velmi dobře, ale méně významně, jest odkryt sloh skal potoky, podél vrstevnatosti od jihu k severu se ubírajícími jako: Mráčským, Čisteckým a Drhlovkou, jejichž koryto hluboko do vrstev hornin dle směru jejich zaryto jest.

Rozdíl v tvárnosti krajiny severně a jižně Sázavy jest ten, že prvá, ač mírně, přece neustále stoupá a toliko ve svých nejsevernějších a nejvýchodnějších částech v pahorkovatinu se vyvinuje; kdežto tato hned od Sázavy počínaje pahorky k jihu směřujícími znamenána jest, kterým všem pro krajinu význačný Chlum vrcholí.

### **Stručný všeobecný přehled zeměznalecký.**

Vrstevnaté horniny břidličnaté krajiny jižně od Sázavy objevují se ve dvou, jako choboty do žuloviny zabíhajících pásmech. Západní prostrannější pásmo táhne se, počínajíc asi u Čtyrkolen, přes Čerčany až asi k Žiňanům k jihu; potom po velmi značném súžení u Soběhrad přes Soběhrady kolem Zahořan přes vesnici Čistec, přes Doubravice až k Sázavě na sever, kde právě k zříceninám Staré Duby směřuje. V tomto západním pásmu prahorní břidlice vyskytují se na přemnohých místech jednotlivé větší neb menší ostrovy žuly, ba toliko pouhé žfly žulové, pak i mocné ložisko zrnitého vápence a posléze mohutná žila porfyru.

Východní pásmo břidlic, obmezenější předešlého, vleče se, od Hvězdonic na Sázavě počínajíc, směrem severojižním až za Vranov, kde mezi Vranovem a Lhotou Vranovou cípem končíc, ve směru severovýchodním okolo Mačovic a Oudolnic přes Naháč až ke Komornému hrádku se sledovat dá. V pásmu tom toliko břidlice, zvláště amphibolové a pak amphibolit, jmenovitě v severní části jeho, hojně co podřízené horniny se objevují.

V obou pásmech, žulovým pruhem od sebe oddělených se objevují na přemnohých místech žfly rudní v značné hojnosti.

Popis celé krajiny dělí se v *I. popsání břidličnatých hornin pásma*, v *II. popsání žulových hornin*; zvláštní ohled dlužno brát na nejdůležitější část hornin v krajině té, na *III. rudy v pásmu břidličnatém se vyskytující*. Mnohé nerosty se objevují v naší krajině, jichž též dlužno v *IV. seznamu vyskytujících se nerostů* uvést. Konečně jsou jednotlivé úryvky obsahu zeměznalecko-nerostopisného ve zvláštním *V. dodatku* sestaveny.

## I. Břidličnaté horniny.

Hornin břidličnatých, z nichž jmenovitě prahorní břidlice neb phyllit převládá, a v kterýchž podřízeně křemence a amphibolové břidlice se objevují, možno rozoznat dvojí ráz: Na Sázavě, tedy v severní části krajiny se objevují břidlice pevné, nezrušené zkyplením, v jižní části nabývají břidlice rázu porušenosti a zkyplení přeměnou a proměnou svou zvětráním. Břidlice porušené, méně pevné, se toliko v rudonosné části horstva objevují a jsou tedy pro rudonosnost jeho důležitý.

**Phyllit** se objevuje na Sázavě co hornina šedá až tmavošedá, pevná, nárazem znějící, velmi dobře břidličnatá, vrstevnatá, štípáním v desky se rozlupující. Hmota phyllitu jest velmi drobnozrnná, na lomu příčným; na lomu ploském však lesknou se přehojně lístečky slídové, jak se zdá muskovitu. V některých phyllitech jest ve směru břidličnatosti takové množství lesknoucích se lupínek slídových rozprostřeno, že hornina zprostředkuje přechod do jemnějších odrůd *svoru*. Že takové slídové odrůdy svorům podobné mnohem méně křemene, odrůd ostatních obsahují, jde samo sebou na um. Ostatní phyllity jsou jemného zrna a tím pevnější, čím více křemene v nich obsaženo.

V jižní části břidličnatého pásma jsou phyllity vesměs více nebo méně zkyplený; na blízku žil rudních ovšem dosahuje zkyplení horniny stupně znamenitého. Neporušené phyllity jsou se zkyplenými poněkud přechody úzce spojeny. Porušenost phyllitů počíná se jevit tím, že tmavošedé neb šedé složivo jejich bledne, a blednouc pevnosti poněkud pozbývá. Vyšší stupeň proměny jeví se tím způsobem, že na světlešedých prahorních břidlicích, kdekoliv nárazem rozštěpeny jsou, se vyskytuje slabý nádech hnědý, pocházející od limonitu, neb citronově žlutý přejemný, mající původ svůj v nějakém nerostu, vodnatém síranu železitém, snad glockeritu neb apatellitu neb i diadochitu podobném. Přibývajícím zkyplením břidlic ubývá pevnosti, hornina zcela vybledlá, buď na světlošedo neb i na světle žlutohnědo, drolí se snadno ve všech směrech. Břidlice na blízku žil rudních bývají ve všech možných směrech rozsedlinkami prostoupeny a každý rozdrolený kousek bývá hnědý od limonitu pokrývajících trhlinky horniny, třeba by tato uvnitř vybledlá, světlošedá neb jinak nahnědlá byla.

Ve phyllitech se objevují vrstvy, v nichž na úkor slídových lupínek, křemene přibývá; takové phyllity sprostředkují přechod do křemenců neb kvarcitů. Proměna a přechod do křemenců děje se ve vrstvách prahorních břidlic jak ve směru

vrstev samých, tedy dle směru a úklonu jejich, tak že některá vrstva na jistém místě jest co phyllit, na jiném co křemenec s pomenáhlými přechody obou hornin do sebe, vyvinuta. Tolikéž i ve směru mohutnosti vrstev samých děje se proměna jedné horniny v druhou.

**Křemence** jsou toliko na Sázavě, tedy v severní části souvrství břidličnatého neporušeně vyvinuty; v jižní částce pásma břidličnatého, v kterém rudní žíly se objevují, podléhají též zkypření. Křemence buď samy o sobě celé souvrství skládají, aneb se vrstvy křemencové střídají ve větší neb menší hojnosti s vrstvami phyllitů. Značná část vrstev se skládá ovšem toliko z křemencových břidlic, které nemožno ani co pravé phyllity ani co pravé křemence pojmuti. Vesměs jsou křemencové vrstvy pevnější vrstev phyllitových.

Barva křemenců jest tmavo-modravě šedá až světlešedá, sloh velice drobnozrný až celistvý, břidličnatost toliko nedokonalá, tak že se plotny křemencové nese snadno štípají. Na plochách, s břidličnatostí zárovných, lesknou se toliko velmi porůznu přemalé lupínky slídy bílé, někdy toliko jen zvětšením patrné. Někdy jeví křemencový lom zárovný s břidličnatostí, tolikéž i lom příčný, slabé zárovné pásy barev světlejších a tmavších nedobře ohraněných a barvitostí svojí do sebe splývajících.

Proměně podléhají křemence méně než odrůdy břidličnatých křemenců a tyto opět jsou méně porušitelné než phyllity samé; než však v jižní části pásma jsou též i křemence a křemenečné břidlice proměněny. Barva šedá jest v bledou pak v bledě šedožlutavou neb i šedozelenavou proměněna a křemence trochu zkypřelé a buď více nebo méně rozsedlinkami, hnědým povlakem zbarvenými, prostoupeny. V některých místech, zvlášť ale v blízkém sousedství žil, drobí se křemenec v samé nepravidelně ostrohranné kusy barvy hnědé dosti snadno, nebo bývá přehojným množstvím rozsedlinek zcela natrhán. Ač barva křemenců a břidlic křemencových jest ve své hmotě bledě žlutavá neb bledě zelenavá, přece toliko na povrchu hnědě zbarvené úlomky se z něho drolí. Na místech vzdálenějších od žil rudních není ovšem hnědé neb nahnědlé zbarvení zkypřelých křemenců tak nápadné. Někdy jest na blízku žil rudních zbarvení rozsedlinek na hnědo velmi značné, ba i ve směru břidličnatosti rozštěpené křemenité břidlice bývají dosti silným povlakem limonitu pokryty.

Mezi vrstvami phyllitů neb křemenců se objevuje v jižní části temene Chlumu a v západním svahu jeho blízko pod temenem, zvláštní hornina, jejíž vrstvy poznenáhlými přechody s phyllity a křemenci spojeny jsou. Na této hornině spočívá v naznačených místech v Chlumu severozápadně od Mezihoří na mezích obcí Soběhrad a Lštěně mohutné ložisko zrnitého vápence; na průřezu obr. 3. Tab. II. jest tato hornina písmenem *d* naznačena.

Hornina jest přepevná, vrstevnatá a na prvý pohled *křemenité drobě*, (prahorní tedy), nad míru podobná. Složivo horniny sestává z přejemné drobnozrného, takřka celistvého, bělavého neb šedavého křemene, v kterém toliko porůznu přemalé lístečky slídy bílé, muskovitu, zarostlé se objevují. Buď se šedavé a bělavé části, základní, přejemné zrnité hmoty křemencové v nepravidelné směsi vedle sebe vyskytují, aneb tvoří pásy tenounké, zárovné s vrstevnatostí, v kterých slídlá v přenepatrných proužkách též zárovné uložena jest. V této základní hmotě křemen-

cové jsou porůznu nebo hojněji zrněčka, až zrna velikosti lískového ořechu průhledného až průsvitavého křemene vtroušena, čímž hornina rázu pískovce nabývá. Nebo, což zvlášť o větších zrnech, objevujících se v břidličnatě zrnité základní hmotě platí, jsou lesklá průhledná, větší zrna křemene co protažené čočky vrostlé svojí ploškostí zároveň se směrem břidličnatosti. Tím nabývá křemenec neb křemenná břidlice povahy drobové, aniž by se ale výraz ten pro podstatu horniny hodil. Na příčném lomu jsou takové, drobám podobné křemence úzce pruhované, s zarostlými mezi pruhy čočkami křemennými, až velikosti lískového ořechu.

Mnohonásobnou zkušeností jest stvrzeno, že se ve svorech a phyllitech objevují vyloučená hnízdečka křemene, která na pohled obláskům křemenným se podobají.

V naší křemenné neb křemenité hornině a břidlici podobají se vrostlá hnízdečka a zrna křemene úplně čočkám zarostlým ploškostí svojí zároveň s vrstevnatostí, a tím tedy zmíněným hnízdečkům křemene v hornině samé vyloučeným, zcela podobna jsou. Tím by byly tedy malá hnízdečka a zrna křemene vyloučeniny z horniny samé, která by tudíž nebyla drobou. Jelikož ale, ač mnohem řidčeji, též okulacené kousky křemene v hornině se objevují, které nejsou směrem břidličnatosti svojí ploškostí zarostlé, mohlo by se o nich soudit, že jsou pravými oblásky křemene a že tudíž tento křemenec jest nejstarší obdobou křemene droby. Při zevrubném zkoumání složiva horniny poznává se však, že čočky křemene, obláskům nad míru podobné, jsou v hornině samé vyloučeny, že jsou tedy shluky křemene a že hornina není tedy drobou, než toliko drobě na pohled podobný křemenec s vyloučenými zrny křemene. Každým způsobem jest ale tato hornina vele památná.

**Amfibolová břidlice.** Do složiva phyllitů, zvlášť ale do křemenných břidlic, přistupují částečně větší neb menší částky amfibolu neb biotitu, — kteréž oba nerosty se vůbec zastupují; též se porůznu i živec (orthoklas) v bílých zrnech objevuje, čímž přechod do *amphibolitů* neb do amfibolových břidlic se zprostředkuje. V přechodních odrůdách křemenných phyllitů do amfibolových břidlic se ještě slída vtroušena objevuje, kteráž ale, přibývajícimi sloupky malých amfibolů, kteréž obyčejně zároveň k slohu břidličnatosti spleteně zarostlé jsou, vypuzena bývá. Břidlice amfibolitové bývají barev tmavošedozelených, velmi drobnozrného až drobnozrného slohu a značné pevnosti; ačkoliv též v jižní části břidličnatého pásma rozloženy a vybledlé jsou, zdá se nicméně, že proměna jejich v zkypřelou a vylouhovanou horninu nepokračuje tak rychlým postupem jako u předešlých hornin. Ostatně jsou též amfibolové břidlice v břidlicích prahorních mnohem méně hojně uloženy než v severní části.

Jestliže se amfibolové krystaly v břidlicích značně uveličují a jestliže též živečnaté složivo (částečně i křemenné) přibývá; tedy se tím přechody z břidlic až do hrubozrných amfibolitů sprostředkují, jejichž amfibolové i orthoklasové krystaly až velikosti hrachu nabývají, a kteréž v mohutných, velice pevných vrstvách v jistých místech dosti hojně s phyllity se střídají v uložení. Jinak nemají amfibolitové břidlice a amphybolity zvláštních znaků, kterými by se zvlášť od jiných jednotvárných amfibolitů různily.

Proto že amfibolové břidlice, jakož i vrstvy zrnitých amfibolitů beze

všeho pořádku s phyllity se střídají, a proto že pro značný počet jejich vrstev by tyto se nemožně na mapě Tab. I. pro malé měřítko její vkreslit daly, zahrnuty jejich vrstvy ve vrstvách phyllitových a křemencových v jediné barvě (bílé). Toliko to budiž zde připomenuto, že vrstev amphibolitu a amphybolových břidlic v severní části, to jest levém břehu Sázavy poměrně větší množství, zvlášť v krajině k Hvězdonicům směřující a na potoce Drhlovce, obsaženo jest, než v jižní části, kdež toliko ve vrchu Horčínu u Phova nad ostatními břidlicemi převládají. Porůznu mezi vrstvami břidlic však v celém prostranství pásma břidličnatého se střídají s ostatními vrstvami. Nutno ještě zmínit se o tom, což jinak ostatními zkušenostmi potvrzeno jest, že se v amphibolitových vrstvách rudy nenalezají aneb toliko po různu, že tedy není rádo v nich rud, zvlášť limonitů hledat, což i zde úplně potvrzeno bylo.

Všecky tuto vypsané horniny jsou úzce pomenáhlými přechody mezi sebou spojeny; třeba i na jistých místech se vrstvy určité rozdílných hornin stýkají, sleduje se na přemnohých jiných místech, jak dle vlaku neb směru vrstev, tak i skrze mohutnost jejich, pomenáhlý přechod jedné odrůdy horniny v jiné.

Toliko jediná hornina v pásmu břidličnatém uložená napřechází v nižádnou z předešlých, ana ostře od nich se dělí a to jest:

**Vápenec.** V celku jest hrubokrystalinický vápenec barvy sněhobílé, až v jistých vrstvách též šedavě neb šedomodravě zbarven jest. Šedé barvy však vesměs v celých vrstvách se neobjevují, než toliko s čistě bílými se střídají. Vápenec jest veskrz vrstevnatý, jednotlivé vrstvy mnohdy až do 2 metrů mohutné; v mnohých vrstvách střídají se čistě bílé pásy s šedavými, však nikoliv v ostrém obmezení, an barvy do sebe splývají, zároveň s vrstevnatostí.

Prahorní vápenec vleče se částečně co velmi zmohutnělé pásmo (ložisko), uložené do prahorních břidlic směrem jihozápadním k severo-severovýchodu. Nejjižnější jeho cíp, až po který se sledovat dá, objevuje se jihozápadně od Mezihoří v místě, kde výmol nazvaný „Bázová rokle“ svého vrcholu dosahuje. Úklon vrstev vápencových jeví se na tomto místě k západu. Nejsevernější cíp ložiska vápencového jest v úbočí k východu se klonícím vrchu Vepří, severně od Přestavlk, kde příkře k východu se sklání. Jak v jižním tak i v severním ukončení ložiska patrma mohutnost jeho v rozsáhlosti toliko několika málo metrů; tolikéž se seznává, že jednotlivé vrstvy vápencové v břidlicích co plásty uloženy jsou, kterými od sebe děleny bývají, tak že se z toho soudit dá, že jak ve směru jižního rozprostírání se, tak i v severním pokračování vlaku pásma, vrstvy vápence od sebe odloučené, brzkým vyříznutím se, to jest, pomenáhlým mizením mohutnosti, konce svého dosahují. Podle toho by se délka ložiska ve směru vlaku na něco více 3 kilometrů páčiti mohla.

Od svého jižního ukončení na vrcholu Bázové rokle rozprostírá se ložisko ve východním svahu Chlumu, nehluboko pod jeho hřbetem, v mohutnosti náramně rychle přibývajícím, a sestává pod triangulačním bodem, tedy pod nejvyšším temenem Chlumu, severně od Mezihoří, v místech, kde osmělé vápenice stojí, z velkého počtu vrstev, zaujímajících dle šířky své asi 300 metrů. Na tomto místě u Mezihořské vápenice, kde ložisko nejvíce zmohutnělé jest, pozoruje se v ležaté části jeho úklon směrem  $8^{\circ} \frac{1}{2}$  s  $70^{\circ}$ , na jiném něco severněji položeném místě úklon k  $9^{\circ} \frac{1}{2}$  s  $46^{\circ}$ ;



v dokrovní části ložiska vedle potůčka směřujícího od vápenice k Mezihoří, tedy jižně tekoucího, jest úklon vrstev k západu a sice směrem  $21^{\circ}$  a úklonem  $32^{\circ}$ . Úklon vápence jest tedy velmi měnivý, jak pouhým pohledem do otevřených lomů vápencových ve východním svahu Chlumu se pozoruje, kde v každé oddělené, vyhlávané jámě se jiný vlak a měnivý úklon jeví. Vysvítalo by z toho, když ležaté ložiska vápencového k východu, visuté ale k západu se kloní, že ložisko v těch místech pánev tvoří; než nezdá se tomu vskutku tak býti, an toto uložení toliko na krátko se pozoruje a velikou porušeností směru a úklonu vrstev se vyložiti dá. Na průřezu Tab. II. obr. 3. u písmena *v* provedeno ložisko v své nejmohutnější části tak jako by nebylo neckovitě uloženo.

Mohutnost ložiska vápencového jest ve východním svahu Chlumu v honech, „na pavláčkách“ nazvaných, patrna na prvý pohled dle množství převelkého v těch místech rozdělaných lomů, otevřených, jakož i opuštěných, spustlých.

Po různu se objevují mezi vrstevami vápencovými, dělíce je na krátko, velmi táhlé čocky křafoučkým vrstvám neb ložím podobné, sestávající z amphibolových břidlic, až na 3 decimetry i více mohutných. Některé z těchto táhlých čockek amphibolových břidlic podobají se vrstvám krátkým, na svých koncích úplně zesláblým; po vytracení se takových vrstev přiléhají vrstvy vápencové vrstvou horniny nečíslené opět těsně k sobě.

Ložisko vápence, sestávající z převelkého počtu vrstev, vleče se od Mezihořské vápenice údolím, pak po západním svahu nejsevernějšího Čistického kopce až přes obecní hranice Soběhradsko-Přestavlké, kde se v lomech otevřených vrstvy s  $70^{\circ}$  k  $8^{\circ}$  se kloní. Jakou mohutnost zde ložisko má, není posud zjištěno; v otevřených lomech ale se objevuje v mohutnosti několika metrů. Na hranicích těch též snad ložisko jest mohutnou žilou porfyru přetrženo; není ale styk nikde viděti. Odtud se vleče ložisko, ne více co jednotlivý pás, ale co podvojně ložisko, rozdělené dosti mocným, asi 50 až 80 metrů v mohutnosti obsahujícím pruhem, složeným z vrstev břidlic převládajících amphibolových a prahorních. Podvojná ložiska příkře k východu se klonící, vlekou se ve východním svahu Častovky, přes silnici, u vápenice v samé blízkosti od Přestavlk a sice k západu od vesnice, až do východního svahu vrchu Vepří severně u Přestavlk, kde oužice se v mohutnosti až na velmi málo metrů, sem a tam též vrstevami břidlic prahorních a amphibolových děleny jsou v jednotlivé, nestýkající se vrstvy vápenné (neb plásty), které zde brzkého ukončení zeslábnutím nacházejí. Vesměs jest úklon loží neb plástů vápenných velmi příkře k východu, jak i na Tab. II. obr. 4. v průřezu u písmeny *v* naznačeno jest.

Jak v Častovce, tak i ve Vepří jsou lomy do ložisek rozdělaný.

Rozštěpení ložiska vápencového ve svém severním vlaku ve dvě jest naznačeno již ve vrstvách křafoučkových, sestávajících z amphibolové břidlice, a vyskytujících se v mohutné části ložiska u Mezihoří.

Ložisko vápencové kloní se tedy ve svém jižním cípu k západu-severu, ve středu a svém severním konci příkře k východo-jihu.

Seznáním směru a úklonu ložiska vápencového podána možnost určení hlavní směr a úklon vrstev celého pásma břidličnatého, které tedy tak jako uložené

v něm ložisko vápencové od jihu (jihozápadu) k severu (severovýchodu) směřuje a příkře k východu se kloní.

Na doklad, jak nesnadno by bylo z přerušného uložení břidlic hlavní směr a úklon jejich vypátrati, kdyby ložiska vápencového nebylo, sloužij tento zde uvedený příklad měnivého vlaku vrstev břidličnatých na rozličných místech.

Od zřícenin hradu Staré Duby na levém břehu Sázavy, severozápadně asi 300 kroků, jest úklon vrstev k  $8^h$  s  $86^\circ$ ; ještě níže po řece od hradu asi 500 kroků, kloní se vrstvy k  $20^h$  s  $80^\circ$ . V severozápadním svahu Vepří, asi 100 kroků jihovýchodně od čísla 3 na mapě Tab. I. naznačeného, jest úklon  $23^h$  směrem s  $30^\circ$ . V jižním úbočí Chlumu na Lštěnsko-Soběhradských hranicích, západně od Mezihoří kloní se vrstvy křemenců, drobám podobných k  $16\frac{2}{3}^h$  s  $32^\circ$ . Na cestě od Mezihoří k Čerčanům, kteráž točíc se po jižním svahu Chlumu, po západním svahu jeho k Čerčanům vede, jest úklon asi 300 kroků severozápadně od Bázové rokle, tedy v západním svahu Chlumu,  $49^\circ$  k  $14^h$ . V Mezihoří samém u chalupy číslo 4, na mapě u rudní žíly číslo 9, kloní se vrstvy směrem  $16^h$  až  $17^h$  s  $27^\circ$  až  $31^\circ$ . V jižní patě Čistického vrchu, severovýchodně vedle samé vesnice Mezihořské u čísla 10 na mapě, jest úklon  $75^\circ$  až  $70^\circ$  k  $21\frac{1}{3}^h$ . Ne temně Třemochu u čísla 11 neb u průřezu *EE*, kloní se vrstvy k  $19\frac{1}{3}^h$  s  $80^\circ$ . Od Soběhradského kostela přes silnici, na jihovýchodní patě Třemochu, sklánějí se vrstvy břidlic s  $40^\circ$  k  $19\frac{2}{3}^h$ . Jak proměnlivý jest směr úklonu a úklon samý v západním rozsáhlejším pásmu břidličnatého horstva, vysvítá z podaných dokladů dostatečně.

V obmezenějším pásmu východním kloní se vrstvy phyllitů u křížce, severozápadně od Vranova s  $60^\circ$  k  $51^h$ . Severně od Vranova, mezi Vranovem a Hvězdonicemi na Drhlavce, jest úklon prahorních břidlic, amphibolových břidlic a amphibolitů  $67^\circ$  k  $18\frac{1}{3}^h$ .

Na styku břidlic s žulou až do jisté vzdálenosti mění se úklon a směr úklonu vrstev tak značnou měrou, že takořka za každým krokem jest jiný i opácný a sloh skalních vrstev ukazuje pohled převeliké rozervanosti, rozdrčenosti a nesouvislosti vrstev samých.

Horniny břidličnaté jako phyllity, amphibolové břidlice, vápenec úplně žulou zahrnuté náležejí vesměs do útvaru *Laurentanského*, jak se mladší pásmo prahorního útvaru nazývá.

## II. Žulové horniny.

Žulové horniny, kteréž se vesměs mladšími býti seznávají, než břidlice prahorní, jsou v krajině v ohromném množství v mnohých odrůdách vyvinuty:

**Obecná žula** se skládá z drobnozrnné směsice orthoklasu barvy bledě pleťové neb přišedlé s zrny průhledného křemene, v nížto krátké nerovné plátky biotitu v různých směrech vtroušeny jsou. V této obecné odrůdě žulové buď jest zrno složiva více nabo méně zrnité; také vedle biotitu se pláty muskovitu nezřídka objevují v složivu. Ohromné množství žuly, panující v krajině na přemnohých místech, vychází na den toliko zkypržené až do hloubek mnoha metrů a dá se snadno kopat v drsný žulový písek. Toliko žíly pevnějšího křemene neb živce prorážejí někdy žuly.

V obecné žule, hojněji však mimo žulu v prahorních břidlicích, vyskytují se žíly velice *hrubozrnné žuly*, prorážející vrstvy břidlic. Složivo převládající jest orthoklas barvy pleťové v přehrubých zrnech, z kterých se kusy i co pěst hrubé. sestávající toliko z čistého orthoklasu, vytlouci dají; pak křemen průsvitavý, zrnitý též ve velkých zrnech, však co do hrubosti orthoklasu podřízených. O slídě toliko slabé známky biotitu se v této žule bezslídné, tedy aplitové spatřují.

Do žul obecných, zvlášť jest-li v nich černý biotit velmi vyvinut bývá, přistupuje nezřídka amphibol v černých, krátkých sloupcích, vedle biotitu uložených. Žuly s bílým neb slabě nažloutlým orthoklasem a patrným amfibolem vedle zřetelného biotitu zprostředkují přechod do žul amphibolových.

**Amphibolové žuly** skládají se z bílého orthoklasu, černého, dosti hojného amphibolu a křemene, ku kterým i malé nepatrné plátky černohnědého biotitu, přistupují. Amphibolové žuly, ponenáhlým přechodem z žul obecných se vyvinující, aneb co žíly mocné v obecních žulách vyvinuté, vyznačují se proti žule obecné poměrně značnější pevností, an na povrchu svém poměrně vzácněji v žulu zkyprženou proměněny jsou.

Z amphibolových žul se vyvinují odrůdy *syenitům* zcela podobné vytrácením se zrn křemene; však byt i velepodřízené, přece v nich bývá něco křemene v maličkých zrnečkách vtroušeno.

V některých syenitech se v bělavém, neb bledě pleťovém orthoklasu objevují bez všeho pořádku vrostlé táhlé sloupky černozeleňého amphibolu, vedle nichž porůznu i plátečky biotitu vtroušeny bývají.

Odrůdy ještě více syenitu podobné, které se zde objevují, sestávají ze zrn orthoklasu pleťové barvy a drobnozrnné hmoty šedozeleného amphibolu, v nichž křemen v nepatrně malých zrnečkách ještě vzácněji vrostlý jest, než v které koliv z odrůd prvé jmenovaných.

Mimo tyto jsou ještě mnohé jiné odrůdy žuly: jako třeba ona se sněhobílým hrubozrnným orthoklasem a vzácnými šupinkami chloritu; odrůda s většími plátky muskovitu; potom jiná na pouhý pohled gabbro velice podobná, a ještě mnohé jiné, o kterých pro větší vzácnost netřeba zde obšírněji se zmiňovati.

Všecky tyto odrůdy žulové vyskytují se mezi sebou, an ponenáhlymi přechody spolu spojeny jsou; však se amphibolové a syenitové žuly v žilách a kabanech nejhojně v obecné žule uloženy objevují.

Hrubozrnné a na křemen chudé žuly, potom turmalinové žuly, které tolikéž v naší krajině zastoupeny jsou, jen v obmezených žilách v obecné žule se vyskytují. Velmi poučný průřez, v kterém velký počet žil těchto odrůd obecnou žulu v písek se drolící prostupuje, vidí se — ač mimo obor naší krajiny — v průřezu železničním z Benešova ke dvoru Mariánovickému.

**Porphyry** se skládá v mezích naší krajiny z přejemně drobnozrnné základní hmoty bílé barvy, v které jemňoučké tečky biotitu vtroušeny jsou. Pouhému oku se zdá být základní hmota, obsahuje-li větší množství přejemných teček biotitu, jednotejně šedavou. Pohledem lupou však se seznávají v ní vtroušené černé tečky biotitové. Jestliže základní hmota bílá, toliko z orthoklasu nebo z drobnohledné směsi orthoklasu a křemene sestává, nedá se z pouhého pohledu určit. Zdá se však, smí-li se soudit z počínajícího porušování se porphyru, kterému na vzduchu tak snadno podléhá, že živcový nerost, byť by nebyl i výhradním složivem základní hmoty, přece co převládající a vynikající část v směsi složiva obsažen jest.

V této základní hmotě jsou vyloučeny malá zrna a zpotvořelé krystaly, jak se zdá orthoklasu barvy vinné, dosti hojně vedlé větších zrněk a šupin podřízeně vtroušeného biotitu. V jiné odrůdě tohoto porphyru jsou vtroušena v bílou základní hmotu průhledná, hranatá zrna křemene, až co víkev veliká, vedlé větších šupin biotitu na pohled nepravidelně v jednom směru uložených. Krystaly živcové proti křemenu a biotitu v této odrůdě v množství podřízenějším se objevují. Na hranatých zrnech křemene seznává se, že jsou velmi zpotvořelé krystaly tvaru  $+R. - R. \infty P$ , který takto pravidlem na všech krystalech křemene, v porphyrech zarostlých se objevuje vyhraněn. V skutku též několik přeražených zrn křemene jeví nepravidelně šestiboký průřez.

Obě odrůdy, jak s vyloučenými krystaly živcovými, tak i ona se zrna křemene, jsou všemi možnými přechody mezi sebou úzce spojeny.

Porphyry, který prahorní břidlice ve vrchu Částovce jihozápadně od Přestavlk a v severním Čistěckém vrchu (Tab II. obr. 3 písmeno *p*) proráží, jest v nich co mocná žíla, ve směru severojižním se rozprostírající, uložena. Zdá se, jako by i ložisko vápence prorážel; ale místo styku s ním není nikde odkryto.

**Amfibolová hornina** toliko na jediném místě, severně nedaleko Phova, na den v šířce mnoha kroků vychází v cestě, do Mezihoří směřující. Amfibolová hornina skládá se z čistého, velmi hrubozrnného amfibolu barvy černozeleň. Složivo jest tak hrubozrnné, že se štípáním plochy štěpné i více 1 □ cm. v ploše odkryt dají.

Kdekoliv žula s prahorními neb laurentánskými břidlicemi se stýká, seznává se toliko jen co mladší hornina, kterou břidlice zahrnuty a obejmuty jsou. V jakýchkoliv částech styk nebo ohraničení žuly s břidlicemi dobře odkryt jest, pozoruje se, že žula co mladší hornina výběžky a žilami více nebo méně mohutnými do břidlic zasahuje, ba že i jednotlivé odtržené úryvky, jakož i kry a menší roztrštěné kusy břidlic v ní zahrnuty jsou; což vše nepopíratelně o poměrně menším stáří naproti stáří břidlic svědčí. Proto že ale žuly svými výběžky daleko do břidlic zabíhají, nepoznává se na všech místech, nejsou-li dobře odkrytá ohraničení žuly s břidlicemi; z té příčiny též na mapě Tab. I. hranice toliko zhruba rovnými směry vyznačena jest, kde se pro neznalost obšírněji oklestit nedala.

V naší krajině jsou mnohá vele památná místa, kde styk žuly s břidlicemi krásně odkryt jest. Tak jest to v příkrých stráních nad Starou Dubou na levém, jakož i na pravém břehu Sázavy; zvlášť poučně ale v rokli, která od Levína k východu se rozprostírá; tolikéž i v odkrytých stráních, které se podél východní strany silnice, z Vranova do Komorného hrádku vedoucí, táhnou.

Na Tab. II. obr. 1 jest průřez stráně východně podél silnice směrem *CC*, asi 50 kroků severně za druhým silničním můstkem — severně od Vranova počítáno — vzdálen. Zde převládají žuly *ž ž ž* nad břidlicemi *b b b*, v kterých objevuje se v žilách mohutných, též větší zlomky břidlic v sobě zahrnující.

Severněji od tohoto průřezu *CC* obr. 1 jest, asi 100 kroků za pátým můstkem silničním (počítá-li se z Vranova k severu) směrem *DD* Tab. II. obr. 2, jiný pohled na odkrytou strán naznačen, v které ale břidlice *b b b* nad žulou *ž ž ž* převládají. Žuly nejinač než v slabých žilách v břidlicích, to jest phyllitech s amfibolovými břidlicemi se střídajících, uloženy jsou.

Všecky vrstvy břidlic, jak dle směru, tak i dle úklonu se mění a usečené, nesou v sobě známky násilných převratů, neboť jsou náramně rozpukané, přelámané a každým krokem mění se úklon a vlak jejich. Jest věc naprosto nemožnou, na hranici styku břidlic s žulou nějaký hlavní směr seznat, kterým by úlomky a rozdrcené zbytky břidlic uloženy byly. O násilných převratech v uložení břidlic na hranicích s žulou svědčí hojně se vyskytující jalové žíly Tab. II. obr. 2 písmě *j*, které vyplněny jsou rozmělněnými břidlicemi a rozličnými jinými úlomky hornin, jakož i slabé žíly limonitu obr. 2 písmě *l*.

Že i větší kry břidlic, co úryvky pásma v žule zahrnuty jsou, jest na některých místech mapy Tab. I. vidět.

Ale netoliko v rozhraní žuly s břidlicemi se vyskytují žíly žulové, než též u prostřed pásma vesměs břidlicemi obklopeny objevují se žíly a kabany žuly na nesčíslných místech, z kterých toliko ony, které s jistotou poznány byly, na mapě Tab. I. uvedeny jsou.

Mnohdy prorážejí břidlice tak slabé žfly žulové, že mohutnost jejich se šířce prstu rovná na krátkou vzdálenost, že ani na mapu uvedeny být nemohly. Velice poučný jest pohled na slabé žfly žulové, které ve všech směrech prorážejí břidlice a žuly samé v úvoze, vedoucím z Mezihoří k jihovýchodu do Phova. Žfly se zde objevují po každém dešti, kterým úvoz vymyt bývá, tak ostře, prorážejí a vrhají se tak pravidelně, že v době překrátké poskytují názoru o poměrech vržení a ostatních jiných poměrech žil mezi sebou.

Konečně dlužno se zmínit, že žuly jsou zcela bezrudé.

---

### III. Rudy, vyskytující se v pásmu břidličnatém.

Břidlice a křemencové břidlice pásma laurentánského, kde zkypřením proměněny jsou, zahrnují v sobě žíly rud železných, které limonit obsahují, v značném množství. Proměna břidlic jest v nejbližším sousedství žil, kterými vrstvy jejich v nejrozličnějších směrech prostoupeny jsou, nejpokročilejší; tak že z proměny a ze zkypřelosti břidlic, jakmile tato jednou poznána byla, se na blízkost žil limonitových soudit dá.

Proměna břidlic, kterou rudonosnost jejich podmíněna jest, jeví se dvojnásobem: buď jsou původně tmavošedé, do šeda vybledlé, nepravidelně břidličnatě se štípající břidlice ve svých rozsedlinkách, dle kterých se v nepravidelné úlomky dělí, částečně slabým nádechem, co citron žlutého zemitého nerostu pokryty; nebo jest původní barva břidlic až do bělohněda, jakoby vylouhováni vybledlá, a zkypřené břidlice jsou nescíslným množstvím přetenkých, úsečných a jako síť se protínajících žilek, limonitem na hnědo zbarvených, veskrz prostoupeny. V prvním případě jest citronově žlutý, zemitý, co nádech na trhlínkách se objevující nerost nějaký z řady vodnatých zásaditých siranů železitých, snad glockeritu neb apatilitu, diadochitu neb i jinému podobný. Původ žlutého zbarvení dá se z rozkladu zrnek pyritových, kterými původně břidlice prostoupeny byly, odvodit; jak se to na jiném místě, totiž na Konopištském Chlumu objevuje, o čem též později zmínka se učiní.

Žíly prostupují vrstvy břidličnaté ve všech možných směrech buď jednotlivě neb v značném množství; povždy vysílají velmi mnohé odžilky; tolikéž se rozštěpují a mezi sebou spojují; též ve vlaku svém úplně se vytrácejí vyříznutím se. Dlužno rozeznat dvojí způsob, jakým žíly rudou vyplněny jsou: buď to jsou žíly, a to zvlášť málo mohutné a slabé, úplně celistvým bohatým limonitem vyplněny; aneb, což zvlášť o mohutnějších žilách platí, sestává celé vyplnění žil z úlomků břidlic, jest tedy breccii, které chudobnější hnědou rudou spojeny jsou.

Je-li vyplnění žil, zvlášť ono slabších, bohaté, sestává úplně z tmavohnědé, celistvé nebo hnědé prostředně pevné rudy; nebo mimo limonit neobjevuje se v žilách nijaké jiné rudy, vyjma případ, že by v rudní žíle nějaký roztráštěný a přeměněný úlomek z boků žilových zahrnut byl. Čím žíly slabší, tím bohatší a pevnější bývá v nich ruda. V některých žilách jeví se limonit vrstevnatě složený z tenkých pásků souběžných s vlakem žilovým; některé z těchto pásků sestávají z rudy o něco chudobnější, any se v nich drobtý rozdrčené jalové horniny objevují.

Limonit z některých slabých žil jest vláknitý, černohnědý a přecistý; jiné limonity jsou tmavohnědé, celistvé, na pohled přebohaté, což i rozbořem stvrzeno, an takové rudy ještě o něco málo více než 50% železa obsahují a toliko nepatrného zbytku nerozpustného, ani 1% neobnášejícího, v kyselině solné po rozpuštění rudy zanechávají. Zvlášť v rolích, na blízkou výchozu žil, se nacházejí tak přecistě kousky rud roztroušené, že se ve svém lučebním složení nejčistšímu limonitu velice podobají.

Mohutnější žíly sestávají z malých ostrohranných úlomků změkklých a úplně zkypřelých, do žluta vybledlých břidlic, spojených dírkovitou žlutohnědou chudobnější rudou, v které tolikéž na jemno rozdrčené drobtý břidlic vtroušeny jsou. Takové žíly na prvý pohled úplně se podobají zkypřelé, rozdrčené a úplně rudou prostoupené břidlici, čímž v skutku též jsou. V některých místech takových žil vyskytují se hnízda a závalky, ba i celé žíly bohatší rudy zarostlé.

Opět jiné žíly složeny jsou z břidličnaté, slabě rudou prostouplé breccie, spojené hlinitým, z rozmělněných a roztrštěných břidlic utvořeným spojivem, které protkáno jest množstvím slabých žileček a odžilek limonitu.

V pásmu břidličnatém objevené žíly limonitu jsou následující:

Na pravém břehu Sázavy, severně od Hvězdonic v západním svahu vrchu, ovocným stromovým porostlém, vyskytují se ve velikém množství žil dosti bohaté, páskované hnědele; soudí-li se z úlomků rud nalezených, nedosahují žíly však 1 dm. mohutnosti. Místo to jest na mapě Tab. I. arabskou číslicí 1 poznamenáno a není zde ani počet žil, ani směr ani úklon jejich znám.

V kopci Borka zvaném, severozápadně od Doubravic, jest uloženo několik slabých žil čistého limonitu, na mapě číslicí 2 poznamenaných. V některých z žil dolováno již, proto že opuštěná rubání objevena byla. Některé z nově vykutáných žil sklánějí se mírně k západu a mohutnost jejich nepřevyšuje 2 dm.

V severozápadní patě Vepří u Přestavlk na hranicích obcí Přestavlk a Lštění, na mapě u číslice 3, vyskytují se v rolích bohaté kusy limonitu, aniž by původního uložení jejich dopátráno bylo.

Po západním svahu Chlumu, západně od Mezihoří, sklání se výmol, nazvaný „Bázová rokle“, směrem západním přímo k vesnici Mrači směřujíc. Ve vyšší části výmolu, nad cestou z Čerčan do Mezihoří vedoucí, jest velmi mohutná, z breccie, spojené chudobným limonitem sestávající žíla do značné délky, až k povrchu výmolu na den vycházející, uložena. Žíla, jejíž vlak a úklon ve výchozu se seznat nedá — zdá se, jakoby snad k jihu se klonila — jest mnoho metrů mohutná a zajisté nej-mohutnější všech ostatních žil. Na mapě číslicí 5 poznačená žíla nebyla pro chudobnost rudy ve svém úplně odkrytém výchozu ani zkoušena.

Jihozápadně od Mezihoří a severně od cesty, která z Mezihoří do Čerčan kolem jižního svahu Chlumu se točí, jest ve výmolech polních „na pavláčkách“ veleznačné množství výchozů žil limonitových seznáno a v přerzličných směrech se rozprostírajících. Žíly, číslice 6, ač z bohaté rudy složeny, zdají se být co do vlaku toliko přetržité. Dříve v těchto žilách i ruda rubána byla. Některé žíly vykutány až v mohutnosti 3 dm. a i více veskrz v čisté, ale ne na daleko se rozprostírající rudě.

Jižně od Přestavlk „na záhvězdě“, číslice 7, jest vlak žíly směrem 4<sup>h</sup> několika



starými, zarovnanými haldami naznačen. Úklon žíly ve své mohutnosti neznámé, tolikéž nejistý jest, též se zdá, smí-li se soudit z bývalého rozdělení, že ruda dle vlaku na dálku nedržela; však z žíly vyrubané a na haldách roztroušené kousky rudní jsou přebohaté.

V Mezihoří, v potoku a v levém svahu „Hradce“ objevují se některé žíly — číslice 8 — z nichž nejmohtnější jest 2 métry mocná a z breccie, jako žíla číslice 5 v Bázové rokli odkrytá, složená. Toliko mohutnost žil odkryta zde, ač se ze starých zbytků pokusů soudit dá, že žíly zkoušeny již. Ve vesnici Mezihoří samé, pod chalupou číslo 4 vychází žíla na mapě číslicí 9 poznačená na den ve směru  $11\frac{2}{3}^{\circ}$  a úklonu  $75^{\circ}$ — $80^{\circ}$  k západu. Žíla jest  $1\frac{2}{3}$  métru mohutná a sestává veskrz z čisté, vrstevnaté žlutohnědé rudy. Žíla není posud otevřena.

V severovýchodním konci Mezihoří, v patě nejjižnějšího Čistického vrchu známa jedna neb několik žil, č. 10, v nichž druhdy ruda rubána byla. Ani o vlaku a úklonu jakož i o mohutnosti není ničeho povědomo, toliko zbytky rudy, v poli roztroušené, jsou bohaté.

Na temeně Třemochu, severně od Soběhrad, jest několik žil limonitu uloženo, jejichž mohutnost však není značná. Toliko jedna žíla, číslo 11 vykutána posud, jejíž mohutnost 3 decimetry převyšuje. Sloh rudy jest vrstevnatý, ruda bohatá. Směr žíly pak k  $7^{\circ}$  a úklon na výchozu jejím  $30^{\circ}$ , pod ním  $45^{\circ}$  k jihu jest. Od žíly vychází množství odžilek a jest směrem *EE* průřez kutáním odkrytých žil *l, l, l*, Tab. II. obrazec 6 podán, kterým zároveň znázorněna povaha všech ostatních zdejších žil.

V západním svahu Chlumu vykutáno mnoho žil přebohatého limonitu, číslo 12, v směrech a úklonech rozličných, jejichž mohutnost však nikde několik málo centimetrů nepřevyšovala.

V západním svahu Čistických vrchů se tolikéž žíly nečistého limonitu, č. 13, objevují a jest výchoz jejich veskrz patrný, z něhož vysvítá, že žíly na krátko se vlekou.

Mnohé jednotlivě se objevující slabší žíly, jako ony v cestě z Přestavlk do Čistce a jiné, pro menší důležitost nepopsány blíže.

Severně od Vranova se objevuje žíla — číslo 4 na mapě — zvláště památná z mnohých příčin. Vlak žíly zajisté v délce 500 metrů poznán, an výchozí její na mnoha místech se jeví. Směřuje pak k  $21\frac{1}{3}^{\circ}$  a kloní se velmi příkře k západu. Nejsevernější část posud známá vychází na den co limonit dosti čistý; vedle cesty z Vranova na severozápad vedoucí zkoušena a prohloubena žíla v mohutnosti 3 metrů. Složivo její jest: jalová breccie, spojená jílovatě rozměklou břidlicí, v níž slabé žilky limonitu hojně se proplétají; toliko částečně jsou v žíle patrnější žíly rudy vyloučené. V jižní části své jsou zbytky starých rozdělení v žíle samé, aneb v nějaké odžilce její. Tato díla jsou přepamátná, neb ze zbytků pozůstalých, zcela srovnaných hald a z kousků po polích, druhdy „nade vsí nad křížem“ zvaných, nyní ale „na železnici“ pojmenovaných, hojně roztroušených rud, které magnetitem jsou, souditi se dá, že v žíle magnetit rubán byl.

Magnetity v polích roztroušené a z výchozího žíly pocházející jsou buď co jednotlivá zrnka po různu v přecistém tvrdém limonitu tmavohnědém vtroušeny, aneb co hojně zarostlé zrnité chomáčky v základní hmotě limonitové se objevují.

Některé kusy sestávají úplně ze zrněk jemně drobných, až do velikosti máku i více, barvy železné, lesku značného a pevnosti velké. Jehla magnetická i kousky limonitu značně odchylována bývá. Zrna přechistého magnetitu seznávají se pod lupou krystalisované v osmistěnech, ovšem ne vždy na každém kousku patrných. Je-li limonit doprovázející magnetitové kusy též pro složivo žíly význačný, aneb je-li na výchozím z proměny magnetitu vytvořený, o tom při žíle ještě neotevřené a nezkoušené nemůže se nijakým způsobem souditi.

Na západní stranu od Mezihořské vápenice, asi uprostřed co do vzdálenosti mezi vápenicí a temenem Chlumu, jest ve vápencových vrstvách velepamátná žíla wadová objevena. Směr žíly jest k  $1\frac{2}{3}^{\circ}$  a úklon příkrý k východu. Na jednom místě jest žíla otevřena ve výchozím svém pod drnem v mohutnosti 4 metry mnoho převyšující. Ležatá polovice žíly, zaujímající větší polovici mohutnosti její, jest breccie, složená z velkých i menších balvanů a drobtů vápence na svých hranách neotupělého, tudíž ostrohranného. Balvany a úlomky vápence spojeny jsou tmelem, v němž na drobno rozdrcený vápenec nejpodstatnější složivo tvoří.

Visutá polovice žíly, okolo 2 metrů mocná, složena jest z wadu zemitého. Wad jest temně černohnědý, vrstevnatě složený, zároveň se stěnami žíly; jednotlivé tenké vrstvy jeho různí se rozličnými odstíny tmavých barev a pevností od sebe. Kousky wadové se snadno v ruce na jemný prach rozžmolují. Vryp aneb barva prášku jest buď černá, neb černohnědá.

V dalším severním pokračování žíly na Tab. II. obr. 3. písmenem V. a 14 a na obr. 5 zvlášť vyobrazené, kdež se již mírněji k východu kloní, vyplňuje zemitý černý wad toliko slabší žíly v jemně rozdrceném visutém žíly samé. Do ležaté vápencové breccie toliko slabé, černé žilky a závalky wadu vrostlé jsou, podávající důkazu, že i ležaté breccie do žíly rudní náleží.

Kyprý wad jest lehký, úplně dutinatý a mezi vrstvičkami jeho přeslabé vrstvičky bílého kaolinu jsou uloženy; hnědé vrstvičky wadové, střídající se s černými, jsou toliko směsí šupinek wadových s předrobnými šupinkami kaolinu. Wad sám tedy není čistá manganová ruda. Památné jest složení jeho, nebo obsahuje vedle mnoho kysličníku hlinitého malé částičky kysličníku kobaltnatého dle kvalitativního rozboru prof. Šafaříka.

Doposud v žíle wadové, mimo to, že výchozí její odkryto bylo pod drnem, nijaká zkouška, jak daleko manganová ruda drží, nepodniknuta.

Přehlednou-li se rudní žíly zdejší krátce ještě jednou, seznává se, že jsou vesměs slabé a na krátko trvající; že ale v jistých místech bohatou a čistou rudu obsahují v níž se buď již dolovalo neb doloovati mohlo.

Ve velké části těchto žil limonitových těžena ruda ku konci předešlého století a dovážena do Piskocelské huti na Sázavě; až když na počátku tohoto století huť od správy Komorno-hrádecké zastavena byla, přestalo všecko roubání rudy v žilách. Teprve letošního roku 1871 opět pražskou železářskou společností žíly zkoušeny a částečně otevřeny byly.

## IV. Seznam nerostů objevujících se v této krajině.

Počet nerostů není veliký, však mnohé z nich jsou památné:

O nerostech 1. **křemenu**, 2. **orthoklasu** a 3. **biotitu** budiž zde jen tolik připomenuto, o čem již při žule zmínka se neděla.

Křemen mimo složivo žuly obecně, kde co malá zrnka průhledná zarostlý se vyskytuje, skládá větší zrna toliko v slabých žilách žuly hrubozrnné, porůznu v ostatní žule neb phyllitech se objevující. Obyčejně bývá i orthoklas v takových žulách s hrubým zrnem křemenným ve velkých kusech vyloučen a barvy pletové. Křemen též slabé žíly bělavé poloprůhledné v žulách skládá hojně. O zrnech křemene v porphyrech zarostlých již výše připomenuto bylo.

Orthoklas obyčejně jest barvy bělavé; v některých hrubozrnných žulách, v nichž křemen podřízeně v menších zrnech se objevuje, bývá bělostný, poloprůhledný, v žilách žulových s hrubšími zrny křemene pak pletový a vždy ve větších zrnech než křemen. V amphibolitech pak tvoří ostré, bílé krystaly, toliko v průřezu patrné, an jinak velmi pevně s ostatním složivem srostlé jsou.

Biotit jest nejméně proměnlivý nerost a toliko v malých plátkách v žule a v porphyru se objevuje.

4. **Muskovit** v tabulkách až co nehet velkých se objevuje zarostlý v žule, severně nedaleko od kostela Soběhradského přes silnici a na jiných místech, zvláště u Bezděkova.

5. **Chlorit**; v jedné žule s bělostnými velikými zrny orthoklasu vtroušeny jsou světle zelené šupinky lesklé na pohled chloritu příslušející.

6. **Amphibol**. O hrubozrnné amphibolové skále u Phova již nahoře zmínka se dělá. Jinak jest amphibol v amphibolových žulách a v amphibolitech v černých sloupkách krátkých, až co brk širokých hojný; v břidlicích amphibolitových a v některých přechodných odrůdách z břidlic do zrnitých amphibolitů, bývá temně šedo zelenavý v sloupkách nebo jehlicích zarostlý.

Co vláknitá odrůda amphibolu objevuje se v lomu vápence na hranicích mezi Přestavlkou a Mezihoří (lom již do obce Přestavlké náleží) asbest, amiant (osinek) a bysolith. V této vylámané jámě jest úzká, přikře se klonící a zcela těsně přilehající, vláknitým amphibolem, vyplněná rozsedlina. Šířka rozsedliny jenom místy přesahuje šířku prstu a v takových rozevřenějších místech jsou toliko boky rozsedliny asbestem potaženy, an střed rozsedliny z vyhraněných zrn calcitu sestává. Toliko těsněji přilehající plochy rozsedliny uzavírají zcela amiant.

**Amianth** jest buď šedavě bílý, přetence vláknitý, vlákna dají se buď jako lněná vlákna třepit, nebo jsou tak pevně srostlá, že se nedají dělit než jen nedokonale štípati (asbest). Barva asbestu jest bělavá až bělošedá. Některé odrůdy jsou tak složeny, že se polozetlelé kůře mnohých dřev podobají (dřevo, korek skalní); podobnost tato jest ještě přeslabým povlakem limonitu zvětšena. Opět jiné tence deskovité kusy, v kterých přejemná vlákenka nejsou zároveň s boky rozsedliny srostlá, než toliko velmi jemně spletená, podobají se jirše (bílé) (skalní kůže). Podobnost s kůží jest tím nápadnější, když slabounký hnědavý povlak nerost pokrývá. V odrůdách byssolitu v podobě kůže se objevují hojně až co čůčka značné, zptvořelé krystaly calcitu. Povrch pevnějších kusů asbestu a byssolitu objevuje se někdy jako potřísněn přetenoučkými dendrity psilomelanu.

7. **Turmalin** v sloupkách černé barvy a v nepravidelných, až co prst hrubých kusech, vyskytuje se v turmalínových žulách, které v žilách jiné žuly prorážejí.

8. **Calcit**. V ložisku vápence objevují se vzácně v rozsedlinách malé průhledné krystaly obecného tvaru —  $\frac{1}{3} R \cdot \infty R$ . Hojněji jsou rozsedliny a skuliny ve vápenci pod drnem pokryty špinavě bílým, dírkovitým tufem vápeným v podobách bradavičkováných.

V žile wadové jak pod číslicí 14 zmíněna jest, objevují se uprostřed černé rudy manganové malé, uvnitř duté shluky (septarie) tak zvané cicváry, sestávající z hnědavého vápeného slínu. V těchto septariích převládá calcit značně.

9. **Limonit** jest takorůžka jedinou a výhradní rudou zdejších žil rudních. Při pohledu na mnohé, limonitem vyplněné žily nemožno se zdržeti myšlenky, že vyplnění žil hnědelem jest výsledkem vsáknutí se rudy z horniny žily obklopující. Zvlášť kdekoliv hnědá ruda dírkovitá jest, objevují se v dutinách podoby kapalin hroznovitých, miskovitě složených. Mnohé hnědele, zvlášť ony s malými dutinami, jeví lesk smolný, tak že se podobá, jakoby část rudy buď stilpnosideritu nebo nějakému jinému, snad vodnatému, zásaditému síranu železitému spřízněna byla.

10. **Magnetit**, doprovázen limonitem toliko v jižním vlaku Vranovské žily nalezen byl v polích kopce, zvaného „na železnici“, mezi Vranovem a Bezděkovem. Jednotlivé úlomky patrně složeny jsou z krystalů osmistěných, z kterých zrnitý magnetit složen jest. Krystaly dosahují rozměrů až asi 2 mm.

11. **Wad** co žila znečištěná kaolinem, severně od Mezihoří, ve vápenci.

12. **Psilomelan** co přetenké dendrity na amianthu a byssolitu v čísle 6.

13. O citronově žlutém nerostu, potahujícím co tenký nádech skuliny zkyprělých šedých phyllitů na blízku žil rudních byla již dříve řeč. Možno, že tento nerost, vodnatý zásaditý siran železitý jest podobný glockeritu, apatellitu nebo diadochitu, nebo i nějakému jinému z těchto zásaditých nerostů.

14. V nejvyšší částce výmolu „v Bázové rokli“ západně od Mezihoří, kde mohutná, ale ne zvlášť rudnatá žila limonitová až po drn vychází a kde též odkryta jest, nalezeny v jižním úklonu svahu výmolu až co ořech veliké, okulacené kusy barvy světle kaštanové a povrchu hroznovitě ledvinovitého, mezi kusy žluté a hnědé železné rudy. Malé tyto a vzácné shluky jsou **delvauxit** jak kvalitativním rozborem zjištěno. Nerost obsahuje toliko velice nepatrný podíl kyseliny sírové.

15. Vedle shluků delvauxitu nalezeny podobné malé kuličky s povrchem nepravidelně hroznovitým a barvy voskové. Lom tolikéž jako u delvauxitu jest polomdlý a sloh celistvý a beztvrný. Kvalitativním rozbořem objeveno značné množství kyselivy sfrové, čímž potvrzeno, že nerost jest **diadochitem**.

Něco bližšího o těchto nerostech, jak delvauxitu tak i diadochitu udati, jest proto nemožné, proto že zjištěno není, jestli v žíle samé, nebo v rozdrolených zkypřelých břidlicích ve výchozím původně zarostlé byly. Než tolik je jisté, že doprovázejí výchozí žil limonitových v laurentánských břidlicích. Kdyby i oba nerosty původně v žíle samé se objevovaly, jest blízká zpřízněnost s zkypřelými phyllity značná, nebo žíla v Bázové roklí sestává beztoho hlavně z vylouhovaných, vybledlých, zkypřelých úlomků břidlic. Možno též, že žlutý nádech na břidlicích zmíněný pod čís. 13) by mohl diadochitem být, o čemž ale bez lučebního rozboru nic určitějšího se nedá říci.

Tak tedy v Čechách opět oba nerosty, mimo útvar silurský, společně v nejuzším spojení v zkypřelých břidlicích, ve výchozím hnědých železných rud v laurentánském útvaru nalezeny jsou.

16. **Kaolin** doprovází žílu wadovou severně od Mezihoří co bílý zemitý povlak buď mezi wadem zároveň s vrstevnatostí žíly, nebo v tenkých rozsedlinkách v černé žíle samé.

17. U prostřed žíly wadové objevuje se asi co ruka široký pás, v kterém též cicváry slínové se vyskytují, též na Tab. II. obr. 5. vyobrazený, zarostlý, sestávající z hojného množství co lískový ořech velkých kuliček povrchu ledvinovitě vlnitého, nerostu hnědého. Jednotlivé kuličky jsou velice drobné, na omak mastné, jemné a pouhým tlakem nehtu přesnadno v lesklé droby nedokonale lasturového lomu se dělí. Prášek hlinitého nerostu jest světle hnědý.

Potažná váha určena s 31 grammy, nalezena pro nerost jak jest číslicí 1·829; nerost vodou úplně prosáklý, až všechny bublinky vzdušné z něho unikly, měl vyšší potažnou váhu 2·093, která se tedy jeho pravé hutnosti rovná. Nerost tedy obsahuje dle objemu 14·4% dutinek vzduchem vyplněných.

Při 100° C sušený nerost vydal 7·98% vody co vlhkosti. V kyselině chlorovodíkové jest snadno rozpustný. Analýza nerostu při 100° C sušeného pochází od p. Frant. Farského :

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <i>HO</i>                          | 12·86 |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 41·91 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 28·65 |
| <i>CaO</i>                         | 0·    |
| <i>FeO</i>                         | 4·45  |
| <i>MnO</i>                         | ·97   |
| <i>MgO</i>                         | ·37   |
| alkalie                            | 2·17  |
|                                    | ----- |
|                                    | 99·36 |

Není nerostu, kterému by se tento vodnatý křemán hlinitý podobal; vzdálená podobnost v složení se toliko v smelitu <sup>1)</sup> seznává, ač též množství kyseliny křemičité úplně nesouhlasí, což ostatně není podivné proto, že vůbec nesnadno jest rozbořeny nerostů zemitých v souhlas uvést. Nerost tedy dle složení se toliko smelitu přibližně se podobá.

Nerost by se sice mohl též za znečištěný kaolin míti, však odporuje tomu jeho snadná rozpustitelnost v kyselině solné. Kaolin se, jak vůbec známo, toliko v sehnané kyselině sírové v teple rozpouští.

18. **Pyrit** se co drobnozrný nerost objevuje v jedné rozsedlině v žule, která za druhým silničním můstkem u silnice z Vranova do Komorného hrádku vedoucí na den vychází. Že žlutý zemitý nerost na proměněných břidlicích, na blízku žil rudných, z rozkladu zrnek pyritových pochází, které druhy v břidlicích vtroušeny byly, o tom již napřed zmíněno se.

---

## V. Dodatek.

### Úryvky obsahu nerostopisně-zeměznaleckého.

#### 1. Kocerady

jsou na pravém břehu Sázavy proti Komornému hrádku. Nedaleko od hřbitova Koceradského, směrem k severovýchodu, jsou nějaké lomy ve vápenci otevřené. Vápenec tvoří ložisko v prahorních břidlicích a směřuje v krajině stoupající směrem asi jihoseverním do výšiny Leontininy (Leontinenhöhe) lesem porostlé, potom směrem až k Hradostřimelicům v mohutnosti měnivé od 5 do 20 metrů. Podél severo-jížního rozprostírání se ložiska vápenného jsou lomy v něm buď opuštěné, neb otevřené rozdělané. Úklon ložiska vápencového jest k východu asi  $60^{\circ}$  i ještě více. Jestliže ložisko jest v prahorních vrstvách samo v sobě vyvinuto, anebo jestli leží v pokračování Mezihořského ložiska, vytrativšího a znovu objevivšího se, tedy s tímto v jednom obzoru, o tom se pro nedostatečné poznání pásma ničeho určitého pronésti nedá.

Vápenec jest uložený vesměs do břidlic amphibolových místy proměněných. Vrstvy vápence jsou místy dosti mohutné na sebe přiléhající neb vrstvami amphibolové břidlice a amphibolitu zvláštního oddělené v jednotlivé plásky. Pozoruje se, že toliko v místech, kde ložisko jest méně mohutné, následovně i jednotlivé vrstvy jeho súžené, více vrstev amphibolitových, vrstvy vápencové v jednotlivé plásky rozštěpujících, se vyskytuje. Vápenec jest hrubokrystallinický, přechistý, sněhobílý. Toliko v jednom místě nalezeny v něm krásně šedavězelené, hrubovláknité kusy amphibolu (aktinolitu) porůznu zarostlé.

Amphibolové břidlice jsou buď rázu obecného, anebo se v tvrdých, nedokonale břidličnatých břidlicích, veskrz krátkými, rozevřenými skulinami prostoupených a šedohnědě potáhlých objevují krystaly křemene a černozelelé sloupky epidotu po vyhranění svém, až zpotvořelém, přece dobře rozeznatelné. V některých místech jest tato amphibolová hornina přetvrdá a epidotem veskrz prostoupena, tak že nesnadno ji popsat.

Na několika místech stýká se žula bezslidová (aplit) s přehojným, pletově zbarveným orthoklasem, vesměs tenkými plátky světle čízkového celistvého pistacitu potaženým, s ložiskem vápencovým. Něco bližšího pro nedokonalé ohledání krajiny sdělit nemožno.

Na výšině Leontině se vyskytuje v ležatém od ložiska vápencového tvrdá, amphibolitová hornina nedokonale vrstevnatá a skrz na skrz otevřenými, krátkými skulinami prostoupená. V rozsedlinkách jest křemen a hojný počet až co vraní brk hrubých, táhlých sloupků a jehlic černozeleňého amphibolu narostlých na stěnách skulin špinavě hnědým povlakem potažených.

Všecky tyto horniny nějakým jmenem pojmenovat, nedá se ani provést, možno jim třeba jméno Erlanových neb Pistacitových hornin dát.

Nejpamátnejší zajisté jest břbet Leontininy výše, od jihu k severu směřující, (severovýchodně od Kocerad), v jehož temeni ložisko vápence na den vychází v mohutnosti značnější. Vápencové ložisko pokryto jest mocnými vrstvami šedé, přepevné horniny, pro tvrdost svoji nesnadno porušitelné, která tudíž v hranatých hrbolích neporostlých nad jiné vystupuje. Ač mohutnost vrstev horniny neznáma jest, obnáší zajisté více 5 až 10 metrů, jak z pouhého pohledu již patrné jest.

Hornina jest světlešedá, velmi drobnozrnná, krystalinická, velice tvrdá, rovnající se tvrdostí svojí křemenu. Potažná váha určena jednou s 2·54 grammy, podruhé s 4·06 grammy horniny obnáší: 3·0856 a 3·1178. Hornina jest v kyselinách nerozpustná a rovná se dle pohledu, tvrdosti a hutnoty úplně *erlanu*, od kterého se ale opět svým složením odchyluje.

Rozbor lučební podniknut s 45 grammy látky, která při 100° C 788%, vlhkosti obsahovala.

V kyselinách vyvíjejí se slabé bublinky kyseliny uhličité z nerostu, na doklad toho, že jest veskrz malým množstvím calcitu prostoupena.

Při 100° C sušený nerost obsahuje dle p. assist. Frant. Farského:

|           |           |
|-----------|-----------|
| $SiO_2$   | 61·02     |
| $Fe_2O_3$ | 7·98      |
| $Al_2O_3$ | 19·22     |
| $MnO$     | ·29       |
| $CaO$     | 6·26      |
| $MgO$     | sledy     |
| $CO_2$    | asi 5—6%. |

Erlanu\*) podobný nerost neobsahuje tedy žádného vápna, an nalezený kyslíčnk vápenatý jest vázán kyselinou uhličitou a co calcit v množství 11 až 12% celý nerost prostupuje.

Některé odrůdy zrnitého skapolithu se podobají též tomuto nerostu, ale liší se podstatně jak nižší potažnou váhou tak i složením svým, an méně kyseliny křemičité a více vápna než tento nerost obsahují.

Každým způsobem zasluhuje tato hornina, erlanu podobná ještě zevrubnějšího prozkoumání.

V žilách rudních u Skalice vyskytuje se baryt bělavý, průhledný, co vyplnění žilové v tak velmi hrubokrystalinických kusech, štípajících se ve velké tvary, že se úplně barytům velmi hrubokrystalinickým podobá, které v žilách některých v Příbrami a Hluboši u Příbrami se objevují. Zmíněno zde vyskytování se barytu z té příčiny, proto že se zdá, jakoby vůbec nebylo známo bývalo.



## 2. Chlum u Konopiště.

Západně od hradu Konopišského, který vedle samého Benešova leží, vypíná se vysoký, porostlý Chlum u vesnice Bišně a Václavic do značné výše a za ním ještě západněji hora Neštětická. Vysoký Chlum vypíná se z jednoho z ostrovů břidlice prahorní, obklopené vůkol žulovinou a jest z daleka viditelný.

Jihozápadně od Václavic leží před Chludem žulový kopec Hůrka, z obecné žuly s pletovým orthoklasem složené, v níž i žíly minety se vyskytují, složený. Mezi Hůrkou a Chludem porostlým táhne se údolí k západu, v němž asi hranice mezi žulou a prahorní břidlicí se táhne.

Krátké temeno Chlumu táhne se od východu k západu; Chlum vesměs složen jest z tmavošedých vrstev phyllitů dokonale břidličnatých, střídajících se s šedými, drobnozrnnými vrstvami křemenců, s kterými přechody úzce spojeny jsou. Úklon a směr vrstev jest měnivý, však převládá dosti značný úklon jejich k západu nad jinými směry. V břidlicích, křemenných břidlicích a křemencích Chlumu se objevují žíly pyritové.

V severozápadním svahu Chlumu, nedaleko od temena samého, táhne se dosti dlouhá řada kotlin co pozůstatků bývalých šachtíček, naznačujících směr východozápadní, kterým se rudonosná hornina rozprostírá. Na haldách kotlin se v šedé křemencové břidlici přehojně objevují zrněčka až dost velká zrna pyritu, ba i celé proužky pyritové, zarostlé. Jak široký jest pruh břidlic pyritem prostoupený, který se v místech, kde zbytky šachtíček jsou, jeví, nedá se určit. Kamení pyritem prostoupené zkypřuje se snadno, bledne a rozpadává se za krátkou dobu tak, jako by rozhašené bylo, čehož příčinu v rozkladu pyritu hledat dlužno. Sem a tam i slabé žilečky a pruhy limonitu a povlaky se v zrušeném kamení co zbytky rozloženého pyritu vyskytují.

Dle jihoseverního, velmi příkrého svahu Chlumu, počínající od samého temene, kde svah nejsráznější jest, táhne se ve východní částce vrchu řada hald a kotlin po svahu dolů, tedy směrem sblížené jihoseverním, až asi do polovice sklonu vrchu. Všecky staré štolky a šachtice byly rozdělaný v širokém pruhu břidlic a křemenných břidlic, zcela pyritovými zrny a závalky prostouplých, v kterých i celé žíly pyritu, velice přikře se klonící, uloženy jsou. Pruh kyzový se snadno poznává, ana na svém výchozím jest břidlice zemitě zkypřelá, rozdrolená a rozhašená a žilky pyritu na výchozím žlutými pruhy zemitého nerostu, zásaditého vodnatého siranu železitého, pokryty jsou do vzdáleností neurčitých. V jedné žilce kyzové rozdělaná krátká štola, v nížto hloubení zaraženo jest, což až posud přístupné jest.

Prvým pohledem seznává se žilová povaha celého rudonosného pruhu, do značné šířky zrněčky kyzovými vezkrz prostoupeného.

Břidlice, jako křemenečné břidlice, jsou ve výchozím rudonosném pruhu kypřé, jako rozhašené a hnědým povlakem ve svých trhlínách potažené. V rozsedlinkách bojně tenké kory selenitu a jednotlivé krystalky nejsou vzácné. I jednotlivé kusy křemenečné, na povrchu zkypřené břidlice, mimo výchozí rudního pruhu, skulinami a rozsedlinkami popukané prostoupeny a potaženy jsou žlutým zemitým nerostem z rozkladu pyritu na vlhkém vzduchu se tvořícím a pak selenitem, tolikéž

z rozkladu pyritu původ svůj beroucím. Žlutý zemitý nerost, břidlice povlékající, jest vodnatý, zásaditý siran železitý, jehož vývin poznenáhlým rozkladem pyritu se sledovati dá. Tenké kory bělavého selenitu složeny jsou z nakupených krystalků, kteréž i různě, v puklých dle vrstevnatosti skulinách v břidlicích, v tvarach krystalových na selenitu obecných, se vyskytují. Též bývají břidlice rudonosné a okolní jalové, s nimi se stýkající, slabými žilkami limonitu hnědého, tolikéž z rozkladu pyritu pocházejícího, prostoupené.

Na severovýchodní patě Chlumu se objevují malé kousky hnědé přebohaté rudy, limonitu, naplavené, pocházející zajisté ze slabých žil hnědele někde ve svahu vrchu uložených.

Na výchozím pyritových břidlic samých se též za suché povětrnosti objevují bílé, slabé kory vykvétající, pocházející z rozpustných siranů jako epsomitu, keramohalitu i snad i kamence.<sup>3)</sup>

Na Neštětické hoře se též vyskytují šedé břidlice v trhlínkách nažloutlé a Chlumským podobné, což i zde na přítomnost břidlic pyritem prostouplých poukazuje.

### 3. Tvořešovice.

Jihozápadně od Benešova leží ves Tvořešovice (Tvoršovice), vedlé níž na západ dvůr. Jižně za dvorem, přes kopec, leží mlýn Zimmermannův na potoku. Proti potoku pak jsou osamotnělé chalupy v dědince nazvané „mlýny Tvořešovické“ kteréž co nejjižnější část obce Tvořešovické daleko od ní odloučeny jsou.

Celá krajina je složena z žuly, až na slabý pás amphibolových a erlanových břidlic laurentánských, podobných oněm u Kocerad, v nichž slabé vrstvy zrnitého vápence a ophiocalcitu, k východu se klonící, uloženy jsou.<sup>4)</sup> Vápencové vrstvy vycházejí na den v stráni bezprostředně na pravém břehu jalového mlýnského potoka, západně u Tvořešovických mlýnů.

Od mlýnů Tvořešovických zaryta v zkyprělé obecné žule, snadno v žlutavý písek se drtící, nehluboká a neširoká rokle, „Stradovou roklí“ nazvaná, která, směřující a stoupající mírně od východu k západu v lese, do kterého směřuje, do několik menších roklí se rozdlí.

Žula rokle jest velkým množstvím žil žuly amphibolové a hrubozrnné (pegmatitu) protrhána, v nichž turmalín se objevuje.

V jedné z těchto rokliček, rozdělených od hlavní rokle, a sice v nejjižnější, asi 1000 kroků od mlýnů dle pohledu vzdálené, jsou v kypré žule slabé žíly hrubozrnné žuly uloženy. Nejpamátnější jest jedna žíla, asi 2 decimetry mohutná, kteráž na dně rokle na den vychází a při příkrém úklonu k výchozímu svému tak sужuje a pojednou vytrácí, že pod drn lesa ani nezasahuje. Žíla, rozsáhlostí svou velmi nepatrná, jest památná tím, že v ní krásné krystaly nerostů vrostlé jsou. Žíla uložena z převládajícího bělavého, velmi lesklého orthoklasu, v němž průhledný křemen tím způsobem zarostlý jest, že směsice tvoří písmenkovou žulu nejhrubšího zrna. V směsici písmenkové žuly zarostlé jsou různě dlouhé, táhlé tabulky biotitu, barvy trochu do tombakova vybledlé. V délce i v šířce se tabulky největší rovnají slabému prstu, hrubost jejich až 2 mm. obnáší.

Jakkoliv na pohled jsou táhlé tabulky čtvercových ploch, tož přece jsou to převelmi táhlé šestiboké plátky s dvěma dlouhými, s dvěma kratšími a dvěma velmi krátkými stranami.

Takové jest složivo žuly, v které se jistá místa objevují, kde biotit úplně vytracený zastoupen jest turmalínem, vedlé něhož též granát se vyskytuje. Toto památné zastupování podřízeného biotitového složiva žuly turmalínem a granátem jest, — ač sice v mnohých jiných horninách známo, že jeden vytrácející se nerost jiným zastoupen bývá, a že takto některé nerosty složiva vzájemně se vylučují — přece velmi poučným doladem o zastupování biotitu těmito nerosty. Také skutečně v žule písmenkové vedlé biotitu nikde turmalín a granát zarostlé neobjevy, jakož i vedle turmalínu a granátu ani nejmenší tabulky biotitu se neobjevují.

Turmalin černý, v písmenkové žule zarostlý, jest o něco hojnější granátu. Menší krystaly turmalínu, až co dětský prst hrubé, jsou velmi pravidelně vyvinuty buď co  $\infty P2$ . —  $\frac{1}{2} R$ , neb i co  $\infty P2 \cdot \frac{\infty R}{2}$ . —  $\frac{1}{2} R$ . Plochy klenčové —  $\frac{1}{2} R$  jsou velmi lesklé, rovné hranolové plochy pak též lesklé a obyčejně slabě rýhované. Největší sloupky krystalů turmalínových dosahují hrubosti až  $2\frac{1}{2}$  cm. a jakkoliv plochy hranol ukončující nebývají obyčejně ostře vyvinuty, tož přece na silně kolmo rýhovaném hranolu jsou plochy  $\infty P2$  a  $\frac{\infty R}{2}$  patrný. I značnější sloupky přesilně kolmo rýhované, však tak okulacené neb zpotvořené bývají že se plochy hranolů, silným rýhováním na hranách okulacené a spolu splývající rozeznati nemohou, objevují se nezřídka. —

Granát, o něco méně hojný turmalínu, vyskytuje se s tímto společně v krystalech velikosti počínající průměrem několika málo millimetrů až do průměru vlašského ořechu. Však jak nejmenší, tak i největší krystaly jsou vzácnější oněch, dosahujících asi velikosti lískového ořechu. Krystaly mnohdy vůkol aneb až na nepatrné složní plochy kolkolem vyhraněné, mají podobu tvarů  $202$ ; též velice převládající tvary  $202$  (leucitotvaru), na kterém rohy  $os$  hranolových maličkými kosočtverci tvaru  $\infty O$  (granátotvaru) otupeny jsou, nebývají vzácné. Granáty barvy hnědokolombínové, průhledné až poloprůhledné, lesknou se na svých rovných, vyhraněných plochách převelmi.

Památno jest zajisté to, že jakkoliv písmenková žula tak i turmalín i granát na pohled nezrušeny a velmi pevný jsou, se přece přechoasto krystaly zarostlé v žule, zvlášť jsou-li až na nepatrné složní plochy kolkolem vyhraněny, vyloupnouti dají.

Jihozápadně od Tvořešovických mlýnů, na rozhraní lesa s rolemi, jsou granáty v tvarech vzácněji co  $202$ , hojněji však v hranatých zrncích neb hranatě kulovitých zrncích v bílé žule přechojně zarostlé. Však lesk granátů jest mdlý, barva bělorudá nečistá; všeliká průhlednost jim chybí a pevnost není značná, an se snadno malým nárazem drolí.

#### 4. Chobot.

Uprostřed v rulové krajině, západně od Vlašima u Nesperské Lhoty, Chobotu a Čeliva, uloženy jsou šedo rudohnědé pískovce permského útvaru, v kterých

lupky, hořlavé lupky, s šupinami ryb Ganoidických (*Palaeoniscus*), potom slabá sloj uhelná uložena jest, nač poprvé prof. J. Krejčí ve *Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt* 1868, č. 11, p. 239 upozornil.

V roku 1868 bylo v pánvičce u Chobotu kutáno a v ní sloj 3 až 4 decimetry mohutná objevena. <sup>5)</sup>

Horniny permské z Chobotu podobají se oněm ze severovýchodních Čech a z Rosic na Moravě tak nápadně, že v kusech jednotlivých k rozeznání nejsou. Ležaté sloje uhelné sestává z šedého pískovce, s vtroušenými bílými šupinami slídy (muskovitu), který velice nedokonale břidličnatý v hrubých vrstvách uložený jest a hojně *Spongilopsis dyadica* obsahuje.

Sloj uhelná v mohutnosti 3 až 4 decimetrů jest přechistá, mírně se klonící, a z uhlé co smůla černého, nebarvícího, v samé krychlové kusy se rozpadajícího, přechistého a lesklého složená.

Vryp uhlé jest černý, potažná váha obnáší 1:3400, určena 1:28 grammy.

Množství jednic tepla (kalorií) určeno dle Berthièrova způsobu z množství redukovaného olova z klejtu olověného, jest 3164·8, když se z redukovaného olova toliko uhlíku (po vynechání vodíku) do počtu uvede; množství uhlíku v uhlí kamenném obsaženého by bylo asi 79·76% (Tichý).

Prášek uhlí nespekává se v otevřeném kelýmku, než náleží toliko k uhlí nespekajícímu.

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Uhlé dává     | 79·62 % koks                              |
| uhlé obsahuje | 6·78 % popele; oboje určeno z 2·47 grammů |

kamenného uhlé.

Bezprostředně nad uhlím sestává strop z černých až černošedých jemných, dokonale břidličnatých, tence vrstevnatých lupků s velmi hojnými, však ne ostře zachovalými otisky rostlin.

Výše do visutého lupky sešednou více, nejsou též tak tence vrstevnaté a dokonale břidličnaté a stávají se poněkud pískovcovitými. S vrstvami těmito, v nichž toliko nejhruběji zachovalé otisky uloženy jsou, střídá se vrstva šedého jílovatého lupku.

Nalezené otisky rostlinné jsou následující:

1. *Spongilopsis dyadica* Geinitz. Dyas od. Zechsteinform. od das Rothliegende 1861, Hft. 2, p. 132; T. 24, fig. 2, 3.

*Palaeophycus insignis* Gein. Dyas p. 131; T. 24, fig. 4.

Zbytky této chaluhy v odrůdě úplně dorostlé, podél rýhované, podobné vyobrazení na uvedeném místě: T. 24, obr. 3, jsou hojné v pískovcových šedých lupkách, v ležatém sloje. Též polovyvinuté a nevyvinuté, na konci skobovitě pod pravým úhlem zlomené odrůdy se objevují.

2. *Sphenopteris Naumanni* Gutbier.

Gutb. u. Gein. Verst. des permisch. Syst. Sachsens 1849; Hft. 2, p. 11; T. 8, fig. 1—16.

Geinitz Leitf. des Rothlieg. 1858, p. 9.

Göppert, Foss. Fl. d. perm. Form 1865, p. 89.

Toto kapradí, velehojné v černých lupkách, bezprostředně nad uhelnou slojí, není sice dokonale zachovalé, dá se ale nicméně z některých malých úlomků vý-

značně vyvinutých k tomuto druhu vřadit. Toliko malé úlomky tohoto jednoduše speřeného kapradí nalezeny; a podobají se Tab. 8, obr. 2 a 3, zvláště ale obr. 4 zmíněného díla, naší rostlině velice, která pro nás ještě tím památnější jest, proto že až posud v Čechách objevena nebyla, že tedy v Chobotu se poprvé vyskytuje.

3. *Cyatheites arborescens* Schloth. sp.

Z četné literatury budiž zde toliko uvedeno:

1820, Schlotheim, Fl. d. Vorw. T. 5, fig. 10; T. 8, fig. 13, 14.

1828, Brongniart, Hist. des vég. foss., p. 307, 310, 311, 312, 313; T. 101, 102, 103, 112.

1849, Germar, Petrific. Wett. Lobejun., p. 97, T. 34, 35.

1855, Geinitz, Steink. Sachsens, p. 24, T. 28, fig. 7—11.

1865, Göppert, Permflora p. 120, T. 15, 16, fig. 1—4.

Velké úlomky vějířů této kapradiny v černém lupku. Ač vějířkové rozvětvení žilek není záchovalé, souhlasí přece dle všeobecného tvaru tato kapradina s tímto druhem.

4. *Cordaites* sp.

V šedém, pískovcovém lupku visutého sloje uhelné, se objevují nejasně zachovalé listy, které co *Cordaites* se seznávají. Mimo to tolikéž nedokonale zachovalé úlomky kmenů a dřeně, pokryté silnou lesklou korou uhelnou, co *Rhabdotus* a *Artisia* pojmenované, se tomuto druhu připočítají.

5. *Cardiocarpon orbicularis*. Ettingshausen, Fl. v. Stradonic, 1853, p. 16. T. 6, fig. 4.

*Cardiocarpon emarginatum* Göpp. et Berger, 1848, de fructibus et de semine ex form. lithanthr. p. 24, T. III., fig. 35.

*Rhabdocarpus Klockeanus* Geinitz, 1862, Dyas p. 153, T. 35, fig. 6.

1865, Göppert, Permfl. 174; T. 25, f. 5?

T. 26, fig. 7—18, 21—23.

*Cardiocarpon* sp. 1848, Gutb. et Gein., Permfl., T. 6, fig. 1 a, b, c; T. 8, fig. 13.

Tyto malé plody se společně se *Sphenopteris Naumannii* objevují v černých, tence břidličnatých lupkách bezprostředně ve stropu sloje a podobají se zvláště nápadně vyobrazením v Gutbier et Geinitz Permfl. Sachs. T. 8, fig. 13 a oněm v Göpp. Permfl. T. 26, fig. 17, 18, 21, 22, 23.

V následujících tabulkách jsou sestavena přehledná naleziště našich permských rostlin v kamenouhelném a permském útvaru zemí českých a ostatních zemí.

Srovnávací přehled nalezišť Chobotských rostlin v českých zemích.

| Jmeno                                      | Permský útvar                                                                                           |                                                                                        | kamenouhelný útvar                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            | Čechy                                                                                                   | Morava                                                                                 | Čechy                                                                                                                                                                                                                  | Morava a Slezsko                                       |
| <i>Spongilopsis dyadica</i> Gein.          | Chobot, Huttendorf a Vrch-<br>láblí.                                                                    | Zbejšov u Rosice.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <i>Sphenopteris Naumannii</i><br>Gutb.     | Chobot.                                                                                                 | Lisice.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <i>Cyathea arborescens</i><br>Schloth. sp. | Dolní Štěpánice,<br>Broumov,<br>Ottendorf u Broumova,<br>Huttendorf u Vrchlabí,<br>Lhotice u Budějovic. | Lisice.<br>Zbejšov, Padochov,<br>Oslavany, Rosice,<br>Krumlov.                         | Mošice, Břasy (Radnice), Víška,<br>Dobráky, Blatnice, Břez, Plasy,<br>Jalovčín u Třemošné, Nýřany<br>(Plzeň), Rakovník, Lubna, Slaně,<br>Zeměchy.<br>Kladno.<br>Stradonice, Dříbří.<br>Svatoňovice, Žďárek, Radvanice. | Zbejšov, Zástavka,<br>Padochov, Oslavany,<br>Nová Ves. |
| <i>Cordaia spec.</i>                       | Chobot.<br>Broumov.                                                                                     | Lisice.<br>Zbejšov, Padochov,<br>Oslavany, Rosice,<br>Krumlov, Nesvojovice,<br>Říčany. | Sviná, Vranov, Chomle.<br>Stradonice, Malé Přílepy.<br>Nýřany, Bílá hora, Třemošná.<br>Příčina.<br>Kráupy, Zeměchy, Votovice,<br>Kladno, Senec, Lány.<br>Letkov.<br>Žďárek, Svatoňovice, Žacléř.                       | Zbejšov, Padochov,<br>Zástavka.<br>Dombrová v Slezsku. |
| <i>Cardiocarpon orbiculare</i><br>Ettings. | Chobot.<br>Broumov.                                                                                     | Zbejšov, Rosice, Pado-<br>chov, Oslavany, Krum-<br>lov, Kratochvílka.<br>Letovice.     | Stradonice.<br>Malé Přílepy.<br>Bílá hora (Plzeň).<br>Kráupy, Votovice.<br>Letkov. Žďárek.                                                                                                                             |                                                        |

Srovnávací přehled nálezů chobotských rostlin v jiných zemích.

| Jmeno                                     | Permský útvar                                                                                                                                                                                                                                                                          | kamenouhelný útvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spongiopsis dyadica</b> Gein.          | Pfaffenheim, Olešnice (Olešnice), Hohendorf, Lichtenstein (Sasy).                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sphenopteris Naumannii</b> Gutb.       | Saalkhausen u Otace, Reinsdorf u Zvítkova (Sasy).<br>Niedervallen (Kladsko); Erbenendorf (bavorská Píale).                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cyathites arborescens</b> Schloth. sp. | Weissig u Plinice, Reinsdorf u Zvítkova (Sasy).<br>Klein Neundorf, Neuode (Slezsko).<br>Seebach, Schmerbach (bavorská Píale).<br>Kleinschmalkalden (Duryňský les).<br>Rathweiler, Diedelkopf, Kira, Lebach (Saarbrücken).<br>Lodève (Francie).<br>Prince Edward Island (Amerika).      | Stanglape (Švýrsko). Kronalpe u Weissenbachu (Korutany). Zvíkov-Kamenice, Píavno (Sasy).<br>Weitin, Lobejun u Halle. Labach, Brücken, Oberweiler, Naunkirchen (Saarbrücken).<br>Erbenendorf (bav. Píale).<br>Baden-Baden (Černý les), Hleid (na Harcu).<br>Stoekheim (Duryňský les).<br>Piesberg u Osnabrücku, Idenburru (Hanoverko).<br>Dortmund (Duryňský les).<br>Waldenburg (Slezsko).<br>Cole de Balme (Wallis).<br>Muse u Antun, St. Etienne, St. Pierre la Cour, Terasson (střední a jižní Francie).<br>Pett Coeur, Val Bonais u La-Mure, Mont de Bacule, Carcume (Dauphiné).<br>Marsange u Langeac (Haute-Loire).<br>S. Pedro da Cora, Payos, Valle de Carro, Eryedora u Bussaco, Moimho d'Ordem (Portugalsko).<br>Villa nuova del Rio (Spanělsko, prov. Seville).<br>Sardinie, Toledano. Mauch-Chunt, Wilkesbarre (Pennsylvanie).<br>Mason-Creek (Groundy-County, Illinois).<br>Sydney, Picton (Nova Scotia a New Brunswick). |
| <b>Cordaia sp.</b>                        | Weissig, Wilmsdorf, Possendorf (Sasy).<br>Klein-Neundorf, Neuode, Marzdorf u Löwenburgu (Dol. Slezsko).<br>Naumburg (Wetterau).<br>Erbenendorf (bav. Píale).<br>Roschberg u S. Wendel, Schwarzbach, Donnersberg, Berschweiler u Kira (Saarbrücken).<br>Prince Edward Island (Amerika). | Stanglape (Švýrsko).<br>Korutany. Weitin, Lobejun (Halle).<br>Stoekheim (Duryňský les).<br>Hleid (Harco).<br>Erbenendorf (bav. Píale).<br>Idenburru, Piesberg u Osnabrück (Hanover).<br>Essen, Werden (Westphaly).<br>Hostenbach, Karlingen, Gerhart, Ingbert, Wiedskirchen, Labach, Salbach u Hausweiler, Urexweiler, Breitenbach, Brücken, Bemiglsburg (Saarbrücken).<br>Píavno (Sasy).<br>Hinter-Olsbach, Opman, Geroldseck, Baden-Baden (bádenský černý les).<br>Inde (Čadky).<br>Waldenburg (Slezsko).<br>— Serron, Erbignon, Outre-Rhône, Tanninge (Wallis).<br>St. Hypolite (Elsas).<br>Tarentaise (Dauphiné).<br>Langeac (Haute-Loire).<br>S. Pedro da Cora, Passal, Pedrundo u Moimho d'Ordem (Portugalsko).<br>Castel-Comer (Ursko).<br>Petrovskaja (Ru).<br>— Grayville (Illinois).<br>Frog-Bayon (Arkansas).<br>Picton, Grand Lake, Springhill, Sydney, Joggins, Anslor (New Brunswick a Newa Scotia).                     |
| <b>Cardiocarpon orbiculare</b> Ett.       | Ottendorf, Neuode, Slezská Logava, Hagsdorf u Lanhan (Dol. Slezsko).<br>Sasy.                                                                                                                                                                                                          | Charlottenbrunn (Slezsko).<br>Stoekheim (Duryňský les).<br>Bochum, Dortmund (Westphalsko).<br>Marsanges u Langeac (Haute Loire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Poznámky.

- 1) Smelit se u Telkibánye v Uhrách co jemná, spojitá, hlinitá hmota, velko- až rovnolasturového lomu, co ložisko nad trachytem objevuje; však i zarostlá známá. Složen jest dle Oswalda (Erdmann Jour. f. prakt. Chem., Bd. 35. p. 39) přibližně takto:

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <i>HO</i>                          | 13   |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 50   |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 33   |
| <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 3    |
| <i>NaO</i>                         | 2·1  |
|                                    | 99·1 |

Náš nerost obsahuje tedy proti pravému smelitu něco málo kyseliny křemičité.

Aby se mohl podat důkaz, jak velice beztvárné nerosty v složení svém proměnlivé býti mohou, byť by i dle pohledu úplně sobě se rovnaly, budiž zde uvedeno:

Nerost — mezihořaké, co smelit poznamenané hmotě, úplně podobný dle zevnějšího pohledu — který bublinovité dutiny ve phonolitu mariánského vrchu u Oustí na Labi vyplňuje, tudíž v geodách se objevuje, má přese všecku značnou podobnost přece jiné složení.

Rozbor sdělenými p. asistentem K. Preisem, pochází od Rochovanského. Při 100° C sušený nerost vydal 13·87% vody co vlhkosti. Při 100° C sušený nerost obsahuje:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <i>HO</i>                          | 7·86  |
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 53·63 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 22·10 |
| <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 3·76  |
| <i>MnO</i>                         | 1·31  |
| <i>CaO</i>                         | 3·12  |
| <i>MgO</i>                         | 8·02  |
|                                    | 99·80 |

- 2) Erlau z Erlhaunneru v Smrcinách, ač dle pohledu našemu nerostu vele podobný, liší se od něho znamenitě svým složením. Dle Gmelína (Schweigers Journ., Bd. 37., p. 76) sestává Erlau z:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <i>SiO<sub>2</sub></i>             | 53·16 |
| <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 14·03 |
| <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | 7·14  |
| <i>Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i> | ·64   |
| <i>CaO</i>                         | 14·40 |
| <i>MgO</i>                         | 5·42  |
| <i>NaO</i>                         | 2·61  |
| <b>Stráta křeháním</b>             | ·60   |
|                                    | 96·00 |



- 3) V dobrém zdání z roku 1754 bylo tehdejšímu majiteli panství Konopišského (nyní Lobkovického) Vrtby-mu, ku kterému Chlum náleží, rada dána, by bane na pyrit otevřel. Zdá se však, že již před tím časem ve vrchu rozdělány, byť by opuštěny, viditelné byly, an se o otevřené štole píše. Zde tedy v druhé polovici minulého století naposled asi dolováno bylo.
- 4) Na generalstábní mapě této krajiny, vydané a zeměznalecky barvené c. k. geologickým říšským ústavem, není ložisko vápenné poznačené.
- 5) Panem baronem K. Villanym, jemuž za známost svou o kusech se skamenělinami díkem zavázán jsem.



## Vysvětlení tabule I.


---


Krajina laurentínská, složená z phyllitů protržených značnou spoustou žulovou.

Hranice mezi phyllity a žulou nejsou v přírodě celkem tak nepřetržitě, jak to na mapě, částečně pro nedokonalé odkrytí hranic hornin v přírodě, vkresleno jest; než všude žula výběžky do břidlic zasahující, na hranicích odtržené ostrůvky a mocná pásma břidlic v sobě zahrnuje. Na hranicích phyllitů s žulou jest celkem dosti porušené uložení břidlic převelmi nedokonalé, mající původ svůj v rozdrčení a rozmělnění pohraničních částí starších břidlic, stýkajících se s mladší žulou.

V břidlicích mimo to se objevují řalvany a žíly žul, z nichž jen část na mapě naznačena jest.


V severovýchodní části břidličnaté, na obou břehách Drhlovky střídají se hojně mocné vrstvy amphibolitových břidlic s phyllity, což na mapě naznačit, měřítko nepřipouští.



**Tab.I.**

1

Tab. II.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Petrografická studia  
čedičového horstva v Čechách.

Od

**dra. Emanuele Bořického,**

un. profesora na universitě pražské a kustoda muzea král. česk.





## Úvod.

Ku poznání nerostní povahy rozličných druhů horstva nejvíce zajisté přispěla lučba. Byvši dosud nejdůležitější téměř pomůckou při skoumání petrografickém vedla u vyjasňování povahy horstva k nemálo důležitým výsledkům, byla-li podporována obezřelým pozorováním geologických poměrů, zejména sledováním nenáhlných přechodů zjevně a skrytě krystalických hornin; nicméně musíme přisvědčiti chtěce objeviti nerostní povahu skrytě krystalických hornin, že bychom i nejdůmyslnějšími výklady chemických rozborů a jiných podobných zkoušek, i užitím těch sporých, obvyklých pomůcek fysikálních nebyli se přiblížili žádoucímu cíli v té míře, jakou vykazuje již nyní zkoumání horstva pomocí drobnohledu.

Drobnohled — jehož se dávno již užívalo v ostatních odborech přírodovědeckých způsobem přerozmanitým — nemohl mezi pomůckami pro bádání petrografická patřičného zaujati místa, pokud výhradně jen ke skoumání prášku a drobných úlomků hornin sloužil. Důležitý však pokrok již nastal, když zkoumaly se obroušené a vyleštěné plochy hornin ve světle odraženém (zvláště užilo-li se zároveň vhodných k leptání skoumadel); leč i tato metoda obmezena jsouc na malé a slabě osvětlené zvětšení nedošla valného rozšíření. Teprve asi před 14 lety obrácen zřetel ku prosvitným neb průhledným, tenounkým lístkům jednotlivých nerostů za tím účelem, aby pomocí drobnohledu ve světle propadajícím, obyčejném i polarisovaném, a za pomocí chemických agentů význačné jich vlastnosti a znaky se objevily, aby pak na základě tom i v lístkách skrytě krystalických hornin — upravených v podobě mikroskopických preparátů — další porovnávací studia konati se mohla. A tak dospělo se již k tomu cíli, že se rozeznati mohou i nejmenší části četných nerostů v lístku z horniny vybroušeném, že zkoumati se mohou vnitřní úprava jednotlivých krystalů, jich vrostlic i (v četných listech hornin) různé stupně proměn, jimž podlehá každý nerost od vzniku až do poslední přeměny své, konečně že se sledovati může i vnitřní horniny skladba, jež vyniká často zvláštním rázem, svědčícím o původu horstva.

První, jenž tomuto způsobu zkoumání cestu proklestil, byl Henry Clifton Sorby, který klassickým dílem svým: on the microscopical structure of crystals, indicating the origin of minerals and rock's (Qart. Journal of the geolog. soc. 1858 XIV.)

drobnohledu takovou platnost zjednal, že nyní po bok nejpotřebnějších pomůcek každého petrografa právem se řaditi musí.

V oboru horstva mezi mladšími eruptivními horninami nejvíce rozšířeného — horstva čedičového, jež co do rozsáhlosti své v Čechách jest předmětem tohoto pojednání, konána jsou již zevrubná bádání mikroskopická od Zirkla, který ve svém povšechném díle: „*Untersuchungen über die mikroskopische Zusammensetzung und Struktur der Basaltgesteine*“ (Bonn 1870) uvádí i mikroskopický rozbor čediče asi z 10 českých nalezišť.

Výskumy Zirkelovy, které vyšedše ze zkoumání 305 destiček čedičových z různých Evropy končin našly jen velmi sporé průpravné práce jiných skoumatelů<sup>1)</sup>, slouží nyní za základ nejen k mikroskopickému zkoumání čediče nýbrž i ke studiu příbuzného, mladšího i staršího eruptivního horstva.

Vedle práce Zirkelovy řadí se ony Sandbergerovy o doleritech a několika čedičových horninách.<sup>2)</sup>

Neméně důležité jsou i výskumy Čermákovy pro rozeznávání nerostů amfibolových a biotitových na základě dichroismu a optických vlastností.<sup>3)</sup> Mikroskopickou povahu jednotlivých nerostů nastínil ve svých kritických, mikroskopicko-mineralogických studiích Fischer<sup>4)</sup>; Möhl pak rozšířil známost tachylitu a odrůd čediče, ve sklu bohatých, pracemi svými na horninách (tachylitových, basaltových a doleritových) ze Sababurku v Hessensku.<sup>5)</sup>

Obrat, jaký nastal vlivem drobnohledu ve studiích malé pouze části petrografie — v oboru mladšího eruptivního horstva, svědčí již o tom, že z podobných zkoumání i jiných mikro- a kryptokrystalických hornin nadíti se lze mnohých důležitých i netušených výsledků, že mikroskopický rozbor u výkladu minerální povahy hornin povždy stane se nejdůležitější podporou rozboru chemického a postaviv na jisto vzájemnost chemické a mikroskopické povahy hlavních typů jednotlivých hornin uspoří pracný rozbor chemický k mnohým účelům praktickým.

Hlavně na základě mikroskopických, chemických a vůbec petrografických studií uvázal jsem se ve zkoumání mladšího eruptivního horstva Čech, jehož geognostické poměry již A. Reussem, E. Reussem, Jokelym a j. byly dosti zevrubně objasněny. Za tím účelem procestoval jsem v posledním pětiletí vždy po čas prázdnin největší část severovýchodních a severozápadních Čech a rozmnožil jsem sbírky hornin král. čes. Musea, Zippem, Krejčím, Fričem a j. snešené. Proskoumav již více než 800 mikrosko-

<sup>1)</sup> *Sorby-ova* bádání vztahují se hlavně k vnitřní úpravě větších součástí hornin.

*G. v. Rath* zkoušel horninu Löwenburkskou v Sedmíhradech. *Zeitsch. d. deutschen geolog. Gesellschaft* 1860, 41.

*Max Deiters* skoumal čtyry čedičové horniny Sedmihorské. *Z. d. d. g. G.* 1861, 123.

*H. Vogelsang* zmiňuje se v mikropetrografické části své „*Philosophie der Geologie*“, vydané v Bonnu r. 1867, o čediči velmi stručně.

*H. Möhl* zabýval se zkoumáním anamesitu z Böhlu u Výmaru (Kassel). *IX. Bericht d. Offenbach. Ver. für Naturkunde.*

<sup>2)</sup> *Neues Jahrb. f. Miner. u. Geol.* 1870, 205.

<sup>3)</sup> *Sitzgsb. d. k. Acad. d. W. in Wien*, Bd. 59, 1869, Maiheft.

<sup>4)</sup> Vyňato z díla vydaného k oslavě 50letého jubilea přírod. spol. ve Freiburgu 1871.

<sup>5)</sup> XVI, XVII, XVIII. Bericht des V. f. Naturkunde zu Kassel 1871.

pických lístků různých čediče odrůd skoro ze tří set nalezišť a zjednav sobě vlastní práci, z části též z laboratoře p. prof. Šafaříka četnou sbírku chemických čediče rozborů, dovoluji si podati u veřejnost výsledky svých studií o českém horstvu čedičovém. Studia tato, vztahující se především k mikroskopické a chemické povaze rozličných čediče odrůd, k jejich postoupnému stáří a povšechnému rozšíření v Čechách, objevují též četné nové mikroskopické zvláštnosti jednotlivých nerostů a jich přeměny i zvláštnosti skladby četných odrůd čedičového horstva vůbec.

K těmto mikroskopickým a chemickým studiím řadí se pak všeobecné úvahy a přehledy, týkající se zevní i vnitřní stavby čedičového horstva, jeho proměn vlivem vzdušnin, druhotných jeho nerostů, vyvinutých v dutinách a puklinách, působení jeho na sousední horniny a na povahu půdy a konečně přehled posavadních studií v oboru čedičového horstva krajin českých.

---

## Mikroskopická studia českého horstva čedičového.

### O původních nerostech skládajících čedič vůbec.

Každá hornina čedičová obsahuje augit (amfibol) a magnetit co stálé a podstatné své součásti. Vedle augitu a magnetitu, jež žádnému pravému čediči nescházejí, vystupuje co třetí součást buď hmota živcová (a sice co trojklonný živec neb co nefelin neb co leucit, k nimž zřídka hauyn a nosean se druží) aneb stejnorodá sklovitá látka. Přítomnost i množství té které ze živcových součástí neb sklovité hmoty rozhoduje o rázu čediče; liší se podstatně jednotlivé horniny čedičové od sebe tím, přítomen-li v nich živec, či zastoupen-li leucitem, nefelinem neb látkou sklovitou.

K těmto podstatným součástkám horstva čedičového přistupují četné jiné vedlejší. Z těch pak nejčetnější a nejrozšířenější bývá olivin, k němuž se dosti zhusta řadí diopsid, brancit a jeho světlá odrůda enstatit, též hypersthen.

S augitem ve velmi blízkém spojení a však zřídka a po skrovnu bývá přítomen i dialag.

V jistých odrůdách čediče jest biotit a rubelan čteněji rozšířen, magnetit pak zastupuje se často železem titanovým, zvláště v odrůdách bohatých olivinem a brancitem. Látka sklovitá přichází zřídka samostatně vyloučena v podobě tachylitu, obyčejně tvoří tmel, jímž krystalické části v celek se víží.

Ve velmi jemnozrnném neb krystalicky celistvém horstvu čedičovém vyskytá se z uvedených součástí dílem olivin sám, neb zároveň s diopsidem, brancitem, enstatitem, hypersthenem smíšen, dílem vedle augitu a amfibolu, v zrnech zřetelných od velikosti máku až do velikosti hlavy a udílí hornině rázu porfyrového. V těchže horninách, v nichž olivin jest sporý, neb jímž úplna schází, bývá augit neb amfibol ve větších krystalech vyvinut; řidčeji lze již v těchže čedičích pouhým okem pozorovati malé kupky neb zrna magnetitu neb železa titanového, jednotlivé tyčinky živcové nebo sloupky nefelinové, neb i krystaly leucitu z víří špendlíkové hlavy, kdežto v zrnitých čedičích odrůdách zřetelné krystaly nefelinu neb živce dosti často co jehlice vystupují.

Veškeré tyto součástky zúčastňují se i mikroskopické skladby čediče, pouze olivin (brancit, enstatit, hypersthen) klesá zřídka na zrněčka mikroskopická.

### Augit.

Krystaly augitu, porfyricky vystupující — buď jednoduché neb dle  $\{\infty \bar{P}\infty\}$ ,  $\{P2\}$  aneb dle  $\{-P\infty\}$ <sup>1)</sup> složené — jsou na povrchu mdlé, rovnoploché, ostrohranné (řidčeji drsné, druznaté, jako na př. krystaly augitu z čediče od Varty na Ohři), beze všeliké stopy pravidelného rýhování. Pod lupou jeví mnohé z nich (n. př. augit z Vlčí hory u Černošína) na plochách krystalových, jmenovitě na ploše  $\infty \bar{P}\infty$ , velmi četné mikrolithy vystupující co krátké čárky a body, jež pak v takých krystalech — jak pozorovati lze na broušených lístkách — na okraji v největším množství přicházejí.

Krystaly augitu uzavřené v pevných odrůdách čediče bývají ve všech dílech dosti zachovalé, krystaly však z tufů, droh a z peperinu jsou již na povrchu plošek svých více méně vyhlodané a uvnitř dírkovité. Mezi těmito vyskytují se (jako v peperinu z Vlčí hory) také na pohled úplně zachovalé krystaly augitu, jichž vnitro však četnými dutinami jest porušené; těmito dutinám ubývá ponejvíce velikosti ze středu ku povrchu krystalu a to sice v takové míře, že na povrchu ploch již nebývá ani stopy po rozkladu. A tato dírkovitost souvisí patrně se shluky vrostlic, zvláště hmoty sklovité, jež snáze se rozkládá a — jak na broušených deskách zřejmo — v největším množství ve středu krystalů nahromaděna bývá. Krystaly augitu z peperinu, droby a z tufů, i když silně jsou zvětřáním porušeny, podržují přece ještě své obyčejné vnější znaky; jen ze slepence (tufu) čedičového, vystupujícího v žule na severním svahu Hradiště u Biliny, známy jsou krystaly augitu, jež v žlutavou, načervenalou neb do zelena přecházející hmotu podobnou hlince valchářské (hutnosti 2·208), dílem také v anauxit přeměněny, co metasomatické pseudomorfozy se objevují; vedle přeměněných jsou zde však také krystaly augitu, na pohled neporušené.<sup>2)</sup>

Jakým způsobem tato přeměna krystalů augitových pokračovala, seznati lze z chemických rozborů<sup>3)</sup> a) dle Rammelsberga, b) dle Hauera, jež udávají v %:

|                      | a)     | b)    |
|----------------------|--------|-------|
| kyseliny křemičité   | 60·626 | 54·24 |
| kysličníku hlinitého | 23·085 | 25·02 |
| „ železitého         | 4·207  | 5·22  |
| „ vápenatého         | 1·275  | 0·87  |
| „ hořečnatého        | 0·910  | 0·56  |
| vody                 | 9·123  | 14·37 |

Zásady augitu, kysličník vápenatý a hořečnatý, částečně i kysličník železnatý jsou až na malé zbytky vylouženy; taktéž musila býti vyloužena i část kyseliny křemičité, poněvadž rozborů svědčí o rozmnožení kysličníku hlinitého.

Jako větší porfyrické, tak i nejmenší mikroskopické krystaly jeví vyvinutím

<sup>1)</sup> Vrba, Lotos. 1870.

<sup>2)</sup> A. E. Reuss, Geognost. Sk. a. Böhmen. Umgebung von Teplitz u. Bilin; Prag, 1840, S. 223.

<sup>3)</sup> Rammelsberg, Handwörterbuch des chem. Theiles der Mineralogie, str. 68. — Rammelsbergs Mineralchemie 1860, 488.

zevní i vniterné stavby své a vrostlicemi svými četné rozdíly, jež ponejvíce s celkovým rázem druhů čedičových úzce jsou spojeny.

Vedle pravidelně vytvořených tvarů pozorovati lze nezdědku i takové, jež jedním koncem v drobnější krystalky vybíhají (jako v čediči ze Zajícova), aneb jen částečně na způsob kostry vyvinuty jsou (v čedičích, bohatých olivinem a sklem na př. v čediči od Míšeovic) nebo tvary takové, které u vyvinování svém různými překážkami přerušovány rozmanitě jsou znetvořeny, ano i prouděním tuhnoucí hmoty rozlámany, tak že základní hmota, zároveň s mikrolithy v proudech uloženými, mezi úlomky augitovými vězí. Nejinak bývají i mikrolithy augitové klínovitě stlustěné, hákovitě zprohýbané aneb i na konci rozštěpené. Tolikéž i vnitřní stavba augitu nebývá v rozličných druzích čediče stejná.

V broušených lístkách četných augitů vyskytují se mikrolithy nepravidelně uložené, a jen poblíže okraje viděti bývá hustých vrstev pásma, jež jsouc téměř bez mikrolithů, spíše proužkům fluidálním se podobá. Augity pak takového rázu bývají nahnědlé neb zelenavé, šedě zbarvené a zvláště pro zrnitý čedič andesitový význačné.

Průřezy augitů ostatních čediče druhů vyznačují se ponejvíce více nástinu barev a vynikají mískovitým slohem vnitřním, který více méně souběžným uložením vrostlic v postupném, všestranně stejnoměrném vzrůstu se byl vyvinul. Velmi často bývá střední část augitu nahnědlé zelená (také co tráva neb co oliva zelená) a bohatá vrostlicemi a obklopena žlutavým, nahnědlým nebo olivově zeleným pásmem: blíže pak okraje, jež nejtemněji bývá zbarven, převládají červenavé a nahnědlé (karafiátově neb kaštanově hnědé) stíny barev; jindy bývá opět vnitřní část (nažloutlá neb červenavá) obložena tmavším, červenavě hnědým pruhem.

Mnohdy nalézají se i takové průřezy augitu, jichž světlejší (ponejvíce žlutavé) jádro od nahnědlého vnějšího pásma ostrými obrysy odděleno, obrácenému krystalu augitu náleží.

Že mískovitý sloh vnitřní vždy vyniká, k tomu přispívá zvláště uložení vrostlic, mískovitým pásmům rovnoběžné. Tyto hromadí se více méně buď ve střední části, buď v jednom buď ve více rovnoběžných pásmech až ke kraji, jež bývá věncem magnetitovým posázen a na mikrolithy bohat.

Vrostlice, jakéž v krystalech augitu a v jiných nerostech přicházejí, jsou závislé na povaze odrůd čedičových, z nichž povstaly. Tak nalézají se v krystalech augitu čediče leucitového vrostlice leucitu, v nefelinovém čediči vrostlice nefelinu atd.; i přihází se, že vrostlice roztopenější augitu v tomto jest uzavřena buď bez porušení svého tvaru buď jen na obvodu slita (na př. nefelin); avšak v zrnitých čedičích bez základní hmoty aneb v takových, jichž základní hmota méně mikrolithů a drobnějších krystalů obsahuje, schází vrostlice i krystalům augitovým.

Vrostlice augitu jsou:

a) Mikrolithy augitu a drobnější krystaly jeho, tyto zřejmě omezené, ony co trnité jehlice vyvinuté; uložení jich bývá rovnoběžné pásmům (v augitových průřezích velmi mnohých čedičův).

b) Magnetit v zrnech po většině roztroušených aneb v hustých řadách nahromaděných, jež se nejčastěji jeví na okraji v podobě věnce (velmi často).

c) Apatit dosti hojný v bezbarvých jehlicích s příčnými šesterečnými průřezy (na př. v čediči ze Zajícova).

d) Leucit v průřezích augitu čediče leucitového tolikéž dosti hojný (zejména v čediči Záhořském a Hořeneckém).

e) Částčky skla, jež augitu velmi zřídka scházejí. V největší části sklovitých dílců, jež na způsob spletených růženců velmi často souvisíce neb žilkovité rozvětvení představuje, bývá jedna neb více plyných (nepohyblivých) neb kapalných (pohyblivých) bublinek, v nichž opět často černé jehličky pozorovati lze; řidčeji jeví se skla, v kterých se mikrolithy čteněji nalézají; vystoupením shluků mikrolithů stává se skelná vrostlice polokrystalickou. Často vyskytují se též vrostlice skla, jež mají takové pravidelné obrysy, jako augit, do něhož jsou vrostlé. (Česká Lípa.) O uložení vrostlic skelných platí celkem totéž, co řečeno bylo o vrostlicích augitu vůbec. Bývají ony nejčastěji v střední části více méně hustě skupeny, často tenčími žilkami spojeny, aneb střídají se na způsob pásů až ku kraji; velmi zřídka vyskytují se pouze v okrajních pásmech. Mimo to bývají v průřezích augitu velmi hojné

f) kulaté, ovální nebo protáhlé póry, naplněné plyny neb parami, z nichž ty nejmenší v přímných neb zakrouhlých čarách seřaděny bývají, i více rovnoběžných řad tvoří (v augitech hory Košovské); velmi zřídka nalézají se póry s pohyblivými bublinkami (v čediči z Pöhlberku a Annaberku v Krušných Horách a z Pecberku u Dokes).

Jako ve velmi mnohých součástkách čediče, tak nacházejí se neméně i v augitech na obvodu hluboko vtlačené aneb i zcela uzavřené

g) částky hmoty čedičové (jež mívá někdy i totéž omezení jako augit). Mimo tyto dříve již od Zirkla uvedené vrostlice augitu zmíniti se mohou ještě o

h) vrostlicích nefelinu v podobě úplně bezbarevných, poněvíc krátkých, tupými jehlanci zakončených sloupků s šesterečnými průřezy příčnými, které v augitech mnohých andesitových čedičů (na př. v čediči ze Strážovického vrchu, od Rostok, od Malého Března, od Nestřežic atd.) hojně se vyskytují

i) o zrnkách olivinu (v čediči od Košova, od Kukunely), jež se co vrostlice velmi zřídka objevují;

k) o zvláštních, ostrých, velmi jemných vláskovitých a jehlicovitých kostrách, jež co lichoběžníkové a obdélníkové obrysy krystalů, zvláště poblíže okraje čteně se objevují.

Reuss pozoroval několikrát uvnitř krystalů augitových i

l) malé sloupečky hnědočerné slídy <sup>1)</sup>.

Množství vrostlic bývá někdy tak veliké, že hmota augitová s těží jen pozorovati se dá. Zirkel zmiňuje se o průřezích augitu v čediči od Čes. Lípy, jichž hmota skládá se na okraji z magnetitu, uvnitř pak z hrubozrné směsi augitu, olivinu, magnetitu, živce a nefelinu. Podobné zjevy pozorovati lze v českých čedičích častěji; tak na př. v čediči od Bezdrůžic složeno jest vnitro, hustým věncem magnetitu a titanového železa obroubené, u jedněch tvarů z hrubé směsi živcových desek augitu a magnetitu, u druhých těmito podobných tvarů z pásků

<sup>1)</sup> Umgebung von Teplitz und Bilin, 1840, 174.



podle sebe rovnoběžně seřazených, černých neb černohnědých zrněk a sloupků, mezi nimiž dflý živce a augitu prosvítají.

Jak známo, pozoroval Haidinger, že desky augitu od Bořislavi okazují vláknitý sloh vniterní, a pomocí dichroskopické lupy poznal uzavřené částčky amfibolu; ukaz tento vyskytl se také v augitech jiných nalezišť — leč vždy jen osaměle.

O optických vlastnostech augitu z peperinu od Bořislavi zmiňuje se Čermák ve svém pojednání „Minerale der Amphibol- und Biotitgruppe“. <sup>1)</sup> Ve světle polarisovaném bývají průřezy augitu ponejvíce stejně a jen na jemných puklinách pestře zbarveny, řidčeji objevují se různé nástiný barev, jež odpovídají jednotlivým vrstvám vnitřního slohu. V průřezech augitu četných čedičů (od Milešova, Bořislavi, Tichlovic, Šénfeldu a j. v.) vyskytují se však rovnoběžné lamely vyznačující se v polarisovaném světle různými barvami, aniž by bylo lze pozorovati jakési rýhování složkové (Zirkel). A objev tento vysvětluje se obráceným položením četných lamel složkových. Tyto procházejí buď celým průřezem aneb jen části jsouce rovnoběžny s určitými, ale ne vždy stejnými hranami průřezu a nalezájí se v průřezích augitu ponejvíce čedičů andesitových (na př. v čediči od Verneřic). Toliko v čediči tachylytovém od Malého Března nalezl jsem průřezy augitu, vynikající pestrými lamelami ve světle polarisovaném a jemným rýhováním ve světle smíšeném.

Dle Reusse jest hutnost krystalů augitu z údolí Šichovského = 3·313, z Bořislavi = 3·293 a co smůla černého, lasturového augitu od Lbína = 2·522. <sup>2)</sup>

Chemický rozbor augitu od Šímy (h. = 3·361) dle Rammesberga udává v ‰ <sup>3)</sup>

| poměry kyslíku       |       |   |   |       |
|----------------------|-------|---|---|-------|
| Kyseliny křemičité   | 51·12 | . | . | 26·53 |
| kysličníku hlinitého | 3·38  | . | . | 1·58  |
| „ železitého         | 0·95  | . | . | 0·28  |
| „ železnatého        | 5·45  | . | . | 1·80  |
| „ manganatého        | 2·63  | . | . |       |
| „ vápenatého         | 23·54 | . | . | 6·68  |
| „ hořečnatého        | 12·82 | . | . | 5·13  |
| 99·82 *)             |       |   |   |       |

### Diopsid.

Nerost tento objevil Sandberger zároveň s olivinem, bronzitem a picotitem v (tak zvaných) koulích olivinových z Kozákova, o nichž se již Reuss zmiňuje. <sup>2)</sup>

\*) Žlutohnědá kůra, pokrývající mnohé krystaly augitu z Černošína a vnikající také do dutin jejich, obsahuje dle Rammelsberga v ‰:

|                      |      |
|----------------------|------|
| Kyseliny křemičité   | 35·5 |
| kysličníku hlinitého |      |
| „ železnatého        | 37·7 |
| „ vápenatého         | 6·5  |
| „ hořečnatého        | 4·1  |
| vody                 | 18·0 |

<sup>1)</sup> Mineralogische Mittheilungen 1871, 1. H., S. 29.

<sup>2)</sup> Umgebung von Teplitz u. Bilin 1840, 173.

<sup>3)</sup> Rammelsberg, Mineralchemie 1860, 488.

Nalezát se diopsid v zrnité směsi v podobě zrnek zvlášť 1—2 mm. a liší se již svou co tráva tmavozelenou barvou od ostatních částek směsi — od olivinu, zelenavě neb co víno žlutého, od šedo-bílého až hnědo-šedého enstatitu a od bronzitu temně šedého neb černě zeleného a poněkud slabě perleťově lesklého. Dle Farského <sup>1)</sup> má diopsid z Kozákova hutnost = 3·20—3·29 a dle rozboru 1. a 2. skládá se (v %):

|                       | 1.    | 2.    | Poměry kyslíku rozboru 2. |         |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------|---------|
| z kyseliny křemičité  | 53·44 | 52·92 | . . . 27·98               | } 29·86 |
| kyslíčnicku hlinitého | 3·74  | 3·54  | . . . 1·65                |         |
| „ chromitého          | 0·75  | 0·74  | . . . 0·23                |         |
| „ železnatého         | 4·70  | 4·75  | . . . 1·05                | } 14·00 |
| „ manganatého         | 0·31  | 0·30  | . . . 0·07                |         |
| „ vápenatého          | 19·90 | 19·99 | . . . 5·71                |         |
| „ hořečnatého         | 16·99 | 17·43 | . . . 6·97                |         |
|                       | 99·83 | 99·67 |                           |         |

Odpovídá tudíž  $Si\ H_2O_3$ , kde  $H$  zastoupen jest  $\frac{1}{6} Fe$  a  $\frac{1}{6} (Ca, Mg)$

Mimo naleziště Kozákovské nachází se diopsid v koulích a zrnech (naznačené směsi) v čediči četných jiných nalezišť, o nichž u výpisu olivinu zmínka se činí.

### Amfibol.

Krystaly čedičového amfibolu, buď vrostlé aneb porfýricky vystupující, jsou poněkud barvy temně černé, v tenounkých částicích hnědě prosvitavé, na povrchu silně lesklé, na hranách a rozích slité, četnými lasturovými prohlubinami opatřené a rovnoběžně s  $\infty P$  jemně a hustě rýhované. Přečíslené jest rýhování na plochách  $P$  podobajíc se husté síti, kdežto na plochách  $\infty P$  seznati lze rovnoběžné plochy lamel k  $\infty P$ .

Toto pravidelné rýhování, patrně na příčném i podélném (vyjma  $\infty P$ ) průřezu se jeví, jest tolikéž pro větší mikroskopické krystaly amfibolu význačné, jelikož průřezy augitu jeví jen méně pravidelné a pouze sporé rozštěpiny. Nalezají-li se mezi průřezy amfibolu takové, jež kolmo ke hlavní ose jsou ubroušeny, tož obnáší úhel křížujících se puklin (dle štípalnosti)  $124^\circ 30'$ , kdežto onen pravidelného průřezu augitu pouze  $87^\circ 6'$  měří. Porfýrické krystaly amfibolu v broušených lístkách červenohnědé neb nahnědlé žlutě prosvitavé, jeví více méně zřejmý, vláknitý sloh vniterní, skládající se na pohled z jemných, hustě k sobě se řadících stebílek nebo vláček a podobajíc se ploše rozštěpeného polena. Tento sloh vniterní jest pro krystaly amfibolu zvláště z peperinu (z okolí Šímy, Lukova, Milešova a odjinud) velmi význačný, pozoruje se však na průřezích amfibolu i z jiných nalezišť; podobný sloh, který však již v naskrce jemné a hustě rovnoběžné rýhování přechází, jeví se často na mikroskopických dlouhých tenkých průřezích amfibolu četných čediče odrůd a podobajíc se slohu průřezů amfibolových v minetě Michelské bývá provázen slabým hedvábným leskem. Dále vyznačují se mikroskopické, zelenavě neb do šeda zbarvené průřezy amfibolu svými obrysy, jež bývají méně rovné, slabě vlnité a začasť obroubené temným neb kalným okrajem.

<sup>1)</sup> Zprávy spolku chemiků českých. V Praze, 1872, str. 29.

Černé zbarvení okraje amfibolového, jež zvláště pozorovati lze na širších (ač ne na všech) průřezech amfibolu téhož broušeného lístku, pochází od magnetitu nebo zrněk titanového železa, aneb i od různých výtvořů práškovitých, jež v podobě hustého věnce okraj amfibolu skládají. Tento okraj bývá na venek ostřeji omezen, tak že obrysy dosti zřejmě vynikají; nezdá se však jak na venek tak i do vnitř, při čemž se začasť v takové míře rozšiřuje, že z čisté látky amfibolové zbývá pouze nepatrná, ponějvíce střední část. I takové průřezy amfibolu nebývají řídké, jež, proniknuty jsouce hustou směsí zrn magnetitových a krátkých sloupečků titanového železa, jen zde onde šedou svou hmotou prosvítají. Není zajisté pochybnosti, že i tehdaž, kdy průřez amfibolu temnými zrunky zcela naplněn býti se zdá, přec ještě možno jest objeviti malé částčky hmoty amfibolové. Takovéto pak průřezy amfibolu, jež jsou více méně vyplněny temnými zrunky, nalézají se v čedičích andesitových a fonolitových (jako na př. v čediči od Veršetína, Dubic, Blankensteinu a j.) co objev zcela obvyčejný.

Vrostlice bývají v amfibolu — až na ona zrnka temná a částice hmoty čedičové — velmi sporé. Pamětihodna jest poznámka Reussova o poměru olivinu k amfibolu v čediči z Klocberku u Kostomlat: „Někdy vídati lze olivin, tvořící tenký obal kolem krystalu amfibolu a u prostřed amfibolu malé zrnko olivinu vrostlé“. <sup>1)</sup>

Dle zkoumání Čermákových jeví dichroism každá deska amphibolová, aťsi již jest v jakémkoli směru proříznuta; dichroism vyniká pak zvláště na průřezech, jež rovině souměrnosti jsou téměř rovnoběžné. Nástinů barev jsou temně červenohnědé a žlutočervené. (Hlavní řezy optické odchyľují se nejvýše o 17°, často leží téměř rovnoběžně a kolmo k hranám štěpným.) Optické vlastnosti amfibolu z Vlčí Hory u Černošína skoumány byly Haidingerem, amfibolu Bořislavského Čermákem. <sup>2)</sup> Pamětihodné jest, že oba vlastnostmi svými velmi příbuzné nerosty, amfibol a augit i v téže hornině čedičové vedle sebe přicházejí (jako k. př. v peperinu z okolí Šímy, Kostomlat, Lukova, Vlčí Hory u Černošína, v čediči leucitovém od Bořislavi [Paskapole] a v. j.)

Amfibol od Biliny rozebrán jest lučebně od Struvého (I.) <sup>3)</sup> amfibol z Vlčí Hory u Černošína od Rammelsberga (II.). <sup>4)</sup> Rozbory tyto udávají v podílech %:

|                      | I.    | II.   |
|----------------------|-------|-------|
| Kyseliny titaničité  | —     | 0·80  |
| kyseliny křemičité   | 40·08 | 40·65 |
| kysličníku hlinitého | 17·59 | 14·31 |
| „ železitého         |       | 5·81  |
| „ železnatého        | 13·69 | 7·18  |
| „ hořečnatého        | 13·50 | 14·06 |
| „ vápenatého         | 11·01 | 12·55 |
| „ draselnatého       | 1·89  | 1·54  |

<sup>1)</sup> Umgebung von Teplitz u. Bilin, 1840, 178.

<sup>2)</sup> Mineralogische Mittheilungen. Wien, 1871. 1. H., S. 40.

<sup>3)</sup> Poggend., Ann. 1826, str. 341. — Rammelsberg, Handw. d. chem. Th. d. M., S. 311.

<sup>4)</sup> Rammelsbergs Mineralchemie, S. 494.

|                      |      |   |   |   |      |
|----------------------|------|---|---|---|------|
| kysličníku sodnatého | 0·96 | . | . | . | 1·64 |
| fluorovodíku         | 1·10 | . | . | . | —    |
| vody                 | 0·18 | . | . | . | 0·26 |

### Dialog.

V čediči od Košova, v průřezu asi 3 mm. dlouhého, řádkami a proužky, jakož i bublinkami velmi bohatého krystalu augitu nalezla se asi 2 mm. dlouhá a 1 mm. široká deska barvy bělošedé, lesku slabě hedvábného, která, jsouc omezena hustým věncem zrn podobných výtvarům struskovitým, protkána jest hustým rovnoběžným rýhováním a tímž podobá se nejvíce desce dialogové. Tato deska jeví se ve světle polarisovaném v barvě mdlé, modro-bílé, zabíhající do šeda, točí-li se však harapatitem, stává se nahnědlou a žlutavě šedou. Za silného zvětšení objevují se rovnoběžné rýhy, poněkud celou deskou dialogu probíhající, co průsečné hrany tenkých lamel; kratší rýhy, jež pak mezi oněmi vystupují, podobají se protáhlým dutinám a podlouhlým porům plynovým, které se vyskytují v augitu, dialog omezujícím, ve velikém množství, jen místy však v patrně naznačené rovnoběžnosti směrů. Struskovitá zrnka, která obrubují desku dialogovou, nejsou tělisky beztvárnými, sklovitými, jak se na pohled zdá, poněvadž účinkují na polarisované světlo, v kterémž nabývají barvy kalné, šedobílé a mléčné; delším pozorováním a za silnějšího zvětšení vyjasňuje se však povaha jejich jeví se co směs zaokrouhlených částic dialogu, augitu a shluků bublinek a porů plynových. Podobného druhu desky (bez obruby struskovité) objevily se též v čediči z okolí Doupovského (Doupov — Dürrmaul) a od Žichova <sup>1)</sup>.

### Bronzit

byl již dříve znám co součástka koulí olivinových některých českých čedičů. Reuss zmiňuje se o něm z údolí Telnického, z Kuzovské hory, z Leimhüglu u Košova a z pahrbku, severně ležícího od Krondorfu <sup>2)</sup>. Sandberger <sup>3)</sup> uvádí jej s diopsidem a picotitem co příměsek koulí olivinových z Kozákova. Mimo to nalezl jsem jej aneb jeho (železem chudší) odrůdu, enstatit, téměř ve veškerých zrnitých koulích, menších shlucích a drobných částkách olivinu, o nichž se v pojednání „o olivinu“ zmíním. V mnohých čedičích vyskytují se také listnaté zrnité kusy sestávající téměř naskrze z bronzitu a enstatitu. Tak uzavírá čedič Kartouzský u Jičína přes 1“ dlouhé, šedavě-zelené, zrnité částky, které se skládají — jak pod mikroskopem pozorovati lze — pouze z více méně změněného, tmavě (špinavě) zeleného bronzitu a šedobíle zbarveného enstatitu. Úlomky enstatitu, jemně rýhované a dokonale štěpné, jsou téměř zachovalé (tvr. 5), kdežto listnaté částice bronzitu

<sup>1)</sup> Reuss činí též zmínku o nerostu, podobném dialogu a vyznačujícím se slohem augitu z čediče Telnického. *Umgebung von Teplitz und Bilin 1840*, 174.

<sup>2)</sup> *Umgebung v. Bilin u. Teplitz*, S. 176.

<sup>3)</sup> *N. J. f. M.* 1866, 385

bývají místy měkčí kamenné soli, a tím právě blíží se přeměněné odrůdě bronzitu, Breithanptem „phaestin“ nazvané.

Bronzit nalézá se v malých listnatých neb listnatě zrnitých neb listnatě vláknitých kouscích, na hranách prosvitavých, šedivě až načernale zelené barvy; má skelný, mastný nebo perleťový lesk, jenž v nejtmavších odrůdách kovovému a v jemněji vláknitých hedvábnému se podobá. Farským <sup>1)</sup> vykonaný rozbor čistého bronzitu Kozákovského udává v %:

| Poměry kyslíku:       |        |       |       |
|-----------------------|--------|-------|-------|
| Kyseliny křemičité    | 53.29  | . . . | 28.23 |
| kyslíčnicku hlinitého | 2.77   | . . . | 1.29  |
| „ železnatého         | 15.43  | . . . | 3.45  |
| „ vápenatého          | 1.19   | . . . | 0.24  |
| „ hořečnatého         | 27.01  | . . . | 10.80 |
| vody                  | 0.35   |       |       |
|                       | 100.04 |       |       |

Častěji vyskytá se v koulích a shlucích zrněk olivinových odrůda bronzitu železem chudší co

### Enstatit.

Zrnka nerostu tohoto jsou asi 1—6 mm. velká, sploštělá, barvy nahnědlé aneb slabě zelenavě tmavošedé, jeví slabší prosvitavost, skelný, poněkud mastný lesk a vynikají tvrdostí větší apatitu, čímž se hlavně liší od olivínu. Různá zrna enstatitu a olivínu dají se již na pohled dobře rozeznati v koulích olivínu, které již v rozkladu svém valně byly pokročily; z drobné jich směsi snadno lze těžce rozložitelná zrna enstatitu oddělit.

Dle Farského <sup>2)</sup> má enstatit Kozákovský hutnost 3.08—3.14 a obsahuje v %:

| Poměry kyslíku:       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
|                       | 1.    | 2.    |       |
| Kyseliny křemičité    | 56.23 | 55.84 | 29.56 |
| kyslíčnicku hlinitého | 2.62  | 2.71  | 1.26  |
| „ chromitého          | 0.34  | 0.40  | 0.13  |
| „ železnatého         | 6.67  | 6.55  | 1.45  |
| „ manganatého         | 0.23  | 0.25  | 0.06  |
| „ vápenatého          | 0.96  | 1.07  | 0.21  |
| „ hořečnatého         | 32.37 | 32.58 | 13.03 |
| vody                  | 0.95  | 0.93  |       |

Z rozborů těchto jest zřejmo, že hmota, již se tu užilo, poněkud byla již proměněna, jelikož poměr kyslíku při 1. rozboru 1 : 2.09, při 2. rozboru 1 : 2.07 vykazuje.

<sup>1)</sup> Zprávy spolku chemikův českých 1872. 1. s., str. 27.

<sup>2)</sup> Zprávy spolku chemikův českých, 1872, 1. s., str. 28.

### Hypersthen

nalézá se v čedičích, v nichž přicházejí zrnité olivinem bohaté výměšky, na místě svrchu uvedených nerostů, bronzitu a enstatitu. Tak nalezl jsem mezi četnými úlomky koulí olivinových z čediče údolí Telnického kus poněkud hruběji zrnitý a velmi pevný, jenž se jevil co směs převládajících černošedých, a nazelenale černých zrněk se světle žlutozeleným olivinem. Dle určení, panem Novákem vykonaného, měl kus 25·5 grammů těžký — v němž olivin sotva třetinu obsahoval — hutnost 3·262. Zrnka černavě šedá a zelenavě černá vynikají velmi dokonalou štípatelností dle jednoho směru ( $\infty \bar{P}\infty$ ) a méně dokonalou dle druhého směru ( $\infty P$ ); na plochách dokonale štěpných mají lesk kovový, obyčejně ale sklovitý, mastnému podobný. *Stupeň tvrdosti jest též jako živce.* A právě tato tvrdost byla mně pokynutím, že nerost tento není bronzit, za který jsem jej zprvu měl. — Celým kusem pronikají jemné pukliny naplněné nerostem barvy zelenavě bílé, který v kyselinách nešumí, jimi však značně se porušuje a videm svým hadci se podobá; mimo to rozeznati lze jemné buď bílé neb bezbarvé lístky ku plochám hyperstenu těsně přiléhající, jež v kyselinách za silného šumotu — ač ne úplně — se rozpouštějí a nedávajíce s roztokem kobaltovým žádné reakce na kysličník hořečnatý, zajisté jen vápenci náležejí. I serpentin i vápenec svědčí co druhotné nerosty o započatém rozkladu. Zajímavé bylo skoumání jemných lístků vápencových drobnohledem. Ač byly čistě bílé barvy, jevily přec ještě šedé husté žilkovité rozvětvení, které, když se hmota vápencová za silného šumění byla rozpustila, představovalo síťovitou a zajisté jen mechanicky uzavřenou kostru, jež, skládajíc se ze zbytku hmoty rozkladem proměněné, krystalické směry vápence podrželo. — Téže povahy, co právě vypsany hypersthen zdají se býti i makroskopická, černavě zelená zrnka krystalová, jež vyskytují se ve mnohých čedičích zastupující tuto makroskopický augit. Taká zrnka nalézají se jmenovitě v čediči magmatovém, v olivinu bohatém, z Zinkensteinu, od Svinčic, z Kralicí Hory u Mirešovic a z j. m.

### Biotit.

Muskovit (slída draselnatá č. světlá) schází co součást mladšímu eruptivnímu horstvu, vyjma velmi sporé nálezy; ale biotit (slída hořečnatá č. tmavá) vyskytuje se dosti častě a hojně, zejména v některých horninách čedičových, vyvinuvši se v krystalech makro- i mikroskopických.

Biotit makroskopický objevuje se v krátkých sloupečkách neb v deskách rázu šesterečného, u velikém množství v čedičích leucitových a některých nefelinových a andesitových. Hojnost biotitu poskytují zvláště ony horniny čedičové, jež Naumann a Zirkel peperinem nazvali, jmenovitě peperin popelavý od Doubic a nahnědlé peperiny od Šmý, Milešova, Kostomlat a Loukova. V čedičích nefelinových, jež nazkrze jsou velmi jemnozrné aneb krystalicky celistvé, bývají jen sporé makroskopické destičky biotitu obsaženy, častěji vyskytují se v čediči andesitovém; v čediči živcovém přichází biotit velmi zřídka a po skrovnu.

Broušené lístky sloupků biotitových z okolí Milešovky jeví mimo osamělé

krystalky apatitu (přes 1. mm. tlusté) jen sporé, bezbarvé vrostlice s nepravidelnými obrysy (bezpochyby hmoty infiltrační), zároveň pak rozmanité tmavší a světlejší výtvořky, jež se podobají chumáčům vlasů a poněkud malé svazečky tvoří; tyto vyčníhají někdy z okraje bezbarvých vrostlic a rozmanitě se kroutíce, dosahují značné rozsáhlosti.

Výtvořky tyto upomínají místy na nálety vadu (hydrátu manganitého) a jako tyto povstaly zajisté infiltrací cizích hmot. Vedle těchto objevují se v některých broušených deskách dlouhé jehlicovité dutiny se zoubkovanými obrysy, křížující se v rozmanitých směrech. Tyto mohly by se považovati za výtvořky krystalických koster.

Četněji zastoupen bývá mikroskopický biotit, který má podobu nahnědlých, poněkud co kaštan hnědých lístků rázu šesterečného, jež bývají přechytnými vrostlicemi nepravidelně rozdělené, rozvětvené a rovnoběžnou polohou lístků na průsečných plochách rýhované.

Velmi hojný jest biotit v čediči leucitovém od Záhoře; nahnědlé destičky jeho, jemně a četně rýhované, vynikají takovým množstvím vrostlic, zejména krystalů leucitových, že na pohled rozpadávají se jen na malé a zdánlivě zcela nepravidelné úlomky destiček. Vrostlice v biotitu jsou pozorovány tyto:

- a) Leucit, obyčejně velmi hojný, s pravidelnými věnečky práškovými a dlouhými bezbarvými mikrolithy, zvláště na okraji.
- b) Nefelin, vyskytující se v krátkých bezbarvých obdélnících.
- c) Magnetit v zrnech četných.
- d) Augit, poněkud v podobě mikrolithů.
- e) Malé partie hmoty čedičové, sestávající z leucitu, nefelinu, magnetitu a augitu.
- f) Částičky skla.
- g) Bublínky a pory plynové.

Pozorují-li se lamely biotitové dichroskopem, jeví se při každém jeho postavení dva stejnobarevné obrazy; destičky však kolmo na rovinu štěpnou říznuté, ukazují, jakmile tu některý hlavní řez vápence rovnoběžně se štěpnou rovinou běží, jeden obraz žlutý, nažloutle zelený aneb hnědožlutý, druhý pak temnohnědý až černě zbarvený (Černák).

## Rubelan

má se za přeměněný biotit a nalézá se hojně v nahnědlém peperinu z okolí Šímy Milešova, Kostomlat a Loukova. Desky červenohnědě zbarvené, i přes 1" veliké, a krátké sloupečky jeho jsou buď jako biotit velmi dokonale štípatelné (tenké lístky téměř prosvitavé), buď více méně v nahnědlou hmotu steatitovou přeměněné. V sloupcích rubelánových bývá mezi jednotlivé lístky bílá prosvitavá hmota vtěsnána, která vniknuvši mezi lístky nejvíce přispěla ku proměně jejich; dle svého chování se ke kyselině solné jest hmota tato zeolitického rázu.

V broušených lístcích rubelanu Loukovského pozoroval jsem šedobílé až 2 mm. tlusté, krátké, šesterečné sloupky a ostře omezené šesterečné průřezy. Poněvadž

reakce na kyselinu fosforečnou záporný měla výsledek, považují tyto vrostlice za nefelin.

Známo jest, že poslední přeměnou rubelanu resp. biotitu jest pevná hmota steatitová cihlově zbarvená.

Destičky a sloupky rubelanu stávají se neprůhlednými a zemitými a lístky souvisí tak úzce spolu, že již ani stopy po štípatelnosti nezbyvá. Takovéto metasomatické pseudomorfósy steatitu po rubelanu nalézají se zvláště v blízkém okolí Milešova (na př. na jz. úpatí Milešovky) a bývají s přeměněnou hnědou horninou peperinovou tak úzce spojeny, že se spíše rozdrobí, než-li by se v destičky aneb v sloupky odděliti daly. Mimo tyto pseudomorfósy bývají tu však také ještě poněkud neporušené prosvitavé lístky a štěpné destičky rubelanu.

### Živec.

Známo jest, že vylučuje se živec v horstvu čedičovém pořádku a jen v podobě sporých, bezbarvých, porfyricky vystupujících jehliček. Větší krystaly živcové (3"—1" dl.) objevily se ve velmi jemnozrných, načernalé šedých čedičích z více nalezišť, ale vždy osamotnělé. Tak našel jsem v čediči od sv. Ivana — jehož úlomek jsem od p. J. Barranda obdržel — asi 2 mm. dlouhý, rýhovaný krystal oligoklasu, vedle něhož malé jehličky u velikém množství pod lupou se objevily. V jiném kuse téhož naleziště vyskytly se 3—6" velké úlomky živcové, jež, ponejvíce nažloutle neb šedobíle zbarveny jsouce, na štěpných plochách jemným a hustým rýhováním se vyznačovaly, majíce zároveň zvláštní ráz, upomínající na sanidiny fonolitů. Podobného rázu našla se zrnka živcová v čediči od Kartouzu u Jičína, od Duckbergu, od Vrabince a Rychnova. Neméně hojně jsou též velmi jemné jehličky živcové na úlomcích velice jemnozrné horniny čedičové z Tolzberku, od Pešvic, od Kračína, ale tyto bývají s horninou tak pevně srostlé, že vyhledávání i sebe menších díleček k bližšímu určování velmi obtížné jest.

Živec z černavých neb temně šedých čedičů jest naskrze rázu trojklonného, jež dle četného rýhování podélných průřezů (vyjímaje případ, kdy řez rovnoběžně probíhá se složkovou plochou  $M$ ) a dle různobarevných, střídavě světlých a tmavých pruhů ve světle polarisovaném snadno poznati lze; neboť tyčinky živce polarisují pouze na tenounkých místech mdle modře, temnošedě, aneb v barvách se doplňujících. Jen zřídka objevují se bezbarevné tyčinky, které ve světle polarisovaném zvláštní onen výjev okazují, o němž se již Zirkel zmínil, že temné pruhy a čáry neprocházejí celým podélným průřezem, nýbrž na jednom jeho místě náhle přestávají, krystal pak jednobarevně dále pokračuje<sup>1)</sup>. V širších průřezích četných živcových čedičů pozorují se pravidelná miskovitá pásma podobně jak na průřezích augitu (Tolzberg).

Mnohé odrůdy čediče obsahují též takové tyčinky živcové, jež skládají se po dvou na způsob karlovarských složek orthoklasu, ve světle polarisovaném se dělí na různobarevné, od sebe často rýhou zjevně oddělené, podélné polovice, jež někdy opět čteně a jemně jsou rýhovány.

<sup>1)</sup> Na př. v čediči Chlumeckém u Děčína.



V jiných čedičích převládají ze 3—7 jednotek složené podélné průřezy živcové, jichž individualní dílce, často nestejně dlouhé a na koncích někdy roztržené, tenkými proužky skla aneb hmoty čedičové rozděleny bývají; tyto dávají v polarisovaném světle velmi krásné obrazy v pestrých barvách. Vzájemné uložení podélných průřezů živcových bývá rovnoběžné, řidčeji paprskovité neb štetcovité (Košov). Takovýmto souměrným uložením tenších tyčinek a mikrolithů živcových povstává často zvláštní sloh mikrofluktuální, svědčící o posledních pohybech proudící hmoty čedičové v době tuhnutí. Složení takové v nejpěknějším vyvinutí ukazují ku př. tyčinky živcové v čediči z Vinohradu u Vartemberku a ze severní strany Friedlandského vrchu.

Zbývat ještě zmíniti se o vrostlicích v živci, jež jsou tyto:

a) Mikrolity — většinou dlouhé bezbarvé mikrolity živcové aneb kratší nazloutlé nebo zelenavé mikrolithy augitové; tyto bývají rovnoběžně uloženy k podélným hranám, vyskytují se však řidčeji.

b) Částice sklovité a struskovité. Vrostlice tyto přicházejí v živcových průřezech četných čedičů dosti hojně, v jiných však docela scházejí. Hojností vrostlic sklovitých a struskovitých vynikají takové odrůdy čediče, v nichž hnědošedá nebo šedobílá, sklovitá základní hmota zřejmě jest vyvinutá, a v případě takovém jest pak táž základní hmota v podobě proužkovitých neb nepravidelných dílečků v krystalech živce uzavřena aneb v podobě tenkých proužků mezi rovnoběžnými jednotkami živcovými vtěsnána. Vrostlé tenké proužky skla bývají někdy bohaty mikrolity i práškovitými a vláskovitými výtvy, struskovitá zrnka bývají opět hustě vedle sebe seřaděna, zvláště v průřezech širších, a to sice buď v jednu okrouhlou skupinu (sv. Ivan) aneb v jedno i více souběžných pásem poblíže okrajních hran. Takové seřazení struskových zrněk nacházíme velmi častě v pravouhelných průřezích čediče Tolzberského, kde se nalézá i široké pásmo zrněk struskovitých, jež, běžíc rovnoběžně k okrajním hranám, k jednomu konci do vnitř schůdkovitě se rozšiřuje.

c) Velmi jemné výtvy vláskovité (trichity) barvy černé, zvící krátkých jehliček (snad železo titan.), jež, jen různě aneb v proužky spojeny, někdy mezi jednotlivými tyčinkami živcovými velmi častě vystupují (sv. Ivan).

d) Zrnka magnetitu, dosti spíše se jeví, jsou buď ojedinělá aneb tvoří řádky mezi jednotlivými tyčinkami (díllem co zřejmá zrnka dílem jen co magnetitový prášek).

e) Pory plynové, příliš malinké, teprve při 400. zvětšení co špendlíkové hlavy, nejsou též v průřezích mnohých čedičů řídké (Tolzberk).

f) Vrostlice bublinek s pohyblivými libelami udává Zirkel jen z několika málo nalezišť.

### Oligoklas.

Na základě mnohých zkoušek, provedených leptáním na trojklonném živci, vynáší Zirkel, že v čediči jest živec mnohem bohatší kyselinou křemičitou než labrador — kyselinami rozložitelný — který dosud za součást čediče byl pokládán. Tato domněnka potvrzuje se četnými zkouškami badatelů jiných o živci více čedičů. Mezi živcovými částicemi mnohých čedičů objevil se pouze v čediči

Kartouzském od Jičína asi 1" dlouhý, nažloutle bílý, na povrchu kalný, uvnitř slabě prosvitavý úlomek trojklonného hustě rýhovaného živce, z něhož se část pro chem. rozbor vybrati dala. Prášek v kyselinách slabě šuměl. Zkouška 0.5575 gr. dala v %:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| kyseliny křemičité   | = 64.215             |
| kysličníku hlinitého | = 22.062             |
| „ vápenatého         | = 1.054              |
| „ hořečnatého        | = 0.745              |
| ztráty při pálení    | = 1.309; zbývá tudíž |
| na žíraviny          | = 10.615             |
| 100.                 |                      |

O výsledku rozboru trojklonného živce co oligoklasu není zcela žádné pochybnosti.

Jest-li že odečteme ztrátu při žáru a přijmeme-li za žíravinu kysličník sodnatý, uvedeme-li pak jednotlivé součástky na 100, okáže se nám následující poměr kyslíku:

| Výpočet v % po odečtení<br>ztráty při žáru |        | poměry kyslíku |                      | počet atomů |  |
|--------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|-------------|--|
| $SiO_2$                                    | 65.066 | 34.701         | <sup>2)</sup> 17.350 | 5.131       |  |
| $Al_2O_3$                                  | 22.356 | 10.437         | <sup>3)</sup> 3.479  | 1.028       |  |
| $CaO$                                      | 1.068  | 0.305          | 3.381                | 1           |  |
| $MgO$                                      | 0.754  | 0.301          |                      |             |  |
| $NaO$                                      | 18.756 | 2.775          |                      |             |  |

Přebytek  $\frac{1}{2}$  atomu kyseliny křemičité lze si vysvětliti při slabém šumění a značnější ztrátě v žáru co následek rozkladu oligoklasu (částečným vyloučením žíraviny a zemin žíravých vlivem kyseliny uhličité), při čemž, jak známo, množství kyseliny křemičité poměrně vzrůstá.

Též výklad chemického rozboru živcového čediče od sv. Ivana připouští pouze přítomnost oligoklasu.

Poněvadž by částčky živců jiných čedičů k chemickému rozboru byly nepostačily, porovnávaly se živce z nalezišť čedičových od sv. Ivana, Duckbergelu, Vrabince a od Střížovic rozkladem svým v čisté kyselině solné s oligoklasem Kartouzským, načež se rozpuštěná část kvalitativně, zbytek pak mikroskopicky zkoumaly. Jemně rozetřený prášek poněvíc našedivělých částic živcových, asi 0.15 gr. těžkých, ponechal se šest dní v kyselině solné a zahříval se denně jednou i dvakrát až do varu.

Výsledek byl tento: Roztok nabyl barvy zelenavě žluté (od přimíšeného mikroskopického magnetitu neb kysličníku železitého) a veškeré průby udaly podíl v kyselinách rozpustný: čpavkem vznikla sraženina četných, světle žlutohnědých, pouze ze živce Střížovického čediče žlutobílých chomáčů, pak šťováním amoniatým mléčné zakalení; mnohem slabší zakalení povstalo ve filtrátu fosforečnanem sodnatým.

Sraženina kysličníku vápenatého jevila se nejsilněji ze živce hory Střížovické a od sv. Ivana, nejslaběji pak ze živce od Duckbergelu a Vrabince, kdež zároveň slabší byla i reakce na kysličník hořečnatý, a sice v té míře, že teprve

po delší době zcela nepatrného zakalení se docílilo. Mikroskopické zkoumání ve světle obyčejném ukázalo, že působením kyselin téměř každá částička byla porušena, ve světle polarisovaném nepozoroval se žádný zvláštní úkaz světla, nýbrž pouze šedobílé a kalné zbarvení.

Zkouškami těmito jde zřejmě na jevo, že živec trojklonný od sv. Ivana, Duckelbergu a Vrabince tolikéž náleží oligoklasu, který kyselinami jen skrovně se porušuje, živec pak z hory Střížovické že patří onomu živci, který, jsa bohatší kysličníkem vápenatým a hořečnatým (andesin), tak jako oligoklas skoro stejně nesnadno se ruší. Interpretace chemického rozboru čediče sv. Ivanského nepřipouští také jiný druh živce nežli oligoklas. Jelikož tedy tyto čedičové odrůdy, jichž živce prozkoumány byly, různé čediče živcové typicky vyznačují, tož zajisté není pochyby, že největší díl trojklonných živců čedičových náleží oligoklasu aneb andesinu, jenž má více kysličníku vápenatého a hořečnatého, málo se liší množstvím kyseliny křemičité a snáze se porušuje.

### Andesin.

Kvantitativním určením několika chemických součástí objevil se ve výsledcích trojklonný živec, který s andesinem úplně souhlasil. Tento živec jest týž, jenž nachází se v jemnozrné a světlé hornině Střížovické, jež byla popisována co dolerit živcový. Známo však, že Sandberger našel podstatné rozdíly od jiných typických doleritů.<sup>1)</sup> Poněvadž však hornina tato, jak z chemického a mikroskopického rozboru zřejmo, andesitu nejvíce se blíží, stavím ji v čelo veškerých čedičů andesitových. Skládá se po většině ze živce klinoklastického, který tuto v podobě širokých bezbarvých (šedobílých) jehlic velmi četně vyloučen bývá. Rozbor kvantitativní stává se tím příliš obtížný, že velmi nesnadno jest vyměsiti čistou průbu a to proto, že i ty nejmenší částky s drobty magnetitovými a augitovými pevně souvisí, aneb tyto onu bezbarvou hmotu živcovou pronikají. Za tou příčinou zkusil jsem pouze velmi nepatrným množstvím 0.196 gr., jež se čisté vyloučiti dalo, několik určení provésti. Určení kyseliny křemičité se nezdařilo; poměr však kysličníku hlinitého, vápenatého a hořečnatého byl v setinách:

$$\begin{array}{rcl} \text{kysličníku hlinitého} & \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{kysličníku hlinitého} \\ \text{kysličníku železitého} \end{array}} \right\} & = 21.1 \\ \text{s velmi malým množstvím kysličníku železitého} & & \\ \text{kysličníku vápenatého} & = & 5.8 \\ \text{„ hořečnatého} & = & 2.3 \\ \text{(Žíraviny neurčeny.)} & & \end{array}$$

Postačí tudíž tato udání, abychom tento klinoklastický živec andesinem nazvali.

### Anorthit.

Ve mnohých krystalicky celistvých čedičích (z Kolozruk, od Pohradic z Panzerova pahrbku, z hory Košovy a j.) objevují se četné bezbarvé, jednoduché ty-

<sup>1)</sup> Ueber Dolerite und einige Basaltgesteine. N. J. f. M. 1870, 205.

činky, z nichž mnohé ve světle polarisovaném světle modře zbarveny, dva neb více temnošedých rovnoběžných pruhů okazují, jiné však stejnou, mdle modrou barvou se vyznačují. V broušených destičkách tohoto čediče vyskytují se též četné pravidelné šesterce, a chemický rozbor čediče Kolozrukského vykazuje při malém množství kyseliny křemičité značné podíly žíraviny; jest tudíž zjevno, že ony bezbarvé, v polarisovaném světle stejnorodě zbarvené tyčinky nefelinem nazvati můžeme. Poněvadž se však krystaly nefelinu v čedičích nefelinových nikdy ve více rovnoběžně srostlých jednotlivcích nenacházejí, a i ty, jež se rovnoběžnými rýhami a jemnými práškovitými zrnky vyznačují, ve světle polarisovaném vždy stejnorodě zbarveny bývají, tož sluší ony bezbarevné průřezy, které v polarisovaném světle temnými proužky vynikají, připočísti jen živci trojklonnému. Interpretace pak chemického rozboru čediče Kolozrukského svědčí pro anorthit. Tyčinky anorthitové jsou ponejvíce jednoduché, málokdy po více tenounkých, rovnoběžných jednotlivcích srostlé a tu obyčejně jemnými pásy skla, nebo proužky magmatu čedičového oddělené, často též více méně skalené vřetenovitými vrostlicemi sklovitého magmatu.

Veškeré odrůdy čediče téhož rázu, jež bezpochyby též anorthity obsahují, mají mocnější vyvinuté sklovité magma, které, jsouc povahy zásadité, dle výkladu chemického rozboru čediče Kolozrukského směsi anorthitu a nefelinu nejvíce se blíží, při čemž nefelin převládá.

### Orthoklas.

(Sanidin.)

Nemalé pochybnosti vznikly o tom, zdali sanidin v horninách čedičových přichází, a pochybnosti tyto dají se ospravedlniti tím, že horniny čedičové obsahují ponejvíce skrovné množství kyseliny křemičité. Jak z výsledků chem. rozborů patrně, nemůže ovšem sanidin ani poněkud značnější podíl míti ve složení čedičového horstva; proto však není tím na jevo vynešeno, že by jednoklonný živec ani v malém množství vyskytovat se nemohl. J. Jahn rozbíral malé shluky živcové z čediče Kunětické hory, při čemž podala proba (byvši dříve očištěna těsně přiléhajících šupinek magnetitu a uhličitanu vápenatého v studené kyselině solné) v % toto :

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| kyseliny křemičité            | 61.797 |
| kysličníku hlinitého          | 23.608 |
| „ vápenatého                  | 1.528  |
| „ hořečnatého                 | 1.048  |
| „ draselnatého                | 11.212 |
| se skrovnými podíly sodnatého |        |

Avšak celkový rozbor čediče z Kunětické hory, jenž vykazuje pouze 42% kyseliny křemičité, prozrazuje zjevně, že tu malé pouze množství sanidinu přítomno býti může. V mikroskopických destičkách čediče z tohoto naleziště sanidin se posud nepozoroval.

Dle mého pozorování vyskytuje se sanidin v podobě bezbarvých širokých

a rozpukaných desek spoře a jen v oněch čedičích, jež činí přechod k horninám fonolitovým a andesitovým, a jichž hutnost (čerstvé horniny) obnáší asi 2·8.

Právě tímto objevováním se desek sanidinových jeví se přechod k horninám fonolitovým dosti význačně podobně jakož se zároveň v čedičových odrůdách oligoklasem bohatých k horninám melafýrovým sledovati dá.

### Nefelin.

Nerost tento nacházíme ponejvíce zároveň s amfibolem v čedičích nefelinových a v nefelinitech; tvoří součást zastupující živec a vyskytuje se buď sám neb s leucitem, hauynem někdy i s anorthitem; v značnějším množství jest též složivem čediče andesitového (a fonolitového) ve společnosti s oligoklasem neb andesinem. Čediče leucitové a hauynové nepostrádají ho nikdy, avšak v čedičích živcových může úplně chyběti.

Bývá po většině bezbarvý (aneb jen slabě nažloutlý, nahnědlý neb našedivělý, málokdy zelenavě zbarvený); podélné průřezy jeho jsou obdélníky, které ve světle polarisovaném stejnorodou namodralou neb nažloutlou barvu mají; průřezy příčné jeví se v podobě více méně pravidelných šesterců, jež mezi křížujícími se harpatity zcela temnými zůstávají.

Dle způsobu vývinu rozeznáváme čtvero druhův průřezů podélných:

a) Krátké, téměř čtvercům podobné obdélníky, bezbarvé, často i nažloutlé neb do šediva zbarvené, tolikéž s krátkými mikrolithy augitovými, jež rovnoběžně (pravouhelně) k hranám jsou uloženy. Ostře přímočárně nebývají vždy obdélníky tyto omezeny, ano někdy i sotva zřejmými se stávají, za to však uložení mikrolithů bývá význačné. Krátké tyto mikrolithy jsou obyčejně oválné a jsou buď poblíže hran buď dále ke středu nahromaděny, tvoříce v šesterečném průřezu soustřední shluk aneb více méně pravidelný věnec. Průřezy nefelinové tohoto druhu nalézány v čedičích od Bělošic, Skržínu, ze Skalky a Kalamajky u Bukovic, od Kamajka, z Kamenné uličky od Červeného Újezda, od Lipenavy u Teplic a z jiných míst.

b) Široké bezbarvé (aneb slabě našedivělé neb zelenobíle zbarvené) obdélníky, jež, jsouce asi dvakrát tak dlouhé, přímočárně omezeny a našedivělými žlutavými neb zelenavě zbarvenými mikrolithy opatřeny bývají, které opět pravouhelně uloženy jsou.

Mikrolithy tyto jsou nejhustěji nahromaděny podél středu hran průsečných (jako ku př. v čediči z Čertovy zdi), aneb vyplňují celý průřez v podobě čtvercové sítě tak, že průřez četnými těmito vrostlicemi zcela kalným aneb namodrale šedým se objevuje (v čediči z Krkavčí hory u Sebusína). Podobné obdélníky nefelinové objevují se v čedičích andesitových a fonolitových, obsahují však obyčejně jehlicovité aneb ostnitě a méně četné mikrolithy.

c) Bezbarvé sloupečky, jichž délka 5 až 15 krátě šířku přesahuje. Tyto, tvoříce podélné tyčinky četnými tupými jehlanci zaokrouhlené a spodovou plochou zakončené, bývají někdy i několika příčnými puklinami prostoupeny; od stejných

průřezů apatitu, jehož množství v horninách čedičových 5% nepřestupuje, liší se hlavně tím, že se u větším množství objevují.

d) Sloupečky téže podoby co poslední, rozdílné však v tom, že mívají husté, jemné, rovnoběžné řádky a proužky, jež, skládající se ze směstnaného prášku (částiček skla, porů plynových a zrněk magnetitových) obyčejně temnošedé až temnohnědě zbarveny jsou. Někdy objevují se řádky přejemných zrníček, jež podobají se jemnému rýhování: avšak v polarisovaném světle zůstává barva stejná, šedomodrá, a obrysy oněch poněkud temnějších řádek (rýh) nejsou ostře omezeny, jako tmavé rýhy v živci, nýbrž znenáhla se rozplývají. Výtvořky tyto bývají tak podobné apatitu, že jen s těžší možností je od tohoto rozeznati a mívají podobně jako apatit velmi úzký, zcela bezbarvý okraj, který široké, ostře omezené a nahnědle zbarvené jádro sloupkové v podobě tenounké misky (vrstvy) objímá.<sup>1)</sup>

e) Značně dlouhé bezbarvé tyčinky, opatřené velmi četnými a krátkými mikrolithy, jež ponejvíce k hranám rovnoběžně uloženy jsou.

Vrostlice nefelinové jsou tyto:

1. mikrolithy augitové a amfibolové (nejčastěji)
2. proužky hmoty čedičové (zřídka)
3. pory plynové a
4. pory, tekutinou naplněné, s pohyblivými bublinkami (Zirkel).

Hauyn, nosean a olivin zvětřávají mnohem dříve než nefelin; také nachází se tento v horninách čedičových velmi zřídka na takovém stupni přeměny, jako ve fonolitech, ač tyto u většině za mladší eruptivné horniny se pokládají. Tento rozdíl, k němuž Zirkel již (na str. 43. Basaltgesteine) poukázal, souvisí dle pozorování mých s tím, že nosean a hauyn mnohem častěji a u větším množství v horninách fonolitových se vyskytují. Tyto dva nerosty, podléhající velmi snadno změnám, ukazují v průřezích fonolitů první výtvořky zeolitové, rozkladem pak svým podávají zplodiny, jež i v nefelinech rychlejší změny působí; neboť kdekoli se v horninách čedičových nosean a nefelin značně přeměněné vyskytly, tu byl i nefelin dosti porušen i v barvě (kalný, žlutavý) i v slohu (jemně vláknitý).

Vzhledem ku proměnám nefelinu sluší podotknouti toto: Zirkel zmínil se o onom způsobu přeměny, která tím se prozrazuje, že v obdélných průřezích vystupují velmi jemná, napříč položená vlákénka (natrolith), podobná třepením jimiž průřez nažloutlé barvy nabývá (mimo světlou středem běžící rýhu). Tento stupeň přeměny, vícekrát pozorován (zvláště na dlouhých průřezích) bere bezpochyby původ svůj z jemných, ale četných, příčných rozpuklin, jež ukazují mnohé podélné průřezy nefelinu.

Vyskytuje se však ještě jiný postup v proměně, jenž záleží v tom, že z počátku jen jednotlivé podélné pukliny v nefelinových průřezích se vytvoří (k. př. v čediči z Čertovy zdi) a teprve později jemná, hustá, podélná vláknitost (na př. v čediči z hřbetu Paskopole) se objeví; tím se stává, že se někdy tyto podélné průřezy nefelinové, přijmou-li na se ráz kalný, mikroskopickému sodalitu

<sup>1)</sup> Dlouhé sloupce apatitu miskovitěho slohu pozoroval jsem též v afanitech vápencových (spod. silur. útvar *Da<sub>1</sub>*) z Krušné Hory. Šedobílé kalné sloupečky, co brk tlusté, objímá kůra nahnědlá, prosvitavá, jež snadno se odchlípuje.

z Vesuvu blíží. Ve světle polarisovaném jsou vláknité průřezy tyto barvy úplně stejnorodé, z čehož plyne, že vláknitost tato na první pohled se rozeznati může od rýhování složkového.

### Leucit.

Mikroskopické krystaly leucitové odkryl v Čechách, jak známo, první Naumann,<sup>1)</sup> objeviv je v čedičové hornině u Oberwiesenthalu na nejvyšším čenenu Hor Krušných.

Krystaly tyto, roztroušené po polích blíže vyznačeného místa, jsou ostře omezené co modely, jeví se však chemickou skladbou co pouhé pseudomorfozy, skládající se ze zrnitého, místy porovitého nerostu, který podobaje se oligoklasu, s limonitem bývá smíšen, ale úplně postrádá (jak Zirkel byl pozoroval) onoho pestrého zbarvení, jež pro polysynthetický, trojklonný živec za význačné se má. Mikroskopické leucity objevil Zirkel v čediči, fonolitu podobném, od Hauensteina u Šenwaldu na severovýchodě od Ostrova (čedič tento znám jest četnými krystaly mezolitovými a komptonitovými) v čediči od Sberku na Ohři poblíže Kadaně, v čedičové drobě od Georgenstadtu, o které známo též, že oplývá množstvím granátu (v průřezích šesterečných neb čtvercových, temnohnědě zbarvených a temnějším poněkud okrajem vyznačených), dále v čediči, u Dominy blíže Šebastianberku na sev. úpatí Krušných Hor, v čediči nalézajícím se jihových. od Šeibenberku (mezi Švarcenberkem a Annaberkem, kdež se zároveň melilith vyskytuje), z Geisinku u Altenberku v Krušných Horách, z Pohlberku u Annaberku, z Kozákova, Tichlovic, z Milešova a Kammerbülu (v olivinu Kozákovském zmiňuje se Zirkel též o pohyblivých bublinkách B. s. 560). Dle mých zkoumání vyskytl se pak leucit na velmi četných místech okrsku čedičového, o čemž blíže pojednám v odstavci o čedičích leucitových. — V čedičích leucitových čili leucitofytech jest leucit vždy provázen nefelinem, jehož průřezy co krátké a úzké obdélníky obírají průřezy leucitové. Tyto jsou ponejvíce šesti- neb osmihranné a zřídka (pouze u větších druhů) ostře omezené; ve světle polarisovaném jsou úplně temné; jen tehdaž ovšem nastává výminka, kdy proménou hmoty leucitové povstanou sploďiny dvojlomné, podržující tvar leucitový.

Obyčejně má leucit hojnost rozmanitých vrostlic (dílem mikrolithy, dílem zrnka magnetitu, pak vejčitá a zakulacená těliska temnohnědě zbarvená a prosvitavá, zrněčka struskovitá, částčky skla s bublinkami plynovými a kapalnými, jež ponejvíce v podobě kruhů neb věnečků, zřídka v podobě paprsků, od středu vybíhajících, uvnitř neb na obvodu uloženy jsou, pro poznání průřezů leucitových velmi význačné jsou a jich stavbu v jednotlivých po sobě jdoucích dobách vývinu objasňují.

Vrostlice leucitu, totiž černá a nahnědlá těliska, prášek a krátké mikrolithy augitové jsou obyčejně ve středu průřezu do kola nahromaděny, ukazující buď totéž pravidelné omezení co průřez sám, nebo tvoříce jeden i více koncentrických

<sup>1)</sup> Neues Jahrbuch f. M. 1860, p. 61 a 1861, p. 59.

**věnců**, jež často co průřezy mnohých srostlých jednotníků více méně do sebe sáhají. Tyto práškové věnce, k průsečným hranám leucitu rovnoběžné, jsou osmi- nebo šestihranné a skládají se z jednoho neb i více pásem zrnček práškových, kteráž více méně hustě k sobě přiléhají, vnitřek pak okrouhlý neb ostře omezený bývá řídkým neb hustým prachem zcela vyplněn. V průřezích leucitových, tmavými práškovými zrnky velmi bohatých, vyskytují se mikrolithy augitové jen pořádku ano někdy i úplně scházejí; leucitové průřezy však, mající hojnost mikrolithů, postrádají temných práškových zrněk.

Uložení krátkých mikrolithů augitových bývá často ještě ozdobnější než uložení práškových zrněk. Mikrolithy tyto vyplňují buď střední část s pravidelným omezením a tvoří poblíže okraje věnce, buď jest střed leucitového průřezu prost veškerých vrostlic a blíže okraje opakuje se více soustředných věnců polygonálních, v nichž jednotlivé augitové mikrolithy, dle rovnoběžné k hranám běžíce, dle pod kosým uhlím k sobě se kloníce, překrásné tvary věncové tvoří. Paprskovité uložení vrostlic, o němž Zirkel praví, že zřídka jen se vyskytá,<sup>1)</sup> našel jsem v leucitových průřezích českých čedičů též velmi pořádku, a i tu neúplně neb nezřetelně vytvořené (k. př. v čediči ze Skalky (Kirchberg) u Bukovic.)

Od krátkých našedivělých mikrolithů augitových liší se již na první pohled dlouhé tenké bezbarvé jehlice, jež šikmo do průřezů leucitových zasahají a pouze na blíže okraje přicházejí. I tyto jehlice jsou dostatečným znakem průřezů leucitových, nahražující kruhové skupeniny a věnečky z temných zrnček a z prášku. Čím čistší jest průřez leucitový a čím méně se v něm práškových zrněk a augitových mikrolithů vyskytuje, tím hojněji vyvinuty bývají bezbarvé jehlice na okraji. Nejhojněji objevují se v oněch zaokrouhlených bezbarvých průřezích leucitových, jež nejvíce žádných určitých obrysů a které by se právě tak považovati mohly za stejnorodou hmotu sklovitou, jako za hmotu leucitovou bez obrysů. Ono šikmé uložení bezbarvých jehlic mikrolithových působí sice málo k tomu, aby obrysy leucitové vystoupily, nicméně vysvitá z četných pozorování, že se míti může za podstatný znak leucitu při určení zaokrouhlených dílců bezbarvé hmoty (a sice právě tak, jako pravouhelné uložení krátkých mikrolithů augitových za nezřejmě omezené, obdélníkové průřezy nefelinové.)

Od průřezů leucitových, jež, vyznačující se věnečky, tvořenými zrnky práškovými, jen slabé stopy obrysů jeví, dají se pozorovati postupné přechody k oněm bezbarvým, více méně zaokrouhleným dílcům hmoty zdánlivě stejnorodé, které se toliko svými mikrolithovými jehlicemi vyznačují; neboť vedle těchto objevují se často i takové bezbarvé dílce, které jen méně dokonalé věnečky práškovité aneb pouze sporé jich skupiny v kruhu zaujmají.

Větší (asi co špendlíková hlavička) krystaly leucitové v čediči z okolí Valče (směrem k Hlavákovu) bývají uvnitř zcela bezbarvé, čisté a obsahují jen zde onde bezbarevné, velmi dlouhé jehlice mikrolithové; velmi blízko na okraji připojuje se pak věncový pás zrněk práškových, který s osmihrannými ostře vyvinutými obrysy rovnoběžně uložen jest.

Průřezy přejemných krystalů leucitových bývají kalné (do šeda neb žluta

<sup>1)</sup> N. Jahrb. f. Min. 1070, 809.



zbarvené) místy i jemně vláknité; avšak soustřední uložení přeměněných vrostlic podává nám pro ně patrný znak.

### Hauyn.

Makroskopické, malé krystaly hauynu, barvy jasnomodré neb zelenavé, byly z několika českých fonolitů již z dob dřívějších známy; na př. Reuss objevil je v černošedém a drobně bublinatém slepenci čedičovém na zámeckém vrchu u Housky. Podobná jasnomodrá zrnka nalezl jsem též při rozbírání čediče Košťálovského a Poppenberkského u Ludvikovic a v Museu čes. nalezá se úlomek zrušeného čediče z Andělské hory blíže Karlových Varů, v němž se vyskytují četné tmavomodré krystalky hauynu; ostatně vyskytuje se mikroskopický hauyn (dle mého posavadního zkoumání) velmi hojně v čedičích andesitových a fonolitových.

Průřezy mikroskopických krystalů hauynu, ponějvíce šesterce a čtverce, řidčeji polygonální průřezy s dutými úhly (jež náležejí složkám granátotvaru), vynikají zvláštní vniterní úpravou, která se ve všem velmi blízkému noseanu podobá. Největší díl průřezu vyplněn bývá hustou černou sítí, jež s nejzevnějším okrajem téměř rovnoběžně omezena jsouc aneb sama nejkrasnější omezení tvoříc, při větším zvětšení v jemnější neb silnější vlákna se rozbíhá. Vlákna tato křížují se pod pravým neb tupým úhlem podle průřezů a jeví se co řady více méně hustě stlačených černých zrněk, bodů, porů a bublinek. Průřezy hauynové bývají dletem zcela temné, složené z husté sítí, někdy i jemným, téměř bezbarvým okrajem opatřené, dletem pouze na okraji tmavé a do vnitř světlejší aneb u vnitru svém zcela bezbarvé; tu ale lze pozorovati, že se široký temný okraj do vnitř v jednotlivá vlákna rozbíhá, tvoří pak dále volné šedé výtvořky práškovité, aneb, že jen dílce oné sítí na různých (ponějvíce však okrajních) místech vystupují, při čemž pak ostatní část průřezu buď volným práškem vyplněna aneb zcela bezbarvá jest. Mimo tyto temné průřezy nalézají se také někdy průřezy hauynové bezbarvé, jevící pouze sporé stopy po sítí temné. Pěkné průřezy hauynové z čediče od Brambachu vyobrazil H. Möhl<sup>1)</sup>.

### Nosean.

V broušených lístkách porušené hmoty čedičové, která nalepena bývá na známých leucitech z Oberwiesenthalu, objevil Zirkel menší i větší (co špendlíková hlava) průřezy ostře omezené, ponějvíce šesti neb čtyřhrané, jež vynikají špinavě šedou barvou a skorem úplnou neprůhledností. Zirkel určil je za nosean (který i Naumann v čediči onom předvídal) a objevil je i co vrostlice v leucitech<sup>2)</sup> téhož čediče.

Světlé, šedožluté, již přeměněné průřezy noseanové, vynikající zřetelnou sítí, nalezl Zirkel též v horninách čedičových od Hauensteinu u Šénwaldu, které podobají se fonolitům (i amfibol obsahující)<sup>3)</sup>. Ze všech oněch skorem tří set

<sup>1)</sup> N. J. f. M. 1872, str. 79

<sup>2)</sup> Pogg. Ann. sv. 136, str. 545.

<sup>3)</sup> „ „ „ 136, „ 547.

nalezišť čedičových, jež posud jsem prozkoumal, nalezl jsem nosean u větším množství jen v anamesitech nefelinových z Řipu, od Slaného, z hory Milé u Bělošic a Dlouhé u Kozlů a v čedičích trachytových.

Vniterní sloh průřezů noseanových, hauynu velice podobných, jež při odrůdách čedičových posléze jmenovaných (z Řipu, z Hory Slanské atd.) blíže vypisují, liší se od slohu hauynu tím, že v prvním vyskytuje se více okrajních pásů jemných sítí, buď z modročerných čárek složených, buď z drobného prášku v podobě ostrohranných pruhů a pak hrubší síťování. Co se týče temnější neb světlejší barvy (namodralé neb nahnědlé), tož podobá se pravdě, že pro rozeznání noseanu od hauynu není právě význačnou; neboť onen hnědý nástin barvy v průřezích noseanových, který někdy také vedle černomodrého vystupuje, nepovstal zajisté jinak než přeměnou sítí původně modročerné (a sice okysličením kysličníku železnatého a přijetím vody). Jak se zdá, jest hauyn odkázán pouze na čediče andesitové a fonolitové, nosean však provází velmi jemnozrnné nefelinity a čediče trachytové.

### Granat.

Nerost tento byl již znám z horniny čedičové z okolí Laachovského jezera, od Kaiserstuhlu v Breisgau; Zirkel ho však také objevil v tak zvané čedičové drobě z Joh. Georgenstatu. Temnohnědé šesti- a čtyřhranné průřezy jeho bývají nejvýše 0·2 mm. široké a omezené často temnějším okrajem.

### Melilit.

(Humboldtilit.)

Melilit byl již znám co součást proudu lavového na Capo di Bove, později pak objevili jej Roth a Laspeyres tolikéž co součást několika Eifelských lav. Zirkel pak, naleznuv jej v Krušnohorských čedičích z Pöhlberku u Annaberku, z Šeibenberské homole mezi Annaberkem a Šwarzenberkem, dále od Geisingu u Altenberku, podal vlastnosti průřezů jeho a zároveň vytkl i to, že úzce bývá vázán na leucitové a nefelinové odrůdy čediče.

Melilit tvoří nažloutlé (co citron), řidčeji zelenožluté obdélníkové tvary, které ponejvíce světle modře co berlínská modř polarisují a pak tvary čtvercové, jež na polarisované světlo neúčinkují. Proměnou jeví se na průřezích obdélníkových sloh podél hlavní osy rovnoběžně, hrubě neb jemně vláknitý.

### Olivin.

Koule a zrnité shluky olivinové, jež nacházejíce se v horninách čedičových uzavřené, často velikosti ořechu až i hlavy dosahují, skládají se z hrubo- až jemnozrné směsi převládajícího olivinu s diopsidem, enstatitem, bronzitem, picotitem a iserinem. Ač tvoří olivin ponejvíce převládající jich součást, vyskytují se přec v tomže nalezišti (ku př. z údolí Telnického) takové ve kterých místy olivin, místy však bronzit neb hypersthen převahu má.

V některých čedičích na př. (z Karthouz u Jičína) vyskytují se pouze vyloučeniny bronzitu, jež částečně v Breithauptův phaestin přeměněny, mřsty i se zelenobílým enstatitem (tv. = 5·5) smíšeny bývají; ostatní součásti jsou v těchto shlucích olivinových jen v malém množství zastoupeny, což hlavně se týká iserinu, jehož sporá zrnka obvykle jen velmi blízko vůkolního čediče se nacházejí.

Čerstvá zrnka olivinová, barvy zelenavé neb žlutozelenavé jsou dosti prosvitavá a mají zvláštní skelný lesk<sup>1)</sup>; mění-li se hmota jejich, mění se i barva na žlutou, žlutohnědou a červenohnědou, a lesku jakož i prosvitavosti značně ubývá. Nástiny barev v postupu naznačeném souvisí s postupem proměny. Zkoušky Farského podávají pro nejčistší zrnka olivinová ze shluků olivinových čediče Kozákovského hutnost 3·25—3·3 a následující kvantitativní rozbor:

|                        | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.       | pom. kysl. 1. rozb. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|---------------------|
| Kyseliny křemičité     | 40·92 | 40·76 | 41·15 | 41·22 | 41·39    | 21·64               |
| kysličníku hořečnatého | 49·60 | 49·52 | 49·51 | 49·42 | 49·14    | 19·84               |
| „ železnatého          | 9·18  | 9·20  | 9·15  | 9·10  | 9·15     | 2·04                |
| „ manganatého          | 0·25  | 0·14  | 0·15  | 0·18  | 0·15     | 0·06                |
| „ hlinitého            | 0·13  | 0·15  | 0·15  | 0·15  | 0·12     | 0·06                |
| „ nikelnatého          | —     | 0·16  | 0·20  | 0·29  | neurčeno |                     |
| „ kobaltnatého         | —     | —     | —     | —     | —        |                     |
| „ chromitého           | —     | —     | 0·04  | 0·05  | 0·05     |                     |
| „ měďnatého            | —     | —     | —     | —     | 0·21     |                     |
| „ ciničitého           | —     | —     | —     | —     | 0·02     |                     |

Poměr kysličníku železnatého ke kysličníku hořečnatému jest 1 : 10.

Jak známo, vykládá se původ shluků zrněk olivinových v čediči tím způsobem, že utrhnuvše se z horniny olivinové vystoupením hmoty čedičové touto obaleny byly.<sup>2)</sup>

Než náhledu tomuto odporují tyto úvahy:

1. Tato klubka olivinová nalézají se na velmi četných a od sebe vzdálených místech; tudíž by se musila také podzemní olivinová skála v severních Čechách daleko prostírat a zajisté by na některém místě zřejmě vystoupila jako horniny ostatních vrstlic čedičových, což se však posud nikde nepozorovalo.

Mimo známé již naleziště koulí a shluků olivinových (co zrnité směsi převládajícího olivinu s bronzitem, enstatitem, diopsitem, picotitem a železem titanovým) z vrchu Kuzova, z údolí Telnického, z Lisé u Čes. Lípy a z Kozákova nalezl jsem je též v čediči četných jiných míst, zejména v čediči z Vraníku u Meronic od Pohradic (olivin, enstatit, diopsid), z Kohlberku u Milečova (drobná zrna směsi olivinu a enstatitu) v čediči šterku u Bohosudova (olivin, enstatit), v čed. ze severozápadního pahrbku Jalovcového vrchu u Teplíc (olivin, bronzit, diopsid), z jižního úpatí Sedla u Liběšic (olivin, picotit), v leucit. čed. ze Střekova (olivin, enstatit, diopsid, picotit) z Pastevčího vrchu u Střekova, v čed. od Třeblovic, z Kartouz u Jičína (bronzit, phaestin a enstatit). Drobné částky a zrna, jež se objevila též co

<sup>1)</sup> Reuss pozoroval úplně vyvinuté krystaly v čediči četných nalezišť. Na krystalech z vrchu Štěpanovského udává:  $P. 2\bar{P}2. 3\bar{P}3. \infty P. \infty \bar{P}2. \infty \bar{P} \infty. \infty \bar{P} \infty.$  (Umgeb. v. Teplitz u. B. str. 173.)

<sup>2)</sup> Sandberger, N. J. f. M. 1866, 385 a  
Gutberlet, Einschlüsse in vulkanoidischen Gesteinen. Fulda, 1853, str. 29.

směs výše naznačených nerostů, nalezla se velmi četně a hojně zejména v nefelinových a leucitových čedičích, olivinem bohatých.

2. Ubývání rozměrů koulí olivinových sledovati lze až do malých, pouze co hrách velikých shluků, v nichž někdy veškeré ony nerosty, jindy jen některé z nich se vyskytují; a takové malé vyloučeniny bývají v hmotách čedičových jednotlivých nalezišť velmi četné.

3. Přicházejí v čedičích olivinem velmi bohatých, v nichž tolikéž mikroskopická zrna olivinu dosti hojně se vyskytují.

4. Na místech, kde jemnozrná neb celistvá hmota čedičová od hrubo- neb jemnozrné směsi olivinu patrně jest oddělena, avšak s ním úzce a pevně souvisí, nelze pozorovati žádného působení hmoty čedičové; ona nahnědlá ponejvíce velmi tenká kůra, jeví se někdy a to jen místy na obrysech klubek olivinových, pochází zajisté odtud, že působením vody započalo se tuto přeměňování.

5. Ani nerostní povaha směsi není pro tak zvaná olivinová klubka význačnou; neboť v jednom osamělém čistě prohledném krystalu olivinovém (barvy žlutozelené) z Kozákova nalezlo se asi 2<sup>mm</sup>. velké, pruhovité zrnko temně zelenošedě zbarvené, jež se zcela dobře vyňati dalo; zrnko toto vynikající velmi dokonalou štípatelností a mikroskopickou povahou, nebylo nic jiného než enstatit. V mikroskopických zrnkách olivinu pozorovaly se dále vrostlice bronzitu a černá zrnka, jež jsou bezpochyby picotit.

V jednom kuse olivinu, jenž (dle dvou směrů rozeklán) jsa a nepochybně jednotlivci náležeje, v čediči Kozákovském zarostlý byl, nalezena jsou četná tmavá poněkud sploštělá zrnka, jež se solí fosforečnou zřejmou reakcí na chrom dávala, jichž tvrdost však menší byla picotitu.

V živcovém čediči z Kartouz u Jičína objevují se malé listnato-zrnité vyloučeniny (tmavě zeleně zbarvené) zvící 2", jež se skládají podstatně ze zrněk již přeměněného, špinavě černo zeleného měkkého bronzitu, Breithauptova phaestinu, a jiného nerostu, který jsa dosti prosvitavý a zelenobíle zbarvený, dle tvrdosti (5-5) jakož i dle velmi dokonalé štípatelnosti své v jednom směru a dle skoro dokonalé štípatelnosti v druhém směru ( $\infty P$  a  $\infty \bar{P}$ ) co enstatit se objevuje. V drobnohledu ukazují úlomky jeho husté rovnoběžné rýhování dle jednoho směru a volné řady i proužky porů plynových. V téže směsi nacházejí se také černá zrnka, velmi drobounká.

6. Konečně i chemicky zkoumány byvše představují tyto vyloučeniny mimo picotit a iserin jen jedinou řadu křemičitanů a to sice jedno- a dvojkřemičitany těchže kysličníků, které se jen poměry kvantitativními liší, vyjímaje snad diopsid, v kterémž kysličník výpenatý převládá. Není tedy příčiny, pro kterou bychom onen náhled přijati měli, že tak zvaná klubka olivinová jsou úlomky jakési skály olivinové, jelikož i mikro- i makroskopické vyloučeniny téže směsi nerostů (byťby i v nestejném množství) v tomtéž čediči zároveň přicházejí. Z uvedených těchto důvodů jsem tudíž toho náhledu, že tyto zrnité shluky olivinu a bronzitu, jež v čedičích přicházejí, pouhé vyloučeniny čediče jsou a téhož původu jako jiné součásti jeho.

Olivin klesá řidčeji u velikosti na zrnka mikroskopická; nejčastěji vyskytuje se u velikosti máku až hráchu. Průřezy olivinu dílem bezbarvé aneb bělavým obláčkům podobné, dílem modravě neb šedozeleně zbarvené, více méně vláknité aneb — jsou-li u větší míře přeměněny — zelenošedé, žluté, červenožluté neb červohnědlé a více méně kalné, nemají zvláštního slohu; omezení jejich jest velmi

zřídka přímočarné, nýbrž slabě vlnité a mezi součástkami čediče vynikají hlavně tím, že mimo pruhy hmoty čedičové a sporá zrnka černohnědá nemají téměř žádných vrostlic krystalových.

Mikrolithy augitu, amfibolu, nefelinu a leucitu nepozorovaly se v nich nikdy; proužky a větší částice hmoty čedičové, jež buď hluboko do průřezů olivinových zasahují buď jimi úplně jsou zavřeny, vyskytují se hojně v čedičích mnohých nalezišť, zvláště pak bývají časté v čedičích s hmotou sklovitou, hnědě zbarvenou. Vrostlé částice skla bývají světlými augitovými neb živcovými, paprkovitými neb vláknitými jehlicemi na polo vykrytalované aneb obsahují černohnědé jehličky a vlásky; zároveň nacházejí se také v průřezích olivinových zrnka ztruskovitá s bublinkami. Prázdné pory a pory plynové bývají někdy v řádkách u veliké hojnosti uloženy a mezi nimi pozorují se někdy též pory tekuté s pohyblivými bublinkami (libelami). Co význačné vrostlice udává Zirkel temnohnědá (hnědožlutě neb žlutohnědě ano i olivově zeleně zbarvená), prosvitavá, velmi malá zrnka, jež bezpochyby náležejí picotitu aneb spinelu.

Tato tělíska podoby přerostmanité (zaokrouhlené, podélné i klínovité, nejčastěji čtyř- až trojhranné) lze i v úplně přeměněném olivinu dosti zřejmě pozorovati; protož uvádí je Zirkel co význačný znak olivinu.

Proměna olivinu, jejíž různé stupně a přechody nejsnáze sledovati se mohou v horninách čedičových, běže počátek svůj od zevnějšíku, pokračujíc pak dle rozličných puklin a trhlin, tak že z počátku pouze okraj a žilky puklin v průřezích olivinových více méně kalné a vlnité vláknité bývají, podobajíce se temnému třepení barvy šedozelené. Tím bývá průřez olivinový na více světlých, šedozeleně obroubených políček rozdělen, která i tenkrát ještě zřejmá jsou, když proměna dále byla pokročila. Ponenáhlu mění se barva šedozelená v zelenožlutou, v citronovou, v žlutočervenou, hnědočervenou až konečně i do temnočervené přechází, při čemž v stejné míře oné kalnosti a barvitosti přibývá. V některých čedičích bývají průřezy krásně olivinové, neb co brčál zelené, aneb i do modra zbarvené. Nezřídka bývá vnitro ještě co oliva zelené aneb nažloutle zelené (proměnou v hmotu hadcovou) — s čímž zároveň spojen jest vlnité vláknitý sloh — okraj však stal se již žluto- až hnědo-červený, méně prosvitavý a okolo něho vzniká temnorudá obruba. Jakmile počíná se vyvinovati barva hnědočervená, již vystupuje i přímočarné rýhování podélné, nezřídka i příčné, tak že průřezy, jichž plochy vesměs barvou hnědočervenou (na některých tenkých místech i narudle žlutou) proniknuty jsou, hrubší sice, avšak zřejmou vláknitost v podobě čtvercových sítí jeví. Poslední stupeň přeměny průřezů olivinových vyniká černohnědou jen něco málo prosvitnou obrubou, která se svými hrubě přímočarnými a rovnoběžnými výběžky do vnitra se prostírá. Hmota její (nepochybně haematit) vyplňuje znenáhla celou plochu olivinu v podobě mřížky, čímž jednotlivé tyčinky mřížové hnědočerně místy zbarveny bývají, políčka pak nacházející se mezi nimi ještě temně rudohnědě prosvitají. Celkem podobají se poměry přeměn olivinu mikroskopického i oněm, jež Čermák při proměnách skal olivinových udal. Různé tyto stupně proměny ukazuje olivin na př. v čediči od Blatců. — Význačné jsou však přeměny olivinu v tělíska koncentricky sferoidická, jaké nalezl jsem pouze v čediči Svárovském.

Ve světle polarisovaném jeví jen bezbarvé průřezy olivinu lepou barvitost.

### Apatit.

Není zajisté ni jediné horniny čedičové, v níž by se přítomnost apatitu reakcí kyseliny fosforečné s molybdaenem amoniatým dokázati nedala, ano jsou i takové horniny čedičové, kde apatit 1—5% hmotě čedičové ujímá; v tomto pak množství dosahuje již svého maxima, tak že více 5% apatitu v čediči se nenačezá.

Podélné průřezy šesterečných sloupců apatitových bývají dlouhé, tenké, bezbarvé obdélníky, zakončené někdy několika tupými jehlanci a spodovou plochou, aneb dlouhé bezbarvé jehlice; průřezy příčné mají podobu více méně pravidelných šesterců, a jsouce poněkud zcela bezbarvé jasně vynikají; jsou-li však práškovitými zrny našedivěle neb nahnědle zbarvené, bývají pak prášková zrnka jejich buď v rovnoběžných hustých řadách a prouzcích (v nichž se zároveň černé jehlice a sloupečky titanového železa objevují) uložena aneb se ode středu k oběma koncům vřetenovitě zúžují neb konečně nepravidelně více méně hustě jsou skupena. Tento práškovitý ráz vyskytuje se zejména v delších a širších průřezích, podélných i příčných, na nichž se jeví spojka tupých jehlanů  $P, mP, m'P \dots OP$ ; zároveň lze na těchto průřezích velmi často pozorovati miskovitý sloh, jenž stává se tím, že práškovité jádro krystalu (šedé neb nahnědlé) obroubeno bývá velmi tenkým a zcela bezbarvým proučkem okrajným. Takovéto průřezy apatitu, jichž množství kvalitativním určením kyseliny fosforečné ustanoviti se dá, rozeznávají se poněkud již na pohled od krátkých, bezbarvých průřezů nefelinových, jež pravidelným uložením četných mikrolithů vyznačeny bývají (jako v čediči ze Řípu). Objevují-li se pouze bezbarevné krystaly apatitu, bývá i jejich značnější délka i sporé jejich rozšíření v poměru k četným a kratším obdélníkům nefelinovým, jež poněkud i vrostlicemi mikrolithů se vyznačují, znakem k rozeznání od nefelinu postačitelým.

Mnohem zřejměji jeví se rozdíl tento v čedičích přeměněných; neboť je-li i největší část součástek čedičových valně porušena, zůstávají přec průřezy apatitové ještě nadobýcejně čerstvé, tak že ostré jich průřezy mezi porušenými součástkami čediče velmi jasně vynikají.

Mimo černošedá neb nahnědlá zrnka prášková, jež bez odporu dle z porů plynových a zrněk ztruskovitých, dle z prášku magnetitového neb titanového železa se skládají, obsahují krystaly apatitu jen zřídka vrostlice patrných zrněk magnetitových neb krátkých sloupců titanového železa.

V příčných průřezích šesterečných jeví se tyto sloupky co široké jádro obroubené bezbarvým pásmem apatitovým (na př. v čediči ze Zajčova.) Velmi zhusta nalezá se však apatit co vrostlice v krystalech augitu, amfibolu, biotitu a rubelanu. Drobné šesterce apatitu objevují se na př. v krystalech augitu, v čediči ze Zajčova, pak v tlustých deskách biotitových a rubelanových z Loukova a z j. m. Ač již hmota desek rubelanových z Loukova z největší části byla v steatit se přeměnila, zůstávají šedobílé, slabě prosvitavé (až 1·5 mm. tlusté) sloupky apatitové téměř neporušené.

Jak z mikroskopických a lučebních zkoumání patrně, podobá se pravdě, že apatit v čedičích nefelinových v největším množství jest obsažen.

Množství apatitu v čedičích vypočetl jsem z určené kyseliny fosforečné z četných nalezišť, a výsledky byly tyto :

|                                                      | kyseliny fosforečné | apatitu           |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| V čediči magmatovém z Pšanského p. u Loun . . .      | 0·563 . . .         | 1·38              |
| v čediči noseanovém a nefelinovém z Řipu . . .       | 2·04 . . .          | 4·98              |
| v čediči nosean. a nefel. ze Solného vrchu u Slaného | 1·25 . . .          | 3·08              |
| " " " " " " " " " "                                  | 1·86 . . .          | 4·54 (jiná próba) |
| v čediči nefelinovém z Čertovy zdi . . . . .         | 0·514 . . .         | 1·26              |
| v čediči leucito-nefelinovém ze Zajícova . . . . .   | 0·553 . . .         | 1·35              |
| v čediči leucitovém z Paškapole . . . . .            | 0·107 . . .         | 0·26              |

Čedič noseano-nefelinový z Milého u Bělošic a čedič živcový od Ra-  
dechova u Bělé jeví jen stopy po kyselině fosforečné; kvalitativné zkoušky čediče  
nefelinového z hory Vinařické jakož i načervenalých (nahnědlých a šedavých)  
leucitových hornin peperinových, od Bořislavy, Šímy a Loukova, jež se vyznačují  
porfyrickým amfibolem, biotitem a rubelanem, okazují, že tu bývá kyselina fosfo-  
rečná zastoupena v množství více 1%, tudíž že i apatit 3—4% obnáší.

Rozbor čediče magmatového ze Skalky provedený v laboratoři p. prof. Šafa-  
říka podal: 1·3% kyseliny fosforečné, odpovídající 3·18% apatitu.

Dle E. Jahna obsahuje

|                                      |                  |              |                |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| čedič trachytový z hory Kunětické    | 0·63% kys. fosf. | odpovídající | 1·54% apatitu. |
| čedič magmatový žfly Spořilské . . . | 0·76% „          | „            | 1·85% „        |
| čedič z Vlčí hory u Černošína . . .  | 0·76% „          | „            | 1·85% „        |

### Ryzí železo.

Ryzí železo v čedičích objevil nejprve Th. Andrevs; tento nalezl je v čedičových  
horninách irského hrabství Antrimu co zrnečka jemně rozptýlená, jež se pod  
mikroskopem od magnetitu v ničem nelišila; avšak i Pagelsovi podařilo prý se je  
objeviti v čediči z Bärensteinu nedaleko Annaberku v Sasku a po něm udává též  
Reuss, že nalezl železo ryzí v četných českých čedičích (Sitzb. d. k. k. Akademie  
der Wissenschaften in Wien 1857. 546.)

Dle návodu těchto badatelů zkoumal jsem na železo ryzí jemně rozetřený  
prášek čediče od Slaného, z pahrbku Pšanského u Loun, ze Řipu u Roudnice.  
od Dubic na Labi, z Radechova u Bělé, od Libšic u Břiliny, z Čertovy zdi, pak  
i melafýr z Trosek u Jičína, ponechav je přes týden v skalici modré, neob-  
držel jsem však ani stopy po sraženině mědě.

### Magnetit.

Magnetit jest nejstálější součást všech hornin čedičových, provázeje tyto  
u velikém množství v podobě černých neprohledných zrn. Průřezy jeho jsou  
čtverce, šesterce neb mnohoúhelníky, z nichž tyto po většině složkám osmisténovým  
náležejí. Velikost jejich nebývá v tomže lístku stejná; klesá často až na nepatrné  
body (prášku magnetitového).

Rozdělení magnetitu jest buď v celé hmotě čedičové stejnoměrné buď jsou místy  
četná zrna nakupena. Někdy bývá uložení zrn těchto pravidelné na způsob složek,

odpovídající buď hranám některého většího krystalu (jako v čediči od Vinařic), čímž se hmota čedičová aneb její součást ve shluku magnetitu co vrostlice nalézají, aneb ukládají se menší magnetity ve směru os, tvoříce podoby křížů, svíců i sukovitých hůlek. Jsou-li pak tvary tyto velmi malé, jeví se nám co jehličky a vlásky.

Znamé vrostlice magnetitové jsou :

1. Apatit, jehož malé šesterečné průřezy, ostře vystupující, v četných čedičích hojně se vyskytují.

2. Nefelin, objevuje se v zrnech magnetitu, jež se co shluky malých krystalů jeví (na př. v čediči Vinařickém).

3. Augit v podobě nahnědlých prosvitavých krystalků, jimiž zrnka magnetitová některých čedičů silně proniknuta jsou (v čediči ze Zajícova). V mnohých čedičích bývají již olivin, jakož i beztvorná hmota úplně přeměněny, zrnka však magnetitová zůstávají ještě úplně neporušena a ostře omezena; ale i naopak nalézají se v čediči málo porušeném zrna magnetitu, která přeměně podlehnou červenavou neb nahnědlou obrubou kysličníku železitého neb hydrátu jeho omezena jsou. V prvním případě proměny převládá působení kyseliny uhličité, v druhém pak působení kyslíku.

Zirkel považuje též ony jazykovité, stromovitě rozvětvené, červenavé neb červenohnědé lístky s kapradovitě rozsekanými ostrými kraji, jež k magnetitu připojeny bývají, za výsledek přeměny magnetitu na kysličník železitý neb hydrát jeho (v čediči od Těchlovic).

### Haematit.

Dle porovnávacích studií Zirklových vyskytuje se haematit v hnědočervených, při vodorovné poloze zřejmě šesterečných lístkách a destičkách, jež bývají nezřídka chobotnaté, vykroužené, třepené a na sebe navrstvené. Zirkel uvádí jej mimo jiná naleziště v čediči od Valče; bývá však haematit i v jiných čedičích přítomen, přicházejí tolikéž v těchto deskách a lístkách — nikde ale v hojnosti.

### Železo titanové.

Titanové železo rázu klencového (Ilmenit, Iserin) objevuje se v zakulacených, co smůla černých, polokovově lesklých lístkách a zrnkách v čedičích z četných nalezišť, všude však jest jen spoře rozptýleno. Co bob velká zrnka nalezl Reuss v čediči z Klocberku u Kostomlat, od Velvet, Hrtiny, Lichtenvaldu, z Vostřého u Střekova, z Košťálu, od Ovčina u Třebenic, z Radobyli, Rabensteinu od Bukova a z j. m. Sporá tato zrnka přicházejí také v klubkách olivinových a sice vždy poblíže hmoty čedičové.

Broušené lístky nerostu toho jeví se co okrouhlé neb šesterečné, černé a neprůhledné průřezy. Známo však, že i magnetit vedle čtvercových a obdélníkových průřezů také šesterečné tvoří, není tudíž ráz tento pro železo titanové



tak význačným, abychom je od magnetitu rozeznat mohli; jediným toliko měřítkem býti může množství, v jakém ten který nerost přichází; při větším množství průřezů šesterečných může se za to míti, že tu v stejném poměru železo titanové jest zastoupeno. Jiný znak, který také ku poznání iserinu mikroskopického v horninách přispívá, jest (dle Sandbergra) fialová barva, jakouž obdržíme, zavaříme-li prášek čedičový, iserin obsahující, s kyselinou sírovou.

### Picotit.

Chromová odrůda černého spinelu (pleonastu) objevena byla v nefelinitech z Kočíšho Hřbetu a z Hory Lebavské; Sandberger dovodil též přítomnost její v tak zvaných koulích olivinových zároveň s bronzitem a diopsidem.

Picotit vyskytuje se ponejvíce v podobě nepatrných černých aneb černo-hnědých, poněkud sploštělých zrnek, kteráž v skrovném množství do olivinu vrostlá bývají; zřídka jen objeví se zrnko 6 mm. velké. Zrnka, která pro vyšší stupeň své tvrdosti, jakož i proto, že v perli boraxové jeví reakci na chrom, za picotit určiti se mohou, vynikají na povrchu svém leskem mastným, na plochách pak lasturových silným leskem skelným. Farský <sup>1)</sup> zkoumal picotit z klubek olivinu z Kozákova a rozbor jeho (proveden s 0.2014 gr.) podal následující výsledek v %:

kyseliny křemičité = 3.77

kysličníku hlinitého = 50.34

„ chromitého = 5.75

„ hořečnatého = 17.87

„ železnatého = 22.27

Odečte-li se přimísená hmota olivinová a uveďte-li se výpočet na %, jest pak

kysličníku hlinitého = 55.40 } <sup>Poměr kyslíku</sup>

„ chromitého = 6.33 } 27.81

„ hořečnatého = 13.34 } 10.87

„ železnatého = 24.93 }

### Kyz magnetový.

(Pyrrhotin).

Přítomnost kyzu magnetového zjištěna jest Farským <sup>2)</sup> v čediči Kozákovském; přichází v tenkých magnetických lístkách barvy spýšové neb bronzové a jest v čediči pevném, neporušeném jen velmi spíše rozšířen.

Podobná zrnka kyzová, jež však pro drobnost svou dále zkoumati se nemohla, objevil jsem v četných (pevných) čedičích; Reuss uvádí čedič z Rabensteinu a olivinové koule z Telnického údolí co kyzonosné. <sup>3)</sup>

V čediči zvětralém nachází se kyz železný mnohdy u veliké hojnosti (v podobě drobných zrníček) a též jeví se co pyrit.

<sup>1)</sup> Zprávy spolku chemikův čes. 1., s. 31.

<sup>2)</sup> Zprávy spolku chemikův čes., s. 1., s. 33.

<sup>3)</sup> Umgebung von Teplitz und Böhlen 1840, 177.

### Sklovité magma.

Zirkel poukázal k tomu, že v největší části čedičů živcových a snad i ve všech čedičích jakési beztvárné, stuhlé magma čedičové vězí, jež po vyloučení krystalických součástí mezi těmito co residuum utkvělo; máje pak na zřeteli, že množství i jakost tohoto čedičového magmatu veliký má vliv na tvárnost sklovitého slohu mikroskopického, podal na základě tohoto magmatu rozdělení čedičů živcových. Podobné sklovité magma nevyskytá se však pouze v čedičích živcových, nýbrž i v čedičích nefelinových a leucitových, ale v těchto zřídka u větším množství. Mimo to jsou i takové horniny čedičové, jichž základní hmota jediné ze sklovitého magmatu bez mikrolithů, pak z augitu a z magnetitu se skládá (aniž by jakýsi živcovitý nerost se přidružil).

Toto sklovité magma jest zřídka čisté t. j. bez mikrolithů a trichitů č. výtvoří temných, vláskových a práškových; je-li však magma čisté, jeví se v tenkých vrstvách co hmota bílá, šedo- aneb žlutobílá a průhledná; vyloučí-li se nahnědlé a černošedé výtvořky vláskovité, kostry krystalů aneb rozmanité mikrolithy, tu pozbývá více méně sklovitého rázu, stává se polokrystalickým a nabývá obyčejně barvy hnědé. Nezřídka vyloučí se výtvořky vláskových, jehlic, vlásků, klínků neb mikrolithů takové množství, že jen s těžší sklovité magma co také objeviti lze; v tomto případě stalo se magma skoro cele krystalickým.

V broušených lístkách pozná se toto sklovité magma (i když v menším množství přítomno jest) snadno po tom, že postrádá individualnosti a že v polarisovaném světle co jednodomná hmota se jeví; zejména ve světle polarisovaném vystupuje sklovité magma velmi zřetelně co hmota temná, ostře oddělená od krystalů, skvoucích se v rozmanitých, pestrých barvách; mnohem však větší obtíže činí poznání magmatu tohoto, je-li v menším množství mezi jednotlivými menšími krystalky vtěsnáno, poněvadž, i kdybychom sebe tenčí lístečky hornin sobě upravili, přece ještě nad i pod magmatem krystalické úlomky patrný bývají. Vždy však ve světle obyčejném vystupuje ono nahnědlé a vlásky bohaté, sklovité magma mnohem zřejměji než je-li bezbarvé a bez vlásků.

Šedobílé a nazkrze stejně žlutobílé zbarvení sklovitého magmatu bývá tomuto vlastní, ono však nahnědlé neb hnědošedé neb hnědožluté zbarvení (někdy nástinem do fialova) pochází poněvíc od roztroušených, velmi jemných výtvořů vláskovitých a práškovitých. Čím hustěji se totiž vlásky a prášek (trichity) v hromádky nakupí, tím více jeví se sklo, které je uzavírá, temnějším; naproti tomu bývá však toto na místech velmi tenkých a na vlásky chudých téměř bezbarevné. Mimo tyto vláskové výtvořky, jež co tmavé body, jehličky, vlásky a klínky rozmanitě sestaveny, co pérka, chocholky, kosmaté a vlnaté hromádky a t. d. se objevují, vystupují také na některých místech shluky výtvořů kostrových, tvořící kypré, hnědočerné mřížování, jehož směry průsečným hranám augitu odpovídají a někdy téměř uzavřené hrany průřezů augitových tvoří. Tyto vyskytují se poněvíc v sousedstvu olivinu a bývají i krystaly olivinovými uzavřeny.

Nejkrásnější a nejčetnější takovéto výtvořiny kostrové (vedle rozmanitých, zvláště pírčitých výtvořin vláskovitých) nalézají se v čedičích magmatových, zejména od Svinčic, z Králíci Hory u Mirešovic a ze Skalky, ony pak vlnité a kosmaté výtvořiny vláskovité bývají v čedičích magmatových a v obecných živcových s nahnědlým sklovitým magmatem docela obyčejné.

Pozorujeme-li důkladněji větší kostry augitu a ony velmi malé pírčité sestavené výtvořiny vláskovité, jež v zmenšené míře tyže směry mají a podobnou (nahnědlé) splývající obrubou se vyznačují, můžeme za to míti, že obojí výtvořiny jednoho druhu jsou a jen velikostí se rozeznávají; jelikož pak mezi oněmi i tvary klenuté a slabě zakřivené nacházíme, můžeme také vlnatým a jiným shlukům vláskovým též původ přiložiti. Mimo to podobá se pravdě, že i pohybování se hmoty sklovité v době tuhnutí rozmanitě působilo na polohu a tvárnost skupin trichitových.

V mnohých čedičích magmatových (ku př. ze Sviňského vrchu, z Králíci Hory) a živcových (ku př. od Pohradic, z pahrbku Panznerova a z Vrkoče), pak v některých nefelinových (od Bělošic, ze Řípu) vyskytuje se nahnědlé, zrnité, na polo neb zcela krystalické magma, jež zbarveno jest velmi jemným práškem trichitovým, hustě roztroušenými body a. krátkými jemnými proužky, jehličkami a vlásky.

Jiného rázu jsou černé výtvořiny trichitové bez nahnědlé obruby v bezbarvém, spoře sklovitém cementu čediče živcového od sv. Ivana a jiných čedičů, vynikajících bezbarvým sklem. Tvary jejich, podobající se ponejvíce písmu hebrejskému připomínají na skupiny magnetitu a železa titanového; téhož rázu jsou i ony výtvořiny, jež vedle skupin chomáčů trichitových a koster augitových co tlusté sukovité hálky přicházejí v čediči od Skalky.

Že se i výtvořiny vláskové co samostatné vyloučeniny bez magmatu skelného vyskytovat mohou, patrně v čediči od sv. Ivana, kde živcové tyčinky buď proužky hustých síťovitých výtvořin vláskovitých odděleny buď krátkými vláskovitými jehlicemi a chloupky posázeny bývají.

Magma mnohých čedičů živcových, na polo neb zcela krystalické, mívá na některých místech aneb v celém broušeném lístku špinavě zelenou barvu, čehož příčinou jsou jemné vyloučeniny jiného druhu. Tyto tvoříce slabá průsvitavá aneb neprůhledná zrnka, osténce, chloupky a vlákénka, podobají se buď zmotanému pletivu, buď mechovitým skvrnám, buď rovnoběžným páskům i hřebenitým a harfovitým tvarům. Jelikož rozmanité tyto tvary barvy zelenavé rozptýleným, vláknitě přeměněným úlomkům olivinovým nejvíce se podobají, jest dle obdoby pravdě velice podobno, že tolikéž náležejí hmotě hadcovité (serpentinovité) a bez pochyby druhotné výtvořiny jsou, jako zelenavá, vláknitá hmota olivinu v hadec proměněná.

Tyto výtvořiny vyskytují se ponejvíce v čedičích zásaditějších, bohatších kyslíkem hořečnatým, jež majíce hojnost olivinu, i nefelin a anorthit obsahují (na př. v čediči z Kolozruk, z pahrbku Panznerova, od Pohradic a Košova). V těchže podobách, jaké jeví sklovité magma, samostatně se vytvořivší, nalézají se i co vrstevnice v augitu, v olivinu a v živci.

Že chemické složení sklovitého magmatu podobně jako chemická skladba tachylytu není stálé, nýbrž že souvisí s rázem ostatních součástí čedičových, a

tom není pochybnosti. V čedičích, v nichž u větším množství jest kyselina křemičitá, jest tolikéž i sklovité magma kyselejší a naopak.

Známo jest, že sklovité magma jakož i tachylit kyselinami se ponejvíce rozkládají, vylučující kyselinu křemičitou co rosol, lze tudíž za to míti, že se mnohem čteněji objevují v oněch čedičích, jež nejméně kyselný křemičitý vykazují. Uváží-li se pak, že v tuhnoucí hmotě tím snáze krystalické součástky se tvoří, čím rozdílnější jsou body tání těchto součástí, jeví se zřejměji, proč v čedičích trachytových, andesitových, leucitových a nefelinových řídčeji a méně sklovitého magmatu se nachází; jsou-li však v magmatu smíšené nerosty téměř stejně roztopené, tu se tyto za rychlého ochlazení mnohem obtížněji krystalicky oddělují a spíše se stává, že beztvornou směs čili sklo tvoří. S tím srovnává se i výsledek chemického rozboru čediče z Kolozruk a od Skalky, v nichž se chemické složení skelného magmatu rovná směsi nefelinu a anorthitu.

Ze všech součástek čedičových hornin podléhá nejprve sklovité magma přeměně, která dle své a chemických agencií povahy rozmanitě díti se může. Zirkel podotýká, že magma krystalické spíše rozkladu podléhá než magma čisté, postrádající mikrolithů a vlásků, a příčina toho leží patrně ve volnější spojitosti částic.

Sedé a žlutobílé, více méně zrnité (krystalické) magma bývá uhličitany proniklé, šumí více méně v kyselinách a neobjevuje se mezi křižujícími se harapatity zcela temné, nýbrž tmavošedé a kalné.

Špinavě zelené, více méně zrnité (krystalické) magma nabývá proměnou barvy rezavé, což se tím stává, že roztroušená zrnka trichitová dílem se okysličují a vodu přijímají; pokročí-li pak přeměna, vyloučí se nahnědlé chomáče hydrátu kysličníku železitého a vedle nich vystoupí místy i výtvořky zeolitové. Velmi krásně pozorovati lze tvoření se zeolitů při přeměně nahnědlého sklovitého magmatu v čediči ze Skalky. (viz výpis t. čed.)

## Rozvrh odrůd hornin čedičových a skrytý sloh hmoty základní.

K horninám čedičovým čítaly se dosud dolerit, anamesit a čedič (v užším smyslu) co odrůdy živcové. Když pak poznány jsou i odrůdy bezživcové, v kterých nefelin, leucit, hauyn ujímá živci místa, rozšířila se řada odrůd čedičových tím, že připojeny jsou nefelinit, leucitofyr a hauynofyr; neboť nebylo podstatných rozdílů v poměrech geologických mezi veškerými vyznačenými odrůdami, jež se jevíly u vývinu svém co členové jedné velké doby — doby čedičové.

Místo oddělování prvních tří odrůd, jichž rozdílů zakládají se pouze na různé velikosti součástí a stejnou měrou dovoditi se dají i u ostatních čedičův odrůd, jest bez odporu prospěšnější, spojití je jmenem „čedič živcový“ a místo názvů ostatních odrůd, totiž místo „nefelinit, leucitofyr a hauynofyr“ prospěšné užití lze výrazu „čedič nefelinový, leucitový a hauynový; neboť tím vynáší se na jevo rozdíl od lav, podobně složených, a prastarého jména „basalt č. čedič“<sup>1)</sup> užívá se pro

<sup>1)</sup> „Basalt“ pochází bezpochyby z etiopického slova „basal“, jež znamená kámen železem bohatý; dle zpráv Pliniových se země Etiopův nejprve basalt byl přinešen.

veškeré členy, jež vznikly v jedné veliké době; zároveň nabudou horniny, jež se zvaly dolerit, anamesit a čedič (v užším smyslu) a poněvíc nejsou čediči *živcovými*, správného a jasného výrazu.

Poněvadž v čediči, obsahujícím hauyn neb nosean, převládá vždy buď nefelin, buď leucit buď živec, tož není potřebí, by se nerostnými jmeny „hauyn a nosean“ vyznačovaly hlavní čediče odrůdy.

Mimo řady čediče živcového, nefelinového a leucitového vyskytují se četné odrůdy čediče, jimž živcovitý nerost (živec, leucit, nefelin) vůbec chybí, aneb v nichž se jen velmi skrovně nalézá. Poněvadž místo součásti živcovité vyvinuto jest magma t. j. hmota na polo neb úplně sklovitá co hlavní součást čediče, zovu takové odrůdy čediče, jichž hmota základní pouze z augitu, magnetitu a ze skla čili magmatu se skládá, *čedičem magmatovým*. Na tomto základě, jakého druhu je živcovitá součást, aneb zastoupena-li jest hmotou sklovitou, rozvrhnouti se mohou horniny čedičové na *magmatové*, *leucitové*, *nefelinové* a *živcové*. Tyto základní typy nevylučují se však zúplna, nýbrž mísí se v četných odrůdách, jež směsí tou nabývají nových, známek, vynikající mnohdy i zvláštními poměry geologickými i zvláštním způsobem svého vývinu. A poněvadž takovéto odrůdy k jiným horninám eruptivním, mladším a starším, mnohou podobnost vykazují, záhodno jest při dalším rozvrhu čedičového horstva přihlížeti též ke způsobu vývinu, k mikroskopické a chemické příbuznosti se sousedními v stáří horninami, s melafry, andesity a fonolity — a tato příbuznost zakládá se nejen na jakosti, nýbrž i na poměrném množství součástí a souvisí se zvláštním způsobem vývinu horniny — a konečně přihlížeti i k poměrům geologickým, zejména k jich postupuému stáří.

Povaha pak magmatu, skrytý mikroskopický sloh hmoty základní a poměr velikosti součástek mohou býti základem rozvrhu podrobného. Odrůda čediče *magmatového* rozvrhuje se přirozeně dle rázu magmatu. Bez ohledu na více neb méně úplný, sklovitý ráz magmatu vystupují hned na první pohled dvě různé podoby jeho, zakládající se na rozdílu v barvě a v podobě tělísek trichitových. Magma hnědé neb nahnědlé vyniká vždy bohatostí černohnědých vláskových tělísek č. trichitů neb i koster krystalů augitových, a přimísením těchto tělísek nabylo barvy své; magma pak šedo- neb zelenavě bílé pozbývá již poněkud sklovitého rázu množstvím vyloučených mikrolitů (belonitů) aneb tělísek šedých, žlutavých, zrnitě práškovitých.

Čedičové horniny onoho druhu jsou na povrchu temněji, tohoto však druhu světleji zbarveny; nezdá se však, že by bylo podstatných rozdílů v ohledu chemickém. Tudíž rozpadá se *čedič magmatový* na skupeninu čediče *tmavého* (šedočerného neb černošedého), jenž vyniká hnědým magmatem, v tělískách trichitových bohatým a pak na skupinu čediče *světlého* (šedého neb světle černošedého), jehož základní hmota obsahuje magma šedé (zelenavě-bílé), vyloučením jehlic a zrníček práškovité.

V oboru horstva čedičového vyskytují se četní členové odrůdy, jejíž hmota základní nemá patrné součásti živcovité, nýbrž jakousi součást zdánlivě beztvornou slabě (šedě nebo žlutavě) zbarvenou, jež postrádající zřejmého, pravidelného omezení nevyniká určitým skupením vrostlic, ale objevuje se v polarisačním světle u většiny v barvě modrobílé neb modrošedé.

Hledíce k neporušenému vzezření hmoty této u porovnání se známými proměnami čediče magmatového, můžeme na jisto vynésti úsudek, že polarisující hmota vyznačená nevznikla proměnou jakési hmoty beztvarné. Bedlivým pozorováním vyskytují se přec na některých místech, zvláště ve světle polarisovaném, patrné známky omezení pravouhelného neb šesterečného, někdy i pravidelné uložení sporých vrostlic; a tyto řídké objevy naznačují již, že onen díl hmoty bezbarvé, jenž modravě polarisuje, pokládati se může za podélné průřezy nefelinové, díl pak, jenž ve světle polarisovaném temný zůstává, buď za příčné průřezy nefelinu neb za průřezy leucitu. Tomuto náhledu nasvědčují též výsledky rozborů chemických (na př. výklad chem. rozboru čediče ze Zajícova).

Tato odrůda čedičová, která pro svou podobnost s čedičem nefelinovým nazývati se může *odrůdou nefelinitoidovou*, vystupuje ponejvíce na okraji hlavního pásma českého horstva čedičového a náleží s čedičem leucitovým k nejstarším výtvarům čedičovým.

*Čedič nefelinový* dá se rozvrhnouti dle slohu na hrubo- a jemnozrný a krystalický celistvý (čili na dolerit, anamesit a čedič nefelinový); může se pak dále rozdělit dle rázu průřezů nefelinových a pak dle toho, chybí-li mu magma sklovité aneb je-li v něm obsaženo.

K jemnozrnému čediči nefelinovému řadí se sporé noseanity, (t. j. odrůdy čediče nefelinového bohatší noseanem).

V mnohých čedičích leucitových vyskytuje se velké množství takových leucitů, jichž průřezy nejsou zřejmě omezeny, nýbrž se spíše podobají bezbarvému neb (šedobílému) magmatu; tím pak, že tuto augit ve více méně pravidelných kruzích uložen bývá, jakož i tím, že dlouhé bezbarvé mikrolithy (snad živce) jako v průřezích leucitových na obvodu leží, rozpadá se toto zdánlivé magma na menší a větší bezbarvé, okrouhlé, neb v podobě růženců souvislé části. Pouze na velmi sporých místech vyskytují se průřezy, které svými, byť i méně zřetelnými znaky co leucitové se poznávají. A tuto třídu, obsahující méně zřetelně vyvinutý leucit, z části i nefelin, zovu *čedičem leucitoidovým*.\*)

Čedič pak obsahující zřejmými znaky vyznačené průřezy leucitu slove *leucitovým*. Obě tyto odrůdy dají se roztržiti dle zřejmého a skrytého slohu (zrnité, jemnozrné, krystalický celistvé, zrnité porfýrické).

Odrůdy černošedé, hnědošedé, hnědé a červenavé, méně pevné, více méně hlinité, vynikající velkými krystaly augitu, amfibolu, biotitu a rubelanu, mohou nazvány býti na základě pravdě podobného původu svého — co hornina z bahna lávového vzniklá jako Albánský peperin — *čedičem peperinovým*.

Nejrozmanitěji objevují se čediče živcové. Tyto rozdělil Zirkel, dle skrytého slohu základní hmoty ve čtyry hlavní skupení, na čediče:

A) stejnozrné (v nichž sklovité magma zřejmě nevystupuje) — jež opět roztržil dle velikosti jednotlivých součástí na

- a) skrytě jemnozrné
- b) skrytě hrubozrné (anamesity)
- c) skrytě velmi hrubozrné (dolerity) —

\*) Rozdíl odrůdy nefelinitoidové od nefelinové a leucitoidové od leucitové nezakládá se na různosti v povaze minerální a chemické, nýbrž toliko na různé tvárnosti mikroskopické.

B) krystalicko-porfyrické,

C) sklovitě porfyrické — a ty zase na odrůdy

a) s čistým a

b) s polokrystalickým magmatem — a na

D) ony, jež mají sporé, mezi krystaly vtěsnané magma, které opět jest buď

a) čistě sklovité, buď

b) polokrystalické, buď

c) zcela krystalické.

Poměry slohu čedičového mění se však často dosti rychle v malé vzdálenosti téhož naleziště, někdy i v tomže lístku broušeném. Za tou příčinou jeví se výhodnějším takové rozdělení, jež neleží ve slohu, nýbrž které buď spočívá na prve udaných základech příbuznosti s melafyrem, andesitem, fonolitem a horninami čedičovými, buď na relativním stáří se zakládá. S tím pak souhlasí zároveň i zvláštnosti skrytého slohu i chemické povahy i jiných důležitých znaků.

Ačkoliv vědomosti naše o mikroskopické povaze melafyrů, fonolitů, andesitů a trachytů v mnohém ještě ohledě jsou neúplné, zvlášť co českých nalezišť se týká, tož jsou předce hlavní typy jejich tak vyznačeny, že se jich dobře užiti může ku porovnávání s horstvem čedičovým.

Ze znaků zevních a z geognostických poměrů čedičů a fonolitů českých soudil již Reuss, že mezi oběma není určitých mezí, nýbrž že se tuto nenáhlé přechody pozorují. Náhled tento rozšířen a změněn mikroskopickým a chemickým rozborem čediče v ten smysl, že nejen mezi čediči a fonolity, nýbrž i mezi čediči a andesity a melafyry přechodní horniny se vyskytují, jež v oboru českého horstva čedičového nemalou mají důležitost.

Na tomto základě podávám tuto rozvrh čedičů živcových, kterémuž základem jest všeobecný typus čili vztahy ku příbuzným horninám, k melafýrům, andesitům a fonolitům, rozeznáváje:

Čediče melafyrové,

obecné čediče živcové (v užším smyslu, po živci pak čediče anorthitové a oligoklasové) a

čediče andesitové (z části i fonolithové).

*Čediče melafyrové* jsou velmi jemnozrné (anamesitové) odrůdy barvy černošedé (s nástinem do zelena neb do hněda) více méně zřejmým, nahnědlým neb bezbarvým, sklovitým magmatem proniknuté, v nichž oligoklas nejméně polovici, obyčejně však  $\frac{2}{3}$  hmoty čedičové zaujímá. (Jich omezení může se určití teprv, až budou melafyry dokonale známy).

*Obecné čediče živcové* v užším smyslu jsou ponejvíce odrůdy krystalicky celistvé a barvy z čedičů nejtemnější, šedočerné; trojklonný živec dosahuje často sotva třetinu, vždy pak méně poloviny veškeré hmoty čedičové; sklovité magma, jež jest ponejvíce nahnědlé, trichyty bohaté, řídčeji šedobílé, množstvím mikrolithů a prášku proniklé — bývá ve směsi převládajícího augitu, magnetitu a olivinu dosti zřetelné.

Dle rázu živce mohou se rozdělití čediče živcové v *čediče anorthitové* a *oligoklasové* (labrador nebyl posud v čedičích nalezen, tím však se nedokazuje, že by se vůbec objeviti nemohl.)

Z výkladu chemického rozboru čediče Kolozruckého podal jsem úsudek o přítomnosti anorthitu v čediči tomto.

Z mikroskopického rázu bezbarvých tyčinek, jež anorthitu přikládám, vychází na jevo, že anorthit ponejvíce v jednoduchých, bezbarvých, tyčinkových průřezích se tu vyskytuje, jež ve světle polarisovaném jen několika málo temnými ostrými, proužky od podobných (tyčinkových) průřezů mdle namodralého nefelinu se liší; i to nezdá se býti nahodilé, že jej mimo nefelin nahnědlé, trichity bohaté magma sklovité provází.

*Čediče oligoklasové*, jsouce bez odporu mezi obec. živ. čediči nejrozšířenější, obsahují buď nahnědlé, vlásky bohaté, aneb šedobílé, dílem zrnité, více méně vyvinuté magma polo krystalické, jež se jen pořádku tak spoře nachází, že zdanlivě mezi krystalickými součástkami se ztrácí.

Rozdělení skoumaných již čedičů živcových v skupinu anorthitovou a oligoklasovou nelze mi z posavadních výskumů do podrobnosti provést; protož je dosud v jednu skupinu zahrnuji.

*Čediče andesitové* jsou po většině velmi jemnozrné, neb skoro krystalicky celistvé; podobajíce se skrytým slohem základní hmoty své slohu andesitů, obsahují vždy řádně vyvinuté bezbarvé neb šedobílé magma, jež množstvím vyloučených mikrolithů a zrněk práškových více méně jest krystalické. Vedle četných krystalků augitových a zrněk magnetitových, vedle vždy přítomného nefelinu neb leucitu a nefelinu vynikají pak dílem jednotlivé, dílem velmi hojné trojklonné tyčinky živcové, někdy jen co jemné mikrolithy vyvinuté. Andesitový čedič, v němž trojklonný živce jen v podobě mikrolithů jest vyvinut, bývá bohatší leucitem.

V popředí čedičů andesitových přirozeně staví se zrnitá hornina čedičová z hory Střížovické, jež jsouc dosud doleritem nazývána, andesitu nejvíce se podobá, pouze obsahem asi 10% nefelinu se liší.

Odrůdy čediče andesitového, hojné v hauynu, mohou pro sebe tvořiti oddělení čedičů hauyno-andesitových. K čedičům andesitovým řadí se čedičové *fonolithové*, jež vystupují s čediči andesitovými v okrsku českého horstva čedičového, přechodní tvary k fonolithům tvoří (kterým se i svým zevnějškem podobají).

Základní jich hmota světlá- neb zelenošedá jest buď velmi jemnozrná, buď krystalicky celistvá a skládá se z bezbarvého neb šedobílého magmatu, jež vyloučením mikrolithů více méně krystalickým se stalo, pak z větších a menších krystalů augitových, z magnetitu, z jemných tyčinek živcových, z nefelinu někdy i z leucitu; řídčeji pozorují se zřejmé destičky sanidinové.

Magma bývá tuto začasť zastoupeno vynikajícím množstvím nefelinu neb leucitu.

Jsou i mnohé odrůdy, jež bohaty hauynem, co čediče hauynofonolithové podřaditi se mohou. Čedičové fonolitové rozeznávají se od čedičů andesitových tím, že v prvých pouze sporé desky sanidinové a menší množství tyčinek živcových se vyskytuje; mohou se tudíž spojit s čediči andesitovými, poněvadž, pokud povaha tyčinek živcových se nevyjasní, všeobecný ráz základní hmoty obou těchto čedičů valně se neliší.

Mimo vytčené již odrůdy čediče povšimnutí zasluhuje zvláštní ještě skupina čedičů, která již svými geologickými poměry patrně se vyznačuje. Zahrnuje nejmladší členy čedičové, jež vystupují ve fonolitech trachytových co žíly zdím po-



dobné; i skrytý sloh čedičů těchto jest význačný, že je na první pohled z broušených lístků poznati lze. Čediče tohoto skupení jsou ponejvíce (velmi) jemnozrné, temně šedé neb (světle) hnědé neb zelenavě šedé, hmotou vápencovou proniknuté a obsahují začasť zeolity.

Základní hmota jejich jest více méně drsná, v této pak vystupují často četné makroskopické krystaly augitové, jež dosahují velikosti několika čárek. Za zvětšení asi čtyřstého pozorována, skládá se základní hmota ze žlutavé neb šedobílé, kalné, zrnité práškovité hmoty, kteráž, vytvořivši se nepochybně přeměnou noseanu, místy převládá (tvoříc samostatné dílce),<sup>1)</sup> pak z četných dlouhých, nahnědlých krystalů amfibolových, úlomků biotitových, méně četných zrn magnetitových a buď zřejmých průseků nefelinu buď z bezbarvých tyčinek, jež buď nefelinu, buď trojklonnému živci náležejí. Poněvadž tito čedičové drsného bývají vzezření a ponědáž se v trachytových fonolitech vyskytují, nazývám je *čediči trachytovými*.

Posléze míním ještě uvéstí název *čedičů tachylytových* pro ony načernalé, šedohnědé neb hnědošedé, horniny, jež jsou mladší čedičů trachytových aneb téhož s nimi stárí, ponejvíce v tenkých ( $\frac{1}{4}$ —1'), rozmanitě se křižujících žilách vynikají, jichž stěny začasť tenkými (3—4'') korami tachylytu pokryty jsou.

Jich základní hmota jeví teprve při 800 zvětšení zřejmé spletení mikrolithů v magmatu kalném, nahnědlém, v němž sporé ojedinělé úlomky čistého trojklonného živce, augitu a velmi sporá zrnka magnetitová porfyricky vystupují.

### Přehled českých hornin čedičových.

| I. Čediče magmatové.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. Čediče nefelinové.                                                                                                                                                                                                                                 | III. Čediče leucitové.                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. tmavé, obsahující nahnědlými trachyty bohaté magma;<br/>dle zjevného slohu<br/>a) porfyrické a<br/>b) krystalicky celistvé;<br/>dle skrytého slohu<br/>α) sklovitě-porfyrické<br/>β) „ zrnité<br/>γ) nestejně;<br/>2. světlé, obsahující našedivělé neb žlutobílé magma, jež jest buď bohaté mikrolity, aneb práškovitě zrnité (všecky odrůdy jsou kryst. celistvé).<br/>dle skrytého slohu<br/>a) sklovitě-zrnité<br/>b) velmi bohaté v augitu s magmatem velmi sporým.</p> | <p>1. nefelinitoidy<br/>a) velmi jemnozrné (anamesitové)<br/>b) kryst. celistvé<br/>2. (čedičové) nefelenity<br/>a) zrnité (nefelinové dolerity)<br/>b) (velmi) jemnozrné<br/>α) anamesity nefelinové<br/>β) noseanity<br/>c) nefelinity celistvé.</p> | <p>1. čediče leucitoidové<br/>a) (velmi) jemnozrné<br/>b) kryst. celistvé<br/>2. čediče peperinové,<br/>3. čedičové leucitofýry<br/>a) zrnité<br/>b) (velmi) jemnozrné.<br/>c) kryst. celistvé.</p> |

<sup>1)</sup> Převládáním nefelinu mizí nosean.

| IV. Čediče živcové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V. Čediče trachytové                                                                                                                           | VI. Čediče tuchylytové. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>1. čediče melafýrové</p> <p>a) s hnědošedým neb zelenošedým magmatem</p> <p>b) s bezbarvým magmatem</p> <p>c) bez zřejmého, sklovitého magmatu.</p> <p>2. obecné čediče živcové (v užším smyslu)</p> <p>a) s nahnědlým, trichity bohatým magmatem (sem patří čediče anorthitové)</p> <p>b) s magmatem šedobílým více méně mikrolity bohatým aneb práškovitě zrnitým (čediče oligoklasové).</p> <p>3. čediče andesitové (z části fonolitové)</p> <p>a) zrnité (doleritické)</p> <p>b) porfýrické (tím, že tu vynikají deskovité krystalky oligoklasu)</p> <p>c) velmi jemnozrné a kryst. celistvé</p> <p>α) v živci bohaté</p> <p>β) v hauynu „</p> <p>γ) v leucitu „</p> | <p>a) s převládajícím živcem</p> <p>b) s převládajícím noseanem</p> <p>c) s převládajícím nefelinem (nefelinity anamesitové a doleritové).</p> |                         |

### Skrytý sloh hmoty základní.

Z toho, co v předcházejícím, pojednání o rázu hmoty základní řečeno bylo, jde na jevo, že zvláštnost skrytého slohu čedičové základní hmoty na tom především závisí, v jakém množství a jaké povahy jest magma, jež v základní hmotě více neb méně krystalicky neb co sklo jest vyvinuto, jakož i na způsobu, jakým jednotlivé mikroskopické součásti pomocí magmatu co tmele (cementu) spojeny jsou.

Velmi zajímavý jest zvláštní onen způsob vývinu hmoty základní jenž se *skrytým proudovým slohem* zove a v tom záleží, že drobné krystalické součástky magmatu v podobě proudů jsou uloženy. Sloh tento jest zřejmým toho dokladem, že v tuhnuoucím sklovitém magmatu, které ponejvíce již většimi vyloučeními krystaly opatřeno bylo, veškeré drobné krystalky, mikrolithy a vlásky v rozmanitých byly pohybech.

Dle obdoby mikroskopického rázu broušených skel, v kterých kolem větších krystalových zrn vyloučeny bývají pásy, proudy a jako nárazem a rozstříknutím rozprášená hejna velmi malých krystalických výtvorů, jeví tolikéž mnohé broušené lístky čedičů překrásné proudy a vlny menších krystalů, mikrolithů a vlásků, jež bývají dílem kolem velkých krystalů amfibolových, augitových aneb olivinových,

dílem kolem stěsnaných shluků rozmanitých součástí hmoty čedičové uloženy; v těchto pak převládá jedna součást, ponejvíce magnetit neb augit. Začasté jsou větší krystaly, v základní hmotě porfyricky vystupující, aneb shluky stěsnaných krystalů dvěma proudy drobných mikrolithů v podobě ok uzavřeny (ku př. krystaly amfibolu v čediči od Veršetína; pak shluky, sestávající většinou z magnetitu a augitu v čediči deskovitém z Dubic) — a při tom bývají pásy mikrolithů, dotýkajících se bezprostředně uzavřeného krystalu, nejhustěji stěsnány — aneb se rozšiřují pruhy mikrolithů v podobě proudů, vějířovitě se rozbíhajících aneb jeví zvláštní uložení podobné rozstříknutí, jež povstalo prudkým nárazem proudu mikrolitového na větší krystaly, které vlivem své tíže vzdorovaly návalu drobných částic krystalických.

Nad míru krásný sloh proudový jeví se na některých místech čediče melafyrového z Vinohradu u Vartmberka. Již pouhým okem lze pozorovati na lístku broušeném zvláštní hedvábný lesk a nálet ledovému květu na oknech podobný; pod mikroskopem pak vystupuje tu překrásná úprava v uložení hustě stlačených bezbarvých tyčinek živcových kolem zaokrouhlených, oválních, větvenovitých neb pruhovitých shluků, které skrovným pouze množstvím sklovitého magmatu zkaleny jsou a z neúplně vytvořených slitých plastovitých krystalů augitu se skládají.

V čedičích, vyznačujících se takovýmto slohem proudovým vyskytují se někdy (přec však dosti zřídka) větší rozbité krystaly, neb úlomky a kousky, k sobě náležející, jež v broušeném lístku nebývají od sebe daleko vzdáleny, aneb tak jsou od sebe odděleny, že jen tenký proud příčně uložených mikrolithů mezi nimi vtlačen bývá. Takovéto mikrolithové proudy mezi úlomky větších krystalů vyskytují se ponejvíce v čedičích andesitových a fonolithových (ku př. z Dubic, Košťálu, Vrabince), ale vždy jen co vzácnost.

## I. Čedič magmatový.

Třída čediče magmatového obsahuje veškeré ony šedočerné a černošedé odrůdy čedičové, jichž velmi jemnozrná nebo krystalicky čelistvá základní hmota pouze z augitu, magnetitu a beztvarného magmatu se skládá. Jen v některých sporých případech vyskytují se také (však velmi skrovně) tyčinky živcové nebo krystalky nefelinové, někdy i stopy po průřezích leucitových.

Dle rázu magmatu rozpadá se čedič magmatový na

1. tmavou odrůdu, obsahující nahnědlé a vlásky čili trichity bohaté sklo co tmel krystalických součástí a

2. světlou odrůdu, obsahující sklovitý tmel (cement) mikrolity bohatý, více méně zrnitý, našedivělý, žlutobílý neb špinavě zelený.

### 1. Tmavá odrůda čediče magmatového.

Čedič této odrůdy má základní hmotu černošedou nebo šedočernou, jež zvětráním se stává žlutošedou; dle svého zjevného slohu dělí se pak na čedič

a) porfyrický, v němž vystupují zrnka olivinu, augitu nebo hypersthenu, a na čedič

b) krystalicky celistvý.

Dle skrytého slohu základní hmoty jest první (1 a) buď

α) sklovitě-porfyrický, převládá-li sklovité magma; jako v čediči z Králičí hory u Mirešovic, ze Sviňského vrchu u Svinčic, z Zinkensteinnu, Kohlberku u Milešova; buď

β) sklovitě-zrnitý, v něm sklovité magma a krystalické součásti stejně jsou rozšířeny, jako v čediči z Kamýku u Všechlap, z Dreiberku, Srbska a ze žíly Spojilské u Pardubic; buď

γ) slohu smíšeného, má nestejný sloh na různých místech broušeného lístku; tento mívá i velmi sporý nefelin a trojklonný živec (čedič z Holé skály u České Lípy).

Čedič krystalicky celistvý jest dle skrytého slohu buď

α) sklovitě porfyrický (čedič od Skalky, z Maršnerova lesa), buď

β) sklovitě zrnitý (čedič ze Šenkelberku u Kozlů, od Bořislavi, ze hřbetu Paskapole, ze Šeblova lomu u Jablonného.

Porfyrický a vlásky č. trichity bohatý čedič magmatový má hojná (porfyricky vystupující) zrnka olivinu, někdy i augitu nebo hypersthenu; ale v krystalicky celistvém a vlásky trichitovými bohatém čediči magmatovém jsou zřejmé vyloučeníy sporé aneb scházejí docela.

Asi za čtyřstového zvětšení okazují broušené lístky jejich, že základní hmota se skládá z více méně převládajícího magmatu, z hromádek krystalů augitových a ze stejně rozdělených zrněk magnetitových. Magma jest na nejtenčích místech a v úzkých pásmech okolo krystalů augitových téměř čisté neb jen slabě nažloutlé aneb nahnědlé, avšak na velmi četných, krystalů augitových vzdálenějších místech jest kalné a tmavěji (hnědě) zbarvené. Toto temné zbarvení a skalení pochází od jemného, hnědočerného prášku, od tmavých jehliček, vlásků a podobných výtvorů v magmatu roztroušených. Ony temné body a jehličky jsou dlesem nepravidelně rozšířeny (rozprášeny), dlesem jsou ve více méně kyprých, skoro rovnoběžných řadách nebo kruzích uloženy vlásky pak kupí se buď v chomáčích, buď v pírých neb stromkům podobných tvarech, neb ve vlnatých hromádkách; vedle těch vyskytují se mnohdy silnější, přímé, jehlicovité výtvary, jež zřejmě se objevují co kostry krystalů augitových. Řídčeji již patrný bývají bezbarvé tenké klínovité mikrolity, k nimž kolmo se druží rovnoběžné řady tmavých zrněk práškových. Četná místa rozmanitých lístků broušených patrně dokazují, že tato nahnědlá hmota sklovitá přeměnou svou nabývá barvy citronové aneb téměř pomerančové, při čemž vrostlé výtvary trichitové mizí. Že přede všemi součástkami čediče ony původně černé výtvary vláskové, železem bohaté, nejprve proměně podléhají, o tom svědčí úzké nahnědlé obruby jejich, jež vždy více se rozplývajíce barví sousední magma (zprvu hnědě, pak žlutě); pokračuje-li přeměna dále, tu vystupuje v magmatu, které již nabylo barvy temnožluté, zvláštní sferoidicky miskovitý a konečně paprskovitý sloh, jímž přeměna v zeolity zřejmě jest vyznačena. Postupnou tuto proměnu magmatu v zeolity objasňuje nejpatrněji čedič od Skalky. Vyskytují se v něm (ponejvíce poblíže vyloučenin zeolitických) přechetné sferoidické výtvary, jež — skládajíce se z kroužků (6—10) soustředných, kalně naředivělých, zelenavě žlutých, vlnitě vláknitých a pak téměř bezbarvých — v polarizovaném světle v opačném poměru temné a světle se jeví, a někdy i temný kříž štětce uka-

zují; touto proměnou stalo se ono beztvorné magma krystalickým. Na místech blízkých vyloučeninám zeolitovým vystupuje poněkud sloh paprskovitě vláknitý, kterýž svým dalším vytvořením nastiňuje přechod k výtvarům zeolitovým.

Z chemického rozboru čediče magmatového od Skalky vychází na jevo i chemický ráz magmatu samého; jest sloučenství jeho velmi blízké směsi nefelinu a anorthitu.

Značné odstíny barev na místech vlásky bohatých a chudých poukazují k tomu, že zbarvení magmatu sklovitého jen od roztroušených nahnědlé černých výtvarů vláskových pochází. Směry větších zřejmě kostrovitých výtvarů svědčí o těchto, že jsou kostry krystalů augitových; tož, zdá se, že platí zároveň o mnohých výtvorech vláskových. Pozorujeme-li však, jak snadno tato vlásková tělíska magmatu se rozkládají, a povážíme-li dále, že ono nahnědlé (a vlásky bohaté) magma přeměnou barvy žluté nabývají vlásků pozbývá, tož zajisté doznati můžeme, že největší část těchto jemných výtvarů vláskových dílem železu magnetovému, v haematit již částečně proměněnému, dílem železu titanovému náleží. Velice pravdě se podobá, že již v nahnědlém zbarvení magmatu první stupeň přeměny oněch původně černých a úplně temných tělísek vláskových se značí, a že dokud tělíska magmatová nebyla porušena, i magma samo bezbarvé bylo. A právě tento úkaz, že ony vláskové výtvary v bezbarvém magmatu úplně černě se jeví, poskytuje nám čedič melafyrový od sv. Ivana.

Hutnost temných čedičů magmatových dle určení čerstvého čediče ze Sviňského vrchu a čediče od Bořislavi = 2·896—2·983.

Hutnost odrůdy č. od Skalky, která v přeměně magmatu již byla pokročila = 2·823.

Temné, vlásky bohaté čediče magmatové, jež zajisté velmi náhlým ochlazením utuhly, vyskytují se zvláště v střední části českého středohoří po levém břehu Labe, uzavírajíce čediče leucitové a peperinové aneb nedaleko vzdáleny jsouce čedičů těchto.

a) Čediče magmatové, temné, četnými, vynikajícími zrny olivinu, augitu neb hypersthenu porfyridé.

α) Mikroskopicky sklovitě-porfyrické (s převládajícím sklovitým magmatem).

#### *Čedič z Králičí hory u Mirešovic.*

Jihozápadně od Mirešovic zdvihá se nízký, holý, kuželovitý pahorek, skládající se z černošedého, zrnky olivinovými a hypersthenovými velmi bohatého čediče, jenž nemá sloupového slohu. Základní hmota čediče tohoto, krystalicky celistvá, jeví při 400 zvětšení převládající beztvornou nahnědlou hmotu, v níž jednotlivé augitové krystaly, zrna magnetitu a více méně volné shluky jejich téměř stejnoměrně jsou rozděleny. Magma toto bývá na nejtenších místech skoro bezbarvé, majíc jen slabý nástin do hněda; místa pak temnější jsou více méně nahnědlá.

Toto zbarvení pochází od velmi jemných, často sotva viditelných, černých neb hnědých teček a čárek, jež, buď ve více méně volných, skoro rovnoběžných řadách, v kruzích neb chomáčích, v přitých tvarech neb v podobě jemných koster

seřaděny bývají, a jsouce nestejně rozděleny, na různých místech více méně četně se objevují; na tenkých dlouhých, klínovitých mikrolitech, jež v sklovité hmotě tu a tam velmi spoře se vyskytují, seřaděny bývají téměř kolmo rovnoběžné řádky hnědočerných zrněk práškových.

Tato vesměs jemná těliska sklovité hmoty jsou výtvary trichitové, jež se poněkud považovati mohou buď za magnetit, který se již z části (na obvodu) v haematit neb limonit zaměnil neb za titánové železo, dle i za hostry mikrolitů augitových. Zvláště krásné jsou skupeniny větších tělísek trichitových, jež se skládají z dlouhých, hnědočerných, přímých a slabě ohnutých jehlic, seřaděných poněkud dle směru hran augitových.

V sklovité hmotě (v magmatu) bývají shluky krystalů augitových nestejně rozděleny a prostory mezi krystalickými shluky, jež pouhé magma vyplňuje, jsou poněkud nepravidelně omezeny; řidčeji podobají se tyto mnohoúhelníkům neb kruhům.

Pozoruhodné pro ráz hmoty sklovité jest též, že tato na místech, kde se dotýká bezprostředně krystalů augitových, téměř bezbarvou se jeví, postrádajíc úplně výtvarů vláskových; tyto však kupí se ve střední části dílců magmatových v největším množství, a tím se stává, že dílce tyto jsou velmi temné, ačkoliv zřejmých krystalů postrádají. Na některých málo místech pozorovaly se v magmatu velmi malé, skoro pravidelně osmihrané, světlejší dílečky, jež průřezům leucitovým se blíží.

Velmi četně vyskytují se velká (4—6 mm.) porfyrická zrna nerostů augitových a šedozelená, více méně kalná, vlnitě vláknitá zrna olivinová. Tato bývají obroubena věncem krystalů augitových, jež k hranám olivinu skoro rovnoběžně uloženy jsou.

#### *Čedič ze Sviňského vrchu u Svinčic (blíže Biliny.)*

Čedič tento, bohatý většími porfyrickými zrnky temnozeleného olivinu, i velmi četnými silně lesklými krystaly augitovými souhlasí v skrytém slohu své základní hmoty skoro úplně s čedičem hory Králičí.

Jeho sklovité, slabě nahnědlé magma nevykazuje sice tak velké množství teček, prášků a jemných vláskovitých výtvarů, (jehliček, pír a p.) jako ono z hory Králičí, za to však jsou v něm krystaly augitu a jich volné shluky téměř stejnoměrně rozděleny, tak že sklovité prostory bez augitu jen malé jsou a v menším množství se jeví.

Zvláště krásné jsou v čediči tomto skupeniny koster krystalových. Tyto skládají se z dlouhých a krátkých, přímých neb málo zakřivených, černohnědých jehlic jsou poněkud třemi určitými — průřezným hranám krystalů augitových rovnoběžnými — směry uloženy.

Takovéto kostry krystalové leží obyčejně na blízku průřezů olivinových, aneb jsou mezi tyto vtěsnány, aneb jimi všestranně omezeny. Úkaz takový nastiňuje Tab. I, obr. 2. Magmatový dílec, jenž kolem do kola olivinem uzavřen jest, obsahuje shluk velkých koster augitových, z nichž mnohé, jen částečně dvěma směry naznačeny, jiné téměř úplně uzavřeny, na první pohled rámeček z hran krystalů augitových představují. Mezi těmito kostrami augitovými uloženy jsou jednotlivé žlutozelené částice, jež jsouce slohu rovnoběžně vláknitého, dle i

vlnitého, na sloh přeměněných průřezů olivinových upomínají. Tomu nasvědčují i četné v těchže kostrovitých dílcích uzavřené průřezy zřejmých sice, ale neúplně vytvořených krystalů olivinových.

Větší, porfyricky vynikající, černozeleňá zrnka krystalová (hypersthen?) vykazují deskovité průřezy, které mají méně rovné omezení, a četnými, rovnoběžnými puklinkami jsou prostoupeny. Barva jejich bývá na okraji slabě nahnědlá, do vnitř světlejší. Vrostlic mikrolitových postrádají úplně, zato nacházejí se v nich četné řady porů plynových s bublinkami stálými i pohyblivými. Někdy vyskytují se v nich, poněvadž u vnitru průřezů, vrostlice nahnědlého sklovitého magmatu s četnými výtvary vláskovými a kostrami augitovými. Poněvadž tyto deskovité průřezy, dichroskopickou lupou pozorovány, dvojbarevné se jeví, při čemž světlo stejnou měrou se pohlcuje, tož, hledíce k vyznačeným vlastnostem, nejbližše hypersthenu položití je můžeme.

Určení hutnosti tohoto čediče dělo se na průběhách 3—5 grammů;

h. první průby = 2·896

h. druhé „ = 2·931 a

h. třetí „ = 2·983 (bohaté olivinem a hypersthenem).

Dle Reusse obnáší hutnost čediče olivinového ze Svinčic 3·000 <sup>1)</sup>

#### *Čedič ze Zinkensteinu u Kozlů.*

Základní hmota této horniny čedičové, v níž se porfyricky roztroušená zrna olivinu a mimo to i zrna nerostu, podobného hypersthenu, hojně objevují, podobá se při 400. zvětšení oné sklovité a vlásky bohaté základní hmotě čediče ze Svinčického vrchu, lišíc se podstatně tím, že vykazuje i sporé, bezbarvé dílečky, v nichž se dlouhé, bezbarvé a krátké našedivělé mikrolity nacházejí.

Sklovité, slabě nahnědlé, i hnědočerně zbarvené (jehlicemi a vlásky proniknuté) magma čediče z Zinkensteinu nebývá tolikéž chudé oněmi skupeninami kostrovitými, jaké v čedičích Mirešovickém a Svinčickém se vyskytují.

Sporé, úplně bezbarvé dílečky, které z větší části malými, hmotě základní náležejícími krystalky augitovými omezeny jsou, bývají na okraji svém opatřeny jednotlivými, dlouhými, bezbarvými jehlicemi, u vnitru svém obsahují pak shluky krátkých mikrolitů augitových, asi tak, jak to vidáme v průřezích leucitových.

Velké šedobílé neb slabě nahnědlé desky hypersthenové jsou poněvadž ostřeji omezené, čisté, mikrolitů prosté, a na okraji, kde se velmi jemné a husté rýhování jeví, malými částicemi skla a řadami bublinek plynových opatřené. Vynikajíce též zvláštním leskem, jenž se slabě hedvábnému podobá, vykazují pouze jednotlivé, rovnoběžné brázdy. V některých těchto deskách objeveny byly též rovnoběžné řady velmi tenkých, zelenožlutých, sklovitých proužků.

#### *Sloupovitý čedič z Kohlberku u Milešova*

řadí se skrytým slohem svým k čediči Svinčickému.

Ve volné směsi malých krystalů augitových, v níž zároveň četné větší krystaly

<sup>1)</sup> Umgebung v. Teplitz u. B. 1870. S. 160.

olivinu umístěny jsou, vyskytuje se všude nahnědlá, prášky a načernalými výtvary vláskovými bohatá sklovitá hmota — dílem mezi krystaly vtěsnána, dílem malé krystalů prosté dílce zaujímajíc. Mnohá jasnější místa hmoty sklovité vyznačují se shluky větších výtvarů vláskových a zřejmých koster augitových; dílečky pak bezbarvé jsou velmi malé a mikrolithy velmi chudé.

Řídčeji nalézají se tutéž větší porfyrické desky hypersthenu, uzavírající v okraji svým množstvím jemných částíček sklovitých a bublinek plynových, za to však rozšířeny jsou velmi četně zcela bezbarvé průřezy olivinové.

Průřezy tyto, jsouce k štěpným směrům rovnoběžně rozpukané, obsahují zde onde částčky sklovité a bublinky plynové; mnohé z nich vyznačují se podélnými a vejčitými, spíše pruhům podobnými vrostlicemi hmoty čedičové s hmotou sklovitou, která začasť i do okraje krystalů olivinu hluboko vniká.

β) Mikroskopicky sklovitě-zrnité, temné čediče magmatové.

#### *Čedič z Kamýku u Všeclab*

srovnává se svým slohem skrytým s čedičem Sviňčickým.

Sklovitá hmota čediče tohoto, slabě nahnědle zbarvená, oplývá hojností tmavých zrnček práškových jakož i přímých neb zkřivených vlásků (jež všude mezi krystaly vtěsnány jsou a menší, krystalů prázdné prostory zaujímají) a obsahuje více méně husté skupiny menších krystalů augitových a četná pravidelně rozšířená zrna magnetitová. Jednotlivé větší (podlouhlé) porfyricky se jevící krystaly amfibolové nejsou hojné, naproti tomu však vyskytují se u velikém množství větší zeleno-bílé, z části i kalné krystaly olivinové.

#### *Čedič z Dreiberku*

při 400. zvětšení pozorován, skládá se z jemnozrné, husté směsi augitu, olivinu, magnetitu v nahnědlé hmotě sklovité, která všude mezi krystalky zřejmě vystupujíc i sama malé prostory ujímá.

Hmota tato jest na velmi četných místech více méně světlé, hnědé barvy obsahujíc jen malé temné body; nicméně objevují se v ní na četných místech skupiny temných černohnědých vlásků (výtvarů trichitových), jež ponejvíce v podobě hustých sítí neb chomáčů uloženy jsou. Co vrostlice v čediči tomto vyskytl se dílec v průměru asi 2 mm., jenž se skládal z volné směsi temných jehlic železa titanového, krátkých průřezů augitových a něco málo úplně bezbarvých (ve světle polarisovaném temných) průřezů leucitových.

#### *Čedič od Srbska*

objevuje se při 400. zvětšení co hustá směs, skládající se z augitu, magnetitu jakož i z jednotlivých porfyricky vystupujících krystalů olivinových a augitových. Mezi těmito krystalickými součástkami vězí temnohnědá, práškovitě vláknitá,



na nejtenších místech jen prosvitavá hmota skelná, která jen na sporých místech nepatrné dílce sama ujímá.

*Sloupový čedič ze žíly Spořilské u Pardubic*

obsahuje velmi četná makroskopická zrna olivinu, amphibolu a augitu. Jeho základní, krystalicky celistvá hmota skládá se z husté krystalové směsi převládajících drobných krystalů augitových, olivinových a přechetných magnetitových zrn v kalné, hnědošedé, místy nažloutlé neb nazelenalé sklovité hmotě. Živec trojklonný chybí. Přítomen-li sporý nefelin, nebylo lze pro nedostatečnou tenkost základní hmoty zjistiti.

γ) Temné čediče magmatové, nestejného slohu skrytého.

*Čedič temný, magmatový (známý svými hlízkami olivinu a broncitu) z Holého vrchu u České Lápy*

vykazuje při 400. zvětšení jemnozrnou směs krystalickou, která v hnědošedé, výtvořky vláskovými velmi hojné, sklovité hmotě rozdělena jsou, z augitu, magnetitu a olivinu se skládá.

Jen místy a v počtu nepatrném vyskytují se tuto krátké a podlouhlé obdélníky nefelinové, plné augitových mikrolithů, jichž vrostlice však jen zřídka pravidelně uloženy jsou; ještě spořeji jeví se zde dlouhé, tenké, bezbarvé, podélné průřezy, jichž větší počet v polarisovaném světle modravě zbarven pouze něco málo tmavých rýh jeví (trojkl. živec).

Místy jest hmota čedičová naskrze jemnozrná a tmavěji zbarvená — skládajíc se pouze z augitové a četnými vlásky propletené, nahnědlé hmoty sklovité.

V malém množství bývají tuto zastoupeny zakulacené, podlouhlé, nezřejmé mnohohranné konkrce, jichž rámce tvořeny bývají vždy temnější, velmi jemnozrnou a hustší hmotou čedičovou, prostoupenou četnými vlásky. Shluky tyto jsou ponějvíce složeny z větších, čistších krystalů augitových neb amfibolových, mezi nimiž vězí světlá hmota sklovitá. A valná část těchto krystalů augitových opatřena jest bublinkami plynovými, na nichž mnohdy pozorovati lze i obrysy augitové.

Takováto jedna ovální konkrce asi 2 mm. v průměru neskládá se z augitu, nýbrž z krátkých sloupků nefelinu, mezi nimiž vězí sklovitá hmota, bohatá jemnými vláskovými a pravidelnými kostrovými výtvořky tělisek černohnědých. Konkrce tato obroubena pak jest naskrze bezbarvým, asi 0.06 mm. širokým pasem, složeným z krátkých širokých obdélníků nefelinových a kolem pasu bezbarvého směstnána jest nahnědlá jemnozrná hmota čedičová.

Četné průřezy olivinové jsou ponejvíce šedobílé, a nepatrná část jich obsahuje vrostlice hmoty čedičové aneb práškovitou sklovitou hmotu.

Prerostanité a u velkém množství objevují se velmi krásné vytvořené temnohnědé výtvořky trichitové; na různých místech střídají se řasnaté, přité a kartáčovité výtvořky tyto s většími a patrnějšími kostrami augitu, jež se hustému mřížení

podobají. Celou pak hmotou čedičovou táhnou se tmavé jich shluky a pruhy, jeví se již pouhým okem v broušených lístcích co temné skvrny a proužky.

*b) Krystalicky celistvé, temné čediče magmatové.*

*a) sklovitě porfyrické.*

*Čedič z blízkého okolí Skalky.*

Z balvanu čedičového, ležícího u silnice mezi Veršetínem a Skalkou (blíže této) vzat byl úlomek k skoumání chemickému a mikroskopickému.

Čedičová tato hornina, jsouc naskrze velmi jemnozrná neb krystalicky celistvá, jest barvy temnošedé s nástinem do zelenošeda a obsahuje četná co hrách veliká zrna bělavá, jichž vnitro jehlicemi zeolitovými vyloženo bývá.

Lístky mikroskopické, skoumány při 400. zvětšení, vykazují skoro volné shluky krystalů augitových a u menším množství zrna magnetitová v převládající, ponejvíce žlutošedé, práškovité, sklovité hmotě, kteráž na mnoze hojně množství temných bodů, skvrn, jehlic a výtvorů vláskových obsahuje a na četných místech samostatné dílce bez augitu a magnetitu zaujímá.

Tato ponejvíce žlutošedá, kalná hmota sklovitá jest na místech, jež nejméně podlehla porušení, nahnědlá, obsahujíc velké množství výtvorů vláskových a koster krystalových; na místech pak zeolity bohatých neb poblíže hmoty infiltrační jest světlejší, barvy žlutavé a obsahuje jen velmi sporá tělíska vlásková. Na místech nejsvětlejších oné hmoty sklovité — která ponejvíce na blízkou okraje částic infiltračních nebo vyloučenin zeolitových se nacházejí — vystupují velmi četné sferoidické průřezy, jež skládají se z mnohých (6—10) soustředných, střídavě kalných, temně šedozelených a světlých šedobílých kroužků, které v polarisovaném světle opáčně temné a světlé se jeví a na mnoze též štětce tmavošedých paprsků v podobě kříže ukazují.

Tyto soustředné výtvary sferoidické vykládají často stěny četných dutin vyplněných co citron žlutou, uvnitř pak žlutobílou hmotou infiltrační (která jemnými kruhově vrstevnatými proužky se vyznamenává). Podobné tvary vypisuje Zirkel (str. 145. Basalte) co přeměny sklovité základní hmoty (magmatu) z čediče od Steinheimu. Pozorujeme-li sporé, na okraji šedozelené, uvnitř šedobílé, dosti zachovalé průřezy olivinu, musíme doznati, že výtvary sferoidické, výše vylíčené, nemohou býti zplodinami jejich, nýbrž že povstaly přeměnou onoho původně slabě nahnědlého, pak co citron žlutého a posléze vlnitě vláknitého magmatu; v další proměně sferoidických výtvorů jeví se postupné přechody k více méně zaokrouhleným částicím zeolitovým; neboť mimo soustředný sloh, vystupuje poněkud i sloh paprskovitě vláknitý a pakli tento nabyt převahy, mění se sferoidy v kruhy zeolitových paprsků. Jednotlivé tyto paprsky vynikají pak silněji a zřetelně vystupují již jehlice i krystaly zeolitové, jež vnikají do dutin, buď vyplněných hmotou infiltrační aneb zrušením její prázdných.

Tyto hojně vyloučeniny zeolitové, které, v rozmanitých stupních vyvinuty

jsouce, žádnému lístku nescházejí (a pak veliký podíl vody v čediči poutané) poukazují k tomu, že hornina čedičová v rozkladu svém již značně byla pokročila.

Mikroskopické krystaly augitu, barvy našedivělé, jsou ponejvíce mnohonásobně srostlé a každý z nich skládá se z četných menších krystalků, aneb je obsahuje u velkém množství co vrostlé — většinou ku hranám rovnoběžně ležící — mikrolithy.

Větší množství apatitu prozrazuje se hojnými, dlouhými a tenkými, bezbarvými průřezy podélnými, jakož i šesterečnými průřezy příčnými, jež se velmi často i co vrostlice vedle zrn magnetitových v průřezích augitových objevují.

Mimo tyto vyskytují se tu ještě sporé práškovité průřezy podélné asi takové co v čediči Slánském; bývají někdy rovnoběžně, podélně neb příčně rozpukané a náležejí nepochybně tolikéž apatitu.

Poleje-li se světlošedý prášek tohoto čediče nějakou kyselinou, tu pouští jednotlivé bublinky kyseliny uhličitě, aniž by šuměl. —

Broušené lístky čediče magmatového, kterýž v *Maršnerově lese u Sarlohu* v porfyrickém čediči žíly tvoří, (a jehož kus jsem ve sbírce českého musea nalezl) obsahují volné skupeniny podlouhlých krystalů augitových a něco málo zrn magnetitových, uložených v magmatu nepolarisujícím a v úplně kalnou žlutošedou hmotu přeměněném.

#### β) Sklovitě-zrnné, temné čediče magmatové.

##### *Krystalicky celistvý čedič z vrchu, nazvaného „Schenkelbergel“ u Kozlů*

jest hustá směs převládajícího augitu, pak magnetitu, jednotlivých zrn olivinových a sklovité hmoty, která mezi krystaly vtěsnána jsou, hnědošedou kalnou a temně šedohnědou barvu mívá a místy i hojně tmavé vlásky obsahuje. Pouze tu a tam objevují se zakulacené, skoro bezbarvé částice, jež — majíce stopy věnečků práškových i jednotlivých bezbarvých jehlic mikrolitových — průřezů leucitových připomínají.

Větší díl bezbarvých průřezů olivinových obsahuje vrostlice hmoty základní.

##### *Čedič od Bořislavi.*

Mikroskopické lístečky této kryst. celistvé, sloupkovité horniny čedičové, — z kteréž v lomu u silnice do Bořislavi vedoucí průba vzata jest — skládají se z převládající, nahnědlé hmoty sklovité, jež, obsahujíc četné černohnědé body, skvrny a husté pletivo jemných vlásek, malými krystalky augitovými a zrny magnetitovými hustě promíchána jest.

Slabě nazelenalé aneb žlutavě zbarvené, skoro i bezbarvé, menší dílce vyskytují se po skrovnu; bývají z větší části více méně okrouhlé a, souvisíce někdy co proud aneb co růženec, uzavírají jen sporé shluky menších mikrolitů augitových; nepochybně náležejí krystalkům leucitovým.

Bezbarvé tyčinkovité krystalky objevují se tuto u velmi skrovném počtu.

### *Sloupkovitý čedič z čerenu Paskapole*

má téměř tentýž skrytý sloh co předešlý, a liší se jen tím, že v základní hmotě jeho sporé, malé, kalné, zelenošedé a značně přeměněné krystaly olivinové patrný jsou. Neméně řídké bývají tu i bezbarvé, čisté částice, jež se infiltrační hmotě podobají.

### *Čedič z lomu Šoblova u Jablonce*

srovnává se poněkud s čedičem od Kuzova. V sklovité hmotě, která hojnými skupinami vlásků, prášku a jemnými mikrolithy světle hnědošedé barvy nabývá, rozprostraňují se menší a větší krystalky augitové — vyplňující téměř dvě třetiny celé hmoty čedičové — s řídkce rozděleným magnetitem a zrny titanového železa (ponejvíce v šesterečných průřezích). Jednotlivé, skoro bezbarvé (aneb šedobílé) průřezy olivinové vyskytují se v různé velikosti ale méně četně.

## 2. Světlé čediče magmatové,

obsahující šedo- neb žlutobílé, neb šedě nazelenalé, sklovité magma, jež jest bohaté mikrolithy, ale chudé tělisky trichitovými.

Dle skrytého slohu rozpadávají se na odrůdy

a) *sklovitě-zrnné*, mající téměř stejně rozdělené sklovité magma a kryst. součástky (Pšovany, Libčoves, Budy u Bakova, Starý Perštýn u Douby, Limberk u Vartenberka), a

b) *velmi bohaté augitem*, mezi nímž jen spoře vtěsnáno jest sklovité magma (Kuzov, Studná).

Světlé čediče magmatové, jež obsahují našedivělý, žlutobílý aneb špinavě zelený, více méně kalný, sklovitý tmel s četnými mikrolithy a sporými vlásky, jsou vesměs kryst. celistvé nebo velmi jemnozrné, (světle) černošedé odrůdy čedičové, které ponejvíce malé pahorky neb nižší hrbolaté břety skládají a k okrsku čedičů leucitových a nefelinových (na obvodu čedičového horstva) se připojují. Sklovitě zrnné odrůdy mívají velmi málo makroskopických, augitových neb olivinových krystalů; ale odrůdy bohaté augitem a chudé sklem vynikají často výměsky zrnné směsi olivinové (s bronzitem, diopsidem a t. d.)

Čím více vyvinuto jest magma — jež v sloučenství chemickém směsí nefelinu a anorthitu nejvíce se blíží — tím snáze rozkládají se čedičové tito; protož bývají bohatší vodou a uhličitany.

a) *Sklovitě-zrnné, světlé čediče magmatové.*

### *Čedič z vrchu Pšanského u Loun*

skládá se z husté směsi menších a větších krystalů augitových, uložené v šedobílém magmatu, kteráž, obsahující četné mikrolithy, jehlice a zrnné výtvořky práškové, mezi krystaly vtlačeno bývá.

Krystaly augitové jsou po většině rozpukané, žilkami druhotných hmot pro-

niklé a obsahují četné vrostlice krátkých tlustých mikrolithů augitových a zrnk magnetitových, z nichž ony po kraji a s hranami rovnoběžně nloženy bývají. Křžaté složky skládající se ze dvou i více jednotníků jsou dosti četné.

Sporé, mikroskopické průřezy olivinové jsou z největší části přeměněny v zelenožlutou, jemně vláknitou hmotu hadcovou, která podobajíc se řasnatému pasu, na okrajích průřezů příčných nejzřejměji se jeví.

Černé jehličky a vlásky, poněvče v skupinách, nejsou hojné; jehlice apatitové vyskytují se dosti četně. Pořídku jen objevují se tuto makroskopické desky biotitu.

V mnohých broušených listcích jsou hojné chomáčovité vyloučeniny, pocházející od gibbsitu, limonitem zbarveného, jakož i dílce hmoty infiltrační, která, vynikajíc klikatými vrstevnatými pruhy, na okraji nažloutlá, uvnitř bílá bývá a nepochybně poněvče z opalovité kyseliny křemičité se skládá. Hmota tato, rozvětvuajíc se na četných místech a objímajíc dílce čedičové hmoty, méně porušené, svědčí pokročilé proměně horniny.

#### *Čedič z Křžové hory u Libčovsi*

obsahuje jen sporá velmi malá zrnka olivinová, porfyricky se jeví. Zvětšen 400. vykazuje hustou, nestejně zrnitou směs krystalů, která se skládá výhradně z augitu, hojného olivinu a magnetitu; pouze tu a tam vyskytuje se také nefelin. Sklovitá hmota barvy šedobílé, všude mezi krystaly se nacházející, tvoří malé dílce a jest bohata mikrolity a jednoduchými výtvoři práškovými; na místech, kde větší dílce skládá, bývá více méně přeměněna. A následkem této přeměny objevují se hojné okrsky hmoty infiltrační, obroubené vlnitými vrstevnatými proužky, které na okraji zelenožlutě zbarveny, u vnitru pak téměř bezbarvé bývají.

V takovémto okrsku vyskytla se skupina malých, bezbarvých, plástovitě seřádných mnohoúhelníků (po většině osmiúhelníků), jež za průřezy jemnozrného vápence považují.

Krystaly augitové bývají rozmanité velikosti; průřezy olivinové jsou šedozelené, vláknité a kalné; průřezy, které buď nefelinu buď apatitu náležejí, objevují se co bezbarvé podélné obdélníky, jsou však sporé; příčné průřezy jejich tvoří pak ostře omezené šesterce.

#### *Čedič z lomu od Bud u Bakova*

objevuje se co směs větších a menších krystalů augitových a amfibolových, jakož i zrn magnetitových a železa titanového. Podélné průřezy amfibolové jsou našedivělé, rovnoběžně, hustě a jemně rýhované. Vedle augitické součásti největší díl zaujímá šedobílá, beztvorná hmota, ve které mimo méně hojné, kopinaté, nažloutlé a bezbarvé, dlouhé a jehlicovité mikrolity i jednotlivé černé přímé a křivé jehlice vláskovité se nalézají. Součást magnetitu podobná — méně hojná a stejně rozdělená — jeví se poněvče v šesterečných průřezích a patří po většině (nepochybně i s oněmi sporými vlásky) železu titanovému. Častěji vyskytují se malé bezbarvé šesterce a jich jehlicovité podélné průřezy, které apatitu náležejí. Větší, žlutě zelené, dílem i bezbarvé, prosvitavé průřezy s pravidelnými mnohostrannými obvody bývají

velmi četné; tyto mají jemný, vlnitě vláknitý sloh aneb jsou opatřeny na puklých plochách zoubkovaným třepením.

Jest to nepochybně olivin, jenž, dletem v hadec, dletem v krevet přeměněn, jemné, černé, přímé a křivé jehličky, krátké vlásky a body obsahuje, jež asi druhotné výtvoř jsou.

#### *Čedič od Starého Perštýnu u Douby*

souhlasí téměř zcela s čedičem vrchu Pšanského a liší se pouze tím od něho, že základní jeho hmota neobsahuje v takém množství výtvoř vláskové a mikrolity, nýbrž opatřena jest všude význačným, ponějvíce rovnoběžným (méně různým), jemně vláknitým slohem, čímž se přeměněným částicím nefelinovým velice podobá; obvody její nejsou však nikde zřejmé. V polarisovaném světle jest ponějvíce temná, jen na sporých místech prosvítá skrze ni barva namodralá. Součástka augitová zaujímá asi dvě třetiny celé hmoty čedičové. Napatrné, bezbarvé šesterce apatitu (a jehlice) bývají jen místy u větším množství.

#### *Čedič z Limberku u Vartenberku*

vyznačuje se co mák velkými zrnky augitu, které v broušených lístcích dosti četně porfyricky vynikají. Při 400. zvětšení jest zjevno, že se skládá z volné směsi krystalů augitu, magnetitu a malých zrn olivinových, která v slabě hnědošedém, na nejtenších místech skoro bezbarvém, sklovitém magmatu skoro stejně rozdělena jest. Tato sklovitá hmota obsahuje hojnost jehlicovitých mikrolitů, prášku a bodů, postrádá však patrných výtvořů vláskových. Krystaly augitové jsou vesměs podélné a dle způsobu rozdělení svého činí čedič tento podobným čediči Valečskému. V polarisovaném světle vynikají krystalky augitové z naskrze temného pole velmi ostře.

#### *Čedič od Rumburku*

jest podoben čediči z vrchu Pšanského a různí se toliko tím, že obsahuje místy velmi sporé jednotlivé aneb z více rovnoběžných jednotníků složené trojklonné tyčinky živcové, jež modravě šedě polarisují a více střídavě temných a světlých pruhů jeví. V témže velmi skrovném množství nacházejí se tuto i jemně omezené průřezy nefelinu.

Průřezy olivinové, ponějvíce barvy modravě zelenavé, jsou dosti četny, ale vesměs jemně vláknitě přeměněny. Mimo magma, jež, obsahující četné mikrolity, jehličky a výtvoř vláskové, v polarisovaném světle temnošedé aneb úplně černé se jeví, obsahuje pak čedič tento jen augit a méně četný magnetit.

δ) Světlé čediče magmatové, velmi bohaté augitem,  
obsahující jen sporé mezi krystaly vtěsnané sklovité magma.

#### *Čedič z Kusovy hory u Třeblic.*

Hornina tato, jsouc naskrze velmi jemnozrná, obsahuje hojná zrnka augitová a olivinová, porfyricky vyvinutá.

Základní hmota čediče tohoto jeví při 400. zvětšení směs větších i menších krystalů augitových, četného olivinu a stejně rozděleného magnetitu; směs tato jest uložena v sklovité hmotě, která, jen na některých sporých místech jsouc patrna, hnědo-šedé zbarvení má a hojně mikrolity, vlásky, prášky a jen místy sporé obdélníkové průřezy nefelinu obsahuje. Ještě méně jest jednotlivých, bezbarvých krystalků podoby tyčinkovitě.

Větší krystaly augitu, které porfyricky vynikají, podobají se krystalům z hory Košovské; mají význačný sloh miskovitý, barvu na zevním pásmu slabě karafiátově hnědou, uvnitř světlejší a objímají četné částčky sklovité a ztruskovitě, jež jsou buď uvnitř nahromaděny, aneb na okraji věnec tvoří.

Vyskytují se tu i příčné průřezy, skládající se naskrze z částic sklovitých, které pouze na okraji úzkým pruhem augitovým jsou omezeny. Téměř v každé sklovité částici bývá jedna neb i více bublin plynových uzavřeno, ano zdá se, že v některých i pohyblivé bezbarvé mikrolity se nacházejí. Ve vrstevnatých pásmech porfyrických krystalů augitových bývá mikrolitů velmi málo, aneb úplně chybí.

Větší průřezy olivinové jsou téměř bezbarvé, obláčkovitě a pouze na okraji zelenošedé a kalně vláknité; průřezy menší bývají celé zelenobílé a vláknité.

Mnohé větší průřezy olivinové uzavírají částice hmoty čedičové.

Mezi olivinovými krystaly vyskytují se dosti často (již pouhým okem patrně) šedobílé, slabě hedbávně lesklé desky, které vyznačují se velmi hustým a přímočarým rýhováním a buď bronzitu buď hypersthenu náležejí. Toto rýhování stává se buď četnými hranami proříznutých lamel buď protáhlými sklovitými proužky, ve kterých se i plynové bublinky nacházejí. V některých těchto průřezích (bronzitových neb hypersthenových) objevují se místo sklovitých proužků více méně husté řady temných bodců a prášků, jež jsou sklovité částice plynem vyplněné. Tento čedič obsahuje co pěst i co hlava velké hlízy, skládající se jen ze zrněk olivinových, desek bronzitových a sporých zrněk picotitu, magnetitu a železa titanového. Bezbarvé šesterce a jehlice apatitu jsou sporé.

#### *Čedič z jižního úpatí Sedla u Liběšic*

obsahuje velmi malá zrnka olivinu a augitu. Při 400 n. zvětšení vykazuje krystalovou směs, jež se skládá z augitu, asi tři čtvrtiny hmoty čedičové ujmajícího, ze sporého olivinu a stejně rozděleného magnetitu; mezi krystaly vtěsnáno jest hnědošedé, výtvoř vláskovými bohaté (v polarisovaném světle úplně temné) magma. Toto jest místy zřejměji vyvinuté, ale proměněné, majíc obrubu co citron žlutou a jsouc chudší práškovými výtvoř, v polarisovaném světle však úplně temné.

Trojklonné krystalky živcové vyskytují se velmi spoře.

#### *Čedič od Rychnova*

souhlasí skrytým slohem svým skoro úplně s čedičem Kuzovským. Jeho hnědošedé, zrnité práškovité magma nalezá se v hustém směsu krystalovém jen spoře vtěsnáno a vedle něho zaujímá augit více než tři čtvrtě celé hmoty čedičové. Hojně tu bývají zastoupeny průřezy větších bezbarvých krystalů olivinových, za to však jen velmi pořídku lze objeviti bezbarvé živcové tyčinky. Na některých málo místech

vynikají bezbarvé zaokrouhlené částice, jež, obsahující dokola uložené mikrolity, v polarisovaném světle co průřezy leucitu se jeví.

*Čedič z vých. úpatí zámeckého vrchu Friedlandského*

srovnává se skladbou svou s čedičem Ryhnovským.

*V čediči od Studné*

rozeznati lze augit, magnetit a nazelenalou základní hmotu, která v krystalové směsi spoře sice, ale stejnoměrně jest rozšířena.

## II. Čediče nefelinové.

Čediče nefelinové — jež, vyjímaje odrůdy doleritické, v obvodových pásmech českého horstva čedičového v podobě proudů, stropů a žil vystupují — zahrnují veškeré ony odrůdy čediče, které obsahují hojnost augitu neb amfibolu a magnetitu a v nichž živci podobná součást hmotou nefelinovou zastoupena jest. Ponejvíce mají čedičové tito též více méně leucitu, ale živec vyskytuje se buď velmi spoře aneb schází docela.

V čedičích nefelinových, krystalicky celistvých, bývá makroskopický olivin často v takovém množství rozšířen, že považovati je lze za odrůdy olivinem nejbohatší; ale v jemnozrných odrůdách bývá olivinu jen málo. Některé mají i nosean. Ze všech pak českých čedičových hornin vykazují čediče nefelinové (zejména noseanity) největší množství apatitu.

Hutnost českých čedičů nefelinových = 3·040—3·096 (dle sedmera určení; vyjímaje nefelinový dolerit ze Střekova, který v přeměně již pokročiv, má hutnost 2·839).

Dle rázu hmoty nefelinové rozpadají se na:

1) nefelinitoidy a 2) nefelinity.

### 1. Nefelinitoidy.

Nefelinitoidy jsou buď velmi jemnozrné buď krystalinicky celistvé, černošedé, (někdy světlejší s nástinem do hněda) odrůdy čedičové, jež, podobající se skrytým slohem svým čedičům nefelinovým, dílem i leucitovým, onu živci podobnou součást zvláštní bezbarvou (aneb slabě našedivélou nebo žlutobílou) hmotou zastoupenou mají, která ponejvíce žádných, zřejmě pravidelných obvodů a pravidelného uložení vrostlic nejví, však více méně modrobíle polarisuje.

Žeby polarisující část bezbarvé hmoty přeměnou z hmoty beztvarné se byla vyvinula, nelze připustiti, hledě k téměř čerstvému vzezření a k proměnám, jaké ukazují čediče magmatové; naproti tomu prozrazují však pravidelnější, obdélníkové a šesterečné obvody, jež jen místy, zvláště ale ve světle polarisovaném, poněkud zřejměji vystupují, že tato modravě polarisující část bezbarvé hmoty z méně do-



konale vytvořených podélných průřezů nefelinových se skládá, ona pak nepolarisující součást, která mnohdy převládá, že složena jest dílem z příčných průřezů nefelinových, dílem z méně dokonale omezené hmoty leucitové.

Tomu nasvědčují i chemicko-analytické výsledky (výklad chemického rozboru čediče ze Zajícova) srovnávající se s výsledky analytickými čedičů nefelinových.

Hutnost nefelinitoidů = 3·065—3·096 (dle trojho určení).

Nefelinitoidy řadí se lokálně dílem k čedičům leucitovým, dílem k nefelinitům a objevují se v nejzevnějším pásmu obvodovém hlavního proudu českého čedičového horstva.

a) (Velmi) jemnozrné nefelinitoidy (anamesity).

*Čedič (anamesit) z Vinařické hory.*

Naleziště toto vykazuje nazkrze jemnozrnou horninu čedičovou, která, byvši 400krát zvětšena, jeví bezbarvou hmotu, která z nezřejmě omezených mnohoúhelníků a z nečetných, krátkých obdélníků se skládá a větší, podélné, hustě nakupené krystaly amfibolu a zrnka magnetitu stejně rozdělená obsahuje.

Úplně bezbarvá tato hmota okazuje na velmi četných místech dílem nezřejmě omezené, modrobílé neb mdle modře polarisující obdélníky, dílem mnohoúhelníky, šestercům i osmercům podobné, poněkud s nerovnými hranami aneb s nepravidelnými obvodů; mnohoúhelníky tyto dotýkají se bezprostředně a obsahují četné, dlouhé a tenké mikrolity; krátké, šedé mikrolity scházejí zcela. Největší díl této hmoty je v polarisovaném světle úplně temný.

Částice temně polarisující, jež, skládajíce se z nezřejmých mnohoúhelníků, dlouhé tenké mikrolity obsahují, považují za méně vyvinutou hmotu leucitovou, ony pak sporé, krátké, modravě-šedě polarisující obdélníky, jakož i méně patrné šesterce, v témže množství se objevují, za nefelin.

Ne tak četné bývají průřezy nefelinové a apatitové, které na koncích tupými jehlanci a plochou spodovou uzavřeny jsou, řadami a vřetenovitými skupinami temných práškovitých zrn se vyznačují. Při bedlivějším pozorování bývá patrné, že právě ony podélné průřezy, jež zrnky práškovými jsou naplněny, nástin do hněda jeví, a zevně úplně bezbarvým velmi tenkým a ostře odděleným proužkem co bezbarvou téže hmoty vrstvou obroubeny jsou. S těmito souhlasí pravidelné šesterce, skoro bezbarvým pásmem obroubené, a na rozhraní svým hustým, do vnitra však řídkým práškem více méně vyplněné. Objevily se tu však i ostře omezené, hluboko a s rovnoběžnými hranami do sebe zasáhající šesterce, z nichž jeden řídkým práškem byl vyplněn, druhý pak sporými krátkými mikrolity co nefelin se vyznačoval.

Magnetit jest poněkud ve větších zrnech a v malých skupinách. Povšimnutí zasluhuje jedna taková skupina průřezů magnetitu, která v podobě velkého pravidelného trojúhelníka se objevuje, vnitro své čedičovou hmotou vyplňuje.

Nahnědlé malé destičky biotitu jakož i jich úlomky jsou velmi sporé; některé z nich pozorovány co vrostlice v amfibolu. Malé, spoře přicházející průřezy olivinové jsou dílem bílé a obláčkovité, dílem zelenožluté, žlutošedé a kalné.

Krystaly amfibolové — jež jsou skoro všude stejné velikosti, zelenožluté, jemně rýhované, a souhlasí s krystaly amfibolovými z čediče Řípského — zaujímají téměř polovici celé čedičové hmoty.

Hutnost (určená 18 gr.) = 3·096.

#### *Čedič z návrší Paškapole mezi Velminem a Bořislaví.*

V listcích tohoto čediče patrna jest pokročilá již přeměna. Skrytým slohem svým blíží se čediči leucitovému z Paškapole, v tom však hlavně od něho se různí, že při 400 nás. zvětšení mnohem hrubozrnější jest a že okrouhlé bezbarvé dílce, jež se považovati mohou za přeměněnou hmotu leucitovou, ne příliš četně objevuje; za to však vystupují tu v jemnozrné směsi krystalové dosti hojně, větší, široké obdélníky nefelinu, jež buď řídký nažloutlý prášek ponejvíce v rovnoběžných řadách sestavený obsahují aneb rovnoběžně a jemně vláknité jsou. Vedle četných desek rubelanových vyskytují se tu menší i větší průřezy olivinové. Jednotlivé dílce bývají dílem infiltrační hmotou vyplněny, dílem i v méně zřejmé paprskovitě vláknité, zeolitové výtvoře přeměněny.

#### *Čedič z malého vrchu „Hummelberg“ u Podbořan.*

srovnává se s čedičem z hřebenu „Paškapole“ jakož i s čedičem z Rané. Větší bezbarvé dílce bez určitých obvodů (nezřejmě obdélníkové aneb mnohoúhelníkové), dosti mocně vyvinuty, jsou buď jednotlivými jehlicovitými mikrolity opatřeny, buď v našedivělou, zrnitou hmotu přeměněny; dílem vykazují i jemnou, rovnoběžnou vláknitost. Vedle hnědošedých nazelenalých, místy zelených krystalů augitu, které s nečetnými zrny magnetitovými malé shluky tvoří, vyskytují se tu i jednotlivé makroskopické krystaly augitové.

Dostí četné jsou dlouhé bezbarvé jehlice krystalové, které bez odporu průřezům apatitovým náležejí. Tolikéž četné přicházejí tu průřezy barvy co oranž neb co citron žluté, jež, místy rovnoběžně jsouce rozpukané, podélnou a příčnou vláknitost jeví; mnohé z nich opatřeny jsou nepatrným množstvím hnědočerných, temných tělisek a takové náležejí nepochybně olivinu, jiné však mohou býti též melilitem. I malé úlomky biotitové nezřídka patrný jsou. Hrubší výtvoře trichitové (železo titanové) objevily se jen na jednom místě.

#### *V čediči augitem bohatém u Kysiblu blíže Langgrünü*

jeví se při 400. zvětšení hrubozrná směs z augitu, magnetitu a v té četná bezbarvá nebo slabě našedivělá neb nazelenalá místa, v nichž mimo chomáče dlouhých a silných jehlic i jednotlivé dlouhé, široké, bezbarvé průřezy pozorovati lze. Místa tato polarisují ponejvíce modravě aneb šedobíle.

Bezbarvé podélné průřezy bývají začasť i 2 mm. dlouhé a 0·03 mm. široké, na přič rozebrané a tím právě v kratší obdélníky oddělené; mimo jeden středem jdoucí, podélný, aneb několik tenkých rovnoběžných sklovitých proužků a něco málo plynových porů jsou beze všech jiných vrostlic. — Většina bývá jemně poprášena. Poněvadž temně modře polarisují, není pochybnosti, že náležejí buď apatitu neb nefelinu.

Na četných místech jeví se co citron žlutá hmota infiltrační, která se vyznačuje jemně vláknitými vrstevnatými a klikatými pruhy.

Krystaly augitové, 2—3 mm. dlouhé, postrádají zcela mikrolithů, jsouce uvnitru nažloutlé, na okraji (jenž ostře omezený a magnetitem osazený bývá) nahnědlé. Co vrostlice vyskytují se v nich jednotlivé sklovité částice a něco málo plynových porů a zrn magnetitových.

Hrubší, magnetitu podobná zrnka jeví se ponejvíce v podobě šesterců a bývají četné a pravidelně skupena.

#### *Čedič od Bejkova u Jenčovic*

srovnává se s čedičem hory Vinařické. Skládá se z větších krystalů amfibolových, zrn magnetitových a z bezbarvé, na zdání stejnorodé hmoty. Bezbarvá hmota jeví na četných místech méně zřejmé, obdélníkové a mnohoúhelníkové obvody, jež buď na nefelin, dílem i na leucit upomínají.

Ostré, světlé šesterce a jich jehlicovité, podélné průřezy, vyskytující se dosti četně, náležejí apatitu; vedle těch vystupují i kratší podélné průřezy, jež, jsouce tupě jehlancovitě zakončeny, jemně poprášeny bývají.

Větší, v hmotu hadcovou proměněné oliviny jsou hojné; za to však zřídka jen jeví se tuto červenošedé úlomky biotitu.

#### *Čedič z Velké Borné.*

Hornina tato jest velice přeměněna. V broušených lístcích rozeznávají se jen dlouhé volné krystaly augitu a amfibolu, a stejně rozdělená nečetná zrna magnetitová; ostatní hmota jest nažloutlá neb nahnědlá, anebo našedivělá a kalná. Světlejší dílce jeví ponejvíce pravouhelné a poněkud zřejmé šesteréčné obvody; jich hmota bývá však buď práškovitě kalná aneb jemně vláknitá, dílem i vrstevnatými pruhy (jako hmota infiltrační) vyznačena.

Porovnáme-li nezřetelné výtvořky tyto s výtvoři navráší Paškapole, Loukova a hory Klobouku u Benešova, tu podobá se pravdě, že světlejší, práškovité a vláknité dílce čediče tohoto jsou poslední výtvoři přeměněného nefelinu. Tyto kalné dílce jeví se ve světle polarisačním světle šedé.

Místy vyskytují se i dílce takové, jež obsahují nesmírné množství černých, krátkých, jehlicovitých, přímých, ohnutých, zlomených výtvořů trichitových (bez pochyby železo titanové) a uložením těchto písmu hebrejskému se podobají.

#### *Čedič z vrchu „Buchsäuerling“*

podobá se skrytým slohem svým nejvíce čediči z Vinařic jakož i čediči mezi Doupovem a Drmaly, jest však hruběji krystalický a bohatší augitem. Částice bezbarvé, nalezající se mezi průřezy augitovými, jsou na zdání téměř stejnorodé; avšak přihlížíme-li déle, seznáme, že skládají se místy dílem z přeměněného nefelinu, dílem z leucitu. Podélné průřezy nefelinu bývají jemně rovnoběžně vláknité a kalné, slabě nažloutlé aneb nazelenalé; i vodorovné průřezy jeho co šesterce poněkud se poznávají.

Povšimnutí zasluhuje poměrně velká hojnost apatitu, jehož jasné malé šesterce často po jedné plynové bublince, aneb nahnědlé okrouhlé nebo vejčité sklovité vrostlice obsahují.

*Čedič z vrchů Kühnelových u Nového Města blíže Žandova.*

Čedič tento podobaje se svým skrytým slohem čediči z Vinařic, jeví při 400. zvětšení hrubozrnější směs, skládající se z augitu, magnetitu, jednotlivých malých nazelenalých neb nahnědlých, přeměněných zrněk olivinových a z větších dílců hmoty skoro bezbarvé.

Dílce tyto, oplývající všude dlouhými tenkými bezbarvými jehlicemi, polarisují mdle modře a nemají na pohled určitého omezení; pozorujeme-li je bedlivěji, tu zříme místy, že bezbarvé ony dílce z méně pravidelných, pravouhelných průřezů podélných se skládají a hlavně na oněch místech vystupují, kde se byla proměnou vytvořila jemná, rovnoběžná, podélná vláknitost širokých obdélníků a nažloutlé zbarvení a zakalení hran průsečných.

V mnohém broušeném lístku jeví největší část oněch našedivělých, bílých aneb téměř bezbarvých dílců široké obdélníky, jež se na zdání z rovnoběžných bezbarvých jehlic skládají, upomínající na průřezy sodalitu z Vesuvu.

Velmi malé ostré šesterce apatitové a široké jeho jehlice jsou dosti četné.

Zrnka olivinová, vyskytující se čteně, jsou kalná, nazelenalá neb nahnědlá a dosahují velikosti máku.

*Čedič z hory „Grabberg“ u Beškab.*

Již lupou pozorovati lze v broušených lístcích tohoto jemnozrného čediče nescíslné množství nahnědlých, až 3 mm. dlouhých jehlic, černá zrna magnetitu, jakož i bezbarvé a nahnědlé skvrny.

Při 400. zvětšení objevuje se hrubozrná směs z velmi dlouhých, nahnědlých aneb zelenošedých, ponejvíce rýhovaných průřezů amfibolu (jež v polarisovaném světle mimo duhové i skvrny rozličné, pestře zbarvené lamely jeví) a z bezbarvých, skoro všude stejných dílců, v nichž zhusta nepravidelné obvody bezbarvé součásti pozorovati lze.

Na některých místech nalézají se krátké a široké, modravě neb žlutobíle polarisující obdélníky nefelinu, buď zřejměji omezené buď sporými krátkými pravouhelně uloženými mikrolity vyznačené. Temně polarisujících mnohostranných průřezů nebylo lze řádně skoumati, jelikož broušené lístky nedosáhly náležité tenkosti; nezdá se však, že by tu vedle nefelinu, sporého leucitu a nečetného apatitu i nějaká jiná bezbarvá součást se nacházela.

Zrna magnetitová jsou větší a méně hojná. Jediný veliký průřez olivinu, který se tu pozoroval, byl přeměněn v kalnou šedozelenou, krátce vláknitou hmotu.

*Čedič ze Sedla u Beškař*

400. zvětšen prozrazuje poněkud hrubozrnou směs amfibolu, magnetitu a nefelinu. Skrytým slohem podobá se čediči hory Vinařické, v tom hlavně se různě, že nefelin řidčeji se vyskytuje, amfibol však skoro  $\frac{2}{3}$  hmoty čedičové zaujímá.

Větší krystaly olivinu, zelenožluté, vlnité a kalné, vyskytují se pořádku. Mezi krystaly vězí hnědožlutá, v polarisujícím světle tmavá, základní hmota, která, vytvořena jsouc v malých dílcích a obyčejně v druhotné zelenožluté výtvoře přeměněna, vlnitými vrstevnatými pruhy se vyznačuje. Velmi malé bezbarvé šesterce apatitu, i do amfibolu vrostlé, nacházejí se po skrovnu.

*Čedič z Klobouku u Benešova*

obsahuje velmi četná, co špendlíková hlava veliká, na průřezu namodralé zelená zrna olivinová, blíže se rázem svým nefelinovému čediči z Paskapole.

Při 400. zvětšení jeví poněkud hrubozrnou směs augitu, amfibolu, nefelinu (jenž se rovná v množství součásti augitické), olivinu a magnetitu. Krystaly augitové jsou hnědošedé, a poněvíc mikrolithy a zrny magnetitovými bohaté; průřezy amfibolové jsou šedozelené a vrostlice prosté. Nefelin vyskytuje se v krátkých obdélnících a šesticích; obvody jejich nevynikají ostře, ale uložení mikrolithů augitových bývá význačné. Jen něco málo průřezů nefelinových jest bezbarvých, nejvíce jsou vláknité a slabě nažloutle zbarvené. Vyskytují se tu i větší vláknité dílce, v nichž se svazečky vláken pod různými úhly křížují; avšak přihlédneme-li k uložení mikrolithů, seznáme, že průřezy tyto náležejí shlukům nefelinovým. Mnohé z nich podobají se silně rýhované ploše živcové, avšak v polarisovaném světle jeví se vždy stejnorodé zbarvení, jen jediná plocha vykazovala ráz trojklonného živce. Větší bezbarvé pruhované dílce, v nichž ještě šesteréčné a krátce pravouhelné obrysy pozorovati lze, jsou tolikéž výtvoře přeměny nefelinu.

Větší průřezy olivinu bývají uvnitř hnědošedé a hrubě vláknité, na okraji však krásně modrozelené, začasť i jemným třepením opatřené. Co vrostlice bývají v nich sklovité částice a řídká zrna magnetitu; jen někdy vyskytne se i proužek hmoty čedičové; za to vyniká však největší jich část černými výtvoři trichitovými, které se jemným, přímým neb zakřiveným a rozmanitě propleteným jehlicím a vláskům podobají.

*Čedič z vrchu „na šibenici“ u Mšena*

řadí se skrytým slohem svým k čediči z Vinařic. Při 400. zv. objevuje hrubozrnou směs amfibolu, pak nezřejmě omezeného a modravě polarisujícího nefelinu a nepochybně i leucitu, mezi nimiž sporý nazelenalý kalný (přeměněný) sklovitý cement vězí. Zrna magnetitová jsou větší, ale stejně rozdělená. Kalná, vláknitá zrna olivinu jakož i jehlice apatitu vyskytují se spoře.

*Čedič z Chlomku u Doubravice.*

Čedič tento, zevnějškem i skrytým slohem svým velice podoben čediči Vinařickému, jest velice přeměněn. 400. zvětšen objevuje hrubozrnou směs amfibolu, augitu,

magnetitu s velmi sporými, zřejměji omezenými krystaly nefelinovými a s velmi četnými, bezbarvými dílci nezřejmějše obdélníkových a mnohoúhelníkových obvodů.

V polarisujícím světle jeví se dílce tyto buď úplně temné, buď namodrale šedé neb šedobílé a mnohé z nich nkazují již nenáhlým vystupováním paprskovitého slohu zárodky zeolitové.

Mnohé podélné průřezy amfibolu, v obyčejném světle čteně podél rýhované, jeví v polarisovaném světle různobarevné lamely, které pouze do třetiny neb polovice podélných průřezů sáhají. Zcela pravidelné, bezbarvé, příčné šesterečné průřezy jsou dosti hojné, jakož i k nim náležející až 3 mm. dlouhé podélné průřezy, jichž šířka až 0.1 mm. dosahuje. Tyto jehlicovité podélné průřezy, v nichž se skoro vždy protáhlé nahnědlé proužky vyskytují, jakož i jich příčné šesterečné průřezy náležejí bezpochyby apatitu, jenž by pak nejméně 4—6% obnášel; o oněch širších a kratších, pravoúhelných dílcích domnívám se, že patří nefelinu. I tyto bývají po délce rozštípané a poněkud nefelinu z Čertové zdi podobné; šedě nazelenalé neb nažloutlé, vláknité, přeměněné průřezy olivinu jsou dosti četné.

#### b) Krystalicky celistvé nefelinitoidy.

##### a) Z levého břehu Labe.

##### *Čedič od Rané.*

V černošedém čediči od Rané vynikají četná malá, nažloutlá a nazelenalá zrna olivinu, pak sporá zrnka magnetitu a železa titanového. Základní hmota skládá se z malých krystalků augitu, stejně rozdělených zrn magnetitu a z hmoty bezbarvé, skorem čiré, která místy dlouhými, tenkými mikrolithy protkána jsou, všude mezi krystaly zřejmě vystupuje, četné menší i větší nedokonalé obdélníkové (nefelin), mnohoúhelníkové, zakulacené a nepravidelné obrysy ukazuje a zde onde nepatrné stopy věnečků práškových (leucit) a zaokrouhlené shluky krystalků augitových uzavírá. Většinou jeví se bezbarvá hmota v polarisujícím světle modrobílá, mdle modrá a modrošedá, skládající se z krátkých obdélníků nefelinových a mikrolithů augitových, které ponejvíce nepravidelně nahromaděny jsou. Sporé tenké, bezbarvé tyčinky vyskytují se jen místy a velmi spíše. Průřezy řídkých, mikro-porfyricky vynikajících krystalů augitových mají význačný miskovitý sloh, jehož pásma na mnoze rozmanité odstíny barev ukazují. Nejčastěji jsou vniterní pásma nažloutlá neb červenobílá, okrajní pak karafiátově hnědá.

Průřezy olivinové bývají našedivělé aneb žlutozelené, často i modrozelené a ve vlnitá jemná vlákénka hadcové hmoty přeměněné. Svazečky vláken jejich jsou ponejvíce rovnoběžny se štěpnými směry, jevíce takto ozdobné přeměněné výtvořky.

##### *Skrytý sloh velmi jemnozrného čediče z vrchu „Vranek“ u Meronic*

souhlasí s čedičem od Rané. Bezbarvá jeho hmota, majíc hojnost tenkých, dlouhých mikrolithů, vyniká v krystalické směsi, jež se skládá z převládajícího augitu, větších krystalů olivinových, zrněk magnetitových a jednotlivých úlomků biotitu. Jen zde onde objevily se zřejmě šesterečné obvody bezbarvé hmoty ne-

felinové, jež byly též proniknuty dlouhými tenkými mikrolithy; mimo tyto vyskytly se i průřezy pravouhelné. Zajisté, že čedič tento, podobající se čediči od Rané, hlavně nefelin, nepochybně i nepatrné krystalky leucitové obsahuje. Živce v něm není.

### *Kryst. celistvý čedič od Lipen u Teplíc*

400. zvětšen, ukazuje jemnozrnou směs, která se skládá z převládajícího augitu, amfibolu, nezřetelně omezeného nefelinu, pak stejně rozděleného magnetitu, velmi četného olivinu, sporého trojklonného živce a bezbarvé (jen zde onde nažloutlé neb slabě nahnědlé) hmoty, která jsouc bohata mikrolithy, v polarisovaném světle temná jest (leucit).

Přihlížíme-li ke skrytému slohu čediče tohoto, podobá se poněkud čediči Košťálovskému a tímž tvoří odrůdu přechodní k čedičům fonolithovým.

Krátké krystaly augitové, slabě hnědošedé, jsou ve spojení s četnými podélnými krystaly amfibolovými, které též mikro-porfyricky vystupují, převládající součástí hmoty čedičové. Průřezy krystalů amfibolových bývají na okraji nahnědlé, v centralní části nazelenalé aneb žlutavé a obsahují množství sklovitých částíček a bublinek plynových.

Mimo augitickou součást převládá tuto nefelin; podélné jeho průřezy modravěšedě polarisující, jeví se co krátké podlouhlé, méně zřetelné obdélníky, jež poněkud pravidelným uložením velmi četných mikrolithů se vyznačují. Šesterečné příčné průřezy nefelinu nejsou též dosti zřejmé; nejmenší z nich bývají bezbarvé, většina pak obsahuje shluky augitových mikrolithů aneb hmoty čedičové v středu svém.

Podobné malé zaokrouhlené dílce, které skládají se z menších kruhů, četnými dlouhými, bezbarvými mikrolithy opatřených, náležejí méně vyvinutému leucitu.

### *Kryst. celistvý čedič z lomu u Bukova blíže Oustí*

obsahuje pouze malá makroskopická zrna olivinu. Základní hmota jeho jeví v šedobílé (výtvoř práškovými jakož i kopinatými jehlicemi bohaté) hmotě krystalickou směs převládajícího augitu s méně zřejmým nefelinem (jehož průřezy v polarisovaném světle jasněji vynikají) pak magnetitu, olivinu a sporých úlomků biotitových. Krátké trojklonné tyčinky živcové vyskytují se jen na sporých místech.

### *Čedič od Švýcarského mlýna mezi Božtěšicemi a Bukovem (sev. od Oustí)*

skládá se při 400. zvětšení z hrubších zrn augitu, olivinu a magnetitu s jemnozrným, méně zřejmě omezeným nefelinem a ze slabě nazelenalé šedé, poněkud kalné hmoty, která, obsahující krátké černé jehlice trichitové, dlouhé mikrolithy a práškové výtvoř, malé zřejmé průřezy leucitové uzavírá.

Průřezy nefelinové nezřejmě omezené bývají bohaté mikrolithy a temným práškem; průřezy augitové vyznačují se často vrostlicemi olivinu, které v polarizovaném světle jasnými barvami v popředí vystupují. Tyčinky živcové jsou velmi sporé.

*Kryst. celistvý čedič z lomu nad Habřím u Trmice*

obsahuje nepatrná zrnka olivinu a jeví při 400. zvětšení jemnozrnou směs převládajícího augitu (amfibolu), nezřetelně omezeného nefelinu, stejně rozděleného magnetitu a dost četných úlomků biotitových, pak bezbarvou hmotu poněkud bez určitého omezení. Krystalky augitové jsou vesměs malé, na hranách a rozích zaokrouhlené (začasté téměř vejčité). Bezbarvá součást čedičové hmoty, která vedle augitové součásti rozšířením vyniká, nebývá určité omezena a z větší části nepolarisuje. Na mnohých místech lze však přece pozorovati obdélníky a šestercům podobné mnohoúhelníky, které dleem úplně čisty jsou dleem jen sporé mikrolithy obsahují.

Příčné průřezy šesterčné, zcela pravidelné a ostrohrané, jen porůznu se vyskytující, vyznačují se miskovitým slohem a náležejí nepochybně apatitu, jenž i dost četné, dlouhé, jehlicovité průřezy přičistí se mohou. Dosti zhusta nacházejí se tu i malé, šedé úlomky biotitu, které hustým rýhováním na průsečných plochách hedvábný lesk jeví.

Průřezy olivinu jsou poněkud modrozelenavé, v četných puklinách nahnědlou kalnou hmotou opatřené a na postranních stěnách co tráva zeleným, krátce jemně vláknitým třepením obložené, tak že ozdobné tvary jeví.

Nazelenalá nebo žlutobílá, vrstevnatými čarami označená hmota infiltrační vyskytuje se pouze v malých dílečkách.

*Čedič z Honosické hory.*

Při 400. zvětšení vyniká v tomto velmi jemnozrném čediči více méně hustá směs malých krystalků augitu, četných porfyricky vystupujících krystalů amfibolu, jednotlivých malých krystalů olivinu, četných zrněk magnetitu a hojných větších a menších, dlouhými mikrolithy bohatých, více méně zaokrouhlených, bezbarvých dílců neurčitě omezených. Malé krystaly augitu nebo amfibolu, jichž množství převládá, bývají podlouhlé a obsahují četné mikrolithy.

Podélné průřezy větších krystalů amfibolu, kteréž porfyricky vynikají, jsou podél rýhované a obsahují četná zrna magnetitu a skla (zvláště na okraji). Zrna magnetitová, která poněkud v šestercích se jeví, jsou dleem na jednotlivých místech skupena, dleem v amfibolové hmotě stejně rozdělena; začasté bývá krystal amfibolu zrna magnetitovými a sklovitými tak vyplněn, že hmota jeho pouze co tenká obruba se jeví. V jiných krystalech amfibolových bývá střední část, v níž se i skupiny sklovitých částic bez magnetitu vyskytují, modrozelenou barvou vyznačena a tímž odělena od pásma okrajního, jež buď našedivélou aneb slabě načervenalou barvou jakož i vrstevnatým slohem vyniká. Co vrostlice pozorován byl šesterčný průřez apatitu.



Vynikající podíl v skladbě tohoto čediče má ona bezbarvá, ponejvíce neurčitě omezená součást, která v polarisovaném světle jest dílem temná, dílem modrobílá neb mdle modrá. Mnohé dílce této součásti, oplývající na okraji dlouhými, tenkými mikrolithy, jsou téměř okrouhlé, jiné berou na se podobu šesti- a osmiúhelníků (se skupinami krátkých mikrolithů ve středu svém), postrádají však oněch věnců z temných práškových zrněk neb mikrolithů složených, jež pro čedič leucitový z blízkých nalezišť význačny jsou; jen tu a tam na menších, ponejvíce nažloutlých výtvorech objevily se též sporé, ale neúplně kruhové věnečky práškové. Na okraji některých těchto dílců bezbarvých uloženy jsou zřejmé obdélníky nefelinu, jež za- časté tím se vyznačují, že obsahují krátké, ku hranám rovnoběžně uložené mikro- lithy augitové. A výjev tento ukazuje právě k tomu, že i ony pravidelně omezené ale světle polarisující dílce součásti bezbarvé těmž nerostu náležejí.

Zrna magnetitu podobná jeví po většině průřezy šesterečné; mnohé z nich jsou temné, jiné nahnědle černé s hnědým kalným okrajem. A tyto jsou složeny z hustého pletiva temných jehlic. Malé hnědé, šestercům podobné průřezy a úlomky připočísti lze biotitu.

Olivin vyskytuje se tuto dosti spore ve větších nahnědle-žlutých, uvnitř šedo- zelených, vlnitě vláknitých průřezích, které v puklinách paprskovitě vláknité bývají.

### *Kryst. celistvý čedič ze Zajícova (Hanšpurk).*

Mezi Křesnem a Sedlcem táhne se řada vrchů čedičových (Zajícov, Jeřetín, Vysetec, Rohatec) z nichž toliko Zajícov se zříceninami hradu Hanšpurku nad krajinou daleko vyčnívá. Hora „Zajícov“ skládá se téměř z kolmých, k vrcholi svému mírně skloněných, v průměru 1' tlustých sloupů, na úpatí pak obložena jest slepenci čedičovými.

V šedočerné, krystalicky celistvé hornině čedičové zřítí lze pouze malá zrnka olivinu; použije-li se však 400. zvětšení, tu jeví broušené lístky velmi jemno- zrnou směs převládajících hnědošedých krystalků augitu, stejně rozdělených zrněk magnetitu a železa titanového, jakož i malých průřezů olivinových a sporých úlomků biotitu, mezi nimiž tu i tam bezbarvá hmota v malém množství vyniká, která na některých místech velmi bohatá jest dlouhými tenkými mikrolithy.

Tato hmota bezbarvá má ponejvíce obrysy zaokrouhlené, aneb krátce obdélníkové (nefelin), a bývá vyvinuta zvláště kolem větších průřezů krystalových. Místy lze v ní pozorovati zřejmější mnohoúhelníky i velmi malé osmerce a úplně temné věnečky práškové (leucit). Poněvadž tyto dlouhými tenkými mikrolithy bohaté, zaokrouhlené dílce v stejné míře v čedičích leucitových se objevují, mohou se považovati za hmotu leucitovou, která nemá omezení zcela určitého, ony pak příčné obdélníkové průřezy s krátkými (augitovými) mikrolithy mohou se toliko nefelinu připočísti. Velmi spore vystupují tu porfyricky jednotlivé větší krystaly augitu. Krystaly tyto, obsahující vrostlice mikrolithů augitových, řídčeji apatit (bezbarvé šesterce), zrna magnetitová a sklovité dílce, jeví patrný miskovitý sloh; mnohdy vyskytují se tuto i větší krystaly augitové, které tím právě, že na jednom konci neúplně vytvořeny jsou, ve více malých krystalů vybíhají. Více krystalů augitových

bývá někdy tak uloženo, že skládají rámec většího krystalu augitového, jenž uzavírá drobnější čedičovou hmotu, hlavně magnetitem bohatou. Četná zrna magnetitu a železa titanového, vyskytující se nejhojněji v průřezích šestercečných, bývají nahnědlými, prosvitavými krystalky augitu proniklé, aneb nahnědlým pásmem omezené, rozbíhající se na okrajích v jehlice a vlákna (jako v čediči od Rané a z Honosické hory); jiné obsahují buď vrostlice bezbarvých krystalků apatitových (bezbarvé šesterce), aneb jsou tenkým bezbarvým ostrohraným pásmem ověncené.

Olivin, vyskytující se dosti hojně, tvoří ponejvíce pravidelné průřezy. Menší průřezy olivinu jsou bílé, obláčkové s kalným, temnozeleným okrajem, aneb v šedo-zelené, ponejvíce rovnoběžné svazečky a vlákna přeměněné; větší průřezy olivinu bývají rozděleny kalnými, zelenavými a nažloutlými pruhy (hmoty serpentinu podobné, uložené do štěrbin směrů štěpných) ve světlá pole, jichž omezení nejčastěji se směry krystalovými se srovnává. Jehlice apatitu vyskytují se řídceji.

Tu a tam lze pozorovati hromádky kostrovité aneb jednotlivé přímé nebo křivé výtvary trichitové.

Po 48hodinném leptání kyselinou solnou objevily se krystaly olivinu, jakož i bezbarvá hmota zřejmě porušeny. Kalné, zelenožluté okraje příčných průřezů olivinu staly se světlejšími; z pruhovitých puklin, jichž klikaté stěny zřejmě se okázaly, z většiny odstraněna jest serpentinu podobná hmota a v některých příčných průřezích vynikly sklovité dílce a plynové pory s černými jehlicovitými výtvary. Vyluhováním bezbarvé hmoty zmizely ponejvíce mikrolithy a ty jež tu zbyly, staly se méně patrnými, za to vynikly mnohem patrněji na některých místech četné výtvary trichitové, vlásky a jehlice.

Temnošedý prášek tohoto čediče nešumí v kyselinách; pálením nabývá barvy žlutošedé.

#### *Čedič z hory Blaníku (blíže Zajícova)*

ukazuje při 400. zvětšení velmi jemnozrnou směs převládajícího augitu a zrn olivinu; ostatně srovnává se skrytý jeho sloh se slohem čediče z blízkého Zajícova.

#### *Kryst. celistvý čedič z Loboše u Lovosic.*

Čedič tento souhlasí téměř s čedičem ze Zajícova, toliko v tom se od něho různí, že krystalická směs jeho jest mnohem jemnozrnější.

Oběma nemálo podobá se jedna odrůda z blízkého *Veršetínu*, druhá pak odrůda z téhož vrchu (nepochybně z čeřenu) náleží však čedičům andesitovým.

#### *β) Z pravého břehu Labe.*

*Kryst. celistvý čedič ze severozáp. svahu Radobyli (blíže Michalovic) u Litoměřic* srovnává se skrytým slohem svým částečně s čedičem od Rané.

Všude v něm převládá hmota bezbarvá, neurčitě omezená, po většině modravě

polarisující, jež obsahuje na mnohých místech sporé dlouhé mikrolithy, vtroušené bez všelikého pravidelného uspořádání.

Součást augitická je dvojí velikosti: shluky menších krystalků objímají ponejvíce nezřejmě omezené, krátce pravoúhelné neb mnohoúhelné dílce bezbarvé hmoty, jiné vyskytují se pak osamotnělé, mikroporfyricky vystupující. Nahnědle obroubená, bezbarvá zrna olivinu nejsou četná.

Z okolí *Dlažkovic* zkoumány byly dvě odrůdy čedičové. Jedna podobá se nefelin. čediči z Veršetinu, druhá pak srovnává se s oněmi čediči, jež místo živcové součásti nahnědlé sklovité magma obsahují (temné čediče magmatové).

### *Kryst. celistvý čedič z vysoké Ovčí hory*

s četnými, co špendlíková hlava velkými zrny olivinu a augitu, jeví naskrze jemnozrnou směs augitu, magnetitu a malých bezbarvých okrouhlých neb nezřejmě krátce pravoúhelných dílců, jež v polarisovaném světle dílem namodralé neb nahnědlé, dílem zcela temné se jeví. Dílce tyto, obsahující jen něco málo mikrolithů, náležejí nepochybov z části nefelinu z části i leucitu. Nahnědlé průřezy augitu obsahují četné dílce sklovité a protáhlé (proužkovité) plynové pory.

### *Kryst. celistvý, šedočerný čedič pod vrcholem Lípové hory u Housky.*

Velmi jemnozrná směs čediče tohoto, již při 400. zvětšení pozorovati lze, skládá se výhradně z augitu, méně zřejmého nefelinu a leucitu jakož i ze stejně rozděleného magnetitu. Bezbarvé nerosty, neukazující určitého omezení, poznávají se poněkud snáze jen kolem mikroporfyrických průřezů olivinu. Živec, jak se zdá, úplně schází.

### *Kryst. celistvý čedič od Svárova.*

jeví pouhému oku pouze nepatrná zrna olivinu; při 400. zvětšení okazuje však hustou směs převládajícího augitu (jenž více než  $\frac{2}{3}$  čedičové hmoty zaujímá), velmi drobného, bezbarvého, méně zřejmě pravoúhelného, modravě polarisujícího nefelinu a dílečků více méně zakulacených, které obsahují hojnost dlouhých bezbarvých mikrolithů (leucit), pak směs krystalů olivinových a četných zrn magnetitu, stejně rozdělených. Některé z největších žlutozelených a kalných průřezů olivinových jeví podobné sferoidické, proměnou vzniklé tvary, jakéž Zirkel v díle svém „Basaltgesteine“ v obr. 49. vyobrazil.

## 2. Nefelinity.

Nefelinity prostírají se v pásmech na obvodu čedičového horstva v Čechách, berouce se směrem hlavního pásma od JZ—SV, a řadí se dílem k nefelinitoidům dílem k čedičům leucitovým.

Nefelinity tvoří stejně zrnitou směs krystalickou (začasté s porfyricky vystupujícími zrny olivinu), která se skládá z převládajícího augitu, pak z magnetitu (titanového železa) a nefelinu, jenž zřejmě omezen bývá a svými pravidelně uloženými vrostlicemi mikrolithů se vyznačuje. K tomutěž řadí se dosti zhusta více méně leucitu, řídčeji i noseanu.

Jen v krystalicky celistvých odrůdách nejsou obrysy průřezů nefelinových vždy dosti zřejmé, čímž právě přechody k nefelinitoidům se jeví. Tyto krystalicky celistvé odrůdy bývají olivinem velmi bohaty, oproti zřejměji zrnitým odrůdám, v nichž olivinu tím více ubývá, čím zrnitější stává se hornina čedičová. Úlomky biotitu nebývají hojné, přec však hojnější než v obec. čedičích živcových. V četných čedičích nefelinových vyskytuje se také nahnědlé, trichitové magma, jež buď v samostatných malých částicích stejně rozšířeno, buď v menším množství mezi krystaly vtěsnáno jest; mnohem častěji tvoří však bezbarvé neb šedobílé magma spory tmel, jímž se víří součásti krystalické.

Živce postrádají nefelinity úplně; toliko v některých vyskytují se sporé trojklonné tyčinky.

Hutnost = 2·839—3·095 (dle 5 určení).

Dle velikosti nerostných součástek lze nefelinity rozdělit:

- a) v zrnité (čedičové, nefelinové dolerity);
- b) (velmi) jemnozrné (anamesity), jež se opět dělí
  - α) v nefelinové anamesity,
  - β) v čedičové noseanity,
- c) kryst. celistvé nefelinity.

#### a) Zrnité nefelinity (čili nefelinové dolerity).

O zrnitých nefelinitech činí se zmínka ze tří nalezišť českého čedičového horstva.<sup>1)</sup>

- od Střekova blíže Oustí
- od Malého Března a
- od Těchlovic.

#### *Zrnitý nefelinit od Střekova.*

U zřícenin hradu Střekova, jež na fonolitovém kuželi stojí, nalezá se více odrůd čedičových. Jdeme-li z Ústí po vozové cestě ke zříceninám, seznáme, že celý levý svah hory, který až k onomu fonolitovému kuželi se táhne, ze samého šedočerného, olivinem bohatého čediče leucitového se skládá (o němž mezi čediči leucitovými se pojedná). Za prvním stavením na Střekově vede pěšina v levo od vozové cesty po lesnatém svahu, a na přič této pěšiny vystupují čtyři asi 2—3' široké žfly zrnitého nefelinitu (asi 15—20' od sebe vzdálené) skoro rovnoběžným směrem proti čerenu hory. Kusy zrnitého nefelinitu bývají s černošedým kryst. celistvým čedičem, v němž žfly ony vystoupily, pevně srostlé a z naplavenin lesnatých strání

<sup>1)</sup> Zirkels Petrographie II. 262.

vynikají balvany, které již dle pohledu co čedič andesitový určití se mohou. Nefelinit Střekovský jeví směs zrnitou, skládající se z nefelinu, amfibolu a sporého magnetitu. Ač se v něm velmi četné paprskovité zeolity nalézají, jest přec dosti pevný, ale značně přeměněný. Pouze v malých prostorách vynikají do vnitř co brk silné, šesterečné sloupky zelenošedého, neprůhledného nefelinu, jež tolikéž v částicích zeolithových uloženy bývají. Broušené lístky jeví směs z převládajícího, poněvadž však v mikroskopické svazečky zeolithové přeměněného nefelinu s amfibolem a něco málo magnetitu. V podélných průřezích nefelinových jsou po většině svazečky vláken s podélnou osou rovnoběžny, avšak v příčných průřezích se křížují v rozmanitých šikmých směrech. Četné bezbarvé šesterce, jakož i široké jehlice náleží apatitu. Přeměna horniny značně ovšem pokročila, jelikož i průřezy augitu na okraji rezavou barvou opatřeny jsou; vnitřek jest karfiatově hnědý neb slabě fialový. Sklovité částčky jsou v nich sporé a jeví se po většině co protáhlé a zakřivené proužky s bublinkami; zdá se, že mnohé z nich jsou prázdné, jiné obsahují plyny (bublinky stálé), některé sporé mají tekutiny (bublinky pohyblivé).

Hutnost = 2·830.

#### *Tak zvaný nefelinový dolerit od Malého Března*

z rokle mezi Leichenberkem a pohořím Březenským nenáleží sem, nýbrž zrnitým čedičům andesitovým, poněvadž obsahuje množství trojklonného živce a s horninou doleritickou od Roztok se srovnává.

#### *Tak zvaný dolerit od Těchlovic,*

který již svými sploštělými, porfyricky se jevícími krystaly znám jest, uvádí Zirkel (Basaltgesteine s. 158) za horninu leucitovou a vypisuje takto: „Velké augity jsou na průřezu nahnědlé, malé jehlicovité mikrolithy augitové, u velikém množství se vyskytující, jsou spíše nazelenalé. Po živci není tu ani stopy, avšak tolikéž i ne po olivinu; za to nalezá se tu něco nefelinu, jehož poměrně velké krystaly (až 0·2 mm. dl. a 0·13 mm. šir.) na krajích svých již barvy žluté nabyly a vláknitými se staly.“ Mimo to zmiňuje se Zirkel ještě o tak zv. nefelinovém doleritu od *Spansdorfu*; nefeliny jeho, dosahující i  $\frac{1}{2}$  mm. velikosti, bývají zcela kalné, špinavě hnědožluté a přeměněné, vedle nich vyskytují se pak dlouhé tyčinky krásně rýhovaného, trojklonného živce dosti hojně (Basaltgesteine S. 171.)

#### **b) Velmi jemnozrné nefelinity.**

##### **α) nefelinové anamesity.**

#### *Čedič z první Čertové zdi mezi Smržovem a Českou Lípou.*

V tomto velmi jemnozrném, černošedém čediči jsou nesčíslná, poněvadž co špendlíková hlavička veliká zrnka olivinu. Základní jeho hmota jeví při 400. zvětšení zrnitou směs, která se skládá z augitu, nefelinu, olivinu a jemnozrného magne-

titu; mezi krystaly nalezá se pak hnědošedá, kalná, práškovitá hmota, která obsahuje četné bezbarvé jehlice a toliko delším pozorováním zřejměji se jeví; právě touto hmotou stávají se světlejší součásti na stranách kalnými. Hmota tato polarisuje temnošedě, ukazujíc jen něco málo úplně temných míst. Velikostí jakož i množstvím vynikají první dvě součásti, totiž olivin a nefelin. Průřezy olivinu jsou uvnitř skoro bezbarvé, bílé, obláčekové, obsahující velmi hojné, větší plynové pory, začasť i nahnědlá těliska a něco málo tekutých bublinek, na obvodu pak kalné, temné, nazelenalé a žlutozelené. Větší takové průřezy bývají trhlinami protaženy, jež hmotou serpentínovou jsou vyplněny; avšak vyskytují se nezřídka i takové průřezy, jež v nazelenalá, rovnoběžná vlákna přeměněna jsou. Někdy objevují se v průřezích olivinových dílce hmoty serpentínové, již dosti přeměněné, nejen v trhlinách, ale i na okraji. Povšimnutí zasluhují mnohé plynové pory, jež tím hlavně se vyznačují, že každá z nich obsahuje vrostlici mikrolithovou a četná nahnědlá zrna prášková.

Zvláštní jsou průřezy nefelinové. Podélné průřezy, jež nehrubě ostře omezeny bývají, jevíce se co obdélníky 3 mm. dlouhé a 1 mm. široké, jsou na okraji vždy kalné s nástinem do zelenošeda, u vnitru svém mívají buď po jedné podélné puklině u prostřed, buď po dvou, řídčeji po více postranních podélných puklinách (k nimž se začasť jemné proužky a řádky práškové rovnoběžně řadí); do těchto puklin vniká začasť ona nazelenalá, sklovitá hmota rozličně hluboko, zúžujíc se do vnitru. Význačné jest v největší části průřezů nefelinových uložení velmi hojných, poněvíc podélných válcovitých mikrolithů, jež s hranami průsečnými rovnoběžně leží. U příčných hran podélných průřezů nahromaděny jsou mikrolithy, vesměs příčné ležící; dále od příčných hran vystupují mikrolithy podélné, tudíž rovnoběžně ku hlavní ose uložené. A tyto množí se, vnikajíce stupňovitě vždy hlouběji do krystalu, až ke středu podélných hran; tuto pak jsou nejhustěji a nejvíce nahromaděny. Podélné průřezy nefelinu jsou onou nazelenalou, kalnou hmotou poněvíc jen na okraji znečištěny, zvláště uprostřed podélných hran, čímž se bezbarvá hmota nefelinu tutěž sůžuje. Zde vyskytují se též nejdelší mikrolithy, jež jsou pokryty nahnědlými brvy, kteréž z jemných, krátkých vlákenek se skládají. Podobná nahnědlá vlákna, jakož i jemné výtvořky trichitové, patrně z magmatu pocházející, bývají na koncích podélných průřezů na přič uloženy. Průřezy nefelinové polarisují hnědošedě a hnědožlutě. Vrostlice plynových porů nejsou řídké. Věncem hustého prášku a zrnok magnetitových opatřený krystal leucitu našel se osamotnělý. Malé bezbarvé šesterce a dlouhé jehlice apatitu nalézají se spore. Podélné průřezy augitu barvy co karafiát hnědé bývají dle délky rýhované; příčné průřezy jejich jsou poněvíc osmerce, z nichž mnohé vynikajíce dutými úhly složkám náležejí.

#### *Nefelinit od Zabil (Pasek) u Českého Dubu*

srovnává se s čedičem Čertové zdi v té míře, že broušených lístků z obou míst rozeznati nelze.

#### *Nefelinit z Turského vrchu (Kühberg) u Nového sídku (blíže České Lípy)*

jeví hrubozrnější směs, skládající se z augitu, olivinu, velmi kalných průřezů nefelinových a stejně roztroušeného magnetitu; podobaje se čediči z Čertovy zdi různě

se hlavně v tom, že průřezy nefelinu jeho nejsou dosti význačné. Velmi hojně jsou v něm bezbarvé šesterce a dlouhé jehlice apatitu; začasť vyskytují se též vrstlice větších nazelenalých zrn olivinu do krystalů augitu.

### β) Noseanity.

Noseanity českého středohoří jsou velmi jemnozrné (anamesitové), tmavošedé, zelenavě šedé neb černošedé odrůdy čedičové, jež při 400. zvětšení jeví směr stejnoměrně krystalickou.

Ve všech převládá amfibol, obnášeje asi polovici celé hmoty čedičové. Podlouhlé, slabě nazelenalé krystaly jeho jsou na hranách a rozích slité. V čediči vrchu Milého a Dlouhého splývají krystaly amfibolové na četných místech v souvislý celek, tvořice mřížovité neb síťovité pletivo krystalů, v němž pak ostatní součástky, nefelín, nosean, magnetit skoro stejnou měrou rozděleny jsou.

Svým množstvím zaujímá nefelín druhé místo, obnášeje asi 30—40%. V čediči Slánské hory bývají jeho podélné průřezy po většině podlouhlé a vyznačují se rovnoběžnými řadami zrněk práškových; v čedičích ostatních nalezišť tvoří krátké obdélníky, vynikající pravidelně uloženými, krátkými mikrolithy.

Příčné průřezy noseanu převyšují velikostí svou pouze v čediči Slánské hory ostatní součásti. Magnetit bývá téměř stejně rozdělen, olivin objevuje se však ponejvíce jen v malých zrnkách a poskovnu.

Mimo to zřejmě lze pozorovati sklovitou hmotu, mezi krystaly spoře vtěsnanou; hmota tato tvoří pouze v čediči Řípském malé samostatné, nahnědlé dílce, jichž zbarvení od velmi jemných, ponejvíce práškovitých tělísek pochází.

### *Čedič z Řípu u Roudnice.*

Čedič tento složením svým jemnozrný, velmi pevný, barvy temnošedé, jeví pod mikroskopem (při 400. zvětšení) všude stejnou, krystalickou směs nefelinu, amfibolu a magnetitu s četnými většími krystaly noseanu, velmi hojným apatitem a nemnohými malými krystaly olivinu, mezi něž vtěsnána jest hmota sklovitá, nehrubě patrná. Nefelín, jenž množstvím svým amfibolu se skorem rovná, tvoří úplně bezbarvé, slabě omezené obdélníky a šesterce; v šestercích těchto, zvláště v jich středu nakupeny bývají nečetné, krátké, k průsečným hranám rovnoběžně uložené mikrolithy, jakož i plynové bublinky s temným okrajem a světlým středem.

Dlouhé krystaly, jež, silným podélným rýhováním se vyznačujíce, uvnitř slabě našedivěle, na okraji však žlutozeleně zbarveny jsou, náležejí amfibolu. Nebývají právě přímočarě omezeny, nýbrž mají okraj vlnitý, sklu podobný, v němž se pozoruje hojnost drobných částecek sklovitých a krátkých mikrolithů; vedle nich vyskytují se tuto kratší a širší, ostřeji omezené krystaly augitu, jež četné, menší, ku stranám rovnoběžně uložené a složkovitě srostlé jednotníky objímají. Větší, porfyricky vynikající krystaly amfibolu s četnými dílci sklovitými, do nichž začasť mikrolithy vnikají, jeví se jen porůznu.

Magnetit bývá v podobě malých, převahou šesterečných zrn stejně rozdělen;

některé z průřezů těchto prosvítají tu a tam černohnědě, jevíce tmavé, na hrany kolmo postavené jehlice aneb bývají na okraji rozštěpené. Četné a velmi pěkné průřezy noseanu, jež se v šesticích, osmercích, nejčastěji však co průřezy složek  $\infty O \{O\}$  jeví, vynikají širokou, modrošedou vnitřní plochou, která se skládá buď z více méně ostře omezené sítě dlouhých černých čar, pod určitými úhly se křížujících, buď ze směsi těchto temných zrn (bublinek, částic skla a černého prášku), jež jinde sestaveny jsou v síť křížujících se čar. Tato vnitřní plocha obložena je jedním, dvěma, neb i více temnými věnci (též hmoty jako vnitro) a na okraji skoro bezbarvým pasem.

Mnohé z těchto středních dílců jsou v poměru k temným věncům veliké a tvoří ponejvíce souvislé, více méně husté, přímočaré sítě; jiné skládají se z temných částic práškovitých a jevíce pouze malé dílce síťovité, bývají ve středu světlejší a světlejšími pruhy v temná mnohohraná pole rozděleny. V těchto světlejších pruzích lze začasť pozorovati krátké a dlouhé mikrolithy, jakož i protáhlé, určitými směry běžící sklovité částice s (pohyblivými) bublinkami. Že tyto sklovité částice, které se plynovými vrostlicemi zatemňují, v železu jsou bohaty, to patrně jest ze změny barvy v žlutou, červenou a hnědou, jež nabývají v postupu proměny své. V šesticích průřezích noseanu táhnou se temné čárky síťovité třemi směry, jež pod určitými úhly (asi  $60^\circ$ ) se protínají; v čtverečních průřezích vyniká mřížení, jehož vlásky na sobě kolmo stojí.

Vedle zmíněných obyčejných vrostlic, dílců sklovitých, bublinek plynových a krátkých i dlouhých, tenkých mikrolithů, vyskytují se tu někdy zřejmá zrna magnetitová; však jen co vzácnost objevil se bezbarvý šesterec, jenž buď nefelinu, buď apatitu náleží a toliko jednou velký krystal amfibolu. Krystal tento táhne se šikmým směrem průřezem noseanovým a jest tím velmi zajímavý, že na místech, kde se s noseanem stýká, tenčí, vlnitý a zoubkovaný jsa, zřejmě dokazuje, že působením tvořícího se noseanu na hotový již krystal amfibolový povrch téhož poznovu se byl roztopil. Krystaly olivinové jsou sporé a vesměs malé, uvnitř světlé a vlnité, na okraji žlutozelené; mimo dílce sklovité (s bublinkami plynovými) nemají vrostlic. Všude mezi krystaly spoře vtěsnáno jest nahnědlé magma, jež, bohatě jsouc velmi krátkými, trichitovými jehlicemi, začasť do větších krystalů (amfibolu a olivinu) více méně vniká. Větší rozbitý krystal amfibolu, jehož jedna polovice jest poněkud pošinuta, jeví v štěrbině pruh hmoty sklovité zároveň s řadou mikrolithů; patrně překážel dlouhý krystal amfibolový proudění tekuté hmoty, kterouž na příd byl rozlomen. Hutnost čediče Řipského = 3.040 (určeno 38 gr.).

Prášek čedičový srosolovatí v kyselině solné, aniž by šuměl.

#### *Noscanit ze Slánské hory (u Slaného).*

Kuželovitá hora tato skládá se ze šedé horniny čedičové, která na povrchu a v puklinách potažena jsouc šedobílou korou uhličitanů, naskrze velmi jemnozrnou se jeví; jen zde onde vyskytují se zjevné jednotlivé šesticíčné jehlice krystalové. Byv však 400krát zvětšen, jeví čedič Slánský stejnorodou krystalinickou směs z amfibolu, nefelinu a zrn magnetitových; v té pak vynikají četné mikroporfyrické průřezy noseanu a jednotlivé krystaly olivinu.



Dlouhé, tenké, začasťe rýhované krystaly barvy nazelenalé neb žlutavé, jež mívají okraj méně ostrý, obyčejně sklovitými proužky a magnetitem temně zbarvený, náležejí amfibolu. V polarisovaném světle jeví se jedna polovice podélného průřezu amfibolového hnědožlutá, druhá pak temnomodrá, uvnitř pak nalézají se vždy temný a světlý pruh. Složení miskovité jest zřejmé.

Co součást místy převládající vynikají tuto široké i poněkud dlouhé, šedobílé i bezbarvé obdélníky, jež vyznačují se rovnoběžnými řádkami a proužky těsně seřaděných, temných zrněk a tmavého prášku, jež jest směsí zrníček skla, magnetitu, titanového železa (v podobě krátkých jehliček) a bublinek plyných a kapalných. U většiny těchto příčných průřezů jsou tyto rovnoběžné proužky více méně husté, jinde splývají v širší pásy, jež se ku konci buď vřetenovitě zúžují aneb v jednotlivá vlákna se rozbíhají. Tyto tečkované čili práškové průřezy nefelinu jeví začasťe i miskovitý sloh, jsouce velmi tenkým bezbarvým pásmem obroubeny. Dlouhé takovéto příčné průřezy bývají na příč čteně rozpukány. Miskovitým slohem vynikají často příčné šesteréčné průřezy, jichž ponejvíce bezbarvý kraj temnější, šedé, ostře omezené jádro uzavírá. Krátké mikrolithy objevují se v těchto pravouhelných a šesteréčných průřezích velmi zřídka a pak uloženy bývají rovnoběžně s hranami. Jen tenké dlouhé obdélníky a malé šesterce, jež se začasťe i v průřezích práškovitě rýhovaných vyskytují, jsou zcela bezbarvé. V polarisovaném světle nabývají podélné průřezy obdélníkové barvy temnomodré, šesterce jsou však úplně bezbarvé.

Mimo to přicházejí tu též větší dílce hmoty bezbarvé s nástinem do žluta, obyčejně slabě tečkované a nezřetelně omezené, jež nepochybně nefelinu, z části snad i leucitu náležejí.

Průřezy noseanové čediče tohoto, jeví se co šesterce, začasťe co průřezy složkové  $\infty O \{O\}$ , řídčeji co osmerce, bývají kalné, temné, modrošedé, opatřené zelenošedými a nahnědlými dílci, kolem však okraje bezbarvým pásmem obroubené. Ve větších průřezích noseanových bývají temné dílce tyto, které ponejvíce jemné, nesouvislé, vláskové síť tvoří, nakupeny na okraji, oným bezbarvým pásmem omezeném; světlejší, střední část zavírá pak v sobě větší a menší zelenožluté a nahnědlé dílce sklovité zároveň s bublinkami plynovými a s četnými tenkými mikrolithy (jež ponejvíce s hranami příčných průřezů rovnoběžny jsou).

Zrnka magnetitu a železa titanového (ponejvíce v průřezích šesteréčných) jsou velmi četná a stejně roztroušená. Vedle oněch součástek vyskytují se tu místy též hnědočervené a červenožluté průřezy, jež nejčastěji dle délky, mnohdy i na příč rozštípeny jsouce, beze vší pochyby olivinu přináležejí. Nazelenalé a nažloutlé, z části i vláknité krystaly olivinu, na hranách kalné, bývají malé a v množství nepatrném.

Působením sehnané kyseliny solné na broušenou desku čediče tohoto patrna byla asi za hodinu značná změna; krystaly apatitu, nefelinu a olivinu byly vyleptané; krystaly noseanu, ztrativše úplně vláskovitou síť svou, byly velmi porušeny; mnohem krásněji však a zřejměji vyniklo rýhování příčných průřezů amfibolových. Vyloužením kysličníku železnatého (z magnetitu) nabyla celá destička barvy zelenavé.

*Noseanit z vrchu Milého (u Bělošic) a Dlouhého (u Kozlů).*

V skrytém slohu i v minerální skladbě souhlasí úplně čedič z vrchu Milého s čedičem z vrchu Dlouhého, asi  $\frac{1}{2}$  hodiny od onoho vzdáleného, tak že mikroskopické lístky z obou nalezišť sotva lze rozeznati.

Dlouhé, tenké zelenožluté krystaly amfibolu, četné malé průřezy noseanu, krátké obdélníky a šesterce bezbarvého nefelinu, četná zrna magnetitová a většinou průřezy olivinu, veškeré tyto nerosty tvoří všude stejnou směs ve sklovité, slabě nazelenalé žluté hmotě, která jen tu a tam velmi spoře se vyskytující, mezi krystaly vtěsnána jest.

Dlouhé průřezy amfibolu, na okraji všude nehrubě přímočaré, slabě vlnité, začasť sklu podobné, slité, jeví četné rýhy a obsahují hojné částice skla s bublinkami plynovými, ale jen málo mikrolithů. Širší takové krystaly uzavírají často shluky zrn magnetitových a sklovitých.

Mezi nerosty, jež směs tuto skládají, převládají po amfibolu bezbarvé, krátké obdélníky a šesterce krystalů nefelinových, z nichž začasť nemnoho krátkých mikrolithů rovnoběžně s hranami uloženo jest.

Velmi četné průřezy noseanu jsou vesměs malé, velmi zhusta šesti- a osmihrané, řidčeji čtvercové; průřezy pak složkové zřídka se pozorují. Střední část nejčetnějších průřezů jest buď vláskovitými sítěmi vyznačená, buď nahromaděním se tělísek práškových temně zbarvená a ostře omezena, podobajíc se někdy zrnům magnetitu, jež teprve při silnějším zvětšení v hustou vláskovitou síť se rozpadávají; kolem těchto středních částí prostírá se široký modrošedý pas z volněji seřaděných zrn práškových, který stává se na zevnějšek světlejším, ostrého omezení nemívá.

Většina průřezů noseanových obsahuje méně vyznačené sítě, jež se skládají ze sypkých zrn práškových, uprostřed průřezů nejhustěji nakupených. Tyto temné sítě, náležející střední části četných, ostře omezených průřezů noseanových, jsou začasť rozděleny nazelenalými a žlutavě šedými, světlejšími proužky (co směsi hmoty sklovité, bublinek plynových a sporých mikrolithů) ve více méně ostře omezené dílce.

Vedle žlutavých a nahnědlých, vlnitě vláknitých průřezů olivinu, které již pouhým okem v čediči co nahnědlé body pozorovati lze, a vedle ne příliš četných zrn magnetitových, vyskytují se tuto i sporé úlomky desek biotitových. Jehlice apatitové jsou velmi sporé; molybdaenem amonatým nalezeny v čediči hory Milé pouze stopy po kyselině fosforečné.

Světlošedý prášek čediče Milé hory šumí v kyselinách velmi slabě; pálením nabývá barvy světlé, žlutavě šedé.

*Nefelinit z Mühlberku u Doupova*

srovnává se s čedičem Slánské hory až na to, že se v něm příčné průřezy noseanové v menším množství nacházejí.

Průřezy nefelinové v čediči tomto mají podoby dvojího druhu. Mimo bezbarvé, krátké obdélníky a šesterce, jež se nemnohými krátkými mikrolithy vyzna-

čují, vyskytují se tu četné šesterečné, příčné a tupě jehlancovitě zakončené, podélné průřezy, obsahující husté řady práškových zrněk a velmi úzké bezbarvé pásmo okrajní; tyto bývají příčnými trhlinami, kolmo na hlavní osu jdoucími, skoro do čtverců rozděleny.

Malé, sitovými výtvary vynikající (bezbarvým pásmem obroubené), mnohdy temné, magnetitu podobné, i složkovitě srostlé průřezy noseanu (osmerce a šesterce) jsou po skrovnu rozšířeny; tolikéž pozorovány byly nepatrné průřezy hauynu barvy modré s velmi tenkou bezbarvou obrubou (skoro co pravidelné šestiúhelníky).

V příčných průřezích amfibolu patrný byly sporé vrostlice nefelinu. Černá zrna ponejvíce co shluky šesterců s vrostlicemi apatitu a nefelinu, náležejí po většině železu titanovému; mnohá z nich jsou na okraji nahnědlá, jiná větší bývají na nejtenčích místech nahnědle prosvitavá a skládají se z malých nahnědlých, krátce sloupkovitých krystalů. Mezi krystaly čediče tohoto vyniká jen na některých málo místech zřejmě sklovitá, nazelenale žlutá hmota.

#### c) Velmi jemnozrné a krystalicky celistvé nefelinity.

α) bezživcové, vyznačené ostře omezenými, krátce pravoúhelnými, podélnými průřezy nefelinu s pravidelně uloženými mikrolithy augitu.

#### *Nefelinit z Bělošic*

(s nahnědlým sklovitým magmatem).

Krystalicky celistvá hornina čedičová z tohoto naleziště jeví při 400. zv. jemnozrnou směs, skládající se z augitu, nefelinu, magnetitu a olivinu ve hmotě sklovité, nahnědlé, všude zřejmě vynikající, a obsahuje jednotlivé dílce, jež, podobající se úplně čediči od Svinčic, jenom z nahnědlé hmoty sklovité a z augitu složeny jsou a četné výtvary trichitové a kostrovité uzavírají.

Porfyricky vystupující, podélné průřezy augitu jsou rozštěpené a nerovným sklovitým okrajem opatřené; téže povahy jsou i příčné průřezy, jež puklinami rovnoběžnými s  $\infty P$  mřížovány bývají. Mikrolithy vyskytují se v nich pořádku a v malém množství, ponejvíce jen v miskách pokrajních, za to jest jich mnoho naplněno zrnky magnetitovými nebo práškem magnetitovým a částicemi sklovitými. Uprostřed většího, příčného průřezu augitu vyskytl se kus skla, který asi  $\frac{1}{3}$  plochy amfibolové zaujímá (hnědě jsa zbarven); od tohoto vybíhá více žilek v zúžující se cípky k rohům augitovým a uprostřed skla vězí černá jehlice (bezpochyby železa titanového). Mimo to vyskytly se průřezy augitové (ostře omezené a magnetitovými zrnky vyplněné), které na jednom konci v drobnější krystaly vybíhajíce, neúplně byly vyvinuty.

Po augitické součástce zaujímá největší část v složení čediče tohoto nefelin. Jeví se v šestercích a krátkých bezbarvých obdélnících, jež vyznačují se sporými mikrolithy (začasté věnečky mikrolithů v šestercích) a v nahnědlé sklovité hmotě ostře omezeny jsou.

Nazelenalé, vlnitě vláknité, průřezy olivinu jsou přecetně roztroušeny.

### *Nefelinit od Skržinu*

podobá se skrytým slohem svým blízkému čediči z Bělošic, chybí mu však nahnědlé magma. Jeho krátké, bezbarvé obdélníky nefelinové a téměř pravidelné šesterce vynikají ponejvíce pravidelným uložením krátkých mikrolithů; větší šesterce uzavírají obyčejně shluky krystalů augitových, mezi nimiž se často křížaté složky nalézají (jako v leucitech z Paskapole); mnohé z nich bývají také sypkým práškem vyplněny. Krystaly augitové, mikrolithy bohaté, jakož krystaly amfibolové, hojné sklo obsahující, vystupují i porfyricky. Nepatrné příčné průřezy leucitu vyskytují se toliko místy zřejměji, malé pak úlomky biotitu velmi pořádku; menší i větší porfyrické průřezy olivinu jsou méně četny.

Hutnost čediče tohoto = 3·064.

### *Nefelinit z kamenné uličky u Červeného Újezda.*

Tento velmi jemnozrný čedič ukazuje při 400. zvětšení jemnozrnou směs augitu, nefelinu, leucitu a magnetitu s velmi hojnými většími zrny amfibolu a tmavými červenavě-hnědými zrny olivinu (hyalosideritu).

Podélné průřezy porfyrických krystalů amfibolu barvy nazelenale žluté vyznačují se jasným rovnoběžným rýhováním, příčné pak průřezy slohem miskovitým. Ve všech nalézají se hojné částice sklovité i bublinky plynové. Bezbarvé průřezy nefelinové objevují se v krátkých obdélnících, vynikajíce vždy pravidelným uložením mikrolithů. Četné průřezy leucitové jsou velmi malé, ponejvíce ostrohrané, osmirečné, a obsahují nezřetelné věnečky práškové a krátké mikrolithy.

### *Nefelinit ze Skalky (Kirchberg) u Bukovic blíže Kostomlat*

jeví při 400 zv. jemnozrnou směs, která se skládá z převládajícího augitu a nefelinu s hojným leucitem, magnetitem a pořádku se objevujícím biotitem a olivinem.

Malé krystaly augitové, jež hlavní díl hmoty čedičové tvoří, jsou podélné, zaokrouhlené (válnovitě); větší, porfyricky se vyskytující, vynikají krásnými nahnědlými i žlutavými miskami a sklovitými vrostlicemi. Malé, bezbarvé krystaly nefelinu, vynikající množstvím vedle augitické součástí, činí krátké obdélníky a méně zřejmé šesterce s mikrolithy, rovnoběžně s hranami uloženými. Dostí hojné jsou i krystaly leucitové s méně zřejmými věnečky a zaokrouhlenými shluky volných součástek hmoty čedičové; k těmto též nepochybně náležejí četné, bezbarvé, dlouhými, tenkými mikrolithy bohaté dílce.

Mnohé příčné průřezy, magnetitu podobné, jsou na okraji nahnědle zbarvené; na jiných lze z okraje pozorovati, že se skládají z hustého mřížení černých jehlic. Ve sporých deskách biotitu pozorovány byly vrostlice bezbarvých jehlic a krystalky augitové; apatit vyskytuje se jen pořádku.

V mikroskopické desce tohoto čediče vyskytuje se též dílec, který se s čedičem ze Skalky úplně srovnává a o tom svědčí, že čedič nefelinový hmotou svou blízek jest čediči magmatovému.

*Nefelinit z Kalamajky u Kostomlat*

blíží se skrytým slohem svým čediči ze Skalky u Bukovic; malé průřezy nefelinu uzavírají četné mikrolithy augitové a sypké shluky součástí čedičových, tak že někdy jen poblíže průřezných hran bezbarvá hmota nefelinu se objevuje. Mimo to vyskytují se zde bezbarvé více méně pravidelně okrouhlé dílce s četnými, dlouhými, tenkými mikrolithy a se zaokrouhlenými shluky součástí čedičových, aneb s méně zřejmými věnečky zrněk práškových; tyto okrouhlé dílce náležejí leucitu.

Větší porfyrické krystaly augitu, jež částicemi sklovitými bohaty jsou, více méně přeměněné průřezy olivinové a hnědé úlomky desek biotitových vyskytují se porůznu.

*Nefelinit v koulích ze sevzáp. svahu Jalovcové hory u Teplíc.*

Mikroskopické destičky tohoto velmi jemnozrného (skoro celistvého) čediče, v němž pouhým okem toliko nepatrná zrna olivinu pozorovati lze, ukazují v drobnohledu (při 400 zv.) jemnozrnou směs převládajícího augitu s nefelinem, leucitem, olivinem a magnetitem.

Krystalky augitové, velmi drobné, jsou — jako ve všech podobných odrůdách čedičových — na hranách zaokrouhlené, válcovité, někdy skoro i vejčité.

Velmi krátké obdélníky nefelinové a méně pravidelné šesterce jsou vesměs velmi malé a vyznačují se četnými, krátkými (ovalními) mikrolithy, jež rovnoběžně s hranami uloženy bývají; jen v málokterých obdélnících vyskytují se i pruhy a okrouhlé dílce mikrolithické hmoty čedičové; ony bývají rovnoběžně s hranami uloženy, tyto nalezájí se ve střední části. Vedle téměř bezbarvých, příčných průřezů nefelinu, objevují se tuto velmi malé výtvary leucitové, které dlouhé, tenké mikrolithy, začasť i méně zřejmé věnečky zrněk práškových obsahují. Porfyricky vystupující, četné průřezy olivinu jsou ponejvíce našedivěle bílé, obláčkovité, na okraji nazelenale žluté a kalné.

Malé nahnědlé destičky biotitové nejsou četné.

*Čedič mezi Hlíňany a Pokraticemi*

srovnává se téměř úplně s čedičem ze Skržínu. Velmi krátké, skoro čtvercům podobné obdélníky nefelinové a šesterce, se slabě vlnitými hranami, rovnoběžně uloženými mikrolithy a četnými bublinkami (i pohyblivými) vynikají množstvím v jemnozrné směsi augitu a magnetitu. Veškeré průřezy olivinu jsou vláknité, nazelenalé a poněkud kalné; v nich uzavřená těliska (picotit?) nahnědlá v průřezech po většině šesterečných a čtvercových jsou větší a dosti hojná.

*Celistvý čedič nad Kundratickým letohrádkem (u Litoměřic).*

Jemnozrná směs čediče tohoto, která se při 400 zv. jeví, skládá se z převládajícího augitu, nefelinu a magnetitu. Podélné průřezy nefelinové jsou krátce pravoúhelné a vyznačují se tím, že obsahují četné (ovalní) mikrolithy augitu, pravidelné

uložené. Některé z nich blíží se oněm blízkého Rabensteinu. I leucit tu neschází; ale po živci není nejmenší stopy. Průřezy olivinu, v menším množství zastoupené, jsou barvy nažloutlé, kalné a přeměněné

*Velmi jemnozrný nefelinit barvy zelenavě černé z Rabensteinu u Sebučina*

obsahuje velmi četná zrna olivinu, jichž průřezy téměř úplně bezbarvé jsou a vrostlic nemají. Svým obláčkovým vzhledem rozeznávají se na první pohled od stejně velkých, okrouhlých dílců, které obsahujíce dílem paprskovité jehlice zeolitové, dílem stejnorodou hmotu vápenatou, nepochybně jsou dutiny, vyplněné druhotnými výtvory.

Krystaly augitové vynikají jen v malém množství mikroporfyricky. Hmota sama jeví hustou směs augitu, nefelinu a magnetitu, k nimž se něco málo leucitu řadí. Zvláštní jsou průřezy nefelinu. Ony velmi malé jsou téměř bezbarvé a obsahují nemnohé podlouhlé mikrolithy, s hranami průřeznými rovnoběžně uložené; větší průřezy nefelinové jsou buď zcela aneb aspoň na okrajích namodralé šedé a kalné v podobě zřejmých podlouhlých obdélníků aneb šesterců. Pozorujeme-li blíže ono modravě šedé, kalné zbarvení v těchto obdélnících, seznáme, že vlastně není nic jiného než čtvercové mřížení, vytvořené dlouhými, tenkými, pravoúhelně uloženými mikrolithy, z nichž každý obalen jsa krátkými, příčně položenými chloupky jehlicovitými kartáči se podobá.

Tato čedičová odrůda vyznačuje se i tím, že obsahuje husté paprskovité shluky amfibolu, jež, tu a tam se objevujíce, buď se v podobě proudů rozbíhají aneb příčné průřezy olivinu v skupinách objímají.

Jemné bezbarvé jehlice a velmi malé šesterce, náležející apatitu, jsou tu a tam hojně roztroušeny.

*Velmi jemnozrný, téměř kryst. celistvý nefelinit od Velenic,*

srovnává se (téměř úplně) skrytým slohem svým s čedičem ze Skržínu, obsahuje hojnost velmi malých zrn olivinových.

Četné krystalky nefelinové, množstvím svým málo jen se lišíce od augitových, jeví se co krátké, pravoúhelné, skoro čtvercové průřezy podélné a pravidelně šesterčné, příčné. Jsou téměř bezbarvé, bez zrn práškových, za to však bohaté mikrolithy augitovými, jež poněvíc s hranami rovnoběžně uloženy jsou. Malé krystalky leucitové, co mnohohrané průřezy s velmi sporými věnečky práškovými a zaokrouhlenými skupinami mikrolithů nejsou četně zastoupeny.

*Velmi jemnozrný nefelinit z Vrátné hory u Mšenu.*

ukazuje při 400 zv. hustou směs, skládající se z augitu, nefelinu a magnetitu s malým příměskem mikroskopického olivinu.

Podélné průřezy nefelinu tvoří krátké široké obdélníky, které buď jen něco

málo mikrolithů obsahují, buď četnými vrostlicemi mikrolithovými znečištěny jsou; pouze některé z nich jsou ostře omezeny, největší část splývá v husté mikroskopické, hrubozrnější směsi krystalové, nemajíc zřejmých obvodů; místy zaujímají též shluky nefelinové větší neb menší dílce a v dílcích těch vyskytují se obdélníky nefelinové s takovým množstvím pravidelně uložených mikrolithů, že se jimi zcela zakalují; největší však díl shluků oněch uzavírá pouze červenožluté, pravoúhelné uložené jehlice, zrnka a skvrny.

β) Nefelinity celistvé obsahující leucit, začasť i živec a z části nehrubě zřejmými průřezy nefelinovými význačné.

*Nefelinit ze Spiegelberku u Oustí n. L.*

Tento velmi jemnozrný čedič barvy našedivěle bílé skládá se z husté směsi převládajícího augitu (amfibolu), pak z nefelinu (leucitu) a magnetitu; mezi krystalky pozorovati lze světlou, nažloutlou neb našedivělou hmotu, která výtvoří práškovými, tu a tam i trichitovými zakalena jsouc, v polarisovaném světle temně zbarvena jest. Hmoty tato barví i krystalovou směs temně šedě a zakaluje veškeré součásti její. Průřezy nefelinové jsou značně přeměněné, mají podobu krátkých obdélníků a obsahují četné, s hranami rovnoběžné mikrolithy i výtvoří práškové; v polarisovaném světle jeví barvu poněkud našedivělou. Příčné jich průřezy bývají dosti ostré. Nepatrné, kalné krystalky leucitové se zřejmými věnečky vyskytují se poskrovnu. Malé, vrstevnatými čarami označené dílce infiltrační a jemnovláknité výtvoří zeolithové okazují k velmi pokročilému stupni přeměny této horniny.

*Nefelinit z Kozí hory*

srovnává se v skrytém slohu svém s čedičem z Kozákova a jeví hustou, jemnozrnou směs převládajícího augitu (jenž  $\frac{2}{3}$  hmoty čedičové zaujímá), krátce sloupkovitého nefelinu, velmi malých krystalků leucitových a stejně roztroušeného magnetitu. Zrnka olivinová jsou méně četná; trojklonné tyčinky živcové, polysyntheticky srostlé, jsou sporé.

*Nefelinit z Ostrého (Spicberk) u Petrovic blíž Tisy.*

Skrytý jeho sloh — jímž se poněkud čediči Kozákovskému podobá — vykazuje jemnozrnou, velmi hustou směs, převládajícího augitu (asi  $\frac{2}{3}$  čedičové hmoty), nefelinu, leucitu a stejně roztroušeného magnetitu, mezi nimiž jednotlivé makroskopické krystaly amfibolu porfyricky vynikají.

Krystaly tyto, nemajíce téměř žádných mikrolithů, obsahují hojnost dílců sklovitých a bublinek plynových.

Bezbarvé, šesterečné a krátce obdélníkové, velmi malé průřezy nefelinu vynikají svými krátkými mikrolithy augitovými; tytéž tvoří začasť větší, mnohostranné dílce s četným augitem a magnetitem, jež úzkou, skoro bezbarvou obrubou objaty jsouce, příčným průřezům leucitovým náležejí.

Mezi hojnými, malými, bezbarvými a zaokrouhlenými těmito dílci vynikají mnohé co zřejmě průřezy leucitu, obsahující ozdobné věnečky z mikrolithů augitových a zrněk práškových.

### *Nefelinit z Ostrého (Spicberk) u České Lípy.*

Celistvý tento čedič, jenž obsahuje hojnost velmi drobných makroskopických zrněk olivinu (jako čedič z Kozákova), vykazuje při 400. zv. hustou směs převládajícího augitu (který asi  $\frac{3}{4}$  hmoty čedičové zaujímá), k němuž přidružují se stejně roztroušený magnetit a velmi malé, ne příliš četné krystalky nefelinu a leucitu. Nefelin objevuje se v krátkých, spíše čtverci podobných obdélnících s nemnohými rovnoběžně uloženými mikrolithy a v ostrých, bezbarvých, příčných průřezích šestercečných. Vedle šesterce lze tuto pozorovati i velmi malé osmerce leucitu, jemuž nepochybně i mnohé z bezbarvých šestercečů náležejí; neboť po většině obsahují méně zřejmě věnečky zrněk práškových a sypké nakupeniny porů plynových. Na četných místech broušené destičky pozorovati lze hnědé, mezi krystaly vtěsnané sklo, od něhož i hnědé zbarvení směsi krystalové pochází.

### *Nefelinit z Ronberku*

blíží se svým skrytým slohem čediči z Oblíku. Celistvý onen čedič, obsahující jen něco málo zrníček olivinu, jeví při 400. zv. stejně jemnozrnou směs augitu, nefelinu, trojklonného živce a poněkud skrovněji roztroušeného magnetitu v hmotě bezbarvé, která poněvíc kruhovým seřazením mikrolithů augitových malé zaokrouhlené dílce tvoří, v polarisovaném světle zcela temna jest, pouze tu a tam zřejměji omezena bývá a z hmoty leucitové se skládá. Bezbarvé, obdélníkové, podélné průřezy nefelinu jsou krátké a široké, nehrubě zřejmě omezené, ale vyznačují se pravidelným uložením mikrolithů; tyčinky živcové, jež v polarisovaném světle jsou poněvíc žlutavě bílé a četné, temné pruhy jeví, jsou dlouhé a tenké; mnohé obsahují množství mikrolithů, jež rovnoběžně s hlavní osou uloženy jsou. Krystaly amfibolové, poněkud větší, jsou spíše roztroušeny, což platí i o našedivěle zelených, kalných, vláknitých průřezích olivinu a velmi malých úlomcích biotitu. Tenké bezbarvé jehlice, na některých místech dosti četné, náležejí apatitu.

### *Nefelinit ze Strimické hory.*

Celistvá hmota čediče tohoto, v níž četné co špendlíková hlava veliké krystalky olivinu a menší zrnka augitu porfýricky vystupují, vykazuje velmi jemnozrnou, mikrolithům podobnou směs, která se skládá z převládajícího (asi  $\frac{2}{3}$  hmoty čedičové ujmajícího) augitu, pak z nefelinu a leucitu. Tu a tam vyskytují se také nepatrné šesterce apatitu a úlomky nahnědlých desek biotitových. Většina kalných, šedavě zelených, jemně vláknitých průřezů olivinu obsahuje uvnitř svým dílce hmoty čedičové, která do jiných v podobě chobotů hluboce vniká.



Některé z porfýrických průřezů augitových uzavírají v střední části své nakupenou hmotu čedičovou. Zrnka magnetitu jsou stejně roztroušena, pořádku jen objevují se husté jich shluky v podobě amfibolu. A takové pozorují se již pouhým okem.

#### *Nefelinit z Kozákova,*

jehož mikroskopický ráz již Zirkel sám byl podal (Basaltgesteine str. 170), vyznačuje se tím, že obsahuje četné, vyloučené koule zrnité směsi olivinu, enstatitu, diopsidu, picotitu a železa titanového, které i velikosti hlavy dosahují i k mikroskopickým zrníčkům se blíží. Broušené destičky jeho vykazují velikou hojnost téměř mikroskopických (bezbarvých, v polarisovaném světle pestře zbarvených) zrnec olivinových.

Bezbarvá součástka, jež vězí v husté směsi augitové, skládá se ponejvíce z velmi malých, mdle modře polarisujících obdélníků a z mnohoúhelníkových příčných průřezů nefelinu. Mezi těmi objevují se však také velmi malé osmerezčné a zaokrouhlené průřezy, jež leucitu náležejí. Vedle nemnohých, jemných jehlic apatitových s velmi jasnými, příčnými průřezy šesterečnými vyskytují se místy bezbarvé tyčinky, jež dílem osamotnělé, dílem po dvou i více rovnoběžně spojené, v polarisovaném světle nažloutlou neb modravě-bílou barvu a četné temné pruhy jeví; tyto sporé tyčinky mám za průřezy trojklonného živce.

#### *Nefelinit z Mužské hory u Bakova*

podobá se čediči z Kozákova. Při 400. zvětšení vykazuje jemnozrnou směs převládajícího augitu, magnetitu, nefelinu (leucitu), k nimž se ponejvíce jemnozrný olivin a místy i tyčinky živcové řadí. Mezi jednotlivými zřejmými krystalky prostírá se šedá, krátkými mikrolity bohatá hmotá, která, jak se z uložení mikrolitů souditi dá, výhradně z průřezů velmi malých nefelinových dílem i leucitových krystalků se skládá. Průřezy leucitové v zřejmých osmerezcích vyskytují se jen pořádku (některé z nich úplně bezbarvé a v polarisovaném světle temné), za to však hojně bývají v podobě zaokrouhlených dílců, které množství soustředně uložených mikrolitů obsahují; trojklonný živec jest tu zastoupen v podobě velmi úzkých, většinou osamotnělých tyčinek.

Průřezy olivinové, z nichž mnohé porfýricky vystupují, podobají se oněm z Kozákova; u mnohých vniká čedičová hmotá velmi hluboko do puklin. Dostí hojně jsou tu též okrouhlé, vejčité a hranaté konkrece augitové, jichž vnitro začasté již čistou, nepochybně druhočnou hmotou vápencovou vyplněno jsouc, úlomky krystalů augitových uzavírá.

#### *Nefelinit z Buchberku.*

Tento velmi jemnozrný čedič obsahuje velmi čtbná, drobolinká zrnka augitu a olivinu. Broušené destičky vykazují hustou, jemně krystalickou směs, skládající se výhradně z malých krystalků augitu, nefelinu a nepochybně i leucitu, pak

z jednotlivých, pořádku jen roztroušených tyčinek živce a z četných, malých olivinových a magnetitových zrněk, z nichž tyto, u velikém množství stejně roztroušeny jsou. Na četných místech pozorovati lze mezi krystaly slabě šedožlutou, zdánlivě stejnorodou hmotu s mnohými krátkými i dlouhými mikrolity, v níž četné, velmi malé, zaokrouhlené a polygonální dílce se zaokrouhlenými nakupeninami zrněk práškových a mikrolitů (leucit) se vyskytují.

Větší krystaly amfibolové s podélnými, mezi jednotlivé mísky uloženými mikrolity mají význačný mískovitý sloh a obsahují četné, souvislé, větší kousky skla ve středních částech; mimo to jsou začasť opatřeny vrostlicemi hmoty čedičové a krystalků živcových.

Jemné, bezbarvé tyčinky živcové jsou ponejvíce jemně rýhované a nemnohé i zřejmě polysyntheticky srostlé.

I zaokrouhlené průřezy méně zřejmých krystalků leucitových (jež mají stopy zrněk práškových, věnečky mikrolitové a dlouhé mikrolity na okraji) lze četně pozorovati.

Videm svým podobá se skrytý sloh onomu mnohých čedičů leucitových.

#### *Nefelinit z Ostré (Spitzer Berg) u Vartemberka*

obsahuje kryst. celistvou základní hmotu s většími, velmi četnými krystalky olivinu a jednotlivými, malými augitu. Základní tato hmota jeví při 400. zvětšení velmi jemnozrnou, hustou, kalnou směs převládajícího augitu, pak magnetitu, velmi malých obdélníkových a okrouhlých průřezů nefelinu, v nichž se často pravidelně uložené skupiny mikrolitů augitových nalézají, a konečně jednotlivých velmi řídko roztroušených tyčinek živce trojklonného.

Porfýrické krystaly augitu objímají četné pruhy hmoty čedičové a struskovitá zrna, z nichž tato ponejvíce úzkými proužky souvisíce, s pásmy rovnoběžně uložena jsou. Tolikéž okrouhlé, tenkou, kalnou obrubou (složenou ze stěsnaných, mikrolitům podobných součástek čediče) omezené konkrce větších krystalů augitových objevují se jako v čedičích podobného rázu dosti hojně.

#### *Čedič z Košumberka u Luže.*

Nejjihnější tato čedičová hora východních Čech podobá se úplně čediči Kozákovskému. Základní hmota čediče Košumberkského skládá se z převládajícího augitu, pak z magnetitu, olivinu a z bezbarvé, ponejvíce temnošedé a temnomodře polarisující součásti, která obyčejně krátké obdélníky a okrouhlé, velmi malé dílečky tvoří, a z části nefelinu, z části leucitu (vyznačenému buď mikrolitovými věnečky neb okrouhlými skupeninami hmoty čedičové) náleží. Malá zrnka olivinová a nečetné krystalky augitové vynikají makroskopicky. Bezbarvé tyčinky trojklonného živce vyskytují se velmi pořádku.

### III. Čediče leucitové.

#### 1. Čediče leucitoidové

čili čediče, obsahující leucit ponejvíce v nezřetelných průřezích (dřlem i nefelin).

Střední část českého, čedičového horstva (mezi Kozly a Střekovem) skládají čediče leucitové, táhnoucí se směrem hlavního pásma (od JZ—SV) rovnoběžně k horám Krušným; okraje pak horstva tohoto tvoří čediče leucitoidové a nefelinové, které též rovnoběžným směrem vystupují, začasťe homole fonolitové a andesitové objímají. Tyto čediče leucitoidové skládají se z mikroskopické, zrnité neb porfýrické směsi augitu, amfibolu, magnetitu a součásti bezbarvé, temně polarisující, ku kteréž někdy se druží skrovnější podíly zřejmého leucitu a nefelinu. Bezbarvá, pořádku jen našedivělá aneb žlutavě bílá a temně polarisující součást, která mimo augit, amfibol a magnetit svým množstvím vyniká, celé to skupení čedičů zvláště vyznačující, neukazuje určitého, pravidelného omezení v dílcích svých, tak že by se mohla považovati za beztvárné, čisté magma. Než časté zaokrouhlení menších a větších dílců, jež se stává krystaly augitovými a mikrolithy, četné objevování se okrouhlých neb věnečkovitých nakupenin mikrolithových uprostřed oněch dílců, jakož různencovitě spojení jejich — to vše (což se jinak toliko v čedičích leucitových objevuje) poukazuje k tomu, že ona bezbarvá, temně polarisující hmota méně zřetelnému leucitu náleží.

Většina čedičů leucitoidových obsahuje též leucitové průřezy, jež buď dle pravidelných obrysů, buď dle jemných věnečků práškových zřejmě se poznávají. Mimo to vyskytují se i sporé, bezbarvé, práškovité průřezy nefelinu dosti zhusta. Co se týče poměrného množství bezbarvé hmoty k ostatním součástem, tož může se ona položit po augitu za součást vynikající. Poněvadž i u velikosti zrněk svých augitu se blíží, činí sloh čediče stejně zrnitým, ač i náhlé přechody někdy se objevují; řidčeji převládá bezbarvá hmota v celé broušené destičce tou měrou, že se hornina leucitoidová bezbarvými dílci mikro-porfýrickou stává. A v tomto případě blíží se čedičům andesitovým. Dle velikosti rozměrů zřejmě krystalických součástí dělí se čediče leucitoidové na

- a) velmi jemnozrné a
- b) krystalicky celistvé.

#### a) Velmi jemnozrné čediče leucitoidové.

Velmi bublinatý a jemnozrný čedič z hřebenu mezi *Turčí a Doupovem*

jeví při 400. zvětšení hruběji zrnitou směs augitu, magnetitu a kalné, našedivělé neb žlutavě bílé součásti, která jest silně porušena. Dle četných, okrouhlých a polygonálních obrysů, pak podle tu a tam se vyskytujících kruhovitých, soustředních kopek práškových posouditi lze, že součást tato krychlovému nerostu, nepochybně leucitu náležela. Průřezy augitové, porfýricky vynikající, srovnávají se s oněmi od Varty na Ohři. V téže broušené destičce objevily se též hojně šedobílé, pro-

svítavé osmerce a šesterce se zřejmě naznačenými věnečky práškovými (zřejmý leucit). Mnohé světlejší dílce skládají se již z uhličitanů a výtvorů zeolitových. Magnetit jest téměř neporušený.

*Jemnozrný čedič mezi Doupovem a Drmoly,*

400. zvětšen, vykazuje hrubokrystalickou směs převládajícího augitu, amfibolu, leucitu, pak nefelinu, olivinu, magnetitu, četných malých úlomků biotitu a dosti hojného apatitu.

Průřezy augitu, význačné svým miskovitým slohem a průřezy amfibolu, četným rýhováním vynikající, obsahují jen pořádku mikrolithy, za to však mívají veliké pory plynové, z nichž některé (s pohyblivými libelami) v kopkách, jiné v řádkách uloženy jsou. Některá místa průřezů augitových bývají velmi jemně a hustě rýhována, aniž by byla zřejmě oddělena od míst rýhování prostých; tím podobají se dialagovým deškám. V jednom takovém průřezu augitovém vyskytl se dlouhý, bledší, barvou ostře vynikající lístek, který náleží buď nerostu, dialagu velmi příbuznému neb dialagu samému.

Průřezy leucitové ukazují po většině již vyšší stupeň proměny. Vyskytují se místy (až asi  $\frac{1}{2}$  mm. široké) zřejmě mnohostranné dílce (osmerce a šesterce, buď téměř bezbarvé buď slabě šedivé) s více méně pravidelným věncem, složeným z větších struskovitých zrněk, porů plynových a sporých mikrolitů; a dílce tyto jeví se co patrné průřezy leucitové. Od těchto sledují se postupné přechody v přeměně; ubývají věnci leucitovému pravidelnosti a zřejmosti, prášek a zrnka jeho se rozptylují, nabývajíce barvy šedo- neb hnědožluté, a konečně jeví se místa prosvitavá barvy slabě nažloutlé a našedivělé, v nichž onen drobolinký prášek a ona zrnka struskovitá skoro stejně roztroušena jsou, sotva stopy po soustředném uložení zachovaly. V některých těchto dílcích pozorovati lze, že s přeměnou tuto naznačenou úzce souvisí i objevování se krátkých, pravoúhelných neb polygonálních puklin a vystupování hrubě vláknitého slohu.

Průřezy nefelinové jsou bílé, rovnoběžné, jemně vláknité, a někdy velmi dlouhými, mikrolitovými jehlicemi (apatitu) proniknuté; příčné průřezy jejich jsou nezřídka ještě zřejmými šesterci omezeny. Velmi jasné vynikají však četné, malé šesterce apatitové, jichž podélné průřezy se tuto co dlouhé jehlice objevují. U prostřed mnohého šesterce apatitu pozoroval jsem větší plynovou poru.

Úlomky biotitové, velmi drobné, mají ponějvíce barvu šedo-zelenou s nástinem do hněda. Červenavé a nahnědlé skvrny jsou beze vší pochyby druhotné výtvoří, haematit a limonit. Průřezy olivinové, jež jsou velmi přeměněné, zcela kalné, temné, našedivělé neb černavě zelené a hrubě vláknité, uzavírají začasť velké průřezy augitové.

*b) Krystalicky celistvé čediče leucitoidové.*

*a) Základní hmota při 400. zvětšení jemnozrná.*

*Čedič s Oblíku u Loun*

srovnává se v skrytém slohu svém s čedičem od Rané, tím pouze od něho se různí, že obsahuje méně oné bezbarvé hmoty, která v polarisovaném světle všude temnou se jeví, a že má četné, tenké, bezbarvé tyčinky. Četné průřezy mikroporfyrických kry-

stalů augitových jsou ve střední části nahnědlé neb zelenavě šedé a obsahují hojné vrstvice magnetitu a částic sklovitých; okraje jejich bývají magnetitovými zrny hustě posypány; mnohdy jsou obklíčeny bezbarvým proužkem, do něhož z hmoty čedičové četné mikrolithy vnikají.

#### *Čedič z hory Charvatovy u Loun.*

Tato celistvá, na zdání úplně stejnorodá hornina čedičová skládá se (při 400. zvětšení) z převládajícího augitu, stejně rozděleného s magnetitem a se šedobílou, jemnými výtvy práškovitými opatřenou hmotou, v níž ony krystaly téměř stejně jsou rozděleny. V bezbarvé hmotě, která v polarisovaném světle úplně temnou se jeví, pozorovati lze na četných místech zřejmé, jemnými výtvy práškovými omezené mnohoúhelníky (osmerce a šesterce), podobající se oněm v čediči ze Želkovic, a okrouhlé skupiny mikrolithů (leucit); krátké obdélníky nefelinové, v polarisovaném světle modravě šedé objevily se jen pořídku.

#### *Čedič z hory Liský u Libčovic*

podobá se skrytým svým slohem poněkud čediči z Bilinky. V husté, jemnozrné směsi podélných, na hranách a rozích oblých krystalků augitu a zrněk magnetitu, v níž velké kalné průřezy olivinu a méně četné amfibolu porfýricky vynikají, převládají malé, okrouhlé, polygonální průřezy leucitu (co zřejmě vyvinutý díl bezbarvé hmoty) sporými, hustými, poněvíc méně pravidelnými věnečky zrněk práškových a krátkých mikrolithů opatřené nad malými, krátkými mikrolithy poněkud význačnými, přfěnými průřezy nefelinu.

#### *Čedič z Pšovského (vrchu) u Žatce.*

Téměř celistvá směs čediče toho, skládající se z augitu a magnetitu, obsahuje hojnost více méně okrouhlých (nezřejmě polygonálních) dílců bezbarvých, v polarisovaném světle temných, jež četnými, dlouhými, tenkými mikrolithy vynikají. Mnohé z nich jsou u vnitru svém slabě nažloutlé neb nazelenalé, na okraji pak bezbarvé. Zřejmé obdélníky nefelinové vyskytují se velmi pořídku. Zvláštní ráz mají okrouhlé, mnohostranné (poněvíc osmihranné, zřídka čtvercové neb obdélníkové) průřezy, jež na okraji citronové neb temně oranžové, u vnitru pak nahnědlé zbarveny jsou, začasté buď v jednom směru buď v podobě čtvercové sítě vláknité se jeví a v polarisovaném světle toliko světlejší neb temnější (ale téhož nástinu) barvu ukazují. Mimo tyto průřezy, jež nepochybně olivinu náležejí, nalézají se tutěž zřejmé, vlnitě vláknité a nazelenalé průřezy olivinu.

#### *Čedič z Chlumu u Měcholup.*

Velmi jemnozrná hornina čedičová tohoto naleziště, obsahující velmi četná drobná zrnka olivinu, jeví při 400. zvětšení jemnozrnou směs leucitu, nefelinu, augitu, olivinu a magnetitu, velmi sporého biotitu, k nimž druží se jen malé množství trojklonného živce.

Průřezy leucitu bývají nezřetelné; velmi sporé vynikají co malé, ostře omezené, úplně bezbarvé osmerce. Největší jich část, nezřetelně jsouc omezena, obsahuje vždy ve středu dílců svých buď stopy po věnečkách práškových buď okrouhlé skupiny hmoty čedičové, aneb něco málo augitových mikrolithů; za to nalézají se téměř u všech hojnost dlouhých, tenkých, bezbarvých jehlic, jež se na některých místech, zejména pak tam, kde známky předešlé chybí, v hustou směs hromadí, tak že místa tato podobají se dílcům skla na polo vykrytalovaného. Dostí hojně bývají též zřetelné, krátké obdélníky nefelinové, k nimž nepochybně náležejí i mnohé ze zmíněných průřezů, které, tvoříce ony okrouhlé dílce, obsahují skupiny mikrolithů a hmoty čedičové.

Průřezy olivinové (velmi četné) jsou skoro bezbarvé, aneb šedobílé, obláčkovité, opatřené velmi úzkým, kalným, zelenavě-žlutým okrajem.

Dlouhé, tenké, bezbarvé, polysynthetické tyčinky živcové obsahují buď velmi sporé mikrolithy, buď zrnka prášková a ubýváním rozměrů klesají až na jehlice mikrolithové.

Hutnost = 3.061 (určená 7 gr.).

#### *Čedič z Borku (Burberg) u Kadaně.*

Skrytý sloh této celistvé horniny podobá se slohu čediče od Rané. V krystalové směsi, skládající se z amfibolu, stejně rozděleného magnetitu, sporých úlomků biotitu a z nevalně zřetelného olivinu, vynikají velmi četné, bezbarvé, dlouhými, tenkými mikrolithy bohaté a v polarisovaném světle temné dílce, jež obvykle více méně okrouhlé, ale nezřetelně omezeny jsouce, jednotlivé krystalky augitu, aneb jich okrouhlé skupiny, tu a tam řady neb shluky temných zrněk uzavírají. Na některých málo místech pozorovati lze (namodrale polarisující) bezbarvé obdélníky nefelinu a tenké, dlouhé, bezbarvé jehlice apatitu. Kulaté, žlutavé dílce s rovnoběžnými, vlnitými, vrstevnatými pásmy jsou výtvoři druhotné.

#### *Čedič z Kandratic*

podobá se čediči z Bilinky. Mimo oblé, ponejvíce malé krystalky augitové objevuje se tuto co převládající součást leucit a nefelin; obrysy těchto dvou nerostů jsou však pouze tu a tam zřetelné; obvykle splývají průřezy jejich v hmotu na zdání stejnorodou, v níž toliko pravoúhlé a okrouhlé uložení mikrolithů nerosty ony prozrazuje. Poněvadž se však největší část hmoty této v polarisovaném světle úplně temnou jeví, lze z toho souditi, že tu leucit v nemalém množství jest přítomen. Magnetit jest stejně roztroušen. Průřezy olivinové vyskytují se dosti zhusta; bývají nažloutlé neb nazelenalé, na způsob třepení omezené, ne však přímočaré, nýbrž okrouhlé aneb vejčité; obsahují hluboké choboty hmoty čedičové.

#### *Čedič z vysoké Ovčí hory*

srovnává se též skoro úplně s čedičem z Bilinky. Základní jeho hmota, obsahující jen jednotlivá zrnka olivinová porfyricky vytvořená, skládá se z velmi jemnozrné

směsi augitu (skoro  $\frac{2}{3}$  hmoty čedičové), leucitu, nefelinu, magnetitu; biotit a haematit vyskytují se (jako obvykle) jen na některých místech čteněji.

Průřezy leucitové jsou bezbarvé, okrouhlé, bez věnečků, začasť však opatřeny skupinami mikrolithů; průřezy nefelinové jsou velmi malé; zrna magnetitová jsou nestejně rozdělena.

#### *Čedič od Blatců (Blatzen) blíže Housky*

jeví při 400. zvětšení jemnozrnou směs převládajícího augitu, magnetitu, olivinu a bezbarvé součásti. Zdá se, že součást tato na mnohých místech jest sklo aneb neurčitě omezená hmota leucitová; na četných místech vyskytují se zřejmé, modravě polarisující obdélníky a méně zřetelné mnohoúhelníky, jež nepochybně nefelinu náležejí. V broušených destičkách čediče tohoto pozorovati lze olivin na velmi význačných stupních přeměny. Četné průřezy jeho jsou uvnitř co moře zelené, slabě vlnitě vláknité, na více méně širokém okraji nahnědle-červeně prosvitlé a začasť černavě-hnědou, skoro temnou obrubou opatřené. Tytéž stupně barev opakují se i v puklinách. Tam kde nahnědle-červený nástin se počíná, vyniká přímočarné rýhování, na něž se mnohdy i jemné, příčné rýhování klade, a tak se stává, že průřezy, jichž celé plochy nahnědle červeně neb na nejtenčích místech červenozlutě zbarveny jsou, hrubší čtvercovou síť jeví, v níž směry rýhování zřetelně vynikají. Poslední stupeň přeměny olivinu poskytuje černavě-hnědá, nevalně prosvitlá obruba, která svými přímočarnými, rovnoběžnými pruhy poněmáhle do vnitř olivinu se rozšiřuje, a jejíž hmota, většinou haematitu, částečně též snad nově vytvořenému magnetitu náležející, celé plochy olivinové mřížovitě zaujímá, tak že jednotlivé tyčinky mřížové nahnědle-černé, místy i zcela černé bývají, jednotlivá pak mezi tyčinkami ležící pole ještě temně červenavě-hnědlo prosvitají.

#### *Čedič ze Zbinské hory u Dokes.*

V celistvé, základní hmotě tohoto čediče vtroušena jsou jednotlivá zrnka amfibolu a nerostu bronzitu podobného.

Základní hmota jeví hustou směs převládajícího augitu, poněmáhle drobolinkých krystalků leucitových, stejně rozděleného magnetitu, jednotlivých desek biotitu a průřezů olivinu. Průřezy leucitové jsou většinou velmi malé a četnými vrostlicemi mikrolithů augitových nehrubě zřetelné. Vyskytují se tu však i větší osmerce a šesterce dosti hojně, jež, vyplněny jsouce augitem a magnetitem, velmi úzkým, ale ostře omezeným, bezbarvým pásmem objaty bývají, tak že poznání leucitu žádných obtíží nečiní.

Krátké bezbarvé obdélníky nefelinové zřídka lze pozorovati.

#### *Čedič ze Sudky u Malé Skály*

obsahuje četná drobolinká zrnka olivinu. Celistvá základní hmota skládá se z převládajícího augitu, magnetitu a úplně čisté součásti bezbarvé, která, ponej-

více okrouhlé, neb nezřetelně mnohohrané a růžencovitě protáhlé dílce tvořící, v polarisovaném světle úplně temnou se jeví; některé, velmi malé dílečky téže jsou temnomodré (nefelin). Mezi krystaly vězí našedivělý cement, který někdy výtvořů praškovými temnějším a kalným se stává. Průřezy olivinu bývají řasnatě obroubeny.

*Čedič z Klobouku (Hutberg) blíže Petrovic (Petersdorf).*

Celistvý tento čedič jeví jemnozrnou směs převládajícího augitu, pak leucitu, nefelinu, stejně rozděleného magnetitu a též místy dosti hojného trojklonného živce.

Leucit objevuje se tuto v slabě nahnědle-žlutých, okrouhlých, někdy i osmi- a šestihranných průřezích, jež pro hojnost volně rozdělených mikrolithů a zrněk práškových méně zřetelně omezeny jsou, ale temnějším zbarvením okrajní směsi krystalové poněkud vynikají.

Krátké obdélníky, podobně zbarveny jako průřezy leucitové, pro množství mikrolithů a výtvořů práškových tolikéž nevalně zřetelné, náležejí nefelinu.

Na četných místech vyskytují se hojné, bezbarvé, jemně rýhované, tyčinkovité krystaly živcové, jež, ponejvíce proudovým uložením vynikajíce, na horninu leucitovou v značném množství přicházejí.

*Čedičová droba z Kamýše*

jeví místy velmi různý sloh. Jednotlivá místa vykazují jemnozrnou, hustou směs krystalů, mimo augit a magnetit úplně přeměněných; nicméně objevují se zde četné, světlé, méně zřetelné mnohoúhelníky a krátké obdélníky, náležející přeměněnému leucitu a nefelinu; hojné nahnědlé destičky prozrazují se co biotit. Větší dílce skládají se však pouze ze zřejmých bezbarvých průřezů leucitových a sporých nefelinových, jež jsou smíšeny se zrny a sloupci magnetitu a titanového železa.

Průřezy leucitové jsou většinou dosti zřetelně omezené, dílem úplně čisté a opatřené slabými věnečky, dílem slabě vláknité a nazelenalými skupinami mikrolithů zakalené.

β) Základní hmota za 400. zvětšení velmi jemnozrná aneb směsi mikrolithové podobná.

*Čedič z Mühlberku u Libčova.*

Čedičová tato hornina, obsahující hojná, drobolinká zrnka olivinu a jednotlivé jehlice amfibolové, vykazuje při 400. zvětšení kalnou, velmi jemnozrnou, mikrolithům podobnou směs augitu s práškem magnetitovým a něco málo zřetelně omezených krystalků leucitových a nefelinových, avšak s četnými, velmi malými, okrouhlými, růžencovitě souvisícími dílci hmoty bezbarvé, nepolarisující, která na četných místech jemné, dlouhé mikrolithy obsahuje (hmota leucitová). Svým mikrolithovým vytvořením podobá se základní hmota takovým místům čediče, jichž se dotýkají vpečené úlomky opuky.



Pozoruhodný jest (pro genetický sled) poměr amfibolu k olivinu, jehož průřezy hustě přiléhajícími krystaly amfibolu uzavřeny bývají.

### *Čedič z Vostrého u Červeného Újezda.*

Černošedá tato hornina obsahuje četná, drobolinká zrnka olivinová a sporé, velmi malé krystalky amfibolu. Základní hmota její jeví při 400. zvětšení velmi jemnozrnou (skoro mikrolithickou) směs augitu a stejně rozděleného magnetitu (zrnka a prášek) vedle četných větších zrn olivinu a jednotlivých krystalků amfibolových ve hmotě zcela bezbarvé, která, obsahující množství velmi jemných, dlouhých, tenkých mikrolithů, všude mezi krystalky se objevuje, a ponejvíce růžencovitě, z malých okrouhlých dílců složené pruhy tvoří.

Na četných místech této bezbarvé hmoty pozorovati lze ostře omezené, osmi- a šestihrané průřezy, opatřené okrouhlými, sypkými skupinami hmoty čedičové, zvláště mikrolithů augitových; na úplně bezbarvých místech vyskytují se pak nezřetelné věnečky zcela jemných zrněk práškových. Na okraji (řidčeji též uvnitř) těchto roztroušeny jsou ony velmi četné, dlouhé, tenké mikrolithy. Na nejvíce místech objevují se součástky hmoty čedičové okrouhle nahromaděné. Poněvadž podobná bezbarvá hmota, vynikající stejnými znaky, v čedičích leucitových vždy se nalézají, může i v tomto případě za leucit považována býti.

Četné, velmi krátké obdélníky a část okrouhlých, šesterců podobných dílců, v nichž se též malé sypké nakupeniny krátkých mikrolithů nacházejí, náleží nefelinu, který v některých destičkách z téhož naleziště převládá.

Krystaly amfibolové, porfyricky vynikající, jsou méně četné a velmi malé, začasť částicemi sklovitými bohaté. Velmi četné průřezy olivinu jsou obláčkovité (našedivělé), bílé, na okraji a v trhlinách štěpných zelenavě-žluté a kalné; menší bývají zcela kalné. Úlomky desk biotitových jsou velmi sporé. Na některých místech objevuje se v bezbarvé hmotě modravě neb žlutě zelená, vrstevnatými čarami označená hmota infiltrační.

Vůbec souhlasí některé destičky této odrůdy čedičové s destičkami čediče Veršetinského, jiné pak blíží se oněm z Bilinky a Kozákova, což se řídí tím, převládá-li nefelin či leucit.

### *Čedič z Cínkensteinu u Libšic*

srovnává se svým skrytým slohem s andesitovým čedičem mezi Libšicí a Bilinou, neobsahuje však zřejmých tyčinek živcových, nýbrž skládá se všude ze stejné směsi jemnozrného augitu a magnetitu v bezbarvé, na zdání stejnorodé, v polarisačním světle temné základní hmotě, v níž krystalky augitové ponejvíce do kola a v podobě proudů uloženy jsouce, menší a větší, bezbarvé, okrouhlé dílce v hustších skupinách omezují. V této bezbarvé hmotě, jež po většině z leucitu se skládá, vyskytují se jen sporé dílce, jež modravě aneb žlutavě polarisují; tyto nebývají však co zřetelné obdélníky omezeny, ale krystalky augitové mají v nich pravoúhelné uložení. Bezbarvé, ostře omezené obdélníky a šesterce jsou v množství velmi podřízeném: po řídce vyskytují se též modravě-šedé, v rovnoběžných řadách poprášené, podélné a příčné průřezy nefelinu.

Olivin je velmi sporý. Základní hmota, která se na zdání úplně beztvarnou

jeví, po většině z leucitu se skládá; patrně to bývá z četných mikrolithových věnečků, jaké se obyčejně v průřezích leucitových objevují; ostatní pak bezbarvé, okrouhlé dílce, růžencovitě spojené, upomínají na první pohled na čediče leucitové.

*Čedič z Doubravického pahorku*  
na severovýchodním úpatí Zámecké hory u Teplic.

Základní hmota tohoto krystalicky celistvého čediče, v němž již pouhým okem přecetná, nepatrná zrnka olivinu a augitu pozorovati lze, jeví při 400. zvětšení velmi jemnozrnou směs augitu a magnetitu s velikým počtem bezbarvých dílců, jež, obsahující hojnost tenkých dlouhých mikrolithů, poněkud více růžencovitě v hmotě čedičové se prostírají a tu a tam se rozvětvují. Z největší části mají dílce tyto zaokrouhlené omezení a uzavírají velmi sporá zrnka prášková a malé skupiny součástek hmoty čedičové, na okraji pak opatřeny jsou dlouhými tenkými mikrolithy. Ač mezi nimi velmi málo osmiúhelníkových obrysů vyniká, můžeme přece za to míti, že bezbarvé tyto dílce dle svrchu uvedených vlastností hmotě leucitové náležejí.

Mimo to vyskytují se na bezbarvých místech ostřeji omezené, více méně pravidelné šesterce a obdélníkové průřezy nefelinu, které začasť z bezbarvého svého okolí nástinem do šeda vynikají. V jednom pravidelném nefelinovém šesterce byla střední část šedozelená, kalná, bezbarvým, zevním pásmem ostře omezená. Porůznu objevují se černé, přímé neb zakřivené výtvořky trichitové.

Nahnědlé, malé desky biotitu jeví se v podobě ostře omezených šesterců a úlomků šestercečných. Nemálo hojně jsou malé průřezy olivinu, jež jsou barvy zelenavě žluté, kalné a vlnitě-vláknité, větší (makroskopické) průřezy jsou však většinou bezbarvé, obláčkovité a jen na puklinách zelenavě-kalné.

Vedle nepatrných, práškovitě rozptýlených zrněk magnetitu vynikají též větší zrna magnetitová, jež jsou spoře, ale vždy skoro stejně rozdělena.

Četné průřezy amfibolové jsou dle štěpných směrů hojně rozpukány, nemají však žádných mikrolithů.

*Čedič mezi Blankensteinem a mlýnem Šiklovým*

vykazuje velmi jemnozrnou, částečně mikrolithovou, místy velmi hustou směs převládajícího augitu s magnetitem, velmi hojných větších i menších, více méně zaokrouhlených, bezbarvých dílců a četných makroskopických zrněk olivinu.

Bezbarvá místa jsou kruhovitě omezená, aneb ze zaokrouhlených dílců složená, tvoříce poněkud více polokruhovitá pásma; tytéž skládají se většinou z hmoty leucitové, po menším díle pak z krátkých obdélníků nefelinových, jež namodralé polarisují a též méně zřejmě omezeny jsou. V dílcích leucitových vyskytují se i zřetelné větší, ostře omezené osmerce aneb mnohostranné průřezy, jež, jsouce úplně čisté, bílé a průhledné, štěpnými puklinami proniknuty bývají; řídceji uzavírají tyto malé, sypké nakupeniny čedičové hmoty a dlouhé jehlice mikrolithové.

Ostrý kraj některých osmerců jest posázen jemnými, bezbarvými jehlicemi, malými zrnky magnetitu a několika krystaly augitu, jež vesměs více méně do prů-

řezů leucitových zasáhají. Střední část některých průřezů leucitových jest oddělena vrstevnatými čarami od vnějšího pásma, a, vynikajíc zvláště v polarisačním světle jasností svou, jeví se již co hmota přeměněná.

Mikroskopicky zřejmé průřezy olivinu, téměř bezbarvé, jsou protkány širokými, zoubkovanými pruhy barvy světle zelenavě-žluté. Ulomky biotitu jsou sporé.

#### *Čedič ze sklepa v zámku Mašovském.*

Čedič tento obsahuje jednotlivé, porfyricky se jevící krystalky augitové, skládá se skoro z mikrolithické směsi augitu, zrněk magnetitových, prášku magnetitového a z četných, poněkud velmi malých bezbarvých dílců, z nichž většina, jeví okrouhlé omezení, též okrouhlé nakupiny, aneb méně zřejmé věnce zrněk práškových, v polarisovaném světle temná jest a zajisté leucitu náleží; jiné dílce bývají okrouhle protáhlé, skládají se však z malých zakulacených průřezů. I velmi malé obdélníky a šesterce nefelinové nebývají tu vzácností.

V mnohých průřezích augitových vyskytují se vedle ostře vynikajících, bezbarvých šesterců apatitu i vrostlice hmoty neurčitě omezené, úplně bezbarvé, která v polarisovaném světle barvy světle-šedé aneb namodralé nabývá (nefelin nebo apatit); v jiných objevují se též vrostlice hmoty čedičové.

#### *Čedič od Kysiblu blízko Bochova*

obsahuje jen velmi malé krystalky augitu. Při 400. zvětšení vykazuje velmi jemnozrnnou směs augitu, leucitu, nefelinu a magnetitu. Četné nahnědlé desky biotitu, jež žádnému čediči leucitovému nescházejí, vyskytují se i zde v hojnosti a mnohé z nich opatřeny jsou vrostlicemi leucitovými.

Větší průřezy leucitové, jež v množství podřízeném se objevují, bývají hmotou čedičovou tak zakaleny, že bezbarvá hmota leucitová poněkud jen co okrajní proužek se pozoruje. Mimo to jest tu i množství bezbarvých, zaokrouhlených a protáhlých dílců, které jsou v polarisačním světle poněkud úplně temné. Dílce tyto obsahují hojnost dlouhých, bezbarvých jehlic mikrolithových a jen některé z nich jeví mnohostranné (osmiúhelné) obrysy.

#### *Čedič z Vysokého Hřbetu u Doupova.*

Tato zelenavě-žlutá, krystalicky celistvá, na zdání úplně stejnorodá hornina čedičová jeví za 400. zvětšení směs velmi jemně krystalickou, skoro mikrolithům podobnou, jež se skládá z augitu, magnetitu, leucitu a nefelinu. Součástky tyto tvoří všude proudy, jichž směry jednotlivými, většími krystaly amfibolovými zřejmě vynikají. Větší i menší bezbarvé dílce jsou po většině zaokrouhlené a růžencovitě omezené; v nemnohých vystupují i mnohoúhelníky (osmerce a šesterce) a okrouhlé skupiny mikrolithů, aneb i nezřejmé věncečky práškové. Okrouhlé ony dílce jsou v polarisovaném světle z větší části temné; toliko ony (sporé), které se již v dru-

hotné výtvořby byly zaměněny, jsou světlé. Obdélníkové průřezy nefelinu, poněkud více s četnými mikrolithy, pozorovati lze též na některých místech. Živec a olivin schází.

### *Čedič od Šenvaldu u Lokte.*

Jsa velmi jemnozrný, obsahuje čedič tento hojnost porfyricky vynikajících, velmi drobných zrněk amfibolu a četné kouličky zeolitové, byv pak 400. zvětšen, vykazuje na zdání stejnorodou, bezbarvou aneb nažloutlou nebo našedivélou základní hmotu, která četnými krátkými i dlouhými mikrolithy hustě je protkána (podobajíc se polokrystalické základní hmotě dle Zirkla.)

Přihlížíme-li však déle, shledáme, že mikrolithová tato směs na četných místech v bezbarvé hmotě více méně zřejmé, mnohostranné omezení má. Tak vyskytují se na mnohých místech zřetelné šesterce, jež nepravidelné shluky mikrolithové objímají; jiné mnohoúhelníky blíží se osmercům; mimo to pozorovaly se též krátké pravouhelné průřezy barvy nažloutlé s podélnými, velmi hojnými mikrolithy, rovnoběžně ku hranám uloženými. Objevy tyto vzbuzují právem domněnku, že ona základní hmota v směsi krystalové z více méně individuální hmoty leucitové a nefelinové složena jest.

Průřezy amfibolové podélné jsou jemně ryhované, příčné vyznačují se pak krásným miskovitým slohem, jehož misky (vrstvy) červenavé, nahnědlé i nažloutlé, na okraji obroubeny bývají věncem z prášku magnetitového a směsi mikrolithové.

### *Čedič z Ovčí hory u Střekova blíž Oustí*

jeví při 400. zvětšení velmi jemnozrnou, hustou směs, skládající se z převládajícího augitu, stejně rozděleného magnetitu a z jednotlivých zrněk olivinových. Bezbarvé, velmi malé dílce jsou buď zaokrouhlené, buď pravouhelné a náležejí (dle celého rázu čediče) leucitu a nefelinu. Živce v něm najisto není. Jednotlivé větší dílce, jež se v husté, nahnědlé směsi augitové jen porůznu vyskytují, prostoupeny bývají dlouhými jehlicemi mikrolithovými.

### *Čedič ze severových. úpatí hory Křižové (u Litoměřic) naproti Zlaté hoře*

vykazuje mikroskopickou, velmi jemnozrnou, skoro mikrolithickou směs převládajícího augitu a magnetitu a malých bezbarvých, temně polarisujících dílců, v nichž namnoze pozorovati lze zřejmé věnečky mikrolithů augitových a jich ústřední shluky, což význačným jest znakem pro průřezy leucitové. Bezbarvá zrna olivinu s vrostlicemi mikrolithové hmoty čedičové vynikají mikro-porfyricky v počtu hojném.

### *Čedič z Kamenické hory u Zákup*

jeví skrytě krystalickou, příliš hustou směs barvy nahnědle-šedé, která se skládá z krystalků augitových, ponejvíce v proudech uložených, z magnetitu a velmi malých, sotva znatelných krystalků leucitových, v hmotě sklovité, nahnědlé a výtvořiny práškovými bohaté. V téže vystupují velké, porfýricky vytvořené krystaly olivinu velmi četně, jednotlivé však průřezy amfibolové jen porůznu. Sklovitá hmota, obsahující hojné výtvořiny práškové a krátké mikrolithy, objevuje zřetelně pouze na nejtenších místech destičky vybroušené a na místech, kde čistší a prosvitavější jest, pozorovati lze v ní i sporé dlouhé mikrolithy.

Krystalky leucitové mají jen porůznu ostré obrysy co šesterce a osmerce, velká jich většina tvoří zaokrouhlené, světlejší dílce, jež ve středu nakupeninami mikrolithů augitových opatřeny jsou. V jemnozrné směsi augitové vynikají začasť větší dílce, které, vyplněny jsouce téměř pravidelně do kruhu nahromaděnými krystalky augitu, více méně zřejmější osmihranné omezení jeví. Široké průřezy augitové vyznačují se miskovitým slohem a obsahují hojné částice skla, žilkami spojené.

V bezbarvých průřezích olivinových s kalným, nazelenalým okrajem vyskytuje se často hmota sklovitá, jež buď do obvodu hluboko vniká aneb úplně uzavřena jest.

### *Čedič od Vratislavic*

skládá se z mikrolithové, husté směsi převládajícího augitu, leucitu a magnetitu. Jednotlivé krystalky olivinové jsou již přeměněny v shluky jemně vláknitých nažloutlých hvězdiček. Krystalky leucitové jsou nesmírně malé, tvoříce ponejvíce zaokrouhlené, úplně bezbarvé dílce v husté směsi augitové; jen tu a tam vyznačují se některé průřezy leucitové jemnými věnečky. V husté mikrolithové směsi krystalové vystupují jednotlivé, hustým (temnějším) věncem krystalků augitových obroubené, okrouhlé neb ovální skupeniny větších jednotníků augitových, jež nepochybně v tekoucím ještě magmatu nejdříve se byly vyloučily.

### *Černošedý čedič z úpatí velké Jelení skály u Svěbořic*

jeví při 400. zvětšení velmi jemnozrnou směs (mikrolithovou), která se skládá z augitu, magnetitu, leucitu a nefelinu. Poslední dva nerosty nebývají ostře omezeny. Velmi hojný leucit jest začasť slabě žlutavě neb nahnědle zbarven a mívá do kola uložené mikrolithy a jen na sporých místech zřejmější věnečky práškové. Úlomky biotitu jsou dosti hojné.

### *Čedič z východního úpatí Ronova u Radoušova*

vykazuje velmi jemnozrnou, téměř mikrolithovou směs, která jeví složení z augitu, magnetitu a četných, velmi malých, okrouhlých dílců, jež v proužkách spojeny bý-

vají. Tyto dílce obsahují jen porůznu zrnka prášková a v polarisovaném světle jeví se úplně temné; poněvadž ale v krystalové směsi všude zřejmé, okrouhlé obrysy ukazují, mohou se považovati za hmotu leucitovou. Význačné jsou též větší, zaokrouhlené husté konkrece (podobné oněm z čediče od Libšic), složené ze světle šedých krystalků augitových, jež kalným širokým pásmem velmi husté, mikrolithické směsi obroubeny jsou.

#### *Krystalicky celistvý čedič z Humprechtova vrchu u Sobotky*

skládá se ze skrytě krystalické směsi, v níž pouze augit a osamělé tyčinkovité jehlice (živcové) vedle zrněk magnetitových zřejmě vynikají; avšak mnohem četnější vystupují větší (co špendlíková hlava) bezbarvá zrna olivinu a hojně menší mnohoúhelníky i zaokrouhlené dílce, z nichž se tyto většinou za průřezy leucitové určití mohou; již na pohled liší se tyto od průřezů olivinových tím, že uzavírají zvláštní, trojhranná, klínovitá, bezbarvá tělíška.

Četné, okrouhlé neb ovální, zelenošedé, kalné dílce podobají se tak zvané kamenité hmotě (představující kalnou směs mikrolithovou).

#### *Krystalicky celistvý čedič z Jestřábí skály u Kruhu*

ukazuje při 400. zvětšení velmi jemnozrnou směs augitu, magnetitu a velmi malých krystalků leucitových a nefelinových. Tyto bývají však méně zřetelné; toliko některé šesterce a osmerce jsou úplně čisté. Mimo porfýrický, našedivělý augit vyskytují se i temno- a šedohnědé průřezy amfibolu dosti zhusta. Živec schází.

#### *Velmi jemnozrný čedič z lomu Velké Horky u Kuří vody*

uzavírá četná, co špendlíková hlava veliká, okrouhlá neb hranatá zrnka barvy nažloutlé neb našedivělé, jichž omezení a uzavření fluktuálně uloženými součástkami hmoty čedičové zřejmě na jevo dává, že přeměněným krystalům leucitu náleží. Průřezy jejich (ponejvíce 6—7 mm. š.) bývají našedivělé, kalné, místy paprskovitě vláknité; uzavírají též tu a tam krátké obdélníky 0.4 mm. z šíří, jež, náležejíce bez odporu nefelinu, tolikéž přeměnou byly uchváčeny; světlejší dílce polarisují v pestrých barvách. 400. zvětšením jeví se hmota čedičová co jemnozrná směs převládajícího augitu, magnetitu (ponejvíce železa titanového) s malými šedobílými místy, jež v polarisačním světle temné zůstávají, a v nichž nepochybně leucit převládá. Nepatrné, ostré, bezbarvé šesterce apatitu jsou dosti četné; tolikéž pozorovány hojně, nahnědlé, ostře omezené desky rázu šestercečného, jež se co biotit vyznačiti mohou. Větší, porfýricky vynikající krystaly augitu a olivinu naskytují se v množství podřízeném.

#### *Čedič z úpatí Kukulny u Františkova.*

Základní hmota krystalicky celistvé horniny, obsahující jednotlivá přeměněná zrnka olivinu, vykazují velmi jemnozrnou směs drobounkých, nahnědle žlutých

krystalků augitu, leucitu, malých zrněk magnetitu, jednotlivých porůzných desek biotitu a spoře rozdělených tyčinek živcových.

Krystalky leucitové mají obyčejně obrysy nezřetelné a bývají růžencovitě v hmotě čedičové rozšířeny; podobajíce se skryté základní hmotě, která však za silnějšího zvětšení všude v okrouhlé, mikrolithy augitovými více méně opatřené, začasť zřejmě osmi- a šestistranné dílce se rozpadá, mohou tak, jako v jiných čedičích téhož rázu, kde velmi malé průřezy leucitu méně zřetelný jsou, za hlavní součást se položit.

Četné, krátké (méně zřejmé) obdélníky náležejí nefelinu, který se v čedičích leucitových všude vyskytuje. Větší, skoro bezbarvé dílce, jež vyznačují se slohem vrstevnatým, jsou zajisté hmotou infiltrační.

Malé průřezy olivinu, jevící se dosti zhusta, jsou ponejvíce barvy oranžové červené.

### *Čedič od Kácova u Sichrova.*

Na zdání úplně hustá, základní hmota čediče tohoto, jenž velmi malá zrnka olivinu a bronzitového nerostu obsahuje, jeví při 400. zvětšení hustou směs, skládající se po většině z velmi malých, téměř mikrolithových krystalků augitu, leucitu (jenž se co okrouhlé světlé dílce jeví) a z hojného prášku magnetitu.

V této základní hmotě vyskytují se četné, větší, světlejší dílce okrouhlé, z nichž ony, jež co zřejmé šesterce a osmerce omezeny jsou, průřezy větších krystalů leucitových a jich skupin naznačují. V největší části jsou uvnitř skoro bezbarvé aneb obsahují toliko jednotlivé roztroušené krystalky augitové; okraj jejich bývá však velmi hustou skupinou mikrolithů augitových (začasť ve způsobu věnce) pokryt. V střední části některých průřezů leucitu vyskytují se shluky ostrohranných bezbarvých šesterců; v jiných zaujata jest střední část nezřejmými věnci zrněk práškových a okrouhlými skupinami krystalů augitových. Jednotlivé, větší, porfyricky vynikající krystaly olivinu jsou na okraji a podél četných, štěpných puklin žlutě zelené a jemně vláknité (vlákna stojí kolmo na okraji a na plochách štěpných.) Desky bronzitové lesku slabě hedvábného a některé krystaly amfibolu vynikají porfyricky. Četné úlomky desek biotitových jsou všude pojedine roztroušeny. V jedné větší bronzitové desce vyskytl se olivin co vrostlice.

## **2. Čediče peperinové.**

Čediče peperinové tvoří zvláštní skupinu čedičů leucitových a vyznačují se nejen svými zevními znaky, nýbrž i svým původem. Jsou červeno-hnědé, na hnědle šedé, řidčeji temně šedé, ponejvíce hlinité aneb drobovitě odrůdy čedičové, obsahující krystalicky celistvou hmotu základní a četné, větší, porfyricky vyloučené krystaly augitu, amfibolu, biotitu, rubelanu a začasť i úlomky jiných odrůd čedičových. Má se za to, že podobně jako peperin jsou i ony ztvrdlé bahno lávové. Základní jich hmota, jsouc vždy značně přeměněna, málokdy dopouští vybroušení destiček do úplné prohlednosti; tak se stavá, že se obyčejně pouze prosvitavými destičkami

spokojiti musíme; leč i tyto postačují, aby se zjistilo, že základní hmota peperinových čedičů mimo augit a magnetit (jenž již částečně v haematit a limonit přeměněn bývá) též leucit a nefelin co podstatné součásti obsahuje.

V pásnu českých leucitových hornin vyskytují se čediče peperinové nejčetněji v středním okrsku na levém břehu Labe v okolí Šímy, Milešova, Kostomlat a Loukova, pak v okolí Doupovském a Radešovském.

Zdá se, že mnohé temnozelené neb nahnědlé, co droby známé odrůdy čedičové, v nichž se velké krystaly augitu a amfibolu aneb desky biotitu a rubelanu, nebo jich krátké sloupky porfyricky vyskytují, téhož rázu a původu jsou.

### *Čedič od Kostomlat.*

Známo jest, že šedočerný tento čedič peperinový od Kostomlat, jehož úlomek od školního rady pana Svobody jsem obdržel, velkými krystaly augitu, amfibolu a deskami biotitu vyniká. Základní hmota jeho, na zdání celistvá, jeví při 400. zvětšení velmi jemnozrnou, krystalovou směs augitu, amfibolu, magnetitu a leucitu (nefelinu). Velmi malé, téměř bezbarvé krystaly leucitu, z nichž se bezbarvá, v polarisovaném světle temná hmota základní ponejvíce skládá, vynikají pouze sybkými věnečky mikrolithů a zaokrouhlenými skupinami hmoty čedičové; obdélníky nefelinové, krátké, pravouhelné, zřejmě omezené, vyskytují se jen porůznu.

### *Čedič z Loukova.*

Tento červenohnědý, hlinitý čedič, jenž, vyznačuje se velkými porfyrickými krystaly amfibolu, deskami biotitu a rubelanu, též známé metasomatické pseudomorfosy steatitu po rubelanu obsahuje, jest přeměněný čedič leucitový a nefelinový. Zemitý ráz základní hmoty překáží i zde zhotovení průhledné destičky; musí se tudíž pouze prosvitných destiček k studiu použít. Destičky tyto vykazují při 400. zvětšení velmi jemnozrnou, nahnědlou, krystalovou směs s většími, méně zřejmými, světlými, šestihrannými a pravouhelnými průřezy, jichž mikrolithy tím, že k hranám rovnoběžně uloženy jsou, na nefelin upomínají. Vedle těchto objevují se tu též větší, bezbarvé osmerce leucitu s nehrubě zřejmými věnečky; velmi malé, ostře omezené a soustředními věnečky vyzdobené osmistranné průřezy jsou četnější. Průřezy porfyricky vytvořených krystalů amfibolových jsou červenohnědé, rovnoběžně rozeklané, místy i jemněji rýhované; do puklin těchto průřezů, v nichž se tu a tam dlouhý mikrolith, za to však četné protáhlé dílce sklovité vyskytují, vniká namnoze červenohnědá, základní hmota s bezbarvými krystalky (nefelinu) a zaokrouhlými dílci.

Velké, více méně bezbarvé, ponejvíce ovální a nepravidelné dílce, jichž vrstevnaté čáry na okraji infiltrovanou hmotu patrně vyznačují, pocházejí nepochybně ze zrušeného olivinu; neboť v sousedním čediči z Klocberku, jemuž se tento Loukovský nemálo podobá, lze ony postupné přechody v olivin (ovšem též přeměněný) zřejměji pozorovati.



Podobného rázu jsou čediče peperinové z blízkých nalezišť od Štímy, Milešova, Dubic, pak od Doupova a Radešova. Čedič z Vlčí hory u Černošína, jenž jsa znám již svými velkými porfyrickými krystaly augitu a amfibolu, právě oněm čedičům peperinovým se podobá, byl chemicky analysován E. Jahnem.

#### Krystalicky celistvá, základní hmota čediče z *Vlčí hory u Černošína*

skládá se z husté směsi převládajících, malých krystalků augitových, jež na hranách i rozích zaokrouhleny bývají, dále z nefelinu, leucitu, hojného a stejně rozděleného magnetitu a sporého olivinu. Podélné průřezy nefelinové jsou zřejmě omezené co krátké pravoúhelníky a obsahují skoro pravidelně uložené vrostlice mikrolithové; neméně zřejmě bývají i průřezy leucitové, vyznačující se buď okrouhle uloženými mikrolithy, buď překrásnými věnečky práškovými. Množstvím svým převládá nefelin nad leucit.

Průřezy olivinové bývají vůbec červeně neb hnědočerveně zbarveny.

### 3. Čediče leucitové.

Čediče leucitové vystupují ve střední části hlavního pásma česk. čedičového horstva a v Krušných horách v rovnoběžných směrech. Táhnou se z krajiny Valečské a Doupovské přes Podbořany do českého středohoří a zaujímajíce zejména mezi Hořencem a Záhořím (s čediči peperinovými, jež je obkličují) vyšší místa, objevují se v tomže hlavním směru i dále na pravém břehu Labe u Střekova.

Čediče leucitové skládají se vesměs ze stejné zrnité směsi augitu a magnetitu, leucitu a nefelinu; olivinu obsahují poměrně málo, za to však vyskytuje se v nich vždy více méně hiotitu aneb rubelanu; začasté jest v nich i trojklonný živec zastoupen, leč obyčejně v množství nepatrném.

Čediče leucitové, jichž průřezy jsou vyzdobeny věnečky zrněk práškových, oplývají nefelinem, který v podobě krátkých sloupků průřezy jejich objímá; v menším pak množství vyskytuje se nefelin v oněch čedičích leucitových, jež ozdobnými věnečky mikrolithovými vynikají, postrádajíce věnečků práškových; ony obsahují též četné zaokrouhlené neb růžencovitě souvislé dílce, v nichž pozorují se pouze bezbarvé, dlouhé, jehlicovité mikrolithy, na obvodu tangentialně uložené. Od průřezů leucitových, které oněmi věnečky zrněk práškových zřejmě jsou odděleny, lze však pozorovati za pomenáhlého ubývání zrněk práškových až do oněch bezbarvých dílců postupné přechody, při čemž jediné tangentialně uložené mikrolithy vynikajícím znakem zůstávají; jest tudíž na blledni, že i tyto zaokrouhlené bezbarvé dílce průřezy leucitové jsou. Poněvadž však, ubývá-li temných zrněk práškových, bezbarvé mikrolithy se množí, jest množství obou v poměru zvratném.

Dle velikosti rozměrů dají se čediče leucitové rozdělit v

- a) čedičové leucitofýry čili zrnité čediče leucitové (s makroskopickými krystaly leucitovými),
- b) krystalicky celistvé čediče leucitové.

Hutnost čedičů leucitových obnáší (dle dvou zkoušek) 2·900—2·994.

## a) Čedičové leucitofýry

známy jsou z hor Krušných a od Lipova (severně od Oustí).

Jak známo, nalezly se na poli u Obervisenthalu v Krušných Horách krystaly leucitové, ostré co modely, jež se co metasomatické pseudomorfozy hmoty oligoklasové objevily; od Lipova pak znám jest leucitofýr, jehož leucity v bílý prášek jsou přeměněny.

Veškerá ostatní naleziště čedičů leucitových obsahují vesměs krystalicky celistvé odrůdy, v nichž toliko co vzácnost krystalky leucitové z více špendlíkové hlavy porfyricky vynikají (jako v čediči z Valče).

## b) Krystalické celistvé čediče leucitové.

*Čedič s Paškapole.*

Krystalicky celistvý čedič tento jeví při 400. zvětšení stejnou směs převládajícího augitu a leucitu, krystalků nefelinových a četných zrněk magnetitu, k nimž řadí se sporé desky biotitu, průřezy olivinu a mikro-porfyrické krystaly amfibolu a augitu.

Většina těchto mikro-porfyrických krystalů, jež se ostatně v množství toliko podřízeném tuto nacházejí, podobá se oněm z čediče od Slaného.

Průřezy augitové srovnávají se s průřezy augitovými z hory Košovy; jsou na okraji slabě nahnědlé a obsahují zejména blíže hran četné dílce sklovité s plynovými bublinkami; krystaly leucitové a různé mikrolithy vyskytují se v nich co vzácné vrostlice. Vedle těchto jsou tu i průřezy augitové, jež, jsouce bohaty krátkými mikrolithy a skládající se zčásti z menších, s hranami rovnoběžně uložených krystalků augitových, zároveň sporými vrostlicemi krystalků leucitových se vyznačují. Větší desky, méně četné, blíží se bronzitu čediče Kuzovského.

Co součást mimo augit převládající vyniká zde leucit. Krystalky jeho, po většině stejně rozděleny, jsou malé a vyznačují se povždy ozdobnými věnečky dílců sklovitých, aneb skupinami krátkých mikrolithů augitových, zrněk magnetitu a v střední části pak dílci sklovitými. Krystaly větší, skupiny a srostlice jsou hojnější, ozdobeny jsouce ponejvíce dvojítm, neb i složitějším věncem temných zrněk práškových a hojných, mezi nimi ležících mikrolithů augitových; střed jejich pak vykrášen bývá nakupeninou mikrolithů augitových (která zčásti rovnoběžnými směry s průřeznými hranami omezena jest), dílci sklovitými (s pevnými bublinkami plynovými), zrnky magnetitovými a mikrolithy leucitovými.

Vedle krátkých mikrolithů augitových, jež buď ve středu (kdež často křížaté srostlice tvoří) aneb ve věnečkách ponejvíce s hranami rovnoběžně uloženy jsou, vyskytují se v krystalech leucitových též dlouhé, tenké, bezbarvé mikrolithy, jež pouze na bezbarvém okraji se objevují, do průřezů leucitových šikmo vnikajíce. Takovéto mikrolithy převládají tím více, čím méně zrníček práškovitých leucit obsahuje; jsou tedy v největším množství v takových leucitech, které věnců z temných zrníček postrádají. Neméně četné jsou tu i mikrolitické složky krystalků augitových, jež v oněch hojných, nezřídka do sebe sáhajících a kontury většího průřezu leucitového tvořících věnečkách nejvíce jsou zastoupeny.

Malé krystalky leucitové, které do větších průřezů leucitových jsou zarostlé, bývají ostře omezeny a zcela vyplněny temnými zrnky práškovými; řidčeji vyskytují se průřezy leucitové, jichž hmota — hmotu čedičovou uzavírající — jen co bezbarvá obruba se jeví.

Nefelin objevuje se tu v bezbarvých, krátkých a tenkých obdélnících, které obvykle s hranami průřezů leucitových rovnoběžně uloženy jsouce, průřezy jejich objímají. — Krystaly olivinové vyskytují se jen porůznu; jsou obvykle malinké, žlutošedé, kalné a vlnitě vláknité.

Hutnost čediče z Paškapole = 2·900.

### *Čedič od Záhoře.*

Velmi jemnozrná hornina čedičová od Záhoře vykazuje za 400. zvětšení hojnost menších a větších, velmi ozdobných krystalků leucitových, jež rovnajíc se množstvím svým skoro součásti augitické ve spojení s nehrubě čtutým nefelinem asi polovici hmoty čedičové zaujmají. Mimo desky biotitové, jež se tu a tam v hojnosti objevují, jest čtutý magnetit tuto téměř stejně rozšířen. Malé, pravouhelné, bezbarvé průřezy nefelinu vyznačují se mikrolithy augitovými a leží rovnoběžně s hranami leucitovými; větší vyskytují se řidčeji. Vzácnější jsou též větší, kalné, zelenožluté, vlnitě vláknité krystaly olivinu. Bezbarvé krystaly leucitové jsou ponejvíce malé, avšak namnoze u velikém množství nakupené; vyznačují se povždy buď vrostlicemi soustředně uložených mikrolithů augitových, aneb ozdobnými, po většině dvojími neb trojími soustřednými věnci temných zrněk práškových; v středu jejich jest však obvykle malá skupina mikrolithů augitových. Největší část těchto průřezů leucitových má ostré mnohoúhelné (osmi- a šestiúhelné) omezení, kteréžto i oněm průřezům neschází, jež temnými zrnky práškovými a mikrolithy augitovými úplně jsou vyplněny.

V značném množství vyskytují se něžné krystalky leucitové v deskách biotitových co vrostlice; tytéž pozorovaly se i dosti hojně v krystalech amfibolových.

Vybroušená destička z porušeného úlomku téhož čediče jevila přeměněnou část, v níž bezbarevné, ale nahnědlými zrnky práškovými opatřené krystaly leucitu vynikaly. Nepochybně poukazuje tato proměna v barvě zrněk k většině obsahu železa v zrnkách práškových.

Krystalky augitové (amfibolové) nestejně veliké, jsou podlouhlé, hnědošedé, ponejvíce jemně rýhované a na okraji, jež hojně částice sklovité a zrna magnetitová obsahuje, nehrubě přímočaré (slabě vlnité). Nepatrné krystalky leucitové bývají v nich co vrostlice dosti hojné.

Větší krystaly amfibolu, poněkud porfyricky se jevící, jsou na okraji, který hojnými dílci sklovitými a zrnky magnetitovými (mezi nimiž i nepatrné krystalky leucitové pozorovati lze,) poset jest, temněji kaštanově hnědé, uvnitř pak mnohem světlejší; pouze na temnějším, okrajním pásmu jejich vyskytly se čtuté, malé, podlouhlé mikrolithy.

Čtuté, dosti velké, nahnědlé desky biotitové a úlomky jejich vyznačují se rovnoběžnými, více méně hustými pruhy, které tím povstávají, že jednotlivé přes sebe uložené lístky svými průřeznými hranami vyčnívají; omezení lístků bio-

titových jest zřídka (jen na menších) pravidlné. Tytéž mají skoro vždy hojnost vrostlic (sporných krystalků augitových a jednotlivých zrněk magnetitových), mezi nimiž bezbarvé krystalky leucitové nejobyčejnějším a nejčetnějším jsou zjevem. Sporné průřezy olivinové jsou zelenavě šedé neb nahnědlé, většinou kalné, nezřejmě vlnitě vláknité a více méně proměněné; poblíže jich bývají celé dílce hmoty čedičové, mnohdy bezbarvé krystaly leucitu slabě nahnědlé. A zbarvení toto pochází nepochybně od vyloužené hmoty olivinové. Krystaly živcové neobjevily se nikde.

### *Čedič leucitový ze severových. úpatí Milešovky.*

Broušené destičky této velmi jemnozrné, černošedé horniny čedičové — kteréž vzaty byly z kusu poněkud již zvětřalého — vykazují stejně krystalickou směs s jednotlivými, porfyricky se jevícími krystaly amfibolu.

Leucit vystupuje tuto co součást po augitu převládající. Jeho průřezy jsou poměrně dosti veliké a některé (málo) z nich zřejmými věnečky temných zrněk práškových a krátkých mikrolithů ozdobené; v největším počtu jsou však bílé, méně prosvitné a uzavírají jednotlivé, malé mikrolithy, aneb bývají více méně bohaty nepravidelně nakupenými vrostlicemi.

### *Čedič leucitový z východ. úpatí Milešovky*

podobá se čediči z Paskapole, obsahuje však patrně více nefelinu než leucitu. Leucit vyskytuje se tu v malých zaokrouhlených, bezbarvých dílcích bez zřetelného omezení. V nemalém množství nacházejí se zde podlouhlé, na okraji jako sklo slité průřezy amfibolové, jež v nazelenalých vnitřních pásmech četné sklovité vrostlice obsahují a začasť hustým, jemným rýhováním lesku hedvábného nabývají. Též nakupeniny zrněk magnetitových, jež v čedičové hmotě stejně jsou rozděleny, vyskytují se v podobě průřezů amfibolových. Olivin barvy nazelenalé, kalné, jest sporný.

### *Leucitový čedič z Klobčerku jihozáp. od Milešovky.*

Četné, velké dílce zelenožluté hmoty infiltrační a touto právě hmotou zakalený vid základní hmoty poukazují k tomu, že mikroskopická destička této velmi jemnozrné horniny čedičové ze zvětřalého úlomku vzata jest.

Základní hmota jeví při 400. zvětšení stejně zrnitou směs malých krystalků augitových, leucitových a magnetitových, v níž se velmi hojně, větší, ozdobné krystaly leucitu, jednotlivé průřezy amfibolu a dialagu, sporné desky biotitu, konečně i porfyricky vytvořené krystaly olivinu vyskytují.

Četné průřezy leucitové jsou ponejvíce ostře omezeny (v osmercích a šesticích), obsahují však méně zrněk práškových, ale množství mikrolithů, jež zvláště v střední části sypce nakupeny jsou a na okraji krásná mnohostranná, věncovitá pásma tvoří, která k zevnímu omezení rovnoběžně uložena jsou. Zdá se, že tyto mikrolithy jiné jsou než ony zřejmé mikrolithy augitové význačných leucitů čediče

Paškapolského; jsou spíše podlouhlé, poněkud zaokrouhlené a jich přístřešení na koncích otupeno jest plochou spodovou; z té příčiny lze je pokládati spíše za mikrolithy amfibolové. Některé z krystalů leucitových jsou slabě žlutavě šedé, většina pak, která i bezprostředně s hmotou infiltrační se stýká, jest bezbarvá a nejví žádných stop po přeměně.

Větší, porfyrické průřezy amfibolu jsou podél silně rýhovány a obsahují malé mikrolithy.

Větší, šedobílé desky nerostu dialagu podobného jsou dosti četné, vyznačujíce se jemným rýhováním, poněkud hedvábným leskem, neméně i tím, že mikrolithů úplně postrádají. Průřezy olivinové, v menším množství se vyskytující, bývají kalné, nažloutlé neb zelenavě šedé, poněkud již přeměněné, tvořice postupné přechody až v nebarevné neb žlutavě bílé dílce, jež hmotě infiltrační se podobají.

### *Čedič leucitový se záp. úpatí hory Kletečné.*

Kuželovitá hora Kletečná (na jejímž vých. úpatí vesnice téhož jména se nachází) neliší se mnoho ve výšce od Milešovky, skládá se i s kuželi sousedními z fonolitu; vrcholy fonolitové obroubeny jsou však hornatinami čedičů leucitových. Skrytý sloh čediče ze záp. úpatí hory Kletečné podobá se slohu čediče Paškapolského.

Velmi četné krystalky leucitové jsou překrásné, vyznačujíce se pravidelnými, složitými věnci, kteréž skládají se z hustě seřazených zrnek práškových a mikrolithů a s průřeznými hranami rovnoběžně uloženy jsou; v největší jich části vyskytují se v dílcích středních menší mikrolithy augitové a na bezbarvém okraji pak četné, šikmé, tenké a bezbarvé mikrolithy. Objevují se však i úplně bezbarvé, zaokrouhlené dílce, jež pouze na okraji hojně, bezbarvé, dlouhé mikrolithy obsahují, mezi nimiž i takové přicházejí, jež, hmotou čedičovou více méně zaujaty jsouce, jen bezbarvou obrubu tvoří.

Krátké bezbarvé obdélníky krystalů nefelinových s význačným uložením mikrolithů augitových vyskytují se v množství menším.

Větší, porfyrické krystaly amfibolu, které jen spoře se objevují, obsahují četné dílce sklovité, v nichž bývají bublinky plynové (některé pohyblivé). Větší, v menším množství se objevující průřezy olivinové jsou co tráva zelené, jemně vláknité a vyznačují se schůdkovitými dutinami, jež na způsob kostry vedle sebe četně seřazeny jsou.

Světle-hnědé desky biotitové jsou dosti četné.

### *Leucitový čedič s Bilinky.*

Nedaleko Bilinky zdvihá se několik malých čedičových kopců, jichž horniny užívá se co šterku na silnici z Lobosic do Bořislavi vedoucí. Tato hornina čedičová, jsouc velmi jemnozrná, obsahuje hojně, malá, porfyricky roztroušená zrna olivinu barvy žlutozelené, černá, silně lesklá, rozpukaná a rýhovaná zrna

amfibolu, sporá zelenočerná zrna nerostu dialagu podobného, řidčeji pak destičky biotitu a četné velké, ponejvíce v hmotě čedičové se rozvětřující vrstlice jaspisovitě, zelenošedé hmoty (žárem přeměněné opuky).

Základní hmota jest naskrze jemnozrná a jeví při 400. zvětšení stejně krystalickou směs malých krystalků augitu, leucitu a magnetitu, nečetné pak krystalky nefelinu a olivinu.

Malé krystalky augitové jsou vesměs krátké a tlusté, častěji křížmo srostlé; i větší krystaly tohoto druhu uzavírají menší krystalky augitové, jež s hranami rovnoběžně jsou uloženy; porfyrické krystaly augitu objevují se pořídku.

Krystaly amfibolové, jež se v základní hmotě porfyricky vyskytují, jsou na okraji nahnědlé, uvnitř žlutavé, mají jen málo mikrolithů, obsahují však hojnost dílců sklovitých s bublinkami plynovými, jež většinou ve středu a na pokraji (se zrnky magnetitovými) nakupeny jsou. Bezbarvé krystaly nefelinu a skupiny zrnok magnetitových i hmoty čedičové objevily se co vzácné vrstlice. Větší desky dialagové s okrajem dosti ostře omezeným obsahují malé mikrolithy, avšak četné, k směru štěpnému rovnoběžné pruby sklovité, v nichž nepatrné bublinky plynové pozorovati lze; tytéž jeví se i v pásnu okrajním. Průřezy leucitové jsou vesměs malé; mnohé z nich jeví ostré osmi- a šestihrany, obsahující věnečky temných zrnok práškových a skupeniny mikrolithů augitových se zrnky magnetitovými; jiné, méně ostře omezené, podobají se bezbarvým dílcům sklovitým, v nichž toliko na okraji hojné, tenké mikrolithy se vyskytují.

Průřezy nefelinové (bezbarvé obdélníky a šesterce) nejsou četné.

V množství velmi malém objevují se dlouhé tenké bezbarvé krystaly nepochybně apatitu a malé bezbarvé polysynthetické tyčinky, jež trojklonému živci náležejí. Magnetit, který se ponejvíce v malých zrnkách, šesterečných průřezech i v skupinách vyskytuje, rozdělen jest po celé hmotě čedičové stejnou měrou.

Malé průřezy olivinu, poněkud kalné, dílem (a zvláště na okraji) vlnitě-vláknité, jsou dosti četné; řidčeji vyskytují se však (v základní hmotě) větší průřezy olivinové, jež jsouce obyčejně zelenavé, šedobílé, vláknité, některé i bezbarvé, četnými puklinami na více méně pravidelná políčka se dělí, jež s průřeznými hranami rovnoběžně omezena jsou. Jednotlivé, šedobílé, kalné, vláknité průřezy podobají se skrytému slohu kankrinitu.

Světlošedý prášek této horniny čedičové pouští v studené kyselině chlorovodíkové četné bubliny; ohřeje-li se, nastává slabé šumění.

Zvláště zajímavé jsou světle namodralé, nazelenalé neb žlutavě šedé vrstlice hmoty jaspisovitě, které se objevují co úlomky opuky, jež byly roztopenou hmotou čedičovou uzavřeny a žárem přeměněny.

Tyto vrstlice, jež v čediči od Bilinky nesmírně hojně se vyskytují, jsou co ořech i co vejce veliké, krystalicky celistvé, velmi pevné kusy nepravidelného omezení. Mikroskopická a chemická skladba jejich uvádí se v dalším článku „o vlivu čediče na horniny sousední etc.“

*Leucitový čedič z Hořeneckého vrchu u Kozlů.*

Skrytý sloh tohoto čediče leucitového podobá se slohu čediče Záhořského.

Bezbarvé průřezy leucitové se zřetelnými, začasté složitými, ne však tak ozdobnými věnečky temných zrněk práškových jsou místy velmi četné, celkem převládá však součást augitická.

Četné, větší, porfyricky se jevící průřezy amfibolové jsou povždy rýhované, nemají téměř žádných mikrolithů, ale kraj jejich poset bývá hojnými dílci sklovitými a zrnky magnetitovými. Protáhlé, šestihrané, příčné průřezy amfibolové ukazují ve středu svém podélnou rýhu; podélné pak průřezy, mající podobu rovnoběžníků, vykazují takové rýhy dvě, které se od rohů jednoho konce ku střednímu bodu protější průřezné hrany sbíhají; klínovité pole rýhami uzavřené bývá světlejší.

Průřezy magnetitové jsou ponejvíce malé a všude téměř stejně rozdělené. Černé trichity, v podobě koster nakupené, skládají se nepochybně z hmoty magnetitové a vyskytují se podobně, jakž Zirkel z čediče Dächelsberkského (nedaleko Bonnu) uvádí.

Větší, olivinu podobné průřezy, jichž zelenožlutý okraj z velmi jemných, skoro přímočarých, aneb širších, slabě vlnitých vláken se skládá, obsahují ve světlejší střední části své četné, pravoúhelné, v určitých směrech (ponejvíce schodovitě) vedle sebe seřazené výtvořiny dutinné, jež nepochybně kostrám krystalů olivinových, jichž hmota k vyplnění dutin nestačila, připočítati sluší; jiné téměř co čtverec omezené, skládají se z jemných, podélných a příčných vláken, jež se křížujíce, vykazují jemné mřížovité síťování. Do mnohých vniká hmota čedičová, do jiných zasahají opět jednotlivé krystaly amfibolu. Jednotlivé malé dílce tohoto čediče leucitového jeví se co skryto-krystalická směs, v níž nahnědlá, poněkud zkalená hmota čedičová se vyskytuje.

Hutnost čediče Hořeneckého = 2.994 (5 gr. ur.)

*Leucitový čedič z Doláněk u Podbořan*

obsahuje jednotlivé, malé, makroskopické krystaly augitové, podobaje se skrytým svým slohem čediči Paskapolskému. Největší díl průřezů leucitových ozdoben jest krásnými věnečky zrněk práškových, z nichž mnohé, našedivěle jsouce zbarvené, ostře omezeny jsou černými rýhami, jež se ze zrněk skládají, a z bezbarvého pásma jasně vynikají. Jednotlivé, bezbarvé dílce, rovnoběžně vláknité a dílem ze širokých podélných průřezů (nefelinu) se skládající, podobají se oněm z Malého Hummelberku u Podbořan. Téhož rázu jako v čediči Hummelberkském jsou tolikéž oranžové a citronově žluté, podélně rozpukané a příčně vláknité průřezy, jež nepochybně melilitu náležejí. Mnohé z nich jsou zelenavě kalné a pouze jemně vláknitou oranžovou obrubou opatřené; v mnohostranných, zaokrouhlených průřezech počíná se čtvercová vláknitost ze středu. Ulomky biotitové a destičky lesklé rudy železné vyskytují se častěji, též co vrostlice v makroskopických průřezech augitových.

*Leucitový čedič z okolí Valečského (směrem k Hlavákovu).*

V okolí Valče směrem k Hlavákovu narovnány jsou v polích veliké balvány čedičové různého rázu. Z takého balvánu vzaty jsou úlomky černošedého, velmi jemnozrného čediče k rozboru mikroskopickému.

Základní hmota jejich, uzavírajíc v sobě velmi hojně, pouhým okem již zřejmé krystaly amfibolu a jednotlivé, sporé, co špendlíková hlava veliké krystaly leucitu, skládá se při 400. zvětšení z velmi jemnozrné směsi převládajícího augitu bezbarvých neb slabě nažloutlých krystalů leucitu, jednotlivých, bezbarvých, krátkých, širokých obdélníků nefelinu, sporých, velmi tenkých jehlic živce a stejně rozděleného, velmi jemnozrného magnetitu. Mikroskopický obraz jeví celkem takový pohled, jakoby se veškerá základní hmota pouze z malých krystalků leucitových skládala, v nichž pak součásti augitové a magnetitové ve věncích stejně rozděleny jsou.

Úplně bezbarvé průřezy leucitové, pouhým okem již zřetelné, omezeny jsou zřejmými osmiúhelníky a mají poblíže kraje velmi tenký věnec zrněk práškových; bezbarvý střed pak proniknut jest dlouhými mikrolithy v rozmanitých směrech.

Malé, mikroskopické průřezy leucitové jeví ve střední části vždy okrouhlé skupiny ponejvíce concentricky uložených mikrolithů augitových; mnohé z nich (zvláště na tlustších místech) vykazují pouze osmihranou nažloutlou obrubu, vnitro pak skládá se z hmoty čedičové. Většina jich obsahuje souvislý věnec mikrolithů augitových na okraji svém.

Větší krystaly amfibolu (mnohé z nich průřezům hypersthenovým podobné) jsou široké, rovnoběžné, hustě rýhované a vyznačují se krásným slohem miskovitým (s dlouhými mikrolithy a zrny v miskových pásmech). Olivin schází.

*Leucitový čedič ze záp. svahu hory Čebíšské proti Turči.*

V krystalicky celistvé základní hmotě vyskytují se četná mikroporfýrická zrna augitová, jichž průřezy skrytým slohem svým s oněmi z čediče od Varty (na Ohři) se srovnávají. Uzavírají nescíslné množství bezbarvých, podlouhlých, tlustších i velmi tenkých, dle rozmanitých směrů roztroušených mikrolithů, jež omezeny jsouce hranolem, plochou spodovou a celou řadou tupých jehlanců, uvnitř opatřeny jsou začasté pory plynovými; vesměs náležejí nefelinu neb apatitu.

Základní hmota, byvši 400. zvětšena, vykazuje velmi jemnozrnou, dleem i mikrolithickou směs, která výhradně z augitu, leucitu, nefelinu a magnetitu se skládá. Průřezy leucitové jsou všude velmi malé, ale vyznačují se zřejmě dleem ozdobnými věnečky práškovými, dleem soustředními shluky mikrolithovými, neb směsí bezbarvých jehlicovitých mikrolithů, řidčeji pak zřejmým, osmihraným omezením.

Podélné průřezy nefelinové vyskytují se v množství menším a jsou skoro úplně bezbarvé a ostře omezené; jich příčné průřezy jsou pravidelné šesterce, které z husté směsi krystalové jasně vynikají.

Poněvadž i na podlouhlých, bezbarvých krystalech, jež vyskytují se v makro-



skopických krystalech augitových a jen nefelinu náležeti mohou, ponenáhle ubývání šíře a přibývání délky se pozoruje, lze souditi, že i ony delší, jemné jehlice v augitových a leucitových průřezích nefelinu náležejí.

Okolo větších průřezů augitových bývá augitická směs základní hmoty sypká, jsouc omezena bezbarvými pásmy, jež výhradně z nefelinu a leucitu se skládají. Malé desky biotitové jsou dosti hojné; v množství menším vyskytují se mikroskopické, co citron žluté, vláknité, pravoúhelné průřezy, jež melilitu se podobají. I apatit bývá hojnější; malé bezbarvé jeho šesterce vězí v zrnkách magnetitových. Leucit a nefelin zaujímají asi polovici hmoty čedičové.

#### *Čedič z Čebíše směrem k Mašovu.*

Čedič z jiného, avšak neúplně určitého místa hory této podobá se čediči ze záp. svahu, obsahuje však méně augitu; hustě nahromaděné krystalky leucitové jsou mikrolithy a zrnky práškovými tak vyplněny, že je pouze dle okrouhlého omezení a koncentrického slohu poznati lze; též průřezy nefelinové bývají skupinami mikrolithů zkaleny.

#### *Čedič z třetího místa hory Čebíšské u Mašova*

srovnává se skrytým svým slohem úplně s čedičem hory Vinařické. Jeví při 400. zvětšení poněkud hrubozrnnou směs krystalovou, v níž dlouhé, rýhované a překrásnými miskovitými pásmy význačené krystaly amfibolové téměř polovici hmoty čedičové ujmají a v polarisovaném světle pestře barevné lístky okazují, nefelin pak vyskytuje se v krátkých, pravoúhlých, na hranách slitých a více méně pravidelných průřezích šesterečných, jsa skoro úplně bezbarvým. Menší, ostře omezené, poněvíc poprášené šesterce a jim podobné, tenší, podélné průřezy čítám k apatitu, bezbarvé pak a zaokrouhlené, dlouhými mikrolithy bohaté dílce leucitu.

I olivin objevil se v nečetných, velmi malých makroskopických krystalkách. Jeden průřez jeho, pouhým již okem zřetelný, vykazuje s obrysem olivinového průřezu rovnoběžně omezenou vrostlici a široké pruhy jemnozrné hmoty čedičové, v níž nefelin převládá. Mezi součástkami směsi krystalové vtěsnána jest kalná šedožlutá hmota sklovitá.

#### *Čedič leucitový mezi Vartou a Vočem.*

Krystalicky celistvý, na zdání úplně stejnorodý čedič vykazuje za 400. zvětšení velmi jemnozrnnou směs leucitu, nefelinu, augitu a magnetitu.

Průřezy leucitové, jakož průřezy ostatních součástek, jsou vesměs malé, zrnky práškovými a mikrolithy velmi znečištěné a přeměnou již poněkud zakalené. Nemnohé z nich obsahují zřejmé věnečky zrněk práškových, za to však vyskytují se tu koncentricky uložené mikrolithy mnohonásobně. Obrysy skoro všech krystalů

leucitových jsou dílem ostré, šesti- neb osmihrané, dílem již do kola uloženými krystalky augitovými zřejmé. Obvykle jsou mnohé krystaly leucitové seřaděny jako v růžencích, které již pouhým okem v broušené destičce co bezbarvé proužky pozorovati lze.

Krátké obdélníky podélných průřezů nefelinových zastoupeny jsou v množství dosti velkém, vyznačující se četnými, s hranami rovnoběžně uloženými mikrolithy. Sporé krystaly amfibolové vynikají nad obvyčejnou velikost.

*Velmi jemnozrný, olivinem bohatý, černošedý čedič ze Střekova*

u pahorku fonolitového, na němž zříceniny hradu stojí, jest čedič leucitový, podobný čediči z Hořence. Makroskopicky vynikají pouze zrna olivinová a nemnohá augitová, z nichž ona začasťe zvící pěsti z čediče vyloužena jsou. Základní hmota jeví za 400. zvětšení velmi hustou, hnědošedou směs převládajícího augitu (ujímajícího skoro  $\frac{2}{3}$  hmoty čedičové), magnetitu s velmi malými krystaly leucitovými a nefelinovými.

Krystalky leucitové, vyznačující se pouze nečetnými, okrouhle nakupenými mikrolithy a tu a tam ostrými, osmihranými obrysy, rozšířeny jsou velmi hojně po celé hmotě, nebývají však všude zřejmé. Obdélníky nefelinové, blížící se čtvercům, vynikají pravidelným omezením mikrolithů a jeví začasťe (následkem proměny) rovnoběžnou vláknitost. Za leucit považují i ony četné, bezbarvé, dlouhými mikrolithy bohaté dílce (jež se Zirklovým polosklovitým místům podobají).

Průřezy olivinové jsou šedoblé neb skoro bezbarvé, na obvodu a v puklinách zoubkovaným třepením opatřené a více méně šedozeleně zbarvené; mnohdy zasahují též pruhy hmoty čedičové dosti hluboko do průřezů olivinových. Průřezy augitové, porfyricky vynikající, obsahují (ponejvíce u prostřed) hojnost zrněk ztruskovitých a porů plynových, které mnohdy největší díl průřezu zaujímají, tak že pouze tenká obruba čisté hmoty augitické zbývá.

*Velmi jemnozrný leucitový čedič z Plešné hory*

obsahuje dosti četná, nepatrná zrnka olivinu a jednotlivá zrna amfibolu. Jeho základní hmota jeví hustou směs augitu, leucitu, nefelinu a magnetitu. Místy uzavírají vyloučeniny (konkrece) bezbarvého nefelinu jednotlivá zrnka magnetitu a na hnědlé destičky biotitu; bezbarvá místa, náležející hmotě leucitové, obsahují hojně, dlouhé, tenké mikrolithy. Malé průřezy leucitové, obsahující tu a tam ozdobné věnečky zrněk práškových a mikrolithů, pronikají velmi hojně celou hmotu; jen místy objevuje se čteněji nefelin v bezbarvých obdélnících. Množství hmoty leucitové a nefelinové rovná se skoro hmotě augitické. Zrnka olivinová jsou na okraji bezbarvá, v puklinách pak zelenavě žlutá.

*Čedič leucitový z Tržánské hory*

srovnává se úplně s čedičem Paškapolským zvláště skrytým slohem základní hmoty, která krásného leucitu hojnost obsahuje. Význačné jsou však větší desky bronzitové, opatřené četnými řadami, neb souvislými pásy protáhlých dílců sklovitých,

v nichž stálé bublinky vězí, a velmi četnými, protáhlými i zakulacenými pory plynovými i (jak se zdá) tekutinými. Pásky porů plynových táhnou se ponejvíce směry, jež jsou zároveň výrazem štípatelnosti.

### III. Čediče živcové.

#### 1. Čediče melafýrové.

Výše bylo již vyznačeno, že čediče živcové obsahují ponejvíce oligoklas; není tudíž v podstatě žádného kvalitativního rozdílu mezi skupinou oligoklasových čedičů a oněmi horninami melafýrovými, jež vykazují krystalickou směs oligoklasu augitu, a magnetitu. Blízká příbuznost obou těchto druhů hornin i v tom se značí, že podobně jako v horninách čedičových i v melafýrových něco magmatu, začasť i sporý nefelin a olivin bývá. Jediný rozdíl spočívá pouze v množství, v jakém se jednotlivé nerostné součásti objevují a jenž i mikroskopickým i chemickým rozbořem na jevo vychází.

V čedičích živcových zaujímá živec trojklonný obyčejně značně méně než polovici hmoty čedičové, tedy daleko méně než součást augitická; v horninách melafýrových převládá však, ujímaje začasť více než  $\frac{2}{3}$ , veškeré hmoty horniny. Jest však shupina hornin čedičových, jež mikroskopickým a chemickým rázem svým horninám melafýrovým se podobajíce, poměrem ve množství jednotlivých, nerostních součástí mezy čedičem a melafýrem leží aneb více k melafýru než k čediči se kloní.

A čedičové horniny tohoto druhu označují co čediče melafýrové.

Čediče melafýrové jsou ponejvíce zřejmě krystalické, avšak velmi jemnozrné (anamesitové) čediče barvy načernalé neb nazelenalé-, nažloutle-, nahnědle-šedé, v nichž živec trojklonný nejméně polovici hmoty čedičové zaujímá, augit pak a magnetit v množství menším a olivin již zřídka v makroskopických krystalech se pozoruje. Možná, že mnohá zde zmíněná hornina čedičová po důkladnějším prozkoumání čedičů melafýrových bude se moci k těmto připočísti.

Zároveň sluší podotknouti, že čediče melafýrové mikroskopickou i chemickou povahou velmi blízko se řadí k velmi jemnozrným čedičům andesitovým, různé se od nich pouze tím, že neobsahují skryté základní hmoty, složené z nefelinu a leucitu, pak že nemají amfibolu a biotitu, leda v množství velmi skrovném.

Mezi jednotlivými krystaly čediče melafýrového objevuje se začasť nahnědlá neb bezbarvá hmota sklovitá u množství větším, řidčeji tak spoře, že na pohled úplně schází. A dle množství a povahy magmatu rozdělití lze čediče melafýrové v čediče:

- a) s nahnědlým
  - b) s bezbarvým
  - c) na zdání bez sklovitého tmele.
- } magmatem sklovitým a

V chemickém ohledu kolísá množství kyseliny křemičité čedičů melafýrových mezi 44—50%; v horninách melafýrových přesahuje 50%.

a) Čediče melafyrové, vyznačené nahnědlým magmatem sklovitým.

*Čedič melafyrový z Tolčberku (jižně od Jablonce).*

Mikroskopické destičky tohoto čediče jeví co převládající součást trojklonný živce, mezi jehož bezbarvými, dlouhými, tenkými a širokými krystaly — jež nejméně  $\frac{3}{4}$  celé hmoty čedičové činí — kalná našedivělá neb žlutavě zelená, sklovitá hmota, obsahující všude hojnost bublinek plynových, trichitů, zrněk a prášků a pak sporé krystaly augitové a četná zrna magnetitová se objevují.

V hojném množství vyskytují se dlouhé a široké, bezbarvé, podélné průřezy živce, jež po 2—3, neb i více rovnoběžných jednotnicích složeny jsou; mnohé z nich přes 1 mm. široké, 5—6 mm. dlouhé a poněvíc velmi silně a četně rýhované, polarisují fialově, červeně, nahnědle neb bílé a jeví na okraji úhledný sloh miskovitý; jiné obsahují též sporé mikrolithy a četné okrouhlé dílce sklovité. V jednom průřezu obdélníkovém objevily se větší, nahnědle žluté a temné dílce sklovité s bublinkami plynovými a zrnky struskovitými, jež, žilkami mezi sebou spojeny, úhlednou vrostlici v podobě rámce schůdkovitých obrysů tvoří.

Podobné dílce sklovité, méně pravidelně uložené, vyskytují se též v jiných podélných průřezích. Okolo větších krystalů živcových, které již pouhým okem spatřiti lze, nakupeny jsou v ozdobných fluktuacích paprsky a svazečky úzkých, bezbarvých tyčinek.

Mezi krystaly živcovými pozorovati lze sklovitou hmotu, která, překypující zrnky, bublinkami, rozmanitými výtvary práškovými, na četných pak místech i dlouhými, tenkými mikrolithy, více méně zkalena jest. Táž jest původně barvy nahnědle šedé, přijímá však namnoze (okysličením železa) barvu špinavě nazelenalé žlutou a stává se kalnou. Větší, obyčejně podlouhlá zrnka magnetitu (železa titanového) jsou spořeji zastoupena; menší zrnka téhož nerostu uložena jsou často v řadách, rovnoběžných s tyčinkami živcovými. Spořeji vyskytují se krátké, široké, neúplně vytvořené (zaokrouhlené) krystaly augitu, jichž skupiny obyčejně krystaly živcovými prorostlé nebo s nimi úplně srostlé jsou. Tolikéž ve středu jednoho širokého příčného průřezu živcového objevil se větší kus augitu. Drobné, bezbarvé průřezy šesterečné, náležející apatitu, jsou dosti četné. Krystaly olivinové jsou velmi silně přeměněné, kalné, dílem i vláknité a temnozelené; hmota jejich působí nepochybně ono nazelenalé zbarvení hmoty základní.

Celkový ráz tohoto mikroskopického lístku jeví velikou pododnost s horninou melafyrovou.

Hutnost = 2.759.

*Čedič melafyrový z Pesvice.*

Velmi jemnozrná hornina čedičová s četnými zřetelnými nepatrnými zrnky augitu a olivinu jeví za 400. zvětšení poněkud hrubozrnou směs augitu s dlouhými a širokými krystaly trojklonného živce (jež zřejmě a velmi četně jsou rýhovány) a jednotlivých zrn olivinu a magnetitu. Mezi krystaly vtěsnána jest hmota, která,

namnoze i samostatné dílce ujímajíc, jest všude temně nažloutle hnědá, výtvoř práškovými a chomáči trichitů velmi bohatá a v polarisovaném světle temná.

V četných průřezích živcových pozorovati lze jednotlivé krátké mikrolithy, uložené ponejvíce s průřeznými hranami rovnoběžně a tu a tam i jednotlivé bublinky plynové, z nichž některé zdají se býti pohyblivé. Velká část podélných průřezů živcových jeví v polarisovaném světle nahnědle šedé neb žlutavě bílé široké pruhy a velmi četné, temné čáry. Podélné i příčné průřezy vynikají miskovitým slohem (zvláště na okraji); v jednotlivých pásmech uloženy jsou řady mikrolithů rovnoběžně k miskám.

#### *Čedič melafyrový ze spálených smrčů u Huntýřova.*

Nahnědlá, všude zřejmě (v malých dílcích) vynikající aneb mezi krystaly vtěsnaná hmota tohoto čediče objímá jednotlivé krystaly neb shluky amfibolu, augitu, trojklonného živce, malých, stejně rozptýlených zrn magnetitu a nečetné menší průřezy olivínu.

Nahnědlá, práškovitá hmota uzavírá na mnoze vlnité skupiny jemných vlásků trichitových, ponejvíce však větší husté kostrovité výtvoř trichitové, jež po většině z černých, ostře vynikajících, obyčejně však nahnědlých, méně ostře omezených, rozčuchaných jehlic se skládají. Velice podobá se pravdě, že jehlice a vlásky nahnědlé z oněch černých přeměnou povstaly, že hmota jejich mnoho železa obsahuje a nepochybně, že ponejvíce z magnetitu aneb titanového železa se skládá.

Krystaly augitové jsou vesměs barvy našedivělé s nástinem do hněda, mají všude téměř stejnou velikost, jsouce  $\frac{1}{5}$  mm. dlouhé a  $\frac{2}{10}$ — $\frac{3}{10}$  mm. široké. Podélné průřezy jsou dle délky rýhované a ty, jež kolmo stojí na hlavní osu (barvy slabě nažloutlé) jeví krásný, miskovitý sloh; mikrolithů v nich skoro žádných není, tolikéž dílce sklovité (se stálými bublinkami) vyskytují se v nich spore.

Trojklonné, bezbarvé tyčinky živcové jsou ponejvíce jemně rýhované, mnoh násobně složené a jeví podélné, rovnoběžné proužky sklovité, jimiž jednotnící od sebe se dělí; polarisují modře a bíle s velmi četnými, černými čárkami a proužky. Průřezy olivínové jsou dílem bezbarvé, dílem nazelenale zbarvené a vláknitě přeměněné. Bezbarvé šesterce apatitové vyskytují se dosti četně.

#### *Čedič melafyrový z vrchole Velikého Jeleního hřebenu u Vartmberka.*

Tento krystalicky celistvý čedič, který za 400. zvětšení stejnou, jemnokrystalickou směs augitu, živce a magnetitu v hmotě nahnědle šedé jeví, obsahuje velmi spore krystaly augitové zvící špendlíkové hlavy a olivin co vzácnost.

Porfyrické průřezy augitové mají ostrý kraj a poblíže tohoto mnohá, tenká, miskovitá pásma s jednotlivými rovnoběžně uloženými mikrolithy, střed pak jejich vyplňují četné sklovité dílce, jež, souvisíce vespolek žilkami, nahnědle šedými výtvoř práškovými temně zbarveny bývají. Jedna taková sklovitá částice proniká krystal živcový 0·7 mm. dl. a 0·06 mm. široký, jenž jemně je rýhován, v polarisovaném světle četné, temné pruhy jeví.

Vedle tohoto vyskytl se menší, bezbarvý průřez (apatitu), jenž nahnědlou, též šesterečně omezenou plochu uzavírá.

Krystalky živcové, jež asi  $\frac{2}{3}$  hmotě čedičové ujímají, jsou dlouhé a tenké, buď po jednom, aneb po 2—3, neb i více jednotnicích srostlé, téměř všude zřejmě a čteně rýhované a ve světle polarisovaném četnými, ponejvíce ostrými, černými pruhy a pásy vyznačené. Obsahují dosti četné krátké mikrolithy, jež většinou rovnoběžně s podélnými hranami, ale i pravouhelně uloženy jsou; tolikéž objevují se dosti zhusta jemné pory plynové a tenké dlouhé, s hlavní osou rovnoběžné sklovité proužky.

Nahnědle-šedá hmota, která na tenkých místech všude zřejmě vyniká, ano i malé dílce tvoří, nabývá této své barvy velmi četnými mikrolithy, jehličkami, prášky a přejemnými, černými výtvy práškovými.

#### b) Čediče melafyrové s bezbarvým magmatem sklovitým.

##### *Čedič od sv. Ivana u Berouna.*

Po delší již dobu znám jest čedič tento Barrandem a Krejčím ze svrchního silurského útvaru na svahu návrší sv. Ivanského u Berouna, kdež v roztroušených balvánech se nalézá. Tato černošedá, velmi jemnozrná a pevná hmota čedičová obsahuje četná zelenožlutá, více méně přeměněná zrna olivinu a velmi sporé bezbarvé, velmi jemné a zřejmě rýhované krystalky trojklonného živce.

Broušená destička, uzmuta byvši kusu, jež jsem od p. Barrandea obdržel, jeví při 400. zvětšení směs převládajících, větších krystalů živcových, pak nedosti zřejmých, spoře nakupených krystalů augitu a větších krystalů olivinu mimo četné rozšířené výtvy trichitové a stejně rozdělená zrna magnetitu.

Co součástí převládající vyniká živec, jehož hmota dojista  $\frac{2}{3}$  veškeré hmoty čedičové zaujímá. Jeho podélné a širší průřezy krystalů jsou na mnoze zřejmě a velmi čteně rýhovány, jednotlivé pak tyčinky polysynthetických krystalů jeví v polarisovaném světle namodralé, nažloutlé i nahnědlé odstíny barev; větší, výtvy práškovými, vlákny a práškem bohaté dílce zůstávají šedé a temné. Širší krystaly živcové mívají velmi tenké proužky dílců sklovitých, jež (jsouce ve světle polarisovaném úplně temné) s rýhováním rovnoběžně jsou uloženy a jednotníky od sebe dělí.

Velmi četné jsou přímé a křivé jehlice a podobné výtvy trichitové, jež většinou na okraji průřezů živcových v sklovité hmotě, která mezi krystaly vtěsnána jest a místy dlouhé, bezbarvé mikrolithy obsahuje, nakupeny jsou a začasť směrem průřezů živcových běží. Zdá se, že hmota výtvorů trichitových — jež obyčejně rozmanitě jsou zkriveny, zohýbány a různě seřaděny, podobající se písmu hebrejskému — jest magnetovec neb železo titanové. Větší i menší zrnka magnetitová jsou v hmotě čedičové téměř stejně rozdělena, řídkěji vynikají ve skupinách. Menší, někdy dosti veliké, vlnitě vláknité krystaly olivinové jsou čteně zastoupeny a jevíce barvu nažloutlou neb našedivěle zelenou, jsou značně přeměněny. Okolo větších krystalů olivinových bývají krystaly živce tak uloženy, že jimi zřejmý flukтуаční sloh vyniká.

Na malých kusech tohoto čediče, jež asi po 3 měsíce chemicky čistou kyselinou

solnou byly vyluhovány; zůstala největší část krystalů živcových skoro bezbarvá, jiné staly se toliko prosvitavými (poněkud kalnými) a jejich rýhování vyznačeno bylo četnými, kalnými pruhy.

Hutnost = 2·964 (určena 16·5 gr.).

c) Čedič melafyrový bez sklovitého tmele.

Na broušených destičkách krystalicky celistvého, načernale šedého čediče  
z Vinohradu u Vartmberku

Lze pozorovati v prostupujícím světle hustší a temnější, fluidální proužky s okraji neurčitými a zvláštní moirantický, hedvábný lesk. V mikroskopu objevuje se pak překrásný flukтуаční sloh hmoty čedičové. Asi  $\frac{3}{5}$  celé hmoty čedičové zaujímá živec, jehož bezbarvé, podélné průřezy asi  $\frac{1}{2}$ —1 mm. dl. a 0·02—0·06 mm. široké, kolem okrouhlých neb oválních, hustých skupin hmoty augitické — která neúplně vykrytalována jsou, pletivu parenchymatickému zcela se podobá — a okolo větších magnetitových zrněk fluidálně uloženy jsou; mezi nimi roztroušena jsou jednotlivá zrnka augitu, bezčetná, drobolinká, začasťe práškovitá zrnka magnetitu a sklovité částice s pory plynovými. Augitická součást má toliko skrovný podíl ve složení hmoty čedičové (zaujímající asi  $\frac{1}{4}$  %) a její podélné průřezy, jež v polarisovaném světle zřejměji vynikají, berou se těmiže směry, co zrnka magnetitová, totiž směry fluidálními, tak že často v polarisovaném světle velmi dlouhé, rozmanitě zprohýbané proužky, co skupiny četných jednotníků se jeví. Větší zrnka magnetitová tvoří ponejvíce shluky čtverců. I ty nejtenší tyčinky živcové, v polarisovaném světle nažloutle neb namodrale bílé, jeví temné proužky a čárky; jsouce pak po dvou i více jednotnicích srostlé, řidčeji osamotnělé, uzavírají nescíslné, velmi malinké pory plynové, jež většinou v rýhách aneb rovnoběžně s rýhami uloženy jsou; tolikéž lze pozorovati tenké, až 0·01 široké proužky sklovité. Velmi četné tyčinky obsahují též poměrně mnoho podlouhlých mikrolithů, jež řidčeji rozptýleny, obyčejně s hlavní osou rovnoběžně uloženy jsou. Nejtenší a nejdelší tyčinky bývají zprohýbány.

Čedič živcový z Veliše u Jičína.

Broušené destičky tohoto velmi jemnozrného čediče obsahují množství zrněk olivinových zvící tečky až špendlíkové hlavy. Při 400. zvětšení jeví destičky tyto stejně zrnitou směs augitu, olivinu, magnetitu a bezbarvé, velmi dlouhými mikrolithy bohaté hmoty, kteráž nepravidelně jest omezena. Hmoty tato polarisuje skoro všude namodrale a nažloutle bíle, ale na nemnohých místech vynikají za obyčejného světla obrysy kalných průřezů podélných se sporými, avšak zřetelnými rýhami a v polarisovaném světle dosti určitě omezené listky, barvy temnomodré, nahnědlé a našedivělé, upomínající na první pohled na polarisační výjevy živeců. Četné mikrolithové, dlouhé jehlice této bezbarvé hmoty jsou obyčejně 0·01—0·04 mm. široké, dosahující délky 1·5 mm. Na koncích vybíhají často v četná kopí a sdružují se nepravidelně paprskovitě; jiné podobné jehlice, jež na přímě mnohonásobně jsou rozpukány, mám za apatit.

Průřezy augitové nemají mikrolithů, oplývají však dílci sklovitými a bublinkami. Ve směsi krystalové vyskytly se též dílce sklovité, avšak žádná souvislá sklovitá hmota.

Průřezy olivinové jsou skoro čisté, co oblaka bílé, omezené vždy kalnou, nazelenale šedou hmotou. Mimo to objevila se také okrouhlá, hustá konkrece šedých splývavých krystalků augitových, vynikajících v polarisovaném světle překrásnou hrou barev.

Hutnost = 2.963 (určena 4 gr.)

### *Velmi jemnozrný čedič od Iviny u Síchrova,*

v němž se hojná, co špendlíková hlava veliká zrna olivinu a augitu nalézají, vykazuje za 400. zvětšení jemnozrnou, velmi hustou, krystalovou směs augitu, živce, olivinu a magnetitu.

Bezbarvé, jehlicovité, až i 1.5 mm. dlouhé a 0.1 mm. široké živcové tyčinky skládají se skoro všude ze dvou jednotníků, tak že v polarisovaném světle podélné polovice různě jsou zbarveny; na nemnohých (pouze na nejširších) pak lze pozorovati mnohonásobné rýhování, ostatní jeví v polarisovaném světle pouze něco málo temných pruhů; mikrolithy vyskytují se v nich častěji, zároveň i dílce sklovité.

Sklovitá hmota v polarisovaném světle jen s těží bývá patrna, jelikož většina hmoty mikrolithicky jest vytvořena. Zdá se, že v ní i nepatrné krystaly nefelinové se vyskytují.

## 2. Obecné čediče živcové.

Čediče živcové v užším smyslu jsou krystalicky celistvé, načernale šedé neb nazelenale černé, magnetitem (titanovým železem) bohaté odrůdy čedičové, v nichž živec méně než polovici hmoty čedičové zaujímá, nad ostatními součástkami množstvím nevyniká.

Dle rázu více méně vyvinutého, vždy zřejmého, sklovitého magmatu lze skupinu tuto rozdělit v

- a) čediče živcové s nahnědlým, trichity bohatým magmatem a
- b) čediče živcové s magmatem více méně zrnitým a šedobíle zbarveným.

- a) Obecné čediče živcové, obsahující nahnědlé, trichity bohaté, sklovité magma.

Výklad chemického rozboru čediče živcového z Kolozruk, jenž také nefelin obsahuje, poukazuje k tomu, že v něm toliko anorthit (co živcová součást) přítomen býti může. Tím pak vyvinuje se pro rozeznání dvou živců v čedičích důležitá domněnka, že ony ponejvíce osamotnělé, bezbarvé tyčinky, jež zvláště v odrůdách nefelinem bohatších se vyskytují a v polarisovaném světle trojklonné rýhování jeví, anorthitu náležejí, ony pak, které po více rovnoběžných jednotnicích srostlé bývají, nepochybně oligoklasu patří. Možná, že zkoušky na broušených destičkách,



leptáním konané, znaky tyto zřejměji odhalí a další rozdělení čedičů živcových v čediče anorthitové a oligoklasové usnadní.

### *Čedič z hory Karabínské u Svárova (nedaleko Berouna).*

Pan prof. Šafařík našel na hoře Karabínské u Svárova (ve vrstvách spodního silurského útvaru) čedičové balvány, jež téhož jsouce rázu jako čedič p. J. Barrandem u sv. Ivana objevený, buď z jakési, náplavem zakryté čedičové žíly pocházejí aneb za času diluvia co bludné balvány sem byly přeneseny. Určitý úsudek nemohu podati, ačkoliv znám mikroskopický ráz čedičů téměř ze 300 nalezišť českých. Jest sice jisto, že v mikroskopickém rázu čediče Karabínského a Kolozruckého veliká jest podobnost, ano v obou těchto čedičích ono nahnědlé, trichity bohaté, magma stejně jest rozděleno; předce však liší se čedič z hory Karabínské tím, že vykazuje mnohem větší hojnost trojklonného živce, jehož jehlicovitá směs již lupou zřetelnou se stává.

Podélné průřezy živcové jsou velmi dlouhé a po většině silněji a hustěji rýhované. Jeho nahnědlé magma, — oplývající jemnými, copům neb i vláknitým svazečkům podobnými skupinami trichytů, obsahuje i hrubší, načernalé hnědé, trichytové výtvořky a uzavírá drobný, místy velmi sporý augit, tak že větší, součástky prosté dílce toliko magma zaujímá. Hojné průřezy olivinové čediče Karabínského jsou zelenavé neb nazelenale žluté a vláknitě přeměněné.

Průřezy podélné, obdélníkové, bývají na přič jemně a rovnoběžně rýhovány; průřezy pak příčné tvoří vlnité, kadeřavé svazečky vláken a rozmanité, ozdobné tvary.

Z krystalů augitových dosahuje málo který té velikosti, že i makroskopicky vyniká.

### *Čedič z Kolozruk.*

Skrytý sloh čediče tohoto jeví při 400. zvětšení nahnědlé, směsí rozmanitých trichitových výtvořů velice bohaté magma, v němž vězí četné, bezbarvé tyčinky, nažloutlé průřezy augitu, zelenavě bílé, poněkud kalné, sklovité průřezy olivinu, četná zrna magnetitu a jednotlivé, větší, porfyricky vytvořené krystaly augitu a olivinu.

Větší krystaly augitové, podobající se krystalům hory Kuzovské, jsou slabě hnědé (barvy karafiatové), postrádají uvnitř mikrolithů, obsahují však na okraji četné dílce sklovité, hojná zrna magnetitu a jednotlivé mikrolithy. Tyčinkovité, bezbarvé průřezy jsou namnoze polysyntheticky (po dvou neb třech) srostlé, jemně rýhované, mnohdy okolo větších porfyrických krystalů augitu a olivinu, s hranami skoro rovnoběžně, řidčeji v proudech uloženy.

V širších průřezích objevují se začasť temné a nahnědlé žluté, sklovité proužky, neméně i pruhy krátkých trichitových jehlic (jako v čediči od sv. Ivana) a velmi sporé, krátké mikrolithy. Ve světle polarisovaném vynikají jednotlivé tyčinky barvou světle modrou, řidčeji nažloutle bílou neb nahnědlou, okazujíce velmi hojné, temné čárky a proužky; ano i na nejtenších pozorovati lze dva neb tři střídavě temné a světlé pruhy barev. Výklad chemického rozboru poukazuje k tomu, že živcové

tyto krystaly anorthitu náležejí ostatní pak tyčinkovité, bezbarvé průřezy, jež namodrale polarisují, a jednotlivé krátké mikrolithy (augitové) obsahují, nefelinu. Pravidelných průřezů šesterečných, jež nepochybně apatitu patří, nalezeno málo. Zdá se, že i chemické sloučenství sklovitého magmatu blízko stojí směsi nefelinu a anorthitu.

Zrnka magnetitová, téměř stejně jsouce rozdělena, mají ponejvíce průřezy čtverečné.

Menší krystaly olivinu barvy kalné, nazelenale šedé, ostře omezené, jsou nehrubě četné; většího rozšíření docházejí téměř bezbarvé, porfyrické krystaly téhož nerostu.

### *Čedič z hory Boračské u Biliny.*

Krystalicky celistvá tato hornina, v níž četná zrnka olivinu a augitu porfyricky vynikají, obsahuje hojnost větších i menších vrostlic opuky, jež, přeměněna jsouc v jaspisovitou, světle nazelenalou neb namodrale šedou hmotu, i v podobě mikroskopických, okrouhlých zrněk do hmoty čedičové četně vtroušena jest. Skrytý sloh čediče tohoto jeví za 400. zvětšení krystalickou směs převládajícího augitu, trojklonného živce, nefelinu a stejně rozšířeného magnetitu v nahnědle šedé, kalné hmotě, která v husté směsi krystalové všude se pozoruje. Poněkud porfyricky vynikající, četné krystaly augitu, podobající se oněm z hory Košovské, vyznačují se vesměs krásným slohem miskovitým a hojností sklovitých dílců nejen na okraji, nýbrž i uvnitř.

V mnohých průřezech augitu vyskytují se více méně četné, mikrolithům podobné výtvary; jsou vždy dlouhé a tenké, ponejvíce pravidelně uložené, přispívající k zřejmějšímu vyniknutí slohu miskovitého. Krátké, obdélníkové a rovnoběžníkové obrysy vrostlic lze často pozorovati, též hojná zrnka magnetitová, jež někdy hustý věnec na okraji tvoří. Sklovité dílce, tvořící ve střední části okrouhlé skupiny aneb v miskách pravidelně uložené, jsou bohaté pevnými bublinkami plynovými, v nichž světlé, ponejvíce načervenalé a v barvách hrající čárky se pozorují; jsou to nepochybně řídké dílce plynové hmoty, která pomocí své roztlačivosti na stěnách bublinek nejhustší a tudíž nejtemnější bývá; v jiných kulatých, plynových bublinkách vyskytují se dvě až tři temnější a světlejší pásma (z nichž tyto v barvách hrají). Vnitřní pásmo krystalů augitových bývá též zbarveno a od světlého načervenalého vnějšího pásma zřetelně odděleno.

Co vzácnost vyskytují se zde malé, jemně rýhované desky dialagové, podobající se desce v augitu čediče Košovského. Podélné průřezy nefelinové, souhlasíce s oněmi od Kolozruk, tvoří bezbarvé, šedobílé tyčinky 0·08 mm. široké a i 0·2 mm. dlouhé, jež začasť okolo větších krystalů uloženy jsou. Mnohé z nich, barvy našedivěle-bílé, bývají velmi jemnými, začasť hustými proužky opatřené, jež se z nepatrných zrněk práškových skládají; jiné obsahují osamotnělé, podlouhlé mikrolithy a v nejčetnějších nalézají se úzké, s hlavní osou rovnoběžné, sklovité proužky. V polarisovaném světle mívají barvu dlfem šedo-modrou, dlfem nahnědle-žlutou.

Co příčné průřezy nefelinu vyskytují se četné větší a menší, úplně pravidelné

aneb poněkud protáhlé šesterce, v nichž se často jeví krásný sloh miskovitý, vyznačený proužky zrněk práškových.

Mnohé z bezbarvých, podélných průřezů jsou polysyntheticky srostlé, ve světle polarisovaném světle nažloutlé, slabě nahnědlé aneb modravě-bílé a vyznačené temnými, ostrými proužky; není pochybnosti, že tyto průřezy trojklonnému živci (anorthitu) náležejí.

Četné, ponejvíce větší průřezy olivinu jsou na okraji kalné, uvnitř pak šedobílé a vlnité.

Hutnost = 2.994 (určena 20.5 gr.).

Zvláště zajímavé jsou hojné, slabě nazelenalé, namodralé aneb šedobílé vrostlice opuky, patrně přeměněné roztopenou hmotou čedičovou; o těch později zmínka se činí (viz o vrostlicích etc. v čediči).

### *Čedič živcový z pahrbku Panznerova u Bíliny.*

Hornina tato jest velmi jemnozrná a obsahuje velmi hojná, drobounká zrnka olivinu a augitu.

Základní hmota její, byvši 400. zvětšena, jeví poněkud hrubozrnější směs augitu, olivinu a magnetitu s velmi jemnými tyčinkami, jež kolem větších zrněk augitu a olivinu v podobě proudů uloženy jsou.

Mezi krystaly vtěsnána jsouc aneb malé dílce tvoříc, vyniká všude nahnědlá, sklovitá hmota, která hojné výtvořky práškové a místy klínovitě rozšířené, černé trichity obsahuje (a v polarisovaném světle úplně temnou se jeví).

Průřezy augitové vyznačují se úhledným slohem miskovitým a překypují dílci sklovitými, bublinkami, pory plynovými a podobnými výtvoři. V mnohých vyskytují se četné vrostlice trojklonných tyčinek živcových (tak na př. objevila se mnohonásobně rýhovaná tyčinka živcová ve větším sklovitém dílci, v augitu uzavřeném), shluky velmi jemných, kostrovitých obrysů (po většině podlouhlých, rovnoběžníkových a šesterečných obvodů, jež jako v augitu čediče Košovského na okraji přicházejí) a začasť též skupiny výtvořů práškových, jako rozstříknutím rozptýlené, tak že krystaly augitů v čediči tomto ke studiu vrostlic výborně se hodí.

Kostrovité obvody, nepochybně dutiny, vyskytly se tolikéž v krystalech olivinových; nejsou však tak ostře omezeny a bývají nahnědlým práškem zakaleny.

Bezbarvé, ponejvíce velmi dlouhé, tenké tyčinky živcové jsou po dvou, třech nebo i více jednotných nestejně délky srostlé aneb na koncích zoubkovitě rozštěpené; četné rýhování jejich bývá dosti zřejmé, vyznačuje se však zvláště v polarisovaném světle hojnými, temnými proužky a pásy (jež začasť pouze do půli průřezu sahají).

Většina průřezů živcových obsahuje hojné, velmi jemné, sklovité proužky; mnohé mají opět četné, ponejvíce s hranami rovnoběžně uložené mikrolithy a jednotlivé pory plynové. V krátkých, širokých, pravouhelných nebo rovnoběžníkových průřezích jsou sklovitá zrnka nahromaděna ve středu v kulatých shlucích. Zdá se však, že se mezi nimi i podélné průřezy nefelinu, podobné oném z hory Boračské, vyskytují.

Průřezy olivinové jsou téměř bezbarvé aneb našedivěle-bílé a kalné, opatřené četnými pory plynovými a začasť hustě obklíčené většími krystaly augitovými. Jeví ponejvíce nepravidelné obrysy; v mnohých pak se vyskytují i stopy výstředního paprskového slohu, jenž jest důkazem pokročilé přeměny. Výtvoř práškové v nahnědlé hmotě sklovité skládají se z bodů, jehliček, vlásků, vlnitých chomáčů i z rovnoběžných a roztroušených vláken; na některých místech jsou v sklovité hmotě neobyčejně dlouhé, nahnědle-žluté nitky, spojené v široké, rovnoběžné pásy, jež se pod různými úhly křižují. Černé jich výtvoř práškové skládají se z tlustých jehlic, přímých a křivých klínů; kostry jsou sporé.

O četných vrostlicích opuky v čediči pahorku Panznerova děje se později zmínka (viz „o vrostlicích etc. v čediči“)

### *Čedič živcový z Vrkoče blíže Ústí n. L.*

V této krystalicky celistvé hornině pozorovati lze jednotlivá, nepatrná zrnka olivinu.

Hmota základní vykazuje za 400. zvětšení velmi hustou směs menších i větších, krátkých, nahnědle šedých krystalů augitových, jednotlivých, spoře rozdělených, trojklonných krystalů živcových, četných, malých průřezů olivinových a stejně rozdělených zrněk magnetitových, mezi nimiž všude nahnědlá, různými výtvoř práškovými bohatá hmota sklovitá vyniká a krystalovou směs kalně, nahnědle barví.

Bezbarvé, tyčinkovité, spoře rozšířené krystaly živcové jsou ponejvíce polysyntheticky srostlé a začasť souvislými proužky práškovité hmoty čedičové opatřené; v polarisovaném světle bývají četnými, temnými proužky v namodrale bílé a našedivěle modré pásy rozdělené.

Nahnědlá, sklovitá hmota obsahuje namnoze velké, zřejmé kostry krystalů augitových a téměř všude jemné, temné proužky, body, svazečky a chomáče jemných vlásků (podobné makrokrystalickým vláskům breislakitu).

Hutnost = 2.951 (určena 12 gr.)

### *Čedič živcový již. od Ústí*

srovnává se skrytým slohem svým s čedičem od Vrkoče, tím však se od něho liší, že v práškovitém, světle šedém magmatu na některých místech světlejší, mnohostraně (osmistraně) dílce s okrouhlými skupinami krystalů augitových pozorovati lze, jež však nikde zřejmě omezeny nejsou.

### *Čedič živcový z Radobyli*

blíží se skrytým slohem svým čediči od Vrkoče, vykazuje poněkud hruběji zrnitou směs augitu a olivinu, přechetného, stejně rozděleného, magnetitu a nehrubě hojných, trojklonných tyčinek živcových. Temnohnědý, výtvoř práškovými velmi bohatý, sklovitý tmel vyniká všude mezi krystaly a zakaluje největší jich díl. Průřezy

augitové vyznačují se miskovitým slohem a v středních částech skupinami magnetitu. Průřezy olivinu jsou skoro čisté. Trojklonné tyčinky živcové jeví velmi jemné rýhování, (jež zvláště v polarisovaném světle velmi ostré bývá) a jsou po 2—3 rovnoběžných jednotnicích srostlé; téměř v každém vyskytuje se krátký, široký, sklovitý proužek, který mnohdy celé vnitro zaujímá, tak že z hmoty živcové pouze bezbarvé okrajní pásmo se pozoruje.

*Sloupkovitý, krystalicky celistvý, černosedý čedič z Polabské skály u Břežanek*

jeví při 400. zvětšení směr ponejvíce menších krystalů augitových, živcových a stejně rozděleného magnetitu, mezi nimiž nahnědle šedá hmota vězí, která hojnost výtvorů práškových a mikrolithů obsahuje. Tyčinky živcové, dlouhé a tenké, všude dosti četné, jsou ponejvíce osamělé, řídceji po 2—3 rovnoběžných jednotnicích srostlé. Mnohé obsahují četné krátké mikrolithy, jež ponejvíce nepravidelně uloženy jsou. Největší jich díl jeví již za obyčejného světla zřejmé rýhování, v polarisovaném světle pak objevují se četné, temné pruhy a pásy v žlutobílém poli; začasť jest každá podélná polovice jinak zbarvena (temnomodře a žlutobíle).

*Čedič živcový z Lisé u České Lípy.*

Tento krystalicky celistvý čedič, jenž má hojná zrnka olivinová, vykazuje, byv 400. zvětšen, jemnozrnou směs augitu, magnetitu a přechetných, jemných a velmi dlouhých tyčinek živcových v nahnědlé (v polarisovaném světle úplně temné) sklovité hmotě, která, objímajíc četné shluky (nebo hnízda) trichitové, nejen mezi krystaly všude vtěsnána jest, nýbrž i hojně, malé, krystalů prosté dílce zaujímá. Tu a tam vynikají výtvoři trichitové co jemná, temná vlákna, jež v pásy seřaděna pod úhlem asi 45° se protínají. Povšimnutí zasluhují však mnohé, okrouhlé, ovalní i hranaté, husté konkrece, složené z čistých, světlošedých krystalů amfibolových, jichž obrysy objaty jsou hustými skupinami mikrolithických součástí čedičových, temných výtvorů trichitových, kostrovitých a kalným, temnohnědým, sklovitým magmatem. Mnohé z těchto konkrecí obsahují dvě temná, okrajní pásma a u vnitř téměř čistou (krystalů prostou), pouze temnými, vlnitými hloučky trichitů zkalenou hmotu sklovitou.

*Krystalicky celistvý čedič z Vyhlídky (Schauhübel am Rollberge) u Mimoně*

podobá se čediči od Koložruku.

Nahnědlé, sklovité magma, jež namnoze chomáčky trichitové, vlásky, jehlice a vláknité výtvoři v hojnosti obsahuje, jest silně vyvinuto; v něm četné uloženy jsou shluky krystalů augitových a amfibolových, zrnka magnetitu a hojně dlouhé, bezbarvé, ponejvíce mikrolithy bohaté tyčinky, jež trichitovými, síťovitými rámci opatřeny bývají. Příčné jich průřezy jeví se po většině co pravidelné š-

sterce, z čehož následuje, že větší jich díl náleží nefelinu; tyčinky pak mikrolithů prosté a z více jednotnských srostlé považovati lze za anorthit.

*Čedič živcový z Radechova u Bělé.*

Krystalicky celistvý, šedočerný čedič tento jeví při 400. zvětšení jemnozrnou směs převládajícího augitu, bezbarvých, poněkud jednoduchých tyčinek živcových, stejně rozděleného magnetitu a ne příliš hojných, menších zrněk olivinu; mezi nimi dosti silně vyvinuta jest hmota slabě nahnědlá, na nejtenších pak místech téměř bezbarvá, v polarisovaném světle temná, která hojnost černých jehlicovitých trichitů a výtvořů práškových obsahuje.

Bezbarvé, tenké, hůlkovité, podélné průřezy jsou většinou jednoduché, řidčeji po dvou i více jednotnských srostlé, jedním neb i více mikrolithy, poněkud však několika pory plynovými opatřené; namnoze obsahují velmi jemné čárky, jež přecházejí v zrnka prášková a jeví se v polarisovaném světle bělavé, nažloutlé neb namodralé s hojnými ostrými, temno- a černomodrými proužky, jež tu a tam v pásy splývají.

Sporá zrnka olivinová jsou již pouhým okem co bezbarvé body zřetelná.

Hutnost = 3·035 (určena 9 gr.).

*Velmi jemnozrný čedič živcový z Horky u Veselího (blíže Mnich. Hradiště),*

v jehož broušených destičkách pouhým již okem bezčetná, co bod až mák velká, bezbarvá zrnka olivinu zřítí lze, jeví za 400. zvětšení stejně (hruběji) zrnitou směs převládajícího augitu, olivinu, trojklonného živce a magnetitu v nahnědlé, všude mezi krystaly zřejmé (v polarisovaném světle temné) sklovité hmotě.

Trojklonné, bezbarvé tyčinky živcové bývají 0·04—0·16 mm. široké a i 0·8 mm. dlouhé, buď osamotnělé aneb (skoro vždy) po dvou i třech, řidčeji i po šesti jednotnských srostlé; jsouce jemně rýhované, obsahují začasť husté řady velmi jemných zrněk práškových neb jemných proužků sklovitých, nečetné pory plynové a tekuté vrostlice, někdy i něco málo mikrolithů; v polarisovaném světle bývají poněkud namodrale šedé, jevíce hojné, temné proužky a tenké pásy.

V bezbarvých průřezích olivinových, jež mají vždy nazelenale šedý, temný okraj, vyskytují se četné, okrouhlé neb ovalní vrostlice sklovité hmoty, z polovice krystalované, pak pory plynové i vrostlice hmoty čedičové s několika krystalky živcovými.

*Krystalicky celistvý čedič ze Spálovské Skály u Rybníka*

vykazuje za 400. zvětšení velmi jemnozrnou směs převládajícího augitu a magnetitu s jednotlivými, dlouhými, tenkými tyčinkami živce, jež v polar. světle četné temné proužky a pásy jeví. Průřezy olivinové, jež se co hojné bezbarvé body v broušených destičkách vyskytují, objímají mnohdy široké proužky a okrouhlé i ovalní dílce kalné, nahnědlé hmoty sklovité. Mezi krystaly vězí všude slabě

nahnědlá, v polarisovaném světle úplně temná, sklovitá hmota, která, oplývající výtvory práškovými a trichitovými, asi čtvrtý díl veškeré hmoty čedičové zaujímá.

*b) Obecné čediče živcové s našedivěle (nazelenale, nažloutle) bílým, více méně zrnitým magmatem.*

Čediče živcové, s našedivěle-bílým, více méně zrnitým magmatem tvoří přechod k čedičům andesitovým. Jeví se za silnějšího zvětšení nestejně zrnitou směs krystalů, v níž se vedle převládající součásti augitické a nečetných tyčinek živcových místy i krystaly nefelinu, někdy i leucitu spoře nacházejí.

Obsahují vesměs olivin, jenž mnohdy velmi četný jest: magnetit vyskytuje se pak v množství poněkud menším a bývá stejně rozdělen.

Z chemického rozboru makroskopických zrněk živcových v čediči od Kartouz u Jičína vychází na jevo, že živec s oligoklasem souhlasí.

### *Čedič z Košovské hory.*

Naleziště toto obsahuje černošedou, velmi jemnozrnou horninu čedičovou, v níž se četné, žlutavé, nazelenalé neb nahnědlé krystaly olivinu vyskytují. 400. zvětšení objevuje hruběji krystalickou, velmi sypkou směs augitu, olivinu, stejně rozděleného magnetitu a hojných, bezbarvých, hůlkovitých krystalků v sklovité, slabě našedivěle-zelené, kalně skvrnitě, jehlicemi, místy i mikrolithy bohaté, na nejtenčích místech téměř bezbarvé hmotě, která v polarisovaném světle temnou se jeví, všude mezi krystalky zřejmě vyniká, žádných však samostatných dílců netvoří.

Průřezy augitové poskytují překrásný sloh miskovitý. Misky tyto jsou na okraji velice tenké, hustě směstnané a četnými zrny magnetitovými, začasť i věncem z nich a hojnými (ponejvíce s hranami rovnoběžně uloženými) mikrolithy opatřené; do středu přibývá miskám šířky a magnetitu i mikrolithů ubývá, za to však množí se dílce sklovité s hojnými bublinkami; pory plynové vyskytují se skoro všude, objímajíce začasť krátkou černou jehlici. Okraj průřezů augitových bývá karafiátový neb nažloutle hnědý, střed pak načervenalý neb nažloutle bílý a v menších průřezích nahnědlé žlutý. V polarisovaném světle objevují se též podélné průřezy, složené z různobarevných lístků; příčné průřezy mají barvu nahnědlou aneb načervenalé-žlutou.

Mimo dílce sklovité, mikrolithy, pory plynové a zrna magnetitová, objevila se co vrostlice augitu i zrnka olivinová, tyčinky nefelinové a živcové.

Zrnka olivinová vyskytla se v podobě okrouhlých, bílých, nazelenale-šedě omezených mnohoúhelníků v některých průřezích augitu; bezbarvý, šikmo zapadlý, podélný průřez nefelinový objevil se pouze jednou.

V jednom velikém průřezu augitickém nalezena jest co vrostlice veliká deska dialagová. Majíc asi podobu harfy a obroubena jsouc hustou směsí na okraji slitých úlomků dialagu, zrněk struskovitých, dílců sklovitých a bublinek plynových, vyznačuje se velmi hustým, rovnoběžným rýhováním. Rýhy tyto jsou dílem průřezné hrany velmi tenkých destiček, schůdkovitě nad sebou složené, dílem náležejí protáhlým dutinám. V polarisovaném světle jest deska tato světle-šedá

vynikajíc v temnomodrém augitickém poli. Abych se přesvědčil, že tato deska dialagová v skutku vrostlicí jest, obrátil jsem desku a úkaz vyznačený opakoval se zúplna.

Bezbarvé, hůlkovité, podélné průřezy — v nichž začasť sporé, ponejvíce s hranami rovnoběžně uložené, krátké mikrolithy a hojné, husté, avšak velmi jemné, rovnoběžné proužky zrněk práškových a jednotlivé proužky i pásy našedivěle zelené sklovité hmoty (jíž okraj nejvíce zakalen bývá) pozorovati lze — jsou v polarisovaném světle dílem stejně namodrale šedé, nažloutle bílé, dílem hojnými, ostrými, temnými proužky a pásy vyznačené, obojí průřezy jsou pak ponejvíce rovnoběžně neb paprskovitě kolem větších průřezů augitu a olivinu uložené; zvláště ony velmi dlouhé, bezbarvé mikrolithy jeví uložení paprskovité.

Více méně pravidelné, bezbarvé šesterce vyskytují se dosti četně.

Podélné průřezy, které začasť v polarisovaném světle velmi četnými, temnými proužky a pásy se vyznačujíce, jednoduché, řidčeji po 2—3 rovnoběžných jednotných zřetelně srostlé aneb na koncích rozštěpené bývají, náležejí trojklonnému živci, ony pak podélné průřezy, jež v polarisovaném světle stejnou, modrou barvu jeví, jakož i větší pravidelné, příčné průřezy šesterčné patří nefelinu.

Větší průřezy olivinové s nazelenale kalným okrajem jsou ponejvíce světlé, dílci sklovitými a pory plynovými bohaté; než i nazelenale kalné a jemné vláknitými výtvoři přeměněné průřezy olivinu nejsou vzácné. Bezbarvé, ostře vynikající šesterce apatitu vyskytují se řidčeji; z roztoku kyseliny solné této horniny čedičové povstává molybdeňanem amoniatým slabá sraženina.

Dvoudenním leptáním chemicky čistou kyselinou solnou vybledly průřezy augitové, miskovitý sloh jejich vynikl mnohem krásněji, a na okrajích, jež nyní též světlejšími se staly, objevily se přímé i křivé, temné, trichitové výtvoři (ponejvíce co kostry mikrolithů).

Na povrchu sklem bohatých, středních dílců byly průřezy augitické leptáním silně porušeny, hlouběji však ležící, sklovité dílce staly se i se svými bublinkami mnohem patrnějšími. Zároveň pozorovány byly i sporé vrostlice olivinové zřejměji. Na některých bezbarvých tyčinkách bylo lze pozorovati paprskovitý shluk více velmi tenkých jednotníků, mezi nimiž ještě zbytky sklovitých proužků se objevily; jiné byly dle svého uložení více méně porušené. Mnohem jasněji vyniklo nyní z hmoty sklovité nesčíslné množství ponejvíce paprskovitě uložených mikrolithů, nazelenale šedým práškem promícháných. Nazelenale kalné průřezy olivinu poskytl leptáním překrásné a přerostmanité, ponejvíce vláknitě vlnité tvary. Zvláště nápadným byl jeden příčný průřez s rovnoběžnými řádkami téměř pravouhelných porů plynových (s bublinkami).

### *Čedič z hory Jeřetínské.*

Broušené destičky tohoto velmi jemnozrného čediče — vzaty z kusu již porušeného — jeví hustou směs převládajícího augitu, velmi četných, bezbarvých, hůlkovitých krystalků, malých průřezů olivinu a stejně rozdělených zrněk magnetitu v hmotě mikrolithy a zrnky práškovými bohaté, která se částečně z více méně zřetelného nefelinu skládá. Mnohé světlejší dílce její podobají se



obdélníkům a mnohoúhelníkům, obsahují též pravoúhelné a mnohostrané uložené mikrolithy, vynikají však jen tu a tam zřejměji co ostré obdélníky a šesterce. Největší část průřezů olivinových jest více méně přeměněna a velké dílce destičky jsou vyplněny nahnědle-žlutou infiltrační hmotou, jejížto vrstevnaté čáry překrásné a velmi rozmanité tvary tvoří. První příčinou tvoření se této hmoty infiltrační jest, jak namnoze pozorovati lze, rozklad i přeměna magmatu, po té nejbližší přispívá přeměna olivinu.

*Čedič s lomů u řeky Bělé na silnici Lovosicko-Teplické.*

Tento téměř krystalicky celistvý čedič vykazuje při 400. zvětšení jemnozrnou směs augitu, trojklonného živce, nefelinu a magnetitu a obsahuje bezbarvou hmotu sklovitou s velmi četnými, tenkými mikrolithy, která se mezi krystaly ve větších i menších dílcích objevuje.

Větší, porfyricky se jevící krystaly amfibolu vyznačují se úhledným miskovitým slohem, v jehož světlejších pásmech hustší a řidší skupiny dílců sklovitých s bublinkami se vyskytují.

Nefelin tvoří krátké a podélné obdélníky a méně pravidelné šesterce. Širší průřezy jeho uzavírají dílce řídké hmoty čedičové s hojnými mikrolithy; protáhlé průřezy nefelinu opatřeny bývají řídkými proužky nad míru jemných zrněk práškových (jednotlivými oválnými mikrolithy a černými jehlicemi). Často dosahují zrnka prášková takové velikosti, že při dotýcném zvětšení co pory plynové s pohyblivými bublinkami poznati se dají.

Podélným průřezům nefelinu velice podobné vyskytují se tuto ještě jiné tyčinkovité, ale mnohem jasněji vynikající, podélné průřezy v množství dosti velkém, jež v polarisovaném světle četné, střídavě světlé (namodrale bílé) a temné proužky, začasté i tmavé pásy jeví. Tyto náležejí trojklonnému živci (anorthitu).

Zdá se, že na některých, bezbarvých místech též stopy po věnečkách práškových a osmerce (leucit) se vyskytují.

Jedna část bezbarvé, temně polarisující hmoty, prostoupena jsouc dlouhými, tenkými mikrolithy, jest zajisté hmota sklovitá, která tu a tam infiltrací zeleno-žlutě zbarvena a všude nepravidelně omezena jest.

Průřezy olivinové jsou ponejvíce nazelenalé neb nažloutle-šedé, kalné, vlnité vláknité a již více méně přeměněné.

*Čedič živcový z východního návrší Trmického.*

Do velmi jemnozrné, načernale šedé, základní hmoty čediče tohoto vtroušeno jest mnoho světle-zelených zrněk olivinových a sporé krystalky augitové.

Za 400. zvětšení jde na jevo, že základní hmota se skládá ze směsi malých, převládajících krystalů augitových, nefelinových a živcových, stejně rozdělených, malých zrněk titanového železa a magnetitu, mezi nimiž na mnohých místech nahnědle-šedá, práškovitá, sklovitá hmota patrně vystupuje.

Větší, porfyricky se jevící průřezy augitové jsou slabě načervenalé-hnědé a

mají mimo četné sklovité dílce a vrstevnaté čáry krásný miskovitý sloh a rovnoběžně uložené mikrolithy.

Tyčinkovitě, tenké, bezbarvé průřezy podélné, jež mimo augit nejzřejmější součást tvoří, jsou obyčejně po jednom rozptýlené a jen některé jsou z více rovnoběžných jednotných srostlé. Některé obsahují velmi sporé, krátké mikrolithy aneb velmi jemné proužky, skládající se ze zrněk práškových, jiné pak protáhlé dílce sklovité (začasté s temnými bublinkami plynovými) a na mnohých pozorovati lze nad míru četné rýhování.

V polarisovaném světle jeví většina tyčinek barvu stejně šedomodrou a slabě nahnědle-žlutou, mnohé však ukazují velmi četné, černé proužky a pásy, z nichž některé již v obyčejném světle co žluté, sklovité proužky patrný jsou; bez odporu náležejí tyto tyčinky trojklonnému živci

Černá, obyčejně malá, stejně rozdělená zrnka krystalová jeví ponejvíce šesti-straně, řidčeji čtyřhrané průřezy; ona, jež za titanové železo určiti se mohou, mají buď nástin do hněda aneb jsou obložena nahnědlým pásmem; mnohé z nich skládají se z husté sítě černých (na hrany kolmých) jehlic. Průřezy, náležející magnetovci, jsou úplně neprůhledné. V tomto vyskytují se bezbarvé jehlice živcové co vrostlice.

Většina průřezů olivinových má obyčejný ráz; uvnitř jsou totiž bezbarvé s oblakovým povrchem, na okraji našedivěle-zelené a kalné. Mnohé jeví však uvnitř pravouhelné výtvořiny dutin, jež pravidelně, schůdkovitě uloženy jsou, a větší dílce v průřezích zaujímají. Jsou to nepochybně prázdné prostory.

Mimo to vyskytují se zde též čtvercové, olivinu podobné průřezy, skládající se z husté, našedivěle-zelené, poněkud kalné sítě pravouhelně složených vláken.

Hutnost = 3.060 (5 gr. urč.).

### *Čedič od Bystřan (Lieschberg bei Wisterschan)*

Velmi jemnozrná základní hmota tohoto čediče obsahuje hojná, roztroušená zrnka augitu a olivinu.

Při 400. zvětšení jeví hmota ta hustou směs menších krystalků augitových, nefelinových, živcových a stejně rozděleného magnetitu v sklovité hmotě, málo vynikající a práškovými i trichytovými výtvořinami nad míru bohaté.

Větší augitové krystaly podobají se krystalům z Košové hory, vyznačujíce se mimo dílce sklovité s pevnými bublinkami plynovými též (zvláště na okraji) kostrovitými obrysy (obdélníkovými a rovnoběžníkovými). Porfyrické krystaly augitové vyskytují se ponejvíce co křížaté složky.

Četné, bezbarvé, hříčkovité, podélné průřezy, v nichž se jednotlivé mikrolithy a naskrze jemné proužky nalézají, náležejí nepochybně nefelinu.

Četné, podobné, podélné průřezy, jež jsouce jemně rýhovány a po 2—3 rovnoběžných jednotných srostlé, co průřezy trojklonného živce se vyznačují, polarisují žlutavě-bíle a temnomodře, okazujíce velmi hojně, temné čárky a proužky; v jednotlivých těchto proužcích jeví se i nahnědlé a našedivěle stupně barev.

Průřezy olivinové jsou na okraji nazelenalé, kalné, nezřejmě vláknité, uvnitř bezbarvé a oblakovité; menší mikroskopické krystaly jsou dosti četné.

#### *Čedič od Vratislavic.*

Mikroskopické lístečky tohoto čediče jeví za 400. zvětšení velmi hustou, jemnozrnou směs převládajícího augitu a amfibolu s hojnými krystalky trojklonného živce, pak nefelinu, malých bílých, obláčkovitých průřezů olivinu a stejně rozdělených zrněk magnetitu.

Převládající, malé, ponejvíce protáhlé, nahnědle-šedé a místy kalné krystaly augitové obsahují četné, krátké mikrolithy; dlouhé krystaly amfibolu, spoře rozštěpené, vyznačují se podélným rýhováním. Veliká, nahnědle šedá deska lesku třpytivě hedbávného, vyniká četnými rovnoběžnými brázdami a šikmými, pod úhlem 49° proti oněm ukloněnými (mezi sebou však rovnoběžnými) širokými pásmy, jež, skládající se z řídkého, nahnědlého prášku, onen zvláštní lesk působí.

Deska tato, náležející nepochybně bronzitu, polarisuje žlutozeleně, nahnědle-červeně a fialově modře.

Průřezy nefelinové co dosti četné, pravidelné obdélníky a šestercům podobné mnohoúhelníky vyznačují se hojností mikrolithů, jež s hranami rovnoběžně jsou uloženy. Pravidelných šesterců nebylo lze nalézt. Hůlkovité, bezbarvé krystalky živcové jsou namnoze jemně rýhované, po 2—3 rovnoběžných jednotnicích srostlé, v polarisovaném světle namodralé aneb žlutavě-bílé a mnohými ostrými, temnými pruhy opatřené. Malé, skoro bezbarvé (obláčkovité, na okraji poněkud kalné) průřezy olivinu jsou četně zastoupeny.

#### *Čedič od Provošina*

podobá se čediči z Trmic, liše se toliko v tom, že jeho zrnité, mikrolithy bohaté magma více jest vyvinuto; neméně četně vynikají i zde trojklonné tyčinky živcové, jež, jsouce polysyntheticky, namnoze rovnoběžně neb paprskovitě srostlé, v polarisovaném světle četnými, temnými proužky a pásy se vyznačují. Tolikéž nefelin zdá se četně býti zastoupen. K stejně rozšířeným zrnkám magnetitovým pojí se hojné úlomky nahnědlých šesterců, náležejících lesklé rudě železné; úlomky biotitové vyskytují se spoře.

#### *Čedič od Malé Veleni*

srovnává se skrytým slohem svým dílem s čedičem Trmickým, dílem s čediči andesitovými, leucitem a nefelinem bohatými.

V magmatu našedivělém aneb nažloutle bílém, jež množstvím jehlic mikrolithových a zrněk práškových vyniká (a místy zaokrouhlené, méně značné, obdélníkové dílce tvoří), uloženy jsou hojné, větší krystaly augitové; kolem nich a kolem větších zrn magnetovce hromadí se dlouhé (1 5 mm.) a tenké (0·02—0·06 mm)

bezbarvé (ponejvíce rovnoběžníky omezené) tyčinky, jež buď po jedné vystupují buď po 2—3, řidčeji (a to jen nejtenší) po více rovnoběžných jednotnících srostlé bývají (tyto odděleny jsou pak jemnými proužky magmatu). Rýhování bývá namnoze patrné; naproti tomu jeví se toto na některých průřezích jen místy v podobě jemných trhlin. V polarisovaném světle jsou tyto průřezy obvyčejně mdle modré, u mnohých objevují se však temné, ostré, podélné proužky; každá pak podélná polovice složek bývá jinak (světle a temně) zbarvena. Jednotlivé mikrolithy, jež se tuto co vrostlice jeví, jsou ponejvíce s hlavní osou rovnoběžně uloženy; bublinky plynové jsou osamělé.

Slabě nahnědlé neb nažloutlé průřezy augitové jeví pouze na okraji krásný, miskovitý sloh a obsahují četné jehlice mikrolithové, plynové pory a dílce sklovité. Podélné průřezy podoby rovnoběžníků jeví mimo střední čáru hojně rovnoběžné lamely.

Téměř 2 mm. dlouhé průřezy apatitu, jež se hustými, rovnoběžnými řadami nahnědlých zrněk práškových a jednotlivými, většími plynovými bublinkami vyznačují, jakož ostré šesterečné průřezy jejich vyskytují se velmi porůznu, ponejvíce poblíže větších zrněk magnetitových.

#### *Čedič živcový z Damberku.*

Tento velmi jemnozrný čedič, podobaje se dílem čediči Trmickému, dílem čedičem andesitovým, bohatým leucitem a nefelinem, jeví v broušených destičkách stejně krystalickou směs augitu, trojklonného živce, nefelinu a magnetitu, k nimž se četná zrnka olivinu řadí.

Na první pohled se zdá, že krystalky augitové a místy nahromaděné, bezbarvé, po 6—7 jednotnících rovnoběžně srostlé tyčinky živcové a zrnka magnetitová v našedivělé bílé, prášky a mikrolithy bohaté hmotě rozděleny jsou; avšak bližším skoumáním vychází na jevo, že ona zdánlivě stejnorodá hmota z nefelinu (dílem i z leucitu) se skládá. Obrysy jsou ponejvíce slabé, méně zřejmé, avšak namnoze pozorovati lze patrné krátké obdélníky, začasť význačné složením jemných, jehlicovitých mikrolithů, pak i zřetelné šesterce, v nichž tolikéž prášek a jemné mikrolithy s hranami rovnoběžně jsou uloženy. Četné průřezy olivinové jsou nazelenalé, kalné, rovnoběžně vláknité, srovnávající se s průřezy čediče Trmického.

Zrnka magnetitová opatřena jsou z největší části nahnědlým pásmem.

#### *Čedič od Šluknova*

podobá se dílem čediči Trmickému, dílem Košovskému. Větší i menší zrnka augitová, magnetit, hojný olivin a bezbarvé tyčinky jsou v hmotě našedivělé, krátkými, našedivělými a podlouhlými, bezbarvými mikrolithy bohaté nepravidelně rozděleny. Bezbarvé tyčinky, jež obvyčejně po dvou i více jednotnících rovnoběžně srostlé aneb paprskovitě seřaděny jsou, jeví v polarisovaném světle barvu mdle modrou a nahnědlou, vždy několika ostrými, temnými pruhy aneb ostrým páskem opatřenou; častěji pozorovati lze na nich též nazelenalé, sklovité proužky.

Přiblížíme-li k množství mikrolithů v oné našedivělé hmotě (v polarisovaném světle temné, modravě šedé), můžeme ji považovati za magma jevící se co sklo na polo vykrystalované. Možná, že v hmotě té i průřezy nefelinové a leucitové vězí, obrysy jejich nejsou však nikde zřejmé.

### *Čedič od Markvartic,*

v němž bývají druzy chabasitu, srovnává se poněkud s čedičem od Trmic, obsahuje však více olivinu a zrnitě kalného magmatu; jest též poněkud přeměněný.

Augit, magnetit a sporý, zcela přeměněný olivin rozděleny jsou v nazelenalé neb našedivělé, kalné, velice přeměněné hmotě; v téže pozorovati lze nad míru hojné, okrouhlé, kalné dílce a dlouhé, dílem bezbarvé, dílem kalné, podélné průřezy, jež, obvyčně dle délky roztrženy jsouce, trojklonnému živci náležejí. Velmi hojné jsou též úlomky biotitu. Všeobecný ráz blíží se onomu čedičů nefelinitoidových a leucitoidových.

### *Čedič z Kartouz u Jičína*

vykazuje jemnozrnou řídkou směs augitu, magnetitu a velmi hojných, bezbarvých, čistých tyčinek, jež sporými proužky a pásy ve světle polarisovaném co trojklonný živec se jeví. Bezbarvá, slabě nahnědlá, sklovitá hmota, která mezi krystaly všude se vyskytuje a v polarisovaném světle temnošedá jest, obsahuje tu a tam modravě polarisující, krátké, podélné průřezy nefelinu; porůznu se vyskytující, okrouhle omezené, velmi malé dílce mohou se leucitu přičísti.

Dosti hojné rozšířeny jsou našedivělé, nazelenalé žluté, dílem práškovitě vláknité, okrouhlé neb mnohostranné průřezy, jež mám za přeměněný olivin; některé z nich staly se již ve svých středních částech paprskovitě vláknité. V jednom kuse čediče tohoto vyskytl se téměř 1" dlouhý, nažloutle bílý, místy kalný úlomek hustě rýhovaného trojklonného živce, který se dle výsledku chemického rozboru s oligoklasem shoduje.

### *Čedič z hory „Dědek“ u Kosmanos.*

Krystalicky celistvá hmota této načernalé šedé horniny čedičové obsahuje hojnost zrněk olivinových a něco málo porfyrických krystalů augitu. Základní hmota jeví za 400. zvětšení hustou směs převládajícího augitu, velmi četných krystalků trojklonného živce a stejně rozděleného magnetitu v nahnědlé šedé, sklovité hmotě, která, obsahující velmi hojné výtvořky práškové a krátké i dlouhé mikrolithy, krystalickou směs proniká a barví, avšak toliko mezi krystaly vtěsnána jest (co sporý tmel). Porfyricky vynikající krystaly augitové jeví hojnost větších vrostlic čedičové hmoty.

Bezbarvé tyčinky živcové jsou téměř všude čteně rýhované a opatřené rovno-

běžnými, jemnými, sklovitými proužky; polarisují namodrale bíle a ony četné sklovité proužky vystupují temně (každá tyčinka jest ostře, temně čárkovaná).

V největší části téměř bezbarvých průřezů olivinových vyskytují se hojné, okrouhlé, oválné dílce hmoty čedičové, kdež i magma zřejmě vyniká. V husté směsi krystalické pozorovati lze též velmi malá, bezbarvá místa, jež, majíce četné jemné, bezbarvé jehlice, nepochybně krystalky leucitové jsou.

### *Čedič od Církvice*

jeví stejnou směs trojklonného živce, augitu a magnetitu v dosti vyvinutém, místy mikrolithy bohatém, buď kalném, buď čistším, i téměř bezbarvém magmatu.

Augit a magnetit činí menší a větší, magmatem na polo krystalovanými zakalené dílce, jež téměř polovici veškeré hmoty zaujímají; naproti tomu rozšířeny jsou v našedivěle bílých, čistších dílcích magmatových dlouhé, kalné, polysyntheticky srostlé, hustě rýhované krystaly živcové, jež v polarisovaném světle hojné, temné proužky a pásy (mnohdy jen místy) vykazují; avšak i tyto znečištěny bývají četnými, rovnoběžnými, podélnými proužky nažloutle šedého, kalného magmatu a temným práškem. Velmi sporé, malé průřezy olivinové, nahnědle červené ukazují k pokročilému stupni přeměny.

Jakostí i množstvím magmatu řaditi by se mohl čedič tento asi k čediči Kosoňovskému, avšak makroskopické krystaly augitové jsou v něm mnohem spořejší a množství olivinu jest velmi malé. (Zdá se, že v magmatu sklovitém i nehrubě osamotnělý nefelin čteněji přichází.)

Úlomky biotitové jsou dosti hojné. A touto součástí vystupuje opět podobnost s čedičem trachytovým od Něstědic.

### 3. Čediče andesitové a fonolitové.

Čediče andesitové jsou buď vynikajícími destičkami andesinovými neb oligoklasovými (začasté i jehlicemi amfibolu) porfyrické, buď velmi jemnozrné neb krystalicky celistvé, temně nazelenale-šedé aneb světleji černošedé, velmi pevné odrůdy čedičové, jež zevním rázem svým tmavým druhům fonolitovým se podobají, avšak již tím se liší, že nemají patrných destiček sanidinových. Základní jich hmota rovná se magmatu, jež vyloučivši mikroskopickou, stejně jemnozrnou směs (trojklonného, dílem i jednoklonného) živce, leucitu, nefelinu, hauynu, amfibolu, augitu a zrněk magnetitových, více méně krystalickým se stalo. Ve směsi té buď převládá součást živcová (živec, nefelin, leucit, hauyn), aneb zřejmě vyniká beztvrný, bezbarvý nebo našedivělý zbytek magmatový, amfibol pak a magnetit jsou ve množství podřízeném.

Tyčinky živcové — ponejvíce zřejmě trojklonné a někdy toliko v podobě mikrolithů vyvinuté — jsou dílem stejně rozděleny, dílem po různu neb pouze místy v řádkách a páskách, ponejvíce však v proudech rozšířeny. V této krystalické směsi vyniká buď nefelin, leucit a hauyn, buď bezbarvé magma, buď i více oněch součástí na jednou, tak že z různých nalezišť čediče andesitového roz-

manité, čedičové odrůdy pocházejí. Jedině bezbarvé tyčinky (živcové) provázejí čedič tento co stálé součásti, ač někdy jen v menším množství aneb toliko v podobě mikrolithu se objevují. Jelikož tyčinky tyto trojklonný jeví ráz, poněvadž makroskopická zrnka živcová, kyselinami byvše skoumána, k oligoklasu neb andesinu poukazují a poněvadž broušené destičky čediče tohoto ponejvíce na andesit upomínají, dáno celému tomuto skupení jméno *čedičů andesitových*; ony dosti hojné odrůdy, v nichž tyčinky živcové jen porůznu se jeví aneb co tyčinky sanidinu neb nefelinu se prozrazují, nazvati se mohou *čediče fonolitové*, poněvadž i základní hmota jejich s hmotou fonolitů nejvíce se srovnává. Není pochybnosti, že až bude soubor čedičů fonolitových důkladněji proskoumán — a prozkoumání toto závisí na důkladné známosti znělců — snadno se rozdělití dá celá skupenina na čediče andesitové a fonolitové.

Mikroskopické destičky oněch odrůd, v nichž většinou našedivělé, podlouhlé jehlice amfibolové nejvíce jsou vyvinuty, jeví zvláště uložením jehlic těchto buď směry proudové č. flukтуаční aneb síťovité mřížování; význačné jsou dosti četné tvary amfibolové, jichž hmota ponejvíce ze shluku převládajících zrněk magnetitových s jinými součástkami čedičové hmoty se skládá.

Hutnost čedičů andesitových = 2·817 co průměr osmera určen, jichž minima a maxima 2·759—2·915 obnášela.

Podíl kyseliny křemičité jest dle čtyř rozboru 46—51%.

Celá skupenina tato dá se rozvrhnouti na čediče

- a) živcem bohaté,
- b) hauynem bohaté,
- c) leucitem neb nefelinem bohaté.

a) (Více méně) živcem bohaté čediče andesitové.

α) Doleritické.

#### *Zrnitý (doleritický) čedič ze Střížovického vrchu*


obsahuje převládající, našedivěle-bílá trojklonná, zřejmá zrnka živcová a méně četná černá zrnka amfibolová a jeví za 400. zvětšení základní hmotu, která, skládajíc se hlavně z kalného trojklonného živce, po menším díle z nefelinu, pak ze sporých, velmi malých krystalků leucitových, z magnetitu, lesklé železné rudy a nepochybně i z pleonastu, množství dílců sklovitých a porů plynových v sobě má a po většině kalná jest.

Lesklá železná ruda objevuje se v dosti četných, našedivěle-hnědých, prosvitavých lístkách, jež namnoze co ostré šesterce omezeny jsou. V základní hmotě vyniká množství makroskopických, trojklonných jehlic živcových a tu a tam i amfibolových. Temnohnědé, široké průřezy těchto vyznačují se četnými vrostlicemi úplně bezbarvých, pravidelných šesterců, obdélníků a krátkých, tyčinkovitých bezbarvých krystalků, jež nepochybně vesměs nefelinu náležejí.

Prášek tohoto čediče v kyselinách nešuměl, rozložil se však silně, byv po 5 dní v chem. čisté kyselině solné denně vždy dvakrát zahříván, při čemž se kyselina křemičitá v podobě chomáčů vyloučila.

Hutnost této čedičové horniny = 2·803 (urč. 3·12 gr.).

Co se týče chemické povahy trojklonného živce, posouditi lze z několika určení, velmi malým množstvím provedených, že trojklonný tento živec velice blízký jest andesinu, jehož



*Zrnitý (doleritický) čedič s rokle mezi Leichenberkem a Malým Březnem.*

V rokli na již. úpatí hory Leichenberku, která dílem lesem porostlá, dílem i sedimentárními vrstvami pokryta jest, nalézají se velké balvany, shodující se buď s čedičem trachytovým z Malého Března, buď s doleritickým čedičem andesitovým hory Střžovické. Tato odrůda čedičová jest zde buď drobnozrná (s téměř stejnými krystaly augitu a živce) aneb velmi jemnozrná jen s jednotlivými, sporými, porfyricky se jevícími krystalky augitu neb živce.

Broušené destičky drobnozrné odrůdy jeví směs převládajících, dlouhých, poněkud po několika rovnoběžných jednotnicích srostlých krystalů živce a přeměněného (našedivělého, kalného) nefelinu, osamotnělých krystalů augitových, méně četných, větších zrněk magnetitových a sporých úlomků biotitových. Pouze některé živcové průřezy jeví zřejmé rýhování, avšak v polarisovaném světle vynikají po většině pestrobarevnými lamelami, temnými čárkami a pásy.

Průřezy augitové vykazují pouze na okraji četná mískovitá pásma s rovnoběžně uloženými mikrolithy, střed pak vyplněn jest dílci sklovitými, plynovými bublinkami aneb bezbarvými jehlicemi mikrolithovými (nefelin). Zrnka magnetitová jsou všude namodralé ťupkována, nepochybně z malých jednotníků složena, jimiž nefelin neb hmota živcová prosvítá.

Podobného rázu jest též základní hmota

*velmi jemnozrné odrůdy čediče andesitového s rokle u Leichenberku.*

I v té, zdá se, že množství nefelinu není větší než v jemnozrné odrůdě téhož naleziště, mnohem hojnější jsou však dlouhé, hrotovité jehlice amfibolu, jež, v různých směrech uloženy jsouce, broušeným destičkám podobný ráz dodávají, jakým čedičové trachyty se vyznačují.

Sporé, porfyricky se jevící průřezy augitové vykazují v polarisovaném světle velmi četné, pestrobarevné lístky, jež vesměs s hlavní osou rovnoběžně uloženy jsou.

*Drobnozrný čedič andesitový mezi Rostoky a Dubkovicemi*  
(již. od Dubkovic mezi pátým a šestým strážním domkem dráhy).

Drobnozrný čedič andesitový, který tuto s (tak zvanými) trachytovými fonolithy co mocná žíla vystupuje, podobá se čediči z Leichenberku; avšak trojklonný živec jenž, jemně jsa rýhován, v polarisovaném světle velmi četné, pestré lístky jeví, zaujímá asi  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  celé hmoty čedičové, naproti tomu jest součástí augitická ve-



lice sporá. V broušených destičkách, převahou bezbarvých, jsou téměř stejně rozděleny temnohnědé a černé skvrny, které podobají se náletům vadu, prozrazují se uvnitř co řídké nakupeniny větších zrněk magnetitových, vně pak co skupiny větších průřezů augitových a dosti četných desek biotitových. Nefelin, jehož šesterce a krátké bezbarvé sloupce ponejvíce do augitu, biotitu a magnetitu vrostlé jsou, objevuje se v množství podřízeném.

*Zrnitý (doleritický) čedič andesitový z vrchu „Hannbusch“ u Františkova údolí*

vystupuje co strmý kůžel z krystalicky celistvého čediče andesitového — jenž skládá lesnatou stráň levého břehu Ploučnice u Františkova údolí — a podobá se nejvíce zrnitému čediči z Leichenberku. Též

*Pickelstein u Chříbské*

obsahuje zřejmě zrnitý (anamesitový) čedič andesitový, v němž však i sanidin nemalého běže podílu na složení horniny.

*β) Makroskopickými destičkami význačně porfyrické.*

*Čedič ze Strážovické hory.*

Na hoře Strážovické vyskytuje se mezi mnohými odrůdami čedičovými též načernale šedá, velmi jemnozrná hornina čedičová, která (místy jsouc bublinatá) velmi hojně, našedivěle a nažloutle bílé, slabě průsvitné, silně přeměněné destičky obsahuje, jež ponejvíce slabý mastný lesk jeví. Mnohé méně rozložené úlomky těchto dokonale štěpných destiček prozrazují jemné složkové rýhování a v polarisovaném světle polysynthetické složení; není tudíž pochybnosti, že, ač vzezřením svým se odchylují, přec trojklonnému živci (snad andesinu) náležejí.

Podobného rázu jest i

*čedičová hornina z jižního svahu hory Čebíšské (proti Mašovským sadům).*

Tento andesitový čedič má fonolithu podobný vzhled a světle šedou barvu. Velmi četně vynikají porfyrické, co sklo lesklé, nažloutle neb našedivěle bílé krystaly živcové v podobě krátkých destiček, jež v polarisovaném světle hojně, pestré proužky jeví. Základní hmota jest velmi jemnozrná a skládá se podstatně z leucitu a nefelinu — jichž obvody pro četné mikrolithy méně zřejmě vystupují — pak z augitu, trojklonného živce a nečetného magnetitu.

Povšimnutí zasluhují velké, v broušených destičkách již pouhým okem co skvrny a krátké jehlice viditelné průřezy tvarů amfibolových, jichž hmota hustě skupení magnetitu, leucitu, nefelinu, augitu s jednotlivými, roztroušenými, nahnědle šedými dílci amfibolu tvoří.

*Ve velmi jemnozrném čediči s Poppenberku u Ludvikovic*

vynikají porfyricky četné, našedivěle bílé destičky a nahnědlé krystalky augitové. Tyto blížíce se k oněm z Varty na Ohři obsahují hojnost bezbarvých, krátkých, v podobě tupých jehlanců zakončených sloupků se šesterečnými, příčnými průřezy, jež při tak velkém množství spíše nefelinu než apatitu přičistí se mohou.

Porfyrické destičky jsou hrubě vláknité, našedivěle neb nažloutle bílé, obdélníkové neb nehrubě zřejmě omezené.

Základní hmota, velmi jemnozrná, skládá se z augitu, magnetitu, nepochybně z leucitu a nefelinu; okrouhlé aneb zřejmé polygonální skupiny základní hmoty ve světlejších dílcích jsou dosti četné a v některých pozorovati lze i stopy po práškových věnečkách.

Podobné porfyrické čediče, význačné porfyrickými destičkami andesitovými, vyskytují se poblíže Libverdy a (dle objevení podobných čedičových balvánů panem prof. Klučákem v Litoměřicích) na severním svahu hory Křížové č. Dlouhé u Litoměřic.

γ) Velmi jemnozrné a krystalicky celistvé.

*Velmi jemnozrný čedič s hory Kračinské.*

Čedič tento, jehož kůželovitý vrchol z fonolitu se skládá, obsahuje četné podlouhlé dutiny, jež velmi jemnými drůsami filipsitu vyloženy jsou. Již pouhým okem rozeznati lze v destičkách, — vybroušených z úlomků, jež na výšině hory poblíže fonolitu uraženy byly — velmi hojné, nahnědle šedé, 4—6 mm. dlouhé a asi 2 mm. široké průřezy augitu, přecetné, jemné, bezbarvé jehlice a větší úlomky živce, z nichž mnohé četné rýhování, aneb rovnoběžný zrust jeví. Asi za 400. zvětšení vyniká mezi makroskopickými krystaly směs, která se skládá z větších i menších tyčinek živcových a méně četných krystalků augitových, ze stejné rozděleného magnetitu a z temné polarisující hmoty, zakalené mikrolithy, jehličkami, vlásky a rozmanitými výtvy práškovými.

Hmota tato zaujímá namnoze světlejší, začasť souvislé, okrouhlé dílce, které za více méně zřejmou hmotu leucitovou považovati se mohou. Na některých jsou zřejmé, šesterečné a mnohostranné obrysy, jež však oněmi výtvy práškovými zakaleny méně vynikají. Vnitro jejich mívá nažloutlé, řidce rozdělené, sklovité dílečky a výtvy práškové, jichž seřadění méně pravidlným věnečkům se podobá. Poněvadž veškeré ostatní součásti téměř neporušený vzhled mají, tož leží v proměně této, v leucitu bohaté hmoty původ četného filipsitu. Zrna augitová vyznačují se vesměs krásným slohem miskovitým a neobyčejným množstvím porů plynových a dílců sklovitých, jež začasť zároveň s četnými mikrolithy ve směrech rovnoběžných k pásmům miskovitým uloženy jsou.

Skoro každý sklovitý dílec obsahuje více bublinek a nezřídka vnikají mikrolithy do porů plynových; v jednom takém nalezl jsem mikrolith úplně uzavřený; neméně jeví se tuto i bublinky, jež tekutým vrostlicím se podobají.

Bezbarvé krystaly živcové jsou ponejvíce zřejmě rýhované, nejčastěji ze dvou jednotníků srostlé, z nichž každý četné rýhování a v polarisovaném světle temné a světlé pásy jeví. Mnohdy dosahují temné tyto pásy a čárky pouze do polovice.

Jednotníci vzrůstají od velmi jemných jehlic až na 4 mm. délky a 1·3 šffe. Větší, podélné průřezy bývají puklinkami prostoupené, uzavírajíce hojně jehlicovité mikrolithy a pory plynové. Tolikéž tenké, kuželovitě se zúžující pásy hmoty čedičové vnikají do mnohých podélných průřezů živcových.

*Čedič nad Klší na počátku Strážovické hory*  
(černošedý, velmi jemnozrný, podobný čediči od Kračina).

V kalné, nazelenale-šedé, mikrolithy bohaté hmotě rozšířeny jsou větší podélné, skoro stejně mikrolithy bohaté krystaly augitu, velmi četné, dlouhé, bezbarvé, široké i tenké tyčinky živce a osamotnělá, velká zrna a prášek magnetitu.

Tyčinky živcové jsou všude jednoduché, avšak v polarisovaném světle prozrazují, že skládající se ponejvíce ze dvou někdy i ze třech (různě zbarvených) nažloutle-nahnědlých neb namodralých pásků trojklonnému živci náležejí.

*Krystalicky celistvý čedič z vrchole Strážovické hory*

vykazuje za 400. zvětšení stejnou, jemnozrnou směs, skládající se z převládajícího trojklonného, z malé části i jednoklonného živce, z amfibolu, nefelinu, leucitu, magnetitu a titanového železa.

Slabě nahnědlá základní hmota, v níž hojně obdélníky (nefelin) a četnými krystalky a mikrolithy polygonálně neb skoro kruhovitě omezené dílce (leucit) pozorovati lze, obsahuje hojnost kopinatých, nažloutlých mikrolithů a sklovitých dílců, jež v obdélnících k hranám rovnoběžně a v průřezích leucitových do kruhu neb tangentialně uloženy jsou. Porfyricky vyniká jen něco málo trojklonných, úplně bezbarvých jehlic živce (asi 1''' dlouhých a asi 1/4''' širokých). V polarisovaném světle jeví některé z těchto průřezů živcových klínovité lístky, jež sotva do polovice délky zasahají. Titanové železo vyskytuje se též v jehlicích. Dosti hojně objevují se nahnědlé neb nažloutlé, velmi malé krystalové průřezy, ponejvíce co krátké obdélníky omezené, které nepochybně melilitu náležejí.

*Krystalicky celistvý, břidlicový čedič z jižního úpatí hory Strážovické*

podobá se fonolitům. Základní hmota jeho skládá se ponejvíce z leucitu, nefelinu a nepochybně i z přeměněného, nažloutle kalného noseanu, v ní pak skoro stejně rozděleny jsou dosti četné krystaly amfibolu, živce a mimo to magnetit a železo titanové. Průřezy leucitu a nefelinu jsou všude kalné a přeplněné mikrolithy a jemnými výtvary práškovými; obrysy jejich jsou nezřetelné a dají se ponejvíce pouze z pravidelného uložení mikrolithů určit; ony tvoří zajisté největší díl slabě

nažloutlé, kalné, mikrolithy a tyčinkami bohaté, na zdání stejnorodé základní hmoty. Některé, větší, podélné průřezy nefelinové vyznačují se rovnoběžnými řadami zrněk práškových; právě tak spoře vynikají některé větší krystalky leucitové poněkud zřetelněji.

Krystalky amfibolové, nažloutle šedé, jsou poměrně dosti četné; zdá se, že leží v rovnoběžných rovinách, čímž asi onen břidlicovitý sloh povstává. Porfyrické krystaly a tvary amfibolové, zaujaté hmotou magnetitem bohatou, vyskytují se porůznu. O rázu tolikéž kalného živce nevysvítá z výjevů polarisačních nic určitého.

### *Fonolitový čedič z Dubic.*

Krystalicky celistvý, deskovitý čedič z Dubic, jenž ve velmi tenounké desky snadno štípati se dá, jeví jemnozrnou směs větších i menších krystalů augitu, amfibolu a živce, jež, v proudech a v kopkách uloženy jsou, v hmotě bezbarvé, krátkými a dlouhými mikrolithy přebohaté, nestejně rozděleny jsou.

Zdá se, že tato temno šedě polarisující, krátkými a dlouhými mikrolithy, jehlicemi a zrny práškovými bohatá hmota, která zároveň skrytou základní hmotu tvoří, podstatně z nefelinu a leucitu se skládá. V ní vyskytují se dlouhé, tenké, bezbarvé, sklovitými, našedivěle bílými pruhy omezené krystaly živce, provázené dlouhými, rovnoběžně uloženými mikrolithy. Podélné jich průřezy tvoří rovnoběžníky a obdélníky, z nichž tyto šikmo rozpukány bývají. Širší průřezy těchto bezbarvých krystalů obsahují začasť podlouhlé mikrolithy a protáhlé pruhy sklovité, jimiž ony v úzké tyčinky rozpukány jsou; jiné bývají jemně rýhované a největší jich díl rovnoběžně neb paprskovitě seřaděny. Polarisuji slabě namodrale bíle a šedomodře, na mnoze s temnými pruhy a pásy; řidčeji jeví jiné, četnými sklovitými pruhy jen slabě zřetelné stupně barev. Nepochybně náležejí živci, z části jednoklonnému, z části trojklonnému.

Krystaly amfibolové jsou roztroušeny v čedičové hmotě, která hlavně z hmoty živcovité se skládá; kolem větších porůznu se vyskytující krystaly amfibolu, jež, ponejvíce našedivěle (začasť uvnitř nazelenale, na okraji nažloutle neb na hnědle) zbarveny jsou, velmi zhusta skupinami zrněk práškových a dílců sklovitých více méně vyplněny jsou, ukládají se v proudech tyčinky živcové a hromádky mikrolithových jehlic.

Magnetit (dílem i titanové železo), jehož průřezy jsou šesterce a čtverce, jest nestejně rozdělen a různé velikosti. Velmi často vyskytují se skupiny velmi malých i větších zrněk magnetitových, jež buď v průřezích amfibolu jsou uzavřeny aneb jich tvary zaujmají, aniž by hmota amfibolová se pozorovala. Okolo shluků tvoří proudy mikrolithů a malých krystalů krásné fluktuální skupeniny.

Drobounké šesterce apatitu jsou velmi sporé. Poněkud hojnější, zvláště v shlucích magnetitových jsou malé, co citron žluté, obdélníkové neb tupými jehlanci zakončené sloupečky, jež kolmo na podélnou osu ostře a téměř v stejných vzdálenostech rozštěpeny bývají. Tyto výtvořky, jež mnohdy méně zřejmou, podélnou vláknitost jeví, a krátké (augitové) mikrolithy uzavírají, podobají se melilitu.

Hutnost čediče Dub. = 2.759 (urč. 9 gr.).

Světlošedý prášek v kyselinách nešumí; rozkládá se však, vylučuje kyselinu křemičitou co rosol; pálením zbělí a přechází do hnědožluta.

### *Fonolitový čedič od Zálesí na Labi*

srovnává se skrytým svým slohem téměř úplně s čedičem Dubickým. Živec vyskytuje se (na zdání) opět dvojí: jednoklonný (sanidin) a trojklonný. Velmi hojně jsou bezbarvé, malé tyčinky krystalické, jež, buď paprskovité nebo rovnoběžné shluky tvořící, ponejvíce sklovitými proužky odděleny jsou, v polarisujícím světle modravě bíle se jeví a temnými pruhy a začasné nahnědlými pásy opatřeny bývají (zřídka jen objevují se slabé barvy duhové).

Nefelin vyniká též zřejměji (nejen v bezbarvých obdélnících, nýbrž i v šestercích a jim podobných mnohoúhelnících). Vedle žlutých průřezů melilitových, (srovnávajících se s oněmi čediče Dubického) vyskytují se též velmi sporé, větší, zřejmé, našedivěle žluté, vlnité, rovnoběžné vláknité průřezy olivinu.

### *Břidlicový čedič mezi Libšicemi a Bilinou*

srovnává se s břidlicovým čedičem hory Střížovické. Za 400. zvětšení vykazuje směr mikrolithů (obyčejně v proudech, kruhům se podobajících) v hmotě bezbarvé, v níž se stejně rozdělená zrnka magnetitová a okrouhlé jich skupiny a pouze místy četné, dlouhé, tenké, bezbarvé tyčinky na způsob proudů uložené, a málo větší krystaly amfibolu, někdy magnetitem úplně zaujaté, vyskytují. Největší díl broušené destičky — bezbarvá to hmota se směsí mikrolithovou — objevuje se v polarisovaném světle temným. Při bedlivějším pozorování okáže se však, že jehlice mikrolithové (namnoze amfibol) do kola nebo do více méně pravidelných šesterců uloženy jsou; protože podobá se velice pravdě, že tato základní hmota převahou z hmoty leucitové se skládá. Krátké, široké obdélníky náležejí nepochybně nefelinu, dlouhé pak tenké, bezbarvé, modravě polarisující tyčinky a rozeklané, bezbarvé (pouze porůznu se objevující) dílce, nezřejmého omezení sanidinu.

Hutnost tohoto čediče = 2.915.

### *Krystalický celistvý čedič u Valče,*

o němž Zirkel se zmiňuje, že upomíná na andesit, srovnává se skoro úplně s čedičem Libšicko-Bilinským. Největší díl základní hmoty, mikrolithickými součástkami přebohaté, polarisuje úplně temně.

### *Krystalický celistvý čedič u Andělské hory u Karlových Varů*

podobá se čediči Libšicko-Bilinskému, jest však za 400. zvětšení téměř mikrolithicky vytvořen a překypuje jehlicemi živcovými. Na četných místech jest patrné,

že hmota základní, na zdání stejnorodá, téměř bezbarevná (v níž jemné, hustě seřaděné krystaly augitu a živce se zrnky práškovými ponejvíce v kruzích neb v proudech uloženy jsou) výhradně z leucitu a nefelinu se skládá. Průřezy leucitové jsou dílem nepatrné, téměř bezbarvé (slabě červenavě bílé), mikrolithů prosté a jen na některých místech velmi jemnými, méně zřetelnými práškovými věnečky opatřené, dílem i větší, ale krystalovou směsí hmoty čedičové vyplněné; tyto pak vyznačují se pouze úzkými, bezbarvými, okrajními pásmy; k oněm řadí se pak velmi malé, nehrubě ostře omezené, začasné uložení jemných mikrolithů význačně nefelinové obdélníky.

Tyčinky živcové, obyčejně mnohonásobně rovnoběžné, dílem i paprskovitě složené, vyskytují se tu a tam velmi hojně. Některé krystaly augitové barvy nažloutlé vystupují porfyricky; obroubeny jsouce více méně temně červenohnědou hmotou infiltrační (krevelem a hnědelem) — která v celé destičce v podobě žilek se rozšiřuje a načervenalé zbarvení veškeré hmoty čedičové působí — vyznačují se miskovitým slohem a vrostlicemi jednotlivých dílců sklovitých; mikrolithů však jen málo obsahují. Skupiny zrněk magnetitových v tvarech amfibolových vyskytují se porůznu.

#### *Fonolitový čedič z vysokého Čihadla u Turče*

srovnává se zcela s čedičem Libšicko-Bilinským. V bezbarvé, temně polarisující, jemnými, jehlicovitými mikrolithy bohaté základní hmotě uložena jest řídká, ponejvíce ve směrech hlavního proudu běžící směs podlouhlých krystalů amfibolových a méně četných, bezbarvých, tyčinkovitých krystalků, hojných nahnědle žlutých, v krátkých sloupcích se jevících krystalů melilitových a stejně rozděleného, úplně jemnozrného magnetitu.

Tyčinky amfibolové (barvy našedivělé), opatřeny jsou ponejvíce řadami zrněk magnetitových. Bezbarvé tyčinky postrádají buď úplně vrostlic aneb obsahují jemné proužky zrněk práškovitých, jednotlivé větší plynové pory a různé položené jehličky mikrolithové. Polarisují nažloutle bíle a namodrale, zřídka s temnými pruhy, širší skládají se pak ponejvíce ze dvou různobarevných, podélných dílců, poukazující k srůstu dvojčatnému jednoklonného živce. Nahnědle-žluté, na tenkých místech světle žluté, slabě vláknité (začasné na přímě rozštěpené) krátké sloupky podobají se melelitu.

V základní, temně polarisující hmotě jsou mikrolithy a krystalky namnoze v kruhových shlucích nahromaděny a světlejším okrouhlým pásmem uzavřeny. Objevy tyto vzbuzují domněnku, že velká část základní hmoty leucitu náleží. Hustými, jemnými řadami nahnědlých zrněk práškových čárkované, široké průřezy nefelinu vyskytují se v malém počtu; za to vynikají množstvím obdélníky a šesterce, hojnými mikrolithy opatřené, našedivěle bílé, od základní hmoty neurčitě oddělené. Tolikéž velmi hojně zastoupeny jsou infiltrační dílce, ostře vyznačené vrstevnatými čarami a jemně vláknitými pásky, uvnitř pak začasné slohem paprskovitým.

Hutnost tohoto čediče = 2·656 (určena 25·5 gr.).

*Čedič ze západního svahu Litoltovského pohoří u Kadaně*

podobá se čediči Libšicko-Bilinskému, liší se však tím, že při 400. zvětšení jest téměř mikrolithickým.

Krystalická směs hmoty jeho skládá se z leucitu, nefelinu, augitu, živce a prášku magnetitového. Jednotlivé, porfyricky vynikající krystaly amfibolu, obroubené hustým věncem magnetitu neb stěsnaných součástí hmoty čedičové, uzavírají sporé krystaly nefelinu a vrstevnatě uložené shluky magnetitové. Průřezy leucitové bývají četnými, nehrubě pravidelně uloženými vrostlicemi zakalené; mnohé však ozdobeny jsou pravidelnými věnečky aneb vynikají pravidelnějším omezením. Větší úlomky práškovitých průřezů nefelinových vyskytují se porůznu; jehlice živcové jsou pouze místy čtenější.

*Čedič ze severního svahu vrchu (Čebiš) Maštovského, blíže Vintířova.*

Porfyricky objevují se v něm pouze jednotlivá zrnka augitu. Průřezy jejich obsahují místy nescíslné množství podlouhlých, bezbarvých mikrolithů s ostrými šesterečnými průřezy a podobají se průřezům augitovým od Varty na Ohři; mnohé z nich vyznačují se tím, že jeví poblíže kraje ozdobný sloh miskovitý, jsouce mimo to v miskovitých pásmech rovnoběžnými řadami mikrolithů opatřeny; četné dílce sklovité a bublinky plynové vyskytují se velmi zhusta co vrostlice.

Skrytá základní hmota skládá se výhradně z nefelinu, leucitu, augitu a magnetitu, jež velmi jemnozrnou, z části mikrolithům podobnou směs vykazují, ve kteréž okolo větších průřezů augitových a okrouhlých hustých skupin augitu a magnetitu tyčinkovité, bezbarvé, podélné průřezy na způsob proudu uloženy jsou.

Průřezy leucitové, dosti četné, tvoří na několika místech ostré osmerce, vynikající na mnoze nehrubě zřejmými věnečky zrněk práškovitých a mikrolithovými, okrouhlými hromádkami; v mnohých leucitech objevují se skupiny mikrolithů v takovém množství, že ony téměř zcela vyplňují.

Též vyskytl se větší, skoro pravidelný osmerek, který ve svém nitru hustou směs jehlicovitých, toliko na okraji s hranami rovnoběžně uložených mikrolithů obsahoval a (bez ohledu na pravidelné omezení) hmotě na polo krystalované se rovnal.

Průřezy nefelinové — tvoříce krátké a podlouhlé obdélníky a méně ostré šesterce — jsou namnoze bezčetnými, nažloutlými a nahnědle žlutými tečkami, jehlicemi a proužky sklovitými více méně zkaleny; jen ty nejmenší jsou zcela bezbarvé.

Neobyčejně četné jsou bezbarvé, v proudech uložené tyčinky, jež bývají po 2, 3 i více jednotných srostlé, sklovitými proužky od sebe se oddělující, málokdy jsou však úplně rovnoběžné, nýbrž rozbíhají se buď dichotomicky buď paprskovitě aneb i do kruhu se ukládají. Šířka jejich obnáší asi 0.02 mm., délka pak přesahuje mnohdy i 1.2 mm. Tytéž obsahují krátké a podlouhlé mikrolithy a (zvláště na

okraji) četné proužky sklovité. Polarisují namodrale a nažloutle bíle, proniknuty jsou podél hlavní osy mnohými, našedivělými proužky.

Okrouhlé skupiny zrněk magnetitových prosvítají modravě šedě; i hranatá, nezřetelně však omezená zrnka magnetitová prosvítají tu a tam namodralým odstínem, jsou skoro všude bledě modře tečkována.

#### *Krystalicky celistvý, fonolitu podobný čedič z křovin Mašovských*

obsahuje četné, makroskopické krystalky augitové a vykazuje za 400. zvětšení jemnou krystalickou směs, která se nejvíce čediči od Dubic a Blankensteinu podobá

Velmi hojné jsou dlouhé, tenké, bezbarvé průřezy živce, proužky sklovitými více méně zkalené a modravě bíle (začasté do žluta neb do hněda) polarisující, jež obyčejně proudovité shluky tvoří, jmenovitě okolo větších krystalů augitových. Na nejtenších místech skryté základní hmoty pozorovati lze četné, obdélníkaté a šesterčím podobné průřezy, jež nefelinu náležejí; mimo to objevují se v téže základní hmotě dlouhé, tenké mikrolithy a hojné proužky sklovité.

Co vzácnost vystupují malé, nahnědlé, hustou sítí vyznačené úlomky, jež hauynu neb noseanu náležejí.

#### *Čedič z Liščí Hory (Fuchschнауze)*

jeví (při 400. zvětšení) řídkou směs převládajícího augitu, nefelinu, leucitu a jednotlivých tyčinek živcových v hmotě základní, bezbarvé, dílem bezbarvými jehlicemi a prášky bohaté, dílem úplně stejnorodé. Namnoze tvoří směs tato rozmanité proudy, v nichž i jednotlivé, k sobě náležející úlomky augitové odděleny jsou. Vedle četných, bezbarvých průřezů nefelinových vyskytují se též úlomky větších, řadami zrněk práškových opatřených průřezů; zdá se, že i nepatrné krystalky leucitu v skryté základní hmotě hojně jsou zastoupeny.

Větší krystaly amfibolové jsou vyplněny shluky zrněk magnetitových.

#### *Velmi jemně krystalický, fonolitu podobný čedič z Blankensteinu*

srovnává se téměř úplně skrytým svým slohem s čedičem od Dubic, nemá však oněch citronově žlutých, melilitu podobných průřezů krystalových.

Při 400. zv. objevuje se co vynikající součást skoro bezbarvá (slabě našedivělá) skrytá hmota základní, v níž zřejmé krystalky augitu (amfibolu), bezbarvé tyčinky živce, malé úlomky biotitu a méně četná zrna magnetitu řídkou směs činí. Táž hmota základní jest však nesmírně bohatá krátkými, dlouhými mikrolithy, světlými výtvary práškovými a obyčejně protáhlými dílci hmoty sklovité a největší její díl polarisuje temně. Skupiny zrněk magnetitových s jinými součástkami hmoty čedičové v podobě průřezů amfibolových jsou dosti četné, právě tak hojné jsou i skupiny magnetitu v menších krystalech amfibolových.

Přetné, bezbarvé krystaly, jež v základní hmotě jsou rozděleny, jsou na



zdání trojho druhu: krátké obdélníky a šesterčům podobné, ale nezřejmě omezené průřezy náležejí nefelinu, ony pak nescíslné, tyčinkovité, polysynthetické průřezy trojklonnému živci a v širších rozeklaných průřezech jeví se sanidin. Průřezy sanidinové, tvořící dlouhé rozpukané rovnoběžnky a obdélníky obsahují protáhlé dílce sklovité a jeví se v polarisovaném světle temněji neb světleji namodrale šedé.

Olivin nevyskytl se nikde.

Hutnost tohoto čediče = 2·789 (14 gr. urč.).

#### *Fonolitu podobný čedič od Chlumu u Děčína.*

V této krystalicky celistvé hornině lze pouze nepatrné krystalky amfibolové již pouhým okem rozeznati. Krystalicky celistvá základní hmota (při 400. zvětšení) blíží se oné čediči od Dubic; nepolarisuje však a, jsouc mikrolithy velmi bohatá, obsahuje i četné, malé krystalky leucitu, jež na okrouhlých věnečkách a kulatých, středních skupinách krátkých mikrolithů zřejmě poznati lze; není též pochybnosti, že i ony bezbarvé, okrouhlé, dlouhými tenkými mikrolithy bohaté dílce téměř nerostu náležejí.

#### *Čedič z jižního úpatí Zlaté hory u Ploškovic*

podobá se čediči Dubickému, jest však zvětřalý. Našedivělé neb nažloutle bílé magma, jež větší dílce broušené destičky (asi  $\frac{1}{5}$ ) zaujímá, jest všude proniknuté našedivěle bílými aneb skoro bezbarvými, trojklonnými tyčinkami živce, velmi četnými mikrolithy a výtvary práškovými. Krystaly augitu a magnetitu nejsou všude stejně rozděleny, nýbrž místy více méně hustě stěsnány. Trojklonné tyčinky živcové, v polarisovaném světle nažloutle neb namodrale bílé, uloženy jsou kolem větších shluků paprskovitě aneb na způsob proudů.

Našedivěle černý, krystalicky celistvý, porfyrickými krystaly augitovými bohatý čedič od *Bachstreicherova mlýna nedaleko Proboštova*,

ježž trachytový fonolit s žilou čediče trachytového prostupuje — podobá se skrytým svým slohem čediči z Valče, jest však (při 400. zvětšení) jemněji zrnitý a obsahuje sporé, velmi malé krystalky leucitu a nepchybně i hauynu. Vyskytují se v něm i osamotnělé, mikroporfyrické průřezy augitu, z nichž jedny rovnoběžně s hranolovými hranami jsou rozeklány, jiné řidkým pásmem zrněk práškových opatřeny a opět jiné neúplně vytvořeny, vesměs však skoro úplně prosty krystalických vrostlic.

#### *Temnošedý čedič z Vrabčince*

řadí se na pohled velmi blízko fonolitům. Mimo četné, silně lesklé, černé jehlice amfibolové, jež se na zdání jedním směrem ubírají, řidčeji paprskovitě se rozbíhá-

jíce, pozovovati lze ve velmi jemnozrné základní hmotě jeho pouze jednotlivá, malá, nažloutle bílá zrnka olivinová, silně dýmavě lesklé destičky biotitu (jež hnědozeleně prosvítají) a sporá, bezbarvá zrnka trojklonného živce. Dosti zhusta vyskytují se i malé okrouhlé shluky amfibolu a biotitu. Zdá se, že skrytá základní hmota čediče tohoto, nesmírně jsouc bohata mikrolithy, podstatně z nefelinu a z leucitu se skládá; neboť v polarisovaném světle jest větší část temná, avšak zároveň prosvítají četné, modravě šedé, pravoúhlé dílce, jichž obrysy nikde zřejmě nevynikají. Tolikéž uložení mikrolithů, rozmanitými proudy se berouc, není pro průřezy nefelinu dosti význačné. V této vesměs převládající, skryté základní hmotě rozšířeny jsou dosti četné, našedivělé, nahnědlé šedé a světlé šedé krystaly amfibolu. Porfyrické průřezy amfibolu ponejvíce načervenalé neb hnědě prosvítavé, jsou vždy opatřeny více méně širokým okrajním věncem zrněk magnetitových a začasť magnetovcem tak vyplněny, že hmotu amfibolovou sotva rozeznati lze. Vrostlice — bezbarvé mikrolithy a sklovité dílce — jsou v nich méně četné. Jinou dosti rozsáhlou součástí základní hmoty tvoří dlouhé, bezbarvé, ponejvíce rovnoběžníkové průřezy (širší jsou rozežlaného vzhledu), jež skoro vždy po dvou jednotlivých srostlé jsouce, dílem stejně, dílem modravě a nažloutle v obou podélných polovicích polarisují.

Dlouhé, tenké jednotlivky jejich (značné délky) uloženy jsou kolem jiných větších nerostů v proudech.

Vedle několika málo úlomků biotitových vyskytl se velký, pravidelně šesterý průřez hauynu (v průměru asi 4 mm.), jenž na okraji úplně černě, ve světlém však nitru nažloutle zbarven, tutěž již přeměněn byl a světle polarisoval. Malé úlomky hauynu se zřejmými vláskovitými sítěmi objevily se ve větším počtu.

#### *Fonolitový, krystalický celistvý čedič z Březin u Děčína*

podobá se poněkud čediči od Dubic. V skryté základní hmotě, která mikrolithy a výtvary práškovými bohata jsouc, temně polarisuje, uložena jest směs bezbarvých tenkých tyčinek (které se oněm z Dubic podobají) a podélných krystalků amfibolu na způsob proudů, mezery pak vyplňuje hojný magnetit.

#### *Čedič od Rytířova blíže Děčína.*

Rázem svým a spojením jednotlivých svých součástí podobá se čedič tento čediči od Valče, obsahuje však pouze tu a tam hojně trojklonné tyčinky živcové. Nahnědlé a našedivělé sklo (v polarisovaném světle temné) černými, přímými i křivými jehlicemi trichytovými bohaté, tvoří skrytou základní hmotu, v níž v podobě husté směsi podlouhlé krystaly augitu a stejně rozdělená zrnka magnetitu obsaženy jsou. Kde výtvary trichitové scházejí, tam jest sklo téměř bezbarvé. A právě takovéto dílce srovnávají se s broušenými destičkami čediče od Valče.

*Čedič z návrší severně od Verneřic*

blíží se čediči Libšicko-Bilínskému. Nemnohé krystaly augitu a amfibolu vynikají porfýricky co nepatrná zrnka; mnohé průřezy jejich vyznačují se tím, že objevují v polarisovaném světle barevné proužky, jež svědčí o úzkých vrostlicích augitu, obráceně položených. Dosti hojně vyskytují se i podobné průřezy, jež převahou ze zrněk magnetitových, krátkých sloupků titanového železa a z nemnohých součástí hmoty čedičové se skládají a začasť ještě tenký, zřetelný okraj hmoty amfibolové jeví,

Základní hmota skládá se ze směsi podélných krystalků amfibolu, nefelinu, sanidinu, sporého leucitu, noseanu a skoro stejně rozdělených zrněk magnetitových. Vyjímaje amfibol, magnetit a bezbarvé tyčinky, jež (pouze místy hojněji se objevují) dílem sanidinu dílem oligoklasu náležejí, jsou obrysy ostatních součástí poněkud nezřetelné.

Bezbarvé tyčinky, jež na některých místech dosti četně a po více jednotnících srostlé se jeví, mohou z větší části trojklonnému živci náležeti, ač ve světle polarisovaném jen sporé rýhování prozrazují. Trhlinkami prostoupené tyčinky lze považovati za průřezy sanidinu. Že nefelin vším právem ve velkém množství jest přítomen, toho důkazem jsou mnohé, krátké, obdélníkovité a šesterečné průřezy. Dosti hojné jsou nažloutlé, okrouhlé neb patrně šesti- a osmihrané průřezy, jichž obvody po většině jsou neurčité. Vyplněny jsou velmi jemnými prášky a jehlicemi, jež jen řidčeji pravidelné, síti podobné uložení mají, ale zřejmě co hlavně se prozrazují.

Větší práškovité nefeliny vyskytují se porůznu. Nehrubě zřetelné průřezy leucitu vyznačují se poněkud uložení svých mikrolithů.

*Krystalicky celistvý, drúzami filipsitu bohatý čedič od Hořejší Kamenice*

srovnává se poněkud s čedičem andesitovým z hory Koutné u České Lípy, obsahuje však více nefelinu, jenž zřetelněji se vyznačuje četnými mikrolithy, s průřeznými hranami rovnoběžně uloženými.

*Čedič od Malé Bukoviny u Benešova*

obsahuje našedivělé neb nažloutlé bílé, v polarisovaném světle temné, hrotovitými a dlouhými, jehlicovitými mikrolithy bohaté magma, jež větší díl hmoty čedičové asi  $\frac{1}{3}$  neb  $\frac{1}{4}$  zaujímá. V tomto jsou nestejně rozděleny skupiny augitu, trojklonného živce a magnetitu. Tu a tam svědčí okrouhlé hromádky mikrolithů, že přítomen i leucit a neurčité, obdélníkové obrysy prozrazují nefelin; avšak největší díl hmoty čedičové (ano i okraje polysynthetických tyčinek živcových) jest již značně přeměněn; neboť dosti velké dílce ukazují klikaté, vlnité, vrstevnaté čáry započaté infiltrace, jiná pak místa prostoupena jsou jemným hustým žilkováním.

Dosti četně zastoupeny jsou též dílce sklovité, jež vyloučením směsi velmi jemných, dlouhých, bezbarvých jehlic staly se na polo krystalickými.

*Zeolity bohatý, velmi jemnozrný, tmnošedý čedič z Koutné hory u České Lípy*

vykazuje jednotlivé, široké jehlice živce a nepatrné, velmi sporé krystalky amfibolu.

Základní jeho hmota skládá se za 400. zvětšení ze směsi převládajícího živce s méně četným, poněkud jemnozrným augitem, téměř stejně rozděleným, tolikéž méně četným magnetitem a z nahnědle žluté, kalné, v polarisovaném světle šedé hmoty, která, mezi krystaly vynikajíc, proměnou stala se kalnou a nabyla nahnědlého zbarvení. Místy vynikají též protáhlé a široké, skoro bezbarvé dílce, jež dle četných malých, okrouhlých, mnohohraných a obdélníkových obrysů aneb dle namodralé šedého, z části úplně temného zbarvení v světle polarisovaném dílem z přeměněného nefelinu, dílem z leucitu se skládají.

Živec, (v průřezích z více rovnoběžných jednotníků složených) jest převahou rázu trojklonného; vyskytují se však též široké, rozpukané, stejně polarisující podélné průřezy, jež sanidinu náležejí.

Vůbec blíží se čedič tento v mnohém ohledu čedičům andesitovým od Dubic a Zálesí na Labi.

*Čedič z Homole (Hutberg) blíže Petrovic.*

Čedič tento jeví velmi jemnozrnou směs převládajícího leucitu, pak nefelinu, augitu, trojklonného živce a stejně rozděleného magnetitu.

Leucit vyskytuje se v žlutavých, okrouhlých, mnohdy osmi- a šestihraných průřezích, jichž omezení množstvím řídce rozdělených mikrolithů a zrněk práškových nezřejmě jest, za to však na mnoze z temněji zbarveného okolí určitěji vyniká.

Krátké obdélníky, taktéž zbarvené co průřezy leucitové, též mikrolithy a výtvoři práškovými méně zřetelně vyznačené, náležejí nefelinu.

Namnoze četněji vystupují bezbarvé, jemně rýhované, tyčinkovité krystaly živce, jež vynikají úhledným, proudovým uložením.

*Čedič z pahorku mezi Cvikovem a Ráasdorfem*

srovnává se úplně s čedičem od Valče. Mimo podélné sloupky amfibolu (jichž podélné polovice v polarisovaném světle různě zbarveny bývají) zúčastňuje se ve složení hmoty čediče v největší míře trojklonný živec v dlouhých, tenkých, jemně rýhovaných, bezbarvých tyčinkách, jež z více rovnoběžných neb jen nepatrně se rozbíhajících jednotníků srostlé bývají. Podélné průřezy oněch nerostů naznačují hlavní směry proudů. Malá zrnka magnetitová jsou méně četná a stejně rozdělená. Zřejmě, krátké obdélníky nefelinové a ostré jeho šesterce vyskytují se řidčeji. Zdá se, že skrytá základní hmota, jež, jsouc nažloutlá neb slabě zakalená, v polarisovaném světle poněkud temná jest a všude černými, přínými a křivými jehlicemi a výtvoři přínými se vyznačuje, převahou hmotě leucitové náleží. Tomu na-

svědčují okrouhlé skupiny jehlic mikrolithových a četné kulaté dílce, jichž obrysy jemnými výtvary trichitovými obroubeny bývají. Vyskytují se však i větší, bezbarvé a mikrolithů prosté, ostře omezené osmerce, jichž hmota zřejmě přeměněna a pravoúhelnými trhlinami proniknuta jest.

### *Čedič z Myknyblu*

blíží se nejvíce čediči Libšicko-Bilinskému, obsahuje však hojnost trichitových výtvarů, podobných hebrejskému písmu, štětcům i chomáčům. V šedobílém, téměř bezbarvém magmatu, jež asi  $\frac{1}{2}$  hmoty čedičové zaujímá, tvoří podélné sloupky augitové a tyčinky trojklonného živce s jemnozrným, stejně rozděleným magnetitem řídké pletení. Na mnohých méně přeměněných místech obsahuje ono skoro bezbarvé magma vedle černých výtvarů trichitových též množství nažloutlých, hrotovitých a dlouhých, bezbarvých mikrolithů; pouze tam, kde mikrolithů a trichitů není, vyniká hustá vláknitost; místa taková jsou přeměnou nejvíce porušena. Krátké obdélníkové obrysy nefelinu jsou sporé ale zřetelné; zároveň objevují se nemnohé průřezy leucitové, jež pouze pravidelným uložením jehlic trichitových vynikají.

Poněvadž podobné okrouhlé dílce, vrostlicemi krystalů zakalené, znetvořené, velmi hojně se objevují, lze souditi, že veliký díl magmatu leucitu náleží.

Velmi jemnozrný, málo nepatrných porfyrických zrněk olivinu a augitu vykazující

### *Čedič ze severní strany zámeckého vrchu Fridlandského*

blíží se čediči od Valče. Přčetné, dlouhé tyčinky trojklonného živce jsou kolem méně četných, dlouhých, mikroporfyrických krystalů augitu a olivinu buď v proudcích buď okrouhle uloženy neb jako nárazem rozptýleny; i nefelin, ponejvíce méně určitě omezen, vyskytuje se dosti četně.

Ubývá-li tyčinek živcových, stává se uložení krystalků augitových a zrněk magnetitových kruhům neb mnohoúhelníkům podobné. Jelikož místa tato ve světle polarisovaném až na vrostlice úplně temna jsou, tož podobá se pravdě, že po většině složena jsou z průřezů leucitových.

### *Čedič z Hageberku u Friedlandu*

jeví sporá zrnka olivinu a augitu. Krystalicky celistvá hmota jeho — skrytým slohem a přiblíženým poměrem nerostních součástí s čedičem Dubickým se srovnávají — skládá se převahou z trojklonného, dílem i jednokloného živce, jehož bezbarvé tyčinky, okolo mikroporfyrických zrněk olivinu a augitu různé proudy tvoříce, o posledních pohybech hmoty čedičové svědčí.

Shluky převládajících zrn magnetitu s jinými součástkami hmoty čedičové vyskytují se osamotněle.

### *Čedič z Lipové hory u Housky*

řadí se blíže fonolitům. Skrytá jeho základní hmota skládá se podstatně z nefelinu a leucitu, jež se pravidelným uložením velmi četných, po většině jehlicovitých mikrolithů vyznačují. V této základní hmotě vyskytují se skupiny drobných, podlouhlých krystalů augitu a bezbarvé tyčinky živcové, jež ponejvíce bledě modravě polarisují, některé však temnými pruhy opatřeny jsou aneb z více rovnoběžných jednotníků se skládají. Sporé krystaly augitu neb amfibolu přesahují obyčejnou velikost.

#### *Velmi jemnozrný čedič z pahorku Skokanských skal u Železného Brodu* (uložený v podobě proudu na břidlici prahorní)

srovnává se skoro úplně skrytým svým slohem s andesitovým čedičem z Hageberku u Fridlandu. Co převládající součást vyniká v onom trojklonný živec, jehož bezbarvé, rovnoběžné, paprskovité aneb různě rozlžené tyčinky kolem mikroporfyrických zrněk augitu a olivinu proudy tvoří. Tolikéž nefelin jest místy dosti hojný, avšak průřezy jeho nemají omezení určitého.

Jednotlivá, nečetná místa, v nichž nefelin a průřezy leucitové převládají, postrádají živce a tím nabývají jiného skrytého slohu. Průřezy olivinové uzavírají začasté čedičovou hmotu. Mimo ovální — práškovitým, kalným věncem shuštěné hmoty čedičové omezený — shluk krystalů augitových objevila se v bezbarvém magmatu i jemně ryhovaná deska bronzitů.

#### *b) Leucitem a nefelinem bohaté čediče fonolitové.*

##### *Fonolitu podobný čedič od Želkovic.*

Krystalicky celistvý čedič tento vykazuje při 400. zvětšení jemnozrnou směs převládajícího nefelinu a leucitu s malými, pravidelně rozdělenými krystalky amfibolu, jehlicemi živce a zrnky magnetitovými. Mezi krystaly pozorovati lze nažloutlé neb slabě nahnědlé magma.

Mimo dosti hojně, velikostí poněkud vynikající, podélné průřezy nefelinu, jež velmi tupými jehlanci a spodovou plochou zakončeny jsou, převládají skoro všude bezbarvé, ostře omezené šesterce; největší jich díl má na okrajních hranách jemný věnec, který se skládá z krátkých, černých jehlic a ze sporých dílců sklovitých, čímž tento ostrý okraj slabě našedivělý neb temně zbarvený bývá; v mnohých pozorovati lze též dlouhé, tenké mikrolithy, jež, poblíže okraje s hranami rovnoběžně uloženy jsouce, uvnitř porůznu se objevují. Poněvadž mezi těmito příčnými průřezy šesterečnými i osmerce se nalézají, náleží též díl nepochybně leucitu. Bezbarvý šesterečný průřez objevil se v amfibolu co vrostlice. Dostí četné jsou i dlouhé, rovnoběžnými řádkami a proužky temných zrněk význačné, podélné průřezy nefelinu, jež se rovnají oněm čediče Slánského.

Všude stejně rozptýleny jsou též útlé, bezbarvé jehlice, ponejvíce ojedinělé,

namodrale bílé a začasť s jedním neb dvěma temnějsími pruhy polarisující; o těch nebylo lze určití, náležejí-li živci neb nefelinu.

Hutnost tohoto čediče = 2·844 (urč. 7 gr.)

### *Čedič od mlýna Šiklova (severozáp. od Oustí).*

V broušených destičkách tohoto, v přeměně již pokročilého a drobě podobného čediče pozorovati lze již pod lupou četná, červenohnědá zrnka, žlutobílé, okrouhlé tečky a pouze jednotlivé, porůzné krystaly amfibolu.

Krystalicky celistvá, základní hmota jeho skládá se při 400 zv. výhradně z leucitu, nefelinu, drobných krystalků augitu a stejně roztroušených zrněk magnetitu.

Krystalky leucitové, jež s nefelinem více než polovici základní hmoty zaujímají, objevují se ponejvíce jen co okrouhlé, nažloutlé neb našedivěle bílé dílce s jemnými, sytkými výtvy práškovými, v množství však neobyčejném; v mnohých vyskytují se více méně zřetelné věnečky a centrální kopky zrněk práškových a jen v některých střední skupiny mikrolithů. Krátké obdélníky, méně zřejmě omezené, svědčí dle pravouhelně uložených mikrolithů o podélných průřezích nefelinu.

Nažloutlé neb našedivěle bílé, okrouhlé dílce, jež pouhým okem jen co tečky se jeví, jsou vesměs na výtvy druhotné přeměněny. K nejzevnějšmu, téměř bezbarvému a velmi úzkému okrajnímu pásmu jejich řadí se soustřední, kalně našedivěle hnědý pásek, který hustým, jemným práškem jest zakalen a k tomu pojí se pak třepení s jemnými, krátkými vlákny. Vnitro polarisuje namodralé neb žlutavě bílé a skládá se z mnohých, malých, okrouhlých dílců paprskovitého slohu. Objevily se však též takové výtvy, jichž vnitro více méně pravouhelně omezené, z nahnědle šedého prášku se skládalo a v němž se též ona pro nosean význačná síť pozorovati dala. Tolikéž sousední součásti základní hmoty okazovaly při bedlivějším skoumání skoro čtvercový obrys, čímž na jevo vychází, že mnohé tyto výtvy přeměněným průřezům noseanovým náležejí. Podobné tvary přeměny objevil jsem též u mnohých noseanů fonolitových.

Temná, červenavě hnědá zrnka, jež se z tlustých, temných pásem a zoubkovaných sloupků skládají, patří průřezům olivinu, nalézajícím se na posledním stupni přeměny.

### *Doleritický čedič od Lipova.*

Silně zvětralý, světle šedý, jemnozrný čedič tento vykazuje při 400. zvětšení směs mikrolithy amfibolovými velmi zkaleného nefelinu, leucitu a magnetitu, v nichž větší, podélné krystaly augitové osamělé a ve shlucích a právě tak velké krystaly nefelinu a nepochybně i noseanu neb hauynu porfyricky vynikají.

Větší podélné průřezy nefelinu, podélné a široké obdélníky jevící, přeměněny jsou v rovnoběžná vlákna, mezi nimiž se nalézají četné, pravouhelně uložené mikrolithy. Vlákna tato povstala patrně přeměnou hmoty zrněk práškových; neboť pozorovati lze ještě takové stupně přeměny, jež ukazují podélné průřezy nefelinu, šedým práškem v podobě vláken a pásek vyplněné. Malé obdélníky nefelinové jsou po většině krátké, široké a obsahují veliké množství (s hranami rovnoběžné

uložených) mikrolithů. Mnohoúhelníky a okrouhlé dílce (leucit) jsou mikrolithy do kruhu uloženy a výtvoř práškovými skoro zcela vyplněny a světlejším okrajním pásmem obroubeny. Obruba tato nevyniká však na tenkých místech zřejmě.

Směs mikrolithová jest v skryté, základní, temně polarisující hmotě, která výhradně z leucitu se skládá, okrouhle a kolem větších krystalů v proudech uložena tak, že flukтуаční sloh všude patrně vyniká. Tolikéž úlomky ponejvíce v paprscích skupených, dlouhých krystalů amfibolových svědčí tomu, že magma čediče tohoto před utubnutím v proudění bylo.

### *Čedič z nejvyššího vrchole Litoltovského pohorí u Kadaně.*

V bezbarvé, dlouhými (bezbarvými) mikrolithy bohaté, nepolarisující a namnoze co neurčité mnohoúhelníky dílem i obdélníky omezené, skryté základní hmotě roztroušeny jsou více méně husté kopky augitu, amfibolu s bezbarvými krystalky živce, a mimo magnetit i sporá, malá zrnka olivinová.

Na některých místech jeví skrytá, základní hmota uložení sousedních krystalků a mikrolithů více méně zřejmé, osmihrané neb obdélníkové omezení; a právě na těchto místech bývá skrytá základní hmota (v dílcích a proužkách) nažloutle zbarvena a polarisuje z části světla.

Na nejtenčích místech broušené destičky lze pozorovati, že veškeré krystaly a mikrolithy osamotě nebo v skupinách na způsob proudů uloženy jsou.

Dlouhé, tenké tyčinky živcové, obsahující jednotlivé mikrolithy, začasté i tenké sklovité proužky, jsou obyčejně zřetelně rýhované a polarisují temně modravě a žlutobíle s přehojnými temnými pruhy a pásy.

Podélné a dle délky četně rýhované krystaly amfibolu obsahují sklovité dílce, zrnka magnetitová a začasté též velmi dlouhé a přetenounké (živcové) mikrolithy.

### *Čedič z Muchovské skály u Rybníka*

vykazuje při 400. zv. velmi jemnozrnnou směs augitu a velmi hojných, dlouhých, tenkých bezbarvých tyčinek, malých stejně roztroušených zrněk magnetovce a četných malých, bezbarvých, nažloutle obroubených průřezů olivinu.

Šedobílá, skoro bezbarvá, skrytá základní hmota, v níž ony místy velmi četné, bezbarvé tyčinky v proudech uloženy jsou, jeví více méně mnohohrané, ponejvíce krátké neb podélné, obdélníkové průřezy, jež, hojnost krátkých mikrolithů obsahující, jimi též omezeny jsou a po většině nefelinu dílem i leucitu náležejí.

Největší díl oněch bezbarvých tyčinek obsahuje sporé, krátké mikrolithy, začasté velmi jemné proužky zrněk práškových a polarisuje stejně modrošedě; jiné jeví se co srostlice více rovnoběžných jednotníků a tyto vyznačují se v polarisovaném světle ostrými, temnými čarami.



### *Čedič z Pecberku u Dokes.*

Tento krystalicky celistvý čedič činí — jak ze skrytého slohu zjevno — přechod od obecných čedičů živcových s našedivěle bílým magmatem k čedičům andesitovým.

V hmotě, mikrolithy a výtvary práškovými bohaté a temně polarisující, v níž nezřetelně mnohostrané a kruhovitě obrysy (leucit) a vrostlice ponejvíce do kruhu neb v proudu nakupených součástek hmoty čedičové pozorovati lze, nalézají se hustá směs dlouhých bezbarvých tyčinek trojklonného živce, jež s jemnozrným augitem a magnetitem stejně roztroušeny a ponejvíce kolem větších průřezů augitu a amfibolu v proudech nakupeny jsou.

Bezbarvé tyčinky, neobyčejně dlouhé (někdy skoro 1 mm. přesahující a pouze 0·04—0·06 mm. široké), často poněkud zakřivené, obyčejně po 2—3, někdy i po více jednotnicích složené, jeví v polarisovaném světle ponejvíce namodralé neb nažloutlé, podélné polovice a často i více střídavých, temných a světlejších proužků a pásků. Příčné jich průřezy jsou nepravidelné; že se však mezi nimi též sporé šesterečné průřezy vyskytují, tož náležejí mnohé z oněch podélných průřezů (jež v polarisovaném světle stejně namodralé bývají) nepochybně apatitu. V nemnohých podélných průřezích živce pozorovati lze jeden neb i více podlouhlých mikrolithů, s hlavní osou rovnoběžně uložených, a ještě častěji též tenké sklovité proužky.

Vedle větších, co karafiát hnědých průřezů augitu, jež, majíce sloh miskovitý, na okraji velmi hojnými jehličkami, tenkými mikrolithy a jemnými výtvary práškovými posázeny bývají, vyskytují se nahnědle žluté průřezy amfibolu, jež v polarisovaném světle mnohé pestrobarevné lístky jeví. •

Zvláštní jsou ještě jednotlivé, větší, jemnými řadami nahnědlych zrněk práškových hustě čárkované, podélné průřezy, jež nefelinu neb apatitu náležejí. V takovém, již pouhým okem patrném, podélném průřezu, 2 mm. zdělí a 0·2 mm. zšíří, objevily se též ovální a rozmanitě zkřivené, sklovité vrostlice 0·06 mm. d., jichž hmota směsí mikrolithovou skoro úplně krystalickou se byla stala; po stranách vnikla pak skoro do polovice podélných těch průřezů hmota čedičová, výtvary práškovými hnědě zbarvená.

V průřezích augitových, jež se ozdobným miskovitým slohem a pravidelně uloženými vrostlicemi mikrolithů vyznačují, nalézají se ovální neb kulaté, osamotnělé bublinky často s pohyblivou libelou.

### *Čedič z Dubin (Eichberg) u Jablonce.*

Skrytý sloh tohoto čediče vykazuje velmi jemnozrnou směs malých krystalků augitu, amfibolu a tyčinek trojklonného živce, stejně roztroušených zrněk magnetitu a sporých nepatrných zrněk olivinu v hmotě našedivěle neb nažloutlé, nebo slabě nahnědlé, která, majíc hojnost mikrolithů a výtvorů práškových, obsahuje velice sporá, porfýrická zrnka olivinu a amfibolu.

Z bezbarvých, tyčinkovitých, podélných průřezů, jež místy dosti hojně se objevují, má největší díl polysynthetický sloh a jeví v polarisovaném světle šedomodré aneb namodrale bílé zbarvení s tenkými proužky.

Porfýricky vynikající průřezy olivinu jsou velmi sporé, za to však hojně objevují se menší jednotníci, jichž průřezy bezbarvé, vrostlic prosté a pouze na okraji našedivělé a kalné bývají; řidčeji vyskytují se v nich dílečky sklovité s jednou neb i více plynovými bublinkami. Magnetit často obsahuje krystaly živce co vrostlice.

Značný podíl ve složení hmoty čedičové má našedivěle neb žlutavě bílá hmota, bohatá zrnky, tečkami, prášky a mikrolithy, v níž přehojné, malé, okrouhlé, na více místech zřejmé, šesterečně neb osmerečně omezené dílce se nalézají, jež ponejvíce okrouhlými skupinami zcela malých krystalků augitových nebo sypké hmoty čedičové opatřeny jsou. Hmota tato náleží zajisté leucitu. Poněvadž se tu však i obdélníkové dílce téhož rázu vyskytují, jež modrošedě polarisují, tož není pochybnosti, že část i nefelinu náleží. Namnoze vynikají proužky a skvrny magmatu, vlásky bohatého, nahnědlého, jež se srovnává s oným z vrchu Svinčického a j. m.

Jsou tu však právě jako v čediči Svinčickém i nažloutlé dílce, jež jsouce krystatů prosty a často prozračny, obsahují pouze tenké, podlouhlé mikrolithy. Dílce tyto povstaly nepochybně přeměnou nahnědlé, práškovité hmoty sklovité a zrušením práškových výtvarů podobně jako v čediči u Skalky.

Že tuhnoucí hmota čedičová v skutku proudila, to dosvědčuje průřez olivinu, jenž se ze tří, patrně k sobě náležejících úlomků skládá, jež hmotou čedičovou, v proudu uloženou, odděleny jsou.

### *Čedič od Bezdružic.*

Skoro krystalicky celistvý čedič tento jeví za 400. zvětšení jemnozrnou směs augitu, trojklonného živce a magnetitu, kteráž v našedivěle neb žlutavě-bílé, mikrolithy a zrnky práškovými bohaté (výhradně z leucitu a nefelinu se skládající) skryté základní hmotě rozdělena jest.

Větší krystaly augitové — co špendlíková hlava veliké, slabě nažloutlé, na okraji nahnědlé a pod dichroskopickou lupou bez rozdílu barev — jsou téměř mikrolithů prosty, obsahujíce pouze dílce sklovité s bublinkami a pory plynovými a opatřeny jsouce na okraji hustým věncem magnetitovým.

Bezbarvé tyčinky, jež ve světle polarisovaném nemnohé temné proužky jeví a po více jednotnících srostlé bývají, jsou velmi četné. Mnohé z nich, obsahujíce někdy sporé mikrolithy, dosahují sotva 0·02 mm. šířky, jsou však přes 1 mm. dlouhé; největší jich šíře obnáší 0·06 mm.

Skrytá, základní hmota, mikrolithy a zrnky práškovými bohatá, skládá se ponejvíce z okrouhlých neb mnohostraných, nepolarisujících dílců (se středními kopkami hmoty čedičové), jež, majíce mnohdy tvar šesterců neb osmerců, co průřezy leucitové se vyznačují; dosti zhusta vynikají i méně zřejmě omezené obdélníky, které namodrale šedě polarisujíce, o menším podílu nefelinu v skryté základní hmotě svědčí.

Dosti hojné jsou též asi 2 mm. dlouhé a 0·8 mm. široké tvary augitické, jichž okraj z hustého magnetitového věnce se skládá, vnitro pak tvoří směs augitu, sypkého magnetitu a bezbarvých, širokých dílců trojklonného živce. Některé z těchto útvarů protkány jsou uvnitř pásy magnetovce neb titanového železa tak, že celá temná plocha augitická z husté směsi magnetitu a nemnohého augitu i živce se skládá.

### *Čedič ze Sabenberku u Vitínu*

srovnává se úplně s čedičem ze Želkovic. V slabě nahnědlé, skoro čisté, sklovité hmotě, která, majíc jen něco málo útvarů trichitových a bublinek, skoro převládá, rozkládá se jemnozrná směs podélných, slabě našedivělých krystalů amfibolu, větších nefelinu, jemných, skoro jehlicovitých krystalů živcových a nečetného, stejně roztroušeného magnetitu.

Velikostí vynikají pouze amfibolové a mnohé nefelinové krystaly. Tyto, vždy zakončené řadou tupých jehlanečů, jsou dílem úplně bezbarvé (tu i tam sklovitými dílci opatřené), dílem rovnoběžnými řadami a pásy zrněk práškových označené. Ostře omezené, pravidelné šesterce jejich jsou ponejvíce zcela bezbarvé, a jen některé jeví skupinu mikrolithů amfibolových aneb hmoty čedičové ve střední části.

Na nemnohých místech jsou však přece bezbarvé šesterce neobyčejně hojné, naproti tomu jeví se podélné průřezy nefelinové jen porůznu. Poněvadž i mimo to vyskytují se tu bezbarvé osmerce, podobá se pravdě, že velký díl oněch bezbarvých šesterců leucitu náleží.

Olivin se neobjevil.

### *c) Čediče andesitové a fonolitové, hauynem bohaté.*

#### *Velmi jemnozrný, fonolitu podobný čedič z Košťálu*

skládá se za 400. zvětšení z převládající, bezbarvé, skryté základní hmoty, která, vynikajíc hojnými, krátkými a dlouhými mikrolithy a útvary práškovými, skládá se z nefelinu, leucitu, dosti četných, bezbarvých tyčinek, jednotlivých, větších krystalů augitu, amfibolu a sporých hauynu, pak ze železa titanového, zrněk magnetitových a jich skupin.

Větší, mikroporfyricky vynikající krystaly amfibolu obsahují skupiny dílců sklovitých, zrněk magnetitových a sporých, krátkých, nažloutlých sloupků melilitu. Příčné jich průřezy vynikají krásným slohem miskovitým a hojnými dílci sklovitými i bublinkami plynovými.

Z četných, v základní, skryté hmotě rozšířených, bezbarvých tyčinek jsou mnohé rýhované a v polarisovaném světle mnohými temnými proužky opatřené (živec trojklonný); jiné prozrazují dle pravouhelně uložených, krátkých, sporých mikrolithů význačné, podélné průřezy nefelinu, některé pak modravě polarisující vynikají videm skla a jsouce začasté rozpukány obsahují protáhlé dílce sklovité. A tyto průřezy náležejí nepochybně sanidinu. Vystoupením sanidinu jeví se přechodní tvar k horninám fonolitovým, jimž blíží se čedič tento i skrytým slohem svým.

Nefelin vyniká zřejmě hojnými, bezbarvými obdélníky (jež se uložením mikrolithů vyznačují), šesterci a podobnými, méně pravidelnými, příčnými průřezy, mezi nimiž toliko nepatrné, poprášené osmerce (leucit) pozorovati lze; tudíž náleží mnohem větší díl základní hmoty nefelinu.

Průřezy, jež skrytým slohem svým s hauynem souhlasí, vyskytují se porůznu. Úlomky větších průřezů hauynu mají kalný, temný — z hustě směstnaných, práškových zrněk a temného síťování složený — okraj, jenž do vnitra nahnědle-šedým a světlejším se stává a husté řady černých, okrouhlých a oválních tělísek obsahuje. Vnitro toto zaujímá začasť bezbarvé obdélníky a mnohoúhelníky (vrostlice nefelinové). Menší takovéto výtvoř jeví pravidelné, namodrale šedé, kalné, nehrubě ostře omezené, nažloutle obroubené čtverce, šesterce a osmerce, jež, vyplněny jsou po většině pouze zrnky práškovými, sporými dílci sítí vynikají. Průřezy hauynu jeví v polarisačním světle velmi mnohé, světlé a barvené dílečky, jež od polarisujících vrostlic pocházejí. Malé, nazelenale kalné, úplně vláknité průřezy olivinu vyskytují se velmi porůznu; hojnější jsou malé, hnědé úlomky biotitu a nahnědle žluté skvrny (limonit).

Poměr součástek není všude stejný, jmenovitě andesin jest jen místy hojněji vyvinut, mezi ostatními pak součástkami vyniká hlavně nefelin.

#### *Fonolitu podobný čedič z Veršetína.*

Kusy čedičové, pocházející z Veršetína, svědčí dvěma různým odrůdám čedičovým. Jedna odrůda, našedivěle černá, krystaliticky celistvá, olivinem bohatá, podobá se skrytým slohem svým čediči Kuzovskému a skládá se (za 400. zv.) z velmi jemnozrné směsi nepatrných krystalků augitových s četnými, mikroporfyricky vynikajícími krystaly augitu a olivinu, jednotlivými deskami dialagu, s četným magnetitem a velmi malými, okrouhlými dílci, dlouhými mikrolithy bohatými (leucit?), obsahuje pak nahnědle šedé, kalné, mezi krystaly vtěsnané, skryté základní magma.

Druhá odrůda (která se fonolitu blíží) jest světle našedivělá, velmi jemně krystalická a souhlasí skrytým svým slohem s čedičem Košťalským.

V převládající, skoro bezbarvé neb našedivělé, mikrolithy augitu a živce bohaté, po většině však z nefelinu složené, skryté základní hmotě vyskytují se četné, menší, jedno- a trojklonné tyčinky živcové, průřezy nefelinu a hauynu, krystaly amfibolu, méně hojná zrnka magnetitu (železa titanového) a jich shluky nejstejně rozšířené.

Mikroporfyrické krystaly amfibolu jsou dílem slabě nahnědlé, šedé, dílem žluté; tyto obsahují jen jednotlivé sklovité dílce, zrnka magnetitová a bývají u vnitru svým nazelenale zbarvené; naproti tomu jsou ony vrostlice prosty, ale za to opatřeny širokým, načernale šedým, kalným okrajním pásmem, které, jak se zdá, výhradně z magnetitového prášku se skládá. V jednom krystalu amfibolu vyskytl se příčný šesterečný průřez (nefelin), z jehož jednoho rohu vybíhal sklu podobný, bezbarvý proužek; bezbarvé jehlice, poněvorce s hlavní osou roznoběžně uložené, objevily se mnohokrát co vrostlice.

Bezbarvé, ponejvíce rozpukané průřezy, jeví se v obdélnících a rovnoběžnících a polarisující namodrale a hnědožlutě, náležejí nepochybně sanidinu, jiné pak polysynthetické, bezbarvé tyčinky trojklonnému živci.

Nefelin vyskytá se též v podélných průřezích, jež, podobajíce se oněm ze Slánské hory, řádkami a pásy temných zrn se vyznačují.

Průřezy noseanu, ponejvíce malé a ostře omezené, jsou dosti četné. Největší jich díl v podobě osmerců a šesterců bývá tenkým, skoro bezbarvým pásmem obklíčen a jeví mřížovité síťování, jež ze dvou křížujících směrů tenkých čárek se skládá; mnohé jsou na zdání úplně temné (příčnému průřezu magnetitu a titanového železa podobné) a teprve při silnějším zvětšení rozplývají se v husté síťování. Poněvadž se též nemnohé, červenavě prosvitavé dílce mezi nimi vyskytují, (jakož i v mnohých průřezích noseanových českých hornin fonolithových) tož nelze jinak souditi, než že hmota oněch temných čárek — skládajících se z hustých řádek zrn, prášku, částic sklovitých a bublinek plynových — železem bohatá jest a nepochybně množství prášku magnetitového v sobě uzavírá.

Hojné jsou skupiny rozmanitých krystalů a mikrolithů, jichž omezení často mnohoúhelníku, šesterce neb osmerce se podobá.

Hutnost = 2·810 (urč. 12 gr.).

#### *Fonolitu podobný čedič od Žichova blíže Kozlů.*

Úlomek čediče tohoto, jehož k zhotovení broušených destiček se užilo, uražen jest ze zvětřelého balvanu na silnici nedaleko Žichova.

Broušené destičky ukazují za 400. zv. krystalickou směs převládajícího nefelinu, hauynu, amfibolu, spíše roztroušeného magnetitu a velmi sporého olivinu; tudíž se podobají čediči Košťálskému. Šestercečné a pravoúhelné průřezy nefelinu objevují se tuto v množství velikém, avšak neméně hojné jsou též takové krystaly nefelinu, jež, podobajíce se oněm z hory Slánské, rovnoběžnými řadami zrn práškových — mezi nimiž začasť i bublinky plynové pozorovati lze — vynikají.

Nahnědle žluté, na okraji ponejvíce zrnky magnetitu a sklovitými dílci poseté krystaly amfibolu opatřeny jsou často shluky magnetitovými a omezeny širokou, načernalé šedou obrubou velmi husté směsí krystalické. V jednom větším průřezu amfibolu objevila se též ostře omezená a husté, rovnoběžně rýhovaná deska dialagu co vrostlice.

Hauynu náležejí velmi četné, nahnědle žluté, šestercům i osmercům podobné dílce, v nichž ještě v sítích uložené řádky načervenalé hnědých zrn práškových (sklovitých dílců) pozorovati lze, a jež přeměněnému noseanu českých fonolitů v mnohém se podobají.

Spíše vyskytují se též bezbarvé, malé krystalky, jež, srovnávajíce se s oněmi čediči Dubického, nepochybně dílem andesinu, dílem orthoklasu náležejí.

*Fonolitu podobný čedič z Husí hory u Skorotice*

podobá se skrytým svým slohem čediči z Veršetínu. Neobyčejně četné, menší i větší průřezy hauynu jsou dílem úplně temné s šedivým, práškovitým okrajem, dílem pouze na ostrém kraji temné a uvnitř světlé a začasťe vrostlicemi augitu a nefelinu opatřené. Ve velmi mnohých pozorovati lze hrubší tvary síťovité.

Poněkud různé jsou okrouhlé výtvoř, v nichž shluky magnetitu a augitu se nalézají a jež s podobnými výtvoř z Dubic, Libšic a j. m. souhlasí. Jelikož však i výtvoř tyto po větším díle šedým, práškovitým okrajem opatřeny jsou a pouze v takovýchto horninách čedičových se vyskytují, považují je za hauyn.

Skrytá základní hmota čediče tohoto skládá se z bezbarvé, v polarisovaném světle temné hmoty, v kteréž vězí velmi jemnozrná směs augitu (amfibolu), magnetitu, nefelinu a četných bezbarvých tyčinek, jež po většině po dvou jednotnicích složkovitě srostlé jsou, v polarisovaném světle různé barvy jeví (sanidin).

Řádkami zrněk práškových význačné průřezy nefelinové jsou ojedinělé.

*Andesitu podobný čedič od Chlumu blíž Děčína*

podobá se čediči od Valče, jest však jemněji zrnitý (skoro mikrolithický) a obsahuje krásné krystaly hauynu v neobyčejném množství.

Jen jednotlivé jehlice živcové a amfibolové zřítí lze v broušených destičkách již pouhým okem. Podélné průřezy živce, místy dosti hojné, jsou ponejvíce trojklonné a vynikají zřetelným složkovým ryhováním; mnohé z nich a to sice širší a větší jsou rozpukané, bez ryhování, srovnávajíce se se sanidinem fonolitů. Ony bývají po 2 jednotnicích složkovitě srostlé a jeví začasťe toliko na protějšcích koncích polovin z podélných průřezů zřejmé, v polarisovaném světle velmi krásné ryhování, jakoby dva jednotníci o 180° otočení a srostli byli. Ozdobnými čárkovitými sítěmi vynikají menší a větší průřezy hauynu. Bývají zcela bezbarvé a toliko na okraji malými úlomky sítě opatřené. Práškovitý bezbarvý nefelin, v krátkých obdélnících a pravidelným uložením jehlic mikrolithových vyznačený, vyskytuje se dosti častě; ještě hojněji objevují se na některých místech menší a větší průřezy leucitové, jichž mikrolithové vrostlice na okraji soustředně, ve středu pak porůznu uloženy bývají a s nimiž ony průřezů leucitových ve fonolitech úplně souhlasí. Průřezy amfibolové objímá věneček zrněk magnetitových a hustá směs jemných mikrolithů.

*Deskovitý čedič od Horních Oslů blíž Ploškovice*

podobá se čediči z Veršetína a vyniká neobyčejným množstvím krystalů hauynových. Práškovité krystaly nefelinu jsou dosti četné. Průřezy amfibolu podobají se oněm fonolitů; objevují se tu však i veliké průřezy augitu s nepravidelně uloženými vrostlicemi větších, bezbarvých i práškovitých, krátkých krystalů nefelinu.

Co vzácnost vyskytují se tvary amfibolu, jichž hmota z rovnoběžně uložených zrněk magnetitu, železa titanového a hojného (též práškovitého) nefelinu se skládá.

Skrytá základní hmota oplývá mikrolithy a našedivělými výtvary práškovými, jež kolem větších krystalů skoro všude v krásných proudech uloženy jsou. Mezi mikrolithy převládají tenké, bezbarvé tyčinky, jež, po více jednotačích srostlé, trojklonnému živci náležejí a čediči andesitový ráz propůjčují.

### *Čedič z Palmové hory u Douby*

obsahuje velmi četná, malá zrnka hauynu, jež po většině našedivěle kalným okrajem opatřena jsou a, ač velmi husté a četné, přec však zřejmé síť jeví. Ostatně srovnává se s čedičem od Chlumu (blíže Děčína).

### *Čedič z Fialkové hory u Housky*

srovnává se v skrytém slohu svém s čedičem od Chlumu u Děčína. Při 400. zvětšení jeví nesmírné množství nepochybných krystalků hauynových, jež, po větším díle temné a namodralé černé aneb slabě prosvitné, hustými sítěmi vynikají a nepochybně tenkou, bezbarvou, aneb slabě co amethyst modrou, na některých místech co citron žlutou, ostrohranou obrubou opatřeny jsou. Větší průřezy hauynu jsou i na okraji temné, ve středu pak obsahují význačnou hustou, černomodrou síť. Celkem vykazují broušené destičky tohoto čediče stejnou krystalickou směs leucitu a nefelinu, augitu a magnetitu. Zdá se, že průřezy leucitu v největším množství zastoupeny jsou, jelikož největší díl skryté základní hmoty v polarisovaném světle zcela temným zůstává; obrysy jejich vynikají však slabě, poněvadž krystalovými mikrolithy všude protkány bývají, čímž se soustřední sloh zatemňuje; celé uložení sousedních krystalů poukazuje skoro všude na okrouhlé průřezy. Tolikéž nefelin rozšířen jest dosti četně a průřezy jeho vyznačují se pravidelným uložením nepochybných mikrolithů, jehliček a četného prášku.

Krystaly trojklonného živce jsou nehrubě četné a vynikají pouze místy, ale vždy v souvislých, pruhových skupinách. Co citron (nebo nahnědle) žluté skvrny, jichž obrysy pouze na několika málo místech přímočarými se jeví, jsou nepochybně přeměněné průřezy olivinu.

### *Čedič z Vinné hory u Mšena.*

Mikroskopické součásti čediče tohoto, jsouce za 400. zvětšení mikrolithům podobny, skládají se z augitu, magnetitu, velmi jemných tyčinek trojklonného živce, nepochybných, sporých krystalků hauynu a z bezbarvé hmoty, v níž ony krystalky augitu v podobě obdélníků, čtverců a do kruhu uloženy jsou. Namnoze prozrazuje uložení mikrolithů, že bezbarvá hmota dílem leucitu, dílem nefelinu náleží.

Průřezy jejich, začasť polygonálními a obdélníkovými, bezbarvými pásmy

okrajními význačné, obsahují hojnost mikrolithů, jež, ubírajíce se ponejvíce směrem hlavního proudu mikrolitické směsi krystalové, překážejí tomu, že průřezy leucitové a nefelinové zřejmě vyniknouti nemohou; vzdor tomu jsou některé z nich skoro bezbarvé, obsahující pouze v střední části kopky hmoty čedičové. Malé průřezy nefelinu vynikají uložením mikrolithů.

Větší osamělé a méně četné krystaly amfibolu, s nimiž se často úplně srostlé aneb do nich vrostlé úlomky augitu vyskytují, uzavírají hustěji nakupenou hmotu čedičovou v podobě oka aneb proudu. Jako v čedičích, tomuto podobných, objevují se i zde okrouhlé, ovalní neb páskovité konkrce husté, nazelenale-šedé směsi mikrolitové, která tu a tam hojná, bezbarvá, obdélníkovitá a nepravidelná místa jeví, místy kalným magmatem proniknuta jest a po většině z nepravidelně, začasté buňkovitě vytvořeného augitu aneb amfibolu, po menším pak díle z neurčitě omezeného leucitu a nefelinu se skládá. Dílce tyto nejsou zajisté nic jiného, nežli rychle utuhlá a tudíž neúplně krystalovaná hmota, kolem níž sousední, zřejmě krystalické součástky směsi čedičové právě tak hustě se nahromadily, jako kolem mikroporfyricky vynikajících krystalů amfibolu. Nemnohé z těchto konkrceí rovnají se husté směsi mikrolithové čili hmotě sklovité, na polo krystalické. Proč právě dílce tyto ze stejného čedičového magmatu dříve se byly vyloučily, k tomu poukazuje nedůstatek magnetovce v konkrceích a vyloučení se téhož v pásnu okrajním. Patrně stalo se magma, vyloučivši podíly železa, velmi kyselým a pozbyvši za touže příčinou rozpustnosti, vyloučilo se rychle v podobě na polo krystalovaných konkrceí.

## V. Čediče trachytové.

Čediče trachytové jsou dílem porfyrické, vynikající zrnky živcovými a augitovými, dílem jemnozrné, anamesitické, nažloutle neb nahnědlé šedé, na omak drsné a snáze rozložitelné odrůdy čedičové, jež v tak zvaných trachytických fonolitech, ale též v čedičích ponejvíce na způsob žil vystupují. Základní jich hmota jeví se při 400. zvětšení buď co krystalická směs převládajícího, bezbarvého nefelinu, hrotovitých (skoro v rovnoběžných rovinách nepravidelně uložených) nahnědlých jehlic amfibolu, méně četných, avšak stejně rozdělených zrněk magnetitu a začasté něco málo leucitu aneb více méně trojklonného živce, aneb základní hmota vykazuje za onoho zvětšení více méně převládající, zrnitě kalnou a nažloutle šedou, na zdání úplně stejnorodou hmotu, v níž se hojnost hrotovitých, nahnědlých, nepravidelně uložených krystalů amfibolu a úlomků biotitových, méně četných, stejně rozdělených zrněk magnetitu a bezbarvých, dlouhých, širokých, více méně přeměněných tyčinek nefelinu a trojklonného živce vyskytuje, aneb vyniká konečně v základní hmotě místo zrnitě kalné, nažloutle-šedé, na zdání úplně stejnorodé hmoty podobné množství noseanu. A právě tento, začasté ve více stupních přeměny hojně se objevující nosean jest patrným důkazem o původu oné zrnitě-kalné, stejnorodé hmoty, an ji určuje co hmotu poslední své přeměny.

Ze zmíněných součástí převládá buď nosean buď nefelin aneb trojklonný



živce; jsou však i také odrůdy čediče trachytového, v nichž pouze jedna z oněch živcových součástí vyvinuta jest.

Hutnost = 2·682—2·718 (dle 2. určení).

Čediče trachytové mohou se rozdělit dle živcových součástí v ony s převládajícím

- a) živcem
- b) nefelinem a
- c) noseanem.

#### a) Živcem bohaté čediče trachytové.

##### *Trachytový čedič od Dubkovic,*

v jehož broušených destičkách shluky zrněk magnetitu, jednotlivé průřezy augitu a velmi četné, bezbarvé jehlice a zrna trojklonného živce pouhým již okem zřejmě jsou, vykazuje za 400. zvětšení převládající, hnědošedými zrnky práškovými skalenou, skrytou základní hmotu, která našedivěle polarisuje a nepochybně přeměněnému noseanu náleží. V ní vězí velmi četné, více méně kalné, trojklonné, rovnoběžně srostlé krystaly živcové a nahnědle-žluté jehlice amfibolové, pak menší úlomky biotitu a méně hojná zrnka magnetitu.

Větší, porfyricky se jevící krystaly živcové, někdy i 2 mm. d. a 0·4 mm. š., skládají se obyčejně ze 4—5 složkovitě srostlých jednotníků, jež dosti zřejmě bývají rýhovány a, jsouce buď kalny buď úplně čisty a prosvitavy, v polarisovaném světle střídavě, světlé a temně modrošedé pruhy jeví.

##### *Čedič trachytový mezi Dubkovicemi a Rostoky*

podobá se čediči od Neštědic, jest však více přeměněn. Patrně trojklonné, polysynthetické krystaly živcové jsou méně četné, hojnější jsou tenké krystaly nefelinu s příčnými průřezy šesterečnými. Žlutavě kalná, práškovitá, skrytá základní hmota (která přeměnou noseanu povstala) jest velmi rozšířena.

##### *Trachytový čedič z údolí Prosečné*

srovnává se s čedičem od Neštědic, obsahuje však četnější a větší trojklonné živce a též dosti hojný nefelin.

##### *V trachytovém čediči mezi Povrly a Rostoky,*

který se tolikéž čediči od Neštědic podobá, jest skrytá základní hmota téhož rázu jako v tomto; hrotovité krystaly amfibolu a menší zrnka magnetitu jsou zde právě tak stejně rozšířena, ale spořeji objevují se shluky magnetitové.

Větší, porfyrické, živcům podobné dílce jsou velmi rozpukané, místy poprášené, kalné a obsahují dosti zhusta jemné, paprskovité výtvořky zeolitové. Vedle nich vynikají dosti četné, bezbarvé neb šedo-bílé, ostré, příčné průřezy šesterečné

a k těmto náležející, málo práškovité, podélné průřezy (obyčejně tupým jehlancem zakončené), jež i v průřezích augitových (zvláště na okraji) zarostlé jsou a vzhledem k rozloženým sousedním součástem, zvláště součástí živcové toliko apatitu přičísti se mohou.

Hutnost tohoto čediče = 2.718 (urč. 7 gr.)

### *Trachytový čedič od Rostok*

podobá se dílem onomu z Neštědic, dílem čediči andesitovému od Střížovic. V skryté základní hmotě, která — obsahující neobyčejné množství mikrolithů a výtvarů práškových — ponejvíce světle šedě polarisuje, vyskytují se dlouhé, poněkud kalné, obyčejně po dvou, někdy i po 5—6 jednotlivých složkovitě srostlé, ponejvíce rýhovaním význačné, trojklonné krystaly živcové, jež v polarisovaném světle velmi četné, střídavé, světle a temně modrošedé proužky jeví a šikmými trhlinami protkány bývají. Krátké a široké, rozpukané dílce, jež se vedle oněch spore vyskytují, náležejí, jak se zdá, sanidinu. Dosti hojné, úplně bezbarvé šesterce a nehrubě dlouhé sloupky čítám k apatitu, poněvadž jsouce neporušené a vynikající jasné vedle silně přeměněných krystalů živcových, nefelinu patřiti nemohou. Rozložená, zrnitá, skrytá základní hmota skládá se hlavně z přeměněného noseanu.

Velké, porfyrické krystaly augitu jsou sporé, za to vyskytují se malé úlomky biotitu dosti hojně.

### *Trachytový čedič mezi Spansdorfem a Blankensteinem*

blíží se poněkud čediči od Neštědic, avšak skrytá jeho základní hmota netvoří žádných, krystalů prostých, samostatných dílců. V této hmotě, která, v polarisovaném světle jeví se buď temnošedou buď zcela temnou, dlouhými, nazele-nale žlutými a bezbarvými mikrolithy, velmi jemnými, jehlicovitými, klínovitými, přímnými i křivými, černými výtvary trichitovými (jež nepochybně železu titanovému náležejí) a rozmanitými prášky neobyčejně jest bohata, vyniká sypká, krystalická směs šedomodře polarisujících, výtvary práškovými zkalených průřezů nefelinu a hojných skoro bezbarvých, neb jemnými proužky sklovitými zkalených krystalů trojklonného živce s hrotovitými, nahnědlými jehlicemi amábolu, malými úlomky biotitu a dosti hojnými, ponejvíce nahnědle obroubenými zrnky magnetitu. Krystaly trojklonného živce, jež v polarisovaném světle četnými, temnými proužky se vyznačují, bývají po dvou jednotlivých na způsob složek srostlé. Porfyricky vynikají hnědé neb fialově hnědé průřezy krystalů augitických, jež mnohé pory plynové a bezbarvé mikrolithy uzavírají. Malé, sporé a bezbarvé, tenké, podélné a šesteréčné průřezy náležejí nepochybně apatitu. Co vzácnost vyskytla se v jedné broušené destičce dvě přeměněná zrna olivinu.

*Velmi jemnozrný, černošedý čedič od Radoušova u Úštěku,*

jehož se co stavebního kamene užívá, vykazuje, pouhým okem pozorován, hojná, černá, silně lesklá zrnka augitová a pod lupou bílé neb bezbarvé dílce.

Užij-li se drobnohledu, tu vyniká ze stejnorodého, přeměněného, poněkud práškovitě kalného magmatu trojklonný živec co převládající součást. Tento zaujímá téměř dvě třetiny veškeré hmoty čedičové, naproti tomu jest však mikroskopický augit pouze v jednotlivých krystalech spoře rozšířen; tolikéž velmi sypce rozdělena jsou větší a menší zrnka magnetitová. Mimo to objevují se v skryté základní hmotě četné, malé, nahnědlé neb žlutavě červené úlomky šestercečné, jež nepochybně haematitu náležejí a něco málo nahnědlých jehlic, které amfibolu patří. Šesterce apatitové i podélné průřezy jejich vyskytují se dosti hojně. Ona část destičky, jež náleží skryté základní hmotě, jeví se v polarisovaném světle temnou, krystaly pak živcové, jež po více jednotlivých složkovitě srostlé bývají, ukazují našedivěle modré a bílé odstíny barev a toliko sporé, střídavě světlé a temné (našedivěle modré) proužky, jež, sahající jen asi do třetiny podélných průřezů, na koncích co klíny vynikají. Zdá se tudíž, že z průřezů živcových mnohé jsou jednoklonné.

*Trachytový čedič z Rosensteinu*

podobá se čediči od Neštědic. V broušených destičkách vynikají již na pohled 3—4 mm. dlouhé, hnědé krystaly augitu a hojně, 1—3 mm. dlouhé, trojklonné krystaly živcové.

Za 400. zvětšení vyniká krystalicky celistvá hmota čedičová co různá směs, skládající se z dlouhých, hrotovitých jehlic amfibolu, jednotlivých tyčinek živce, méně četných, stejně rozdělených zrněk magnetitu a ze shluků velmi jemných jehlicovitých mikrolithů amfibolových, jimiž bezbarvá, stejnorodá, skrytá základní hmota na polo krystalovanou se stává.

Tyčinky živcové jsou vesměs trojklonné, poněkud zřejmě rýhované a vynikají v polarisovaném světle pestře barevnými proužky. Nemnohé z nich jsou i úplně bezbarvé; největší jich část (zvláště ony větší krystaly) opatřena jest četnými vrostlicemi hmoty čedičové.

Z *Hutberku* bez bližšího udání naleziště nalézá se ve sbírkách Českého Musea kus, z něhož se broušená destička zhotovila.

Skoumáním objevil se trachytový čedič, podobný čediči od Neštědic, jenž obsahuje hojně, velké tyčinky trojklonného i, jak se zdá, jednoklonného živce. Průřezy augitové tohoto čediče jsou velmi bohaté vrostlicemi bezbarvých šesterců a krátkých, širokých, podélných průřezů, jež nepochybně nefelinu náležejí.

Skrytá základní hmota, na zdání jednotvarná, obsahuje nepochybně nefelin a místy hojně, dlouhé, tenké mikrolithy. V ní rozděleny jsou též dosti četné úlomky biotitu (snad i haematitu).

## b) Trachytové čediče, bohaté nefelinem (leucitem).

*Čedičová žila v trachytovém fonolitu mezi Povrly a Veselím.*

Skrytý sloh čediče tohoto (srovnává se poněkud s oným čedičem od Neštědic) jeví za 400. zvětšení zrnitě kalnou, nahnědle žlutou a v polarisovaném světle temnou, skrytou základní hmotu, jež místy převládá a v níž skoro stejnou měrou rozšířena jest sypká směs dlouhých bezbarvých (nefelinových) a podobných, avšak nástinem do hněda opatřených, nehrubě četných, tyčinkovitých průřezů (živec), hrotovitých krystalů amfibolu a širokých, porfyricky se jevících krystalů augitu, hojných úlomků biotitu a spoře rozděleného magnetitu.

Dlouhé, úplně bezbarvé krystaly, jež množstvím svým namnoze převládají, zakončeny bývají jedním neb i více tupými jehlanci a spodovou plochou; polarisují nahnědle šedě a průřezy jejich jsou více méně pravidelné šesterce, jichž rohy všude druhotným hranolem otupeny jsou.

Podobné, skoro bezbarvé, obdélníkové krystaly, jež nejsou jako předešlé zakončeny, nástinem do hnědožluta od prvních úplně bezbarvých (aneb méně do hněda zbarvených) poněkud se liší, bývají po dvou, někdy i po více (5—7) jednotlivých (jež pouze tenkými proužky sklovitými odděleny jsou) na způsob složek srostlé, polarisují namodralé bíle a slabě nahnědle žlutě, jeví však, jelikož všude skoro přeměněny jsou, slabé neb žádné temné proužky.

Rýhované, načervenalé hnědé, na okraji ponejvíce laločnaté úlomky krystalické a desky náležejí biotitu. Krystaly pak světlejší, nahnědlé, jichž šestercečné průřezy rovnoběžně s hranolovými hranami rozpukány bývají, připočísti sluší amfibolu.

V průřezích biotitových i amfibolových bývají četné krystaly nefelinu uzavřené.

V jednom průřezu amfibolovém vyskytla se dialagu podobná, velmi jemně rýhovaná deska co vrostlice.

Spoře rozšířená zrnka magnetitu (titanového železa) jeví se ponejvíce v šestercích.

K úplnému vyznačení této odrůdy čedičové ještě vytknouti lze zvláštní, nezřejmě čtvercové neb mnohostrané (ponejvíce šestistrané) žlutavě šedé, kalné průřezy, jež (jsouce ve zvětralých fonolitech velmi hojné) skládají se z kalných, ponejvíce do tří směrů běžících vláken a svazečků paprskovitých, kteréž se co embryonální výtvořky zeolitové prozrazují. Takové průřezy z fonolitů a mnohých čedičů trachytových (zvláště onoho od Malého Března a z Kunětické hory u Pardubic) sledovati lze po stupních proměn až do patrných průřezů noseanu; v tomto čediči scházejí však určitější známky.

Této hornině čedičové podobá se

*čedič od Neštědic,*

jest však jemnější zrnitý a nefelinem (nepochybně i leucitem) bohatší, tak že jím se naznačuje přechodní ráz k fonolitovému čediči od Želkovic.

Trachytový čedič od Neštědic má hutnost = 2.682 (urč. 2 gr.)

*Velmi jemnozrný čedič z Dubin od Libchavy horní nedaleko České Lípy*

podobá se onomu od Neštědic, obsahuje však hojně, šedobílé průřezy olivinu. Našedivěle žlutá, kalná, skrytá základní hmota jeho jest obyčejně bohata tenkými jehlicovitými mikrolithy a výtvoří práškovými a jeví se v polarisovaném světle temnou aneb slabě našedivěle prosvitavou; zároveň dosti četně zastoupena jest bezbarvá, avšak již porušená součást příčných, šesterečných a dlouhých pravoúhelných, začasť na příc rozštěpených průřezů, jež nepochybně nefelinu náležejí. Mnohé neurčitě omezené, bezbarvé, rozpukané dílce, jsou bezpochyby sanidin. Vedle těch vyniká hojnost dlouhých, rýhovaných, nahnědlých krystalů amfibolových, temnohnědých úlomků biotitu a poněkud větších, mikroporfyricky se jevících průřezů augitových. Magnetit a titanové železo (převahou tvaru šesterečného) jsou méně četny, ale stejně rozděleny. Zvláštním objevem jsou tuto i nazelenalé, kalné, vláknité, aneb slabě zeleně bílé průřezy, jež, dosti hojně se vyskytnouce, pouhým již okem co nazelenalá zrníčka se jeví a snad olivinu náležejí. Obsahují vždy množství černých, krátce jehlicovitých, přímých a křivých trichitů (titanového železa?) a hrají v polarisovaném světle (pro svou vláknitost) nejkrásnějšími barvami.

Ve větších, bezbarvých, pravoúhelných dílcích prozrazuje paprskovitá, jemně vláknitá směs zeolitickou přeměnu nefelinu. Že ony dílce v skutku přeměnou nefelinu povstaly, tomu nasvědčují téměř bezbarvé, široké, ostré obdélníky a pravidelné šesterce, v nichž za obyčejného světla pouze nemnohá, jemná, slabě nazelenalé žlutá vlákna s podélnou puklinou ve středu pozorovati lze, jež však v polarisovaném světle pestrou vláknitost jeví, která celý průřez zaujímá. — Na nejtenších místech tohoto čediče vyniká proudovitý sloh mikrolithů, okolo větších průřezů uložených.

*Skoro krystalický celistvý, trachytový čedič od Prachomet (Westhof)*

srovnává se rázem skryté základní hmoty s oným od Neštědic. Temně polarisující, nažloutle kalná, práškovitá, skrytá základní hmota převládá; v ní téměř stejně rozděleny jsou četné krystaly augitu, amfibolu a biotitu a neméně četná zrnka magnetitová.

Dosti hojně jsou dlouhé, bezbarvé, modravě polarisující krystaly a jehlice se šesterečnými příčnými průřezy, z nichž ony nepochybně nefelinu, tyto pak apatitu náležejí. Tyž objevují se též co vrostlice v průřezích augitových.

Živci náležejí pak nemnohé, místy kalné průřezy.

*Čedič z Horké u Bakova*

skládá se z práškovitě zrnité, skryté základní hmoty, již proniká jemnozrná směs převládajícího nefelinu, jednotlivých, méně četných mikro-porfyrických krystalů augitu a práškovitého magnetitu. Jehlicovité krystalky apatitu jsou velmi četné.

Namnoze vyvinuty jsou i skupiny kostrovitých a trichitům podobných výtvořů. Mikroskopickým vzhledem svým podobá se hornina tato čedičům trachytovým.

### *Trachytový čedič od Těchlovic*

naproti údolí Prosečné vyniká co žíla,  $1\frac{1}{2}$ —3' široká, která při stavbě dráhy zdělí asi 50 kroků směrem J—S v krystalicky celistvém, černošedém čediči se objevila.

Trachytový čedič tento jest temně šedý, jemnozrné základní hmoty, vyloučením velmi četných, deskovitých krystalů augitu, místy i našedivěle bílými, kalnými krystaly živce porfyrický a jako veškeré trachytové dolerity drůsnami analcinu bohatý. Základní jeho hmota skládá se z nažloutle šedé, zrnitě práškovité, v polarisovaném světle temnošedé hmoty, v níž ony pro čediče trachytové význačné, nahnědlé jehlice amfibolu, jednotlivé bezbarvé neb nažloutlé tyčinky a nečetný magnetit skoro stejně rozděleny jsou. Bezbarvé neb nažloutle bílé podélné průřezy, jež ponejvíce z mnoha jednotníků složkovitě srostlé jsou, avšak na příč pestré polarisují, často též soustředně paprskovitým, barevným třpytem počátek tvoření se zeolitů prozrazují, náležejí bezpochyby trojklonnému živci. Skrytá základní hmota skládá se však na zdání z přeměněného nefelinu a leucitu.

### *c) Čediče trachytové, noseanem bohaté.*

Vynikajícími, velmi četnými jehlicemi amfibolu porfyrický, temnošedý

*čedič ze starého lomu na pravém svahu údolí Malého Března*

tvoří asi  $1\frac{1}{2}$ ' tlusté žíly v trachytovém fonolitu. Mimo velmi hojné jehlice amfibolové vykazuje čedič tento (pod lupou) jednotlivá, co víno žlutá, a našedivěle bílá, slabě prosvitavá zrnka (nosean) a velmi sporé částčky co spyže žlutého kyzu. Základní hmota jeho skládá se z 400. zvětšení z krystalické směsi převládajícího, trojklonného živce s nefelinem, noseanem, méně četným magnetitem, a z kalné, mezi krystaly vtěsnané hmoty. Tolikéž vyskytuje se tuto dosti značné množství průřezů noseanových, jež z hrubší, modrošedým práškem zkalené sítě temných jehlic se skládají a kalnou, našedivěle bílou, práškovitou obrubou opatřeny jsou. Při další proměně mění se modrošedá barva průřezů noseanových do hnědo žluta, síťování se zakalí, rozplývá se poněkud v nepravidelné kopky práškové a průřezné hrany stanou se tak neurčité, že pak tyto přeměněné dílce noseanové úplně se podobají zrnitě práškovité, místy skupinami prášku zkalené, na zdání stejnorodé hmotě.

### *Šedočerná odrůda čediče trachytového z jiných žil čedičových téhož naleziště*

podobá se celkem čediči trachytovému od Prosečné. Krystaly trojklonného živce vynikají dosti četně, velmi málo však porfyricky; spořejší jsou též porůznu uložené jehlice amfibolové. Mezi součástkami směsi převládá zrnitě kalná, nažloutle šedá, v polarisovaném světle temnošedá, skrytá základní hmota, která se jeví po většině co výtvor přeměny průřezů noseanových.

*Trachytový čedič ze žíly asi 1 1/2' široké, v trachytovém fonolitu u mlýna Bachstreicherova*

skládá se za 400. zvětšení výhradně z krystalické směsi přeměněného noseanu s augitem, amfibolem, úlomky biotitu a nestejně rozděleného magnetitu. Jemné trojklonné tyčinky živcové, začasť paprskovitě uložené, vyskytly se pouze na několika málo místech.

*Trachytový čedič z Kunětické hory u Pardubic.*

Velmi jemnozrná, nazelenale šedá hornina tato jeví za 400. zvětšení nestejnou směs, která se skládá z převládající, nažloutlé neb slabě nahnědlé žluté a zrnité kalné (z přeměněného noseanu povstale) skryté základní hmoty, ze shluků nefelinu, nečetného amfibolu a spoře rozděleného, ponejvíce jemnozrného magnetitu; mimo to zastoupen jest tu i apatit v množství poměrně dosti velkém. Velmi hojně, ponejvíce malé, šesterečné, a jak se zdá, též osmerečné, méně zřejmě omezené průřezy, jež sypkým práškem magnetitu a temnými zrnky práškovými vyplněny jsou, jeví se co zřejmé průřezy noseanu. Podélné průřezy nefelinové, vesměs kalné a značně přeměněné, zrnky práškovými a mikrolithy, s hranami rovnoběžně uloženými, opatřené, podobají se oněm z fonolitů; tvoří ponejvíce krátké obdélníky, mající ostrý obvod 0·2—0·5 mm. šíře a až 1·2 mm. délky a skládající větší díl hmoty čedičové; než i dosti zhusta vyskytují se podlouhlé obdélníky, význačné řádkami zrněk práškových, jimiž obrysy se zatemňují. Tytéž pozorovati lze, podobně jako krystaly noseanu, na různých stupních přeměny; i v oněch nažloutlých, kalných, zdánlivě stejnorodých dílcích, v nichž jemné, paprskovitě zeolity již tvořiti se počínají, rozeznávají lze shluky dílem čtverečných (nosean) dílem obdélníkových průřezů (nefelin).

Mimo to vyskytují se též malé, až 0·5 mm. široké, úplně bezbarvé šesterce a obdélníkové průřezy, jež, objevující se velmi hojně, vzhledem k sousedním součástem porušeným pouze apatitu přičísti se mohou.

Větší, až 1·5 mm. dlouhé a asi 0·2 mm. široké průřezy amfibolu objevují se dílem osamotnělé, dílem ve shlucích; průřezy jejich jsou nazelenalé, šedozelelé, silně rozpukané a obsahují hojně vrostlice nefelinu neb apatitu.

Četnější, menší krystaly amfibolu jsou skoro ostrohrané a vynikají barvou temně zelenou; celkem však sůčastňují se jen poskrovnu ve skladbě čediče, zaujímajíce asi 1/3 hmoty čedičové.

Magnetit zajisté zastoupen jest částečně železem titanovým; neboť nejčetněji jeví se černá zrna v podobě průřezů šesterečných a sloupkovitých.

Povaha oné našedivělé, kalné zrnité, skryté základní hmoty dlouho byla mi nejasna, nyní však nemám pochybnosti více, že povstala rozplynutím se velmi četných průřezů noseanových.

V jednom broušeném lístku čediče z Kunětické hory, který nepochybně z čerstvého kusu vzat, panem ředitelem E. Jahnem z Pardubic mně ochotně zaslán byl, objevily se mnohé, kalné, nažloutle šedé dílce co shluky zřejmých šesterců a osmerců; ještě patrnější bylo omezení a slabé vynikání husté síti výtvorů práškových na osamotnělých jednotnicích, mezi nimiž nalezly se též mnohé, které měly

ještě zachovalé jádro, načernale modré, šesterečné neb osmerečné a ze zřejmého síťování temných výtvorů práškových se skládající, tak že o určení oné převládající, skryté, základní hmoty co výtvoru, vzniklého přeměnou průřezů noseanových, nemůže býti žádná pochybnost.

Velmi sporé, z mnohých jednotníků složené, podélné průřezy mohly by též trojklonnému živci náležeti, ale úkazy polarisační tomu nenasvědčují. Tolikéž objevil se při bedlivém prohlížení broušeného lístku rozpukaný lichoběžníkový průřez, který s průřezy sanidinovými z fonolitů se srovnává.

## VI. Čediče tachylytové,

jež v žilách  $\frac{1}{4}$ '—2' širokých (ponejvíce z tlustých, vodorovných sloupků se skládajících) zároveň s čediči trachytovými v nejmladším eruptivním horstvu českém se objevují, rozmanitě se křížující a rozvětřující — bývají na svých stěnách 3"—4" širokými kůrami tachylytu pokryty a skládají se z magmatu, vyloučenými mikrolithy poněkud krystalovaného, v němž malé krystaly augitu a živce po různu mikroporfyricky vystupují. Povlaky tachylytové nejsou od hmoty čediče zřejmě odděleny, nýbrž přecházejí v ní ponaáhlu. Z poměrů stáří jejich lze se domnívati, že v ohledu chemickém čedičům trachytovým se blíží.

### *Čedič tachylytový z $\frac{1}{2}$ ' široké žíly starého lomu v údolí Malého Března*

jeví již na broušených destičkách světlejší a temnější skvrny, z nichž ony (za 400. zvětšení) vyloučením se množství droboulinkých mikrolithů co polokrystalované, tyto pak co trichity a prášky bohaté dílce magmatu se objevují. Nikde se nevy-skytuje magma co úplně beztvarná hmota, nýbrž celá broušená destička okazuje velmi hustou, ale nesterjně rozdělenou směs mikrolithů a trichitů, která mocnými vyloučeninami výtvorů trichitových a práškových na mnohých, i nejtenších místech (broušené destičky) sotva prosvítá. Mezi mikrolithy a výtvary práškovými převládají načernale hnědé a nahnědle černé jehlice, z nichž dvě začasť jednu bezbarvou jehlici uzavírají; ony náležejí nepochybně součásti augitické, tyto pak součásti živcové; mimo to objevují se též dosti četné krátké, co vlasy a vousy zkřívené, černé výtvary trichitové, jež nepochybně magnetitu a titanovému železu náležejí. Magnetit ve velmi malých zrnkách jest spoře a nesterjně rozdělen.

Místy vynikají též světlejší dílce, v nichž krátké obdélníkovité mikrolithy (nefelinu) zřejměji se pozorují.

V celé broušené destičce převládá uložení trichitových a mikrolithových jehlic v podobě čtverců a obdélníků, vynikajíc zvláště v polarisovaném světle za-temněním uzavřených, velmi malých dílců magmatových.



*Celistvý, černohnědý, tachylytový čedič se žíly asi 2' široké, se starého lomu v údolí Malého Března.*

Celistvá tato hornina obsahuje jen sporé krystaly augitové a bezbarvé jehlice, jež porfyricky vynikají. Základní jeho hmota jeví temnošedou, všude stejnou, kalnou, v polarisovaném světle neúplně tmavou, nýbrž šedou hmotu, v níž sporé, větší krystaly augitu, nemnohá, osamotnělá zrnka magnetitu, a četná trojklonná (v polarisovaném světle barevnými proužky význačná) zrnka živce mikroporfyricky vystupují.

Úplně beztvarná, šedivá, práškovitá, skrytá základní hmota jeví již při 400. zvětšení četné, nepatrné mikrolithy, ale teprve za 800. zvětšení vyniká hustá, mikrolithická směs, která v našedivěle kalném, beztvarném magmatu uložena jest.

Porfyricky vynikající průřezy augitové vyznačují se poněkud krásným slohem miskovitým, v jehož pásmech četné pory plynové a tekuté (s podélnými líbelami) a okrouhlé dílce hmoty čedičové uzavřeny jsou; pouze v některých vyskytly se vrostlice nefelinové neb apatitové (s šesterečnými průřezy). Mnohé průřezy augitu ukazují jemné rýhování a v polarisovaném světle pestrobarevné proužky, jaké ukazuje živce trojklonný. Úkaz tento svědčí o tom, že ve větších krystalech augitových četné, uzounké krystaly v podobě lamel směrem obráceným jsou vrostlé; neboť celý průřez skládá se zčásti z tenkých destiček, jež kolmými ukončujícími plochami rovnoběžně uloženy jsouce, v nejpestřejších barvách se střídají.

*O tachylytu od Malého Března.*

Stěny tenkých žil tachylytového čediče, které vystupují na levém svahu v údolí Malého Března, bývají pokryty hnědočernými, asi 3—4''' tlustými korami, jež, vynikající silným skelným leskem a lasturovým lomem, nejsou od čediče ostře odděleny, nýbrž zvolna do něho přecházejí. Kůry tyto jeví se v polarisovaném světle co hmota beztvarná — co tachylyt.

Tachylyt, jenž i v tenkých tříškách je neprůhledný, má tvrdost = 6 a hutnost = 2.65 (urč. 0.854 gr.). Roztápí se snadno na kuličku, ale kyselinou solnou rozkládá se obtížně, vylučuje kyselinu křemičitou v chomáčích.

Broušené destičky jeho, jež pro křehkost svou těžko se dají zhotoviti, jsou pouze na nejtenších místech ke skoumání dosti prosvitné a jeví nahnědle-žlutou, práškovitě prosvitavou, zrnitými a chomáčovitými vyloučeninami zakalenou hmotu, v níž osamotnělá mikrolithy, místy i sporé krystaly augitu a úlomky trojklonného živce porfyricky vynikají.

Přeměnou stává se kalná, sklovitá hmota co oranž neb co citron žlutou, světlejší, čistší a v polarisovaném světle není pak úplně temnou; nejčastěji jsou dílce tyto malé, okrouhlé, a souvisí tenkými pásky mezi sebou.

Mikroporfyrické úlomky augitu a živce srovnávají se úplně s oněmi čediče tachylytového.



## Chemická studia českého čedičového horstva.

Již ke konci předešlého století byl čedič ze Zajícova (Hanšpurku) Klaprothem<sup>1)</sup> chemicky rozebrán.

Rozbor jeho udává v % :

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| kyseliny křemičité   | = | 44.50 |
| kysličníku hlinitého | = | 16.75 |
| „ železitého         | = | 20.00 |
| „ vápenatého         | = | 9.50  |
| „ hořečnatého        | = | 2.25  |
| „ sodnatého          | = | 2.60  |
| vody                 | = | 2.00  |
|                      |   | 97.60 |

Hutnost téhož čediče, Klaprothem určena = 3.065.

Klaprothův rozbor vyložil Hessel<sup>2)</sup> v ten rozum, že čedič Zajícovský (č. Hanšpurkský) může býti položen za směs augitu, magnetitu a labradoru. A výklad Hesslův, podporován na jiných místech pozorováním zřejmých přechodů zjevně krystalického doleritu do skrytě krystalického čediče byl základem onoho ještě před nemnoha lety všeobecného náhledu, že „čedič“ jest horninou labradorovou. Avšak mikroskopický rozbor čediče Hanšpurkského objevuje, že v něm vyskytují se toliko

<sup>1)</sup> A. Reuss, Mineralogie 1801, II., 2., 562. — Ve své mineralogii (II., 2., 133) vypisuje A. Reuss pokusy, jež konány byly o roztupnosti čediče Zajícovského takto: V žáru peci na porcelán, v kelímku uhelném roztopen, tuhne čedič na hmotu zevně celistvou, šedou, většinou zrnky magnetovce hojně posázenou a z části pokožkou co tumpach hnědou pokrytou; táž hmota, na lomu mdlá, zemitá a šedá co světlý popel a na omak velmi drsná, jest — pod lupou pozorována — velmi jemné dirkovitá. Roztopením pozbyla 0.09%, své váhy původní. O změnách čediče, jimiž podléhá v kelímku hliněném za téhož žáru, udává Reuss (Mín. II. 2. 564) takto: v kelímku hliněném uzavřen roztápí se týž čedič vlivem žáru peci na porcelán na černohnědé sklo, jehož tenké úlomky jsou prosvětavé; v tyglíku mastekovém též se roztopil čedič na řídkou tekutinu, díl však téže vnikl do puklin masteku a zbytek vykryštoval se v podobě hnědých, lesklých, na povrchu rýhovaných a buňkovitě složených látek.

<sup>2)</sup> Mineralogisches Taschenbuch 1824. 119.

nepatrné stopy po živci trojklonném a že ona živci podobná součást hlavně z nefelinu a leucitu se skládá.

R. 1829 podnikl Struve<sup>1)</sup>, hledaje stopy původu minerálních vod Českých, chemická zkoumání některých hornin čedičových.

Z jednoho českého čediče (bez bližšího udání naleziště) zkoumána byla hornina čerstvá, pevná, a zároveň v hornině porušené téhož čediče určeny byly žráviny.

Rozbor udal v ‰:

| horniny čerstvé a větráním porušené |         |      |
|-------------------------------------|---------|------|
| kyseliny křemičité                  | = 50·86 | —    |
| kysličníku hlinitého                | = 16·66 | —    |
| „ železnatého                       | = 14·77 | —    |
| „ vápenatého                        | = 8·06  | —    |
| „ hořečnatého                       | = 0·95  | —    |
| „ draselnatého                      | = 1·35  | 2·62 |
| „ sodnatého                         | = 7·35  | 2·31 |

Bez odporu náleží rozbor tento čediči andesitovému, bohatému nefelinem. A v rozboru čediče, porušeného větráním, zasluhuje povšimnutí značný úbytek kysličníku sodnatého a relativné zmnožení kysličníku draselnatého.

Jiné horniny čedičové zkoumány byly tím způsobem, že jemný prášek po celou hodinu míchán byl vodou, jež byla za tlaku 1½ atmosféry kyselinou uhličitou nasycena.

16 uncí louhu tohoto obsahovalo v gránech:

|                                                                              | z čediče<br>Bilinského | z č. Podhorského<br>u Mar. lázní | z čediče<br>„Plattenberku“<br>u Chebu |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| kyseliny křemičité                                                           | 0·385                  | 0·685                            | 0·488                                 |
| kysličníku železnatého a sledy kysličníku<br>hlinitého a kyseliny fosforečné | 0·075                  | —                                | 0·017                                 |
| „ strontnatého                                                               | 0·017                  | —                                | —                                     |
| „ vápenatého                                                                 | 6·547                  | 2·774                            | 1·692                                 |
| „ hořečnatého                                                                | 1·828                  | 2·679                            | 0·869                                 |
| uhličitanu draselnatého                                                      | —                      | —                                | —                                     |
| siranu „                                                                     | 0·353                  | 0·329                            | 0·210                                 |
| chloridu „                                                                   | —                      | —                                | —                                     |
| uhličitanu sodnatého                                                         | 0·911                  | 0·980                            | 0·588                                 |
| siranu „                                                                     | 0·160                  | 0·199                            | 0·400                                 |
| chloridu „                                                                   | 0·109                  | 0·191                            | 0·102                                 |

Novější rozborů českých čedičů vykonaly: Ebelmen, Rammelsberg, Köhler, Jahn a Hoffman.

I. Čedič z Kammerbühlu u Chebu (má zřetelný labrador (?) olivin a augit)  
r) podíl téhož v kyselinách rozpustný = 64·8‰; n) nerozpustný podíl = 35·2;  
c) rozbor celé horniny. Ebelmen<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. 1826. 341.

<sup>1)</sup> Gesteinsanalysen v. J. Roth 1861. p. 47.

II. Čedič z Andělského vrchu u Karlových Varů (má zřetelný augit a olivin <sup>1)</sup> r) v kyselinách rozpustný podíl = 44·00; n) podíl nerozpustný = 56·00; c) rozbor celé horniny. Rammelsberg<sup>2)</sup>).

III. Čedič od Bečova (má četný olivin <sup>3)</sup>); r) v kyselinách rozpustný podíl = 45·65; n) nerozpustný podíl = 54·35; c) rozbor celé horniny. Köhler<sup>4)</sup>

|                      | I.   |      |      | II.   |       |       | III.  |       |       |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | c    | r    | n    | c     | r     | n     | c     | r     | n     |
| Kyseliny křemičité   | 44·4 | 41·8 | 45·5 | 45·73 | 33·74 | 55·16 | 45·06 | 34·16 | 54·22 |
| kysličníku hlinitého | 12·2 | 14·6 | 8·6  | 10·49 | 14·41 | 7·42  | 13·46 | 13·66 | 13·31 |
| „ železitého         | 3·5  | 5·4  | —    | 3·49  | 7·94  | —     | 3·84  | 4·79  | 3·05  |
| „ manganatého        | —    | —    | —    | 0·12  | 0·26  | —     | —     | —     | —     |
| „ vápenatého         | 11·3 | 4·2  | 21·8 | 9·93  | 5·28  | 13·60 | 11·50 | 7·13  | 15·18 |
| „ hořečnatého        | 9·1  | 8·3  | 11·2 | 11·30 | 9·55  | 12·68 | 10·58 | 14·85 | 6·99  |
| „ draselnatého       | 0·8  | 4·7  | —    | 1·43  | 2·77  | 0·36  | 1·21  | 2·66  | —     |
| „ sodnatého          | 2·7  |      | —    | 1·87  | 3·42  | 0·66  | 2·49  | 1·44  | —     |
| vody                 | 4·4  | 6·8  | —    | 3·14  | 6·90  | —     | 1·50  | 3·30  | —     |

Poznamenání: Hnědošedý, bublinatý čedič (láva) z Kammerbühlu jest (dle rozboru mikroskopického) čedič leucitový; nahnědlý, pevný čedič z Andělského vrchu jest čedič andesitový, bohatý v živci trojklonném.

V seznamu chemických prací výskumu Čech (po prof. Hoffmannovi) nalézá se chem. rozbor čediče od Jičína (bez bližšího udání naleziště), jenž udává v %:

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| kyseliny uhličité    | = | 0·90        |
| „ fosforečné         | = | 0·60        |
| „ křemičité          | = | 50·80       |
| kysličníku hlinitého | } | = 36·15     |
| „ železitého         |   |             |
| „ vápenatého         | = | 3·42        |
| „ hořečnatého        | = | 0·82        |
| „ draselnatého       | = | 4·51        |
| „ sodnatého          | = | 1·61        |
|                      |   | <hr/> 98·81 |

<sup>1)</sup> Gesteinsanalysen v. J. Roth 1861 p. 47.

<sup>2)</sup> totéž

<sup>3)</sup> Olivin Karlovarský (I) a

<sup>4)</sup> olivin Bečovský (II) obsahují dle Rammelsberga (Rammelsb. Min. Chem. 438), pak olivin z louky Jizerské (III.) dle Walmstedta (Dana a system of mineralogy 257) v %:

|                        | I.        | II.         | III.            |
|------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| kyseliny křemičité     | = 39·34   | 44·67       | 41·54           |
| kysličníku železnatého | = 14·85   | 10·76       | 8·66            |
| „ hořečnatého          | = 45·81   | 41·84       | 50·04           |
| „ vápenatého           | = —       | 2·35        | kyl. mang. 0·25 |
| „ hlinitého            | = —       | 0·23        | 0·06            |
|                        | <hr/> 100 | <hr/> 99·85 |                 |

## O chemické povaze jednotlivých odrůd čes. čedičového horstva.

Aby se vyznačila chemická povaha jednotlivých odrůd čedičového horstva, vytčených na základě rozborů mikroskopických a poměrů geologických, vykonal jsem chemické rozborů čedičů z 11 různých nalezišť (z Pšanského vrcha u Loun, z Hanšpurku (Zajícova), z Čertové zdi, ze Řipu, ze Slánské hory, z Milého, z Paskapole, od sv. Ivana u Berouna, z vrchu Střížovického, od Dubic, od Veselé) a tři (od Skalky, od Kolozruk a z Košťálu) získal jsem z laboratoře p. prof. Šafaříka. K tomuto účelu užil jsem i chem. rozborů pana řed. J. Jahna (z Kunětické hory, ze žíly Spořilské a z Vlčí hory u Černošína) moha je porovnávat s rozborů mikroskopickými na probách, jež mi pan ředitel Jahn laskavě zaslal.

Ještě před nemnoha lety pokládán byl čedič za skryto-krystalickou směs augitu, labradoru a magnetitu a na tom základě, že v čediči přítomen jest labrador, byly mnohé rozborů chemické vykládány.

Avšak již r. 1825 našel Hoffman<sup>1)</sup> v čediči z Hamberku u Běhny zřejmě krystaly bílého nefelinu a Girard (r. 1841) vyvozuje minerální součásti z chemického rozboru čediče od Wikensteinu v Dolním Slezsku předpokládal přítomnost nefelinu. Když pak pokusy chemickými se ukázalo, že značný díl četných odrůd čediče, v kyselinách se rozpouští, kyselinu křemičitou co rosol vylučuje a v kysličníku sodnatém bohat bývá, stala se důměnka velmi podobnou pravdě, že v četných čedičích nefelin jest podstatnou součástí. A důměnka tato ztvrzena jest mikroskopickými studiemi čediče, jež Zirkel byl konal.

Studie Zirkelovy dokázaly, že v čediči místo živce ujmá často buď nefelin neb leucit neb i hauyn, nosean, melilith. A tyto různé nerostní součásti, živce zastupující, daly již Zirklovi postačitelý podnět k rozřídění čedičových odrůd na živcové, nefelinové a leucitové. Hauyn, nosean a melilith, jež vázány jsou na čediče nefelinové a leucitové, nevystupují ve množství převládajícím, nebyly pojaty v základy hlavního rozvrhu.

Hlavním rozvrhem čedičového horstva na odrůdy živcové, nefelinové a leucitové — jež Zirkel provedl na základě jakosti nerostní, objasniv je četnými příklady mikroskopických rozborů a rozšířiv je podrobnějším rozříděním odrůdy živcové dle rozmanitosti skrytého slohu — byla naznačena různost oněch tří odrůd i v ohledu chemickém.

Další postup mikroskopických a chemických studií čedičového horstva ukázal ku potřebě, by při rozvrhu zřetel se měl nejen k jakosti součástí chemických, nýbrž i k jejich poměrnému množství, k celkovému mikroskopickému vidu, t. j. ku podobnosti, jakou jeví horniny čedičové k horninám příbuzným, k melafyřům, andesitům a fonolitům a pokud možná i ke stáří poměrnému a k způsobu vzniku.

A na těchto základech spočívá na str. 42. podané rozvržení českého čedičového horstva, jež najde zajisté obdoby i v čedičovém horstvu zemí jiných.

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. III. 78. — Zirkel's Petrographie II. 294.

## I. Čediče magmatové.

Čediče magmatové, jsouce směsí augitu, magnetitu a sklovitého magmatu, vykazují v chemických rozbořech 38·7—42·5 %, kyseliny křemičité, 3·6—6·3 %, žíravín a 3—6 % vody.

Množí-li se magma — jehož hmota dle výkladu chemických rozborů směsí nefelinu a anorthitu nejvíce se blíží — přibývá žíravín a ubývá kyseliny křemičité; v tomtéž poměru stává se snazším rozklad kyselinami, jímž se kyselina křemičitá v podobě chomáčů (méně v podobě rozsolu) vylučuje.

Ne méně důležitý vliv na ubývání kyseliny křemičité má přítomnost olivinu, jenž ve skladbě mnohých, tmavých, magmatových čedičů dosti hojně se účastňuje, ve světlých odrůdách však jen spoře se nachází. Světlé čediče magmatové, pokročivše v rozkladu, bývají bohaty v uhličitanech a ve vyloučeninách beztvárné kyseliny křemičité a kysličníku hlinitého, tmavé čediče magmatové mívají i výtvary zeolitické (někdy v podobě kuliček paprskovitého slohu).

### 1. *Temný čedič magmatový od Skalky u Velmíny,*

obsahující místy velmi drobné kuličky paprskovitých zeolitů, pak zrnka vápence a opalovitě kyseliny křemičité.

Hutnost = 2·823.

Chemický rozbor, vykonán v laboratoři p. prof. Šafaříka, udává v %:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| vody                 | = 6·5  |
| kyseliny fosforečné  | = 1·3  |
| „ křemičité          | = 42·5 |
| kysličníku hlinitého | = 12·7 |
| „ železnatého        | = 11·4 |
| „ manganatého        | = 1·3  |
| „ vápenatého         | = 13·1 |
| „ hořečnatého        | = 6·8  |
| žíravín              | = 5·8  |

Poněvadž v čediči tomto mimo augit, magnetit, olivin, apatit, kalcit (neb dolomit) a opalovitou kyselinu křemičitou žádné jiné součásti nerostní není, tož není pochybnosti, že značné podíly žíravín jakož i bezpochyby část kysličníku vápenatého magmatu náležejí; hledíce pak k nevelikému množství kyseliny křemičité, můžeme chemickou skladbu sklovitého magmatu vyložit v ten způsob, že nejvíce se blíží směsi nefelinu a anorthitu.

Větší část vody, již vykazuje rozbor chemický, souhlasí s četnými výtvary zeolitů a jiných nerostů druhotných, jež objevuje drobnohled; větší pak podíly kysličníku vápenatého připouštějí domněnku, že by tímto zeolitickým nerostem mohl býti skořezit.

Tyto pravdě nejpodobnější domněnky položeny jsou za základ rozvrhu poměrů kyslíkových dle jednotlivých nerostních součástí, skládajících čedič magmatový od Skalky.

Poměry kyslíkové jednotlivých chemických součástí a rozdělení jejich dle součástí nerostních :

|                      |        | skolezit | apatit | magma   |          | augit  | olivín | magnetit |
|----------------------|--------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|
|                      |        |          |        | nefelín | anorthit |        |        |          |
| vody                 | 5·777  | 0·722    | —      | —       | —        | —      | —      | —        |
| kyseliny fosforečné  | 0·732  | —        | 0·732  | —       | —        | —      | —      | —        |
| křemičité            | 22·078 | 1·442    | —      | 6·375   | 0·944    | 11·983 | 1·33   | —        |
| kysličníku hlinitého | 5·930  | 0·722    | —      | 4·500   | 0·708    | —      | —      | —        |
| " železnatého        | 2·533  | —        | —      | —       | —        | 1·529  | —      | 1·004    |
| " manganatého        | 0·292  | —        | —      | —       | —        | 0·292  | —      | —        |
| " vápenatého         | 3·742  | 0·240    | 0·486  | —       | 0·236    | 2·780  | —      | —        |
| " hořečnatého        | 2·720  | —        | —      | —       | —        | 1·890  | 1·33   | —        |
| " sodnatého          | 1·500  | —        | —      | 1·500   | —        | —      | —      | —        |

Z toho pak vypočítati lze podíly jednotlivých součástí nerostních :

|                      | sko-<br>lezit | apatit | magma   |          | augit  | olivín | magnetit                               | vody  | úhrn    |
|----------------------|---------------|--------|---------|----------|--------|--------|----------------------------------------|-------|---------|
|                      |               |        | nefelín | anorthit |        |        |                                        |       |         |
| vody                 | 0·812         | —      | —       | —        | —      | —      | —                                      | 5·688 | —       |
| kyseliny fosforečné  | —             | 1·3    | —       | —        | —      | —      | —                                      | —     | —       |
| křemičité            | 2·779         | —      | 12·272  | 1·817    | 23·067 | 2·56   | —                                      | —     | —       |
| kysličníku hlinitého | 1·546         | —      | 9·637   | 1·516    | —      | —      | —                                      | —     | —       |
| " železnatého        | —             | —      | —       | —        | 6·88   | —      | Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> = 4·847 | —     | —       |
| " manganatého        | —             | —      | —       | —        | 1·3    | —      | —                                      | —     | —       |
| " vápenatého         | 0·84          | 1·701  | —       | 0·826    | 9·73   | —      | —                                      | —     | —       |
| " hořečnatého        | —             | —      | —       | —        | 3·475  | 3·325  | —                                      | —     | —       |
| " sodnatého          | —             | —      | 5·812   | —        | —      | —      | —                                      | —     | —       |
|                      | 5·977         | 3·128  | 27·721  | 4·159    | 44·452 | 5·885  | 4·847                                  | —     | 101·857 |

## 2. Temný čedič magmatový ze žíly Spojilské (u Pardubic).

Chemický rozbor čediče tohoto, vykonaný E. Jahnem <sup>1)</sup>, udává v % :

kyseliny křemičité = 38·72  
 kysličníku hlinitého = 14·43  
 " železnatého = 19·20  
 " manganatého = 0·63  
 " vápenatého = 9·72  
 " hořečnatého = 0·94  
 žiravin = 6·30  
 kyseliny fosforečné = 0·76  
 ztráty při pálení = 6·70

Výpočet poměrů kyslíkových zmíněného rozboru a rozdělení jich dle součástí nerostních, jež buď mikroskopickým rozbohem zjištěny aneb dle domněnky přítomny jsou :

|                      |       | apatit | magma   |          | augit | olivín |
|----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|
|                      |       |        | nefelín | anorthit |       |        |
| kyseliny křemičité   | 20·65 | —      | 7·34    | 2·48     | 9·89  | 0·38   |
| kysličníku hlinitého | 6·74  | —      | 4·89    | 1·85     | —     | —      |
| " železnatého        | 5·76  | —      | —       | —        | —     | —      |
| " železnatého        | —     | —      | —       | —        | 2·92  | —      |
| " manganatého        | 0·14  | —      | —       | —        | 0·14  | —      |
| " vápenatého         | 2·78  | 0·28   | —       | 0·62     | 1·88  | —      |
| " hořečnatého        | 0·38  | —      | —       | —        | —     | 0·38   |
| " sodnatého          | 1·63  | —      | 1·63    | —        | —     | —      |
| kyseliny fosforečné  | 0·43  | 0·43   | —       | —        | —     | —      |

<sup>1)</sup> Živa 1859 sv. 4. str. 197.

Z toho pak vycházejí tyto podíly nerostních součástí:

|                                | apatit    | magma   |          | augit | olivin | ma-<br>gnetit | vody | úhrn  |
|--------------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|------|-------|
|                                |           | nefelin | anorthit |       |        |               |      |       |
| kyseliny křemičité . . . . .   | —         | 13·76   | 4·65     | 18·54 | 0·71   | —             | —    |       |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —         | 10·47   | 3·96     | —     | —      | —             | —    |       |
| „ železitého . . . . .         | —         | —       | —        | —     | —      | 6             | —    |       |
| „ železnatého . . . . .        | —         | —       | —        | 13·14 | —      | —             | —    |       |
| „ manganatého . . . . .        | —         | —       | —        | 0·63  | —      | —             | —    |       |
| „ vápenatého . . . . .         | 0·98      | —       | 2·17     | 6·68  | —      | —             | —    |       |
| „ hořečnatého . . . . .        | —         | —       | —        | —     | 0·94   | —             | —    |       |
| žíravin (nepochybně kys. sod.) | —         | 6·8     | —        | —     | —      | —             | —    |       |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 0·71      | —       | —        | —     | —      | —             | —    |       |
|                                | Cl = 0·12 | —       | —        | —     | —      | —             | —    |       |
|                                | 1·86      | 30·53   | 10·78    | 38·89 | 1·65   | 6             | 6·7  | 96·41 |

Dle mikroskopického rozboru vyskytuje se olivin u větším množství (asi 5%), nežli tuto vykazuje rozbor chemický.

### 3) Světlý, magmatový čedič z pahorku Pšanského u Loun.

Prášek čedičový šumí v kyselinách slabě. Chemický rozbor jeho udává v %:

|                        |        |                                            |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|
| vody =                 | 2·918  | (určeno pálením v proudu kyselin uhlíčitě) |
| kyseliny křemičité =   | 41·690 |                                            |
| kysličníku hlinitého = | 23·188 |                                            |
| „ železitého =         | 13·423 |                                            |
| „ vápenatého =         | 8·615  |                                            |
| „ hořečnatého =        | 4·510  |                                            |
| „ sodnatého =          | 3·218  |                                            |
| „ draselnatého =       | 0·450  |                                            |
| kyseliny fosforečné =  | 0·563  |                                            |
| „ uhlíčitě =           | 0·782  |                                            |
|                        | 99·357 |                                            |

V jiné průběh téhož čediče určeno 3·379% vody, 0·566% kyseliny uhlíčitě a 40·952% kyseliny křemičité.

Poměry kyslíkové jednotlivých součástí chem. rozboru a rozdělení jich dle jednotlivých, mikroskopickým skoumáním buď zjištěných aneb dle domněnky přijatých součástí nerostních:

|                                | uhlíkatý<br>vápenatý | apatit | sklov. magma |          | augit | olivin | ma-<br>gnetit | opal a<br>gibbsit |
|--------------------------------|----------------------|--------|--------------|----------|-------|--------|---------------|-------------------|
|                                |                      |        | nefelin      | anorthit |       |        |               |                   |
| vody . . . . .                 | —                    | —      | —            | —        | —     | —      | —             | 2·6               |
| kyseliny křemičité . . . . .   | —                    | —      | 4·09         | 4·8      | 7·76  | 0·63   | —             | 5·15              |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —                    | —      | 2·73         | 3·6      | 1·04  | —      | —             | 3·46              |
| „ železitého . . . . .         | —                    | —      | —            | —        | 1·94  | —      | 2·0           | —                 |
| „ železnatého . . . . .        | —                    | —      | —            | —        | 0·97  | —      | —             | —                 |
| „ vápenatého . . . . .         | 0·28                 | 0·21   | —            | 1 } 1·2  | 0·97  | 0·63   | —             | —                 |
| „ hořečnatého . . . . .        | —                    | —      | —            | 0·2      | —     | —      | —             | —                 |
| „ sodnatého . . . . .          | —                    | —      | —            | —        | —     | —      | —             | —                 |
| „ draselnatého . . . . .       | —                    | —      | —            | —        | —     | —      | —             | —                 |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | —                    | 0·32   | —            | —        | —     | —      | —             | —                 |
| „ uhlíčitě . . . . .           | 0·57                 | —      | —            | —        | —     | —      | —             | —                 |



Výpočet nerostních součástí z poměrů kyslíkových, naznačený v ‰:

|                               | uhlíkatý<br>vápenatý | apatit    | magma   |          | augit | olivín | ma-<br>gnetit | opal a<br>gibbsit | úhrn   |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|-------------------|--------|
|                               |                      |           | nefelin | anorthit |       |        |               |                   |        |
| vody . . . . .                | —                    | —         | —       | —        | —     | —      | —             | 2·9               |        |
| kyseliny křemičité . . . . .  | —                    | —         | 7·67    | 9·00     | 14·55 | 1·18   | —             | 9·65              |        |
| kyslíčnku hlinitého . . . . . | —                    | —         | 5·85    | 7·11     | 2·24  | —      | —             | 7·41              |        |
| „ železitého . . . . .        | —                    | —         | —       | —        | 8·73  | —      | 7·2           | —                 |        |
| „ vápenatého . . . . .        | 0·98                 | 0·738     | —       | 3·5      | 3·39  | —      | —             | —                 |        |
| „ hořečnatého . . . . .       | —                    | —         | —       | 0·5      | 2·42  | 1·57   | —             | —                 |        |
| „ sodnatého . . . . .         | —                    | —         | 3·21    | —        | —     | —      | —             | —                 |        |
| „ draselnatého . . . . .      | —                    | —         | 0·47    | —        | —     | —      | —             | —                 |        |
| kyseliny fosforečné . . . . . | —                    | 0·568     | —       | —        | —     | —      | —             | —                 |        |
| „ uhlíkaté . . . . .          | 0·78                 | Cl = 0·07 | —       | —        | —     | —      | —             | —                 |        |
|                               | 1·76                 | 1·376     | 17·20   | 20·11    | 31·33 | 2·75   | 7·2           | 19·96             | 101·68 |

## II. Čediče nefelinové

(nefelinitoidy, nefelinity a noseanity).

Čediče nefelinové — skládají se z augitu, nefelinu a magnetitu — vykazují ze všech čedičových hornin nejmenší množství kyseliny křemičité, totiž 33·7—41·8‰, naproti tomu obsahují 6·9—9·0‰ žiravin a 0·7—3·2‰ vody.

Čím více přibývá nefelinu, tím více jest žiravin a v tomtéž poměru kyseliny křemičité ubývá. A to stává se u větší míře tehdy, přidruží-li se nefelinu značnější množství noseanu; s tím srovnává se i chemický rozbor čediče nefelinového z Milého vrchu, ze všech českých čedičových hornin noseanem nejbohatšího, udává nejmenší množství kyseliny křemičité (33·7‰) a největší podíl žiravin (9‰).

Čediče nefelinové mají poměrně dosti čerstvé vzezření; v kyselinách šumí slabě aneb docela nic a mimo uhlíkaty (a snad beztvornou kyselinu křemičitou, gibbsit a limonit) nemívají jiných druhotných výtvarů nerostních (zeolitů a j.).

*Nefelinitoid ze Zajícova (č. Hanšpurku).*

Temnošedý prášek čediče \*) tohoto v kyselinách nešumí, pálením bere na se barvu žlutavě šedou.

Chemický rozbor vykonán 2·4405 gr. udává v ‰:

|                       |         |                                         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------|
| kyseliny křemičité =  | 41·794  | } určeno v 1·3365 gr. výpočtem se sčítá |
| kyslíčnku hlinitého = | 26·218  |                                         |
| „ železitého =        | 11·751  |                                         |
| „ vápenatého =        | 8·873   |                                         |
| „ hořečnatého =       | 3·405   |                                         |
| „ draselnatého =      | 1·305   | }                                       |
| „ sodnatého =         | 6·993   |                                         |
| kyseliny fosforečné = | 0·553   |                                         |
| vody =                | 0·754   |                                         |
|                       | 101·646 |                                         |

\*) Klaprothem určena hutnost = 3·066.

Poměry kyslíkové chemických součástí a jich rozdělení dle součástí nerostních, mikroskopickým zkoumáním zjištěných aneb dle domněnky přítomných.

Rozdělení poměrů kyslíkových dle chemických součástí:

| Poměry kyslíkové               | apatit | leucit | nefelin | angit | olivin | zbytek |
|--------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | —      | 3·52   | 7·11    | 9·50  | 0·68   | (1·48) |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 1·32   | 4·74    | 1·31  | —      | (4·87) |
| " železnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 1·73  | —      | —      |
| " vápenatého . . . . .         | 0·206  | —      | —       | 2·34  | —      | —      |
| " hořečnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 0·68  | 0·68   | —      |
| " draselnatého . . . . .       | —      | 0·22   | —       | —     | —      | —      |
| " sodnatého . . . . .          | —      | 0·22   | 1·58    | —     | —      | —      |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 0·31   | 0·31   | —       | —     | —      | —      |

Při tomto rozdělování poměrů kyslíkových přijalo se, že leucit, jsa velmi bohatý v kys. sodnatém, 1 atom kysličníku draselnatého a 1 atom kysličníku sodnatého obsahuje; zbytek kyslíku z kyseliny křemičité pochodí nepochybně odtud, že přítomna jest tu hmota opálová, větší pak zbytek z kysličníku hlinitého od pleonastu, jemuž by část temných, nahnědle prosvitavých zrnek náležeti mohla. Že vskutku leucit českého čedičového horstva velmi bohat jest kysličníkem sodnatým, tož dokazuje též chemický rozbor čediče leucitového z Paskapole.

Procentový výpočet součástí nerostních z poměrů kyslíkových:

|                                | apatit | leucit | nefelin | angit | olivin  | magnetit | zbytek | úhrn   |
|--------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|----------|--------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | —      | 6·6    | 13·31   | 17·81 | 1·28    | —        | 2·78   |        |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 2·83   | 10·15   | 2·8   | —       | —        | 10·43  |        |
| " železnatého . . . . .        | —      | —      | —       | —     | —       | 3        | —      |        |
| " vápenatého . . . . .         | 0·72   | —      | —       | 7·78  | —       | —        | —      |        |
| " hořečnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 8·19  | —       | —        | —      |        |
| " draselnatého . . . . .       | —      | 1·29   | —       | 1·7   | 1·7     | —        | —      |        |
| " sodnatého . . . . .          | —      | 0·85   | 6·12    | —     | —       | —        | —      |        |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 0·55   | —      | —       | —     | —       | —        | —      |        |
| vody . . . . .                 | 0·09   | —      | —       | —     | —       | —        | 0·75   |        |
|                                | 1·36   | 11·57  | 29·58   | 38·28 | 2·98 *) | 3        | 13·96  | 100·73 |

### *Nefelinit z Čertovy zdi u Českého dubu.*

Hutnost tohoto čediče (22 gr. urč.) = 3·095.

Prášek v kyselinách nešumí, rozkládá se však z části kyselinami, vylučuje rosol.

Částečný chemický rozbor čediče z Čertovy zdi z lomu „na břízách“, udal v %:

kyseliny křemičité = 40·76

kysličníku hlinitého = 25·98

" železnatého = 13·11

" vápenatého = 8·97

" hořečnatého = 2·86

kyseliny fosforečné = 0·59

\*) Porovnáme-li mikroskopický a chemický rozbor, jeví se procentové množství olivinu poněkud větší, asi 4—6%.

Chemický rozbor čediče z „Čertovy zdi“ blíže Smržova vykazoval v %:

|                                            |           |                        |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------|
| kyseliny křemičité                         | = 39·36   | (vypočtené co doplněk) |
| kysličníku hlinitého                       | = 20·25   |                        |
| „ železitého                               | } = 16·53 |                        |
| „ (manganitého)                            |           |                        |
| „ vápenatého                               | = 10·21   |                        |
| „ hořečnatého                              | = 5·43    |                        |
| kysličníku sodnatého (a málo draselnatého) | = 6·95    |                        |
| kyseliny fosforečné                        | = 0·47    |                        |
| ztráty při pálení                          | = 0·80    |                        |
|                                            | 100·00    |                        |

Poměry kyslíkové druhého rozboru a rozdělení jejich dle nerostních součástí:

|                      |        | apatit | nefelin | augit | olivin |
|----------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| kyseliny křemičité   | 20·99  | —      | 8·06    | 10·04 | 2·89   |
| kysličníku hlinitého | 9·45   | —      | 5·37    | 2·04  | —      |
| „ železitého         | } 4·96 | —      | —       | —     | —      |
| „ železnatého        |        | —      | —       | 2·27  | 0·72   |
| „ vápenatého         | 2·92   | 0·17   | —       | 2·75  | —      |
| „ hořečnatého        | 2·17   | —      | —       | —     | 2·17   |
| „ sodnatého          | 1·79   | —      | 1·79    | —     | —      |
| kyseliny fosforečné  | 0·26   | 0·26   | —       | —     | —      |

Procentový výpočet nerostních součástí:

|                      | apatit | nefelin | augit | olivin | magnetit | sou-hrnem | zbytek |
|----------------------|--------|---------|-------|--------|----------|-----------|--------|
| kyseliny křemičité   | —      | 15·11   | 18·82 | 5·43   | —        | 39·35     | —      |
| kysličníku hlinitého | —      | 11·50   | 4·37  | —      | —        | 15·87     | 4·38   |
| „ železitého         | —      | —       | —     | —      | 1·74     | 1·74      | —      |
| „ železnatého        | —      | —       | 10·21 | 2·34   | 0·76     | 13·31     | —      |
| „ vápenatého         | 0·59   | —       | 9·62  | —      | —        | 10·21     | —      |
| „ hořečnatého        | —      | —       | —     | 5·42   | —        | 5·42      | —      |
| „ sodnatého          | —      | 6·94    | —     | —      | —        | 6·94      | —      |
| kyseliny fosforečné  | 0·46   | —       | —     | —      | —        | 0·46      | —      |
| ztráty při pálení    | —      | —       | —     | —      | —        | 0·8       | —      |
|                      | 1·06   | 33·55   | 43·02 | 13·18  | 2·5      | 94·10     | 4·38   |

Dle mikroskopického rozboru obnáší množství magnetitu asi 5 %; zbytek kysličníku hlinitého poukazuje snad k přítomnému pleonastu.

*Noseanit z Řipu (u Roudnice).*

Hutnost (určena 38 gr.) = 3·04.

Prášek čediče tohoto v kyselině chlorovodíkové nešumí, ale srosovaví, nechá-li se déle státi.

Chemický rozbor, proveden 2·691 gr., udává v %:

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| kyseliny sírové      | = | 0·667         |
| „ fosforečné         | = | 2·040         |
| „ křemičité          | = | 40·728        |
| kysličníku hlinitého | = | 13·396        |
| „ železitého         | = | 21·657        |
| „ vápenatého         | = | 8·561         |
| „ hořečnatého        | = | 4·334         |
| žiravin              | = | 7·675         |
| ztráty při pálení    | = | 1·274         |
|                      |   | <hr/> 100·287 |

Odečte-li se voda, jest pak ve 100 dílech:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| kyseliny fosforečné  | = | 2·060  |
| „ sírové             | = | 0·674  |
| „ křemičité          | = | 41·134 |
| kysličníku hlinitého | = | 13·529 |
| „ železitého         | = | 21·873 |
| „ vápenatého         | = | 8·601  |
| „ hořečnatého        | = | 4·377  |
| žiravin              | = | 7·752  |

Poměry kyslíkové jednotlivých součástí a jich rozdělení dle nerostů, tento čedič skládajících:

|                                |        | apatit | nosean | nefelin | am-<br>fibol | olivin | ma-<br>gnetit |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------|---------------|
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 1·160  | 1·160  | —      | —       | —            | —      | —             |
| „ sírové . . . . .             | 0·404  | —      | 0·404  | —       | —            | —      | —             |
| „ křemičité . . . . .          | 21·360 | —      | 1·616  | 6·213   | 18·464       | 0·067  | —             |
| kysličníku hlinitého . . . . . | 6·316  | —      | 1·212  | 4·386   | 0·718        | —      | —             |
| „ železnatého . . . . .        | 3·701  | —      | —      | —       | 3·364        | —      | 0·337         |
| „ železitého . . . . .         | 1·011  | —      | —      | —       | —            | —      | 1·011         |
| „ vápenatého . . . . .         | 2·457  | 0·773  | —      | —       | 1·684        | —      | —             |
| „ hořečnatého . . . . .        | 1·751  | —      | —      | —       | 1·684        | 0·067  | —             |
| „ sodnatého . . . . .          | 2·000  | —      | 0·538  | 1·462   | —            | —      | —             |

Při vypočítávání poměrů kyslíkových položeny jsou žiraviny co kysličník sodnatý, ač tu i něco málo draselnatého přítomno jest. Rozdělení kyslíku, náležejícího kysličníku železnatému a železitému odvozeno z výpočtu amfibolu a magnetitu. Pro výpočet noseanu vzalo se za základ množství kyslíku kyseliny sírové, pro nefelin zbytek kyslíku z kysličníku sodnatého. Za zásady amfibolu přijaly se jeden atom kysličníku vápenatého, jeden atom hořečnatého a dva atomy železnatého. Ze zbytku kyslíku kysličníku hořečnatého vypočítáno množství olivinu a ze zbytku železa množství magnetitu. Magma, jež toliko sporé podílů zaujímá, nebylo do výpočtu vzato.

S tímto rozdělením poměrů kyslíkových jednotlivých nerostů souhlasí toto percentové, nerostní složení:

|                                | apatit | nosean | nefelin | amfibol | olivin | magnetit |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| chloru . . . . .               | 0·342  | —      | —       | —       | —      | —        |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 2·060  | —      | —       | —       | —      | —        |
| " sírové . . . . .             | —      | 0·674  | —       | —       | —      | —        |
| " křemičité . . . . .          | —      | 3·111  | 11·960  | 25·918  | 0·129  | —        |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 2·512  | 9·893   | 1·537   | —      | —        |
| " železnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 15·138  | —      | 1·179    |
| " železitého . . . . .         | —      | —      | —       | —       | —      | 3·370    |
| " vápenatého . . . . .         | 2·684  | —      | —       | 5·894   | —      | —        |
| " hořečnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 4·210   | 0·167  | —        |
| " sodnatého . . . . .          | —      | 2·085  | 5·665   | —       | —      | —        |
| úhrnem . . . . .               | 5·086% | 8·382% | 27·018% | 52·697% | 0·296% | 4·549%   |

V okrouhlých číslech skládá se noseanit z Řipu ze 53% amfibolu, 27% nefelinu, 8·5% noseanu, 5% apatitu, 5% magnetitu a 0·5% olivinu.

*Noseanit ze Solné hory u Slaného.*

Hutnost = 3·060 (urč. 4 gr.).

Zeleno-šedý prášek čediče tohoto nabývá pálením barvy žlutavě-šedé; v kyselinách vystupují z něho pouze jednotlivé bublinky kyseliny uhličitě, aniž by šuměl.

Odvážené množství 2·6105 grammů udalo v %:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| kyseliny křemičité = 39·479   |                   |
| kysličníku hlinitého = 19·203 |                   |
| " železitého = 18·616         |                   |
| " vápenatého = 10·478         |                   |
| " hořečnatého = 0·304         |                   |
| " sodnatého = 6·696           | } určeno 1·98 gr. |
| " draselnatého = 0·621        |                   |
| vody = 3·253                  |                   |
| kyseliny fosforečné = 1·859   |                   |
| " sírové = 0·284              |                   |

V jiné průbě téhož čediče nalezeno 1·249 % kyseliny fosforečné.

Odečte-li se voda, udává pak výpočet tato procenta jednotlivých součástí a jich množství kyslíku:

|                                     |  | množství kyslíku |
|-------------------------------------|--|------------------|
| kyseliny fosforečné = 1·906 . . .   |  | 1·073            |
| " sírové = 0·291 . . .              |  | 0·174            |
| " křemičité = 40·474 . . .          |  | 21·025           |
| kysličníku hlinitého = 19·686 . . . |  | 9·191            |
| " železitého = 19·085 . . .         |  | 5·730            |
| " vápenatého = 10·743 . . .         |  | 3·069            |
| " hořečnatého = 0·311 . . .         |  | 0·124            |
| " draselnatého = 0·636 . . .        |  | 0·108            |
| " sodnatého = 6·864 . . .           |  | 1·771            |

Rozdělení poměrů kyslíkových dle nerostů mikroskopickým rozbořem zjištěných :

|                                | apatit | nosean | nefelin | amfibol | olivin |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | —      | 0·696  | 7·43    | 12·70   | 0·186  |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 0·522  | 4·95    | 3·66    | —      |
| „ železitého . . . . .         | —      | —      | —       | —       | —      |
| „ železnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 3·99    | 0·062  |
| „ vápenatého . . . . .         | 0·71   | —      | —       | 2·36    | —      |
| „ hořečnatého . . . . .        | —      | —      | —       | —       | 0·124  |
| „ draselnatého . . . . .       | —      | —      | 0·11    | —       | —      |
| „ sodnatého . . . . .          | —      | 0·232  | 1·54    | —       | —      |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 1·073  | —      | —       | —       | —      |
| „ sírové . . . . .             | —      | 0·174  | —       | —       | —      |

Percentový výpočet nerostních součástí z poměrů kyslíkových :

|                                | apatit | nosean | nefelin | amfibol | olivin | magnetit | souhrn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | —      | 1·34   | 13·93   | 23·81   | 0·85   | —        | 39·43  |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 1·12   | 10·60   | 7·84    | —      | —        | 19·56  |
| „ železitého . . . . .         | —      | —      | —       | —       | —      | 5        | 23·23  |
| „ železnatého . . . . .        | —      | —      | —       | 17·95   | 0·28   |          |        |
| „ vápenatého . . . . .         | 2·48   | —      | —       | 8·26    | —      | —        | 10·74  |
| „ hořečnatého . . . . .        | —      | —      | —       | —       | 0·31   | —        | 0·31   |
| „ draselnatého . . . . .       | —      | —      | 0·64    | —       | —      | —        | 0·64   |
| „ sodnatého . . . . .          | —      | 0·90   | 5·97    | —       | —      | —        | 6·87   |
| kyseliny sírové . . . . .      | —      | 0·29   | —       | —       | —      | —        | 0·29   |
| „ fosforečné . . . . .         | 1·91   | —      | —       | —       | —      | —        | 1·91   |
| chlóru . . . . .               | 0·32   | —      | —       | —       | —      | —        | —      |
|                                | 4·71   | 3·65   | 31·14   | 57·86   | 0·94   | 5%       | 102·98 |

Dle rozboru mikroskopického zdá se, že jest amfibolu o něco méně (asi polovice veškeré hmoty čedičové), noseanu a olivinu o něco více.

#### *Noseanit z Mlého vrchu (u Bělošic).*

Světle-šedý prášek čediče tohoto šumí v kyselinách velmi slabě; pálením stává se světlejším, nabývá barvy žlutavě-šedé.

Odvážené množství 2·28 gr. udalo v % :

|                      |   |                |                  |
|----------------------|---|----------------|------------------|
| kyseliny křemičité   | = | 33·734         |                  |
| kysličníku hlinitého | = | 30·160         |                  |
| „ železitého         | = | 12·062         |                  |
| „ manganatého        | = | stopy          |                  |
| „ vápenatého         | = | 9·188          |                  |
| „ hořečnatého        | = | 4·367          |                  |
| „ draselnatého       | = | 1·611          | určeno 3·514 gr. |
| „ sodnatého          | = | 7·489          |                  |
| kyseliny uhličitě    | = | 0·659          |                  |
| vody                 | = | 3·061          |                  |
|                      |   | <u>102·331</u> |                  |

Mimo to 0·4% kyseliny titaničité a stopy po kyseřině fosforečné.

Množství kyseliny uhličité 0·659% srovnává se s 0·839% kysličnku vápenatého, čínic 1·498 % uhličitanu vápenatého.

Odečte-li se voda a uhličitán vápenatý, udává výpočet tato percenta jednotlivých součástí:

|                                    | Poměry kyslíku |
|------------------------------------|----------------|
| kyseliny křemičité = 34·503 . . .  | 17·923         |
| kysličnku hlinitého = 30·847 . . . | 14·403         |
| " železitého = 12·337 . . .        |                |
| " vápenatého = 8·539 . . .         | 2·439          |
| " hořečnatého = 4·466 . . .        | 1·786          |
| " sodnatého = 7·660 . . .          | 1·977          |
| " draselnatého = 1·648 . . .       | 0·280          |

Dle mikroskopického rozboru skládá se čedič z vrchu Milého z amfibolu, noseanu, nefelinu, olivinu a ze součástí podobné magnetitu. Poněvadž se kyselina sírová neurčila, není základu, na němž by se množství noseanu vypočítalo. V následujícím rozdělení poměrů kyslíkových přijalo se, že žíraviny nefelinu z jednoho atomu kysličnku draselnatého a čtyř atomů sodnatého se skládají, přebytek pak kysličnku sodnatého položil se za základ k výpočtu množství noseanu.

Rozdělení poměrů kyslíkových dle jejich nerostních součástí:

|                               | nefelin | nosean | amfibol | olivin |
|-------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| kyseliny sírové . . . . .     | —       | 0·57   | —       | —      |
| " křemičité . . . . .         | 6·10    | 2·29   | 7·74    | 1·79   |
| kysličnku hlinitého . . . . . | 4·2     | 1·72   | 2·1     | —      |
| " železitého . . . . .        | —       | —      | —       | —      |
| " železnatého . . . . .       | —       | —      | 1·43    | —      |
| " vápenatého . . . . .        | —       | —      | 2·44    | —      |
| " hořečnatého . . . . .       | —       | —      | —       | 1·79   |
| " draselnatého . . . . .      | 0·28    | —      | —       | —      |
| " sodnatého . . . . .         | 1·12    | 0·86   | —       | —      |

Percentový výpočet nerostních součástí:

|                               | nefelin | nosean | amfibol | olivin | magnetit | zbytek | úhrn  |
|-------------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|
| kyseliny sírové . . . . .     | —       | 0·95   | —       | —      | —        |        | 0·95  |
| " křemičité . . . . .         | 11·44   | 4·29   | 14·51   | 3·35   | —        |        | 33·59 |
| kysličnku hlinitého . . . . . | 8·995   | 3·68   | 4·5     | —      | —        | 13·7*) | 30·88 |
| " železitého . . . . .        | —       | —      | —       | —      | 5·72     |        | 12·15 |
| " železnatého . . . . .       | —       | —      | 6·43    | —      | —        |        | 8·54  |
| " vápenatého . . . . .        | —       | —      | 8·54    | —      | —        |        | 4·47  |
| " hořečnatého . . . . .       | —       | —      | —       | 4·47   | —        |        | 1·64  |
| " draselnatého . . . . .      | 1·64    | —      | —       | —      | —        |        | 7·67  |
| " sodnatého . . . . .         | 4·34    | 3·33   | —       | —      | —        |        | 26·41 |
|                               | 26·41   | 12·25  | 33·98   | 7·82   | 5·72     |        | 99·89 |

\*) Značný zbytek kysličnku hlinitého pochází snad z části z vyššího udání kysličnku hlinitého; jest však i pravdě podobno, že poukazuje spíše ku přítomnosti hlinitého nerostu, pleonastu neb hercynitu podobného.

### III. Čediče leucitové.

(Čediče leucitoidové, leucitové a peperinové).

Z leucitofýrů č. čedičů leucitových v užším smyslu — jež tvoří směs augitu leucitu, nefelinu a magnetitu — užilo se k chemickému rozboru jen čediče z Paskapole, jež vyniká v broušené destičce nejkrásnějšími a nejčtenějšími průřezy leucitovými. A tento obsahuje 43% kyseliny křemičité, 5·9% žíraviny a 2·6% vody.

Na první pohled vystupuje v chemickém rozboru množství kysličníku sodnatého (3·7%), jež téměř o třetinu množství kysličníku draselnatého (2·23%) přesahuje, na-proti tomu udává mikroskopický rozbor skoro dvakrát větší množství leucitu co nefelinu; z toho plyne, že hmota leucitová čediče tohoto považovati se musí za velmi bohatou v kysličníku sodnatém. Čediče leucitové obsahují méně olivinu než č. nefelinové, mají však ze všech čedičových hornin největší množství biotitu. To platí výhradně o čedičích peperinových, jež vynikají porfýrickými krystaly augitu a amfibolu, v nichž biotit často se objevuje hmotou svou přeměněn v rubelan neb ve steatit (metasomat. pseudomorphosa).

#### Čedič z Paskapole.

Šedý prášek čediče tohoto v kyselinách nešumí; pálením stává se světlejším a nabývá nástinu do žluta.

Odvážené množství 2·376 gramů vykávalo v %:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| kyseliny křemičité   | = | 43·109 |
| kysličníku hlinitého | = | 27·344 |
| „ železitého         | = | 11·658 |
| „ vápenatého         | = | 7·495  |
| „ hořečnatého        | = | 1·698  |
| „ draselnatého       | = | 2·236  |
| „ sodnatého          | = | 3·711  |
| vody                 | = | 2·628  |

} určeno v 2·784 gr.

Mimo to nalezeno 0·610% kyseliny titaničité a 0·107% kyseliny fosforečné.

Poměry kyslíkové chemických součástí a jich rozdělení dle jednotlivých nerostů, jež tuto horninu čedičovou skládají:

| Poměry kyslíkové               |       | Rozdělení poměrů kyslíkových |        |         |       |        |                    |
|--------------------------------|-------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------------------|
|                                |       | apatit                       | leucit | nefelin | augit | biotit | titanové<br>železo |
| kyseliny křemičité . . . . .   | 22·99 | —                            | 6·08   | 2·6     | 8     | 1·7    | —                  |
| kysličníku hlinitého . . . . . | 12·76 | —                            | 2·28   | 1·73    | 1·4   | 1·02   | —                  |
| „ železitého . . . . .         | 3·497 | —                            | —      | —       | —     | —      | 0·236              |
| „ železnatého . . . . .        |       | —                            | —      | —       | 1·9   | —      | 0·24               |
| „ vápenatého . . . . .         | 2·14  | 0·04                         | —      | —       | 2·1   | —      | —                  |
| „ hořečnatého . . . . .        | 0·68  | —                            | —      | —       | —     | 0·68   | —                  |
| „ draselnatého . . . . .       | 0·381 | —                            | 0·38   | —       | —     | —      | —                  |
| „ sodnatého . . . . .          | 0·958 | —                            | 0·38   | 0·578   | —     | —      | —                  |
| kyseliny fosforečné . . . . .  | 0·06  | 0·06                         | —      | —       | —     | —      | —                  |
| „ titaničité . . . . .         | 0·238 | —                            | —      | —       | —     | —      | 0·238              |
| vody . . . . .                 | —     | —                            | —      | —       | —     | —      | —                  |



Výpočet procentového množství jednotlivých nerostů a jich chemických součástí:

|                          | apatit   | leucit | nefelin | augit | biotit | titanové<br>železo | ma-<br>gnetit | zbytek | úhrn    |
|--------------------------|----------|--------|---------|-------|--------|--------------------|---------------|--------|---------|
| kyseliny křemičité . .   | —        | 11·4   | 4·875   | 15    | 3·2    | —                  | —             | 8·64   | 43·17   |
| kysličníku hlinitého . . | —        | 4·88   | 3·713   | 3     | 2·2    | —                  | —             | 13·5   | 27·3    |
| " železitého . .         | —        | —      | —       | —     | —      | 2·14               | 1             | —      | 11·7    |
| " železnatého . .        | —        | —      | —       | 8·6   | —      | —                  | —             | —      | —       |
| " vápenatého . .         | 0·14     | —      | —       | 7·35  | —      | —                  | —             | —      | 7·49    |
| " hořečnatého . .        | —        | —      | —       | —     | 1·7    | —                  | —             | —      | 1·7     |
| " draselnat. . .         | —        | 2·23   | —       | —     | —      | —                  | —             | —      | 2·23    |
| " sodnatého . .          | —        | 1·47   | 2·24    | —     | —      | —                  | —             | —      | 3·71    |
| kyseliny titaničité . .  | —        | —      | —       | —     | —      | 0·61               | —             | —      | 0·61    |
| " fosforečné . .         | 0·107    | —      | —       | —     | —      | —                  | —             | —      | 0·107   |
| " fosforečné . .         | Cl 0·017 | —      | —       | —     | —      | —                  | —             | —      | —       |
| vody . . . . .           | —        | —      | —       | —     | —      | —                  | —             | 2·628  | 2·628   |
|                          | 0·264    | 19·98  | 10·828  | 33·95 | 7·1    | 2·75               | 1             | —      | 100·645 |

Zdá se, že značný přebytek kysličníku hlinitého a kyseliny křemičité původ svůj má dle ve skrovněji udaných podílech kysličníku hořečnatého a vápenatého, dle i v pokročilém již rozkladu, jenž se jeví vyloučením kyseliny křemičité a hydrátu kysličníku hlinitého a snad i v přítomnosti pleonastu.

Dle mikroskopického rozboru jest množství augitu poněkud větší, též podíl magnetitu, ale množství apatitu, leucitu a nefelinu srovnává se s výpočty chemického rozboru.

#### . Čedič peperinový z Vlčí hory u Černošína

byl chemicky skoumán E. Jahnem. Rozbor udal v %:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| kyseliny křemičité =   | 42·40  |
| kysličníku hlinitého = | 11·80  |
| " železitého =         | 26·74  |
| " manganatého =        | 0·74   |
| " hořečnatého =        | 0·22   |
| " vápenatého =         | 10·96  |
| žiravin =              | 4·40   |
| kyseliny fosforečné =  | 0·76   |
| ztráty při pálení =    | 3·30   |
|                        | 101·32 |

Výpočet poměrů kyslíkových a rozdělení jejich dle nerostních součástí, tuto čedičovou horninu skládajících:

|                                             | apatit | leucit | nefelin | augit | olivin |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .                | 22·61  | —      | 2·96    | 2·56  | 11·40  |
| kysličníku hlinitého . . . . .              | 5·51   | —      | 1·11    | 1·71  | 1·63   |
| " železitého . . . . .                      | 8·02   | —      | —       | —     | —      |
| " železnatého . . . . .                     | —      | —      | —       | 2·68  | 0·09   |
| " manganatého . . . . .                     | 0·17   | —      | —       | 0·17  | —      |
| " vápenatého . . . . .                      | 3·13   | 0·28   | —       | 2·85  | —      |
| " hořečnatého . . . . .                     | 0·09   | —      | —       | —     | 0·09   |
| žiravin } kysličníku draselnatého . . . . . | 0·37   | 0·37   | —       | —     | —      |
| " " sodnatého . . . . .                     | 0·57   | —      | 0·57    | —     | —      |
| kyseliny fosforečné . . . . .               | 0·42   | 0·42   | —       | —     | —      |

Percentový výpočet nerostních součástí čediče peperinového z Vlčí hory u Černošína:

|                                       | apatit  | lencit | nefelin | augit | olivín | ma-<br>gnetit | zbytek | úhrn   |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .          | —       | 5.55   | 4.81    | 21.38 | 0.34   | —             | 10.32  | 42.40  |
| kysličníku hlinitého . . . . .        | —       | 2.38   | 3.66    | 3.5   | —      | —             | 2.26   | 11.80  |
| „ železitého . . . . .                | —       | —      | —       | —     | —      | } 12.46       | —      | 26.74  |
| „ železnatého . . . . .               | —       | —      | —       | 12.06 | 0.40   |               | —      | —      |
| „ manganatého . . . . .               | —       | —      | —       | 0.74  | —      | —             | —      | 0.74   |
| „ vápenatého . . . . .                | 0.98    | —      | —       | 9.98  | —      | —             | —      | 10.96  |
| „ hořečnatého . . . . .               | —       | —      | —       | —     | 0.22   | —             | —      | 0.22   |
| žiravin { kys. draselnatého . . . . . | —       | 2.2    | —       | —     | —      | —             | —      | 2.2    |
| kys. sodnatého . . . . .              | —       | —      | 2.2     | —     | —      | —             | —      | 2.2    |
| kyseliny fosforečné . . . . .         | 0.76    | —      | —       | —     | —      | —             | —      | 0.76   |
| vody . . . . .                        | Cl 0.12 | —      | —       | —     | —      | —             | 3.30   | 3.30   |
|                                       | 1.86    | 10.13  | 10.67   | 47.66 | 0.96   | 12.46         | 15.88  | 101.34 |

## VI. Čediče živcové.

Chemický ráz jednotlivých skupin č. živcových záleží hlavně v kvantitativné různosti minerálních součástí, toliko v oboru čedičů andesitových a fonolitových též v různosti kvalitativné.

### 1. Čediče melafyrové.

Čediče melafyrové, v nichž živcová součást nejméně polovici veškeré hmoty čedičové zaujímá; obsahují buď málo nefelinu aneb týž úplně jim schází. Tolikéž leucitu schází. Krystalická směs skládá se pouze z několika málo nerostů, totiž ze živce, augitu a magnetitu, k nimž se jen pořádku více méně olivinu a sporé magma přidružují. Vesměs trojklonný živec jeví se co oligoklas. Poněvadž i velikost součástí jest po většině stejnoměrná, bývá i skrytý sloh skoro stejný.

Z čedičů melafyrových použilo se k chemickému rozboru pouze čediče od sv. Ivana u Berouna a tento vykázal 45.8% kyseliny křemičité, 5% žiravin a 2.6% vody.

#### *Melafyrový čedič od sv. Ivana.*

Chemický rozbor čediče tohoto udal v %:

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| kyseliny křemičité                                              | = 45.842                   |
| kysličníku hlinitého                                            | } = 36.775                 |
| „ železitého                                                    |                            |
| „ vápenatého                                                    | = 6.030                    |
| „ hořečnatého                                                   | = 4.728                    |
| žiravin (hlavně kysličníku sodnatého a velmi málo draselnatého) | = 5.065 (určeno 2.118 gr.) |
| ztráty při pálení                                               | = 2.625                    |

Odečtou-li se určené podíly vody, vychází pak v ‰:

## Poměry kyslíkové

|                                      |   |        |        |        |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| kyseliny křemičité                   | = | 46·568 | . . .  | 24·171 |
| kysličníku hlinitého                 | } | =      | 37·358 |        |
| „ železitého                         |   |        |        |        |
| „ vápenatého                         | = | 6·125  | . . .  | 1·75   |
| „ hořečnatého                        | = | 4·803  | . . .  | 1·92   |
| kysl. sodnat. a něco málo draselnat. | = | 5·145  | . . .  | 1·327  |

Pozorujeme-li výsledky tyto, zvláště pak větší poměrné množství kysličníku sodnatého a menší kysličníku vápenatého, tož nelze jinak určit onen trojklonný živec, jenž v této hornině čedičové převládá než-li za oligoklas. Přijal-li se labrador za základ výpočtů, nevedly pokusy početní k žádnému výsledku. —

Položíme-li tudíž za základ, že oligoklastický živec v čediči tomto 10‰ kysličníku sodnatého a 4‰ kysličníku vápenatého obsahuje, temnožlutý pak dílem nahnědlý olivin že z 29‰ kysličníku železnatého a 33‰ kysličníku hořečnatého (co hyalosiderit) se skládá, tož vypočítá se z poměrů kyslíkových percentové množství jednotlivých součástí nerostních takto:

| Poměry kyslíkové               |        |            |         |        |
|--------------------------------|--------|------------|---------|--------|
| chem. součástí rozboru         |        | oligoklasu | olivinu | augitu |
| kyseliny křemičité . . . . .   | 24·171 | 17·01      | 2·86    | 4·30   |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 5·61       | —       | —      |
| „ železitého . . . . .         | —      | —          | —       | —      |
| „ železnatého . . . . .        | —      | —          | 0·94    | 0·98   |
| „ vápenatého . . . . .         | 1·75   | 0·58       | —       | 1·17   |
| „ hořečnatého . . . . .        | 1·92   | —          | 1·92    | —      |
| „ sodnatého . . . . .          | 1·327  | 1·327      | —       | —      |

‰ tohoto rozvrhu vychází pak skladba nerostních součástí, a sice:

|                                | oligoklasu | olivinu | augitu |
|--------------------------------|------------|---------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | 32·74      | 5·505   | 8·277  |
| kysličníku hlinitého . . . . . | 12·015     | —       | 2      |
| „ železitého . . . . .         | —          | —       | —      |
| „ železnatého . . . . .        | —          | 4·23    | 4·41   |
| „ vápenatého . . . . .         | 2·03       | —       | 4·095  |
| „ hořečnatého . . . . .        | —          | 4·80    | —      |
| „ sodnatého . . . . .          | 5·145      | —       | —      |
|                                | 51·93      | 14·53   | 18·78  |

Od kysličníku hlinitého a snad i od kysličníku železitého náleží nepochybně ještě díl augitu; nehledí-li se však k tomuto vůbec nepatrnému podílu a vezme-li se v okrouhlých číslech 52‰ oligoklasu, 14·5‰ olivinu a 19‰ augitu (což s vyšetřením mikroskopického rozboru přibližně se srovnává), zůstane zbytek 14·5‰ pro magnetit.

## 2. Obecné čediče živcové.

V obecných čedičích živcových převládá augitická součást a trojklonný živec zaujímá asi třetinu (aneb ještě méně) veškeré hmoty čedičové. Leucit schází. Olivin jest ve množství velmi různém.

### a) Obecné čediče živcové, mající nahnědlé magma.

Čediče této skupeniny jsou více méně nefelínem bohaté. Tyčinkovité průřezy jeho rozeznati lze od trojklonného živce — jenž nepochybně anorthitu náleží — pouze ve světle polarisovaném. Nahnědlé, trichity bohaté magma jest více méně, vždy však žřetelně vyvinuto.

Z čedičů tohoto skupení užilo se k chem. rozboru čediče od Kolozruk; rozbor ten, proveden v laboratoři pana prof. Šafaříka, vykázal v %:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| kyseliny křemičité   | = 38.66   |
| kysličníku hlinitého | } = 33.12 |
| „ železitého         |           |
| „ vápenatého         |           |
| „ hořečnatého        |           |
| žiravin              | = 5.38    |

Pozorujeme-li značné množství žiravin a malé pouze množství kyseliny křemičité, tož můžeme již souditi o přítomnosti hmoty nefelinové v hmotě čedičové s největší pravdě podobností, i kdyby průřezů nefelinových objeviti lze nebylo; tolikéž ukazuje množství kysličníku vápenatého ku přítomnosti hmoty anorthitové. Tato pravdě podobnost obou předeslaných důměnek, jimž i mikroskopický rozbor nasvědčuje, vysvětluje z následujícího výkladu rozboru chemického.

Množství kyslíku chemických součástí a jich přibližné rozdělení dle jednotlivých nerostů:

|                                           |       | nefelin | anorthit | augit | olivin |
|-------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .              | 20.04 | 6.25    | 4        | 6.4   | 3.892  |
| kysličníku hlinitého . . . . .            | —     | 4.17    | 3        | 1     | —      |
| „ železitého . . . . .                    | —     | —       | —        | —     | —      |
| „ železnatého . . . . .                   | —     | —       | —        | 0.6   | —      |
| „ vápenatého . . . . .                    | 3.66  | —       | 1        | 2.6   | —      |
| „ hořečnatého . . . . .                   | 3.89  | —       | —        | —     | 3.892  |
| žiravin (nepochybně kysličníku sodnatého) | 1.39  | 1.39    | —        | —     | —      |

### Percentový výpočet nerostních součástí z poměrů kyslíkových:

|                                   | nefelin | anorthit | augit | olivin | magnetit | souhrn |
|-----------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .      | 11.72   | 7.5      | 12.0  | 7.3    | —        | 38.52  |
| kysličníku hlinitého . . . . .    | 8.93    | 6.43     | 2.14  | —      | —        | 17.50  |
| „ železitého . . . . .            | —       | —        | —     | —      | 12       | 15.62  |
| „ železnatého . . . . .           | —       | —        | 2.70  | —      | —        | —      |
| „ vápenatého . . . . .            | —       | 8.5      | 9.1   | —      | —        | 12.6   |
| „ hořečnatého . . . . .           | —       | —        | —     | 9.72   | —        | 9.72   |
| žiravin (co kysličníku sodnatého) | 5.38    | —        | —     | —      | —        | 5.38   |
|                                   | 26.03   | 17.43    | 25.94 | 17.02  | 12       | 99.34  |

**b) Obecné čediče živcové**  
(s našedivěle bílým magmatem).

Obecné čediče živcové s našedivěle bílým magmatem nebyly posud chemicky rozebrány; dle mikroskopického rozboru lze však souditi, že i tato skupenina čedičů v chemickém ohledu přechod činí k čedičům andesitovým.

Sem náleží augitem velmi bohatý čedič z Malého Radechova u Kuří Vody, jenž má 43·9% kyseliny křemičité.

### 3. Čediče andesitové.

Čediče andesitové obsahují mimo trojklonný živec též značnější množství nefelinu aneb častěji nefelin a leucit; hmota magnetitová ustupuje značně do pozadí, olivin jest sporý aneb schází docela; naproti tomu zdá se, že melilit hojněji se vyskytuje. Na tuto skupeninu obmezuje se hojnější objevování se hauynu, jenž začasť v poměrně velkém množství (co mikroskopická součást) v čedičích andesitových se jeví. (Nosean, zdá se, že náleží hlavně velmi jemnozrným nefelinitům, čedičům trachytovým a fonolitům.) Poněvadž nerostné součásti velmi různými se jeví a v kolísavých poměrech kvantitativních zastoupeny jsou, lze se též nadíti značných rozdílů v chemických výsledcích; vzdor tomu dají se vytknouti přibližné meze kyseliny křemičité od 45·7—50·6% a žiravin 4·4—5·7%.

Čediče andesitové, nefelinem a hauynem bohatší, vynikají mimo čediče trachytové velikým množstvím zeolitů a vůbec druhotnými výtvoxy nerostnými. Tot patrný důkaz o snažším rozkladu vlivem vzdušnin, který též se snažší porušitelností jejich v kyselinách se srovnává. V tomto případě pozorovati lze buď slabé buď docela žádné šumění, a kyselina křemičitá vylučuje se ponejvíce ve způsobě chomáčů, řidčeji co rosol.

*Jemnozrný čedič andesitový ze Strážovické hory.*

O chemickém rázu trojkloného živce učiněna již zmínka svrchu udaným určením (na str. 20.), že týž andesitu se blíží, jehož  $R = (\text{asi}) \frac{2}{3} Ca + \frac{2}{3} Na + \frac{1}{3} Mg$ .

Chemický rozbor čediče tohoto, jehož hutnost = 2·803 (určena 3·12 gr.), vykazuje v %:

|                      |   |                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| kyseliny křemičité   | = | 50·64                                |
| kysličníku hlinitého | } | = 33·84                              |
| „ železitého         |   |                                      |
| „ vápenatého         | = | 5·39                                 |
| „ hořečnatého        | = | 2·67                                 |
| žiravin              | = | 5·74 (vypočtených co doplněk ke 100) |
| ztráty při pálení    | = | 1·72                                 |
|                      |   | 100                                  |

Výpočet poměrů kyslíkových a jich rozdělení dle nerostů, mikroskopickým rozbořem zjištěných:

|                                |       | andesin | nefelin | augit |
|--------------------------------|-------|---------|---------|-------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | 27·01 | 19·60   | 2·16    | 5·25  |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —     | 7·35    | 1·45    | —     |
| „ železitého . . . . .         | —     | —       | —       | —     |
| „ železnatého . . . . .        | —     | —       | —       | 1·47  |
| „ vápenatého . . . . .         | 1·54  | 1·00    | —       | 0·54  |
| „ hořečnatého . . . . .        | 1·06  | 0·45    | —       | 0·61  |
| „ sodnatého . . . . .          | 1·48  | 1       | 0·48    | —     |

Z toho pak následuje tento procentový výpočet nerostních součástí:

|                                | ande-<br>sin | nefelin | augit | magnetit<br>s leštěncem železnatým dílem<br>pleonastem | voda | úhrn   |
|--------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------|------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | 36·75        | 4·05    | 9·84  | —                                                      | —    |        |
| kysličníku hlinitého . . . . . | 15·74        | 3·08    | 1·64  | —                                                      | —    |        |
| „ železitého . . . . .         | —            | —       | —     | 5·79                                                   | —    |        |
| „ železnatého . . . . .        | —            | —       | 6·62  |                                                        | —    |        |
| „ vápenatého . . . . .         | 3·5          | —       | 1·89  |                                                        | —    |        |
| „ hořečnatého . . . . .        | 1·12         | —       | 1·52  | —                                                      | —    |        |
| „ sodnatého . . . . .          | 3·88         | 1·86    | —     | —                                                      | —    |        |
| vody . . . . .                 | —            | —       | —     | —                                                      | 1·72 |        |
|                                | 60·99        | 9·99    | 21·51 | 5·79                                                   | 1·72 | 100·00 |

### Čedič andesitový z Košťálu.

Chemický rozbor čediče tohoto, vykonaný v laboratoři pana prof. Šafaříka (průbrou, v teplotě 100° sušenou), vykázal v ‰:

|                        |   |                                             |
|------------------------|---|---------------------------------------------|
| kyseliny křemičité     | = | 47·02                                       |
| kysličníku hlinitého   | = | 19·34                                       |
| „ železitého           | = | 5·00                                        |
| „ železnatého          | = | 6·53                                        |
| „ manganatého          | = | 0·05                                        |
| „ vápenatého           | = | 8·78                                        |
| uhlíčitanu vápenatého  | = | 2·36 (obsahujícího 1·04‰ kyseliny uhlíkové) |
| kysličníku hořečnatého | = | 6·40                                        |
| „ draselnatého         | = | 1·04                                        |
| „ sodnatého            | = | 3·45                                        |
|                        |   | 99·97                                       |

Prášek obsahoval 0·89‰ hygroskopické vody. Co dodatek určil jsem ztrátu při pálení = 2·3‰ a množství kyseliny sírové = 0·6‰. V kyselině solné zahříván rozkládá se a kyselina křemičitá vylučuje se v podobě chomáčů (z malé pouze části i co rosol).

Výpočet poměrů kyslíkových a jich rozdělení dle jednotlivých nerostů, skládajících tuto horninu čedičovou:

|                                | kalcit | hauyn | nefelin | andesin | leucit | augit | biotit | olivin | magnetit |
|--------------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|----------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | 25·07  | —     | 0·96    | 1·76    | 4·56   | 2·16  | 8·1    | 1·35   | 0·27     |
| kysličníku hlinitého . . . . . | 9·03   | —     | 0·72    | 1·17    | 1·71   | 0·81  | 2      | 0·81   | —        |
| " železitého . . . . .         | 1·50   | —     | —       | —       | —      | —     | —      | —      | 1·5      |
| " železnatého . . . . .        | 1·45   | —     | —       | —       | —      | 0·95  | —      | —      | 0·5      |
| " manganatého . . . . .        | 0·01   | —     | —       | —       | —      | 0·01  | —      | —      | —        |
| " vápenatého . . . . .         | 2·85   | 0·38  | 0·18    | —       | 0·23   | —     | 2·06   | —      | —        |
| " hořečnatého . . . . .        | 2·56   | —     | —       | —       | 0·11   | —     | 1·64   | 0·27   | —        |
| " draselnatého . . . . .       | 0·18   | —     | —       | —       | 0·18   | —     | —      | —      | —        |
| " sodnatého . . . . .          | 0·89   | —     | 0·18    | 0·39    | 0·23   | 0·09  | —      | —      | —        |
| kyseliny uhličitě . . . . .    | 0·76   | 0·76  | —       | —       | —      | —     | —      | —      | —        |
| " sírové . . . . .             | 0·36   | —     | 0·36    | —       | —      | —     | —      | —      | —        |

Z rozdělení poměrů kyslíkových vychází toto nerostní složení horniny čedičové:

|                              | kalcit | hauyn | nefelin | leucit | andesin | augit | biotit | olivin | magnetit | souhrn | zbytek |
|------------------------------|--------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|
| kyseliny křemičité . . . . . | —      | 1·8   | 3·3     | 4·05   | 8·55    | 15·21 | 2·53   | 0·51   | —        | 35·95  | 11·07  |
| kysličníku hlinit. . . . .   | —      | 1·54  | 2·51    | 1·73   | 3·66    | 4·28  | 1·73   | —      | —        | 15·45  | 3·89   |
| " železitého . . . . .       | —      | —     | —       | —      | —       | —     | —      | —      | 5·00     | 5·00   | —      |
| " železnat. . . . .          | —      | —     | —       | —      | —       | 4·27  | —      | —      | 2·25     | 6·52   | —      |
| " manganat. . . . .          | —      | —     | —       | —      | —       | 0·04  | —      | —      | —        | 0·04   | —      |
| " hořečnat. . . . .          | —      | —     | —       | —      | 0·27    | 4·10  | 1·35   | 0·67   | —        | 6·39   | —      |
| " vápenat. . . . .           | 1·33   | 0·63  | —       | —      | 0·80    | 7·21  | —      | —      | —        | 9·97   | —      |
| " draselnat. . . . .         | —      | —     | —       | 1·05   | —       | —     | —      | —      | —        | 1·05   | —      |
| " sodnatého . . . . .        | —      | 0·7   | 1·51    | 0·35   | 0·89    | —     | —      | —      | —        | 3·45   | —      |
| kyseliny uhličitě . . . . .  | 1·04   | —     | —       | —      | —       | —     | —      | —      | —        | 1·04   | —      |
| " sírové . . . . .           | —      | 0·6   | —       | —      | —       | —     | —      | —      | —        | 0·6    | —      |
| vody . . . . .               | —      | —     | —       | —      | —       | —     | —      | —      | —        | —      | 2·3    |
|                              | 2·37   | 5·27  | 7·32    | 7·18   | 14·17   | 35·11 | 5·61   | 1·18   | 7·25     | 85·46  | 17·26  |

Zbytek 11·07% kyseliny křemičité a 3·89% kysličníku hlinitého jest důkazem buď malého udání žiravin v chemickém rozboru aneb pokročilého již rozkladu horniny čedičové, t. j. dokazuje, že přítomna jest kyselina křemičitá a hydrát kysličníku hlinitého. A toto potvrzují mnohé, vrstevnatými čarami označené, infiltrační dílce v broušených destičkách, neméně i přítomné uhličitany. Dle mikroskopického rozboru jest nefelinu mnohem více, než vykazuje výpočet chemického rozboru, poměr pak ostatních nerostních součástí srovnává se přibližně.

#### *Chemický rozbor čediče andesitového od Dubic na Labi,*

jehož prášek v kyselinách silně se rozkládá (aniž by šuměl) a kyselinu křemičitou ve způsobě rosolu vylučuje, udal v %:

|                        | I.     | II.    |
|------------------------|--------|--------|
| kyseliny titaničité =  | 1·062  | —      |
| " křemičité =          | 45·697 | —      |
| kysličníku hlinitého = | 19·023 | 28·190 |
| " železitého =         | 10·181 |        |
| " vápenatého =         | 4·023  | 4·783  |
| " hořečnatého =        | 1·197  | 0·095  |
| ztráty při pálení =    | 3·271  | —      |
| kyseliny fosforečné =  | 0·361  | —      |

K I. rozboru použito 2·354 gr.

Nalezené množství kyseliny fosforečné 0·361 odpovídá 1·07% apatitu. Mezi žíravinami zaujímá kysl. draselnatý značný podíl, neboť sraženina s chloridem byla dosti značná.

V laboratoři pana prof. Šafaříka proveden též chemický rozbor čediče, který nepochybně tolikéž od Dubic pochází a ten vykazoval v %:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| kyseliny křemičité   | = | 48·27  |
| kysličníku hlinitého | = | 19·15  |
| „ železitého         | = | 10·44  |
| „ vápenatého         | = | 11·48  |
| „ hořečnatého        | = | 4·79   |
| „ sodnatého          | = | 2·36   |
| „ draselnatého       | = | 3·32   |
| kyseliny fosforečné  | = | 0·85   |
|                      |   | 100·66 |

### Čediče trachytové.

Čediče trachytové, vynikající i svými geologickými poměry i zevními znaky, jeví obvykle pokročilý stupeň přeměny; v kyselinách šumí dosti silně a rozkládají se vylučující kyselinu křemičitou buď co rosol aneb v chomáčích. Že tak snadno jsou rozložitelny, toho příčinou jest hlavně nerostní ráz, avšak též vždy zrnitý (porfýrický, doleritický neb anamesitický) sloh.

Čediče trachytové jsou dle nefelinem dle živcem bohaté, trojklonný živec náleží — následkem výkladu chemického rozboru — oligoklasu neb andesinu vápníkem neb hořčíkem bohatému. Jako jsou odrůdy čedičů trachytových, v nichž nefelin a živec v stejném množství zastoupeny jsou, tak vyskytují se i odchylné odrůdy, totiž takové, jež jen nefelin aneb pouze trojklonný živec obsahují. Ony blíže se nefelinitům, liší se na první pohled svými porůznu uloženými, hrotovitými, nahnědlými jehlicemi amfibolu aneb četnými úlomky biotitu. (Vzdor tomu zdá se, že některé doleritické a anamesitické nefelinity, zvláště onen zvětřalý, nefelinový dolerit ze Střekova čedičům trachytovým náležejí.)

Nosean, jednu z nejobyčejnějších součástí čedičů trachytových lze poznati pouze v broušených destičkách nejčerstvějších úlomků po význačném vláskovitém síťování; ponejvíce rozplývá se však nosean v kalnou, nažloutle šedou, na zdání stejnorodou (v polarisovaném světle žlutavou aneb světle šedou) skrytou základní hmotu. Hmotu tato, skládající často největší díl hmoty čedičové, (jako v čediči Kunětické hory, v němž se tvoření její ponenáhlym rozplýváním noseanu stopovati dá), schází pouze oněm členům trachytových čedičů, jež nejvíce nefelinu obsahují. Magnetit jest poměrně sporý a zdá se, že jest v míře nepatrné pleonastem zastoupen. Čedičové trachytové mají 42·0%—44·5% kyseliny křemičité, žíraviny 6·0—7·4%, vody pak 4·8—4·9%.



*Čedič trachytový ze žíly v trachytickém fonolitu mezi Povrly a Veselím*

šumí silně v kyselinách a rozkládá se dosti značně, vylučuje kyselinu křemičitou co rosol a v chomáčích.

Chemický rozbor čediče toho vykazoval v %:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| kyseliny křemičité        | = 44.53       |
| kysličníku hlinitého      | } = 33.36     |
| „ železitého              |               |
| „ vápenatého              | = 8.48        |
| „ hořečnatého             | = 2.47        |
| („ draselnatého           | = velmi málo) |
| „ sodnatého               | = 0.02        |
| kyseliny uhličitě         | = 1.52        |
| vody co ztráty při pálení | = 4.80        |
|                           | 101.18        |

Kyselina sírová neurčena.

Poměry kyslíkové jednotlivých chemických součástí a jich rozdělení dle nerostů, jež mikroskopickým rozbohem zjištěny aneb dle domněni přítomny jsou:

|                                |       | kalcit | nefelin | and-<br>sin | biotit | am-<br>fibol |
|--------------------------------|-------|--------|---------|-------------|--------|--------------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | 23.75 | —      | 4.5     | 11.04       | 0.77   | 6.08         |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —     | —      | 3       | 4.14        | 0.46   | 1            |
| „ železitého . . . . .         | —     | —      | —       | —           | —      | —            |
| „ železnatého . . . . .        | —     | —      | —       | —           | —      | 1.32         |
| „ vápenatého . . . . .         | 2.42  | 0.55   | —       | 0.55        | —      | 1.32         |
| „ hořečnatého . . . . .        | 0.99  | —      | —       | 0.28        | 0.31   | 0.40         |
| „ draselnatého . . . . .       | —     | —      | —       | —           | —      | —            |
| „ sodnatého . . . . .          | 1.55  | —      | 1       | 0.55        | —      | —            |
| kyseliny uhličitě . . . . .    | 1.10  | 1.10   | —       | —           | —      | —            |

Z toho vycházejí následující podíly nerostních součástí:

|                                | kalcit | nefelin | and-<br>sin | biotit | am-<br>fibol | ma-<br>gnetit | kyseliny křemi-<br>čité a hydrátu<br>kysličníku hlinit. |
|--------------------------------|--------|---------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| kyseliny křemičité . . . . .   | —      | 8.44    | 20.70       | 1.44   | 11.40        | —             | 2.55                                                    |
| kysličníku hlinitého . . . . . | —      | 6.42    | 8.87        | 0.82   | 2.14         | —             | 4.4                                                     |
| „ železitého . . . . .         | —      | —       | —           | —      | —            | } 4           | —                                                       |
| „ železnatého . . . . .        | —      | —       | —           | —      | 5.94         |               | —                                                       |
| „ vápenatého . . . . .         | 1.92   | —       | 1.92        | —      | 4.62         | —             | —                                                       |
| „ hořečnatého . . . . .        | —      | —       | 0.70        | 0.78   | 1.00         | —             | —                                                       |
| „ sodnatého . . . . .          | —      | 3.88    | 2.13        | —      | —            | —             | —                                                       |
| kyseliny uhličitě . . . . .    | 1.52   | —       | —           | —      | —            | —             | —                                                       |
| vody . . . . .                 | —      | —       | —           | —      | —            | —             | 4.8                                                     |
|                                | 3.44   | 18.74   | 34.32       | 3.04   | 25.10        | 4             | 11.75                                                   |

*Čedič trachytový z Kunětické hory u Pardubic.*

Trachytový čedič z Kunětické hory, který od Reusse co fonolit, od Jahnů co čedič vyznačen byl, skládá se z převládajícího, poněkud rozplynulého noseanu, z nefelinu, amfibolu, magnetitu a apatitu. Živec, který se dle rozboru Jahnů

sanidinem býti ukázal, náleží ovšem k nejřidším součástkám, jelikož se ve více broušených destičkách jen stopy po něm našly. Jen tu a tam vtroušeny jsou do čediče tohoto listky slídy, stále pak objevování se vápence — i v těch nejmenších dílcích horniny — značí poněkud již pokročilý stupeň přeměny.

Jahnův chemický rozbor tohoto čediče udává v %:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| kyseliny křemičité   | = | 42·00  |
| „ titaničité         | = | stopy  |
| kysličníku hlinitého | = | 18·80  |
| „ železitého         | = | 9·87   |
| „ železnatého        | = | 7·79   |
| „ manganatého        | = | 0·75   |
| „ vápenatého         | = | 4·20   |
| „ hořečnatého        | = | 0·59   |
| „ draselnatého       | } | 7·41   |
| „ sodnatého          |   |        |
| „ lithnatého         | = | 0·09   |
| kyseliny fosforečné  | = | 0·63   |
| „ uhličité           | = | 2·20   |
| „ chloru             | = | 0·04   |
| pyritu               | = | 0·06   |
| ztráty při pálení    | = | 4·93   |
| kygroskopické vody   | = | 0·80   |
|                      |   | 100·16 |

### Přehled hutnosti jednotlivých odrůd čedičových.

K mému vybídnutí a pod mou dohlídkou provedli pánové Med. C. Novák, Ph. C. Tauer a Ph. C. Břek pro české odrůdy čedičové četná určení hutnosti, jichž výsledky tuto podávám:

1. Pro **temné čediče magmatové** = 2·896—2·983 a sice:
  - pro čedič ze Sviňského vrchu (u Svinčič) = 2·896
  - pro odrůdu z téhož naleziště augitem bohatou = 2·931
  - „ „ „ „ „ „ = 2·983
  - pro č. z lomu u Bořislavi = 2·900
2. Pro **nefelinitoidy** = 3·06—3·09 a sice:
  - pro čedič od Vinařic = 3·096
  - „ „ „ Loboše = 3·084
  - „ „ ze Zajčova = 3·065 dle Klaprothova určení.
3. Pro **nefelinity** = 3·04—3·09 a sice:
  - pro nefelinit (anamesit) z Čertovy zdi na březích = 3·095
  - „ noseanit „ z Řipu u Roudnice . . = 3·040
  - „ „ ze Slánské hory . . . . . = 3·060
  - „ krystalicky celistvý nefelinit od Skrzína . . = 3·064

(pro nefelinový dolerit ze Střekova, jenž bezpochyby náleží

k čedičům trachytovým . . . . . = 2·839)

4. Pro čediče **leucitoidové** = 2·977—3·061 a sice:

pro čedič z Chlumu u Měcholup . . . . . = 3·061

„ „ od Kukunely ve Františkově údolí . . = 2·977

5. Pro čediče **leucitové** = 2·900—2·994 a sice:

pro čedič od Paskapole . . . . . = 2·900

„ „ „ Hořence . . . . . = 2·994

„ „ „ Břlenky . . . . . = 2·924

6. Pro čediče **melafyrové** = 2·759—3·06 a sice:

pro čedič melafyrový z Tolčberku . . . . . = 2·759

„ „ „ od sv. Ivana . . . . . = 2·964

„ „ „ od Veliše (u Jičína) . . . . . = 3·06

7. Pro **obecné čediče živcové** = 2·951—3·06 a sice:

pro ob. čed. živ. s hnědým sklovitým magmatem

od Podhradí = 2·994

„ „ „ „ „ z Vrkoče . . . . . = 2·951

„ „ „ „ „ od Radechova . . . . . = 3·035

„ „ „ „ s našedivěle bílým, sklovitým magmatem od Trmic . . . . . = 3·060

8. Pro čediče **andesitové** = 2·656—2·915 a sice:

ze Střížovické hory (jemnozrný čedičový andesit) = 2·803

„ „ „ (velmi jemnozrný, načernale

šedý, s porfyrickými malými krystaly augitu a

našedivěle neb nažloutle bílými destičkami andesinu) = 2·793

pro čedič od Dubic . . . . . = 2·759

„ „ od Libšice u Biliny . . . . . = 2·915

„ „ od Blankensteinu . . . . . = 2·789

„ „ z Vysokého čihadla u Turče . . . . . = 2·656

(pro andesitové čediče, obsahující hauyn):

pro čedič z Košťálova . . . . . = 2·858

„ „ z Veršetína . . . . . = 2·810

(pro čediče andesitové, leucitem a nefelinem bohaté):

pro čedič od Želkovic . . . . . = 2·844

9. Pro čediče **trachytové** = 2·406—2·73 a sice:

pro čedič od Nestřežic . . . . . = 2·682

„ „ mezi Povrly-Roztoky . . . . . = 2·718

„ „ z Kunětické hory . . . . . = 2·406—2·73 (dle E. Jahns

Největší díl starších určení hutnosti českých čedičových hornin pochází od E. Reusse. Ve svém geognostickém díle: „Die Umgebung von Teplitz u. Bilin“ (Prag 1840) uvádí — na str. 109. 1. sv. a na str. 267. 2. sv. — tato určení hutnosti

Hutnost velmi čerstvého čediče od Vranova u Ústí = 2·759

„ „ „ „ od Kučlínu . . . . . = 2·851

„ „ „ „ z Kozího hřbetu u Vranova = 2·955

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| hutnost čediče olivinového od Kostelce u Bilíny . .                                                                                | = 2·843 |
| „ „ „ od Chlumu . . . . .                                                                                                          | = 2·884 |
| „ „ „ od Svinčic . . . . .                                                                                                         | = 3·000 |
| „ „ „ od pramene Bilínského . .                                                                                                    | = 3·113 |
| „ magnetitem bohatého čediče amfibolového<br>z Vostrého u Střekova . . . . .                                                       | = 3·000 |
| „ celistvého čediče s olivinem od Střekova dle<br>v. Leonarda . . . . .                                                            | = 3·062 |
| „ čediče s hojným amfibolem, jednotlivými<br>zrnky olivinu a tumpachově hnědými lístky<br>slídy od Kostomlat (dle v. Leonarda) . . | = 2·969 |
| „ čediče s krystalickým olivinem a augitem<br>od Mirešovic (dle v. Leonarda) . . . .                                               | = 3·036 |
| „ hlinitého, popelavě šedého, dirkovitého čediče<br>s krystalickým amfibolem a chabasitem<br>od Kostomlat . . . . .                | = 2·415 |
| „ šedého, celistvého čediče s živcem, sporým<br>olivinem a vápencem od Telnic . . . .                                              | = 2·672 |
| „ šedého, pevného, jemně bublinatého čediče<br>s neurčitelnými kuličkami zeolitů od Loukova                                        | = 2·333 |
| „ červeného, jemně bublinatého, hlinitého čediče<br>z Kubačky . . . . .                                                            | = 1·870 |
| „ doleritu od Švace . . . . .                                                                                                      | = 2·790 |
| „ pevného, čediči podobného slepence z Kolo-<br>zruk s četným olivinem, šedou slídou, augi-<br>tem i kalcitem . . . . .            | = 2·711 |
| „ měkšího, šedého slepence od Dopic u Sušic                                                                                        | = 2·484 |
| „ „ červeného „ od Žímy . . .                                                                                                      | = 2·417 |

## O geotektonice, o poměrech stáří a rozšíření čedič. horstva v Čechách.

---

Tektonické tvary, v nichž se horniny čedičové vyskytují, jsou, jak známo, proudy, stropy a žíly.

V krajinách českého čedičového horstva převládají proudy a stropy tou měrou, že celé toto pohoří za příklad onoho tektonického tvaru sloužiti může. V největším svém rozsahu jeví čedičové horstvo střídavé lože tufů, slepenců a cedičů, jichž hmota horniny sedimentární, které nyní za základ jí slouží, opět a opět byla prorazila a u větší neb menší mocnosti a rozsáhlosti na způsob proudů a stropů pokryla.

Původu mladšího jsou čediče balvanitých žil, jež — objevujíce se dílem co osamotnělé kužele, dílem co protáhlé hřbety hor a pahorků, mající ostré, zubaté obrysy — byly prorazily starší čediče proudové a způsobily rozmanitá porušení v uložení jejich i jich tufů i vrstev hnědého uhlí, v tufech ukrytých.

Za nejmladší výtvořiny čedičové sluší pak považovati ony cedičové žíly, jež, vystoupivše na způsob zdí, pronikly různými horninami cedičovými i fonolity trachytovými.

Tyto rozdíly v stáří českého, čedičového horstva, jež se na tektonických tvarech zakládají, vynešeny byly již Reussem a Jokelym.

K objasnění geotektoniky mladších, v balvanitých i v užších žilách vystupujících čedičů, jež v osamotnělých kuzelech aneb v protáhlých hřbetech hor a pahorků se jeví, připojuji ještě tato pozorování: Čedičové kužele skládají se buď z kolmých aneb k ose hory více méně nakloněných sloupů, které též do hloubky pokračují (na pokraji však začasté na slepencích, tufech a sedimentárních horninách stojí), buď nejví sloupoví na povrchu svém, nýbrž vrchol složen jest z hustého, někdy mocnými slepenci pokrytého čediče, pod nímž více méně zatočená, pouze několik stop široká žíla stejně dlouhých, vodorovných, aneb dle směru žíly mírně nakloněných sloupů z hloubi co zeď vyniká. (Takováto žíla podobá se stěně narovnaných polen.)

Kuželovité vrchy — jež, skládajíce se z kolmých neb k ose hory více méně nakloněných, do hloubky sahajících sloupů, považují se buď za výběžky neb zbytky

balvanitých žil, jichž pokračování začasté v četných kuzelech hor aneb v celém pořadí kuželů stopovati lze — tvoří obyčejný tektonický tvar pro odrůdy čedičové, jež se vyskytují v pokrajním pásmu levého a blíže pravého břehu Labe, naproti tomu objevují se úzké žíly — v podobě zdí, z vodorovných sloupů zbudovaných a do hloubi pokračujících — v severo- a jihovýchodních horách a v řadách kuželovitých hor a klikatých hřbetů, jimiž obrubuje se středohoří.

Čedičové kuzele tohoto druhu jsou buď osamělé buď činí řady vrchů, spojených táhlými neb mírně klikatými náspy, z nichž výstřelky menších čedičových pahorků vystupují. Tyto, složeny jsou z pevných slepenců, jež na čedičových žilách spočívají, vynikají ve způsobě trosek, ony však skládají se z balvanitého čediče, který s vystouplými žilami vodorovných, začasté velmi tlustých sloupů pevně souvisí, avšak menší tvrdostí svou snadno se rozeznává. A rozdílu tohoto používají také cestáři, vylamujíce pouze pevnější odrůdu čedičovou, totiž ze žíly k roztloukání na štěrky. Vylámaním žil otevírají se pak klikaté směry jejich mezi stěnami měkšího čediče balvanitého a usnadňuje se názor do vnitřní stavby čedičových vrchů.

Ve větších kuželovitých vrchách čedičových, jež, lomy otevřeny jsou, řádný pohled do tektonických poměrů nitra svého poskytují, ku př. v čedičových pahorcích u Horké a u Bud blíže Bakova neb ve vysokém, lesem pokrytém vrchu, v Lisé u Bělé, pozorovati lze jedinou mocnou žílu, která celým vrchem proniká ve směrech klikatě okrouhlých, okružnímu kamenu podobných, dále pak od kuželovité hory téměř přímočarě se táhne.

Čím mocnější jest žíla, čím četnější a rozsáhlejší jsou otáčky její, tím mocněji a výše vyniká kuželovitá hora čedičová; zevnější tvar, je-li totiž kuželovitá neb protáhlá, rakvi podobná, souvisí, jak se zdá, se způsobem otáček, blízkých se buď kruhu buď elipsoidu, relativní pak výška čerenu v horském pásmu (při stejné šířce žíly), zdá se, že jest asi v přímém poměru k počtu otáček.

Vystoupila-li však žíla čedičová beze všech otáček, aniž by tudíž kuželovitou horu byla vytvořila, v podobě táhlého hřbetu a pak-li její slepence, jež při výstupu třením povstaly, vodami zrušeny a odplaveny byly, zdvihá se pak ona žíla co úmělá z vodorovných sloupů vystavená zeď.

Velezajímavý příklad této zvláštní stavby čedičových žil podávají nám ona přes hodinu dlouhá, přímá, rovnoběžná, asi 3' široká čedičová pásma pověstné zdi Čertové u Českého dubu.

Celkem shodují se tudíž veškerá pozorování v tom, že starší čediče v podobě proudů a stropů uloženy jsou, mladší pak v podobě balvanitých neb úzkých žil vystupují.

K ustanovení relativné posloupnosti v stáří rozmanitých odrůd čedičových nestačí toliko pozorování tektonických tvarů, nýbrž musí se též přihlížeti k celkovým směrům čedičových pásem, jež naznačují směry tehdejších výbuchů na povrchu zemském. V krajinách českého čedičového horstva zřejmě lze rozeznati tři směry pásem čedičových: JZ—SV, JV—SZ, a SJ, jimž zároveň tři občasí stáří odpovídají. První občasí zahrnuje: čediče leucitové, nefelinové a magmatové a snad i část obecných čedičů živcových, druhé pak: čediče andesitové a fonolitové a třetí: čediče trachytové a tachylytové.

### 1. Občasí.

Hlavní směr česk. čedič. horstva táhne se, jak známo, od JZ k SV skoro rovnoběžně s horami Krušnými; směrem tímto táhnou se souvislé spousty mocných proudů a ústředních žil balvanitých českého Středohoří, jež beze vší pochyby nejstaršími jsou čediči českými. Nejméně porušeny mladšími eruptivními čediči, za to však četnými kuželi fonolitovými pozdviženy, objevují se dalekosáhlé proudy nejstarších centrálních žil mezi řekou Bělínou a Labem a přímo na pravém břehu Labe mezi Litoměřicemi a Ústím. Největší pak roklina onoho území — koryto říčky Běliny (i část Labe mezi ústím a Valtýřem) táhne se k hlavnímu směru, JZ—SV, skoro rovnoběžně.

Vnitřní a zároveň nejvyšší díl tohoto území — od Střekova u Ústí přes Záhoř, horu Kletečnou, Milešovku, Klocberk, Kostomlaty, Loukov, Hořenec — zauímají čediče leucitové. Pozoruhodný jest tento přímočarý, s horami Krušnými rovnoběžný směr, jenž z českého Středohoří ještě dále přes Dolánky u Podbořan až do krajiny Valečské sledovati se dá a nejen v střední části pohoří Ústí-Děčinského na levém břehu Labe (mezi Lípovem a Spansdorfem), nýbrž i v pohoří Doupovském (Doupov, Drmoly, Turč, Maštov) i v Krušných horách (Čes. Oberwiesenthal, Šenwald, Hauenstein; Voč, Séberg u Kadaně) své souběžnice má.

K čedičům leucitovým pojí se v širokém okrsku čediče peperinové, jež jsou též čediči leucitovými vynikají zvláštním původem — totiž co utuhlé bahno lávové. Čediče peperinové rozkládají se v okolí Žímy, Dubic, Kostomlat a Loukova a dosahují svého největšího rozsahu v okolí Milešovky a Klocberku. Přihlédneme-li nyní k okolí tomuto, jež nejvyššími a velmi četnými kuželi fonolitovými (jako Milešovkou, Kletečnou a Silkavskou horou, Klocberkem, velkou Františkovou horou, Kamenným klukem, Horou a j. v.) proniknuto jest, tož musíme doznati, že čediče leucitové a peperinové, v proudech vynikající, jen tím na povrchu celé krajiny tak mocně se rozšířily, že kuželi fonolithovými vyzdviženy byly.

V nejbližších sousedních pásmech čedičů leucitových a peperinových v území Běliny a Labe táhnou se skoro rovnoběžným směrem čediče leucitoidové a nefelinové, jež i uvnitř onoho území tu a tam se objevují.

Rozkládají se od Ostrého u Červeného Újezda (zauímajíce Mühlberk u Libčovic, horu Lisku, vrch Charvatův a Oblík) až do okolí Loun a objevují se pak opět v západním a v severozápadním území Běliny (na Chlumu u Měcholup, na Zinkensteinu u Libšic a na Doubravickém pahorku u Teplic). S nimi mnohokrát střídají se nefelinitoidy (od Vranku u Meronic, od Raného u Loun, od Lipenavy u Teplic), pak noseanity (z hory Milé a Dlouhé u Kozlů) a nefelinity (z Kamené uličky u Červeného Újezda, od Bělošic, Skržínu a z Jalovcové hory u Teplic).

V jihovýchodní části levého břehu Labe (u Dlaškovic, Veršetína, Režného Újezda, na Loboši a v řetězi kuželovitých hor Hanšpurka, Blánka) převládají nefelinitoidy, vynikající mikrolitickým skrytým slohem, v jižní pak části pravého břehu Labe (mezi Rabensteinem, Kundraticemi, Hlinou a Pokraticemi) vystupují dosti mocně nefelinity, jež i z vnitra území leucitových čedičů ze dvou míst (od Klocberku a od Kalamajky u Bukovic blíže Kostomlat) známy jsou.

Z nejjihnějších hor čedičových levého břehu Labe skládají se hora Říp a Solná hora u Slaného z jemnozrných noseanitů, pak Vinařická hora, pahorek Bejkovský u Jenšovic na pravém břehu Labe a dále Clomek u Doubravic — kteréžto tři odrůdy čedičové svým mikroskopickým rozbořem úplně se srovnávají a v přímé čáře JZ—SV leží — z jemnozrných nefelinitoidů.

Veškeré zmíněné odrůdy čedičové (na jižní straně levého a pravého břehu Labe) vynikají tam, kde rozsáhlejší hornatinu tvoří, na způsob proudů a mocných balvanitých žil, a to jest hlavně ve střední části onoho území: v okrajních pásmech objevují se v podobě řetězů kuželovitých hor a pahorků a na nejzevnějším pásmu co osamotnělé, od sebe dosti vzdálené homole. Dva tyto způsoby tektonických tvarů jakož i vystupování na obvodu ukazují patrně k mladšímu staří, jež však spadá do onoho velikého občasí, které se stejným směrem od JZ k SV a velmi podobným, mikroskopickým i chemickým rázem těchto čedičových odrůd vyznačuje. Podobně má se to i v pohoří Ústí-Děčínském na levém břehu Labe, jež mladšími čediči, fonolity a trachytovými fonolity čteně jest proniknuto. Na jihozápadním okraji (u Postic, Bukova) vystupují nefelinitoidy, na jižním okraji (u Kozí hory, blíže Veselí) nefelinity, a u vnitru tohoto území (u Šiklova mlýna blíže Blankensteinu a u Lipova) čediče leucitoidové a leucitové. V pohoří Doupovském vynikají čediče leucitoidové dletem s čediči leucitovými (u Turče, Doupova, Drmol, Maššova, Kysiblu a Buchova, na Výšinách u Šénwaldu a na Burberku u Kadaně) dletem co průvodce mladších čedičů (andesitových a fonolitových), zde ovšem co zbytky starších proudů, mladšími čediči zdvižených.

Na místech od Labe vzdálených, na pravém břehu a v severovýchodní části Čech neobjevují se čediče leucitoidové, nefelinitoidy (ponejvíce leucitem bohaté) a čediče nefelinové tak rozsáhlé, ve větších spoustách co mocné proudy a balvanité žíly, nýbrž více co zbytky proudů, pokrývajících na úpatí a svazích čediče mladší (andesitové a fonolitové). Čtené hory a pahorkatiny, jež utvořily se vystoupením užších žil, kolem osy kuželovitého vrchole klikatě stočených, sluší považovati za nejmladší členy prvního občasí.

Labi nejbližší jest čedič leucitoidový na Ovčácké hoře, jenž se řadí k čediči leucitovému u Sřekova. Na severovýchodním úpatí hory Křižové vyskytují se čediče leucitoidové co zbytky někdejších proudů, jež mladšími čediči směrem JVJ — SZS zdviženy jsou. K nejstarším čedičům náležejí zároveň čediče leucitoidové z Hutberku u Petrovic, ze Zbyny u Dokes, z úpatí Kukunely u Františkova, z Kamenické hory u Zákup, z Ladeberku u Vratislavic, z úpatí velikého Jeleního hřebenu u Svěbořic, z úpatí Ronšperku od Radoušova, z Humprechtova vrchu u Sobotky, z Jeřábí hory u Kruhu, z velkého Hůrského lomu u Kuří vody, od Kacova u Sichrova a ze Sudky u Malé Skalky.

Po bok čedičů leucitových řadí se relativním svým stářím nefelinitoidy ze severozáp. úpatí Radobyli, z vysokého Ovčína, z veliké Borné, z Kühnových vrchů, z Hrobu a ze Sedla u Beškab, z Homole (Hutberg) u Benešova, ze Svárova, z úpatí Lipové hory u Housky (jejíž temeno z čediče andesitového se skládá), ze Šibenice a z Vrátné u Mšena, pak nefelinity z Ostrého u Čes. Lípy, z Velenice, z Ronšperku u Doun, ze Strimické hory, z čedičového proudu od Kozákova, jenž tuto na melafýru se rozprostírá, z proudů hory Mužské, nefelinity z Ostrého u Vartemberka, poslední



jihovýchodní čedičový bod, totiž nefelinit z Košumberku u Luže a (nepochybně co nejmladší členové) skoro hodinu dlouhé, rovnoběžné žfly Čertové zdi u Českého Dubu. Temné čediče magmatové vystupují — ponejvíce v proudech — převahou v území řeky Běliny a Labe, uzavírajíce na severu a jihu střední proudy čedičů leucitových a peperinových. Jich naleziště pojata býti mohou ve dvě, téměř přímočárná, rovnoběžná pásma. Sevrní zaujímá: vrch Svinčický, Králičí horu u Mirešovic, Uhlířský vrch u Milešova, hřbet Paskapole, hory Pilkovské u Bofislavi; jižní zaujímá Zinkenstein a Šenkelbergel u Kozlů, Kamýk u Všechlab a Skalku. Osamotnělé objevují se pouze na pravém břehu Labe.

Světlé čediče magmatové, vyskytující se převahou po různu v nejzazších okrajních pásmech, táhnou se rovnoběžně s hlavním pásmem směrem JZ—SV. Tvoří buď malé pahorky, jež se skládají ze svislých sloupců (jako pahorek Pšanský u Loun) aneb žfly (Budy u Bakova), pokryté slepenci, anebo se objevují na úpatí hor, zdviženy mladšími čediči aneb horninami fonolitovými (jako na úpatí Sedla, skládajícího se z fonolitů a na východním úpatí Fridlandského zámku, jenž z čediče andesitového se skládá).

Náležíce bez odporu mladším členům prvního občasí, vyskytují se pouze na nemnohých místech (na Křížové hoře u Libčovsi, na Kuzově u Třeblic, na starém Perštýně u Douby, na Limberku u Vartenberka a u Rychnova).

Na rozhraní prvního a druhého občasí stojí obecné čediče živcové. Známá jich naleziště jsou osamotnělá a ponejvíce dosti daleko od sebe vzdálená, tak že posud není lze, přesné ustanovení jich směru podati.

Na jihu českého Středohoří stojí vrchy čedičů živcových osamotnělé, jako Košov, Jeřetín a Radobyl (u Litoměřic), v části pak severozápadní a severní jsou čediče živcové (s hnědým sklovitým a trichyty bohatým magmatem) z Kolozruk, z Panznerova pahrbku, od Pohradice (u Bíliny), z Vrkoče, od Vranova u Ústí a z Labského kamene nad Ústím daleko od sebe vzdáleny, jevíce se, jak se zdá, co vynikající členové podzemní balvanité žfly (jejíž směr by pak byl JZ—SV); známá naleziště pravého břehu Labe (Holý kámen u České Lípy, Výhlídka na Rollberku u Mimoně, jenž se z fonolitu skládá, Radechov u Bělé, Horká u Mnichova Hradiště a Spálovská skála), mohou se položit do jedné přímé čáry, jež poukazuje k hlavnímu směru druhého občasí, totiž od SZ—JV.

Obecné čediče živcové, obsahující našedivěle bílé magma (z Církvice, ze Silbersteinu u Vratislavic, z Provodína, od Merklova, Šluknova, z Dědku u Kosmanos a z Kartouz u Jičína) obmezeny jsou pouze na jednotlivá naleziště; avšak přechody jejich v čediče andesitové více nasvědčují tomu, že se řadí k druhému občasí.

Z velmi sporých čedičů melafýrových vystupují Tolberg u Jablonce, Jelení hřeben a Vinohrady u Vartmberka, pak čedič u Iviny blíže Sichrova co osamotnělé kuzele poblíže krajiny melafýrové.

## 2. Občasí.

Již v předešlém bylo vytčeno, že nepochybně daleko převládající díl obecných čedičů živcových — jichž eruptivní směry pro skrovný počet a velikou vzdálenost jednotlivých nalezišť od sebe udati lze nebylo — do druhého občasí spadá; na-proti tomu s jistotou může se tvrditi, že čediče andesitové a fonolitové po větším díle aneb vesměs do druhého občasí náležejí.

Vynikajíce skoro všude v mocných a vysokých, řidčeji v nízkých balvanitých žilách aneb v proudech a stropch, táhnou se směrem Krkonošů, SZ—JV, rozšiřujíce se nejvíce v nejsevernější a severovýchodní části Čech.

Nejhlubší rokle tohoto území, jež převahou čediče andesitové zaujímají, jest koryto řeky Ploučnice, která — od Žandova až k Děčínu čediči andesitovými obroubena jsouc — od České Lipy k Děčínu stejným směrem od JV k SZ skoro přímočárně se ubírá. Z území Ploučnice jsou známy čediče andesitové a fonolitové z Pecberku u Hirsberku, z Koutné hory u Čes. Lipy, z Homole (Hutberg) u Petrovic, od malé Bukoviny, z Liščí hory, z Hannbuše, od Františkova, Šarfensteinu, Malé Veleně, z Homole (Hutberg) a hornatiny Březinské.

V severním, rovnoběžném pásmu téhož druhu jsou čediče známy od Hořejší Kamenice, Poppenberku u Ludvikovic, z Dubin u Jablonce, mezi Cvikovem a Röhrsdorfem a od Pikelsteina u Chřibské. Nejvýše na severovýchodě jsou pak čediče Friedlandského zameckého vrchu a Hagebergu u Friedlandu.

Jižní, rovnoběžná místa, Ploučnici nejbližší jsou: Veneřice, Rytířov a Vrabinec. Rovnoběžně k údolí Malého Března táhne se roklina u Leichenbergu, v níž se drobnozrné a velmi jemnozrné čediče andesitové vyskytují; ony srovnávajíce se se zrnitými čediči andesitovými protějšku břehu Labe mezi Povrly a Roztoky, ubírají se patrně směrem JV—SZ. V nejjižnější části pravého břehu Labe zaujímají čediče andesitové severní úpatí Křižové hory, Zlatou horu a pahorek u Hořejších Oslů blíže Ploškovic.

Dále na jihovýchodě v tomtéž směru vystupují: Palmová hora u Douby, Lípová hora a Fialková hora u Housky a Viná u Mšena. Osamotnělé objevují se čediče andesitové u Veseřic, na Machovské skále u Rybnic a ve Skokanských skalách u Železného Brodu.

Poměrně spoře vyskytují se čediče andesitové na levém břehu Labe v českém Středohoří.

V území Ústí-Děčínském tvoří hřbet Blankensteinský mezi Lipovem, Spansdorfem a českým Bukovem téměř pokračování žíly čediče andesitového, který se mezi Povrly a Roztoky objevuje a k němuž se na severu a jihu přes český Bukov (Šiklův mlýn), Žezici (Seesitz) a u Skorotic (Gänseberg) krátké rovnoběžné směry přidružují.

Skoro přímočárně a směr čedičů andesitových ostře označujíc táhne se hora Střížovická — jemnozrnými, porfyrickými a krystalicky celistvými odrůdami čediče andesitového a fonolitového bohatá — zároveň s přímočárným pokračováním Chlumeckých čedičů andesitových, jimiž Chabařovicko-Trmická pánev hnědého uhlí od-

dělena jest od Skoroticko-Ústské. Mimo čedič andesitový z Tuchomyšle, jenž Vrbou popsán a vyobrazen byl a jenž tvoří jižní pohraniční bod pánve Teplicko-Trmické, objevují se též andesitové čediče východně od Trmic.

Z území Bělina a Labe známy jsou čediče fonolitové ze Zálesí a Dubic na Labi, čediče, haunem bohaté, z Košťálova, Veršetínu a ze Žichova, nefelinem pak bohaté ze Želkovic, konečně hojný augit (amfibol) obsahující čediče andesitové od Libšic u Bělina.

V pohoří Doupovském objevují se čediče andesitové a fonolitové dosti hojně, za to však fonolity a mladší horniny eruptivné skoro úplně scházejí, z čehož souditi lze, že nejmnomnější erupce pohoří toho do druhého občasí spadají.

Celé pohoří toto proniknuto jest pásmy hor, jež se zvláště dvěma, křižujícíma se směry vyznačují, totiž od JZ—SV a od JV—SZ a skládá se — jakž nyní mikroskopickým rozbořem čediče asi 20 nalezišť čedičových dokázáno — pouze z čedičů leucitových a andesitových (fonolitových). Čediče leucitové leží v hlavním pásmu čedičového horstva českého od JZ—SV a proniknuty i zdviženy jsou čediči andesitovými směrem od JV—SZ. Čediče tyto jsouce ponejvíce nejmladšími horninami Doupovského pohoří zaujímají nejvyšší body jeho.

Největší díl údolí jižního pohoří Doupovského, souhlasí ve směru s převládajícími čediči andesitovými, táhna se rovnoběžně od JV—SZ, na severu pak v území čedičů leucitových rovnoběžným směrem od JZ—SV. Povšimnutí zasluhuje náhlé odbočení se severozápadního směru, jímž se Mlýnský potok v území čedičů andesitových ubírá, ve směr severovýchodní (zde Aubach zvaný), kdy vstupuje do krajiny čedičů leucitových.

Z čedičů andesitových skládá se nejvyšší vrchol a západní svah pohoří Mlýnského, severní svah hory Čebíšské, Křoviny u Mastova, vysoké Čihadlo u Turče, mateční hornina hyalitů od Valče a čedič z Andělské hory u Karlových Varů.

### 3. Občasí.

Třetí občasí zahrnuje ony odrůdy čedičové, jež se táhnou hlavním směrem od S—J, kloníce se začasť slabě k západu neb k východu. Jsou to čediče trachytové a tachylitové. Ony pronikají trachytickými fonolity aneb jinými horninami čedičovými co žíly zděm podobné, skoro rovnoběžné, 1—3' široké, tyto pak tvoří rozvětvené a různě se křižující, ponejvíce jen několik palců tenké žíly, jež začasť na stěnách svých povlaky tachylitovými pokryty jsou. I tyto jsou buď téhož stáří co čediče trachytové, aneb ještě mladší, oboje pak jeví se co nejmladší horniny eruptivné v Čechách.

Čediče trachytové vyskytují se převahou v severní části českého Středohoří mezi Ústím a Děčínem, zvláště ale v krajině mezi Veselím a Prosemmou na levém a pak na pravém břehu Labe mezi velkým Březnem a Nabočady. Provázejí obyčejně trachytové fonolity, jež onu krajinu ve velmi četných žilách prostupují.

Nepochybně prorylo jihoseverním směrem i Labe koryto své v krajině této v době eruptivní činnosti třetího občasí.

Z levého břehu Labe skoumány jsou čediče trachytové mezi Povrly a Veselou,

od Dubkovic, z údolí Prosemné a ze Spandorfu-Blankensteinu, pak z pravého břehu Labe od Těchlovic, z rokle u Leichenberku, několik odrůd z údolí Malého Března a od Bachstreicherova mlýna u Velkého Března. Mimo to známy jsou ještě mnohé jiné žíly čedičů trachytových, jež dleem v trachytických fonolitech dleem v jiných čedičích vystupují.

Jelikož v čedičích trachytových buď nosean buď nefelin buď živec převládá, a jelikož jen zřídka všechny neb dvě tyto součásti téměř ve stejném množství jsou vyvinuty, není tudíž divu, když vyskytují se i odrůdy, v nichž dvě z oněch živcových součástí úplně scházejí. Mohou tedy čediče trachytové objeviti se buď co čisté noseanity (ku př. na hoře Kunětické) nebo co nefelinity (ku př. ze Střekova) aneb co čediče živcové (ku př. z údolí Prosemné), aniž by se tím onen zvláštní ráz skrytého slohu, zvláště pak ono různoběžné uložení hrotovitých jehlic amfibolu zastírelo (tato známka bývá pouze za hruběji zrnitého vytvoření méně význačná).

A právě úkaz tento, zdá se, že jest postačitelý, aby i zrnitému nefelinitu ze Střekova, jenž tam asi ve čtyřech, téměř rovnoběžných, od jihu k severu se táhnoucích žilách se objevuje a čediče leucitové (a jak se zdá i andesitové) proniká, stáří čedičů trachytových přirčeno bylo. Mimo zmíněná naleziště objevují se čediče trachytové dále na Růžové hoře (Rosenstein) (severně od Děčína), u Radoušova, (blíže Uštěku) na Eichperku u horní Libchavy (blíže České Lípy) a u Premut; tolikéž noseanit z hory Kunětické nejvíce se blíží čedičům trachytovým.

## Poznámky o eruptivních směrech nejdůležitějších odrůd čedičových v jiných zemích.

Zdá se, že poměry směrů eruptivních jednotlivých odrůd čedičových, jež v severozápadních a severovýchodních Čechách jsem byl vyvinul, platí nejen pro naleziště čedičová blízkých zemí, nýbrž nepochybně pro celé čedičové horstvo na zemi vůbec; postupně však stáří nezdá se býti všude stejné.

Pozorujeme-li odrůdy čedičové, Zirklem skoumané a jich dle určitých směrů převládající rozdělení, seznáme, že panují nejen pro čediče leucitové a nefelinové, nýbrž i pro čediče živcové (jež převahou, jak se zdá, čedičům andesitovým a fonolitovým náležejí) tyže eruptivní směry, jež naleziště česká vykazují.

Celkem táhnou se též čediče leucito-nefelinové směrem od jihozápadu k severovýchodu (JZ—SV), čediče živcové od jihovýchodu k severozápadu (JV—SZ), srovnávající se s hlavními pásmy horskými a hlavními údolími neb řečišti svých krajin.

České Krušné hory vykazují pouze čediče leucitové a nefelinové (Oberwiesenthal, Šibenberk, Domina u Šebastianberku, Pélberk).

A rovnoběžně ke Krušným Horám (JZ—SV) ubírají se čediče leucitové a nefelinové v Sasích (Geising, Stolpen, Wiliš, Herzogswalde, Spechthausen) v českém Středohoří, v Doupovském pohoří a ve Smrčinách (Beurenth).

Čediče tyto pokračují téměř přímým směrem ve Švábských Alpách (Eisenrüttel, Neuhausen, Sachsberg), v Černém lese, v údolí Flsenu a v Kaiserstuhlu (Weiler, Auerbach, Oberberger, Rothweil).

Zdá se, že týmž směrem táhnou se i lávy Eiflerské, čediče nefelinové pak z Odenského lesu (Katzenbuckel) jeví v pokračování vysoké Rhöny (Kaltennordheim, Poppenhausen) — více k severu se kloníce — malé poněkud odbočení.

Čediče živcové severního Německa mezi Harcem, Durinským lesem a údolím Rýnu (mezi Rüdesheimem a Düsseldorfem pod Kolínem) táhnou se převahou směrem Durinského lesa a onoho údolí Rýnu (od JV—SZ). Tak na př. uložena jsou místa čediče živcového v okolí Kasselu (Wilhelmshöhe, Körle a Göttingen) v pokračování lesa Durinského.

S těmiže směry, zdá se, že srovnávají se i horská pásma ve Francii, jež naleziště čedičů živcových vykazují (v Auvergni, Cantalu, Valais, Vivarais).

Pro směry čedičů živcových jsou dále význačná i severozáp. naleziště evropská totiž na Islandu, souostroví Farönských, jež s územím čedičů andesitových v Čechách s řečištěm Ploučnice (SZ—JV) téměř v jednom směru leží.



## O vrostlicích různých druhů hornin a nerostů

v českém horstvu čedičovém, pak o změnách hornin vlivem čediče způsobených.

---

Výstupy čedičů děly se v horninách sedimentárních všech útvarů; hlavní však proud českého čedičového horstva obmezuje se na území křídového a třetihorního útvaru.

V Čechách proniká čedič:

*žulu* v Českém lese (u Liebensteinu) a ve Středohoří (mezi Dubkovicemi a Prosemmou);

*granulit* mezi Damícemi a Vočí (na levém břehu Ohře);

*rule* v Rudohoří, na četných místech žateckého kraje (u Přísečné, na Šaibenbergském hřebenu, na velikém Hassberku u Břliny);

*svor* u Chebu (Kammerbühl);

*břidlici prahorní* u Polínek v jihozáp. Čechách a u Veseřic (Ostrý a Zámecký vrch);

*spodní a svrchní silurský útvar* středních Čech, v němž na hoře Karabínské u Svárova (panem prof. Šafaříkem) a u sv. Ivana (p. J. Barrandem a prof. Krejčím) čedičové balvany objeveny byly;

*kamenouhelný a permský (dyasový) útvar* u Vinařic, Slaného a na četných místech v severových. území českém;

*křídový útvar* (zvláště opuku, kvádrový pískovec, bakulitové vrstvy) na velmi četných místech severních Čech (ku př. na Panznerovu pahrbku u Bilíny, u Kuzova, na Hanšburku, na Mužském a u Čes. Dubu);

*třetihorní vrstvy* českého Středohoří a pohoří Doupovského (břidlice, pískovce, vrstvy hnědého uhlí atd.)

Jako při činnosti sopečné vůbec, tak značí se i působení vyvřelé čedičové hmoty nejen ve vyzdvížení, přeházení a ztroskotání sousedních hornin, pak v četných vrostlicích úlomků z proražených hornin a v ohromném tvoření se slepenců, vzájemným drobením povstalých, nýbrž i ve fyzikální a chemické změně vrostlic a sousedních hornin. A změna tato nejví se projevuje na místech dotýčných, nýbrž rozšiřuje se neztídka na celé skály.

Přehojné toho příklady uvedli již Reuss a Jokely ve svých geognostických dílech a téměř každé území českého Středohoří podává četné nové doklady.

V českých čedičích známy jsou ce vrostlice tyto horniny:

*žula* v čediči mezi Dubkovicemi a Prosemmou;

*rula* a zkřemenělé kusy *břidlice* na jihoz. úpatí Bořeně u Biliny. Velmi četně vyskytují se vrostlice hornin útvaru křídového a třetihorního.

*Opuka* objevuje se na př. v čediči hory Kuzovské u Třeblic, v (sloupovitém) čediči Panznerova pahorku, u Podhradic, v čediči od Břenky, od Sovína u Litoměřic, od Kašova u Sichrova. Veliké spousty opuk uzavírá čedičový slepenec z Humborku u Šířejovic a pevný slepenec od Bud u Bakova.

Neméně často vyskytuje se též sypký *pískovec*, buď mezi čedič a slepenec uložený aneb co vrostlice v pevném čediči zaujatý, v posledním však případě úplně přeměněný (zkřemenělý) v pevnou horninu křemencovou.

Týž se nachází na př. mezi Prosemmou a Gleimrem, v rozsedlině u Vanova, na Šibenici u Ústí, v rozsedlině u Střekova, na pravém svahu v údolí Malého Března, u Kamenice, na jižním svahu údolí u Prosemmé (uzavřen mezi trachyt a čedič).

*Břidlice*, čedičem úplně uzavřená, vyskytují se na př. na pravém svahu údolí Malého Března, jmenovitě u Leštiny, dosti zhusta; v témž množství pozorovati je lze mezi Dubkovicemi a Prosemmou, pod Dubickým kostelem a na j. m.

Také hnědé *uhlí* od Zálesí u Velkého Března, žilami čedičovými mnohokrát zdvižené a proniknuté, objevilo se co saze v hlubokých trhlinách mezi jednotlivými balvany čedičovými a co pevné uhlí (co hnízdo 1' p.), čedičem úplně uzavřená. \*)

Sladkovodní *vápenec*, v čedičovém slepenci uzavřený, nachází se na vozové cestě mezi Kostomlaty a Hlincem.

Vedle vrostlic úlomků z hornin objevuje se také v čediči dosti zhusta nerost, jenž nemůže se pokládati za hmotu, vyloučenou z čedičového magmatu, nýbrž za vrostlici nahodilou. Jest to *křemen*, jehož ponejvíce zakulacená zrnka nejen v slepencích, nýbrž i v pevných čedičích — jmenovitě v takých, jež s horami křemen obsahujícími ve styku stojí — dosti hojně se vyskytují.

Tak na př. obsahuje čedič z údolí Telnického, spočívající na granitu, veliké množství 1—4" velikých zrněk křemene; skoro 1/2" veliká, našedivěle bílá, kalná zrnka křemene vyskytují se v pevném čediči od Vebruc u Litoměřic (ve styku s kvádrovým pískovcem). —

Zvláštní jest fysikální a chemické působení hmot čedičových na sousední horniny. Obyčejně vzaly tyto takové vlastnosti na sebe, jaké prozrazují za působení značného žáru. Horniny, bohaté kyselinou křemičitou, staly se pevnými, tvrdými a na povrchu začasté skelnými. Křemičité horniny, hojnost kysličníku vápenatého a hlinitého obsahující, přijaly ráz pevné a tvrdé, na zdání stejnorodé hmoty, vynikající lomem lasturovým, která svým videm velmi často jaspisovitým výtvarům vypálených ložisek uhlí se podobá.

Veliké, na povrchu začasté sklovité balvany slitého, na křemenec přeměněného pískovce — dílem v slepencích uložené, aneb, byly-li tyto odplaveny, po stránkách roztroušené — objevují se v celém čedičovém území, zejména v jižním okrajním

\*) Reuss, Lotos 1852, 163.

pásmu velmi často; tak na př. na severním svahu vrchu Milého, na úpatí Oblíku, Zlaté hory (u Ploškovic), hory Křížové blízko Třebušína a j.

Kvádrový pískovec, v bezprostředním styku s pevným čedičem se nalézající, bývá toliko spečen a na místech dotýčných povlakem, asi  $\frac{1}{2}$ " tlustým, jenž hematitem a limonitem proniknut jest, od čediče oddělen. Možná, že i vtékáním vod, jež na rozhraní dvou různých hornin nejsnáze se děje, působení vespolná méně zřetelnými se stala.

Takovým dojmem působil na mne pohled na pískovcové stěny v lomu Čertové zdi „na břizách“. Ačkoliv zde zeď pískovcová zdi čedičové přímo se dotýká, tož nebylo lze pozorovati na kvádrovém pískovci leda mírné vypálení; i úlomek lastury, jenž se tuto v pískovci objevil, nebyl na pohled porušen. Tolikéž různé změny jeví opuka, která blíže neb ve styku s čedičem se nachází; na př. na úpatí Hanápurku vyskytují se sklovité a rohovité kusy opuky; na Mužském u Mnichova Hradiště nacházejí se opukové balvany, jež ve velmi pevnou a tvrdou, na zdání stejnorodou hmotu lomu lasturového přeměněny jsou. V lomu od Břlenky obsahuje čedič kousky opuky, jež, nejsouce od hmoty čedičové ostře odděleny, velikosti hrachu až i pěsti dosahují a jaspisový vid mají. Podobného druhu jest opuka z Dubického vápeného lomu, která se tam ve styku s čedičem nachází. Kusy opuky proniknuty jsou velmi úzkými žilami čediče a větší i menší kousky uzavřeny jsou v čediči; nikde však nevynikají obrysy vrstlic ostře, nýbrž mezi smíšenými hmotami jsou poněkud přechody; čedič a úlomky opuky splynuly v jednu, namodralé, nazelenalé, našedivělé neb černě mramorovanou horninu.

Zajímavé jsou četné, nazelenalé, namodralé aneb našedivělé vrstlice opuky v čediči od Pohradic blízce Břliny, které vyvrhelou hmotou čedičovou se byly přeměnily. Okrouhlé, začasté kapkám podobné, místy velmi hojné (také v mikroskopické velikosti se jevící) dílce její jsou buď celistvé, buď zřejmě zrnité. V kyselínách šumí větším dílem. Pod mikroskopem mají na různých místech různý ráz. Světlejší dílce obsahují bezbarvá, více méně zaokrouhlená zrnka křemene, jež v hmotě podstatně vápené — která, nescíslnými pory plynovými zakalena jsouc, na nejtenčích místech našedivělé neb žlutavě bílou se jeví a v polarisovaném světle šedě zbarvena bývá — více méně hustě rozdělena jsou.

Tyto křemenité dílce objímají tu a tam světlejší, našedivělé bílá, okrouhlá místa, jež hustým vřencem porů plynových a zrnky práškovými omezena jsouce, více méně sypké skupiny velmi jemných mikrolithů uzavírají.

Temnější dotýčná místa opuky s čedičem skládají se převahou ze součástí hmoty čedičové v mikrolithickém vytvoření. U většiny pozorovati lze šedivé mikrolithy augitové, smíšené s bezbarvými, tyčinkovitými krystalky živce neb nefelinu a s velmi sporými, většími neb menšími zrnky olivinu. Magnetit objevuje se v osamotnělých zrnkách, poněvčí však co prášek, smíšený s nescíslnými pory plynovými a jest nescísně roztroušen. Tato dotýčná místa uzavírají buď četné, nažloutle šedé, chomáčům vlny podobné skvrny (jež jsou buď skupiny trichitů, buď na polo krystalovaná místa) aneb četné drobounké i co špendlíková hlava veliké kuličky, které se dílem z paprskovitých výtvarů zeolitových, dílem z uhlíkatů, vyznačených na okraji soustředními (začasté jemné vláknitými), vrstevnatými čarami, uvnitř pak pravidelnými trhlinami (po kalcitu) skládají.



Světlošedé vrostlice opukové v čediči Panznerova pahrbku, jež v kyselinách dosti silně šumí, ostatně však čediči od Podhradic velice se podobají, skládají se, za 400. zvětšení, z mikrolitické hmoty, která, jsouc z krystalků augitových, bezbarvých tyčinek a prášku magnetitového složena a hustými skupinami porů plynových všude zkalena, hojné, bezbarvé, pravidelně do kruhu omezené, neb poněkud ovální, dšlem v paprskovité zeolity, dšlem v patrnou vápencovou hmotu přeměněné dšlce (zvící máku neb špendlíkové hlavy) obsahuje.

Nemnohé z nich jeví na okraji čáry klikaté a vrstevnaté, slabě zbarvené; většina jich jest však úplně bezbarvá a náleží dle trhlín hmotě vápencové. Mnohé obsahují široký věnec nahnědlých zrněk práškových a bublinek a u vnitru svém kruhovitou skupinu.

Velmi četné, nejvíce co levandule modré (též namodrale, nazelenale neb nažloutle šedé), co ořech i co vejce veliké vrostlice opuky v čediči od Břlenky protaženy jsou četnými žilkami dšlem hmoty šedivé (hmoty čedičové), dšlem hnědé (limonitové). Na okraji splývají ponenáhlu v hmotu čedičovou a uzavírají malé dšlce čediče. Skoro každá opuková vrostlice jeví dšlce různých barev, avšak v bezprostředním styku s hmotou čedičovou jest vždy temnošedou. Mikroskopické destičky opukové vrostlice od Břlenky vykazují četná, zaokrouhlená zrnka křemene v kalné, šedivé směsi mikrolitů, dšlců sklovitých i bublinek. —

Povšimnutí zasluhuje též sloupovitý tvar hornin, s čedičem se stýkajících, jenž — dle obdoby sloupových tvarů čediče a kamenů v ohništích vysokých pecí — za následek stejného, pozvolného ochlazení se má.

Sloupovitý pískovec z třetihorního útvaru znám byl již z několika míst českého čedičového území. Pravidelné, přes 1' vysoké a několik palců tlusté, kolmé sloupy pískovcové nalézají se ku př. u velkém množství nedaleko (jižně) od Střekova (u Ústí) a sice bezprostředně pod prstí.

Avšak i kusy opuky, čedičem obalené, jeví začasť více méně zřejmé sloupovité vyloučení a zároveň i paprskovité uložení v podobě koule.

V ohledě tom zajímavé jsou lomy u Bud nedaleko Bakova. Asi 3' mocná, z vodorvných sloupů se skládající čedičová žíla, zdvihá se směrem JZ—SV ve třech málo vynikajících pahorcích, jež se skládají z pevného, balvanitého, sloupovitou žílu obklopujícího čediče, výše pak a na okraji ze slepenců čedičových. V balvanité hornině čedičové vyskytují se četné kusy opuky, tvrdé a vypálené; někdy však lze pozorovati, že větší kus z menších úlomů se skládá, jichž plohy kysličníkem železitým potaženy a nahnědle neb červeně zbarveny jsou. Nad balvanitým čedičem, ve zbytkách slepenců čedičových, které co trosky vynikají, nachází se opuková koule, jež z paprskovitých, stejně dlouhých, vícehraných sloupců složena jest a nedaleko pod ní vyčnívá úlomek druhé koule téhož rázu. Též v lomech druhého i třetího pahorku objevily se podobné, patrně sloupovité koule opuky co vrostlice v čediči.

Sloupovitý tvar objevil se též na hnědém úhlí v dolu „Boží naděje“ u Zálesí, kdež toto v bezprostředním styku s žilami čedičovými se nalézá.<sup>1)</sup> Asi 1—1½'

<sup>1)</sup> Reuss, Lotos 1852, 163.

mocný, na čedičové žíle spočívající pruh uhlí — jenž, úplně dle obrysů čedičové žíly se ukládaje, místy hluboké výběžky mezi čedičové balvany vysílá — rozštípán jest na dotýčných místech na  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ '' tlusté a  $2\frac{1}{2}$ —3'' vysoké, mnohohrané sloupce, které vždy na ploše styku, ať si tato jakkoliv různé okliky tvoří, kolmo stojí a výše ponenáhlu v celistvé uhlí splývají. Tyto úhelné sloupečky, které ve všech svých poměrech se sloupkovitým uhlím Míšeňským (v Hessensku) se srovnávají, postrádají látek těkavých. —

Velmi zajímavé výsledky poskytují i chemické rozborů vrostlic opukových od Bílenky a opukových balvanů čediče Kunětického.

K mé žádosti proveden v laboratoři pana prof. Šafaříka panem assistantem K. Preissem rozbor opukové vrostlice barvy modré co levandule od Bílenky — již hutnost jsem = 2.924 (19 gr.) určil.

Rozbor vykazoval v ‰:

|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| kyseliny křemičité  | = | 46.10 |
| kysličnku hlinitého | = | 13.70 |
| „ železitého        | = | 8.48  |
| „ železnatého       | = | 4.01  |
| „ vápenatého        | = | 13.69 |
| „ draselnatého      | = | 1.01  |
| „ sodnatého         | = | 3.99  |
| kyseliny uhličité   | = | 8.45  |
| vody                | = | 0.50  |

V studené kyselině solné rozpustilo se 35‰; roztok ten obsahoval:

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| kysličnku železitého | = | 0.96        |
| „ hlinitého          | = | 13.22       |
| „ vápenatého         | = | 13.07       |
| kyseliny uhličité    | = | 8.45        |
|                      |   | <hr/> 35.70 |

Pozorujeme-li rozpuštěný podíl, tu stává se nám především poměr kyseliny uhličité a kysličnku vápenatého nápadným. 8.45‰ kyseliny uhličité vyžaduje 10.75‰ kysličnku vápenatého k vytvoření uhličitanu vápenatého; zbytek pak 2.32‰ může se považovati za vápno žravé. Tím by byl tedy díl kyseliny uhličité působením vyvrhelé hmoty čedičové vypuzen. Nápadné toliko zajisté jest, že, ano se veškeré množství kysličnku hlinitého v rozpuštěné části nalezlo, právě žiraviny nerozpuštěnému dílu připadly.

Poněvadž opuka obvyčejně pouze stopy po žiravinách jeví, přijato jest zajisté ono značné množství žiravin, skoro 5‰, z hmoty čedičové.

Pro přeměnu opuky Bílenské význačna jest i hutnost (2.924), která u jiných opuk jen ve velmi řídkých případech dosahuje 2.6 a obvyčejně jen 2.2 se rovná.

O chemickém působení čediče hory Kunětické na opuku, jež s ním ve styku se nalézá, podávají E. Jahnovy (chemické) rozborů zajímavé výsledky. \*)

\*) Živa 1859, 4. sv. 197 a Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien XII. 1862, 157.

Na hoře Kunětické nacházejí se tři veliké balvany opuky, jež jsou čedičem dílem zdviženy, dílem uzavřeny a přeměněny.

1. Opukový balvan jižního úpatí, jenž má asi 15° v objemu, jest pouze na dotýčných místech zřejmě přeměněn a barvy zbaven. Skameněliny, zejména foraminifery, jsou v něm neporušeny.

2. Opukový balvan, na severových. straně se nacházející, asi 30° vysoký, jest skoro celistvý a lomu lasturového; ocelem otloukán jiskří. Barva jeho jest co levandule modrá, avšak zvětřením sezelená a konečně zežloutne.

3. Na severním svahu jest balvan opukový, mající asi 18° v průměru. Hornina tato jest co levandule modrá (na vzduchu barvy nemění) a má lasturový a tříštivý lom; ocelem otloukána jiskří a bývá žilkami křemene proniknuta. Nikde nenalézají se v ní stopy po zkamenělinách. Zdá se, že právě tato opuka byla roztopena, neboť mezi opukou a čedičem není žádných určitých mezí, nýbrž mezi oběma nalézají se pohnuté přechody a jednotlivé žilky její pronikají čedičem (beze všeho zřejmého omezení).

Průby následujících tří rozborů vzaty jsou z dotýčných míst čediče:

- I. opuka, šedomodrá, hustá, lomu lasturového; ze severní strany hory.
- II. „ bílá, slabě namodralá; z již. strany hory.
- III. „ co levandule modrá, lomu lasturového, mění svou barvu na vzduchu.

|                                      | I.    | II.   | III.  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Uhličitanu vápenatého . . . . .      | 5·00  | 13·63 | 5·40  |
| „ hořečnatého . . . . .              | 0·46  | —     | 9·99  |
| žiravého vápna . . . . .             | —     | 8·41  | —     |
| prostého hořečku . . . . .           | —     | 1·88  | —     |
| kyseliny křemičité . . . . .         | 59·69 | 47·40 | 61·00 |
| kysličníku hlinitého . . . . .       | 7·62  | 15·60 | 14·20 |
| „ železitého . . . . .               | 13·42 |       |       |
| „ vápenatého v křemičitanu . . . . . | 4·98  | 4·24  | 1·80  |
| „ hořečnatého . . . . .              | 1·45  | 1·52  | 0·92  |
| žiravin . . . . .                    | 4·84  | 2·24  | 2·48  |
| ztráty při pálení . . . . .          | 2·40  | 5·00  | 4·20  |
| hustnost . . . . .                   | 2·686 | 2·716 | 2·560 |

Následujících pět průb pochází z velikého balvanu na jižní straně hory a sice každá následující průba jest z místa od čediče vzdálenějšího.

- IV. Opuka, temně nazelenale modrá, velmi jemnozrná, nerovného lomu, velmi tvrdá (při uhození zvoní); má stopy po zkamenělinách.
- V. Opuka špinavě šedá, nerovného lomu, u vnitru namodrale šedá, méně tvrdá; v ní Ananchytes ovata Lamarck.
- VI. Opuka světle našedivěle bílá, okrovitým kysličníkem železitým prostoupená.
- VII. Opuka, našedivěle zelená, šedě kropenatá, lomu tříštivého neb nerovného; v ní se nalézají Dentalium medium Sowerby, Rostellaria Reussii Geinitz, Cerithium Lužicanum Geinitz.
- VIII. Opuka, světle šedomodrá, celistvá, hrubě lasturového lomu; obsahuje četné foraminifery.

|                                      | I.    | II.   | III.  | IV.   | V.    |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uhličitanu vápenatého . . . . .      | 9·11  | 27·27 | 10·03 | 10·48 | 15·49 |
| žíravého vápna , . . . .             | 2·96  | 4·37  | 2·21  | 3·52  | 3·54  |
| prostého hořčíku . . . . .           | 0·64  | 2·64  | 0·50  | 1·01  | 1·08  |
| kyseliny křemičité . . . . .         | 52·50 | 34·81 | 68·16 | 49·90 | 47·64 |
| kysličnku hlinitého . . . . .        | 12·20 | 11·03 | 6·90  | 7·93  | 14·62 |
| „ železitého . . . . .               | 9·84  | 10·57 | 3·88  | 16·94 | 3·70  |
| „ vápenatého v křemičitanu . . . . . | 0·63  | 1·97  | 0·27  | 0·34  | 1·56  |
| „ hořečnatého „ . . . . .            | 1·11  | 1·42  | 0·68  | 0·98  | 1·78  |
| žíravín . . . . .                    | stopy | stopy | stopy | stopy | stopy |
| ztráty při pálení . . . . .          | 10·60 | 7·00  | 7·20  | 8·20  | 5·60  |
| hutnost . . . . .                    | 2·126 | 2·383 | 2·416 | 2·340 | 2·303 |

Tři poslední průby pocházejí z velmi vzdálených míst téže krajiny.

IX. Opuka, měkká, hlinitá, lomu zemitého, zvětralá.

X. „ nazelenalá, pevná.

XI. „ „ „ obsahující pyrit a sádrovec a bohatá jsouc foraminiferami; rozpadá se na vzduchu.

|                                      | IX.   | X.    | XI.   |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Uhličitanu vápenatého . . . . .      | 15·60 | 45·01 | 14·13 |
| „ hořečnatého . . . . .              | 1·76  | —     | 2·86  |
| kyseliny sírové . . . . .            | stopy | stopy | 0·41  |
| „ křemičité . . . . .                | 52·69 | 25·80 | 47·02 |
| kysličnku hlinitého . . . . .        | 11·76 | 5·03  | 15·08 |
| „ železitého . . . . .               | 5·11  | 8·21  | 8·32  |
| „ vápenatého v křemičitanu . . . . . | 0·28  | 1·16  | 0·31  |
| „ hořečnatého „ . . . . .            | 0·46  | 0·29  | 0·19  |
| žíravín . . . . .                    | stopy | stopy | stopy |
| ztráty při pálení . . . . .          | 12·40 | 14·40 | 11·20 |
| hutnost . . . . .                    | 2·122 | 2·183 | —     |

Z analytických výsledků i opuk, jež působením roztopeného čediče přeměněny byly i oněch, čediče vzdálených, vychází na jevo toto:

1. Ve všech průbách opuk čedičem zdvižených objevují se žíravé zeminy, což jest důkazem toho, že kontaktní čedič trvale roztopen býti musil, jelikož uhličitanu jen trvalým žářem žíravými se stávají.

2. Poněvadž ze všech 11 průb pouze v oněch značnějších podíly žíravín se našly, jež z dotýčných míst čediče vzaty byly, v ostatních pak pouze stopy se objevily, tož není pochybnosti, že žíraviny opuk dotýčných z hmoty čedičové pocházejí. Z toho jde zároveň na jevo, že i dotýkající se opuka tekutou býti musila. Zdá se, že opuka mimo žíraviny též část kyseliny křemičité přijala; naproti tomu však ztratila největší díl hmot těkavých (vodu a ústrojně látky).

3. Působením roztopeného čediče ztvrdly opuky, staly se pevnější a dosáhly vyšší hutnosti.

Zajímavá jest též chemická proměna, jakou nabylo hnědé uhlí, čedičem zajmuté neb proniknuté. Proměnu tuto pozorovati lze ku př. u Zálesí (nedaleko Velikého Března).

Nejen že hnědé uhlí následkem vysokého tlaku mnohem hustším a pevnějším se stalo a tímž co pěkný druh smolného uhlí (intenzivního lesku a výtečného lasturového lomu) se jeví, nýbrž ono poblíže žil čedičových i zcela se rozdrtilo a na slepenec úlomků, sypkou, uhelnou hmotou spojených, se přeměnilo.

Při tom ztratilo hmoty téžavé a nabylo rázu přirozeného, šedo-černého koaksu. Za to nahromadila se bituminosní hmota jeho na jiných, vzdálenějších místech a utvořila tam i co hlava veliké, v uhlí ležící hnízda nahnědle černé, lesklé, drobné, zemské smůly — pyroretinu\*)

### Prvotní č. původní sloh hornin čedičových.

1. Dle poměrné velikosti a dle rozdělení součástek nerostních, jsou čediče:

a) *stejně* (drobně neb jemně) *srnitě* neb *krystalicky celistvé*.

Tento sloh mají všechny odrůdy čedičové, vyjímaje čediče peperinové.

b) *Skvrnitě-srnitě*.

Skvrnitě zrnitý sloh, který se prozrazuje vystoupením četných, menších i větších, temnějších skvrn, vyskytuje se jen ve velmi jemnozrných a krystalicky celistvých čedičích, a omezuje se poněkud na malé díly nalezišť čedičových. Zakládá se zajisté na nestejném rozdělení nerostních součástí, totiž na vytvoření se velmi drobných, v čedičové hmotě téměř stejně rozdělených skupin č. kongregací buď jedné neb i více součástek nerostních buď přehojného, temného magmatu. Tyto skupiny neb shluky jeví se pak na lomných plochách čedičových co temné skvrny.

Význačně vytvořen jest sloh tento v nefelinitu z Bělošic, magmatem bohatém, v němž ony temné, poněkud co mák až i co víkev veliké skvrny právě oněm dílcům magmatu odpovídají, jež množstvím trichitů vynikají; totéž nalézáme na čediči živcovém z Radobyli, jež hojně magma obsahuje a na onom z Labské skály u Krásného Března. V mnohých čedičích andesitových, na nichž se sloh ten pozoruje, odpovídá velmi drobným shlukům větších i menších krystalů augitových, neb augitových a nefelinových; každý shluk opatřen jest pak okrajem, který se skládá ze shoustlé, mikrolitické, výtvoř trichitovými zkalené hmoty magmatové.

Přeměnou skvrnitě zrnitého slohu vytváří se sloh okrouhle zrnitý (kokolitický), o němž se v následující odstavci (druhotný sloh) zmínka činí.

c) *porfyrické*, vynikají-li v nich větší krystaly aneb krystalická zrnka olivinu, augitu, biotitu, rubelanu a živce.

Pouze v čedičích magmatových, nefelinových, leucitových a obecných živ-

\*) Reuss, Lotos 52, 162.

cových vynikají zrnka olivinová v takovém množství, že tím porfyrický sloh povstává, řidčeji bývá to v čedičích andesitových; naproti tomu však jsou čediče trachytové olivinem velmi chudé aneb postrádají ho úplně.

Augitická součást (augit, amfibol, hypersthen) může ve všech odrůdách čedičových tvořit sloh porfyrický.

Biotit a rubelan přispívají pouze v čedičích peperinových (leucitových) a trojklonný živec jen v čedičích andesitových a trachytových, zřídka v obecných čedičích živcových k vytvoření se porfyrického slohu.

2. Dle uložení nerostných součástí jest sloh čedičů :

- a) *naskrse bese směru* (ve všech odrůdách čedičových),
- b) *k určitému směru rovnoběžný.*

Sloh tento objevuje se v některých čedičích trachytových (ku př. od Těchlovic) a povstává uložení deskovitě rozšířených krystalů augitových do téměř rovnoběžných rovin.

- c) *proudový neb paprskový.*

Týž povstává v některých čedičích andesitových a trachytových, uloží-li se jehlice augitové neb amfibolové na způsob proudů aneb paprsků (jako v č. ze Zálesí). Podotknouti sluší, že tento sloh jest mnohem hojnější v mikroskopickém vytvoření, v kterémžto případě se tvoří poněvíc uložení jehlic živcových v proudech aneb v paprscích a že vyniká začasť již na broušených destičkách zvláštním, moirantikovým videm aneb náletem, ledovým kvítkům podobným (na př. čedič z Vinohradu u Vartmberka).

3. Dle prostoty, jež hmota horniny čedičové vyplňuje, jsou čediče buď celistvé buď dírkovité neb bublinaté aneb struskovité.

Úplné vyplnění prostoru i v sebe menších dílcích horniny čedičové jest nejobecnější, tak že neúplné vyplnění prostoru pouze k řidčím objevům náleží. A tyto obmezují se, jak se zdá, jen na schvrtní části čedičového horstva.

Dírkovité odrůdy čedičové vyskytují se, jak se zdá, zvláště mezi čediči nefelinovými a trachytovými, jsou však poněvíc omezeny na menší dílce některých nalezišť (ku př. Tannenwald u Mětikalova).

Bublinaté čediče objevují se dosti často, zvláště mezi čediči peperinovými a andesitovými. Bubliny jejich, protaženy jsouce poněvíc stejným směrem, jsou řidčeji prázdné, obyčejně na stěnách jemnými druzami druhotných výtvarů pokryty, neb infiltrovanými hmotami více méně vyplněny. Dosti zhusta vyskytují se čediče dírkovité v Doupovském pohoří mezi Turčí a Doupovem a v krajině Maškovské; v Středohoří jsou to poněvíc čediče peperinové v okolí Milešova a čediče andesitové ku př. od Kračína z Údolí Františkova, od Benešova atd. Nejobecnější druhotný nerost v bublinách bývá phillipsit.

Mimo struskovité, dílem i houbovité horniny čedičové z Kammerbühl, kdež i pumy a lapilly se vyskytují, známy jsou struskovité čediče z více nalezišť českého Středohoří, jmenovitě z Vlčí hory u Černošína, z Kozákova a z údolí Františkova u Benešova.

Není zajisté pochybnosti, že bublinatý a struskovitý sloh tím povstal, že se před utuhnutím horniny plyny vyvinovaly; zároveň lze se domysleti, že dle rozdělení vulkanických hornin času nynějšího odrůdy bublinaté převahou na nej-

vrchnější část hornin čedičových obmezeny byly. Tolikéž jest velice pravdě podobno, že v celém okrsku čedičového horstva byly struskovité kužele čedičové, jako na bocích a úpatí nynějších sopek, že však zvětřavše, k vytvoření se mocných ložišť tufů, jež v celém Středohoří se rozkládají, nejvíce přispěly. A proto nacházíme podnes v tufech těch časté úlomky bublinatých a struskovitých čedičů, jež svým vzhledem úplně se rovnají lávě.

## Sloh druhotný aneb přeměnou čedičového horstva povstalý.

1. Takým se jeví *sloh okrouhle zrnitý aneb kokolítický*, jenž se tvoří ze slohu skvrnitě-zrnitého, pokročila-li hornina ve své přeměně, a proto jest i výrazem pokročilé přeměny horniny. Zrnka, z nichž se skládají jednotlivé dílce čedičové, jsou ponejvíce z víc máku až hrachu. Tento sloh objevuje se v čedičích magmatem bohatých (magmatových, živcových) v nefelinitoidech a v čedičích leucitoidových, jakož v čedičích andesitových, jež vynikají množstvím drobných konkré; bývá však omezen na malé části čedičových nalezišť.

Tak na př. vyniká sloh tento na jednotlivých kusech nefelinitoidu od Bejkova u Jenšovic, z Ostrého u Milešova, z Radešova, z vých. úpatí Ronnberku u Radoušova a na četných kusech čediče z Lorety u Jičína; na Sovínu u Litoměřic pozorovati lze tento sloh pouze na jihozáp. úpatí čedičového pahorku v malém pouze rozsahu, naproti tomu nejeví sousední, stejný (výše položený) čedič prázdné stopy po slohu okrouhle zrnitém.

Cotta zmiňuje se o čedičích s takovýmto slohem z okolí Arnoltic a Kamenné Šenavy, pak v. Reuss z Hanšpurku, od Lužic a z Ostrého u Červeného Oujezda.

Jak známo, byla pronešena různá mínění o původu tohoto slohu v horninách čedičových.

Senft a Reuss měli za to, že sloh tento, jsa původní, v nestejném rozdělení čedičových součástí se zakládá, naproti tomu tvrdil v. Cotta, že jest výsledkem rozkladu hmoty čedičové. U výkladu mém, jenž určuje skvrnitě-zrnitý sloh za prvotní a okrouhle zrnitý za druhotný, pojí se oba náhledy.

2. *Sloh porosní*, jenž povstal zrušením jedné neb více nerostních součástí. Jest zcela přirozeno, že tento druhotní sloh zvláště v oněch jemnozrných a krystalicky celistvých odrůdách čedičových se vyskytuje, v jichž uložení snáze rozložitelné nerosty, jako hauyn, nosean, olivin, začasť i nefelin neb magma, podstatně se zúčastňují. Z té příčiny jeví se porosní odrůdy nejčastěji v čedičích, olivinem bohatých, pak v čedičích magmatových, peperinových, andesitových a trachytových, velmi zřídka však v obecných čedičích živcových.

### 3. *Sloh mandlovitý.*

Týž vzniká ponejvíce následkem slohu bublinatého. Z počátku pokrývají se stěny bublinatých prostorů druhotnými výtvy nerostními, jmenovitě zeolity, pak se vyplňují uhličitany aneb beztvornou kyselinou křemičitou.

## O tvarech, jichž odrůdy čedičové nabyly v době tuhnutí a jichž nabývají větráním.

Tvary, jichž nabyly odrůdy čedičové v době tuhnutí můžeme nazvati prvotními, tvary pak, jichž nabývají větráním z předešlých, druhotnými.

### 1. Tvary prvotní.

Co prvotní tvar jeví se ve všech případech tvar buď balvanitý buď sloupovitý a jen zřídka tvar deskovitý.

Sloupovitými tvary vynikají všelike odrůdy čedičové vyjma čediče peperinové.

Sloupy stojí, jak známo, kolmo na směrech (č. plochách), v kterýchž ochlazení se dělo; podobu a rozměry mají různé. Vyskytují se jednak co úzké neb tlusté, dlouhé neb krátké pilíře, jež jsou buď přímé buď ohnuté, zkrivené, dílem stejně tlusté, dílem na obou koncích užší než ve středu. I počet pobočných ploch jest nestejný. V stropech a proudech jsou sloupy ponejvíce kolmé, v žilách vodorovné, nicméně odchylují se směry na jednom a tomž místě rozmanitě, tak že od vodorovného k svisnému směru všechny možné stupně pozorovati lze. Krásný pohled jeví jmenovitě paprskovité uložení. Kůželovité vyvýšeniny a táhlé hřbety horské obsahují na nejzašším pásmu okrajním sloupy téměř vodorovné, úhel jich úklonu zvětšuje se ke středu tou měrou, že střední a nejvyšší sloupy kolmo stojí.

*Deskovitý tvar* co prvotní výtvar vyskytuje se pouze v čedičích fonolitových a andesitových.

V četných případech lze i v těchto poznati tvar sloupovitý; sloupy bývají však nesmírně tlusté a nezřejmě oddělené. Není zajisté pochybnosti (dle četných pozorování), že oba tyto tvary v mnohých čedičích, andesitových a fonolitových, v stejném čase se byly vytvořily; avšak desky, jež vždy na sloupech kolmo stojí, dají se (jsouce méně tlusté) snáze oddělit, tvar pak sloupovitý vyniká méně v popředí pro značnou šířku sloupů.

Deskovitým tvarem prozrazuje se přechod k fonolitům.

### 2. Tvary druhotní.

Za druhotné aneb zvětřáním povstalé tvary zaznamenati sluší (dílem) deskovité a koullovité neb elipsoidické.

Postoupilo-li větrání, rozpadávají se sloupy dílem ve více méně tlusté, příčné desky, dílem v koule. Ony tvoří se zvláště ze sloupů, v podobě žil uložených. Poněvadž poloha těchto ponejvíce jest vodorovná, vynikají pak desky, jež začasť celou žilou pronikají co kolmé, těsně k sobě přiléhající stěny a pokročilo-li větrání horniny ještě dále, rozpadávají se pak tyto snadno na drobné deskovité kusy. V takovém případě nebývá již sloupovitý tvar zřejmý.



Tenké, 1—3' mocné žíly kolmého a tence deskovitého (zvětralého) čediče vynikají ku př. v čedičovém pahorku u Pšan nedaleko Loun, jenž se téměř ze svislých sloupů skládá, pak v třetihorním pískovci od Vanova, a v sloupovitém čediči od Bořislavi.

V Pšanském pahorku vynikají dvě, asi 2' široké, ve svislé desky rozpukané žíly skoro kolmo blíže středu hory. Hornina těchto žil (světlý čedič magmatový) neliší se však od sousedního, uhličitany zatmeleného, sloupovitého čediče, leda tím, že obsahuje více vody a méně kyseliny uhličitě a tudíž, že působením kyslíku více se přeměnila.

Deskovitý čedič od Bořislavi náleží temným čedičům magmatovým a čedič Vanovský obecným čedičům živcovým (s nahnědlým, trichity bohatým magmatem).

Mnohem hojnější jest tvar *koulovitý* a *elipsoidický*, jehož tvoření takto se děje: z počátku objevují se čedičové sloupy vodorovnými a šikmými trhlinami v nepravidelné, ostrohrané kusy rozdělené. Kusy tyto zakulacují se vždy více neustálým působením vod na hranách a rozích, any se zatím prostory mezi jednotlivými úlomky uhličitany a menšími zvětralými drobty vyplňují. Rozpuštěním a odplavením uhličitany, sloužících co tmel, zbývají koule neb elipsoidy, v podobě sloupů na sobě narovnané. Nezřídka sledovati lze všechny tyto stupně přeměny v jednom a totéž sloupu čedičovém. V nejspodnějším díle bývají kusy ostrohrané, výše již více méně okrouhlé a uhličitany zatmelené, nejvýše pak v podobě narovnaných koulí upravené. Již na polyedrických úlomech přecházejících sloupů čedičových — zvláště na oněch, které na povrchu hnědě zbarveny jsou — lze pozorovati, že při roztloučení nejzevnější vrstvy zřejmý, miskovitý tvar jeví a že, odstraní-li se pozorně zevní míška, celá koule se vyloupne. A tato dá se často roztlouci na četné soustředné mísky.

Má-li se vytvořiti koule či více méně sploštělý elipsoid, to, jak se zdá, závisí na tom, zda-li tvar úlomků v rozpukaném sloupu více se podobá tělesu stejnosměrnému neb různosměrnému. Byl-li větší úlomek sloupovitý ve více menších rozštěpen, vyniká na něm začasť více středů soustředného miskovitého slohu, dílce pak obvodové — uhličitany, hydrátem kysličníku železitého, kaolinovými hmotami stmelené — bývají vytvořeny v jednu zevní vrstvu; tímto způsobem se stává, že větší koule čedičové více menších uzavírají.

Pokračuje-li nyní rozklad, tu buď zevní dílce poněmáhlu větrají a koule se rozpadá, aneb pouze vnitro koule se rozpouští, zevní pak miskovitý obal, uhličitany jsa proniknut, tvar svůj podržuje. Tu teprve počínají se tvořit v dutinách koulové skořápky druhotné nerosty, zvláště zeolity a uhličitany.

## Rozložitelnost hornin čedičových.

Rozložitelnost hornin čedičových závisí:

a) na původním tvaru horniny, jehož nabyla v době ochlazení, b) na slohu a zvláště c) na chemické povaze nerostních součástí.

Čedič balvanitý vzdoruje daleko více chem. agentům nežli čedič sloupovitý a deskovitý; mimo to mají též směry a rozměry sloupů a desek vliv na rozložitelnost čedičů; na př. svislé sloupy usnadňují přijímání vod do vnitra kužele horského, naproti tomu bývají vodorovné sloupy úzkých žil mnohem méně porušeny.

Stejnozrné odrůdy čedičové odporují rozkladu značněji než porfyrické, pak krystalicky celistvé více než zrnité. Nejsnáze rozkládají se dirkovité, bublinaté a struskovité odrůdy čedičové.

Při rozkladu té které horniny čedičové nejvíce působí nerostní povaha.

Každá hornina čedičová, která na pohled zdá se, že čerstva jest, obsahuje 0.5—6%, nejčastěji 1—2% vody. Četné čediče, kyselinami byvše skoumány, prozrazují buď silnějším neb slabším šumotem aneb vypouštěním bublin kyselinu uhličitou, která ponejvíce v množství 1% se vyskytuje a zřídka 2% přesáhá.

Jak voda tak i kyselina uhličitá tomu svědčí, že i dle zevního vidu úplně čerstvé horniny čedičové již se rozkládati počaly. Přibývá-li vody, souditi lze ve všech případech, že rozklad čediče pokročil; to však nesouvisí vždy v přímém poměru s přibýváním kyseliny uhličitá, poněvadž uhličitany, ze zásad se vytvořivše, většinou vodami vylouženy bývají, tak že jich jen malé množství v hmotě čedičové zůstává. Vůbec podléhá pak hornina čedičová rozkladu tím spíše, nejen čím více zásad obsahuje, nýbrž čím snáze zásady tyto v uhličitany se zaměňují aneb výše okysličují. Nesrovnává se tudíž úplně rozložitelnost hornin čedičových s přibýváním zásaditosti, jelikož právě nejkyselejší členové hornin čedičových, čediče andesitové, fonolitové a trachytové, v rozkladu nejvíce pokročilé bývají a nejvíce druhotných výtvorů nerostních vykazují.

Dle toho, převládá-li působení kyslíku aneb kyseliny uhličitá, jest, jak známo \*) pochod rozkladu dvojí: působením kyseliny uhličitá bývají živci a ještě dříve mnohé z oněch snáze rozložitelných, živci podobných součástí, jako: hauyn, nosean, melilit, nefelin, leucit, především porušeny; tím vylučuje se kyselina křemičitá a tvoří se uhličitany, jež částečně vodami se vyluhují; tím způsobem ubývá žiravin a žiravých zemin. Působí-li kyslík, změní se pouze kysličník železnatý v železitý, a následkem toho přemění se i augitická a magnetitu podobná součást.

V četných případech lze již na počátku rozkladu sledovati první pochod, jenž teprve v průběhu svém, okysličováním provázen, rychleji pokračuje; proto jeví velmi mnohé broušené destičky, v nichž součást živcová často již u veliké míře přeměněna jest, ještě skoro čerstvé průřezy augitu i magnetitu. Zvláště magnetit, jenž mezi ostatními, dosti přeměněnými, nerostními součástkami ještě neporušen

\*) Bischof, Chem. Geologie. 2. Auf. II. 464 a III. 430.

bývá (a pouze někdy úzkým červenohnědým pásmem obrouben jest), svědčí, že převládající působení kyslíku k řidcím zjevům náleží.

Poněvadž rozkladem živcové součásti kyseliny křemičité poměrně přibývá a rozkladem augitické součásti (za převládajícího působení kyslíku) relativně ubývá, může se pro určitý stupeň rozkladu státi, že se působení obou rozkládajících pochodů na vzájem tak vyrovná, že procentové množství kyseliny křemičité stálým zůstává.

Ve všech případech odstraňují se působením kyseliny uhličité prvě žiraviny, pak žiraviny zemité (dílem i kysličníky kovů těžkých a jen malé množství kyseliny křemičité; tím se stává, že ve zbytku s kysličníkem hlinitým a železnatým i kyseliny křemičité (relativně) přibývá. Mimo to pozorovati lze, že i oněch částek též v rozličné míře ubývá. Odstranil-li se již většinou kysličník sodnatý, tu zbývá ještě skoro veškerý kysličník draselnatý, tak že množství jeho až k jistému stupni přeměny neustále (relativně) přirůstá.<sup>1)</sup>

Z nerostních součástí hornin čedičových přeměňuje se nejprve magma, pak olivin; pak následují dle řady hauyn, nosean, nefelin, leucit a trojklonný živec. Augit, amfibol a magnetit vzdorují proměně nejsilněji. Nezřídka vyskytují se podivným způsobem v přeměněných horninách čedičových tak čerstvé jehlice apatitové, že nerost tento — za působení vod, kyselinou uhličitou bohatých — za součástku velmi obtížně rozložitelnou pokládati se musí. Jsou však, jak známo, jisté roztoky solí, zvláště chloridy, jež u veliké míře přispívají k rozpuštění apatitu. A za působení těchto hmot podléhá i apatit snáze rozkladu.

Mimo více méně snadnou rozložitelnost nerostních součástí má též vliv na rozklad celé horniny způsob směsi; tak má stejnorodost neb různost živcových součástí za následek méně neb více snadný rozklad celé horniny. Směs nerostů, jež skoro stejnou měrou se rozkládají, vzdoruje chemické proměně mnohem více než směs, v níž se součásti různé rozložitelnosti nalézají.

Důkazem toho jsou čediče andesitové, fonolitové a trachytové.

Většina z nich obsahuje mimo trojklonný živec, jenž nejspíše náleží andesinu, kysličníkem vápenatým a hořečnatým bohatému, buď leucit, nefelin, aneb i hauyn a nosean. Vlivem výtvarů, vzniklých proměnou nerostů snadno rozložitelných, zejména hauynu a noseanu (mezi nimiž mimo uhličitany, sírany i sporé podíly chloridu se vyskytují) porušuje se i nesnadno rozložitelný živec mnohem snáze. Zvláště v čedičích trachytových, jež obsahují hojnost noseanu, působí výtvary vzniklé z proměny jeho na trojklonný živec a jiné nerostní součásti tou měrou, že tyto nejmladší čediče k nejsnáze rozložitelným horninám (čedičovým) počítati se musí.

Kyselinou křemičitou značně chudší odrůdy čedičové, totiž nefelinové a leucitové čediče starých proudů, stropů a žil, jichž krystalická směs z méně nerostních součástí se skládá, vzdorují velmi mocně působení vzdušnin ve vodě rozpustěných. Skládá se sice největší díl mocných ložisek *tufů* z čedičů leucitových a nefelinových, ale o těchto může se pronésti úsudek, že utvořily se toliko z oněch odrůd, jež kdysi v podobě lávových kůželů svahy čedičových sopek po-

<sup>1)</sup> O absolutním i relativním množství žiravin vynesl, jak známo, Bischof (Journ. f. prakt. Chemie XCIII. 1864. 267) důležité výskumy.

krývaly. — Až k zemitému vidu přeměněný výtvar čediče jest tak zvaná *čedičová droba* a v posledním stupni přeměny *drobový jíl*. O postupu rozkladu čediče v drobu a drobový jíl podává velmi jasný obraz Bischof ve svých výskumech o čedičové žíle z dolu „alte Birke“ na železném Hardtu u Siegeny.<sup>1)</sup> Přeměnou čediče ve drobu ztrácí se značné množství kyseliny křemičité a skoro veškerý kysličník vápenatý i sodnatý, za to však přibývá nemálo kysličníku železnatého a vody. Mění-li se však čedič v drobový jíl, ztrácí se opět voda a kysličník železnatý, relativní pak poměr mezi kyselinou křemičitou a kysličníkem hlinitým zůstává skoro týž. Jest tudíž v přeměně čediče — ve vyloužení žiravin, zemin žiravých, dílem i kyseliny křemičité a v nahromadění se kysličníku hlinitého a železnatého — dosti zřejmá obdoba tvoření se kaolinu.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Bischof, Chem. Geologie. 2. Aufl. III. 434.

<sup>2)</sup> Ebelmen. Comptes rendus XX. 1845, 1415. XXVI. 1848, 38.

## Paragenesis druhotných nerostů česk. čed. horstva.

---

V horninách čedičových tvoří se nerosty druhotné dílem v bublinách aneb (vyloužením mateční horniny) v nově utvořených dutinách, dílem v trhlinách mezi čedičovými sloupy aneb mezi stěnami desek a jiných tvarů. Hornina čedičová bývá při tom vždy poblíže stěn, vyložených novými výtvary nerostními, více méně zvětřalá, což toho jest důkazem, že hmota horniny čedičové tvoření se nových nerostů se účastnila a že tudíž druhotné výtvary nerostní podstatně závisí na rázu odrůdy čedičové. A právě z této závislosti druhotných nerostů na rázu mateční horniny vychází na jevo, proč v každé odrůdě čedičové některé nerosty převládají, jiné jen spoře se vyskytují a mnohé docela chybí. Skrovný jest počet nerostů, jež se vyskytují ve všech odrůdách čedičových; a i nerosty tyto vynikají začasť pro každou odrůdu čedičovou zvláštními vlastnostmi. Zároveň sluší podotknouti, že rozmanitost nově vytvořených nerostů právě tak, jako rozložitelnost mateční horniny, hlavně záleží v rázu a rozmanitosti živcovité součásti, obsažené v horninách čedičových.

Odrůdy čedičové, jež pouze jeden druh živcové součásti obsahují, vykazují nejmenší množství druhotných nerostů; ony však, ve kterých největší počet živcových nerostů se nachází, vynikají nejčtetnějšími novými výtvary. To platí zejména o čedičích fonolitových a andesitových, v nichž začasť skoro veškeré čedičové, živcovité nerosty, hauyn, (noscan), melilit, nefelín, leucit, trojklonný a jednoklonný živec zastoupeny jsou a jež tudíž nejrozmanitější nerostní výtvary ve svých dutinách obsahují.

Rozložitelností svou i bohatostí nerostních součástí pojí se k čedičům andesitovým čediče trachytové. Vyznačují se (jako ony jim velice podobné trachytové fonolity) ve zvětřalých odrůdách stálou přítomností analcimu, který mimo čediče fonolitové a andesitové v ostatních odrůdách čedičových se nenachází.

Objev-li se dva neb více nerostů v dutinách, pozorovati lze ode stěn do vnitra určitou, zákonitou následnost v ukládání se jednotlivých nerostů na sebe čili následnost dle relativního stáří. Tak následují ku př. dle v. Dechena v dutinách čedičů sedmihradských: chalcedon, sferosiderit, vápenec, onen co nejstarší, tento co vnitřní a nejmladší nerost.

Dle v. Reuse následuje v českých čedičích vápenec po komptonitu (u Morvan) a mesotypu (u Dubic).

Na Řideči u Žimy ve velikých dutinách bublinatého, světle šedého čediče sedí na celistvém natrolitu (jenž v malých dutinách v podobě jehlic jest vytvořen) krystaly vápence, jež kulatými kůrami vláknitého aragonitu pokryty jsou; jádro vrostlic takových tvoří sloupkovitý aragon barvy krásně fialové. Na Panžerovém pahrbku a u Kolozruk tvoří miemit vnitřní, pak křemen, hyalit a cacholong spodní vrstvy; tyto pak střídají se pravidelně.

### Druhotné nerosty čedičů magmatových.

Z temných čedičů magmatových objevily se pouze v onom ze Skalky *srnka uhličitanů, opalovitě kyselinu křemičitě a výtvoř zeolitické* v podobě zrněk hrachových, z nichž tyto u výkladu chemického rozboru čediče ze Skalky *co skolerit* pojaty byly. Jak zeolith tento z magmatu se tvoří, vylíčeno bylo u výpisu čediče od Skalky (str. 51.). Mimo nerosty tuto vyznačené činí se zmínka o *chabasitu* a *kalcitu* v čediči od Skalky a o vláknitých neb kornatých povlacích *komptonitu* s krystaly *kalcitu* v šedém, na polo zvětralém čediči u Bořislavi (Zephar. Min. Lex.). Světlé čediče magmatové jsou chudé druhotnými nerosty, ačkoliv velmi zvětralé bývají. Nemívají ani bublin ani dutin, nýbrž proniknuty bývají na povrchu *limonitem*; na blízku obvodu hory slepeny jsou sloupy jejich tmelem *uhličitanů* tou měrou, že na zdání v balvanitou horninu splývají.

Jest to ponejvíce *aragonit*, jenž se byl mezi sloupy, deskami a v různých trhlinách v podobě krátkých, jemně vláknitých, nažloutle neb nahnědle zbarvených desek vyloučil.

Aragonit z pahorku Pšanského u Loun, jakož četné aragonity jiných odrůd čedičových, obsahuje stopy po kyselině fosforečné a sporý příměsek strontianitu.

Mimo *aragonit* jest i *kalcit* nerost obecný; nebývá však tmelem, mezi sloupy čedičovými vyloučeným, nýbrž vyplňuje sporé dutiny, jež vznikly vyloučením čedičové hmoty.

### Druhotné nerosty čedičů nefelinových.

V čedičích nefelinových jest *aragonit* nejobyčejnější vyloučeninou v trhlinách a mezi sloupy. Tvoří více méně tlusté, jemně vláknité desky barvy žlutavé, začasť slabě nahnědlé.

Mnohé čediče nefelinové, jmenovitě leucitem bohaté, obsahují tolikéž *zeolity*, avšak ponejvíce v malých zaokrouhlených dílcích málo zřetelného, paprskovitě vláknitého slohu a uvnitř zeolitů bezbarvý kalcit [ku př. v čediči z návrší Paskapole].

Haidinger uvádí *dolomit* z čediče nefelinového hory Jenšovické (u Mělnka) za příklad miemitického (dvojnásobně zrnitého) slohu. Jiné nerosty vyskytují se v čedičích nefelinových jen pořídku; mezi těmi zasluhuje zmínky *chabasit* (fakolit)

z Kozákova, který v nepatrných žlutobílých krystalkách jemné drusy tvoře, bezprostředně na hornině čedičové sedí.

### Druhotné nerosty čedičů leucitových.

Z čedičů leucitových od Hořence pocházejí známé, co víno žluté, řídkěji bělavé neb nazelenalé, co modely pravidelné krystaly *aragonitu* [hutnosti = 2·85—2·93]\*)

Sloupkovitý aragon tvoří v tomto leucovitém, olivinem bohatém čediči mocné hnízdo, vyplňující více stop v průměru; hojně dutiny téhož obsahují pak ony, začasť i několik palců dlouhé krystaly. Řídkěji leží krystaly na obou koncích vyvinuté v měkké jemnozrné hmotě vápené\*\*). Sloupkovitý a krystalovaný aragonit uvádí v. Reuss z čediče Sněžníka u Hostomic, jemně vláknitý aragonit od Lužic, Obrnic, Lbína, Bečova (hutnosti = 2·88) a Šachova, dílem tyčinkovitý dílem rozbořavě paprskovitý, ve velikých hnízdách, zřídka v narostlých koulích uložený uvádí z čediče od Žímy, Stadice a ze Šibenice u Ústí, v krystalech jehlicovitých z četných čedičů Žichovského údolí; v páskách, čedičem pronikajících, od Wtelna. Severně od Mašova na Radonickém vrchu nalézá se aragonit sloupkovitý v kulovatých slepencích, majících 3—4' v průměru; sloupky až na 1" tlusté seřaděny bývají v paprscích kolem společného středu [v. Zeph. Min. Lex.].

Pevné, nahnědlé, de tičkami rubellanu neb hnědými pseudomorfosami steatitu po rubellanu vyznačené čediče peperinové z Paskapole a Velminu u Milešova, pak ony velkými porfýrickými krystaly augitu a amfibolu vynikající od Žímy, Loukova, Kostomlat a z Vlčí hory u Černošína, zvláště bublinaté, duté odrůdy, obsahují po většině velmi jemné, nažloutlé neb našedivělé, bílé *drusy filipsitu*, jež buď stěny dutin neb povrch porfýrických krystalů augitu a amfibolu pokrývají. Poněvadž filipsit — jenž větším množstvím kys. draselnatého vyniká, posud toliko v čedičích leucitových a leucitem bohatých čedičích nefelinových, fonolitových a andesitových objeven byl — vždy o tom svědčí, že i mateční hornina jeho více kyslíčníku draselnatého obsahuje, tož lze pronéstí úsudek, že i čedič, obsahující filipsit v dutinách svých, leucitem bohatší jest.

Ze zrnitého čediče od Žímy uvádí v. Reuss červené krystaly *stilbitu* [heulanditu] a velmi malé, co voda jasné krystaly *chabasitu* ve společnosti s *aragonitem*; *chabasit* znám jest tolikéž z hlinitého, popelavě šedého, porfýrickými krystaly amfibolu bohatého čediče od Kostomlat [v. Zeph. Min. Lex.].

\*) První přesné měření krystalů aragonu z Hořence provedl v. Kupfer (Preisschrift, Berlin 1825. 162); výkresy tvarů krystalových (ponejvíce spojky  $\bar{P}_{\infty} \cdot \infty P \cdot \infty \bar{P}_{\infty}$  a podřadných  $0P$ ,  $\frac{1}{2}\bar{P}_{\infty}$ ,  $\frac{3}{2}\bar{P}_{\infty}$ ,  $2\bar{P}_{\infty}$ ,  $3\bar{P}_{\infty}$ ,  $6\bar{P}_{\infty}$ ,  $\frac{1}{2}P$ ,  $\frac{3}{4}\bar{P}_{\infty}$ ,  $\bar{P}_{\infty}$ ,  $2\bar{P}_{\infty}$ ,  $\frac{1}{2}P$ ,  $P$ ,  $\frac{1}{2}\bar{P}$ ,  $\bar{P}2$  a  $2\bar{P}2$ ) podali Schrauf (Atlas der Krystallformen des Mineralreiches) a Levy (Atlas k „Description d'une collection de minéraux etc.“ Londres 1858). Leydolt zkoumal sloh polysynthetických krystalů. Povahu ploch krystalových vyličuje Scharff (N. J. f. M. 1861. 32) Zephar M. L. II. 32.

\*\*) v. Reuss: Umgebung v. Teplitz u Bilin 175 a 205.

## Druhotné nerosty čedičů žilcových.

### a) Obecných čedičů žilcových.

Z čedičů žilcových, obsahujících nahnědlé magma, objevuje slepencový čedič z Kolozruk ubličtany hořečnato-vápenaté, střídající se s krystalickou a beztvárnou kyselinou křemičitou.

Na tenké kůře *stilpnosideritu*, který z části na *limonit* se byl přeměnil, rozkládají se zelenavě šedobílé, velmi málo prosvitavé (až  $\frac{3}{4}$ " tlusté) kůry *nezřetelně paprskovitého neb klínovitého kalcitu*, výše pak šedobílé neb žlutobílé kůry *kalcitu sřejměji zrnitého a více prozračného*. Na těch vyvinuta bývá vrstva šedobílého *zrnitého křemene*, jenž vybíhá v *drůzy krystalové* ( $\infty$  P. P.). Tyto pokrývá modravý, červenavý neb šedobílý *chalcedon*, jenž místy má tenounký povlak bělavého *cacholongu* a místy uzavírá *štěpný, bílý* (slabě nažloutlý) *prozračný dolomit*, který jinde, kde chalcedon chybí, tlusté (střední) kůry činí. Chalcedon jest výše prozračnější a vybíhá mnohdy v jemné drůzy drobolinkých krystalků, jež se jeví co *pseudomorfosy po dolomitu*. Na chalcedonu sedí buď drůzy buď jednotlivé *krystaly žlutavého kalcitu* (s vypouklými plochami) neb *koule* neb *tlusté ledvinité kůry*, z drobnějších krystalů složené. Co nejmladší a vzácný nerost vystupuje skoro bezbarvý *hyalith*, jenž kryje předešlý kalcit, tvoře namnoze úhledné *perimorfosy po krystalech* jeho.

Táž řada nerostů objevuje se též v čediči Panznerova pahrbku.

Paragenetická řada nerostů vyznačených jest tedy:

a) kalcit klínovitě stébelnatý, slabě prosvitavý, zelenavě šedobílý lesku poněkud mastného;

b) kalcit zrnitý neb nezřetelně klínovitý, prosvitavý, šedo- neb žlutobílý;

c) křemen (šedobílý) zrnitý, vybíhající v drůzy krystalů;

d) chalcedon, červenavý, modravý neb šedobílý, jenž místy pokryt jest

e) kacholongem, místy uzavírá

f) drůzy krystalů bílého, prozračného dolomitu, a mnohdy vybíhá v pseudomorfosy po dolomitu;

g) krystaly s plochami vypouklými, koule a ledvinité kůry kalcitu, složené z drobných krystalů;

h) hyalith (začasté v perimorfosách po kalcitu neb dolomitu) co nejmladší nerost.

Pan Cand. Fr. Bílek, zabývaje se po delší dobu určováním hutnosti nerostů, ustanovil (za mé kontroly) hutnost:

$$\begin{aligned} \text{kalcitu } a) &= 2.770 \\ \text{" } b) &= 2.746 \\ \text{chalcedonu } d) &= \begin{cases} 2.580 & \text{spodní} \\ 2.578 & \text{svrchní} \end{cases} \\ \text{dolomitu } f) &= \begin{cases} 2.864 \\ 2.863 & \text{(krystaly a úlomky dokonale štěpné)} \end{cases} \end{aligned}$$



|                    |   |                                                          |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------|
| kalcitu <i>g</i> ) | = | 2·736 (krystaly s plochami vypouklými)                   |
| "                  | = | 2·741 (kulíčky málo stepné neb f nezřetelně paprskovité) |
| hyalitu <i>h</i> ) | = | 2·083                                                    |

Z výsledků těchto vychází na jevo, že dolomitu přičten může býti toliko onen pod *f*) a týž jest bezpochyby, jenž Ramelsbergem analysován, udal poměr:  
 $3 \text{ CaO} \cdot \text{CO}_2 + 2 \text{ MgO} \cdot \text{CO}_2$ .

Pozoruhodné jest též, že kyselina křemičitá vylučovala se ve zvrátném poměru k hutnosti, nejprve co křemen, pak co chalcedon a konečně co hyalith, zrovna opačně jako v mandlích melafýrových, v nichž nejprve vrstvy opalu, pak chalcedonu a posléze (u vnitru) drůzy křemene se vytvářejí.

Od Kolozruk známy jsou mimo tyčinkovité odrůdy *aragonitu* též krystaly, jež začasť na zrnka dolomitu přeměněny jsou.

Krystaly dolomitu z Kolozruk obsahují dle Ramelsbergova (I. a II.) a Kühnova (III) rozboru:

|                         | I.            | II. | III.          |
|-------------------------|---------------|-----|---------------|
| uhličitanu vápenatého = | 61·00         | 64  | 85·84         |
| " hořečnatého =         | 36·53         | 36  | 10·39         |
| " železnatého =         | 2·73          | —   | 5·53          |
|                         | <u>100·26</u> |     | <u>101·76</u> |

Z čediče od Vanova činí se zmínka o paprskovitých skupinách komptonitu (v. Zeph. Min. Lex.).

#### b) Čediče fonolitové a andesitové.

Nejrozmanitější a nejčtenější jsou druhotné nerosty čedičů fonolitových a andesitových, jež, jak již vyznačeno bylo, agentům v přírodě působícím nejméně vzdorují, ač množství kyseliny křemičité nade všechny odrůdy čedičové vynikají. Jelikož živcová součást čedičů fonolitových a andesitových nejčastěji celou řadou nerostů — hauynem (noseanem), melilitem, nefelinem, leucitem, trojklonným a jednoklonným živcem — zastoupena bývá, jest tu dosti různých látek, jichž třeba k vytvoření rozmanitých, nových nerostů druhotných, jež nalézáme v dutinách hlavně bublinatých odrůd. V následujícím vyličují se druhotné nerosty českých čedičů fonolitových a andesitových dle para- a metagenetické následnosti.

#### Chalcedon.

Nejstarší, avšak též jeden z nejmladších druhotných výtvorů v čedičových horninách jest beztvorná kyselina křemičitá, která se v prvním případě co chalcedon, v tomto co hyalith jeví.

Chalcedon tvoří velmi úzké, nažloutle-nahnědle-našedivěle neb načervenalé bílé, ledvinité povlaky, jež začasť z velmi jemných, rovnoběžných vrstev se skládají (Stabigt u Děčína, Vrabčinec u sv. Jakuba na Labi).

Začasť bývá chalcedon velmi tenkou vrstvou

**stilpnosideritu**

pokryt (Stabigt) aneb chybí-li onen, jest pak stilpnosiderit nejstarší člen řady nerostů (Zálesí, Česká Lípa).

Často bývá tento přeměněn v

**limonit,**

který co tenká svrchní vrstva bezprostředně na horninu čedičovou aneb na chalcedon se ukládá.

Pro čediče trachytové a trachytické fonolity význačný

**analcim**

nechybí též čedičům fonolitovým i andesitovým, ale objevuje se mnohem skrovněji.

Na pevném čediči fonolitovém ze Stabigt u Děčna tvoří analcim jemné druzy velmi malých, nažloutle bílých neb skoro bezbarvých krystalů (202) na tenkém, nažloutlém, ledvinitém povlaku — dílem v limonit přeměněného — stilpnosideritu, pod nímž velmi tenkou, nažloutle bílou vrstvu chalcedonu pozorovati lze. Co nejmladší člen řady nerostů objevují se malé, nažloutlé klence kalcitu, na krystalech analcimu sedící.

Ve větších dutinách čediče z hory Koutné u české Lípy často vyskytují se velmi malé, bílé, neprůhledné krystaly analcimu (202) s natrolitem a apofyllitem (v. Zeph. Min. Lex. 13).

Jiné naleziště analcimu jest Vrabčinec (na tufovitém čediči). Druzy nepatrných, téměř bezbarvých krystalů obalují malé kuličky a ledvinité kůry chalcedonu, na nichž pak nažloutlé krystaly kalcitu (— 2 R) sedí.

Na jemných, nažloutlých neb našedivělých druzách analcimu, jež pokrývají stěny dutin v černošedém čediči od Séberku u Kadaně rozkládají se tlusté vrstvy komptonitu. — Dutiny zrušeného čediče od Verneřic bývají úplně bezbarvými krystaly analcimu vyloženy.

Mimo to znám jest analcim z Vostrého u Střekova a z údolí Lužického. Práobyčejným jest však analcim v čedičích trachytových a fonolitech trachytových. Dle rozboru Rammelsbergova obsahuje analcim trachytového fonolitu od Velsé v %:

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| kyseliny křemičité   | = | 56.22        |
| kysličníku hlinitého | = | 22.22        |
| „ vápenatého         | = | 0.27         |
| „ sodnatého          | = | 12.10        |
| „ draselnatého       | = | 1.45         |
| vody                 | = | 8.33         |
|                      |   | <hr/> 100.59 |

a má hutnost = 2.26.

### Starší komptonit.

Pro čediče andesitové nejvýznamnější a v těchže nejhojnější nerost jest komptonit (thomsonit), jenž obyčejně s chabasitem neb filipsitem, velmi zřídka s natrolitem ve společnosti bývá.

V poměru k nerostům těmto jeví se komptonit dílem mladší dílem starší.

Staršímu komptonitu náleží jemné, ledvinité, skoro celistvé neb méně zřejmě paprskovitě vláknité, začasťe kůrák podobné, (našedivěle bílé neb špinavě žlutobílé) povlaky jeho, které vykládají stěny čedičových dutin; mladší komptonit tvoří na-proti tomu obyčejně osamotnělé, z deskovitých neb sloupkovitých krystalků, neb z jehlic v podobě bradavic, polokoulí neb vějířů složené družiny, jež nezřídka na filipsitu neb chabasitu sedí. Tak na př. jeví čedič z Koutné hory u České Lípy na jemné ledvinitých povlacích komptonitu (paprskovitě vláknitého slohu) bezbarvé krystalky chabasitu, buď po jednom roztroušené neb v drusách skupené, a na těch sedí co med žluté, vějířovité shluky krystalků mladšího komptonitu. V druzovitých prostorách čediče leucitového a nefelínového jihozáp. od Valče sedí malé, osamotnělé krystaly filipsitu ponejvíce na tenkých, nažloutlých neb našedivěle bílých, méně zřejmě vláknitých kůrách komptonitu.

Staršímu komptonitu náleží též částečně tak zvaný mesolit od Hauensteinu, z něhož rozkladem tvoří se kaolinové hmoty v nápodobeninách komptonitu a natrolithu. Dle Rammelsbergova rozboru <sup>1)</sup> obsahuje tento v %:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| kyseliny křemičité   | = 39·63     |
| kysličníku hlinitého | = 31·25     |
| „ vápenatého         | = 7·27      |
| „ sodnatého          | = 8·03      |
| vody                 | = 13·30     |
|                      | <hr/> 99·48 |

Hutnost jeho (dle Rammelsberga) = 2·357.

Jak známo má Rammelsberg tak zv. mesolit z Hauensteinu za směs komptonitu a natrolitu, Kengott staví jej však mezi skolezit a lehuntit a v. Zepharovich rozeznává mezi sferoidy mesolitovými čistý komptonit, komptonit s natrolitem a natrolit.

Dle obdoby s moučnými zeolity od Dubic lze se domnívati, že i tak zvaný mesolith od Hauensteinu se skládá z paragenetické řady: a) staršího komptonitu (v nehrubě zřejmě paprskovitých sferoidech); b) z natrolitu, jenž v podobě dílců koulí mezi sferoidy staršího komptonitu jest vklíněn, aniž by se zevními znaky lišil (leč by byl již v přeměně pokročil) a c) z mladšího komptonitu v nezřejmě oddělených, z jemných krystalků se skládajících kor, jež povrch sferoidů a a b pokrývají.

Velmi zřetelně pozorovati lze tuto paragenetickou řadu na moučném zeolitu od Dubic. Bezprostředně na čediči nalézá se tlustá kůra našedivělého prosvítavého komptonitu, která poblíže čediče jest celistva, dále pak od něho vždy zřej-

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. XLVI. 288 a Dana, a system of mineralogy. 425.

mějí paprskovitě vláknitého slohu nabývá. Na této prosvitavé kůře uloženy jsou místy bílé, na moučný prášek přeměněné sferoidy (mehlzeolith), jež — jevíce místy ještě stopy po paprskovitém slohu — co úseky koule hluboko do kůry komptonitové vnikají a zároveň tenkou, z krátkých, tlustých, prosvitavých krystalků komptonitu se skládající korou pokryty jsou. Kůra tato rozprostraňuje se i po sferoidech staršího komptonitu. Krystalky, skládající kůru mladšího komptonitu, skupeny jsou nad sferoidy staršího komptonitu radiálně co pokračování paprsků jeho. Poněvadž od zřejměj vnikajících tyčinek jeho odděleny nejsou, jeví se nazdání co osamělé krystaly, vynikající ze starších sferoidů komptonitových; ale rozšíření jejich i po zeolitech moučných (natrolitových) dosvědčuje, že mladšímu komptonitu náleží.

### Fillipsit.

Bylo již vytčeno, že fillipsit vyznačuje kys. draselnatým bohaté horniny čedičové, zvláště čediče lencitové. V čedičích fonolitových a andesitových jest fillipsit známkou většího množství kys. draselnatého a přítomnosti leucitu.

Krystaly fillipsitu, jež v čediči čtrnácti horek se vyskytují, jsou obyčejně dvojité srostlice (srovnávající se s obr. 3. v Naumann's Elemente der Mineralogie str. 343), začasťe nažloutlými krystalky kalcitu (— 2R) co mladším nerostem provázené; ony pak z hory Koutné, jež chabasitem, komptonitem a natrolitem provázeny bývají, jsou obyčejně jednoduché, pronikající se srostlice, mající společnou hlavní osu. A téže podoby jsou i krystaly z Lysé u Kuří Vody, na nichž nažloutlé krystalky kalcitu (— 2R) roztroušeny bývají.

Krystaly fillipsitu od České Kamenice, 4—6mm. dlouhé, prosvitavé, šedobílé, pokryty jsou vějířovými skupinami komptonitu a jeho ledvinitými, našedivěle bílými povlaky (*a*) filipsit *b*) mladší komptonit); právě tak pokrývají drůzy chabasitu od Valče osamotnělé krystaly filipsitu a tyto sedí na starším komptonitu (*a*) starší komptonit, *b*) filipsit *c*) chabasit). A poněvadž jemné drůzy filipsitu v čediči od České Kamenice též štětkám natrolitovým za podloužku slouží (*a*) filipsit, *b*) natrolit), proto postaven filipsit v paragenetické řadě mezi starší komptonit a natrolit. \*)

### Natrolit.

Ačkoliv krystaly a jehlice natrolitové stěny dutin a bublin čedičových dosti často pokrývají, nalézají se nerost tento přec velmi zřídka ve společnosti s jinými nerosty, vyjímaje analcim co starší, albin co mladší nerost.

Na drůzách analcimu čedičů trachytových (a fonolitů trachytových) sedí krystaly ( $\propto$  P. P.) a jehlice natrolitu osamotnělé, buď v chomáčích aneb v souvislých povlacích; jehlice natrolitu v čediči od Dubic, z Vysokého Ostrého u Střekova, z Koutné a Neubauerové hory u České Lípě a z poblíže Kuří vody bývají drobnými, roztroušenými krystaly albinu pokryty. Velmi jemné, dlouhé chomáčky na-

\*) V trachytovém fonolitu Mariánské hory u Ústí přichází prý fillipsit(?) co povlak na apophyllitu (Zeph. Min. Lex. 314.)

trolitu z hory Koutné mají někdy velmi jemné drůzy filipsitu za podložku. v Reuss uvádí natrolit z Roudnické hory ve společnosti s načervenalým bílým kalcitem, mimo to z hory Střížovické a Liščí hory u Zálesí. Z Verneřic známy jsou krystalové jehlice, v chomáčích skupené, a ze Studené hory u Haslu skupiny hvězdovité a paprskovité (v. Zeph. Min. Lex. 287.).

Čedič z Moravan — nalézající se ve sbírce universitní — vykazuje sypkou, zduchanou směs jemných jehlic natrolitových na drůze komptonitové, zřejmě paprskovitě hvězdnaté.

### Chabasit

V českých čedičových horninách objevuje se chabasit dílem bezprostředně na mateční hornině, dílem ve společnosti s fillipsitem, se starším i mladším komptonitem, řidčeji s natrolitem. Breithaupt <sup>1)</sup> uvádí od Čtrnácti svatých mesotyp a chabasit v postupu: a) mesotyp, bezpochyby mesolith, b) chabasit.

V čediči hory Koutné u čes. Lípy vyloženy bývají stěny dutin velmi jemnými drůzami fillipsitu; na těch sedí osamotnělé, paprskovitě vláknité kuličky mladšího komptonitu a místy pronikající se složky malých, nažloutlých krystalů chabasitu (a) fillipsit b) mladší komptonit; a) fillipsit b) chabasit).

Jiné kusy jeví drůzy krystalů chabasitových, v jichž dutinách paprskovitě vláknité kuličky mladšího komptonitu vězí (a) chabasit b) mladší komptonit).

Z této naleziště činí se zmínka o chabasitu ve společnosti s natrolitem, komptonitem a aragonitem (Zeph. Min. Lex.).

Že se mezi drůzami chabasitu od Valče též jednotlivé krystalky fillipsitu vyskytly, jež jemnými krystalky chabasitu pokryty jsou, již z prvu bylo podotknuto.

Malé, šedobílé krystalky (R), spojené v drůzách, nacházejí se na stěnách bublin a dutin čedičů z Čtrnácti horek, z Pöhlberku, od Verneřice (v pevném hlinitém čediči dolu sv. Antonína a Vavřince), z Biňovského údolí v dolu sv. Jana (na trhlinách a dutinách čediče, pyritem proniklého), od Čes. Kamenice (krásně rýhované, pronikající se složky  $R \cdot \frac{1}{2} R \cdot 2 R$  s rozežranými klenci kalcitu barvy co med žluté) a dle v. Reusse <sup>2)</sup> v čediči od Markvartic u České Kamenice (na vláknitém aragonitu) a od Žímy (tolikéž na aragonitu).

Nejkrásnější a největší drůzy chabasitu českého Středohoří pocházejí, jak známo, z trachytových fonolitů od Řepčice. <sup>3)</sup>

Chabasit od Ústí obsahuje dle Rammelsbergova (I) a Hofmannova (II) rozboru <sup>4)</sup> v ‰:

<sup>1)</sup> Paragenesis der Minerale. Freiberg. 1849. 105.

<sup>2)</sup> Umgebung v. Teplitz u. B. 1840. 177.

<sup>3)</sup> O krystalech chabasitu z Řepčice: Neues Jahrb. f. M. u. G. 36. 648.

O polyedrickém rázu ploch krystalových: Zeitschrift d. d. geol. G. 15. 51.

Optické výskumy o českých chabasitech: Manuel de minéralogie, tome premier. Paris 1862. 409.

<sup>4)</sup> Rammelsberg's Mineralchemie. 1860. 816.

|                        | I.    | II.   |
|------------------------|-------|-------|
| kyseliny křemičité =   | 47·91 | 48·18 |
| kysličníku hlinitého = | 18·14 | 19·27 |
| „ vápenatého =         | 9·64  | 9·65  |
| „ sodnatého =          | 0·25  | 1·54  |
| „ draselnatého =       | 2·56  | 0·25  |
| vody =                 | 21·50 | 21·10 |
|                        | 100—  | 99·95 |

### Fakolit

považován dle G. Rosy a Des-Cloiseaux za odrůdu chabasitu, objevuje se ponejvíce bezprostředně na horninách čedičových, aniž by jinými nerosty byl provázen; jen na čediči z Vrabčince pozoroval jsem mezi velmi nepatrnými, našedivěle bílými krystalky fakolitu příliš jemnou ledvinitou kůru, která, pozorována lupou, z méně patrných paprskovitě vláknitých kuliček se skládá a nepochybně staršímu komptonitu náleží. Sporé krystaly fakolitu z bublinatého čediče vysokého Ostrého sedí začasť na natrolitu.

Breithaupt<sup>1)</sup> uvádí natrolith a fakolith od Lípy a od Zálezle v postupu: a) natrolith, b) fakolith.

V. Reuss uvádí fakolit z čediče od Zálezle, Vanova a co vzácnost z bublinatého čediče vysokého Ostrého. Krystaly tohoto naleziště — četně pronikající se složky s rovnoběžnou soustavou osní, spojky:  $R. - \frac{1}{2}R. \propto P^2$  začasť i  $\frac{2}{3}P_2$  — jsou čočkovité, prosvitavé, silně lesklé a na plochách klencových pérovitě rýhované. Jim podobné jsou též složky od Čersinku.

Fakolit od Čes. Lípy obsahuje dle Rammelsberkova (I)<sup>2)</sup> a Andersonova (II) rozboru<sup>3)</sup> v %:

|                        | I.    | II.   |
|------------------------|-------|-------|
| kyseliny křemičité =   | 40·33 | 45·63 |
| kysličníku hlinitého = | 21·87 | 19·48 |
| „ železitého =         | —     | —·43  |
| „ vápenatého =         | 10·40 | 13·30 |
| „ hořečnatého =        | —     | 0·14  |
| „ sodnatého =          | 0·95  | 1·68  |
| „ draselnatého =       | 1·29  | 1·31  |
| vody = (19·16)         | 17·98 |       |
|                        | 100—  | 99·95 |

K chabasitu a fakolitu blíží se

### Levyn.

Levyn *nevyskytuje* se v průvodu jiných druhotných křemičitanů, nýbrž drůzy jeho krystalů prostírájí se obyčejně bezprostředně na hornině čedičové. Tak obje-

<sup>1)</sup> Paragenesis der Minerale. Freiberg 1849. 105.

<sup>2)</sup> Pogg. Annal. LXII. 149.

<sup>3)</sup> Ed. N. Phil. J. 1843. 23 a Dana, A. system of mineralogy.

vují se v okolí Čes. Lípky a Horní Kamenice jednoduché krystalky v bublinách čedičových (v Zeph. Min. Lex).

Na jednom rozloženém (tuřovitém) čediči z Třebeska nalézají se větší vápencotvary kalcitu, jemným povlakem psilomelanu potažené, a na tomto sedí nepatrné nažloutlé krystaly levynu (pronikající se složky obecného tvaru). Na jiném kuse z téhož místa jsou krystaly levynu posázené malými klenci kalcitu, jež větším dílem v práškovitou hmotu přeměněny jsou.

### Mladší komptonit,

jehož rozdíl od staršího již na str. 220. naznačen byl, nalézá se mnohem častěji než starší komptonit a v průvodu četných, druhotných křemičitů.

Na čediči od Horní Kamenice tvoří ml. kompt. jemné, téměř bezbarvé, rozšířenými plochami  $\infty \bar{P} \infty$  z deskovitých krystalků složené vějíře a polokoule, sedící na velmi jemném povlaku, aneb (na jiných kusech) na osamotnělých krystalech fillipsitu.

Jemné destičky jeho, páleny, nadýmají se poněkud, zakalí se a roztápějí se velmi nesnadno; kyselina solná rozkládá jemný prášek jeho vylučující kyselinu křemičitou co rosol.

Na jiném kuse čediče od Čes. Kamenice sedí na drůze drobných, bezbarvých klenců chabasitu kuličky komptonitu, jež se uvnitř svém skoro celistvými, blíže pak pokrač. paprskovitě vláknitými jeví. Dmuhavkou zkoumány mají se oboje vrstvy zcela stejné.

Úlomky čediče, pocházejíce z Koutné hory u Čes. Lípky vykazují buď bezbarvé krystaly chabasitu, roztroušené na jemné ledvinitých povlacích komptonitu, aneb vykazují mimo to co med žluté, vějířovité skupiny mladšího komptonitu, jenž na chabasitu sedí.

Ledvinité, dosti tlusté kůry, skládající se z deskovitých krystalků komptonitu, objevují se v čediči Ostrého u Mimone.

Komptonit z Valče, jenž popsán byl od Reusse,\*) vyskytuje se v malých, skoro bezbarvých krystalech, jež, jsouce paprskovitě seřaděny, na dolní části ve vláknitou hmotu splývají. Krystaly vykazují obyčejnou spojku  $\infty \bar{P} \infty . \infty \bar{P} \infty . \infty P$  s velmi tupým, vodorovným hranolem k ose podélné. Dle v. Zepharoviche (Min. Lex. II. 103.) leží ledvinité aneb hroznovité, na lomu zrnité kůry komptonitové na nerostu zvětralém, jevícím se v podobě drobných hroznů barvy šedohnědé. Na takovém kuse objevil v. Zepharovich uprostřed větších sferoidických skupin krystalů komptonitových tenké, velmi jemné vláknité, bílé, kulaté misky (hmoty komptonitové), jež tvoří obal krystalů komptonitových a jimi zároveň jsou pokryty, vždy však od komptonitu ostře odděleny jsouce. Na komptonit ukládá se začasť aragonit, buď v žlutavě šedých sloupkách aneb v radialně vláknitých polokoulích, jež, skládající se z četných misek, na skupinách komptonitu jsou uloženy a mnohdy bezbarvé krystaly kalcitu na sobě nesou.

Na čedičovém tufu a slepenci vápencovém z lomu Dubického pokryty jsou větší nažloutlé krystaly kalcitu sploštělými, žlutavě bílými, jemně vláknitými kuličkami, jež se před dmuhavkou co komptonit prozrazují.

\*) Verhandlungen d. k. k. geolog. Reichsanst., 30. Okt. 1871.

Nejkrásnější druzy komptonitu pocházejí, jak známo, z temného, nazelenale šedého čediče ze Seeberku u Kadaně. Krystaly z naleziště tohoto, až 0·5“ dl., bezbarvé, průhledné aneb bělavé, jeví ponejvíce mnohonásobné, dle zákona harmotomového vytvořené, křížaté složky; drobnější krystaly, nakupené v chomáčkách, polokoulích neb ve vějířích, jsou začasté v korovité druzy srostlé nesouce co med žluté krystalky kalcitu. v. Reuss zmiňuje se o paprskovitém komptonitu (hutnosti 2·41) v čediči od Vanova, Žímy, Provodína, Proboštova, z rokle u Střekova a ze Střížovické hory.

Našedivěle bílé polokuličky komptonitu, sedícího na chabasitu z hory Koutné, měly hutnost = 2·360 (urč. 0·903 gr.). Žlutavé, na chabasitu sedící a v malé bradavičky skupené krystalky z téhož naleziště jevíly hutnost = 2·313 (urč. 0·273 gr.). Dle Zippeho jest hutnost komptonitu ze Seeberku = 2·35—2·38 a dle Rammelsberka = 2·37.

Dle rozboru Zippeova (I.) a Rammelsberkova (II. a III.) obsahuje komptonit ze Seeberku a dle Mellyho komptonit od Lokte (IV) v %:

|                        | I.     | II.    | III.   | IV.   |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|
| kyseliny křemičité =   | 38·25  | 38·73  | 38·77  | 37·00 |
| kysličníku hlinitého = | 32·00  | 30·84  | 31·92  | 31·07 |
| „ vápenatého =         | 11·96  | 13·43  | 11·96  | 12·60 |
| „ sodnatého =          | 6·53   | 3·85   | 4·54   | 6·25  |
| „ draselnatého =       | —      | 0·54   |        |       |
| vody =                 | 11·50  | 13·10  | 11·81  | 12·24 |
|                        | 100·24 | 100·49 | 100·00 | 99·16 |

### Harmotom

ve velmi malých krystalech (ve společnosti chabasitu a komptonitu) uvádí se z čediče od Čes. Kamenice (v. Zeph. Min. Lex. 206) a mimo to od Žímy a Hauensteina.

### Stilbit

v širokých, jehlicovitých, žlutobílých krystalkách, seřazených v paprskovité skupiny a souvislé druzy, objevuje se na čediči od Čes. Kamenice. Z těchto druz vystupují místy malé skupiny krystalků chabasitových, jež však ponejvíce pokryty jsou stilbitem a nepochybně starší téhož. Jim podobné jsou i shluky stilbitové z Koutné hory u Čes. Lípy (Zeph. Min. Lex. 123.)

Osamotnělé krystaly stilbitu z Kozákova ( $\infty P \infty . \infty P \infty . P \infty . OP . 2P$ ), jež na druze křišťálové sedí, mají za podložku mandlovec melafýrový.

v. Reuss <sup>1)</sup> uvádí červené krystaly stilbitu z hlinitého čediče od Žímy a z čediče od Rodisfortu.

### Desmin

v čedičovém horstu Čes. Středohoří posud se nepozoroval. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Umgebung von Teplitz u. Bilin 176.

<sup>2)</sup> Krystaly desminu z Nalsoe a Dalypen sedí na druzách chabasitu a komptonitu.



### Apofyllit.

Ačkoliv apofyllit a jeho mléčná, šedobílá odrůda, albin, v trhlínách a bublinách trachytových fonolitů velmi často přicházejí, jest týž v čedičovém horstvu vzácností.

Nepatrné, co mléko bílé, osamotnělé krystalky ( $P. \infty P \infty$ ), částečně na práškovitou hmotu přeměněné, objevují se v čediči Dubickém na druzách natrolitu, jenž z jemných jehlic se skládá, pak na krystalech kalcitu, jež tolikéž na natrolitu sedí. Mnohé krystaly albinu jsou jehlicemi natrolitu protkány.

Mimo sporá naleziště jeho na Kamenné hoře a na Ostrém u Střekova (kdež s natrolitem i komptonitem co nejmladší nerost se objevují) vyskytují se začasťe průhledné krystalky apofyllitu ( $\infty P \infty . P . OP$ ) s analcimem a s krásnými chomáčky a polokoulovými shluky natrolitu ve větších dutinách čediče z Koutné a Neubauerové hory u čes. Lípy (v. Zeph. Min. Lex. 27. a II. 29.), podobně i v čediči od Kuřavy (kde sedí na chomáčkách natrolitu).

Na trachytickém fonolitu Mariánské hory u Ústí rozkládají se druzy apofyllitu dletem bezprostředně na mateční hornině, dletem sedí osamotnělé krystaly aneb druzy krystalové na jehlicích natrolitových, jimiž často prorostlé bývají; začasťe vyskytují se tuto i klence (a sloupovité spojky) kalcitu, jež keřovitými nálety vadu opatřeny jsou. Jest tu tedy paragenetická řada: a) natrolit, b) albin c) kalcit a d) vad.

Jak známo, objevil Knop, že v albinu úplná aneb částečná pseudomorfosa kalcitu po albinu se nalézají, která z vnitra na venek se tvoří (Blum III. Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs. Erlangen 1863. 41).\*)

### Aragonit.

Aragonit náleží zajisté k nejobecnějším a nejrozšířenějším nerostům českého čedičového horstva; vyplňuje dletem v rovnoběžných a jemně vláknitých deskách trhliny mezi čedičovými sloupy, dletem tvoří v tufech četné vrstvy aneb paprskovité skupiny (uzavírající krásně vyvinuté krystaly v dutinách svých) aneb zaujímá na palec až stopu tlustá hnízda; spořeji vyskytuje se naproti tomu v bublinách pevných čedičů ve společnosti s jinými druhotnými nerosty. A tu tvoří tenké neb tlusté, sloupkovité krystaly aneb z jehlicovitých krystalů se skládající paprskovité skupiny. Tak nalézají se na jednom čediči z okolí čes. Lípy bezbarvé neb bílé, v podobě kužele skupené jehlice aragonitu, základnicí kužele k čediči přirostlé. Z Koutné a Neubauerové hory u čes. Lípy činí se zmínka o krátkých, hrotovitých, průhledných neb nažloutlých krystalech ve společnosti s natrolitem, chabasitem a kom-

\*) Na mandlovci z Nalsoe sedí krátké bezbarvé sloupky apofyllitu ( $\infty P . P . OP$ ) na polokoulovitých, paprskovitě vláknitých shlucích komptonitu a jsou, jak se zdá, částečně osamotnělými krystaly desminu posázené.

Překrásné, co může zelené krystaly apofyllitu z Pomati ve vých. Indii mají místy na podložku druzy stilbitu a natrolitu.

ptonitem (Watzel — Programm des Obergym. zu B. Leipa 1862), pak od Krásného Dvora o jemně vláknitém aragonitu, střídajícím se s kalcitem (Lotos 1870. 59).

Na jednom kuse z Valče, který se ve sbírce praž. university nachází, patrný jest sloupkovitě paprskovitý aragonit na druze komptonitu; jiný kus z téhož místa vykazuje velmi jemně vláknité, tenké kůry aragonitu, jež sedí v polokoulích na komptonitu, uzavírajíce shluky krystalů komptonitových a jsouce místy naředivěle bílými krystalky kalcitu pokryty.

Aragonit z Valče obsahuje dle Stromeyerova \*) rozboru v %:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| uhličitanu vápenatého             | = 98.00             |
| „ strontnatého                    | = 1.01 <sub>4</sub> |
| vody                              | = 0.21 <sub>4</sub> |
| limonitu ( $2Fe_2O_3 \cdot 3HO$ ) | = 0.14 <sub>5</sub> |

Pan kand. Bílek určil hutnost aragonitu z těchto nalezišť (z různých čediče odrůd):

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| od Kržiny (aragonit deskovitý, jemně vláknitý)       | . . . . . = 2.935 |
| „ Křemuše ( „ „ bílý, hedbávného lesku)              | . . . . . = 2.946 |
| „ Chlumu u Maštova (aragonit deskovitý, vláknitý)    | . . . . . = 2.928 |
| „ Čokavy (aragonit deskovitý, bílý)                  | . . . . . = 2.930 |
| „ „ ( „ „ žlutý)                                     | . . . . . = 2.916 |
| „ Bystřan ( „ „ nezřejmě vláknitý)                   | . . . . . = 2.732 |
| „ „ ( „ „ jemně „ bílý)                              | . . . . . = 2.867 |
| „ Raného (tenké desky, vláknité, bílé)               | . . . . . = 2.794 |
| „ „ ( „ „ nezřejmě vláknité, žlutavé)                | . . . . . = 2.763 |
| „ Valče (desk., jemně vláknitý, hedváb. lesku, bílý) | . . . . . = 2.866 |

### Kalcit

převládá v dutinách pevných čedičů co nejmladší člen, sedí obyčejně na druhotných výtvorech křemičitých. Tak na př. sedí v dutinách čediče od Lysé u Bělé malé krystalky kalcitu ( $-2R$ ) na jemných druzách fillipsitu, v dutinách čediče Dubického pokryty jsou jehlice natrolitové malými klenci kalcitu ( $-\frac{3}{4}R$ ), z nichž jemné jehličky natrolitu co štětiny vynikají; podobně sedí větší klence kalcitu ( $-2R$ ) na jehlicích natrolitu na Liščí hoře u Zálesí.

Dle v. Reusse potaženy jsou krystaly kalcitu od Šachova ( $4R$ ) korou jemných krystalů *dolomitu* a dutiny desek kalcitových z trhlin čediče od Třiblic jsou dílem malými čočkovitými klenci posázeny, dílem tlustými sloupky bezbarvého a slabě namodralého aragonu protkány.

Mimo to zmiňuje se v. Reuss o kalcitu z četných jiných nalezišť, ale bez společnosti nerostů jiných (Umgebung v. T. u. B. 1840. 175 a 204).

Klencový kalcit (ponejvíce  $R$  neb  $-2R$ ), jsa pravidelně nejmladší člen paragenetické řady, bývá též někdy starším nerostů jiných. Tak na př. tvoří druze chabasitu (v čes. sb. mus.) perimorfů kůry kolem větších, co med žlutých, rozežraných

\*) Schw. J. XIII. 362, 490.

krystalů kalcitu, jichž hlavní tvar, jak se zdá, byl vápencotvar. Na jehlicích natrolitových čediče Dubického sedí osamotnělé, co med žluté krystaly kalcitu, jež jsou podložkou nepatrným krystalům albinu.

### Apatit (odrůda: staffelit).

V průvodu hyalitu vyskytuje se staffelit v trhlinách a dutinách čediče z hory Vilíře a Vysokého Čihadla sevzáp. od Valče. <sup>1)</sup>

Nejmenší, osamotnělé a nakupené krystalky jeho jsou slabě prosvitavé a mají skelný lesk; větší (až 6''' dl.) jsou co snh bílé, neb našedivělé, neprůhledné, mdlé neb co perleť lesklé a srůstem četných, ponějvíce s hlavní osou rovnoběžně skupených krystalků jsou na zdání silně rýhované a druzovité. Mnohonásobným složením vytvářejí sferoidické skupiny, jež druzením se k sobě v koulavité a hroznovité výtvoř přecházejí. Též se vyskytují osamotnělé, v hroznovité povlaky sloučené, skoro až co hrách veliké polokuličky, jež z tenkých soustředných misek se skládají, které opět jemně vláknité jsou.

Jak svrchu řečeno, objevují se tyto krystalické povlaky apatitu ponějvíce ve společnosti s hyalitem. Nejobyčejněji tvoří druha jemných krystalků apatitových nejspodnější vrstvu; na tu následují střídavé vrstvy hyalitu a apatitu a nejmladší bývají polokoulavité a jemně hroznovité výtvoř, jež z misek apatitu a hyalitu aneb z velmi těsné směsi obou nerostů se skládají, vyznačující se opalovitým vzezřením.

Ve svém pojednání (sepsaném k agronomickým účelům): „O rozšíření drasla a kyseliny fosforečné v českých horninách“ <sup>2)</sup> vyznačil jsem již částečným rozbořem, jenž vykonán byl probou, smíšenou z ledvinitých kor a drůz krystalových, celkový ráz chemický tohoto staffelitu. Hutnost průby této odrůdy = 3·083. Později přidružil jsem k tomu nová určení, vyznačiv zejména vynikající množství fluoru a úplnou nepřítomnost chloru.

K mé žádosti vykonal pan asistent K. Preis chemický rozbor čistých úlomků drůz krystalových, jenž udal v %:

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| kyseliny fosforečné   | = | 36·86  |
| kysličníku vápenatého | = | 53·83  |
| „          hlinitého  | } | = 2·01 |
| kyseliny křemičité    |   |        |

Položíme-li určené množství kyseliny fosforečné za základ výpočtu čistého apatitu a přimíšenin, vychází na jevo, že drůzy krystalů staffelitu z Valče se skládají z

|                       |   |       |                                                            |
|-----------------------|---|-------|------------------------------------------------------------|
| kyseliny fosforečné   | = | 36·86 | } 87·19% apatitu, jenž obsahuje fluor<br>nikoli však chlor |
| kysličníku vápenatého | = | 43·58 |                                                            |
| fluoridu vápenatého   | = | 6·75  |                                                            |
| kysličníku vápenatého | = | 5·41  | } 9·66% uhličitanu vápenatého a z                          |
| kyseliny uhličité     | = | 4·25  |                                                            |

<sup>1)</sup> Bořický. O nových nalezištích nerostů v okolí Valče. Zpr. k. č. sp. nauk, 21. února 1873.

<sup>2)</sup> Archiv pro přírodověd. vyakoumání Čech, II. s., V. odd., s. 48.

3·15% přimšenin

kyseliny křemičité, kysličníku hlinitého, něco málo vody, žiravin a stop po kysličníku hořečnatém.

### Opal (hyalith).

Není pochybnosti, že četné v destičkách přeměněných čedičů se vyskytující infiltrační dílce, jež elyptickými neb okrouhlými, zprohýbanými, vrstevnatými čarami vynikají (nemajíce příčného, vláknitého slohu), výhradně náležejí beztvárné kyselině křemičité. Táž vylučuje se též ve větších dílcích buď co našedivěle, žlutavě neb namodrale bílá hmota opálovitá aneb co hyalith.

Nepatrná zrnka opalu (a chalcedonu), rozmanitě zbarvená (ponejvíce namodrale bílá) vyskytují se v různých čedičích (od Dubic, Krondorfu, z Panznerova pahorku u Biliny a Chodounského vrchu u Ústí a j.) Na jednom kuse čediče od čes. Lípy prostírá se na velmi tenké podložce stilpnosideritu jemně ledvinitý povlak cacholongu, na němž sedí kuželovitě paprskovitý shluk jehlic aragonitových.

Chalcedon a cacholong objevují se jen velmi pořádku, náležejíce k nejstarším druhotným nerostům, hyalit<sup>1)</sup> naproti tomu, jsa u velké míře vyvinut, stejného jest stáří se staffelitem od Valče a mladším aragonitu (po kterémž krásné perimorfosy tvoří).

Také v trachytických fonolitech objevuje se hyalit co nejmladší výtvar a svědčí ve všech případech o velmi pokročilé přeměně matičné horniny. Tak na př. na fonolitu Mariánské hory bývají začasť krystaly albinu, na natrolitu sedící, jemnými ledvinitými výtvarhy hyalitovými potaženy.

Nejkrásnější kusy hyalitu našich sbírek pocházejí z čedičů andesitových z Vysokého Čihadla a z vrchu Vilře u Valče.

Dle Schaffgotschova rozboru<sup>2)</sup> obsahuje hyalit z Valče v %:

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| kyseliny křemičité    | = | 95·5       |
| kysličníku železitého | = | 0·8        |
| „ vápenatého          | = | 0·2        |
| vody                  | = | 3·0        |
|                       |   | <hr/> 99·5 |

### (Perimorfosy hyalitu po miskovitě vláknitých kůrách apatitu.)

Již svrchu bylo vyznačeno, že na vrstvách hyalitových čediče od Valče též ledvinité a hroznovitě kůry se nalézají, jež dílem ze střídavých, tenkých, soustředných misek apatitu a hyalitu se skládají, dílem soustředně miskovitou a zároveň více méně zřejmě paprskovitou směs obou nerostů tvoří. Tento sloh pochází

<sup>1)</sup> Pogg. An. LXVIII. 147.

<sup>2)</sup> Veškeré hyality jsou, jak známo, dvojlomné. Hyalit z Valče má cibulovitý sloh a jest prost hydrofanu. (Behrens mikroskop. Untersuchungen über Opale. Sitzgh. d. k. Akad. d. W. Dez.-Heft 1871.)

patrně od apatitu, s nímž částice hyalitu v naznačených směrech promíchány jsou. Zruší-li se apatit, podržuje hyalit první, miskovitě paprskovitý sloh, stává se však dirkovitým jako houba. Tímž způsobem povstávají co papír tenké, duté polokoule hyalitu, jichž povrch otisky jemných krystalků apatitových, jež dříve uzavřeny byly, druzovitým se jeví.

*(Perimorfosy hyalitu po krystalech aragonitu.)*

v. Reuss popsal paprskovitě skupené jehlice hyalitu co pseudomorphosy po natrolitu. \*) Prohlížeje úlomky některých těchto jehlic, v nichž ostře omezené — začasť sypkou nahnědlou hmotou vyplněné — šestiboké, duté sloupce pozorovati lze, seznal jsem, že velikost uhlů se nesrovnává s rozměry aragonitu. Měření šestihraných dutin (ovšem approximativně, poněvadž se mně nepodařilo zcela kolmo sloupec postaviti) podalo postačitelny důkaz, že dutiny sloupců mají rozměry aragonitu.

Mimo větší perimorfny, polokulovité a paprskovitě skupené jehlice hyalitu, jež na povrchu okrouhle splývají a drsnými se jeví a místy hmotou hyalitovou co tmelem slepeny jsou, vyskytují se též skupiny hvězdovité, paprskovitě a vláknité; tolikéž malé, mléčně bílé kuličky hyalitové bývají paprskovitě seřazenými, velmi jemnými jehlicemi hyalitu protkány, podávající důkaz, že před apatitem a hyalitem paprskovitý aragonit byl se tvořil.

Hmota, z níž apatit a hyalit pocházejí a která co přímá vyloučenina dutiny a bubliny čediče na způsob mandlí vyplňuje, jest nažloutá neb nahnědlá, dosti měkká, lomu miskovitého, lesku slabě voskového a skládá se hlavně ze směsi beztvárné kyseliny křemičité a hmoty apatitové. Kde tato chybí, tu bývají stěny dutin novými výtvyry, apatitem a hyalitem, pokryty. Mimo zmíněná naleziště z krajiny od Valče nalézají se poloprůhledné stalaktitické povlaky hyalitu na kusech lávy z Kammerbühlu u Chebu. (A Paliardi. Der Kammerbühl, ein Vulkan bei Kaiser-Franzensbad. Eger 1848).

K nejmladším výtvyrům nerostním v dutinách náleží též

### Pyrit,

jehož nepatrné, začasť v limonit přeměněné krystalky na různých nerostech roztroušeny bývají; mnohem však hojněji vyskytuje se tento v přeměněných čedičích v podobě vtroušených zrněk.

V řadě nerostů bývá též

### Vad

v jemných dendritických povlacích na rozličných nerostech, zejména na kalcitu. Aniž by určitého stupně zaujímal, náleží celkem k výtvyrům nejmladším.

\*) v. Zeph. Min. Lex.

## Druhotné nerosty čedičů trachytových.

Přeměněné, noseanem a nefelinem bohaté čediče trachytové, jakož i trachytové fonolity, hojnost noseanu a nefelinu obsahující, mívají někdy takové množství druz analcimových, že se jim co hornině přikládá začasťe název „analcimophyr“. (Pod tím jmenem obdržel jsem analcimem bohatý čedič trachytový od Dr. Krantze.)

Obyčejně sedí analcim na matičné hornině; řídčeji bývá stilpnosideritem neb limonitem od ní oddělen, sloužie začasťe za podložku druzám natrolitu.



### Analcim.

Stěny ponejvíce podlouhlých, skorem rovnoběžných bublin čediče z Kunětické hory bývají vyloženy druzami analcimu, jichž krystaly — barvy obyčejně našedivěle neb nažloutle bílé, u vnitř více méně dirkovité a rozežrané — co modely ostré leucitotvary neb co spojky  $2 O 2. \infty O \infty$  se jeví. Mezi nimi vyskytují se též ostrohrané a rovnoploché krystaly, jež úplně jsou duté, podobající se tenké slupce. Na těchto krystalech analcimu — jež, dle E. Jahna, až  $\frac{1}{2}$ '' š. dosahují, ale ubíváním velikosti též co mikroskopické krystalky se jeví a našedivélou korou potaženy a světle žlutými, zvětralými jehlicemi (nepochybně pseudomorfosami steatitu po amfibolu) protkány bývají — sedí 1'' dl. a až 2''' šir., šedobílé, prosvitavé, na pólech skoro bezbarvé krystaly

### natrolitu

( $\infty P. P$ ), jež jen velmi zřídka v pokročilém stupni rozkladu (až na prášek přeměněny) se nalézají.

Ze stále paragenetické následnosti obou nerostů analcimu a natrolitu, dále z obyčejného, čerstvého vzezření natrolitu a značně pokročilé přeměny analcimu lze souditi, že natrolit vyloužením hmoty analcimové se byl vytvořil; neboť



Na jehlicích natrolitových bývá někdy roztroušen

### pyrit

v nepatrných krystalkách, ale mnohem častěji objeviti lze

### kalcit

vkrátkých (často čočkovitých) sloupcích ( $\infty R. - \frac{1}{2} R$ ). Jest tudíž paragenetická řada; a) analcim, b) natrolit, c) pyrit, d) calcit.

Konečně uvádím co doplněk ony druhotné nerosty, jež dle se nacházejí osamotnělé v dutinách pevných čedičů, dle tvoří hmotu, vyplňující trhliny čedičové.

Bylo již (na j. m.) vyznačeno, že trhliny čedičové nejobyčejněji vyplněny jsou *uhličitan*y (ponejvíce aragonitem, kalcitem, dolomitem).

Dále známo jest naleziště *osteolitu* u Šénwaldu nedaleko Fridlandu; v nejnovější době objeven jest týž v trhlínách čedičových u Valče, kdež tvoří několik palců tlusté, v tenké rovnoběžné misky štěpné desky. Hmoty jejich, na lomu jemně zemitá, barvy bílé neb žlutavě bílé, ukázala se co směs převládajícího zásaditého fosforečnanu a sporého uhličitanu vápenatého. Hutnost jejich = 2·831.

Na Šibenici u Ústí vyplňuje černé skalní mýdlo, *oropion*, trhliny a dutiny čedičové. Podobně vyskytuje se začasť *selená hlinka* (*seladonit*) (na př. v čediči Sovína u Litoměřic), která však častěji v podobě hlízovitých kusů v dutinách zvětřalého čediče se jeví (ku př. na Roudnické hoře).

V zrnkách co chrest zelených objevuje se *steatit* v čediči od Vanova, v žlutohnědých zrnkách v čediči Kubačky; často bývají také v mnohých čedičích *neolitu* podobné výtvořky (ku př. v čediči od čes. Kamenice, na Kubačce a n. j. m.) a *bolu* podobné, co lískový až vlašský ořech veliké hlízy (ku př. v dutinách čediče Koutné hory a Horky u čes. Lípy). Konečně sluší se zmíniti také o *kerolitu*, jenž na Hauensteinu\*) drobné kusy tvoří a začasť v podobě malých zrněk v moučných zeolitech Dubických (poblíže hmoty čedičové) vrostlý bývá.

Z nerostů, v tufech se vyskytujících, zasluhují zmínky fosforečnany.

Ve svém pojednání „O rozšíření drasla a kyseliny fosforečné v českých horninách“ poukázal jsem na poměrné bohatství českých čedičových tufů fosforečnanem vápenatým, zmíniv se zejména o tom, že v tufech se vyskytují začasť vyloučeniny zásaditého fosforečnanu vápenatého, s uhličitanem vápenatým smíšené, co našedivělé, nazelenalé neb žlutavě bílé, dirkovité, jemně zemité kusy, jež buď co hnízda neb co žfly, několik palců až i přes stopu mocné, v tufech jsou uloženy. Mimo to zmiňuji se v tomž pojednání, že objevují se začasť pojedine v tufech uložené, načervenalé (co maso červené), červenavé neb nažloutle bílé hlízy, povrchu slabě mastného, jichž mdlé, na lomu ploským miskám podobné úlomky mastný omak jeví, na jazyku lpí a silnou reakci na kyselinu fosforečnou dávají. Vnitro mnohých těchto hlíz jest na zdání stejnorodé; jiné skládají se však ze světlých (nažloutle neb načervenalé bílých) a temnějších (co maso červených) dílců, aneb též z ostrohranných kusů, žilkami zemité hmoty oddělených.

Světlé (nažloutle neb načervenalé bílé) dílce jsou zemitého vzezření, upomínajíce na celistvý fosforit, ony pak co maso červené dílce srovnávají se v zevních znacích s bolem. Tvrdost = 2—3; hutnost temných, červených úlomků = 2·749 a světlých, načervenalé bílých = 2·990.

\*) G. Leonard's Handw. d. topogr. Min. 1843.

Panem assistantem K. Preisem provedený rozbor

|                       | světých    | a tmavých úlomků | vykazoval v %     |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|
| kyseliny fosforečné   | = 34·09    |                  | 29·49             |
| kysličníku vápenatého | = 52·13    |                  | 43·70             |
| „ hořečnatého         | = 1·23     |                  | neurčen           |
| „ hlinitého           | = } 0·54   |                  | 3·90              |
| „ železitého          | = }        |                  |                   |
| zbytku                | = 0·83     |                  | 9·74              |
| ztráty při pálení     | = 4·64     |                  | 7·66; zbývá tudíž |
| neurčených součástí   | = 6·54     |                  | 5·51              |
|                       | <u>100</u> |                  | <u>100</u>        |

Porovnávající hutnost světých a co maso červených úlomků s chemickými jejich rozborů, můžeme vynésti na jevo, že světlé úlomky velmi blízko stojí čisté hmotě fosforitu (k němuž jen malé množství uhličitanu vápenato-hořečnatého přimíšeno jest), temné pak úlomky že smíšeny jsou s bolem (asi 14 %) a sporými podíly uhličitanu vápenatého.



## Seznam prací, týkajících se čedičového horstva v Čechách.

Ke konci předešlého století (1790) vydal dr. Fr. A. Reuss orografii severozápad. části českého středohoří. V knížce 180 str. s. (8°) nastiňuje v úvodu poměry zeměpisné, dále pak vylicuje geologické poměry jednotlivých horstev, uhelen, vypálených ložiseh uhlí, jam granatových, a končí přehledným seznamem nerostů čes. středohoří.

R. 1793 vyšel I. díl (408 str. 4°) a r. 1797 II. díl (500 str.) nerostopisného zeměpisu Čech, vydaného od dr. Fr. A. Reusse. V obou dílech vypisují se orografické, a (dle tehdejších vědomostí) i petrografické poměry každého důležitéjšího místa a každému dílu připojen jest chronologický seznam českých nerostopisců a jich prací od r. 1528 (počínaje Agricolou).

Též nerostopis dr. Fr. A. Reusse — vydaný ve třech dílech, z nichž každý na více svazků se rozpadává — obsahuje četné poznámky, týkající se různých odrůd čes. čedičového horstva.

Struve, chtěje se dopátrati původu minerálních vod českých, zkoumal lučebně některé horniny čedičové (Pogg. an. VII. 1826 . 349). Zkoušky jeho ukazují, jaké hmoty a v jakém poměrném množství z některých čedičů se vyluhují vodou, která za zvýšeného tlaku kyselinou uhličitou byla nasycena, mimo to pak dovozují, že do jistého stupně proměny ve hmotě čedičové kysličníku sodnatého ubývá a kysličníku draselnatého relativně přibývá.

Mnohé topografické poznámky o nalezištích čedičových jsou v díle: „Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt von Joh. G. Sommer. Prag. 1838.“

Dr. A. E. Reusse geognostický výpis okolí Teplického a Bilínského (Umgebung von Teplitz u. Bilin 1840) zahrnuje velmi podrobné vylíčení geologických poměrů Čes. Středohoří.

Více krátkých pojednání a poznámek, týkajících se českého horstva čedičového, obsahují časopisy: Živa a Lotos.

Ebelmen podal rozbor čedičové lávy z Kammerbühlu u Chebu (Ann. des mines VII. 1845). Rammelsberg pak chemicky rozebral čedič z Andělské hory (u Karlových Varů) a Köhler čedič od Bečova (Rothovy „Gesteinsanalysen“).

Přehledné vylíčení geologických poměrů horstva v Čes. Středohoří podal Jokély (Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanst. in Wien IX. 1858. 400).

Chemická studia na čediči okolí Pardubického (z hory Kunětické a ze žfly Spojijské) a na sousedních opukách konal E. Jahn. Týž podal chemický rozbor čediče z Vlčí hory u Černošína (Živa 1859. s. 4. str. 147. — Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanst. XII. 1862. 157).

V Hoffmannových pracích, určených pro archiv přírodověd. výskumu Čech, nalézá se chemický rozbor čediče od Jičína.

Zirkelova bádání o mikroskopické skladbě a mikroskop. slohu čedičových hornin (Untersuchungen über die mikroskop. Zusammensetzung und Struktur der Basaltgesteine. Bonn. 1870.) obsahují též mikroskopický rozbor několika českých čedičů, a sice: *čediče živcového* od Kamenné Šenavy, od Vanova, od České Lípy, Valče, Rumburku a Zálesí; *čediče leucitového* od Těchlovic, Milešova, Bořislavi a Velkého Března; *nefelinových čedičů* z okolí Jachymova a Blatné, ze Šeibenberského vrcholu v Krušných Horách, z Kozákova od Těchlovic a Spansdorfu. K těm pak přidružil Vrba (Lotos 1870) mikroskop. rozbor čediče Šénhofskeho u Teplic.

Farský, vykonáv velmi zevrubné, chemické rozborů nerostů, obsažených v olivinových hlízách Kozákovských (zprávy spolku chemiků českých 1872 s. 1.) rozšířil známost nerostů do čediče vtroušených.

V pojednání svém o rozšíření kysličníku draselnatého a kyseliny fosforečné v horninách českých atd.“ (archiv přírodovědeckého výskumu Čech díl II. odd. V.) uvedl jsem jedenáct chem. rozborů čes. čedičů, z nichž dva rozborů pocházejí z lučebny pana prof. Šafaříka. Ve zprávách král. čes. společnosti nauk uveřejnil jsem tato, čedičů českých se týkající pojednání:

O čedičích leucitových a nefelinových; 30. listp. 1870.

„ „ noseanových; 19. dubna 1871.

„ „ magmatových; 12. ledna 1872.

O poměrech relat. stárí a o rozšíření čedičových odrůd v Čechách; 25. listp. 1872.

O tachylitu a čed. tachylitových od Malého Března; 10. ledna 1873.

O vrostlicích v čediči a o kontaktních účincích čediče na horniny sousední.

O paragenesi druhotných nerostů v českých čedičích; 20. června 1873.




# Obrázce

**průřezů krystalových a dílců z mikroskopických lístků**

**jednotlivých odrůd čes. čedičového horstva.**





## Tab. I.

(Za 400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Temný magmatový čedič z hory Králíč u Nirešovic skládá se z augitu (šedé průřezy), magnetitu (černá zrna) a nahnědlého magmatu (beztvarná hmota, vystupující co tmel mezi krystaly), jehož zbarvení od velmi jemných trichitových a kostrovitých výtvarů pochází. Výtvary trichitové (hnědočerné body, čárky, jehlice, pířka atd.) skládají se hlavně z hmoty magnetovce a železa titanového; ale jehlice černohnědých koster řídí se směry hran augitových (srov. na str. 47).

**Obr. 2.** Temný magmatový čedič ze Sviňského vrchu u Svinčic. Na pokraji v pravo a v levo vystupují průřezy olivinové, jež jsouce uvnitř šedobílé, vlnité, vynikají zelenavě šedou obrubou a taktéž zbarvenými trhlinami. Hnědé magma, průřezy olivinovými omezené, obsahuje skupiny větších koster augitových, jež poněmco toliko dvěma směry jsou nastíněny; některé však, jsouce třemi směry vyznačeny, jeví se co úplné rámce krystalů augitových. Mezi krystaly augitovými pozorují se jednotlivé, zelenavě našedivělé dílce, jež jsouce rovnoběžně vláknité, i poněkud vlnité, upomínají na sloh přeměněného olivinu. A vedle takých vyskytují se průřezy neúplně vyvynutých krystalů olivinu (srov. na str. 48.).

**Obr. 3. 4. 6.** Průřezy augitu z čediče Hanšpurského. Průřez augitový v obr. 3. uzavírá mimo četné mikrolity augitové bezbarvý průřez apatitu a v obr. 4. zrno magnetitu (nebo železa titanového). Obr. 6. naznačuje průřez krystalu augitového, jenž na jednom konci neúplně jsa vyvinut, objímá dva mikrolity a průřez apatitu; tento pak jeví se toliko co bezbarvé pásmo kolem černého, šestihraného zrnka titanového železa (srov. na str. 66.).

**Obr. 5.** Průřez augitu, jenž vyniká úhledným slohem miskovitým a jest velmi bohat zrnky ztruskovitými; tato pak, jsouce v pásmech č. mískách pravidelně uložena, jsou uprostřed a na okraji — majíce tutéž i četné mikrolity — nej hustěji nahromaděna.

**Obr. 7. a 8.** Průřezy augitové z čediče nefelinového od Bělošic. Průřez augitový v obr. 7. uzavírá ve středu svém dílec hnědého magmatu, které slouží co tmel kryst. součástkám téhož čediče; v pásmu okrajním jsou pak četné, k hranám rovnoběžné mikrolity. Obr. 8. ukazuje průřez krystalu augitového, jenž neúplně jsa vyvinut, zrnky magnetovcovými a ztruskovitými skoro docela jest vyplněn (srov. na str. 76.).



## Tab. II.

(Za 400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Čedič ze Řípu u Roudnice. U prostřed obrazce vyznačen jest průřez srostlice krystalů noseanu (hauynu?). jehož střední část ukazuje modravě černou síť jehlic, vláken a proužků, složených z těsně přiléhajících tmavých zrnítek porů plynových a částic skelných. Kolem této střední, síťované části střídají se světlejší a temnější pásma (chudší neb bohatší v prášku), jež jsou ovroubena okrajem skoro bezbarvým; blíže téhož vystupují zřejměji jednotlivé částice skelné a pory plynové. Dílce podobných průřezů noseanu (hauynu?) téměřž znaky opatřené, nalézají se v pravo a pak výše středního obrazce. — Průřezy amfibolu, žlutozelenavě zbarvené, jsou (zvláště blíže okraje) k hlavní ose rovnoběžně rýhovány; příčné průřezy jeho — obyčejně šestihrané — vynikají úhledným slohem miskovitým a rovnoběžným uložením mikrolitů k jednotlivým miskám. Takovýto příčný průřez nalézá se v pravo blíže okraje obrazce. — Bezbarvé prvoúhelníky a šesterce, náležející nefelinu, vyznačeny jsou sporými mikrolity, k hranám průsečným rovnoběžně uloženými. — Zrna magnetovce roztroušena jsou po kopkách, uzavírajících začasté bezbarvý nefelin. — Podélné, šedobílé průřezy — mající podobu dlouhých obdélníků, často zakončených tupými jehlanci a plochou spodovou a vyznačených řádkami neb kopkami temného prášku (jenž jest směs porů plynových, částic skelných a zrnítek magnetovce) — náležejí apatitu. Mezi součástkami krystalickými vtěsnán jest nahnědlý, práškem méně bohatý, sklovitý tmel (magma), jenž na mnoze i malé dílce zaujímá (sr. na str. 72.).

**Obr. 2.** Čedič z hory Slánské. U prostřed obrazce jest průřez noseanu (hauynu?), v kterémž se nalézají hnědožluté sklovité dílce a proužky a jemné mikrolity. Podobný průřez vyobrazen jest dole v levo. Kolem obou průřezů seřaděny jsou (zelenavěžluté) krystaly amfibolu těsněji v podobě proudů; četnými pak řádkami šedého prášku vyznačené průřezy nefelinu a apatitu a zrnka magnetovce (a železa titanového) rozděleny jsou skoro stejnou měrou. Jednotlivé hnědožluté dílce hmoty druhotné vyskytují se po skrovnu (srov. na str. 70.).

**Obr. 3.** Čedič nefelinový od Bělošic. Bezbarvé průřezy nefelinu, šedé krystaly amfibolu a méně četná zrnka magnetovce rozšířeny jsou skoro stejnou měrou v nahnědlém magmatu (srov. na str. 76.).



**Obr. 4.** Noseanit (hauynofýr?) z Dlouhého u Kozlů. Týž ukazuje směr tečkovaných, modrošedých průřezů noseanu (hauynu?), pak průřezů bezbarvého nefelinu, zelenavě žlutého amfibolu a černých zrn magnetovce. Zelenavý, jemně vláknitý průřez náleží olivinu (srov. na str. 75.).

**Obr. 5.** Vrostlice na hranách slitého amfibolu do noseanu (hauynu) — z čediče Řipského.

**Obr. 6.** Noseanit (hauynofýr?) z Milého u Bělošic. Průřezy noseanu (hauynu), v středních dílech temnou sítí vyznačené, rozděleny jsou hnědě a zelenavě žlutými dílci na více políček. Mimo bezbarvé průřezy nefelinu a zelenošedé amfibolu nalézá se v pravo na obrazci červenohnědý průřez vláknitého olivinu (srovnej na str. 75.).

**Obr. 7.** Čedič z Oblíku u Loun. Týž jest směs šedých průřezů augitu, bezbarvých tyčinek nefelinu, černých zrn magnetovce a bezbarvé, dlouhými mikrolity (jehlicemi) bohaté hmoty, která bezpochyby z hmoty leucitové se skládá. Zelenavý, vláknitý průřez náleží olivinu (srov. na str. 85.).

**Obr. 8.** Čedič od Raného u Loun. Týž se skládá ze směsi augitu a magnetovce, uložené v hmotě bezbarvé, dlouhými mikrolity bohaté, která — činic okrohlé dílce a uzavírajíc více méně zřetelné, skoro osmihrané věnečky temných zrn — bezpochyby méně vyvinutému leucitu náleží (srov. na str. 63.).

### Tab. III.

(Za 400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Čedič leucitový od Záhoře blíže Milešova. V mikroskop. obrazci jeví se velmi četné průřezy leucitu, jež vynikají úhlednými věnečky z temného prášku (porů plynových, částic skelných a zrníček magnetovcových), krátkými (augitovými) mikrolity ve věnečkách, skupinami mikrolitů a výtvorů práškových u prostřed věnečků, na okraji pak bezbarvými jehlicemi, jež šikmo do věnečků zasáhají. Četné průřezy leucitové podobného rázu objevují se co vrostlice buď v hnědé a rovnoběžně rýhované desce biotitu, jež veliký díl obrazci ujímá, buď v šedém průřezu augitu, jenž dole na obr. se nachází; augit pak obklopen jest hnědočervenými chomáči, jež bezpochyby jsou směsí limonitu a gibbsitu. Ostatní součásti minerálů jsou šedý augit a černá zrna magnetovce (sr. na str. 100.).

**Obr. 2.** Čedič z hory Košovské (za 200. zvětšení). Ústřední část obrazce zaujímá deska dialagu, která, vynikajíc hustým rovnoběžným rýhováním a uzavřena jsouc v srostlici augitové, omezena jest věncem, jenž se skládá z drobných úlomků augitových, dialagových a částic ztruskovitých. Průřez augitový vyznačen jest na okraji pěkným slohem miskovitým a četnými vrostlicemi zrněk magnetovcových, sporých mikrolitů a porů plynových. Průřezy na okraji načervenalé náležejí augitu, průřezy šedozelené a vlnitě vláknité olivinu a velmi četné tyčinky a jehlice bezbarvé buď nefelinu buď živci (srov. na str. 120.).

**Obr. 3. a 7.** Čedič od Honosic. Obrazec téhož čediče ukazuje směs šedých průřezů augitu, černých zrn magnetovce, sporých, bezbarvých průřezů nefelinu a hmoty bezbarvé, mikrolity bohaté, která (dle úkazů polarisačních) může se považovati dílem za hmotu méně vyvinutého leucitu, dílem za hmotu nefelinu. Zelenavě šedé, vlnitě vláknité průřezy náležejí olivinu (obr. 3.), šedé pak uvnitř začasté nazelenalé amfibolu (obr. 7., srov. na str. 65.).

**Obr. 4.** Čedič leucitový z okolí Valče, směrem k Ludvíkovicům (odražen z balvanu, ležícího na polní cestě). Mikroskopický obrazec ukazuje (mimo průřezy sporých krystalků amfibolových, mikroporfyricky vystupujících) toliko průřezy leucitů, v nichž ostatní kryst. součásti, augit a magnetit, co mikrolity vyvinuty a uzavřeny jsou v podobě úhledných věnečků (srov. na str. 105.).

**Obr. 5.** Čedič leucitový od Paskapole. V ústřední části mikroskop. obrazce vězí průřez dvou do sebe vnikajících krystalů leucitových, jež vyznačeny jsou pra-

videlnými osmihranými, místy dvojitými i trojitými pásmy temného prášku (skládajícího se z pórů plynových, částíček skelných a zrníček magnetovce); kolem pak jeví se mezi skupinami šedých průřezů augitových četné, bezbarvé, okrouhlé dílečky, které, vynikající méně pravidelnými věnečky a ústředními skupinami výtvorů práškových a mikrolitů, též leucitu náležejí (srov. na str. 99.).

**Obr. 6.** Čedič leucitový z hory Kletečné. Bezbarvé, šedými krystaly augitu obklopené průřezy leucitu v čediči tomto uzavírají velmi úhledné věnečky, složené z mikrolitů a výtvorů práškových (srov. na str. 102.).

**Obr. 8.** Čedič z Vinařického vrchu. Mezi zelenošedými krystaly amfibolu rozkládá se hmota bezbarvá (místy dlouhými mikrolity bohatá) v podobě mnoh - úhelníků a krátkých, modravě polarizujících obdélníků. Táž náleží po většině nefelinu, z části pak leucitu. V levo vyznačeny jsou na obrazci tři poprášené (šedobílé) obdélníky, jež náležejí apatitu (srov. na str. 58.).

## Tab. IV.

(Za 400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Čedič melafýrový od sv. Ivana u Berouna. Ve velmi sporé, bezbarvé, mikrolity a výtvary trichitovými velmi bohaté, skryté hmotě základní převládají bezbarvé (začasté trichity omezené) tyčinky trojklonného živce; mezi těmi pozorují se pak drobné, šedé průřezy augitu, jehož množství jest sporé. Mimo četné skupiny černých zrn magnetovce vyznačeny jsou v obrazci větší, zelenošedé, vlnitě vláknité průřezy olivinu. Takovýto průřez olivinu zaujímá ústřední obrazce část a kolem téhož rozloženy jsou tyčinky živcové v podobě proudů (srov. na str. 111.).

**Obr. 2.** Čedič melafýrový z Vinohradu u Vartemberka. Mikroskopický obrazec ukazuje úhledné proudy bezbarvých tyčinek živce a černých zrn magnetovce kolem — parenchymatickému pletivu podobných — skupin nedokonale vyvinutých, zelenavých krystalů augitových (srov. na str. 112.).

**Obr. 3.** Výtvary trichitové v čediči melafýrovém od sv. Ivana blíže Berguna.

**Obr. 4.** Obecný čedič živcový z Panznerova pahrbku u Břlín. Šedé průřezy augitové, bezbarvé tyčinky živcové a drobná zrna magnetovce rozšířena jsou skorem stejnou měrou v magmatu zelenošedém, na jemná vlákna přeměněném a na některých místech hnědošedém a trichity bohatém (sr. na str. 116.).

**Obr. 5.** Obecný čedič živcový z Kolozruk. Nahnědlé, krystalovými kostrami a trichity velmi bohaté magma převládá aneb vystupuje dosti zřejmě mezi krystaly; v tomtéž pak rozšířeny jsou stejnou měrou bezbarvé tyčinky nefelinu, trojklonného živce, šedé průřezy krystalů augitových a zrna magnetovce (srov. na str. 114.).

**Obr. 6.** Obecný čedič živcový z Vrkoče u Ústí n. L. podobá se čediči Kolozruckému; ale magma jeho, jsouc též bohato výtvary trichitovými a kostrami krystalovými, jest slaběji vyvinuto a na některých místech zelenavě šedě zbarveno. Bezbarvé tyčinky trojklonného živce uzavírají začasté podélné částice skla a proužky magmatu (srov. na str. 117.).

**Obr. 7.** Dřlec vrostlice opuky, jaspisu podobné, modrošedé, z čediče od Podhradic. Týž ukazuje šedou, kalnou směs zrn ztruskovitých, prášku magnetovce, velmi četných porů plynových, sporých mikrolithů a jednotlivá, bezbarvá, okrouhlá neb ovální zrnka křemene.

**Obr. 8.** Dřlec z místa, v kterémž vrostlice opuková, jaspisu podobná, se dotýká čediče (z Panznerova pahrbku). V dřlci tom jeví se směs bezbarvých jehlic (mikrolithů živcových) a šedých mikrolithů augitových v hmotě zcela zakalené pory plynovými, částicemi sklovitými a prachem magnetovcovým. Této kalné hmoty přibývá tím více, čím bližší jest místo hmotě opukové.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

## Tab. V.

(Za 200—400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Průřez trojklonného živce ze zrnitého čediče andesitového z hory Střizovické. V levo na hoře přidružen jest malý dílec skryté základní hmoty (za 200. zvětšení) (srov. na str. 128.).

**Obr. 2.** Týž průřez (obr. 1.) pozorován ve světle polarisovaném.

**Obr. 3.** Čedič andesitový, hauynem bohatý, z hory Fialkové u Housky. Skrytá základní hmota tohoto čediče skládá se hlavně z leucitu, jehož polygonální průřezy, skupinami po různu uložených mikrolithů zakaleny, méně zřejmě vynikají. V skryté základní hmotě nalézá se též sporý nefelin, jenž v polarisovaném světle (v podobě krátkých obdélníků) zřejměji se objevuje. Na různých místech vyskytují se skupiny tyčinek trojklonného živce v podobě pruhů. A velmi četné jsou droboulkové, modročerné průřezy hauynu, jež omezeny jsouc uzounkým pasem bezbarvým, teprv za silnějšího zvětšení husté sfíkování objevují. V obrazci našem jsou průřezy jejich co černé šesterce vyznačeny (srov. na str. 152.).

**Obr. 4.** Čedič andesitový od Valče, matičná hornina hyalitu a staffelitu. Mimo bezbarvé, trojklonné tyčinky živce, šedé průřezy augitu a černá zrnka magnetovce obsahuje skrytá hmota základní též nefelin; ale jeho průřezy nevynikají dosti zřejmě. Žlutavá zrníčka náležejí bezpochyby olivinu (srov. na str. 134. a v Zirkelových „Basaltgesteine“ na str. 123. a 117.).

**Obr. 5. a 6.** Čedič melafyrový z Tolberku u Jabloného. Obr. 5. (za 200. zvětšení) ukazuje v ústřední části průřez bezbarvého trojklonného živce, jenž uzavírá skupinu částic ztruskovitých v podobě schůdkovitého obdélníku seřaděných, jemnými žilkami spojených a velmi bohatých pory plynovými. V pravo na obrazci vystupuje v popředí kalná, zelenavě neb žlutavě šedá hmota skelná (tmel) — bohatá pory plynovými, práškem a výtvary trichitovými — z níž vynechána valná část tyčinek živcových. Obr. 6. nastiňuje rozdělení bezbarvých tyčinek živcových, sporých, šedých průřezů augitových a tmele sklovitého za 400. zvětšení (srov. na str. 109.).

**Obr. 7. a 8.** Obec čedič živcový od Trmice. V obr. 7. vyznačeny jsou šedé průřezy augitu, jednotlivé, bezbarvé tyčinky živce a veliký díl zelenavě šedého průřezu olivinu, vynikajícího zvláštními dutinami, jež v podobě schůdkovitých obdélníků k sobě se řadí. V obr. 8. naznačuje se rozdělení šedého augitu a bezbarvého živce v skryté hmotě základní (prachem a mikrolithy bohaté), jež bezpochyby jest tmelem sklovitým (srov. na str. 122.).

---



## Tab. VI.

(Za 400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Čedič fonolitu podobný (deskovitý) z Dubic na L. V ústřední části mikroskopického obrazce jeví se okrouhlá skupina mikrolitických součástí hmoty čedičové, mezi nimiž magnetovec převládá, pak dva žluté, na příč rozpukané pravouhelníky (náležející bezpochyby melilitu) a několik větších, šedých průřezů amfibolu; kolkolem rozkládají se v proudech hejna mikrolithů, četné, bezbarvé tyčinky (jednoklonného a trojklonného) živce, krátké obdélníky nefelinu, šedé průřezy amfibolu a žluté melilitu (?) (srov. na str. 133.).

**Obr. 2.** Čedič trachytový ze žfly v trachytickém fonolitu mezi Povrly a Veselím. V kalné, zrníčky a práškem bohaté, nahnědlé, skryté hmotě základní převládají bezbarvé průřezy živce a nefelinu nad hnědošedými průřezy amfibolu a poněkud temnějšími úlomky biotitu. Některé z průřezů bezbarvých vynikají rozeklaným vzhledem, upomínající na sanidin (srov. na str. 157.).

**Obr. 3.** Mikroskop. obrazec čediče, fonolitu podobného, od Želkovic ukazuje v nahnědlém magmatu zelenavé průřezy amfibolu, bezbarvé a poprášené obdélníky a šesterce nefelinu a četné, bezbarvé, tenké tyčinky (srov. na str. 143.).

**Obr. 4. a 6.** Fonolitu podobný čedič od Veršetína. V skryté základní hmotě, bezbarvé a mikrolithy bohaté (obr. 4.) roztroušeny jsou četné, zelenavé šedé krystaly amfibolu. Na hoře a dole (v obr. 4.) nastíněny jsou dva průřezy hauynu (noseanu?) vyznačené úhlednou sítí temných (z hustého, temného prášku složených) čárek a bezbarvým okrajem (na hoře jest skoro pravidelný osmerek, dole obdélníky); ústřední pak obrazce část zaujata jest hustou skupinou krystalků amfibolových, zrněk magnetovcových a proudem mikrolithů kolem temně žlutého průřezu amfibolu, jehož okraj černošedou hmotou jest zakalen. Mimo zelenošedé průřezy amfibolu a pravidelně síťované průřezy hauynu (neb noseanu?) ukazuje mikroskop. obr. 6. v pravo bezbarvý, rozeklaný průřez sanidinu a dole více šedobílých, řádkami zrníček vyznačených průřezů nefelinu (srov. na str. 149.).

**Obr. 5.** Fonolitu podobný čedič z Blankensteina. V bezbarvé, šedými a bezbarvými mikrolity bohaté, skryté hmotě základní objevuje se (u prostřed obrazce) bezbarvý, trhlinami proniklý průřez sanidinu; blíže pak okraje jest více šedých průřezů amfibolu, zrněk magnetitu a černohnědý úlomek biotitu (srov. na str. 137.).



**Obr. 7.** Fonolitu podobný čedič od Vitínu srovnává se s čedičem od Želkovic, má však v nahnědlém magmatu a na okraji bezbarvých průřezů nefelinu (šesterců a pravouhelníků) krátké, černé jehlice a zrníčka (výtvoř trichitové) (srov. na str. 148.).

**Obr. 8.** Fonolitu podobný čedič z Vrabčince. Mikroskopický obrazec ukazuje (u prostřed) šedý průřez amfibolu s hnědým úlomkem biotitu a kolem obou proudy mikrolithů, bezbarvých, tenkých tyčinek živce a méně zřejmých pravouhelníků nefelinu (srov. na str. 138.).

---

## Tab. VII.

(Průřezy jednotlivých nerostů z čedičů českých za 200—400. zvětšení.)

**Obr. 1.** Dřelec z průřezu augitového, vyňatého z čediče od Varty na Ohři. Týž uzavírá velmi četné mikrolithy, jednotlivé částice skla s bublinkami plynovými, póry plynové a vyznačen jest pruhy fluidálními.

**Obr. 2.** Průřez amfibolu z čediče Šenvaldského u Lokte. Týž vyniká úhledným slohem mískovitým a v mískách pravidelně uloženými mikrolithy.

**Obr. 3.** Průřez augitu z čediče Panznerova pahrbku u Břiliny. Týž vyniká na okraji slohem mískovitým, věncem mikrolithů a zrnkem magnetovcových, uvnitř pak rozsáhlou vrostlicí, složenou z částic sklovitých.

**Obr. 4.** Dřelec průřezu amfibolového z čediče Vlčí hory u Černošína.

**Obr. 5.** Podélné průřezy nefelinu: a) (v levo, na hoře) z čediče Čertové zdi; b) (v levo, dole) z čed. Skržínského; c) (u prostřed) z čediče Mühlbergského u Doupova d) (v pravo) z čediče Slánského.

**Obr. 6.** Podélné průřezy živců trojklonných: a) (v levo) z čediče Tolčberkského (s porem plynovým); b) (v pravo) z čediče Panznerova pahrbku.

**Obr. 7.** Průřez leucitový z čediče Klocberkského (u Milešova).

**Obr. 8.** Průřez leucitový z čediče od Bukovic blíže Kostomlat (V ústřední části tohoto leucitu seřaděny jsou mikrolity přiblížené v podobě paprsků).

**Obr. 9. a 10.** Průřezy noseanu (hauynu?) z čediče Řipského (od Roudnice). (V noseanu obrazce 10. nalézají se mikrolity a protáhlé bubliny (č. póry) co vrostlice.)

**Obr. 11.** Průřez noseanu (hauynu?) z čediče Slánského (uzavírající v části ústřední skupinu mikrolitů a dva proudy těchže k okraji).

**Obr. 12.** Skupina zrn magnetovce z čediče Vinařického (uzavírá hmotu nefelinovou a obložena jest v pravo sloupečky amfibolovými).

**Obr. 13. a 14.** Průřezy olivinu z čediče Košovského.

**Obr. 15.** Průřez olivinu (uzavírající pravoúhelné, v podobě schůdků k sobě přiléhající dutiny) z čediče Trmického.

**Obr. 16.** Druhotný (zelenožlutý) výtvar (bezpochyby proměnou olivinu povstálý) z čediče od Raného.

**Obr. 17.** Dřelec hmoty infiltrační z čediče Šenvaldského u Lokte (skládá se bezpochyby ze střídavých vrstev beztvárné kyseliny křemičité a uhličitanů).

**Obr. 18.** Výtvar sferoidický (co citron žlutý) z čediče od Skalky (vznikl přeměnou hnědého magmatu) (viz na str. 51.).

**Obr. 19.** Skupení zeolitické z čediče od Skalky (vytvořilo se další přeměnou výtvarů sferoidických obr. 18.) (viz na str. 51.).



## Tab. VIII.

Obr. 1. Žíly čedičové starého lomu na pravém svahu v údolí Malého Března.

Silnice, táhnoucí se od Malého Března k Leštině, sbíhá se u vzdálenosti asi sto kroků za Malým Březnem s cestou vozovou, vystupující vlevo k lesnatému svahu, a vedle této otevírá se lom, jenž se jeví na první pohled co směs četných žil čedičových, prostupujících buď trachytický fonolit buď čedič olivinový buď slepence a tufy. V obr. 1. podán jest nástin geologických a petrografických poměrů různých hornin, jež tuto byly vystoupily.

V čediči leucitoidovém, v olivinu bohatém *b*, k němuž všude se druží peperinu podobné slepence a tufy *a*, vystupuje trachytický fonolit *d*. Tímto pak, i čedičem *b* i slepenci *a* proniká žíla andesitového, leucitem a nefelinem bohatého čediče *e*, která (pokud jest odkryta) sleduje směr VJV—ZSZ a vyběhaje v podobě klínu do trachytického fonolitu v tomtéž se ztrácí. Tufy a slepenci *a*, čedičem leucitoidovým *b* a čedičem andesitovým *e* prostupují žíly čedičů trachytových *f*. V pravo vyčnívá malé úskalí, skládající se z čediče leucitoidového (*b*) a ze slepenců a za tímž objevuje se žíla čediče trachytového *k* a dále četné žíly čediče tachylytového *h*, jež, majíce šířku jen několika palců a začasté pokryty jsouc kůrami tachylytu, rozmanitě se křížují a protínají neb rozvětvují. Podobnými žilami čediče tachylytového, trachytového a fonolitu trachytového prostoupěna jest dále na východ celá, lesem pokrytá stráž.

Krystalicky celistvé, černošedé, pevné slepence *a* uzavírají velmi četné, větší a menší kusy slité břidlice, pevného (slitého) křemence i sypkého, nahnědlého pískovce; též koule (pumy) různých odrůd čedičových hojně se v nich nalézají. Podobajíc se peperinu ukazují v listkách vybroušených velmi nestejný, ale po většině mikrolitický sloh. Největší díl zakalen jest hustými skupinami zrnok magnetocových a temného prášku tou měrou, že jen na sporých místech pozorovati se mohou průřezy nefelinu a leucitu po pravouhelném, polygonálním neb věnečkovitěm uložení mikrolithu. V dílcích světlejších (chudších v temném prášku a v magnetoci) objevují se četné tenounké, bezbarvé tyčinky (živce?) a drobné úlomky biotitu. Dílce skupinami temného prášku a magnetovce zakalené mají polygonální omezení, podobajíc se často průřezům hauynovým, hustě poprášeným; mnohé uzavírají též konkrce zelenošedých krystalků (amfibolu?) a jednotlivé, mikroporfyrické, nahnědlé průřezy amfibolu a žlutošedé průřezy augitu. Toliko sporá místa jsou zřejméji krystalická podobajíc se čediči leucitoidovému *b*.

Z četných koulí čedičových *c*, uložených v slepencích a tufech, byly toliko ze dvou úlomky vzaty k úpravě listků mikroskopických. Jeden druh podobal se živcovému čediči od Košova, druhý pak srovnával se s čediči leucitovými; ale i v tomto objevil se dílec, jenž máje množství bezbarvých tyčinek upomínal na čedič Košovský.

Černošedý, krystalicky celistvý, olivinem bohatý čedič *b* podobá se ve skrytém slohu čediči od Břlenky. Ve směsi převládajícího (asi  $\frac{2}{3}$  čedičové hmotě ujímajícího) drobného a hrubšího augitu, četného magnetovce a olivinu pozoruje se bezbarvá, temné polarizující hmota. Táž činí okrouhlé a polygonální dílce, jež buď objímajíc sypké skupiny mikrolitů, buď jimi skorem vyplněny jsouc upomínají na průřezy leucitu. Jen sporé dílce, mající podobu krátkých obdélníků a polarizující namodrale, jeví se co průřezy nefelinu. Živec chybí. Průřezy olivinu, jsouc ve směrech stěpných přeměněny na hmotu zelenavou, jemně vláknitou, hadci podobnou, uzavírají částky skryté základní hmoty. Na mnoze vyskytují se též konkrce, jež se skládají buď ze sloupečků amfibolových, buď ze směsi nefelinu, leucitu a železa titanového (bez součásti augitické). Zmínky zasluhuje zvláštní průřez amfibolu, který toliko v ústřední části čistou, šedožlutou hmotu (amfibolovou) ukazuje, na okraji však se skládá ze směsi sloupečků titanového železa, krystalků nefelinových a podélných částic amfibolových, ve směs uložených v podobě paprskovitěho věnce.

Trachytický fonolit *d* vyniká velmi četnými, porfyrickými deskami skelného živce, jenž ve světle polarisovaném ponejvíce krásné úkazy trojklonných živců jeví a bezpochyby po většině oligoklasu (nebo albitu) náleží. Též základní hmota tr. fonolitu *d* jest velmi bohatá jednoklonnými a trojklonnými živci. Magnetit jest sporý, ale stejně rozdělený, amfibol pak vyskytuje se jen v podobě velmi útlých žlutavých jehlic.

Temnošedý, nazelenalý neb nažloutlý, krystalicky celistvý čedič andesitový *e* ukazuje na lomu sporé nahnědlé jehlice amfibolu, jež ponejvíce jsou zrušené. Základní hmota jeho (též velmi porušená) skládá se z trojklonného živce, nefelinu a leucitu (bezpochyby též hauynu neb noseanu — kterážto směs asi  $\frac{2}{3}$  veškeré hmoty čedičové činí — pak z kalných zelenošedých, stejně rozřazených jehlic amfibolu a zrněk magnetovce; krystalické tyto součástky spojeny jsou tmelem žlutošedým. Mimo živce trojkloný, jehož tyčinky jemné buď po více jednotnicích jsou srostlé, buď v podobě paprsků neb proudů uložené, nejsou průřezy ostatních živcovitých součástí dosti zřejmé. Obdélníky nefelinu mají méně určité omezení a příčné průřezy jeho neliší se od četných průřezů leucitových; jen velmi sporé průřezy téhož vynikají mikroporfyricky. Ostré, bezbarvé šesterce apatitu jsou vzácné.

Jemnozrný, velmi pevný čedič trachytový *f*, jenž vystupuje v žilách  $1\frac{1}{2}$ —3' širokých a z tlustých vodorovných sloupů složených, má velmi četné jehlice amfibolu a jednotlivá žlutavá zrníčka noseanu. V základní hmotě jeho převládá buď trojklonný živce, buď nosean a nefelin. Dvě odrůdy téhož čediče byly již na str. 159. vypsány.

Čedič trachytový ze žíly *k* liší se poněkud v skrytém slohu. Skládá se z kalné, zelenošedé, skryté hmoty základní, pak z drobných, různě položených krystalů amfibolu a stejně rozdělených zrněk magnetovce. Mimo průřezy jednotlivých krystalů amfibolu a apatitu vystupují mikroporfyricky i četné průřezy noseanu (neb hauynu), které jsou buď modrošedým prachem vyplněny, buď širokým a hustým věncem výtvořů práškových ovroubeny aneb v paprsky zeolitů přeměněny. Od výtvořů druhotných, vzniklých zrušením noseanu (neb hauynu) pochází bezpochyby zakalení skryté základní hmoty, která mimo nosean (hauyn) snad i leucit a nefelin obsahovala, nyní však četnými paprsky jehlic (zeolitů?) na polo krystalované hmotě se podobá.

Tachylitové čediče ze žil *h* byly již na str. 161. vypsány.

**Obr. 2. Žíly a balvany čedičové v trachytickém fonolitu starého lomu u Bassstreicherova mlýna blíže Proboštova.**

Skorem uprostřed lomu vystupuje v trachytickém fonolitu *f* žíla krystalicky celistvého, olivinického, černošedého čediče *e* co zeď asi 2' silná, na levo pak uzavřeny jsou v tomtéž fonolitu čedičové balvany *a*, *b*, *c*, jichžto hmota nemá žádného olivinu. Nedaleko balvanu *c* objevuje se nezřetelně omezená žíla čediče, úplně zvětřalého, a na západním konci lomu vyčnívá žíla čediče trachytového *d*, jež z veliké části drnem jest zakryta.

Tak zvaný fonolit trachytový *f* — jenž vyniká četnými porfyrickými krystaly amfibolovými a konkrécemi těchže, co ořech až co hlava velikými — má velmi jemnozrnou základní hmotu, v kteréž amfibol a magnetit velmi četné jsou zastoupeny; po těch pak vystupuje nosean (hauyn) do popředí. Průřezy jeho mají velmi sporé a neúhledné dílce sítí, jsou však ovroubeny hustým širokým věncem výtvořů práškových. Četné jsou i bezbarvé, modravé polarisující průřezy podélné, které zakončeny jsou několika tupými jehlanci a plochou spodovou. Poněvadž příčné průřezy jejich jsou pravidelné šesterce, lze je pokládati za nefelin neb apatit. Vzhled lístků mikroskop. upomíná na čediče trachytové.

Černošedý, velmi jemnozrný čedič z balvanu *a* jest směs dlouhých zelenožlutých jehlic amfibolu (ujímajících asi  $\frac{2}{3}$  veškeré hmoty čedičové) a zrn magnetovce, stejně rozdělených v hmotě nepolarisující a zakalené četnými mikrolity amfibolu a šedým práškem. Tato nepolarisující, skrytá základní hmota, jež mezi krystaly skoro stejnou měrou jest rozdělena, má na četných místech omezení polygonální; zdá se, že náleží nerostu krychlovému (buď leucitu, buď hauynu neb noseanu; jehož vývin rozmanitými proudy jehlic amfibolových byl zamezen. Tomu nasvědčuje, že nalezl se i dílec, složený ze směsi hnědých jehlic amfibolu a převládajícího, kalného noseanu.

Čedič balvanu *b* a *c* srovnává se v skladbě své s čedičem balvanu *a*, totiko v *c* vystupuje vedle amfibolu i sporý augit, tím pak vyznačen jest přechod k čediči olivinickému ze žíly *a*.

V černošedém, velmi jemnozrném čediči *a* převládá vedle amfibolu augit, jenž nemá vrostlic mimo sporé pory plynové. Součást augitická a magnetovce činí asi  $\frac{2}{3}$  veškeré hmoty; olivin pak do jehož průřezů — zelenošedých, kalných, jemně vláknitých — hmota čedičová hluboko vniká, v lístcích mikroskopických spoje se nachází. Skrytá hmota základní, jež co sporý tmel krystalické součástky v souvislost víže, jest šedobílá a nepolarisuje; ale prostoupena jest mikrolity tou měrou, že se podobá magmatu vykrystalovanému; jen na některých místech pozorují se v ní malé šedobílé dílečky, jež, jsouce mikrolity prázdné, neurčité polygonální omezení mají.

O čediči trachytovém, v noseanu bohatém, *d* byla na str. 160. zmínka učiněna.

**Obr. 3. Vrostlice opuky v slepenci a v balvanitém čediči jižního lomu u Bud (Horek) blíže Bakova.**

Nad žilou *a* — asi 3' širokou, z vodorovných sloupů složenou, v podobě okruží stočenou, a celkem směr JZ — SV sledující — rozprostírá se čedič balvanitý *b* a nad ním vypínají se trosky slepenců *c*. V těchto i v čediči balvanitém uzavřeny jsou četné, žárem přeměněné kusy opuky *d*, z nichž některé *e* mají podobu koule, z paprskovitých sloupců složené.

V balvanitém čediči nalezá se též malá koule *f*, jež z tenkých čedičových sloupců se skládá.

# Obsah.

|                                                         | str. |                                               | str. |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| Úvod . . . . .                                          | 3    | a) Čediče magmatové, temné, četnými, vy-      |      |
| <b>Mikroskopická studia českého hor-</b>                |      | nikajícími zrny olivinu, augitu neb hy-       |      |
| <b>stva čedičového</b> . . . . .                        | 6    | persthenu porfyrické . . . . .                | 46   |
| <i>Původní nerosty skládající čedič vůbec</i> . . . . . | 6    | α) Mikroskopicky sklovitě porfyrické          |      |
| augit . . . . .                                         | 7    | (s převládajícím sklov. magmatem) . . . . .   | 46   |
| diopsid . . . . .                                       | 10   | z Králičí hory u Mířovic . . . . .            | 46   |
| amfibol . . . . .                                       | 11   | ze Sviňského vrchu od Svinčic . . . . .       | 47   |
| dialag . . . . .                                        | 13   | z Cinkensteinu u Kozlů . . . . .              | 48   |
| bronzit . . . . .                                       | —    | z Kohlberku u Milešova . . . . .              | 48   |
| enstatit . . . . .                                      | 14   | β) mikroskopicky sklovitě zrnité, temné       |      |
| hypersthen . . . . .                                    | 15   | čediče magmatové . . . . .                    | 49   |
| biotit . . . . .                                        | —    | z Kamýku u Věchlab . . . . .                  | 49   |
| rubelan . . . . .                                       | 16   | z Dreiberku . . . . .                         | 49   |
| živce . . . . .                                         | 17   | od Srbska . . . . .                           | 49   |
| oligoklas . . . . .                                     | 18   | ze žíly Spořilské od Pardubic . . . . .       | 50   |
| andesin . . . . .                                       | 20   | γ) Temné čediče magmatové nestejného          |      |
| anorthit . . . . .                                      | —    | slohu skrytého . . . . .                      | 50   |
| orthoklas . . . . .                                     | 21   | z Holého u České Lípy . . . . .               | 50   |
| nefelin . . . . .                                       | 22   | b) Celistvé, temné čediče magmatové . . . . . | 51   |
| leucit . . . . .                                        | 24   | α) Sklovitě porfyrické . . . . .              | 51   |
| hauyn . . . . .                                         | 26   | od Skalky . . . . .                           | 51   |
| nosean . . . . .                                        | 26   | β) Sklovitě zrnité . . . . .                  | 52   |
| granat . . . . .                                        | 27   | od Kozlů (Šenkelberg) . . . . .               | 52   |
| melilit . . . . .                                       | 27   | od Bořislavi . . . . .                        | 52   |
| olivin . . . . .                                        | 27   | z čeřenu Paškapole . . . . .                  | 53   |
| apatit . . . . .                                        | 31   | z lomu Šeblova u Jablonce . . . . .           | 53   |
| ryzí železo . . . . .                                   | 32   | 2. Světlé čediče magmatové . . . . .          | 53   |
| magnetit . . . . .                                      | 32   | a) Sklovitě zrnité . . . . .                  | 53   |
| haematit . . . . .                                      | 33   | z vrchu Pšanského u Loun . . . . .            | 53   |
| železo titanové . . . . .                               | 33   | z Křížové hory u Libčovic . . . . .           | 54   |
| piccotit . . . . .                                      | 34   | od Bud u Bakova . . . . .                     | 54   |
| kyz magnetový . . . . .                                 | 34   | od Starého Perátny u Douby . . . . .          | 55   |
| sklovité magma . . . . .                                | 35   | z Limberku u Vartenberku . . . . .            | —    |
| <i>Rozvrh odrůd hornin čedičových a skrytý</i>          |      | od Rumburku . . . . .                         | —    |
| <i>sloh hmoty základní</i> . . . . .                    | 37   | b) Světlé čediče magmatové, velmi bohaté      |      |
| <i>Přehled českých hornin čedičových</i> . . . . .      | 42   | augitem . . . . .                             | —    |
| <i>Skrytý sloh hmoty základní</i> . . . . .             | 43   | z Kuzovy hory u Třibovic . . . . .            | —    |
| I. Čediče magmatové . . . . .                           | 44   | z jižního úpatí Sedla u Liběšic . . . . .     | —    |
| 1. Tmavé čediče magmatové . . . . .                     | 44   | od Rychnova . . . . .                         | 56   |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| z vých. úpatí zámeckého vrchu Fried-<br>landského . . . . .     | str. 57   |
| od Studné . . . . .                                             | —         |
| <b>II. Čediče nefelinové . . . . .</b>                          | <b>57</b> |
| <b>1. Nefelinitoidy . . . . .</b>                               | <b>—</b>  |
| <b>a) (Velmi) jemnozrné nefelinitoidy (anamesity) . . . . .</b> | <b>58</b> |
| (anamesit) z Vinařické hory . . . . .                           | —         |
| z návrší Paskopole . . . . .                                    | 59        |
| z malého Hummelberku u Podbořan . . . . .                       | —         |
| od Kysiblu blíže Langrynu . . . . .                             | —         |
| od Bejkova u Jenšovic . . . . .                                 | 60        |
| z Velké Borné . . . . .                                         | —         |
| z vrchu „Buchsäuerling“ . . . . .                               | —         |
| z vrchů Kühnelových u Nového Města<br>blíže Žandova . . . . .   | 61        |
| z hory „Grabberg“ u Beškab . . . . .                            | —         |
| ze Sedla u Beškab . . . . .                                     | —         |
| z Klobouku u Benešova . . . . .                                 | —         |
| ze Šibenice u Mšena . . . . .                                   | —         |
| z Chlomu u Doubravice . . . . .                                 | —         |
| <b>b) Krystalicky celistvé nefelinitoidy . . . . .</b>          | <b>63</b> |
| <b>α) z levého břehu Labe . . . . .</b>                         | <b>—</b>  |
| od Raného . . . . .                                             | —         |
| z Vranku u Meronic . . . . .                                    | —         |
| od Lipan u Teplic . . . . .                                     | 64        |
| od Bukova blíže Oustí . . . . .                                 | —         |
| od Švýcarského mlýna mezi Božtěšicemi<br>a Bukovem . . . . .    | —         |
| z lomu nad Habřím u Trmice . . . . .                            | 65        |
| z Honosické hory . . . . .                                      | 65        |
| ze Zajčova . . . . .                                            | 66        |
| z Blanský . . . . .                                             | 67        |
| z Loboše u Lovosic . . . . .                                    | —         |
| <b>β) Z pravého břehu Labe . . . . .</b>                        | <b>67</b> |
| ze severozáp. svahu Radobylu . . . . .                          | 67        |
| z Ovčí hory . . . . .                                           | 68        |
| pod vrcholem L'pové hory u Housky . . . . .                     | —         |
| od Svárova . . . . .                                            | —         |
| <b>2. Nefelinity . . . . .</b>                                  | <b>—</b>  |
| <b>a) Zrnité nefelinity . . . . .</b>                           | <b>69</b> |
| od Střekova . . . . .                                           | 69        |
| od Malého Března . . . . .                                      | 70        |
| od Těchlovic . . . . .                                          | 70        |
| <b>b) Velmi jemnozrné nefelinity . . . . .</b>                  | <b>—</b>  |
| <b>α) Nefelinové anamesity . . . . .</b>                        | <b>70</b> |
| z Čertovy zdi mezi Smržovem a Če-<br>skou Lipou . . . . .       | 70        |
| od Zabil u Čes. Dubu . . . . .                                  | 71        |
| z Turského vrchu u Nového zámku . . . . .                       | 71        |
| <b>β) Noseanity (Hauynofyry?) . . . . .</b>                     | <b>72</b> |
| z Řípu u Roudnice . . . . .                                     | —         |
| ze Slánské hory . . . . .                                       | 73        |
| z Milého a Dlouhého . . . . .                                   | 75        |
| z Mühlberku u Doupova . . . . .                                 | 75        |
| <b>c) Velmi jemnozrné kryst. celistvé nefelinity . . . . .</b>  | <b>76</b> |
| <b>α) bezživcové . . . . .</b>                                  | <b>76</b> |
| z Bělošic . . . . .                                             | 76        |
| od Skrzínu . . . . .                                            | 77        |
| z kamenné uličky u Červeného Újezda . . . . .                   | 77        |
| ze Skalky u Bukovic blíže Kostomlat . . . . .                   | 77        |
| z Kalamaiky u Kostomlat . . . . .                               | 78        |

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ze severozáp. svahu Jalovcové hory<br>u Teplic . . . . .                                                | str. 78   |
| mezi Hlíňany a Pokraticemi . . . . .                                                                    | 78        |
| nad Kundratickým letohrádkem . . . . .                                                                  | 78        |
| z Rabensteinu u Sebusína . . . . .                                                                      | 79        |
| od Velenic . . . . .                                                                                    | 79        |
| z Vrátné hory u Mšena . . . . .                                                                         | 79        |
| <b>β) Nefelinity celistvé, obsahující leucit,<br/>začasté i živec . . . . .</b>                         | <b>80</b> |
| ze Spiegelbergu u Oustí n. L. . . . .                                                                   | 80        |
| z Kozí hory . . . . .                                                                                   | 80        |
| z Ostrého u Petrovic blíže Tisy . . . . .                                                               | 80        |
| z Ostrého u České Lípy . . . . .                                                                        | 81        |
| z Ronberku . . . . .                                                                                    | 81        |
| ze Střimické hory . . . . .                                                                             | 81        |
| z Kozákova . . . . .                                                                                    | 82        |
| z Mužské hory u Bakova . . . . .                                                                        | 82        |
| z Buchberku . . . . .                                                                                   | 82        |
| z Ostré u Vartenberka . . . . .                                                                         | 83        |
| z Košumberka u Luže . . . . .                                                                           | 83        |
| <b>III Čediče leucitové . . . . .</b>                                                                   | <b>84</b> |
| <b>1. Čediče leucitoidové . . . . .</b>                                                                 | <b>84</b> |
| <b>a) Velmi jemnozrné čediče leucitoidové . . . . .</b>                                                 | <b>84</b> |
| z hřebenu mezi Turčí a Doupovem . . . . .                                                               | 84        |
| mezi Doupovem a Drmolý . . . . .                                                                        | 85        |
| <b>b) Kryst. celistvé čediče leucitoidové . . . . .</b>                                                 | <b>85</b> |
| <b>α) Základní hmota při 400. zvětšení<br/>jemnozrná . . . . .</b>                                      | <b>85</b> |
| z Oblíku n. Loun . . . . .                                                                              | 85        |
| z hory Charvátovy u Loun . . . . .                                                                      | 86        |
| z Lišky u Libčovic . . . . .                                                                            | 86        |
| z Pšovského (vrchu) u Žatce . . . . .                                                                   | 86        |
| z Chlumu u Měcholup . . . . .                                                                           | 86        |
| z Borku u Kadaně . . . . .                                                                              | 87        |
| z Kundratic . . . . .                                                                                   | 87        |
| z Ovčí hory . . . . .                                                                                   | 87        |
| od Blatců blíže Housky . . . . .                                                                        | 88        |
| ze Zbinské hory u Dokes . . . . .                                                                       | 88        |
| ze Sudky u Malé Skály . . . . .                                                                         | 88        |
| z Klobouku blíže Petrovic . . . . .                                                                     | 89        |
| droba z Kamýše . . . . .                                                                                | 89        |
| <b>β) Základ. hmota za 400 zvětš. velmi<br/>jemnozrná aneb směs mikrolithické<br/>podobná . . . . .</b> | <b>89</b> |
| z Mühlberku u Libčovic . . . . .                                                                        | 89        |
| z Vostřého u Červeného Újezda . . . . .                                                                 | 90        |
| z Cinkesteinu u Libšic . . . . .                                                                        | 90        |
| z Doubravického pahorku . . . . .                                                                       | 91        |
| mezi Blankensteinem a mlýnem Ši-<br>klovým . . . . .                                                    | 91        |
| ze sklepa v zámku Mašovském . . . . .                                                                   | 92        |
| od Kysiblu blíže Bochova . . . . .                                                                      | 92        |
| z Vysokého Hřbetu u Doupova . . . . .                                                                   | 92        |
| od Sěvaldu u Lokte . . . . .                                                                            | 93        |
| z Ovčí hory u Střekova blíže Oustí . . . . .                                                            | 93        |
| ze severozáp. úpatí hory Křížové na-<br>proti hoře Zlaté . . . . .                                      | 93        |
| z Kamenické hory u Zákup . . . . .                                                                      | 94        |
| od Vratislavic . . . . .                                                                                | 94        |
| z úpatí velké Jelení skály u Svěbořic . . . . .                                                         | 94        |
| z vých. úpatí Ronova u Radoušova . . . . .                                                              | 94        |
| z Humprechtova vrchu u Sobotky . . . . .                                                                | 95        |
| z Jestřábí skály u Kruhu . . . . .                                                                      | 95        |
| z Velké Horky u Kuř. Vody . . . . .                                                                     | 95        |
| z úpatí Kukunely u Františkova . . . . .                                                                | 95        |

|                                                   | str. |                                                 | str. |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| 2. Čediče peperinové . . . . .                    | 96   | z hory Jeřetínské . . . . .                     | 121  |
| od Kostomlat . . . . .                            | 97   | z lomu u říčky Bělina na silnici Lo-            |      |
| z Loukova . . . . .                               | 97   | vosicko-Teplické . . . . .                      | 122  |
| z Vlčí hory u Černošína . . . . .                 | 98   | z vých. návrší Trmického . . . . .              | 122  |
| 3. Čediče leucitové . . . . .                     | 98   | od Bystřan . . . . .                            | 123  |
| a) Čedičové leucitofýry . . . . .                 | 99   | od Vratislavic . . . . .                        | 124  |
| b) Kryst. celistvé čediče leucitové . . . . .     | 99   | od Provodína . . . . .                          | —    |
| z Paškapole . . . . .                             | 99   | od Malé Veleni . . . . .                        | —    |
| ze Záhoře . . . . .                               | 100  | z Damberku . . . . .                            | 125  |
| ze severovýchl. úpatí Milešovy . . . . .          | 101  | od Šluknova . . . . .                           | —    |
| z vých. úpatí Milešovy . . . . .                  | 101  | od Markvartic . . . . .                         | 126  |
| z Klocberku, jihozáp. od Milešovy . . . . .       | 101  | od Kartouz u Jičína . . . . .                   | —    |
| ze záp. úpatí hory Kletečné . . . . .             | 102  | z hory „Dědek“ u Kosmanos . . . . .             | —    |
| od Bílenky . . . . .                              | 102  | od Církvice . . . . .                           | 127  |
| z Hofeneckého vrchu u Kozlů . . . . .             | 104  | 3. Čediče andesitové a fonolitové . . . . .     | 127  |
| od Doláněk u Podbořan . . . . .                   | 104  | a) (více méně) živcem bohaté . . . . .          | 128  |
| z okolí Valečského . . . . .                      | 105  | α) doleritické . . . . .                        | —    |
| ze záp. svahu hory Čebíšské proti                 |      | ze Střížovického vrchu . . . . .                | —    |
| Turci . . . . .                                   | 105  | z rokle mezi Leichenberkem a Malým              |      |
| z Čebíše směrem k Mašovu . . . . .                | 106  | Březnem . . . . .                               | 129  |
| z třetího místa hory Čebíšské u Maš-              |      | mezi Roztoky a Dubkovicemi . . . . .            | —    |
| tova . . . . .                                    | 106  | z vrchu Hannuš u Františkova údolí . . . . .    | 130  |
| mezi Vartou a Vočem . . . . .                     | 106  | z Pickelsteinu u Chřibské . . . . .             | —    |
| ze Střekova . . . . .                             | 107  | β) makroskopickými destičkami vý-               |      |
| z Plesné hory . . . . .                           | 107  | značné porfyrické . . . . .                     | 130  |
| z Tržínské hory . . . . .                         | 107  | ze Střížovické hory . . . . .                   | —    |
| II. Čediče živcové . . . . .                      | 108  | z jižního svahu Čebíše (u Mašova) . . . . .     | —    |
| 1. Čediče melafýrové . . . . .                    | 108  | z Poppenberku u Ludvikovic . . . . .            | 131  |
| a) Čediče melafýrové, vyznačené na-               |      | γ) Velmi jemnozrné a krystalicky ce-            |      |
| hnedlým magmatem sklovitým . . . . .              | 109  | listvé . . . . .                                | —    |
| z Tolčberku . . . . .                             | 109  | z hory Kračínské . . . . .                      | —    |
| z Pešvice . . . . .                               | 109  | nad Klíší na počátku hory Střížovické . . . . . | 132  |
| ze Spálených smrčín u Huntýřova . . . . .         | 110  | z vrcholu hory Střížovické . . . . .            | —    |
| z vrcholu Velikého Jeleního hřebe-                |      | z jižního úpatí hory . . . . .                  | —    |
| nu u Vartmberka . . . . .                         | 110  | od Dubic . . . . .                              | 133  |
| b) Čediče melafýrové s bezbarvým mag-             |      | od Zálesí n. L. . . . .                         | 134  |
| matem sklovitým . . . . .                         | 111  | mezi Libšicemi a Bílinou . . . . .              | —    |
| od sv. Ivana u Berouna . . . . .                  | 111  | z Valče . . . . .                               | —    |
| c) Čediče melafýrové bez sklovité tmele . . . . . | 112  | z Andělské hory u Karlových Varů . . . . .      | —    |
| z Vinohradu u Vartmberka . . . . .                | 112  | z vys. Čihadla u Turče . . . . .                | 135  |
| z Velíse u Jičína . . . . .                       | 112  | ze záp. svahu Litoltovského pohoří              |      |
| od Ivy u Sichrova . . . . .                       | 113  | u Kadaně . . . . .                              | 136  |
| 2. Obecné čediče živcové . . . . .                | 118  | z sev. svahu Mašovského pohoří . . . . .        | —    |
| a) Obecné čediče živcové, obsahující              |      | z křovin Mašovských . . . . .                   | 137  |
| nahnědlé, trichyty bohaté, sklovité               |      | z Liščí hory . . . . .                          | —    |
| magma . . . . .                                   | 113  | z Blankensteinu . . . . .                       | —    |
| z Karabínských hory u Svárova . . . . .           | 114  | z Chlumu u Děčína . . . . .                     | 138  |
| z Kolozruk . . . . .                              | —    | z již. úpatí Zlaté hory u Ploškovic . . . . .   | —    |
| z hory Podhradické u Bíliny . . . . .             | 115  | od Bassastreicherova mlýna . . . . .            | —    |
| z Panznerova pahrbku . . . . .                    | 116  | z Vrahčince . . . . .                           | —    |
| z Vrkoče u Ústí n. L. . . . .                     | 117  | z Březin u Děčína . . . . .                     | 139  |
| jižně od Ústí n. L. . . . .                       | —    | od Rytířova . . . . .                           | —    |
| z Radobyli . . . . .                              | —    | z návrší sev. od Verneřic . . . . .             | 140  |
| z Polabské skály u Břežánek . . . . .             | 118  | od Hof. Kamenice . . . . .                      | —    |
| z Lysé u České Lupy . . . . .                     | —    | od Malé Bukoviny u Benešova . . . . .           | —    |
| z Vyhličky u Mimoně . . . . .                     | —    | z Koutné hory u Čes. Lupy . . . . .             | 141  |
| z Radechova u Bělé . . . . .                      | 119  | z Homole blíže Petrovic . . . . .               | —    |
| z Horky u Veselého (blíže Mnich.                  |      | z pahorku mezi Cvikovem a Rěra-                 |      |
| Hradiště) . . . . .                               | —    | dorfem . . . . .                                | —    |
| ze Spálovské skály u Rybní . . . . .              | —    | z Mykenhyblu . . . . .                          | 142  |
| b) Obecné čediče živcové, mající naše-            |      | ze sever. strany zámeckého vrchu                |      |
| divěle bílé, více méně zrnité magma . . . . .     | 120  | Eriedlandského . . . . .                        | —    |
| z Košovské hory . . . . .                         | —    | z Ilageberku u Fridlandu . . . . .              | —    |
|                                                   |      | z Lipové hory u Housky . . . . .                | 143  |
|                                                   |      | z pahorku Skokanských skal . . . . .            | —    |



|                                                             |      |                                                                                                                              |      |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                             | str. |                                                                                                                              | str. |
| b) nefelinem a leucitem bohaté č. fon.                      | —    | I. Čediče magmatové . . . . .                                                                                                | 167  |
| od mlýna Šiklova . . . . .                                  | 144  | Rozbor čediče                                                                                                                | —    |
| od Lipova . . . . .                                         | —    | od Skalky . . . . .                                                                                                          | —    |
| z nejvyš. vrchole Litoltovského pohoří                      | 145  | ze žíly Spojilské . . . . .                                                                                                  | 168  |
| z Machovské skály u Rybní . . . . .                         | —    | z pahorku Pšanského . . . . .                                                                                                | 169  |
| z Pecberku u Dokes . . . . .                                | 146  | II. Čediče nefelinové . . . . .                                                                                              | 170  |
| z Dubin u Jablonce . . . . .                                | —    | Rozbor čediče                                                                                                                | —    |
| od Bezdružic . . . . .                                      | 147  | ze Zajčova . . . . .                                                                                                         | —    |
| od Vitínu . . . . .                                         | 148  | z Čertovy zdi . . . . .                                                                                                      | 171  |
| c) hauynem bohaté č. and. a fon.                            | —    | z Řípu . . . . .                                                                                                             | 172  |
| z Veršetína . . . . .                                       | 149  | ze Slánské hory . . . . .                                                                                                    | 174  |
| od Žichova blíže Kozlů . . . . .                            | 150  | z Milého . . . . .                                                                                                           | 175  |
| z Husí hory u Skorotice . . . . .                           | 151  | III. Čediče leucitové . . . . .                                                                                              | 177  |
| od Chlumu blíže Děčína . . . . .                            | —    | Rozbor čediče                                                                                                                | —    |
| od Horních Oslů blíže Ploškovice . . . . .                  | —    | z Paskapole . . . . .                                                                                                        | —    |
| z Palmové hory u Douby . . . . .                            | 152  | z Vlčí hory u Černošín . . . . .                                                                                             | 178  |
| z Fialkové hory u Housky . . . . .                          | —    | IV. Čediče živcové . . . . .                                                                                                 | 179  |
| z Vinné hory u Mšena . . . . .                              | —    | 1. melafýrové . . . . .                                                                                                      | —    |
| V. Čediče trachytové . . . . .                              | 153  | Rozbor čediče                                                                                                                | —    |
| a) živcem bohaté . . . . .                                  | 154  | od sv. Ivana . . . . .                                                                                                       | —    |
| od Dubkovic . . . . .                                       | —    | 2. obec čediče živcové . . . . .                                                                                             | 181  |
| mezi Dubkovicemi a Roztoky . . . . .                        | —    | Rozbor čediče od Kolozruk . . . . .                                                                                          | —    |
| z údolí Prosečné . . . . .                                  | —    | 3. č. andesitové a fonolitové . . . . .                                                                                      | 182  |
| mezi Povrly a Roztoky . . . . .                             | —    | Rozbor čediče                                                                                                                | —    |
| od Roztok . . . . .                                         | 155  | ze Střížovické hory . . . . .                                                                                                | —    |
| mezi Spandorfem a Blankensteinem . . . . .                  | —    | z Košťálu . . . . .                                                                                                          | 183  |
| od Radoušova a Ústěku . . . . .                             | 156  | od Dubce n. L. . . . .                                                                                                       | 184  |
| z Rosensteinn . . . . .                                     | —    | V. Čediče trachytové . . . . .                                                                                               | 185  |
| b) nefelinem (leucitem) bohaté . . . . .                    | 157  | Rozbor čediče                                                                                                                | —    |
| mezi Povrly a Veselím . . . . .                             | —    | mezi Povrly a Veselím . . . . .                                                                                              | 186  |
| od Neštědic . . . . .                                       | —    | z Kunětické hory . . . . .                                                                                                   | —    |
| od Dubin u Libchavy horní (u Čes. . . . .                   | —    | Přehled hutnosti jednotlivých odrůd čedičových . . . . .                                                                     | 187  |
| Lípy) . . . . .                                             | 158  | O geotektonice, o poměrech stáří . . . . .                                                                                   | —    |
| od Prachomet . . . . .                                      | —    | a rozšíření čedičového horstva . . . . .                                                                                     | 190  |
| z Horké u Bakova . . . . .                                  | —    | v Čechách . . . . .                                                                                                          | 190  |
| od Těchlovic . . . . .                                      | 159  | Poznámky o eruptivních směrech nejdůležitějších odrůd čedičových v jiných zemích . . . . .                                   | 197  |
| c) noseanem bohaté . . . . .                                | —    | O vrostlících různých druhů hornin a nerostů v českém horstvu čed., pak o změnách hornin olivem čediče způsobených . . . . . | 199  |
| od Malého Března . . . . .                                  | —    | Prvotní č. původní sloh hornin čed. . . . .                                                                                  | 206  |
| od Basstreichova mlýna . . . . .                            | 160  | Druhotný sloh hornin čed. . . . .                                                                                            | 208  |
| z Kunětické hory . . . . .                                  | —    | O tvarech, jichž odrůdy čedičové nabývaly v době tuhnutí a jichž nabývají větráním . . . . .                                 | 209  |
| VI. Čediče tachylitové . . . . .                            | 161  | Rozložitelnost hornin čedičových . . . . .                                                                                   | 211  |
| od Malého Března . . . . .                                  | —    | Paragenesis druhotných nerostů čed. . . . .                                                                                  | 214  |
| (jiná odrůda) . . . . .                                     | 162  | čed. horstva . . . . .                                                                                                       | 214  |
| tachylit od M. Března . . . . .                             | —    |                                                                                                                              |      |
| Chemická studia čes. čedičového horstva . . . . .           | 163  |                                                                                                                              |      |
| Rozbor čediče                                               | —    |                                                                                                                              |      |
| ze Zajčova (Klaproth) . . . . .                             | —    |                                                                                                                              |      |
| z neznámého naleziště (Struve) . . . . .                    | 164  |                                                                                                                              |      |
| z Kammerbühl . . . . .                                      | 164  |                                                                                                                              |      |
| z Andělské hory . . . . .                                   | 165  |                                                                                                                              |      |
| od Bečova . . . . .                                         | —    |                                                                                                                              |      |
| od Jičína . . . . .                                         | —    |                                                                                                                              |      |
| O chemické poraze jednotlivých odrůd čed. horstva . . . . . | 166  |                                                                                                                              |      |

**z nichž podány jsou mikroskopické a chemické rozborý.**

17<sup>b</sup> \*


|                                                                | str. |                                           | str. |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| Kadaň, Borek . . . . .                                         | 87   | Mykenhybl . . . . .                       | 142  |
| Kadaň, Mašovské pohoří, sev. svah . . . . .                    | 136  | Mšeno, Šibenice . . . . .                 | 62   |
| „ Litoltovské . . . . .                                        | —    | „ Vratná hora . . . . .                   | 79   |
| Kalamaika u Kostomlat . . . . .                                | 78   | „ Vinná . . . . .                         | 152  |
| Kamenice, Hofení . . . . .                                     | 140  | Mužská hora u Bakova . . . . .            | 82   |
| Kammerbühl . . . . .                                           | 164  | Mühlberg u Doupova . . . . .              | 75   |
| Kamýš . . . . .                                                | 89   | Nestědice . . . . .                       | 157  |
| Karlové Vary, Andělská hora . . . . .                          | 134  | Nové město, Kühnelův vrch . . . . .       | 61   |
| Kartouzy n Jičina . . . . .                                    | 126  | Nový zámek, Turský vrch . . . . .         | 71   |
| Kysibl . . . . .                                               | 59   | Ovočí hora . . . . .                      | 68   |
| „ Bochoř . . . . .                                             | 92   | „ . . . . .                               | 87   |
| Kletečná hora, záp. úpatí . . . . .                            | 102  | Pardubice, Spojilská žila . . . . .       | 50   |
| Klocberk, jihozáp. od Milešovky . . . . .                      | 101  | Paskapole z čefenu . . . . .              | 53   |
| Kolozruky . . . . .                                            | 114  | „ z návrší . . . . .                      | 59   |
| „ . . . . .                                                    | 181  | „ . . . . .                               | 99   |
| Kosmanosy, Dědek . . . . .                                     | 128  | „ . . . . .                               | 177  |
| Kostomlaty . . . . .                                           | 97   | Pecberk u Dokes . . . . .                 | 146  |
| Košovská hora . . . . .                                        | 120  | Pešvice . . . . .                         | 109  |
| Košumberk u Luže . . . . .                                     | 83   | Petrovice, Tisa, Ostrý . . . . .          | 80   |
| Košál . . . . .                                                | 183  | „ Klobouk . . . . .                       | 89   |
| Koutná hora u české Lipy . . . . .                             | 141  | Pickelstein a Chřibské . . . . .          | 130  |
| Kozákov . . . . .                                              | 82   | Plešná hora . . . . .                     | 107  |
| Kozí hora . . . . .                                            | 80   | Ploškovice, již. úp. Zlaté hory . . . . . | 138  |
| Kozly, Cinkenstein . . . . .                                   | 48   | „ Horní Osly . . . . .                    | 151  |
| „ Šenkelberg . . . . .                                         | 52   | Podbořany, malý Hammelberk . . . . .      | 59   |
| „ Hofinecký vrch . . . . .                                     | 104  | Poppenberk u Ludvikovic . . . . .         | 131  |
| Kračinská hora . . . . .                                       | 131  | Povrly — Roztoky . . . . .                | 154  |
| Kruh, Jestřabí skála . . . . .                                 | 95   | „ — Veselí . . . . .                      | 157  |
| Křížová hora naproti hoře Zlaté . . . . .                      | 93   | „ . . . . .                               | 186  |
| Kundratický letohrádek . . . . .                               | 78   | Prachomet . . . . .                       | 158  |
| Kundratice . . . . .                                           | 87   | Provodín . . . . .                        | 124  |
| Kunětická hora . . . . .                                       | 160  | Prosečná . . . . .                        | 154  |
| „ . . . . .                                                    | 186  | Pšanský pahrbek u Loun . . . . .          | 109  |
| Kuří voda, Velké Horky . . . . .                               | 95   | Rabenstein u Sebusína . . . . .           | 79   |
| Leichenberg, malé Březno . . . . .                             | 129  | Radobyl . . . . .                         | 117  |
| Libchava, Dubiny . . . . .                                     | 158  | „ severozáp. svah . . . . .               | 67   |
| Liběšice, již. úpatí Sedla . . . . .                           | 56   | Radoušov u Ústěku . . . . .               | 156  |
| Liběšice — Bělina . . . . .                                    | 134  | Rané u Loun . . . . .                     | 63   |
| „ Cinkenstein . . . . .                                        | 90   | Rychnov . . . . .                         | 56   |
| Libčoves, Křížová hora . . . . .                               | 54   | Rybnice, Spalovská skála . . . . .        | 119  |
| „ Liška . . . . .                                              | 86   | „ Machovská skála . . . . .               | 145  |
| „ Mühlberg . . . . .                                           | 89   | Rytiřov . . . . .                         | 139  |
| Lípa Česká, Ostrý . . . . .                                    | 81   | Ronov u Radoušova . . . . .               | 94   |
| Lipov . . . . .                                                | 144  | Ronsberk . . . . .                        | 81   |
| Lipová hora u Housky . . . . .                                 | 68   | Rabenstein . . . . .                      | 156  |
| „ . . . . .                                                    | 143  | Roztoky — Dubkovic . . . . .              | 129  |
| Liščí hora . . . . .                                           | 137  | „ . . . . .                               | 155  |
| Litoltovské pohoří, nejvyšší vrchol . . . . .                  | 145  | Rumburk . . . . .                         | 55   |
| Loboš u Lovosic . . . . .                                      | 67   | Říp u Roudnice . . . . .                  | 72   |
| Loukov . . . . .                                               | 97   | „ . . . . .                               | 172  |
| Louny, Pšanský vrch . . . . .                                  | 53   | Šenvald u Lokte . . . . .                 | 93   |
| „ Oblík . . . . .                                              | 85   | Slanská hora . . . . .                    | 73   |
| „ Charvatova hora . . . . .                                    | 86   | „ . . . . .                               | 174  |
| Lovosicko-Teplická silnice, lom u říčky Běl-<br>liny . . . . . | 122  | Skalka . . . . .                          | 51   |
| Markvartice . . . . .                                          | 126  | „ u Bukovic blíže Kostomlat . . . . .     | 77   |
| Mašovské křoviny . . . . .                                     | 137  | „ . . . . .                               | 167  |
| Mašov . . . . .                                                | 92   | Skokanské skály . . . . .                 | 143  |
| „ Čebišská hora . . . . .                                      | 106  | Skorotice, Husí hora . . . . .            | 151  |
| Milešov, Kohlberg . . . . .                                    | 48   | Skráň . . . . .                           | 77   |
| „ severových. úpatí Milešovky . . . . .                        | 101  | Sobotka, Humprechtová hora . . . . .      | 95   |
| „ vých. úpatí . . . . .                                        | 101  | Spálené smrciny u Huntýrova . . . . .     | 110  |
| Mily u Bělošic . . . . .                                       | 75   | Spandsdorf — Blankenstein . . . . .       | 155  |
| „ . . . . .                                                    | 175  | Spigberk u Ústí n. L. . . . .             | 80   |
| Minoň, Vyhlička . . . . .                                      | 118  | Spojilská žila u Pardubic . . . . .       | 168  |
| Mirešovice, Králičí hora . . . . .                             | 46   | Srbsko . . . . .                          | 49   |
|                                                                |      | Střekov . . . . .                         | 66   |

|                                                    | str. |                                   | str. |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| řekov blíže Ústí, Ovčí hora . . . . .              | 93   | Valeč . . . . .                   | 134  |
| " řimická hora . . . . .                           | 107  | Valečské okolí . . . . .          | 106  |
| udná . . . . .                                     | 81   | Varta — Voč . . . . .             | 106  |
| řizovická hora . . . . .                           | 57   | Vartmberk, Ostrý . . . . .        | 83   |
| " " nad Kláš . . . . .                             | 128  | " Limberk . . . . .               | 55   |
| " " vrchol . . . . .                               | 130  | " , velký Jelení hřeben . . . . . | 110  |
| " " jižní úpatí . . . . .                          | 132  | Vartmberk, Vinohrad . . . . .     | 112  |
| " " (chem. rozbor) . . . . .                       | —    | Veleň, Malá . . . . .             | 124  |
| idka, Malá skála . . . . .                         | 132  | Velenice . . . . .                | 79   |
| árov, Karabínská hora . . . . .                    | 182  | Veliš u Jičína . . . . .          | 112  |
| " " " nad Kláš . . . . .                           | 88   | Vernefice, sev. návrší . . . . .  | 140  |
| řebořice, velká Jelení skála . . . . .             | 114  | Veršetín . . . . .                | 149  |
| řinčice u Biliny . . . . .                         | 68   | Veselí, Horka . . . . .           | 119  |
| kláv mlýn . . . . .                                | 94   | Vinařice . . . . .                | 58   |
| uknov . . . . .                                    | 47   | Vitín . . . . .                   | 148  |
| řecarský mlýn mezi Boštěčicemi a Bukovem . . . . . | 144  | Vlčí hora u Černošína . . . . .   | 178  |
| šchlovice . . . . .                                | 125  | Vratislavice . . . . .            | 94   |
| " " " " . . . . .                                  | 64   | " " " " . . . . .                 | 124  |
| eplice, Lipeny . . . . .                           | 70   | Vrabčinec . . . . .               | 138  |
| olcberk . . . . .                                  | 159  | Všechlaby, Kamýk . . . . .        | 49   |
| rmické návrší vých. . . . .                        | 64   | Zabity, Český Dub . . . . .       | 71   |
| řínská hora . . . . .                              | 109  | Zajícov . . . . .                 | 66   |
| řiblice, Kuzová hora . . . . .                     | 122  | " " " " . . . . .                 | 163  |
| urč — Doupov . . . . .                             | 107  | " " " " . . . . .                 | 170  |
| stí n. L., jižně . . . . .                         | 55   | Záhoř . . . . .                   | 100  |
| " " " Vrkoč . . . . .                              | 84   | Zákupy, Kamenická hora . . . . .  | 94   |
| " " " Špiglberg . . . . .                          | 117  | Zálesí n. L. . . . .              | 134  |
|                                                    | 80   | Žatec, Pšovský vrch . . . . .     | 86   |
|                                                    |      | Žichov u Kozlů . . . . .          | 150  |






1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.









Tab. II.











Tab. IV.






Tab. V.





1

2



Лит. 4. Актинитовый шпат



